

C
066
110
(343)

NUEVO MÉTODO

Farmacológico infantil.

POR EL

DR. A. P. G.

DEPÓSITO EN LA FARMACIA

DE

D. MIGUEL GONZALEZ PERALES.


PLAZUELA DE S. GIL GRANADA.

1882.

Imprenta del «Anunciador,»

Darro del Camgillo.

125-6850



NUEVO MÉTODO
Farmacológico infantil.

POR EL

DR. A. P. G.

DEPÓSITO EN LA FARMACIA

DE

DON MIGUEL GONZALEZ PERALES.

PLAZUELA DE S. GIL GRANADA.

1882.

Imprenta del «Anunciador.»

Darro del Campillo, 15.

LISTA

de los medicamentos y las indicaciones terapéuticas que pueden llenarse con ellos en la patología infantil (1.)

ACÓNITO.

Antiflogístico que equivale, para los niños, á la sangrias y sanguijuelas, Hemorragias activas, Sustos, Congestiones, Sarampion.

ARNICA.

Contusiones, Caidas, Traumatismos en general.

(1) Colocamos las sustancias siguiendo el órden alfabético de sus nombres, para que se puedan encontrar mas rápidamente por el lector.

ARSÉNICO.

Tónico, Diarreas negruzcas pestíferas, ó tambien acuosas, con ó sin dolores intestinales; sobre todo en verano. Fiebres intermitentes, no palúdicas. Abusos del sulfato de quinina. Anasarca. Síntomas asmáticos infantiles. Ulceraciones fagedénicas.

AZUFRE.

Herpetismo. Atrófias. Erupciones cutáneas escrofulosas. Escoriaciones aftas y oftalmias de los recién nacidos. Después del sarampión, en niños escrofulosos, raquíticos y herpéticos.

BELLADONA.

Congestiones cerebrales. Accidentes nerviosos; tos nerviosas; delirios; neuralgias y convulsiones. Erisipelas simples. Escarlatina.

BRIONIA.

Bronquitis, pleurexia, pulmonia. Dolores articulares y musculares que se exacerbán con los movi-

mientos; supresion brusca del saranpion; principalmente, si se acompaña de sintomas bronco-pulmonares.

CAFÉ.

Excitaciones nerviosas con insomnio ó sin él.

CARBONATO DE CAL.

Escrófulas y raquitis. Retardos de osificacion y denticion. Diarreas por salida dentaria. Debilidad muscular.

FOSFATO DE CAL.

La misma indicaciones que el carbonato de cal.

FÓSFORO.

Pulmonia. Laringitis crónica. Hemorragias. Diarreas que se han hecho refractarias á los demás medicamentos.

GELSEMINA.

Accidentes convulsivos infantiles de indole neu-rósica.

IPECACUANA.

Gastricismo y sus fiebres. Vómitos Afecciones asmáticas infantiles. Tos convulsiva. Excitaciones por abuso del café.

MANZANILLA.

Denticion trabajosa con sobreexcitaciones nerviosas, erupciones simples, gingivitis, ronqueras y toses del mismo origen. Efectos generales provocados por grandes llantos y caprichos contrariados de los niños.

MERCURIO .

Sífilis. Sudores abundantes. Aftas. Otitis y otalgias Hepatitis.

NUEZ VÓMICA.

Dispépsias. Fiebres gástricas. Estreñimiento ¡Prolapsus rectal y hernias!

PULSATILA.

Fiebre. Diarreas mucosas. Afecciones gástricas mucosas y biliosas. Desórdenes de la micción. Horquitis. Catarros. ¿Otorreas purulentas?

QUINA.

Tónico. Convalecencias. Hidropesias. Infartos hepáticos y esplénicos crónicos. Hemorragias pasivas.

RUX TOXICODENDRO.

Erupciones cutáneas con escrecion amarillenta. Erisipela vexiculosa. Costra láctea. Tiña. Afecciones de las membranas sinoviales ¿Tifoideas?

SÍLICE.

Escrófulas y raquitismo. Enfermedades óseas. Ulceras no específicas. Supuraciones excesivas.

VERATRINA.

Eclampsias y convulsiones epileptiformes.

INDICACIONES

de los medicamentos alternados.

ACÓNITO Y BRIONIA.

Flegmasias bronco pulmonares.

ACÓNITO Y PULSATILA.

Sarampion y fiebres inflamatorias.

ARSÉNICO Y QUINA.

Tónicos. Lienterías.

BELLADONA Y GELSEMINA.

Accidentes epileptiformes. Congestiones cefálicas por denticion, acompañadas de delirio y convulsiones.

BELLADONA Y VERATRINA.

Eclampsia. y Epilepsia.

MERCURIO Y BELLADONA.

Anginas. Oftalmias escrofulosas.

MERCURIO Y QUINA.

Ictericia. Hepatitis.

RUX TOXICOD. Y BELLADONA.

Erisipelas complicadas.

INDICACIONES

1. Se debe utilizar el producto en las siguientes condiciones:

2. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

INDICACIONES

3. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

4. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

5. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

6. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

INDICACIONES

7. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

8. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

INDICACIONES

9. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

10. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

11. El producto se debe aplicar en las siguientes dosis:

REGLAS.

Tales son las indicaciones farmacológicas que hasta hoy hemos podido comprobar. Mas el médico que quiera llenarlas con provecho, debe tener muy en cuenta las reglas siguientes.

1.^a—No olvidar jamás que muchas veces es difícil hacer diagnósticos completos de las enfermedades infantiles; en cuyo caso, hay un recurso que puede usarse con éxito notabilísimo, y al que de buen grado reduciríamos todas las indicaciones infantiles, si no temiéramos una negligencia diagnóstica punible. Consiste en elegir los medicamentos atendiendo solamente á los síntomas culminantes que presenta el niño, y combatirlos uno á uno.

2.^a—El farmacéutico posee una preparacion de cada sustancia incluida en la lista que precede: se

denomina *Elixir de Chust*, anteponiendo al nombre del autor el de la sustancia recetada. Así, por ejemplo: si se quiere recetar la belladona, se ordenará, *de elixir de belladona de Chust*.

5.^a — La fórmula de todos los medicamentos dichos, ha de ser siempre la de cinco centigramos de la preparacion elegida disueltos en treinta gramos de agua natural y á la temperatura ordinaria. De este modo se logra un líquido incoloro, inodoro é insípido; circunstancias que permiten al niño tomarlo sin oposicion, en todo caso.

4.^a — En los enfermedades ó síntomas agudos ó intensos son las dosis; una cucharada ordinaria de la disolucion antes dicha (5 centigramos en 30 gramos de agua) cada seis, cuatro, tres, dos una ó media horas, segun que la intensidad ó agudeza sean menores ó mayores.

5.^a — En las enfermedades crónicas las dosis se darán en la cantidad de tres cucharadas ordinarias al dia. Exceptuánse de esta regla las llamadas *diatísicas* (escrófulas, herpetismo etc.) en las cuales se hará tomar la misma dosis dos veces á la semana, ó una vez cada siete ó quince dias. Tambien se exceptuan los tónicos dados para combatir las debilidades anémicas y convalecencias: en estos casos se dará una sola cucharada dia iamente.

REGLAS IMPORTANTÍSIMAS.

1.^a—De ningún medicamento se ordenará mas *tomas* desde que la enfermedad ó síntoma que se combata haya desaparecido.

2.^a—Nunca se asociarán dos ó mas sustancias medicamentosas en una misma fórmula.


3.^a—Si hay necesidad de usar dos ó mas medicamentos para llenar otras tantas indicaciones, se darán las cucharadas que contengan cada una, separándolas por un intervalo de una hora lo menos.

4.^a—En síntomas intensos, se dejará de administrar la sustancia elegida, si pasadas seis *tomas* ó cucharadas del líquido formulado no se observará ningún alivio. Entónces, ó se cambiará el medicamento, ó se añadirá otro que alterne con él.

NOTAS.

A. En estudio todavía otras indicaciones de los medicamentos apuntados, y las de otras sustancias, se promete al lector ampliar este impreso cuando la práctica consienta dar mas seguridades.

B. Los Sres. farmacéuticos que deseen adquirir las preparaciones medicamentosas dichas, pueden dirigirse á la farmacia de D. Miguel Gonzalez Perales, Plazuela de S. Gil en Granada; e indicando la manera, se les enviará, ya la coleccion de *Chust*, ó ya frascos no coleccionados que contenga las preparaciones de las sustancias que indiquen.




REVIEWS

The first of these is the book by Mr. [Name] on the subject of [Topic]. It is a very interesting and well-written work, and is highly recommended to all who are interested in the subject. The author has done a great deal of research, and his conclusions are well supported by the facts. The book is well illustrated, and is a very good example of the art of writing. It is a very valuable addition to the literature on the subject, and is highly recommended to all who are interested in the subject.

The second of these is the book by Mr. [Name] on the subject of [Topic]. It is a very interesting and well-written work, and is highly recommended to all who are interested in the subject. The author has done a great deal of research, and his conclusions are well supported by the facts. The book is well illustrated, and is a very good example of the art of writing. It is a very valuable addition to the literature on the subject, and is highly recommended to all who are interested in the subject.

The third of these is the book by Mr. [Name] on the subject of [Topic]. It is a very interesting and well-written work, and is highly recommended to all who are interested in the subject. The author has done a great deal of research, and his conclusions are well supported by the facts. The book is well illustrated, and is a very good example of the art of writing. It is a very valuable addition to the literature on the subject, and is highly recommended to all who are interested in the subject.



NEVO METODO

Farmacologico infantile

PER IL

DR. A. P. G.



ARMAMENTA

MIAMI, GEORGE P. BROWN

PHARMACEUTICALS & CHEMICALS

INDICAZIONE D'USO

DELLA PREPARAZIONE