

THE  
C. M. C. J. C.  
M. C. J. C.

A  
18-388





28 12 4 1



Biblioteca Universitaria  
GRANADA

Sala A

Estante 18


Tabla 388


Numero


i11850760



1829











R. 2443  
PRACTICA  
MEDICINÆ  
GENERALIS

A  
IO. TACOB O VVECKERO  
POLIATRO COLMARIEN.  
VII. libris explicata



FERRARI

Per Benedictum Mamarellum

Superiorum, permissu. 1589.

De Andrus P. d. s. i. o. u. e. s. o. c. i. a. t.

La...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...

ob  
co  
se  
se  
di  
et

SVMMO CHRIS-  
TIANI ORBIS  
IMPERATORI  
CÆSARI RODOLPHO  
II. AVGVSTO.

**L**iam si Telemachi verum  
illud esse, sciam CÆ-  
SAR inuictissime, ma-  
gnos magna, paruos par-  
ua decere: adeoq; si meã  
obscuritatem cum S. M. T. splendore  
componã, ab instituto meo penitus di-  
scedere debuerim: argumēti tamen su-  
scepti, dignitas & amplitudo non mo-  
dò in sententia me confirmavit, verum  
etiã Cephese dictum discipulũ conten-

tius tibi as inflātem cedentis, in memo-  
riam reuocauit οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ δὲ  
ἀλλ' ἐν τῷ δὲ τὸ μέγα positū esse. Nam  
cū id demū verè magnū censerī debe-  
at, q̄ in suo genere perfectū existit: per-  
fectio autem non aliunde, si Peripateti-  
corum Principi credimus, quā ex vir-  
tute pendeat: at virtus sui possessorē bo-  
num efficiat: consentaneū sanè videtur,  
id quod cōparatione aliorū magnum, est  
bonū itidem verūq; existimari debere.  
Qua quidem rōnis inductione, Medici-  
nā non modò inter vtilissimas hominum  
vitæ artes recipi, verūm ēt plerisq; præ-  
ferri, sapiens antiquitas meritò censuit,  
eiusdemq; inuentionē Dīs immortalib.  
attribuit, vsū & exercitationem sum-  
mis regibus familiarē esse deprehendit.  
Etenim si q̄ in œconomia Pater est, id

in

in politia Rex: nō minus regi, pro salute  
populi excubāti, salubritatis, quā reli  
quorū ad vitam oportunorū presidiorū  
cognitio, necessaria esse videbitur. Ut  
proinde minus miremur, Catonem pris-  
cum in re rustica pertractanda ea, quæ  
ad familię morbos vel præcauendos uel  
depellēdos facere possunt, curiosè descri  
bere solitū: cūm Homerus, sapiētīę oīge-  
næ Oceanus, Agamemnona illū ποιητῆρα  
λαῶν, in pestilentīę, quę Græcorū exer-  
citū inuaserat sedende rōne cessantem,  
& oscitantem, ab Achille, nō minus Chi-  
ronijs, quā Martijs artibus instructo  
heroe, p̄ cōcione reprehēdi introducāt.

Magna igitur Medicina est, propter  
auctores magnos, Deos uidelicet, & qui  
vel sacrarū literarū testimoniō, Deorū  
terrestriū locū obtinent, Reges atque

Principes. Sed ut hæc nobilitatē Medici  
nē cōmendant, ab Artificibus desumptā:  
ita est alia magis propria eiusdē cōmen-  
datio, ab arte ipsa petita, quatenus habi-  
tus verus est methodicè traditus: p̄ quē  
solum Methodici seu Dogmatici medici  
ab Empiricis differūt, & à quo solo arti-  
fices nō immeritò appellari debent. Hu-  
ius uti primus inuētor, & cōstrutor fuit  
Hippocrates, sic ampliator et designator  
Galenus: cui fortassis operibus artis mul-  
ti, præceptionibus verò nulli cōferri pos-  
sunt, cū quicquid posteriores Græci Ara-  
bésue boni habent, hoc est methodici, id  
ex Galenicis fontibus hausisse, & quoti-  
dianę tantū experientiæ exemplis locu-  
pletasse videātur. Sed q̄ summo illi viro  
& à nemine præter q̄ docto satis laudato  
à nemine præter q̄ indocto petulanter cō-

temto, vitio datur, Methodi virtutē pri-  
mam, ordinē. s. et perspicuitatē, orationis  
prolixitate, ab eo fuisse obscuratā, id v̄t  
per se verū sit, at neq; ex confesso ne-  
que ex professo. Namq; virū illū verē  
magnum non magis patrie vitio (nam ple-  
riq; ad Asiaticum dicendi morē confu-  
giendo, dum Galenū excusare conātur,  
vitiōsam illius institutionē, per quā hoc  
ipsum, licet populare vitium, emendari  
debuerit, accusare videntur) quā cer-  
to consilio, vt Hippocrate e breuitati lu-  
cem inferret clarissimā, hoc ipsum facti-  
tasse, vel ex eo liquet, quōd in præclaris  
illis de Arte medicinali, & de Cōstitu-  
tione artis cōmentarijs, satis ostēdit, quā  
ta breuitate artē ipsā tradere potuerit.  
Medicinā ab illo multis libris fufissimē  
traditā, sed & pro diuersa scribendi oc-



casione non semper eo, quæ theorematū  
ab ipso propositorum series requirebat,  
ordine explicatā, nos Galenicæ methodi  
terminis circumscriptam, in locos com-  
munes retulimus, recisis supervacuis,  
alienis in suū locum relatis: & nequid  
in hoc genere deesset, posteriorū quoque  
Græcorū scripta, eadē methodo in classes  
certas redegimus, ut hac ratione inte-  
grā Medicinā Græcorū, vno veluti cor-  
pore cōprehensam, magno cū studioso-  
rū fructu, & verò etiā temporis compē-  
dio, Asclepiadeis hominibus exhibere-  
mus. Et iam profectò diligentia & labo-  
rē nostrū publicè spectandū proposuisse-  
mus, nisi Typographicę remorę hac in  
parte vota publica impediuisent. Inte-  
ra dum Iouis Olympici gigantea statua  
expectatur integra, in singulis partibus  
peri-

periculū artis facere, methodiq; specimē  
exhibere, nō alienū nobis visum est. Ad  
eoq; ex quinq; Medicinæ partib. eā quæ  
sibi eximiē Therapeias nomē uēdicauit  
hocce Enchiridio vniuersim delineare  
studuimus: ut quēadmodū Geometre am-  
plissimā uniuersi machinā exili interdū  
globo cōprehendūt, & minore quidē cū  
labore, at non minore cum ingenio

Terrarum tractusq; maris cœ-  
lumq; profundum

oculis hominū subiiciunt: ita quoq; nos  
diuinos illos methodi Therapeutice li-  
bros, à Galeno scriptos, in hanc formā cō-  
trahere. & heterogenea ab homogeneis  
segregātes, purā putam curatiuam me-  
thodum exhibere voluimus. Ergo siue  
propter authorū amplitudinē, siue prop-  
ter methodum opusculum hoc, mole qui-

dem exiguum, sed virtute magnū, tibi,  
RODOLFE AVGVSTE, maxi-  
mo Christiani orbis Imperatori, ea qua  
debet submissione, offero, ut quemadmo-  
dū hoc ipsum maioris operis rudimentū  
erit, D.O.M. benè fortunāte: sic feliciss.  
Imperij tui initij Rex ille regū, & Dñs  
dominantium, ea addat pacis ornamenta,  
belliq; decora, ut domus Austriaca, quę  
constati Electorū voluntate incompara-  
bili inter Christianos Principes exēplo,  
tot iam cōtinuata serie Imperatores, nō  
minus in rectè sapienterq; gubernanda,  
quàm in fortiter defendēda Rep. clariss.  
protulit, ea per te incrementa suscipiat,  
ut ex homericis Hectoris voto, nō tantū  
patrē tuū Maximiliadū II. sapienti mo-  
deratione, Ferdinandū auū sanctimonia  
vitęq; innocentia, Carolū V. patrum  
for-

fortitudine, verum et ut maiores tuos nunquam  
quam satis laudatos, haec nisi heroico stylo  
celebrandos, Maximilianum I. Fredericum III.  
Albertum II. atque I. ipsumque generis tui  
illustratorem Rodolphum I. a quo nomen trahis  
felicitate, et pietate, hac quidem Deo  
immortali, illa mortali generi conciliandus,  
ad aequos atque superiores. Hanc voti  
publici summam, is qui solus potest, ratam  
faciat, ad Christiani orbis tranquillitatem,  
et priuatorum S. M. T. deuotorum (inter  
quos occasione potius quam affectione me  
vel a deuictissimis vinci patiar) salutem,  
et incolumitatem.

Colmaria A. d. IV. kal. Martij,  
An. Sal. M. D. XXCV.

S. M. T.

Humillimus cliens

Io. Iacobus Vaeckerus.



C L. V.

IO. IACOBO VVECKERO  
Medico Asclepiadeo

*Ἰακώβου*

Clinico lauti, excellenti,  
experienti

ob MEDICINAM multis iampridem  
vigiliis & monumen-  
tis illustratam,

nunc demum hoc paruo quidē  
sed ingenioso opere

summam eiusdem *ἐν θεωρίᾳ*

*καὶ πράξει* feliciter tentatam

*Ἰατρικῆν*

Theorematis practicis verè,  
germanè, catholiceq;  
constitutis

omni ἀμνηχανία καὶ ἀλογισία in mor-  
borum causis, in remedio-  
rum ὁρέσει, μίξει, διακρίσει  
καὶ ἐφαρμώσει longif-  
simè profligatis

Regia deniq; via ad medendum  
citò, tutò iucundeq; a-  
perta, & compla-  
nata

IAC. MOCCIUS MEDICVS


Ex

V. M. L. D. E. Q.

L. M.

P.





IN METHODVM VNI-  
uersalem perueniendi ad Praxin  
D. D. IO. VVECHERI,

D. Agnati sui obseruandissimi.


ὁ χάρισι κόντε γὰ παρανετικὸν ἔπος.

*Jonathę Meieri Basiliensis .*



*Vnc librum, præclare tibi VE-  
CKERE remitto  
Excusum prælo, te cupiente, meo.  
Et te nunc docti toto venerantur in orbe,  
Pro medicis donis auxilijsq; tuis.  
Hic generalis. n. medicine præxis habet,  
Ingenti quæ non utilitate caret.  
Nos et te nunc merito veneramur honore  
Proq; tuo studio, proq; favore tuo,  
Hoc q; opus doctum nostro comiseris aeri,  
Illustrèq; typos quod tua scripta meos  
Nec cessas posthæc Praxim, fœtusq; priores  
Pergis: et egregium nunc meditaris Opus.  
Utq;*

*Uigil legit hęc cupido mō pectore lec-  
Qui fruit toties teq̄ tuisq̄ libris: (tor,  
Sic plures admiratur, sperat q̄ futuros:  
Teq̄ petit libros pollicitante nouos .  
Pergas sic nobis Specialē absoluerē Praxi  
Facta h̄ pollicitis adde petita tuis:  
Atq̄ illam potius praelis suppone tuorū,  
Ut videat, lucem per mea praela diu.  
Perge tuis medicas ornare laborib. artes,  
Utq̄ facis, praelis perge fauere meis .  
Sic duce te crescūt cupidi bona pub. mūdi  
Cōmendat, nomen sic tua fama meū .  
Sic alacri vigiliq̄ fide, sic tempore laeto  
Te consanguineū magnificabo meum.  
Sic ego sic oīs medicis imbutus ephēbus  
Artibus, aeterno tempore gratus erit .  
Et nomen sine fine tuū super astra feretur  
Rem Medicā tali quod ratione iuuas.*





❧ I D E Æ ❧  
HIPPOCRATEÆ AD ME-  
dicam Praxin simul, &  
Theoriam facientes  
APHORISMI.



EDICVS Philosophus dijs  
æquiparandus, Doctus e-  
sto, Bonus, & in arte po-  
tens: nempe vt Sciat, Velit  
atque Possit de genere' humano in  
sanitate custodienda reuocandaq;  
benè mererj,

Proinde duo in eo requiruntur sūma,  
*ἡ πρώτη* medicū, & *ἡ δεύτερη* in medica  
*ἡ πρώτη* medicum in Dogmatica præ-  
ceptorum cognitione, & Historica  
designatione exemplorum ad artē  
pertinentium consistit.

Quarum

APHORISMI.

Quarum utraque & Naturæ rectam  
conformationem, & Doctrinæ fide-  
lem institutionem, & Experientiæ  
insuper diligentem confirmatio-  
nem requirit.

Εὐχρηστών verò siue Elegantiâ medi-  
ca, à qua Gratiofi Asclepiadæ olim,  
hodie Excellentes appellantur, tan-  
quam externa personam artificem or-  
nat secundùm Animum, Corpus,  
& Fortunas.

Ad Animi ornatũ faciunt Instrumẽta  
philosophiæ, eiusdemq; Habitus.

Instrumentis nitatur oportet tum Ra-  
tionis, à Logica: tum Orationis pu-  
ræ, & elegantis, à Grammatica, à  
Rhetorica, & uerò etiam à Poetica  
mutuatis.



Ha-

Habitus philosophici ad Cognitionē,  
 & Actionē pertinentes sunt Varij.  
 Cognitionis habitus ad Medicum or-  
 natum faciunt, alij magis, alij mi-  
 nus. Theologia in primis, tanquā  
 basis. Physica deinde, amplissimas  
 colonias ex se deducens. Anato-  
 miam, Rhizotomiam, Pharmaco-  
 pœiam, & sub hac Chymiam. Ma-  
 thematica denique, vt non necessa-  
 ria, saltem pedissequa. Ex quibus  
 sapiēs medicus iure denominatur.  
 Actionis verò habitus ad Probitatem  
 eiusdem conferentes nobilissimas  
 ex se actiones deducunt.  
 Sic Prudentiæ Medici conuenit In-  
 loquendo & disserendo argutum  
 & neruosum esse: In deprehenden-  
 dis

*A P H O R I S M I .*

dis ægrorum adstantiumue erroribus & decipulis sagacem.

Fortitudine sit ea animi, vt ne vel terrorem vel confidentiam excitantibus supra quàm decet moueatur.

Munditiè corporis amplectatur, multo verò maximè eam quę animi est: quoad alimenta frugalis. quoad venerem etiam suspicionis expers.

Quæstum ex opera operæue medico turpem fugiat.

De mercede nunquam paciscatur præterquam confidentiæ ægri excitandæ causa.

Præmia ne promissa quidè auarè exigat ab ijs qui possunt, qui non possunt, ne speret quidem.

Honoris contemptor esto, nisi quem



artis peritia non emendicatū ultrò  
 offert. Parcus sui ipsius laudator, nec  
 nisi urgente necessitate recitator.  
 Seuerus in ijs, qui artis successum im-  
 pedire possunt erroribus: benignus  
 in cæteris, & miserix ægrorum se-  
 riò condolens.

Ne' quidem errores suos fateri, & a-  
 lios suo exemplo cautiores reddere  
 super sedeto.

Medicorum aliorum congressum, &  
 conuersationem ultrò expetito.

Morbum leuem & salutarem uerbis  
 ne aggruato.

Euentum morbi præscitum nunc præ-  
 dicit, ad ægri obedientiam exci-  
 tandam, artisue calumniam auer-  
 tedã: nunc dissimulato, ne morbus

*A P H O R I S M I .*

corporis, animi morbo augeatur.

Remediorum præstantiam præciūue  
nūquam quæstus, sed auctoritatis  
interdum causa mentitor.

Quæ uel in arte uel extra artem cæla-  
re præstat occultato.

In alienis obseruandis censendisue,  
nec curiosus nec acerbus esto.

Aliorum successibus nec inuidero,  
nec obtrectato.

Humanus, & popularis egra omnes  
minimè tamen garrulus.

Non morosus, & acerbus, nō scurilis,  
& ridiculus.

In familiaritate contrahenda facilis,  
in conseruanda officiosus, in consi-  
lijs placidus. (titor.

Orōne breui, sed arguta & sētētiosa v-

I D E Æ

Vultu grauitatem simul & blanditiã  
præfero.

Aegrum sedatè, & si morbus postulet,  
frequenter visitato.

Modestè assideto, interrogato, tangi-  
to, considerata perpendito.

Turpia dicta factaq; auersator oïa.

Religionem & pietatē vt Dei & Natu-  
ræ minister non fucatè colito.

Numinis in cōsulendo agendoq; gra-  
tiam atque pacem exorato.

Aegrū ne quacūq; de causa suspēdito.

Præceptores parentū loco colito, eorū  
dē filios pro fratribus cōplectitor.

Medicos collegas tum aliàs, tum præ-  
fertim in cōsultationib. absq; inui-  
dia, & sugillatione audito, doceto.

Aliena contrectare ne in animum  
quidem

*A P H O R I S M I.*

quidem inducito.

Atque ut animus Medici Philosophi  
benè quoque habitet, corporis or-  
namenta accedant opportuna.

Aetas iuuenilis quidem tolerantia &  
officio, sed senilis sapientia & iudi-  
cio præstat. Intermedia utroque  
participat.

Habitu corporis bono sit, ne vulgatū  
illud objiciatur, cura te ipsum.

Vestitum nec sordido, nec luxurioso,  
nec peregrino, sed mundo & fruga-  
li & ad peregrinationes actionesq;  
medicas oportuno vtor.

Non sordidus, non comtulus, sed niti-  
dus atque lautus esto.

Ab odorib. & vnguentis abstineto.

Hisce ex Fortunis quoque penitus or-





natus adstipuletur.

Comitatum, & pompam discipulorū  
egrorūque sanitati restitutorum,  
tabellarum item atque diplomatum  
ostentationem agyrtis relinquitō.

Testimonium prouectus in arte, non  
sua sed ægrorum confidentiæ cau-  
sa, à bonis atque doctis accipito.

A ratione non à fortuna totus pende-  
to. Fortunam in Artem, nihil in Ar-  
tificem non nisi concedente Numi  
ne aliquid posse persuasum habeto  
Nobilitatem ex Asclepiadea profes-  
sione potius quàm ex maiorum cla-  
ritate, consecrator, tuetorq;

Ex his fontibus porrò Προσαρίη siue  
Præfectura medica, triplici ornatu  
instructa, in mediam hominum ui-

tam

# APHORISMI.

tam prodiens, uarijs operibus sese  
spectandam exhibebit, siue Officia  
perpendatur, siue personæ.

OFFICIORVM genera nisi metho  
di terminis circumscriberentur, pro  
pe innumerata censi possent.

Huius sunt loci, Locorum quo ad  
aerem, aquam, cælum, diligens  
inspectio.

Chirurgicarum operationum obser  
uatio: Remediorum exploratio:  
Præceptorū methodica perceptio.

Diligens morbi mutationis atque e  
uentus prædictio, Morbi præsen  
tis cognitio, inuestigatio, ab ægro,  
ab astantibus.

Naturæ ante omnia imitatio.

Communicatio præceptorum simul,



s

&

I D E Æ

& exemplorum artis fida erga discipulos.

Aegros & adulantes sui officij admonere, securos terrere, meticulos erigere.

Non perfunctoriè, non temerè, non nimis curiosè artis munia obire.

Occasionem præsentem apprehendere, futuram patienter expectare.

Inspectatis nec confidere, nec supra modum terreri.

In suscipiendis aggrediendisq; morbis, nec temerariû, nec meticulosû esse.

Nullus operis operæue medicæ subpudere.

Præcipitantiam in motu, incessu administratione fugere.

Grauitatem in sermone, sessione, incessu

*A P H O R I S M I.*

- cessu, vestitu amplecti.
- Auctoritate velet heroica excellere,  
imperando necessaria, prohibendo  
noxia, reprehendendo errata.
- Aegro, dissimulato sordium fastidio,  
comiter assidere.
- Pauperibus gratis mederi.
- Peregrinos præ cæteris humaniùs cõ-  
plecti.
- Ingratos & auaros, quatumuis dignos  
qui negligentur, in morbo præser-  
tim ancipiti, non derelinquere.
- In agendo promptum, expeditum, dex-  
trum, elegantem esse.
- Instrumentis medicis diligenter & oportu-  
nè paratis domi abundare: foris ne-  
cessaria tm̄ & expedita secum ferre
- Memoria remediorũ formas tum sim-  
pli-

plicium tum compositorū tenere: ad eiusdem subsidiū nihilominus aduersaria in promptu habere.

In ijs quæ offeruntur alimentis medicamentisquæ elegantia lantiaquæ studere.

Ægri cupiditati neque adulatoriè blādiri, unde morbus augeatur: neque crudeliter reluctari, unde animus ægri à cura absterreatur.

In chirurgicis operibus administrandis celeriter & expeditè agere, iucundè & indolenter agere, securè atque tutò agere.

Consuetudinis atque uirium ægri in primis rationem habere.

Quòd si nunc Personis cōsideremus, eadem ipsa officia in tres classes diuidi

*A P H O R I S M I.*

uidi possunt quorum alia Aegrum,  
alia Astantes, alia Medicos ceteros  
respiciunt.

Aegri animo prius quàm corpori me-  
dendum.

Ea quæ agrū scire par est, docere, quæ  
opinari, persuadere: nunc confiden-  
tiam, nunc timorem exprimere.

Ea quæ agrum facere oportet, dicta-  
toricè imperato: interdum quoque  
in parem gratiam aliquid remitti-  
to, & indulgentia leui grauiorem  
obedientiam mercator.

Quæ agrum ignorare conuenit, cæ-  
lato, dissimulato, callidèue inter-  
pretator.

Morbū modò difficile, ut obediat, mo-  
dò facilè, uti ne deturget; simulato.

Nihil

I D E Æ

Nihil superbè promittito: ad Dei potentiam, & Naturæ obedientiam artis opera omnia referto.

Remedijs nunc varijs, nunc paucis v-  
tendum affirmato: illud ne festinet,  
hoc ne animum despondeat.

Medicum nec auarum, nec infidū &  
desertorem fore fidem facito.

A quibus abstinere debet, partim mi-  
nis, sed, vt erga hominem liberum,  
modestis, extorqueto, partim blan-  
da admonitione abducito.

Adstantes; ægro gratos, & acceptos  
præstato: ingratos abigito.

Iisdem morbi naturam & causas non  
multis ambagibus, sed apertis simi-  
litudinibus explicato.

Euentum prædictione occupato.

Tumul-

*A P H O R I S M I .*

Tumultus ex confidentia vel desperatione ortos cohibeto, corrigito.

Ad imperara dextrè & fideliter facièda nunc pollicitatione nunc interminatione cogito .

Fidei astantium quorùmuis ne fidito, in eorum præsertim quæ maioris sunt momenti remediorum subministratone'.

Medicorum aliorum in mor'oo tum periculoso, tū salubri, sed propter ægri nobilitatem inrositatèmue' difficili, introductionem expetito, ne dum subterfugito .

Absque contentione, & altercatione' & inuidia, non priuati, quæstus, vel gloriæ, sed ægri salutis & veritatis causa, consilium dato, admittito .

*Em.*



I D E Æ

Empiricorū consilia, propter metho-  
di ignorantiam cōtemnito: media  
uero tanquam omniparentis Natu-  
ræ dona, examinato, & nisi potior  
ratio dissuadeat admittito.


Præceptorū ab doctrina & experiētia in-  
structiorū, quicūq; ætate iuuenis es  
cōsilia expetito, monita admittito.

Discipulis præcepta fideliter commu-  
nicato, exempla cōmostrato, admi-  
nistrationis, quādo licet atq; datur  
comites & inspectores & adstites,  
& custodes adhibeto, sed iam ætate  
matturos, & præceptis artis eruditos

Contrariæ sunt Medicorū improbo-  
rū & sophistarum, artis pulcerrimæ  
professione ad quæstū & amitionē  
abutentium, notæ atq; noxæ. So

PRAC-

I  
PRACTICAE GENERA-  
LIS TYPVS.



PRACT. GENERAL. TYPVS.

A a Cō  
sidera-  
tio insti-  
tuenda

Finis nēpe a-  
ctionis Medi-  
cus ab actione  
incipit. Inde  
ad instrumen-  
ta p̄greditur.  
Antequam e-  
nim instrumē-  
tari incipiat  
prius perspi-  
cit, an agere  
possit Deinde  
quid agere de-  
beat. Sic ergo  
Medicus per-  
pendit.

Efficientium  
Cū Medicus  
agat p̄ instru-  
menta necesse  
est, ut cogni-  
tionē habeat  
tum

An mor-  
bus cura-  
ri possit.  
Multi nā  
que mor-  
bi solis p̄-  
sagijs re-  
linquendi  
sunt.

Quid fie-  
ri debeat.

De his  
Lib. II

Diætæ. Lib. III.

Pharma-  
ciæ: vide-  
licet me-  
dicamen-  
torū tum

Simpli-  
ciū Lib  
III.  
Cōpo-  
sitorū  
Lib. V.

Chirurgiæ. Lib VI.

PRACT.

PRACT. GENERALIS,  
LIBER I.

ARGUMENTVM

De partium affectarum, affectuūq;  
& causarum cognitione agit.

Eius autem capita  
hæc sunt.

**Q**uibus notis locus affectus de-  
prehendi possit, Cap. 1.

De locis affectis p se, & p  
consensū & quot modis pars aliqua  
corporis percōsensum afficiat. C. 2

De notis, quibus affectus dignoscan-  
tur, Cap. 3.

De morborum generibus, Cap. 4

De symptomatis in vniuersum, Cap. 5

De notis, qb. causæ cognosci possint C. 6

De morborū causis in vniuersū, C. 7

+

❁❁❁❁❁❁

P R A C T I C A E  
G E N E R A L I S  
L I B E R I.

*Proœmium totius operis.*



Q MNIS docendi via, ac ratio, præcipit, vt à generalibus ad particularia progrediamur. Itaq; efflagitantibus quibusdam medicæ artis studiosis, & candidatis, vt librum de curandis humani corporis malis conscriberem, generalẽ prius methodum describendam fore putavi, qua tandem facilius & promptius in particularibus sese exercent, cum in vniuersalibus methodus, in particularibus exercitatio consistat. Methodus ergo est, in ægrotis primò perscrutari, quæ nam corporis pars affecta sit, & quo-

5

quomo lo, primarione, an per consensum  
alterius cuiusdam particulæ: deinde quis  
sit affectus præternaturâ, num morbus,  
vel symptoma: tertio quæ sit eius causa:  
Postremò an is affectus curari valeat, &  
quomodo, & quibus instrumentis. His  
enim incognitis, fieri nequit, ut probè cu-  
ratio absoluator. Qua autem via, ac ratio-  
ne valeat quispiam affectam sedem om-  
nem, ac quemuis præternaturam affectû,  
eiusque causam dignoscere, ac demum  
affectum ipsum, si is curari possit, propu-  
gnare, & quibus instrumentis, iuxta Hip-  
pocratis & Galeni doctrinam, hoc  
opere scribere aggrediar, ini-  
tio à læsis particulis  
sumpto.



6 PRACT. GENERALIS  
*Quibus notis locus affectus deprehen-  
di possit, Cap. I.*

**I**Taque ante omnia Medicus in curandis singu-  
lis corporis malis, partium corporis, quas lo-  
cos nominare consueuimus, notitiam habere de-  
bet Huiusmodi namque plurimum confert, non  
solum ad curationem, quam pro locorum diffe-  
rentia variari contingit: verum etiam ad affectus  
dignotionem, & Prognosticum. Verum hic non  
de iis, quæ in superficie constitutæ sunt, partibus  
utpote quæ faciliè sensibus deprehendi, queant,  
neque etiam de earum natura seu essentia, neq;  
actione, siue vsu, neque compositione quicquam  
agenus (cum hæc ad artem secandi corpora per-  
tineant. scribimus enim hæc iis, qui iam in cor-  
poris affectionibus sunt uersati) sed de iis locis,  
qui intrinsecus latent, & in conspectum non ue-  
niunt, quibus scilicet notis deprehendantur.

Itaque locorum affectorum cognitio quinque  
potissimum rebus elucescit: nimirum actione læ-  
sa, excretis, positu, doloris proprietate, & pro-  
priis accidentibus. Sanè actio læsa sola interdum  
affectam partem indicare potest. & quidem hoc  
modò. Si enim accidens aliquod circa cernendi  
officium euenerit, oculum affici constat. Sic quo-  
que ratio, vel imaginatio, vel memoria læsæ, cere-  
brum affectum esse demonstrat: pulsus verò præ-  
terna.

ternaturam, cor laborare indicat: priuatio mot<sup>9</sup>  
neruum, & musculum: cibi fastidium, os uentri-  
culi: mala cibi concoctio, ventriculum: sanguifi-  
cationis frustratio, hepar, &c. Porro excretorum  
species affectam partem indicat. & per partium  
ipsius essentiam, & per contenta in ipsa. Per par-  
tium ipsius essentiam, ut si bronchium tussiedo  
excernatur, pulmones agrotare indicat: ram-  
entum per alium eiectum, intestina affecta ostendit:  
caruncula per urinam excreta, renes: excre-  
menta lamarum speciem referentia, per vrinam  
excreta, vesicam affectam esse portendunt. Sic  
etiã per contenta in ipsa parte. Nam urina excre-  
ta per vulnus, vesicam, vel vrinarios meatus affe-  
ctos ostendunt: stercus per vulnus excretum, in-  
testinorum aliquod: cibus per vulnus, ventricu-  
lum: efflatus spiritus inter respirandum, mem-  
branam costas succingentem affectam esse indi-  
cat: lapis excretus, renes uel vesicam: sanguinis  
grumus per tussim eiectus, thoracem: lumbrici  
intestina laborare demonstrant. Ceterum pos-  
itus quoq; affectam partem sufficienter common-  
strare potest. quippe durus in dextra præcordio-  
rum parte tumor, nō lienis, sed iecoris affecti no-  
ta est, quemadmodum si fuerit in sinistra, nō he-  
patis, sed splenis affectum portendit. Ac positus  
interdum, ubi similiter se habet excreta, affectam  
partem commonstrat. Si enim membranosa tu-



• PRACT. GENERALIS

nicæ frustulum excernatur, id vlcus esse alicubi ostendit: verum in qua sit particula, expositu discere poteris. Nam si vomendo fuerit reiectum, aut gulæ, aut ventriculi: si tussiedo, gutturis, aut asperæ arteriæ: si screando, faucium: si cum vrinâ, eius fistulæ si à sede, alicuius intestinorum: si per mulieris pudenda, vteri affectum portedit. At verò cõsta, quod singuli dolores pro positu varietate, affectum locum ostendere possunt. Quippe apparentib. pro vomitum vlceris notis, animaduertendum est, vtrum anteriores partes circa præcordia, aut posteriores circa dorsum, dolor aliquis inest: dignoscemus autè id hæc ratione. Etenim qui in anteriorib. percipitur, venter: qui verò in posterioribus, gulam occupare censetur. Haud aliter os ventriculi à spacio ipsius, & à gula distinguendum est: si deuoratis quibusdam acribus, hoc quidem in ore ventriculi, aut parte inferiore mordicationem excitet: illud verò in transitu gulæ, quæ secundum thoracem est. Omnia enim hæc positu distinguuntur. Sed punc exemplum aliquod afferre operæpretium videtur, quomodo scilicet locus affectus ex propriis accidentibus innotescat. Ore quidem ventriculi affecto, fastidium inest: per hepatis vero imbecillitatem, excrementa per alium deiecta, aquæ, in qua carnes nuper maceratae ablatae fuerunt, simulantur: item maxilla rubræ apparet in peri-

in perineumoniacis : suffusio oculos infestat: hz-  
modia, dentium stupidorum est nota. Sed ex do-  
loris specie locus affectus commodè deprehen-  
di potest. Siquidem dolor punctorius, membra-  
nas, dolor pulsatorius, arterias: dolor grauis, vi-  
scera, vel aliam partem sensus hebitioris affectâ  
esse indicat. Hæc igitur sunt affectorum loco-  
rum notæ.

*De locis affectis per se, & per consen-  
sum, & quot modis pars aliqua  
corporis per consensum af-  
ficiatur. Cap. 2.*

**N**Otia partis affectæ habita, perquirendum  
venit, nû propriè, seu primò, aut per con-  
sensum pars afficiatur. Nam huiusmodi specula-  
tio non parum ad curationem conducit, cû ad  
curandi rationem nò sine manifesta vtilitate in  
primis pertineat, cui nã parti remedia sint aptâ-  
da, cognouisse. Siquidem medicamenta non nisi  
ei, quæ proprio, & primatio affectu laborat, ap-  
plicanda sunt. Ea namque curata, nullus relin-  
quitur in ea, quæ per consensum, afficitur, prz-  
ternaturam affectus. Equidem parti pro-  
prius siue primogenius morbus est, cuius pars  
per essentiam & propria affectione laborat: vel

tum affectus proprius esse putandus est, cum permanere in parte quapiam perspicitur. Vnde si in morbo laterali permanens eueniat delirium, caput proprium habere morbum perpendendum, ita, ut quamuis lateris morbus quiescat, possit tamen capitis morbus permanere. Quod si verò pars aliqua ob alteram afficitur sic, vt irritata quidē vna, altera vehementius molestetur, remissa verò irritatione, quiescat, eā per sympathiam, seu per consensum affici putandum est. Verum pars corporis per consensum quinque modis afficitur: videlicet quādo vel humor, vel vapor aliunde pertransit, quādo facultas vel cum essentia, vel citra essentiam priuatur, uel quando materia aliunde preparata deficit. Siquidē aliter dolet caput vbi cōtēti in vētriculo humores eleuātur, qui simul & calescere, & distēdere ea, quae sunt in capite, possunt, atq; aliter suffusorū apparēt visa quādam, solo uapore per ipsostransfunte. Præterea aliter afficitur is, cui meatus à cerebro descendens obstructus est: aliter ille, cui pp spinalis medullae inflammationem resoluta sunt crura. atq; aliter is, cui vox aut perijt, aut vitata est. Et enim ad crura facultas quaedā citra essentiā, descēdere prohibita est: ad oculo verò, cū essentia: verum ad guttur, quāuis materia perueniat, sufficiens tamen ipsius quantitas haud quaquam accedit. Qui verò ob intercostalium musculorum

perfo-

perforationem obmutuit, is totam vocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura per diſtas ſpinalis medullę diſpoſitiones reſeruntur, ita etiam guttur vocalibus neruis vel inciſis, vel laqueo interceptis. Sed hæc de primogeniis, & per conſenſum affectibus ſufficiant, nunc tempus eſt ut ſitium eſſe videtur, vt ad ipſius affectus notiã, accedamus.

---

*De notis proprijs, quibus affectus, digno cantur, Cap. 3.*

**P**Arte affecta cognita, inueſtigandũ eſt, quis ſit affectus præternaturam, an ſcilicet morbus, uel ſymptoma. Ad horum autem cognitionem prius tum morborum, tum ſymptomatum naturam, & diſtinctiones ſcire cõuenit. Verũ de his deinceps, nunc autem qua via, ac ratione affectus dignoſcamus vniuerſos, præſertim eos, qui circa partes corporis intimas conditi fuerint, agendũ uidetur. Niſi .n. affectus fuerit cognitus, quomodo remedij qualitatem inuenit? cũ quilibet affectus ſuo contrario auferatur. Proinde horum cognitio apprime neceſſaria eſt. Eos autem dignoſces: ab excretis, ab accidẽtib. proprijs, ſeu ſymptomatis à loci natura, & doloris proprietate. Ab excrementis quidem, vt ſi vlcus ſit, ex ramenis: ex ſabuloſa vrina lapidem deprehendimus.

Excre-

Excremēta verò cucurbitæ seminibus similia, la-  
 torum vermium indicia sunt: deiectio cibi non-  
 dum satari, dyarrhex: micus potus non muta-  
 ti, diabete indicium est. Ab accidentium quoq;  
 proprietate, affectuum indicia sumuntur. Nam  
 quibusdam per tabem vngues adunci euadunt: si  
 ne ratione inuadens rigor cum febre, inflamma-  
 tionis ad supurationem trāseuntis, indicium est:  
 lingua nigricans, ardentem febrem portendit.  
 Sic etiā coloris in vniuerso corpore proprietas,  
 alia quidē per hepatis, alia verò per splenis affe-  
 ctus apparet: ita vt doctum medicum haudqua-  
 quam possit fallere, sicut nec color quidem: quē  
 hæmorrhoides induxerunt. Ab ipsorum quoq;  
 locorum affectorū natura indicia morborū oriū-  
 tur, eò quòd quibusdā solis partibus morbus hic  
 accidat, quibusdam verò solis non eueniat: qui p-  
 pe soli oculi, suffusione laborāt: lapis, in renibus.  
 & vesica nascitur. lūbrici in intestinis gignūtur.  
 Rursus impossibile est, vt abscessum cor susti-  
 neat: quēadmodū neq; pulmo, neq; ligamenta  
 dolorem. Quinetiam a doloris proprietate affe-  
 ctuum notæ deprehenduntur. Dolor. n. puncto-  
 rius, pleuriticus: pulsatorius verò inflammatio-  
 nem ostendit. Porrò ipsius quoq; morbi magni-  
 tudo, & mos tēpusq; , minimē negligenda sunt.  
 Dignoscitur autem ipsius affectus magnitudo, ex  
 dispositionis, ac ipsam sequentium priorum  
 sympto-

symptomatum magnitudine. Quòd si magnus  
 propter præcellentiam partis fuerit morbus, ex  
 præstantiâ, partisq; affectâ natura cognoscitur.  
 Morem verò seu malignitatê deprehendes, cum  
 ex eorundem morborum differentia, tum ex sym-  
 ptomatibus quæ ipsam sequuntur. Pestis enim ma-  
 lignus, ephemera verò benignus affectus cõsen-  
 dus est. Sic quoq; pulsus bonus, sputum coctum,  
 mentis constantia, salutarem: è contra verò spu-  
 tum nigrum, mētis turbatio, inquietudo, &c. læ-  
 thalem morbū portendunt. Tempora præterea  
 morborum dignoscuntur ex cruditate, ex antici-  
 patione, vel tardatione accessionum, ab accessio-  
 nis longitudine, à morborū & symptomatū ma-  
 gnitudine & intermissionem. Siquidem cruditas  
 principium morbi denotat: anticipatio verò ac-  
 cessionis, longiorq; accessio, morbus & sympto-  
 mata vehementiora, & intermissionis tempus bre-  
 uius augmentum significant. In statu autem seu  
 vigore, accessio neq; anticipat, neq; retardat, ne-  
 que lōgior, neq; breuior, sed æqualis est: morbus  
 & symptomata neq; vehementiora, neq; mitio-  
 ra, sed in eodem statu permanent. In declinatio-  
 ne accessiones tardiores, & breuiores, symptoma-  
 taq; mitiora fiunt. Caterum pauca admodum  
 sunt ipsorum affectuum notæ, quæ non simul lo-  
 cum affectum ostendant. Etenim actionis noxæ  
 affectam duntaxat partem: earum verò differen-  
 tiz,

tię, ipsius affectum declarant: quę solę ipsorum affectuum sunt propria signa, per accidens tamę ipsos sequuntur. Vbi verò cōplicati duo vel tres aut plures fuerint morbi, non aliter dignoscendi erunt, quàm ab excretis, symptomatis propriis, locorum natura, ac doloris proprietate, diuersis siquidem existentibus pro connexorum morborum numero ac natura. Cum his quoq; perpendenda sunt, quę præcesserunt. Nam & ea non parum conferunt pro partis cum affectu, tum ipsius affectus cognitione. Itaq; qualis præcesserit victus ratio, quę cōsuetudo, ætas, anni tēpus, regio aeris constitutio, &c. consideranda sunt, totius corporis dispositione non neglecta, ut valeamus, quò ad artificiosa coniecturapermissit, distinguere, quis affectus vrgeat. Porro cognitus morbis, distinguere oportet eos, qui per consensum fiunt, à propriis affectibus. Siquidem cum propriis accidentibus discernitur, ac semper eadem furint perpetua, neq; aliis præcedentibus superueniunt, tunc eum proprium, ac primogenium appellamus. At cum propriis accidentibus discerni nequit, neque perpetuò permanent, & ad alias affectiones sequuntur, per consensum ipsum fieri dicimus. Quot autem modis affectus per consensum fiant, præcedenti diximus capite. Nunc ad reliqua transeamus.

De mor-

LIBER I. 25  
*De morborum generibus,*

*Cap. 4.*

**Q**Uamquā morborum & symptomatum tractatio limites instituti nostri excedere videatur, & ad theoriā tantū spectet, nosq; iis tantum qui se à theoria ad praxin conserunt; scribamus: tamen ut morborum, & symptomatum genera in promptu semper habeant studiosi, faciliusq; affectus à se inuicem distinguere possint, ea hic quoq; in memoriā iis reuocanda fore putauimus. Morbus itaq; affectus est præternaturam, actionem primò ledens. Eius genus triplex est: in temperies: cōpositio vitiosa, & unitas soluta. In temperies simplex, vel calida, vel frigida, vel humida, vel sicca. Composita, ea quidem immaterialis, uel calida & humida, vel calida, & sicca: uel frigida & sicca: uel frigida & humida. Materialis uel d, uel sanguinea, ut phlegmone, uel biliosa, ut erysipelas, uel pituitosa, ut œdema; uel melancolica, ut scirrhus uel mixta, &c. Porò cōpositio vitiosa in qualitate in quantitate & situ. In qualitate seu conformatione figura, consistit, Varietas, Vacuitas, Curuitas, Simitas, &c. In qualitate cavitatum, sunt, Obstructio, Angustia, Compressio, Dilatio, Plenitudo, & Inanitas: in qualitate, superficiiei, Asperitas, Leuitas. Morbi in quantitate, & quidem numero abundante, sunt,

sexus



sextus digitus: varices: tubercula: lapis: lumbrici: vitiligio: suffusio: atheroma: meliceris: steatoma, &c. in numero verò deficiente: vt amissio digitorum: dentium: ossium: narium: aurium: cruris, &c. In magnitudine aucta: vt lingua tumefacta: priapismus: auctio mamarum, testiculorum: caro supercrescens in vlceribus, &c. in magnitudine imminuta: atrophia tabes, &c. In situ autem morbi sunt: luxatio: articulorum commotio: laxatio ligamenti, linguæ, pudendorum: coalitus digitorum, labiorum, sedis: epiplocele: enteroccele, &c. Cæterum in vnitæte soluta, & quidem in carne morbi sunt, Vlcus: vulnus: contusio: illisio: in osse, fractura. rima: caries: in nervis, punctio: scissio *σπασμα*: in venis, ruptio: in cute, excoariatio, &c. Cõpositi verò morbi, ex iam dictis facile deprehendi possunt. Hæc quidem sunt vniuersa morborum genera.

*De symptomatis in vniuersum.*

*Cap. 5.*

**S**ymptoma est affectus morbum sequens. Hoc duo lex est genus: aut functionum noxæ, aut affectus corporis nostri. Actionum noxæ, sunt vel naturalium, vel animalium. Rursus animalium actionum noxæ, sunt vel sensibiliū, vel motricium, vel principum. In principe actione, & quidem imaginatione abolita

abolita consistit, Caros: catalepsis: in debili, coma: lethargus: in deprauata, delirium. Sic in ratione abolita, dementia, & stultitia comprehenditur. in debili, fatuitas: in deprauata, delirium: in memoria verò abolita, obliuio: debili, torpor: deprauata, delirium. Quod ad noxas functionū sensibiliū attinet, in visu abolito, cæcitas: in debili amblyopia: in deprauato hallucinatio existit. Sic in auditu abolito, surditas: in debili, grauis auditio in deprauato, obauditio. Ad eundem modum in reliquis sensibilibus censendum. Cæterū in motu abolito, apoplexia, & paralysis est: in debili, stupor in deprauato: cōuulsio: tremor: horror rigor sternutamentū: tussis: pādicalatio, & oscitatio. Porro naturaliū actionū noxæ sunt vel in retentione vel expulsionē, vel attractionē, vel alteratione seu coctione. In retentione quidem abolita, hæmorrhagia: vomitus: sudor immodicus: henteria: diabetes: menstruorum fluor immodicus, &c. In expulsionē verò abolita, colica passio, voluulus: ischuria in debili, dysuria: in deprauata, dysenteria: stranguria, &c. In coctione abolita, cruditas existit: in debili, tarda concoctio: in deprauata, cūm cibus in ventriculo in alienam qualitatem permutatur. Eadem ratione de attractrice facultate existimādū est. Atque hæc quidem symptomatum differentiz à functionum offensis sumuntur. symptomata au-

tem affectus corporis nostri, aut visibilia, aut odorabilia, aut gustatilia, aut tactilia sunt. Visibilia sunt colores præternaturam, ut Morbus regius: icteritia nigra: aqua intercus: lingua decolorata: pars aliqua corporis, ob abscessum, uel nigra, uel liuida, uel rubra. Audibilia uerò sunt, uoces clangosæ, turbidæ, uel tremulæ: soni: strepitus: stridores: murmurilla in aliis animalis partibus. Odorabilia sunt, fetor auriû, nariû, axillarû, gutturis, totius corporis: itê ructus fumosus, acidus, virosus, piscium fetorê referens Gustatilia sunt: ut sudor, uel alia reiectio dulcis, uel amara, uel falsa. Tactilia uerò, ut cutis arida, intêta, laxa, uel rugosa, &c. Ac tales quidem, & tot numero symptomatum differentia existunt.

*De causarum indicijs, Cap. 6.*

**Q**uam pars corporis sit affecta, & quis præternaturam affectus, hæcenus docuimus, nunc qua sit ipsius affectus causa, qua via, qua ratione dignosci ualeat, inquirendum est, cum nihil sine causa fiat, affectusq; curari nequeat, nisi prius eius causa tollatur. Est itaq; causa affectus quoq; præternaturâ, & actionem lædens, non quidê primò, sed secundariò. Ipsa nãque non per se, sed morbo interueniente, actionem lædit. Proinde quinq; affectus præternaturam morbos præcedunt,

dunt, causæ rationem obtinebunt, ac morbificæ  
 causæ nominabuntur. Harum autem, cum aliæ in  
 ipso animalis corpore consistant, *πρόκογω μεναι* seu  
 antecedentes medicis dicuntur, aliæ verò extrinsecus  
 adueniunt, quas procatarticas seu primitiuas ap-  
 pellant: prius qua via ac methodo internæ inue-  
 stigandæ sint, docebimus, deinde ex quib. exter-  
 nis quoq; dignosci possint. Internas ergo causas  
 ex morbi specie poussimū ac symptomatib. co-  
 rumq; diuersitate deprehēdimus. At morbi spe-  
 cies præcipuè causam indicat, vt si Synochus nõ  
 putrida fuerit, sanguinem: si tertiana, bilem: si  
 quotidiana, pituitam: si quartana, atram bilem,  
 causam esse denotat. Eadē quoq; ratione, phle-  
 gmone, sanguinem: erysipelas, bilem œdema, pi-  
 tuitam: scirrhus, melancholiam demonstrat. Sic  
 quoq; nõ modò quæ causa sit, verùmerita vtrum  
 ea, quæ morbū facit, in parte cõtineatur, tâquã  
 in propria essentia, vel tâquã in instrumēto, aut  
 per ipsam trãseat, ex symptomatum inquã diffe-  
 rentia, vt ex diuersa noxa diuersarum functio-  
 num, excrementorū uarietate, ac corporis diuer-  
 sis affectibus, colore præsertim, uel sapore, uel o-  
 dore, uel calore, uel mollitie, uel duritie. Totius  
 quoq; corporis dispositio, temperamentum, seu  
 ægrotantis natura, ætas, regio, tēpus anni, consue-  
 tudo, ratio victus, & vt uno uerbo perstringã, cū  
 ista, quæ præcesserūt, morbi rû causas ostendūt.

Nam præteritorum cognitio nihil aliud est, quàm inuentio causarum, quæ affectus pariunt His quoq; addenda erit tum ciborum portionumq; tum medicamentorum quotidiana experientia, ut exquisitè cum morbos, tum eorum causas inuenire ualeas. Similiter quoq; ratione causæ externæ, seu procatarticæ inuestigandæ erunt. Ex ipsa namq; morbi specie, natura ægrotantis, ætate, regione, anni tempore, aeris constitutione, præcedenti victus ratione, affectibus præcedentibus, aliisque prædictis inquirendæ erunt. Quare ut summatim dicam, intueri oportet cuncta, tam præsentia, quam præterita symptomata. Præsentia quidem medicus ipse inspicere poterit. Præterita verò non ab ægrotante solum, sed ab absistentibus, vel ipsius familiaribus haud difficulter perdiscere licebit, quò promptius, non modo locus affectus, ipseq; morbus, uerùm etiam causa insalubris, quæ cunque ea sit, comprehendatur. Quamuis præteritorum cognitio magis necessaria fuerit, pro causarum, quæ affectus inducunt, inuentione: uelut præsentium, pro affectuum, & partium affectarum inuentione.

---

*De morborum causis in uniuersum, Ca. 7.*

**L**icet causarum tractatio præter nostrum institutum esse uideatur (alterius enim tractationis est) tamen cum ad causarum inuentionem non parum

parum cōducatur, morborum etiam causas in me-  
 moriam saltem studiosis reuocandas esse duxi.  
 Itaque similarium morborum calidorum causę,  
 & quidē internę sunt, putredo sanguinis, vel bi-  
 lis itē constipatio maxima Internę uero, ignis:  
 sol: alimenta calida, acria: potus calidus: medica-  
 menta acria, & alexiteria, & amuleta: exercitiū  
 vehemens animi affectus, ut ira, excādescētia,  
 &c. Frigidorum morborum causę internę sunt,  
 humores frigidi, qualis est pituita: rarefactio to-  
 tius, vel partis: constipatio maxima. Externę, ae-  
 ris frigiditas, aquę niuis, glacię, &c. cibus & po-  
 tus qualitate frigidus, vel quantitate nimia sum-  
 ptus: item medicamenta frigida: motus im-  
 modicus: ocium: timores, &c. Humidorum morbo-  
 rum internę sunt humores pituitosi. Externę ve-  
 rò aer humidus, imbres plurimi: aquarum dul-  
 cium crebrę balneę: cibus & potus copiosior, &  
 natura humidior: medicamenta potestate humi-  
 da: somnus longior: vita ociosa, & ignaua: mol-  
 lis educatio: & animi tranquillitas. Siccorum ve-  
 rò morborum causę internę sunt, humores me-  
 lancholici: transpiratio plurima. Externę, aeris  
 constitutio sicca: aquę naturam habentes sul-  
 phuris, nitri, vel aluminis: cibus & potus parcior  
 & natura siccior: medicamenta exsiccātia: exer-  
 cidia immodica: uigilię: cura: tristitia, męror,  
 angor, &c. Compositorum uerò similarium mor-  
 borum

borum causæ ex simplicium morborum causis facile inueniuntur. Porro instrumentalium morborum causæ, & quidem figure vitiatæ: est malus conformator plenitudo, uel defectus. Obstru-  
 nis uerò, humor lentus & crassus: callus: grumus, &c. Angustia, carúcula: uel tuberculum, uel phlegmone, uel scirrhus, uel abscessus, &c. Cōpressio nis uerò est omne id, quod extrinsecus comprimere uehementius ualet. Dilatationis, expultrici facultatis motus immodicus: retentricis imbecillitas medicamenta uim aperiendi habentia: molities immodica instrumentorum: aer humidus & calidus. Coalitus autem causa est exulceratio superficiei internæ, qua partes postea coalescunt. Asperitatis causæ sunt, humores acres: medicamēta abstergentia: pulus, fumus. Leuitatis uerò, humor pinguis, & viscosus. Sic numeri deficientis causæ sunt, ustio: resectio: putrefactio: refrigeratio. Superflui uerò, utilis, uel inutilis materię multitudo: caro supererescēs in ulcere: phterigiū in oculis, &c. Ad eundem modū magnitudinis auctæ, utilis materię multitudo: uirtus ualida. Minu-  
 itæ uerò utilis materię defectus: uirtus imbecillis. Luxationis præterea causæ sunt, subitarius, & uehemens motus: intemperies humida: fractio superciliarum ossiū. Epiplocelis, &c. meatus à peritonæo ad testiculos pertingēs dilatatus, uel ruptus, &c. Cæterum solutæ unitatis causæ & quidē  
 extrin-

extrinsecæ sunt omnia ea, quæ erodere, tendere, rumpere, frangere, tundere, incidere, uel uulnerare, apta sunt. Intrinsicæ uerò repentini ualidi- que motus. humores acres, seu erodētes: plentudo ad uasa, &c. Tales quidem sunt morborum causæ. Porro cum symptomatum causæ, morbi sint, atque de iis superius tractauerimus, huic libro finem imponemus.





  
 PRACTICAE GENERALIS  
 LIBER I.

ARGUMENTVM.

De prognosticis, & indicationibus  
 curatiuis potissimum tractat.

Eius capita hæc sunt:

**A**N affectus curari ualeat, Ca. 1.  
 Nunquid æger seruabitur, aut  
 morietur, Cap. 2.

De signis salutaribus, & lethalib. C. 3.  
 Quo tempore æger sanabitur, vel mo-  
 rietur, Cap. 4.

De notis quibus modus salutis, vel  
 mortis dignoscatur, Cap. 5.

Num crisi vel absq; crisi morbus ter-  
 minaturus sit, Cap. 6.

De præsentis crisis cognitione, & indi-  
cijs ipsam præcedentibus, Cap. 7.

De futura crisis præcognitione, Ca. 8.

De futuræ crisis per fluxum sanguinis  
narium præcognitione, Cap. 9.

De indicijs futurae crisis per vomitū,  
Cap. 10.

De signis crisis per deiectionem alui  
futuram. Cap. 11.

De præcognitione crisis per menstruorū  
purgationem & hæmorrhoides, C. 12

De crisis præcognitione per sudores. C. 13

De præcognitione crisis per abscessū,  
Cap. 14.

De diebus indicatorijs, & decretorijs,  
Cap. 15.

Quid sit in corpore egro agendū, C. 16.

Quid sit agendū, si unicus fuerit affe-

- Aus, seu morbus.* Cap. 17  
*Quid sit agendum in pluribus affe-*  
*ctibus, siue morbi, siue symptoma-*  
*ta fuerint,* Cap. 18  
*Quid sit agendum, si fuerit morbus*  
*cum symptomate,* Cap. 19  
*Quid sit agendum, si fuerit morbus*  
*cum sua causa,* Cap. 20  
*Quid sit agendum, si morbus, & mor-*  
*bi causa, & symptomata fuerint*  
*complicata,* Cap. 21  
*De alijs indicationib. quę indicationes*  
*improprię dicuntur,* Cap. 22



27  
PRACTICAE GENERALIS  
LIBER II.

---

*An affectus curari valeat, Cap. I.*

**Q**ua uia ac ratione Medicus debeat partē affectā, affectumq; & causā morbi inuestigare, libro primo, qua potuimus breuitate, ostendimus, nunc ad actionem ipsam accedentes, tempestinum esse uidetur, ut edoceamus utrum affectus sanari queat: deinde si quidem is curari ualeat, quomodo, & qua methodo id peragi possit. Scire aut prius cōuenit an curari ualeat affectus Nisi. n. medicus futura prius p̄cognouerit, & quonam morbus terminaturus sit p̄dixerit, suā facile reputationē amittet. Ecōtra uerò, si futura p̄dixerit, & usum auxiliorū dextrum adhibuerit, non solum se à mortis culpa immunē reddet, sed etiam agrotos obtemperantes efficiet, & de longinquo ipsi morbo obuiā ibit, multo antè re mediōrū tempus oportunū edocēs. Quare huiusmodi aris pars minimè negligenda erit, utpote quæ in dignoscendis morborum euentis cōsistit. Verū cū non omnia, q̄ circa agrotantē oriūtur, necessariā obtineāt generationē, non erit utique semper firma p̄dictio, ut si propter uicinorū tumultū, aut latrantes canes, aut iniucūdos quosdā nuncios

nuncios in somnis reddatu, æger: nullo horum morbi ratione effecto. Quinimò nec eorum omnium, quæ morbi ratione efficiuntur, certam præ cognitionem habere poterit. Nam si humor aliquis intra corpus abundans, & superfluous, in partem quampiam nobilem, vel principem repente influat, aut ab ea in viliores transeat: quo fit, ut cum, qui in princeps membrum illatus est, summum periculum eum verò, qui non in nobilem, sed in viliores partem transmigravit, subita, ac inexpectata salus laborantis necessario sequatur. In his autem statibus, quò terminaturus sit morbus non exactè comperit Medicus: sed tantù in his prænoscere licebit inconstantiam, ac lubricitatem. At si permanentiam habuerit morbus: in quo non amplius diffluunt excrementa, sed in locum vnum quendam grassata, illum occupant, præfagire in his futurum poterit, præsertim si circa ægrotantem omnia rectè gerantur. Quæ enim perperam à quoquam aguntur, et causæ existunt, ut aut morbi solutio prorogetur, aut mors antevertat. Methodus autem, qua Medicus præfagiri valeat, nù morbus curari possit necne, ex quinque potissimè rebus elucescit: natura videlicet & usu partis: specie morbi: viribus: more morbi, & quantitate. Si namque pars corporis spermatica fuerit concisa, vulnerata, vel fracta, ita ut suo simili colligari non possit: vel

pars

pars aliqua corporis tam longinqua, ut ad eam medicamenta pertingere non queant, quomodo sanitatem polliceberis? è contra verò, si carnosà, vel huiusmodi, ut remedia ad eam ptingere facile possint, de sanitate quis dubitabit? Ad eundem modum pars, quæ ad vitam necessaria est, si perierit, præstari non posse id, quo tendimus, indicat: è contra si perierit hæc, quæ ad vitam necessaria non est, præstari posse id, quod tendimus insinuat. Morbi verò species, quæ ex propriis symptomatibus, ut primo diximus libro, dignoscitur, utrum curari affectus valeat, sic indicare potest. Nam pestis, elephantiasis, phthisis, & hydrops, non, aut vix curari posse indicat: è contra febris diaria, tertiana &c. curari posse insinuat. Porro viriù robur, vel imbecillitas tum ex propriis actionibus, tum ex commodo temperamento, vel intemperie partium, ex quibus vires proueniunt, dignoscere licet, tam eius, quæ ex corde prodit, quam quæ ex hepate oritur, quam etiã, quæ ex cerebro originem ducit. Si quidem fuerint ualidæ, optimè sperare licet: sin imbecillas omnes deprehenderis, malum, vel mortem prædices. Si aliter tantum, ut vitalem, periculum annuncies: si animale tantum, non omnino desperabis: si naturalem, diligenter considerabis. Quoniam & ipsa multum suspecta est, tamè prius consideranda vitalis est, deinde naturalis, ultimo animalis. Porro morbi mos curationis facilitatem

tatem, vel difficultatem ostendit. Si quidem magni morbi, & lethales solis præfagiis relinquendi sunt, boni verò, quorum signa sunt salutaria, curandi. Ad eundem modum morbi longi, difficilius, ac tardius; breues verò facilius, & citius cgrantur. Parui præterea Medici ope non indigent, magni & quidem cum signis salutaribus curandi cum signis verò lethalibus, solis præfagiis relinquendi sunt.

*Nunquid eger seruabitur aut morietur, Cap. 2.*

**P**orro in conualsituris moriturisq; ægrotationis vis cum uirtute, seu natura semper cõterenda est. utrum uidelicet superet. Nam ueluti in oblectatoribus, vel onus, aliquod portantibus accidit: utrum aliquis portãdo oneri sufficiat, sciri minimè poterit, hominis robore, oneris magnitudine, & itineris longitudine antea non perspicis. Aegri uãque uires portant onus, morbus uerò oneri, tempus autè, quod usq; ad statum extenditur, itineris longitudini respondet, euadendum ergo vel pereundum homini esse ex horum duorum altero robustiore cognito, morbo uidelicet, uel natura, prædicto faciẽda erit. Nam si natura, seu uires ad eò ualidè fuerint, ut possint morbum

bum superare, necesse est ægrotum euadere. Si  
 verò contra omnino morietur. Vires autem tum  
 ex actione, tum proba temperie, vel intemperie,  
 vt præcedenti capite diximus, cognoscendæ sũt.  
 Aegrotationis uero vis, tum ex morbi specie, ma  
 gnitudine, tum more, siue malitia, vel benignita  
 te: tum morbi statu, potissimum si crisi termina  
 turus morbus sit. Adiuncta insuper consideratio  
 ne signorum salutarium, & lethaliũ, de quibus  
 deinceps dicitur.

*De signis salutaribus, & lethaliibus,*

*Cap. 3.*

**S**Vnt autem signa salutaria, mente constare, fa  
 cilis anhelitus, facilis tollerãtia, pulsus bo  
 nitas, virium robur, decubitus decēs, facies sanis  
 similis, uenter & hypochondria nõ dura, alui ex  
 crementa æqualia, compacta, & coloris aurei; vri  
 na subflaua cum hypostasi alba, æquali, cõtina:  
 spu utum album, nõ fetens quod facillè expuitur:  
 sudor in febribus acutus critico die superueniēs.  
 Cõctiones namq; omnes crifium celeritatem, se  
 curitatemq; salubrẽ portendunt. E contra uerò  
 signa mortalia sunt, viriũ p̄sternatio, pulsus ma  
 lus debilis inordinatus, & inequalis mētis incõ  
 stãtia, anhelitus difficilis, difficilis tollerãtia, in  
 quiet-



quietudo, facies tornatilis, nasus acutus, oculi cō  
caui, tempora collapsa, aures pendentes, cutis fa  
ciei tensa, oculi lumen effugientes, lachrymæ in  
uolūtariæ: colligere paleas, vel festucas. somnus  
in senibus superfluus: iuuenib. vigilix superflua:  
appetentia prostrata: oculi rubri: venæ nigræ, aut  
obscuræ. color faciei viridis, vel obscurus: interi<sup>9</sup>  
labrum agitatum: digiti, & ungues obscuri, vel vi  
rides: frigiditas extremorū: sudores frigidi: alui  
excrementa nigra, viridia, fetida: vel alba liq̄da,  
vrina nigra, vel liuida, vel aquosa ī pueris, &c. Et  
vt ex his ordinatū habeas epilogū, sic collige &  
p̄ signa discurras, à capite faciēs initiū. Primò  
itaq; cōsidera dispositionē faciei, an. s. similis sit  
sano: quomodo circa somnum, vigiliam, cogi  
tationem, rationem, & motum se habeat. De  
scende deinde ad pectus, considerando videlicet  
anhelitum, & pulsum. Item tangas pectus, num  
calor sit acutus, igneus, pugitiuus, vel suauis: nū  
tusiatur, vel nō. Deinde ad stomachū descendēs,  
de appetitu quæras, an cōstet necne: num dolo  
rem vel tensionem, vel tumorem patiat: num  
eruptionem acidam, vel fumosam, vel aceto  
sam, vel acrem, vel insipidam, vel putridam sen  
tiat. Demum ad hypochondria, si in dextro, aut  
sinistro grauitatem, tēsiōnem, duritiē, dolorem,  
uel tumorem senserint. Similiter de ventre, an tu  
morem circa vmbilicum, an dolorem patiat.

His

His omnibus si adiunges signa ab egestionibus, & vrina sumpta, facile tum signa salutaria, tum mortalia, & per consequens morbi euentum iudicabis.

*Quid tempore aeger sanabitur, vel morietur, Cap. 4.*

**V**trum aeger euadet, necne ex precedentibus duobus capitibus deprehendere licet, nunc etiam, quo tempore euadendū, vel pereundum homini sit, edocendum est. Hoc autem facile dignoscemus ex morbi, ac naturæ robore. Siquidem eo tempore morietur ægri, cum facultatem morbus adeo præsternat, ut functio aliqua ad vitam necessaria, pereat. Euadent uerò tunc temporis, cum morbum semel natura superatura est. In propinquo uero morbi solutio erit, cum bene ualuerit facultas, ac morbo fuerit validior, isque imbecillior. quòd si natura fuerit imbecilla, morbus uerò ualétior, mors ma iurabit. Vter autem altero ualidior sit ex coctionib. & cruditatibus excrementorū percipitur. Quæ quidē in uenis continentur, per urinas quæ in toto corpore, per sudores: quæ in thorace & pulmone, per sputa: quæ in uentriculo, & intestinis, per alui excrementa: quæ in vesica, & renibus, per ea, quæ in urinis deferuntur: quæ in stomacho, & ventre su-

tre superiori, per ea, quæ euomuntur; quæ uerò per palatum, nares, uel aures excernuntur, animalem facultatem declarabunt. Ita, & de reliquis iudicandum excrementis. Commune namque in omnibus est, non prius morbum dissolui posse, nisi coctionis indicium apparuerit. Concoctiones enim omnes crasium celeritatem, securitatemque salubrem portendunt. Cruda uerò & incocta, & quæ in malos conuertuntur abscessus, infestas iudicationes, uel labores, uel reciduas, uel mortem significant. Præfinitum ergo tempus, quo uel pereundum, uel euadendum sit homini, ex eo intelliges, quanto uidelicet alter altero validior sit: quantum inuicem superant, & superantur concoctionis, & cruditatis signa. Hæc igitur uniuersa in primis etiam morbi diebus, quos primus præfinit quaternarius, præsertim si acutus sit, ex acutè dignoscenda sunt, pro notitia temporis, quo potissimum salus, aut ægri exitium expectetur. Vfus namque prædictionis est agnoscere diem, quo morbus iudicandus est. Verum cum nec scribi, neque sermone edoceri omnino singulorum quantitas possit, ex nulla tamen re possumus aded ad exquisitam eius peruenire notitiam, quantum ex crebra exercitatione circa quantitatis coniecturam. Neque enim bene prænoscere ualebimus, nisi horum

horum singulorum magnitudinem diligenter  
 pensitemus, eiusdem morbi motu, nunquid vide  
 licet acutè, aut tardè moueatur, non neglecto.

*De notis quibus modus salutis, vel  
 mortis dignoscatur,  
 Cap. 5.*

**M**odus verò conualefcendi, aut moriendi,  
 ex morbi natura, seu specie, ac loco affe-  
 ctu parebit. Sunt namque morborum quidam,  
 quorù natura est suffocare, cuiusmodi sunt mor-  
 bi thoracis, pulmonis, aut gutturis, qui vitalem  
 suffocant facultatem. Ex cerebri ventriculorum  
 obstructionibus, suffocationes eiusdem anima-  
 lis facultatis oriuntur. Sunt etiam morborum  
 nonnulli, quorum natura est prosternere, qui sta-  
 tim ipsum cor occupant, quemadmodum longi,  
 & vehementes dolores stomachi affectus qui-  
 dam, aut hepatis morbi diuturni, vitalem facul-  
 tatem prosternunt, ac hecicè febres omnes, &  
 cordis intemperies magna. Pari ratione de na-  
 turali facultate sentiendum erit, etsi animal om-  
 nino perire nequeat, nisi cor afficiatur. Vnde  
 mortem semper cordis immodicas intemperan-  
 tias sequi necesse est. Porro quidem subito

vnâ cum turbatione, & agitatione, & quibusdâ excretionibus, vel abscessibus moriuntur: nonnulli vero subito, sed sine excretionibus, vel decubitu: quidam mortem non subeunt, sed multò deterius euadunt: nonnulli paulatim moriuntur vt in marasmo fieri contingit. Conualescendi verò tres existunt modi: vnus qui fit per crifim perfectam: alter, per imperfectam crifim: tertius per solutionem tantùm, & absq; crifi. Hæc autem omnia ex morbi specie, moru, coctionibus, cruditatibus, & viribus perdisces.

---

*Num crifi, vel absq; crifi morbus terminatur sit, Cap. 6.*

**V**trum autem per crifim terminabitur morbus, aut non ex magnitudine & paruitate, distinguitur. Siquidem magni omnino per crifim iudicantur: qui autem parui, soluantur solum. Per crifim verò subito ad sanitatem veniunt, & quidem per manifestas excretionibus, aut effatu dignus abscessus. Per solutionem autem paulatim, decrefcente videlicet morbo.

*De præsentis crisis cognitione, &  
indicijs ipsam antecedentibus,*

*Cap. 7.*

**E**quidem præsentis crisis ex quinque; potissimum  
rebus dignoscitur, coctionibus scilicet, indi-  
catoriæ die prægressa morbi specie, & more &  
excretionem, quæ morbi speciei correspondeat.  
Primum quidem, & maximum instantis bonæ  
crisis indicium sunt coctiones urinarum; ex-  
crementorum alui, & sputaminum. In morbis qui  
de thoracis, atque pulmonis sputamina sunt ani-  
maduertenda: non tamen urinarum contempla-  
tio negligenda, sed & alui excrementa sunt in-  
spicienda. si uero tantum febricitent, sine alicuius  
uisceris passione, aut cum inflammatione he-  
patis, vel renum, vel uesicæ, vel splenis, maxime  
urinis animum adhibere oportet: sicut, si circa  
ventriculum passio sit, primum excrementis al-  
ui: deinde neque urinae sunt negligendæ. Semper  
enim cum febris affuerit, vel ex sola humorum  
putredine accensa, vel ex membro inflamma-  
tionem patiente, præcipue urinae inspicienda  
sunt, atque inde coctiones agnoscendæ. Secun-  
dum autem indicium, quod ab aliqua die indi-  
catoriæ antea indicetur, cui annexa est diei iudi-  
cantis potentia. Deinceps autem inspicere

oportet, & speciem morbi, & morem; speciem quidem si tertiam, vel quotidiana, vel febris, ardens, vel pleuritis, vel peripneumonia; morem autem, si moderatus, & mitis, vel prauus atque malignus. Deinde si formę morbi excretio respondeat: vt si in febris ardente, vel sanguis e naribus profluat, vel sudor multus emanabit, aut per vomitum, aut per aluum biliosa excernentur; in tertiana quidem, si vel sudor multus, vel biliosa per vomitum, vel aluum profluat: in quotidiana verò si plurimum pituitę excernetur, & multi in toto corpore sudores; in quartana, si atra simul ac varia excernentur; & sic in cęteris affectibus iudicandum. Porro huiusmodi excretiones non medioeris in corpore ægrotantis perturbatio antecedit. Nam & difficiles tolerantię, & vigilię, & deliria, & graues somni, & difficiles anhelitus, & vertigines tenebricosę, & difficiles sensus, dolores capitis, colli, & stomachi, & multorum aliorum membrorum: nonnullis verò aurium sonitus, & vani ante oculos apparent splendores, & lachrymę inuoluntarię efflunt, & vrina retinetur, & labrum agitatur, obliuio, & presentium ignorantia, & vehemens accidit rigor, & plurimum accessio consuetam anticipat horam, & multus astus, sitisque intollerabilis sequitur: clamant,

mant, & saliant, sicuti furentes, neque possunt in eodem situ recumbere: deinde repente multus sudor erumpi, aut vomitus aliquis non paucus insequitur, aut venter subito soluitur, aut abundans sit fluxus sanguinis, aut hæc omnia si simul contingunt, vnde non paruus inuadit timor insipientes. Ac sic quidem presentem crism dignoscere oportet. Et ab horum sanè symptomatum apparitione sunt qui Criseos appellatione deducunt, quod quales in iis qui ad mortem dantur perturbationum euripi deprehenduntur, tales quoque in ægris conspiciantur.

---

*De futurae crisis præcognitione,*  
*Cap. 8.*

**Q**uod ad futuram crism attinet, eam hoc modo dignoscere oportet. Morbi natura consideranda est, an ad bilem flauam pertineat, vel atram, aut pituitam, vel mistas habeat significationes. Post hoc autem tempus anni, & laborantis ætas, & complexio, & quæcunque alia eius ordinis sunt. Post hæc autem accessionum circuitus sunt considerandi, si vel per tertium, vel per quartum, vel per singulos dies eueniât, vel nullo modo eueniât, sicuti in Synochis accidere solet. Si enim properauerint, ac semper

C 4                      propor-



proportionabiliter anticipauerint horam, & multò vehemētius infestauerint, & per tertium occurſauerint, citò criſim ſubſecuturam denunciant. Si verò lentè moueantur, atque eadem inuaſerint hora & ſingulis diebus fiant, poſt longius tempus criſim futuram denunciant. Præterea cōſiones inſpicere oportet. Si enim in diebus indicatoribus fiant, indicia ſunt, quod ſequentes iudicatorij dies ægrum morbo libera- bunt: veluti ſi ſtatim ab initio omnia ſigna integre ſecura videantur, in primo quaternario criſim futuram denunciant: ſi autem parum à maximè ſolobrib. diſceſſerint, ſeptimum diem transcendere nō cōtingit. Si verò ſeptima die aliquod cōſionis ſignum manifeſtè appareat, & morbus magnus extiterit, & celeriter moueatur, vndecimo potius, quàm decimoquarto, criſis futura eſt. Quòd ſi minor fuerit, neque celeriter motum habeat, decimoquarto magis, quàm vndecimo. Simul verò cum alijs eſt diſtinguendum, & ſi iuuenis fuerit, & natura bilioſus, & tempus æſtium, & in loco calido ægrotauerit, & prior victus, & quæcunque præſenti at- tinent ſtatui, ad calorem declinauerint, omni- no vndecimo criſis ſubſequutura eſt, quemad- modum ſi omnia contraria iis, quæ dicta ſunt, affuerint, in quartodecimo. Quòd ſi nonnulla quidem affuerint, nonnulla verò non atque  
interim

interim aliquis error inciderit, fieri, non potest, ut crisis die undecima subsequatur: sæpius verò nec die decimoquarto, quando magis fuerit erratum. Sed, si nullus error acciderit, mista verò fuerint accidentia, hic opus erit Medico exercitato, ac perspicaci, ut ea, quæ vim maiorem habent, signa distinguat, & illi, quæ ab ipsis ostenditur, crisi fidem adhibeat certiolem, in hisce adedò ambiguis præcognitionibus. Quòd si autem in salubri morbo in primis diebus tardiolem sebris motum habeat, neque cum nimis vehemènti calore, & adsint cruditatis signa, hæc quidem intra quartumdecimam diem non finietur: an verò in illa ipsa die, uel postea, ex morbi temporibus, distinguendum est. Nam principij quidem signa, si diu permanserint, diuturnum fore morbum significant. Augmentum verò si in quarta vel septima die apparuerint, sperandum est aliquid in quartodecimo: sed in undecimo determinabitur. Nam si hæc tria in eodem die coniuncta fuerint, & motus velocitas, & sebris magnitudo, coctionisq; signum manifestum, fiet crisis in quartodecima: adhuc autem magis, & anni tempus, & ætas, & egrotantis natura, & quæcunque alia his sunt proportionabilia, ad crisis celeritatem contulerint. Si verò solum manifestum coctionis signum die undecima appareat, neque tamen morbi magnitudo,

tudo, aut motus velocitas festinauerint, tunc ultra diem decimumquartum crisis differetur. Sed, si quidem anni tempus, & ætas ægrotantis & quæcunque alia his sunt proportionabilia, ad frigidius declinauerint, fortè sperandum est morbi solutionem in vigesimo die secuturam. Quod si mista quoquo modo signa affuerint, & dies decimusquartus coctionem insigniter auerit, die decimoseptimo crisis occurret. Si verò neque die quartodecimo aliquid nouatum fuerit, tunc ad septimumdecimum diem est respiciendum. Si enim in eo aliquod signum apparuerit, id fidissimum erit, quamuis valde exiguum fuerit, vigesimoq; die crisin præmōstrabit. Et hoc quidem sic se habere censendum, nisi Naturæ conatus ab externis quibusdam vel consilio vel casu superuenientibus impediatur.

---

*De futuræ crisis per fluxum sanguinis narium præcognitione,*

*Cap. 9.*

**E**Rgo si acutus & calidus fuerit morbus, necesse est huiusmodi crisibus excretionem aliquam subsequi. Vtrum verò per sanguinis fluxum, vel vomitum, vel sudores, vel per aliquod aliud futura sit crisis, deinceps dicemus

mus initium à profluuij sanguinis indicijis, facientes. Itaque propria profluuij sanguinis è naribus signa sunt splendores vani ante oculos, quoniam humor flauus est: obtusiones, quoniam multus & totus simul elatus ad superiora spiritus meatus obserat. oculi lachrymofi ob fluxus multitudinem. Eodem modo rubicundi aliquando videntur, cum malis nonnunquam & naribus. Proprium verò signum est etiam præcordiorum tensio sine dolore; anhelitus difficilis. Sed & dolores capitis extendentes, pulsantesque, & calidi, sanguinis fluxum proprie significant. Sic etiam viscerum sub præcordiis existentium inflammationes, causæ sunt vnà, ac signa sanguinis fluxuum. Quòd si ad latus diuersum sanguinem fluere non est bonum, secundum directum verò est bonum, iam tibi facillimum est narem, ex qua fluxurus est sanguis, prædicere, vbi causam iam fluxuri sanguinis inueneris. Dextra enim præcordia, ex dextra nare bonam crism afferunt, sinistra verò ex sinistra. Præter hæc omnia, & ætas & tēpus anni, & regio, & ægrotantis natura, futurum sanguinis fluxum possunt manifestare. Porro per sanguinis narium fluxum iudicantur plerunque febres ardentes, acutæ. Et omnes, quæ in præcordiis sunt calidæ atque acutæ inflammationes, fluxu sanguinis iudicantur.

Soluít

Soluit autem lienis, & hepatis inflammationes sanguis é naribus profluens, cum hæc viscera vna cum acnis febribus habent inflammationes. Contingit autem aliquando, quod etiam per sanguinem é naribus fluentem phrenitis indicatur, interdum etiam pleuritis, rarius tamen quam phrenitis profluvio sanguinis soluitur.

*De indicatijs futurae crisis per vomitum Cap. 10.*

Vomitum autem signa sunt oris ventriculi morsus, simul cum dolore capitis, & vertigines obortæ, cum ijs, quæ obiciuntur oculis, tenebrosis, & cum agitatione labri inferioris, & multo ac tenui sputo defluente. Hæc verò omnia accidunt, cum biliosus, & mordax humor in ventre ac stomacho collectus fuerit, & ventriculi os momorderit, & cum ipso totum stomachum intus atque infra diltraxerit, vnde & labrum in ipsis agitatur, & sputum tenuis defluit, & tenebrosa, quædam oculis obuersantur, & & hallucinantur, & vertiginem patiuntur, & caput dolent, evaporante re aliqua ex humore bilioso, & præterea facta ex nervis compassione. Item pulsus sunt inæquales omnino, cum stomachus iâ grauatur, ac mordetur. Porro per vomitum magna ex parte iudicantur, febres ardentæ

dentes, tertianæ, quotidianæ, quartanæ, semiter-  
 tianæ. Hepatis uerò cauz quidem partes inter-  
 dum biliosis vomitibus finiuntur, &c.

---

*De signis crifim per dilectionem alui  
 futuram, indicantibus,*

*Cap. II.*

**S**I uerò per excretionē alui crifis fit subsequen-  
 tata, manifestum quidem est nullum signum  
 nec proprium, sed ex eo, quod adsunt, quidem  
 crifis signa, defunt autem vomituum, vel fluxus,  
 sanguinis, vel sudorum, colligere licet. Solent  
 autem per alui deiectionem sæpissimè finiri ter-  
 tianæ, quartanæ, & quotidianæ. Hepatis uerò ca-  
 uz quidem partes inflammationem patientes,  
 excrementis alui biliosis interdum iudicantur.

---

*De præcognitione crifis per menftruo-  
 rum purgationem & hæmor-  
 rhoides, Cap. 12.*

**P**Orò crifim per mulierum menses, indicabit  
 magna lumborum grauitas, & tensio, & do-  
 lor. Hæmorrhoides uerò non omnibus conseruæ  
 sunt.

46 PRACT. GENERALIS  
funt. Quibus autem sunt consuetz, in his solis  
non facile quis distinguet.

---

*De crisis præcognitione per sudores,*  
Cap. 13.

**Q**UOD si crism per sudores fieri contingat, partes corporis erunt calidæ rubræ, vaporosæ: pulsus erit vndosus & mollis: vrina & alui excrementa pauca: delirium: rigor: signa vomitus nulla. Per hunc potissimum finiuntur febres omnes, potissimum ardentes acutæ, tertianæ, quotidianæ, phrenitides, inflammationes calidæ & acutæ in præcordijs existentes, &c.

---

*De præcognitione crisis per abscessum*  
Cap. 14.

**H**ÆTENUS acutorum & calidorum affectuum crises enumerauimus, nunc ad diuturnorum ac tardorum accedamus, qui plerunq; per abscessus quiescere consueuerunt. Horum quidem omnium communia indicia sunt, salutariter se habere egro, quod neq; morbus soluat, neque vrina multa & multam habens subsidantiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria vero vbi morbus non fuerit valde diuturnus, si subita  
dissi-

difficultas anhelitus laboranti superueniens, mox quiescat, eamque grauitas capitis, ac dolor subsequatur, & grauis somnus, ac surditas; huic in glandosis carnibus post aures necesse est abscessus fieri. Si verò morbus iam diu durauerit, neque vllum ex his signis affuerit, sed in aliquo ex locis inferioribus, vel grauitas, vel tensio, vel inflammatio, vel dolor apparuerit, huic abscessus ad partes inferiores est expectandus. Solent autem per parotides finiri lethargus frequenter, & capitis affectus omnes; per alios verò abscessus diuturnæ febres omnes, &c.

*De diebus indicatorijs, & decretorijs. Cap. I 5.*

**C**VM ad crisis notitiam indicatoriorum pariter & indicatoriorum dierum, quorum supermentionē fecimus, cognitio necessaria sit operæ pretium esse videtur, vt de eorum quoque natura disseramus. Primum itaque omnium dierum decretoriorum septimum dicimus, non numero videlicet, & ordine, sed potentia & dignitate: omnes enim summam decretoriorum notas occupat. Etenim plurimos iudicat, & absolutè, item cum manifesta excretionē, vel abscessu, sine periculo vehemēti: & vt plurimum quartus cum prænuñciat. Nam si vrinæ in illo



illo planè, vel sputa vel deiectiones fuerint co-  
 cta, appetitusque uel mentis, uel sensus, uel alie-  
 rius cuiusdam similis bona adfuerit mutatio, in  
 septimo iudicatio bona comitabitur: si uerò ma-  
 la, omnino contraria euenient. Septimi naturam  
 decimusquartus maximè imitatur: hunc indicat  
 undecimus. Sic decimusseptimus uigesimalis: uige-  
 simus quartus uigesimalis septimi: trigesimalis pri-  
 mus trigesimalis quarti: trigesimalis septimus qua-  
 dragesimalis index est, & sic deinceps usque ad  
 centesimum. Cæterum sunt quoque dies interci-  
 dentes, quod scilicet inter indices, & decretos  
 dies intercidant: uerùm hi minus perfecti sunt,  
 & in eos non nisi erratis quibusdam interuenien-  
 tibus, crises transferuntur. Multò igitur mino-  
 rem, quàm priores vim obtinent, neque enim na-  
 turæ motu, sed morbi malitia, aut extraneo ali-  
 quo impellente, in his crisis accidit. Sunt autem  
 intercidentes dies, sextus, octauus, decimuster-  
 tius, &c. de quibus consule Galen. lib. primo de  
 dieb. decretorijs.

*Quid sit in corpore agro agendum,*

*Cap. 16.*

**P**Arte affecta, ipsoque affectu, & causa in-  
 uentis, selectoq; ex eorù notitia prognostico  
 reliquum

reliquum erit, si curari affectus ualeat, ad agendi modum accedere, atque indicare Quid fieri debeat. Ergo generalis circa corpus ægrum operandi ratio ex natura corporis affecti procedit. Aeger namque sano contrarius est, ut immoderatum moderato, & præternaturale naturali. Moderatum in medio consistit: immoderatum uero in excessu, tum in defectu ad latera abscedit. Moderatum quidem suo simili conseruatur: immoderatum suo dissimili curatur. Ut ergo corpus ægrum ad sanitatem reducatur, contrario egritudinis opus erit, iuxta communissimum Hypocratis axioma: quod omnium uidelicet, quæ præternaturam sunt, ab ijs, quæ ipsis sunt contraria, curentur. Verum cum tria in corpore nostro præternaturam sint, Morbus, Causa, & Symptoma, quid in singulis, tum etiam complicatis agendum sit, deinceps dicere aggrediar, exordio à morbo sumpto.

*Quid sit agendum, si vnicus fuerit affectus, seu morbus*

*Cap. 17.*

Quod si morbus causam, quæ ipsum fouere potest, non amplius habeat, sed eger desierit, & solus morbus remanserit, huic soli, in-

D

cum-



cumbendum erit. Quid autem faciendum sit, indicat ipse morbus, sui videlicet curationem per contraria. Quare quot sunt morborum differentie, totidem quoque erunt curationes particulares. Sunt autem morbi vel similes, vel instrumentales, uel similes & instrumentales simul. Similes vero morbi in intemperie uel simplici, uel composita consistunt. Sic in morbo calido, frigesaciendum est: in frigido, calefaciendum; in sicco, humectandum in humido vero, siccandum. Ad eundem modum in compositis uidelicet calido & humido frigesaciendum & siccandum; in frigido & humido, calefaciendum & siccandum: in calido & sicco, frigesaciendum & humectandum, in frigido & sicco calefaciendum & humectandum est. Quod ad instrumentarios morbos attinet, contrariis quoque curandi sunt. Quod namque in figura praternaturam curuum est, in contrarium impellendum, quod uero rectum, reflectendum erit. Simili quoque modo in cavitatibus procedendum est. Ea namque obstructa, aperienda: plena, uacuanda: inanis replenda dilatata contrahenda: compressa dilatanda. In situ praterrea, quod in anteriorem partem prominet, retrorsum pellendum: idem de reliquis oppositionibus in situ iudicandum. Iam quoque in superficie, partes quidem asperas leuigandas: leues uero exasperandas. Ad eundem modum pars aliqua praternaturam

naturam nimium aucta, imminuenda: imminuta  
 uerò augenda. Sic quoque numerus superabun-  
 dans, auferendus: deficiens uerò adijciendus. Por-  
 rò unio soluta reficienda est: reficitur autem per  
 unionem. Hæc quidem in uno præternaturam  
 affectu, uidelicet morbo, facienda sunt.

*Quid sit agendum in pluribus affe-  
 ctibus, siue morbi, siue  
 symptomata fuerint*

*Cap. 18.*

**A**T si non unus tantum fuerit præternaturam  
 affectus, sed duo, vel plures, primū uidere  
 licebit, à quo maximè discrimen ægro impedere  
 videatur. Siquidem affectus, à quo primum ma-  
 ximeque impèdet homini periculū, hic primus  
 curari debet. Ad id uerò quod magis urget, diri-  
 gi primū curantis cōsiliū debet, nō tamē alterius  
 cura oīno posthabita: cum etiam aliqui omnibus  
 pari studio auxiliemur, si æqualiter urgeant. Ur-  
 gebit autem maximè affectus, ubi ipse magnus  
 fuerit, aut malignus, aut pars, quæ afficitur nobi-  
 lis seu princeps. Hac igitur via curari debet cō-  
 plicati affectus, ubi alter magis urgeat. At si ita  
 se habeat, ut unus sana, inæquet, nisi prius alter  
 curetur, ad id, quod ordo dicat, est respiciendū.

eo scilicet prius curato, quo non curato, reliquus affectus curari non ualet, ueluti si vlcus uena cum phlegmone consistat: quamuis phlegmone ad vlcus consequatur, curari tamen non ualet vlcus, nisi prius phlegmone curetur.

---

*Quid sit agendum, si fuerit morbus cum symptomate, Cap. 19.*

**A**T si vnus affectus causæ rōnem obtineat, alter uerò effectus, animaduertendū erit, quia nam eorum augere, aut gignere reliquum possit quūue rursus gignatur, uel incrementum ab eo suscipiat. illud pro compertio habens, non posse ad perfectionem vllum affectū sanari, manente adhuc ipsa, vnde natus est, causa. Quanquam fieri aliquando potest, ut tamen sit eius, qui se habet ut effectus magnitudo, ut p̄sentem p̄niciem, nisi occurras, afferat: quo casu oportebit huic primò occurrere, deinde ad causam redire, licet non amplius complicati, tunc affectus à Medico, ut causa, & effectus considerent̄, sed ut vnus magis vrgeat, quàm alter. Qua ratione interim sit, ut quamuis symptoma nullum seorsū curationem exigat, ex accidente tamē symptomata, quædam interdum curationem immittit, causæ scilicet locum eo tempore habentia quādo adeo.

do aded aucta sunt, ut ledant, aut uirtutem, aut affectionem. Quo fit, ut curandi ratione mutata, symptomata primùm summouere cogamur. Quod iterum non ut symptoma, sed tanquam magis urgens affectus à Medico consideratur. Quare cum non aded uigent symptomata à morbo ipso, à quo dicta symptomata gignuntur, & incrementum suscipiunt, prima sumenda erit indicatio, ac is primò curandus, demum ad symptomata accedendum erit.

*Quid sit agendum, si fuerit morbus cum sua causa, Cap. 20.*

**V**Bi verò qui generata affectum, morbi causa fuerit, ipsa causa spectanda erit. Prima nãq; indicatio ab ipsa sumitur causa, quoniã hæc primò sumenda erit. Fieri enim nequit, ut morbus curetur, nisi prius causa, quæ ipsum fouet remoueat. Quare prius antequam morbum aggrediaris, causa remouenda erit, alioqui morbus inde recrudescet. Interim tamẽ nec eius morbi qui p̄ eam genitus est, ratio non habenda erit. Quinimò si in idem consentiant, & quæ morbũ curant, & quæ causam oppugnant, sine cunctatione id pagendum erit. Animaduertendum tamen in huiusmodi implexibus,

à causa quapiam oritur affectus, sed ita oritur, ut separata causa, haudquaquam affectus ipse permanentē habeat dispositionē. Nonnunquam autem partim iam factus est, partim etiamdū fit, saepe numero, quāquam fieri desinat ablata causa, perseverans tamen manet dispositio. Proinde si talis naturæ erit, qui à quapiam causa affectus oritur, ut ea sublata permanere nō ualeat, summo uenda tunc tantū causa erit, nulla demum ipsius affectus habita ratione, cum propter eorum exiguitatē, separata causa, illico tales affectus finiantur, natura uidelicet ipsos sanante, nullo adhibito medicamento. Verū si non ad eō exiguus sit affectus, sed pars eius iam genita sit, pars ingnendo, & etiam dum fiat, utriq; consulendum erit. Primū quidem summo uendo, quæ ipsum efficit, causam: deinde quod factū iam est ipsius auferendo, utpote natura propter eius magnitudinem absq; medicamento externo ipsum uincere non potente. Quod si in idem consentiant, & quæ causam rescindunt auxilia, & quæ affectum oppugnant, sine cunctatione id peragendum erit: Quamquam prima indicatio ppetuo ab ipsa sumitur causa, eaq; nimirū prima sananda erit. Btenim dū ipsa lædit, curādi morbi rationē interpellat. Interim tamen nec ipsius morbi, ut diximus, ratio nō habēda erit, quinimò semper quo ad fieri possit, medicamentorum materia eligenda est,

da est, quæ cum hoc, quoddam causam rescindant, affectum saltem non augeant. Si ex iisdem amborum sublatio prouenire non poterit, necesse est, ut unamquamque prius, quæ efficit, causam rescindamus, deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, ægritudinem accedamus. Ut uero ipsius efficientis causæ congrua fiat abscissio, prius alteranda seu cōcoquenda erit, præsertim si adhuc fuerit cruda: deinde euacuanda. Concoquitur autem, quod crassum est, attenuando: quod tenax, ac viscosum, abstergendo, quod obstructum, aperiendo, quod mordax diluendo: quod putridum, exiccando, &c. Interim autem statim circa initia euacuamus, præsertim si materia turgeat. Quantitas uero quæ auferri debet tum ex eiusdem causæ quantitate mensuratur, tum ex uirium robore, vel imbecillitate. Naturæ autem robur ex ipso præsertim pulsu dignoscimus. Si uero admodum uires fuerint imbecilles, ut causæ ablatione prohibeant, ipsæ prius rescindendæ sunt, causæ ac morbi indicatione posthabita, ac demum ad causam, ipsamque morbum redeundum erit. Porro si morbi causa uehementer moueatur, & ad partem affectam impetu quodam fluat, tunc uel ad appositam partem reuellenda, uel ad uicinas partes deriuanda erit. Quod si partim fluat, ac partim influxerit, tunc partim quæ influxit, euacuandum: partim quæ fluit adhuc reuellendum uel deriuandum est.



*Quid sit agendum, si morbus & mor-  
bi causa, & symptoma  
fuerint complicata,*

*Cap. 21.*

**T**Ria in corpore nostro praternaturam sunt, Morbus, Causa, & Symptoma: & morbus, quidem sui curationem, causa sui ablationem: symptoma correccionem postulat. Causa ea est, quæ morbum ipsum fouet. Quare primò & ante morbum remouenda est. Morbus verò, ille est, qui primò & per se actionem lædit quare illi post causæ obsecutionem incumbendum. Symptomata morbos sequi solent: ideo post morborum extirpationem corrigenda sunt. Quid autem in quolibet affectu sit faciendum, superius dictum est.


*De alijs indicationibus, quæ indica-  
tiones in propria dicuntur,*

*Cap. 22.*

**P**orrò sunt & aliæ indicatione (quas improprias appellat, propterea quòd proprias indicationes, indefinitas alioqui, definiunt, & circumscribunt) minimè negligendæ: cuiusmodi sunt,

sunt, virtus, temperatura, corporis habitus, ætas, tempus anni, aeris constitutio, regio, consuetudo, & vitæ industria. Ostendi hoc potest in euacuatione. Siquidem virtus quantitatem actionis præscribit: imbecillis enim minimam euacuationem tollerat. Sic temperatura calida & humida euacuationem facilius ferre, quam reliqua composita temperamenta. Habitus corporis gracilis pharmacum vehemens difficulter fert: rarus vi pharmaci omnino dissoluitur. Aetas puerilis, & ienilis, neq; sanguinis missionem, neq; purgationis tollent. Tempus anni calidius, aut frigidius euacuationem impedit. Regio frigida & sicca ad purgationes ineptiores reddit. Aeris constitutio australis corpora humectat, & conspirabilia efficit. Consuetudo indicat à quibus magis vel minus lædit consueuerit. Nam consueta naturæ sunt acceptiora. Vitæ industria in fabris, & balneatoribus minus tutam euacuationem fore monet, quando quidem hæc corpora per sudores subinde expurgantur. Sed pro indicationum cognitione hæc nobis sufficiant, ad tertium accedamus librum.





PRACT. GENERALIS  
LIBER III.

ARGVMENTVM.

Quomodo, & quibus instrumentis  
agendum sit, docet: item precæ-  
pta de victus ratione instituen-  
da, secundum qualitatem,  
quantitatem, locum, tem-  
pus, & ordinem.

Eius cap. hæc sūt.

<b>Q</b> uomodo, & quibus instrumen- tis agendum,	Cap. 1.
De diætâ,	Cap. 2.
De aere,	Cap. 3.
De ciborum qualitate	Cap. 4.

De cibis temperatis,	Cap. 5
De cibis calidis,	Cap: 6.
De cibis frigidis,	Cap. 7.
De cibis humidis,	Cap. 8.
De cibis siccantibus	Cap. 9.
De cibis boni succi	Cap. 10.
De cibi mali succi,	Cap 11.
De cibis lenibus, & acribus,	Cap. 12
De cibis crassis & subtilibus,	Cap. 13
De cibis medis inter tenuantia, & in- crassantia,	Cap. 14.
De cibis stomacho idoneis,	Cap. 15.
De cibis stomacho alienis,	Cap. 16.
De cibis capiti nocentibus,	Cap. 17.
De cibis inflatiniis, & status soluenti- bus,	Cap, 18.
De cibis faciliis, & difficilis corruptio- nis,	Cap, 19.

- De cibarijs velocis cōcoctionis Cap. 20  
 De cibarijs tarde digestionis, Cap. 21  
 De cibarijs multorū superfluitatū, et  
 nō habētibus superfluitates C. 22.  
 De cibus multi nutrimenti, Cap. 23.  
 De cibus pauci nutrimenti Cap. 24  
 De cibus laxantibus, Cap. 25.  
 De cibus astringentibus, Cap. 26.  
 De cibus vrinam mouētibus, Cap. 27.  
 De ciborum quantitate Cap. 28.  
 De ciborum ordine, Cap. 29.  
 De ciborum tempore, Cap. 30.  
 De motu & quiete, Cap. 31.  
 De somno & vigilia, Cap. 32.  
 De abundantia, & inanitione, seu eua-  
 cuatione. Cap. 33.  
 De venæ sectione, Cap. 34.  
 De scarificatione. Cap. 35.

*De purgatione,*  
*De sudore,*  
*De balneis,*  
*De animi affectibus,*

*Cap. 36.*  
*Cap. 37.*  
*Cap. 38.*  
*Cap. 39.*



---

PRAC-

62  
PRACTICAE GENERALIS  
LIBER III.

---

*Quando, & quibus instrumentis  
sit agendum, Cap. I.*

**Q**ua auctore via, ac ratione ualeat Medicus affectam partem omnem, ac quemuis praeternaturam affectum, eiusque causam dignoscere, ac demum affectum ipsum, si quidem is curari possit, propugnare, duobus praecedentibus libris ostendimus, nunc tempestiuum esse uideatur, ut, quomodo, & quibus instrumentis sit agendum, doceamus. Itaque tria in uniuersum instrumenta sunt, quibus Medicus in profligandis uentur morbis: Dieta scilicet, Pharmacia, & Chirurgia. Vtrum unico solum, uel pluribus, uel omnibus simul uti debeat Medicus, indicabit in omni qualitas, causarum uarietas, corporis situs, & locus affectus. Morbi quidem qualitas, ut inter peries totius corporis aliqua, comode tum Dieta, tum Pharmacia curabitur: situs, & figura uitiata, & numerus superabundans, sola Chirurgia curabuntur: sic quoque meatuum obstructions, compressiones, & dilatationes, Dieta, & medicamentis: plenitudo uero, tum medicamentis tum phlebotomia: inanitas sola dieta: magritudo aucta.

aucta, pharmacia, & chyrgia: unitas soluta, chy-  
 rurgia sola curatur. Eadē quoq; ratione causarū  
 varietas, quo nimirū instrumēto vtendum sit,  
 indicat. Siquidem humorum qualitas, sui abla-  
 tionem indicat, tum per commodā victus ratio-  
 nē tū per medicamenta cōtraria: quantitas verò  
 vitiosorū humorū, solis pharmacis purgantibus  
 euacuari potest. Sic quoq; sanguis abundans, so-  
 la chyrgia, phlebotomia scilicet, vel scarifica-  
 tione, vel sanguisugis: pituita, bilis melancholia,  
 solis purgātib. Eadem ratione partes corporis  
 supficiae, solis medicamētis sanari probē pos-  
 sunt. Quod ad locum affectū attinet, is pariter in-  
 strumentorū varietatē demonstrare poterit. Nā  
 totius corporis constipatio per frictions, per bal-  
 nea, per sudores curatur: euacuatio uerò totius,  
 per phlebotomiam, per frictions, per exercitia,  
 per balneum, per pharmaca, per inedia com-  
 modē perficitur. Hepar euacuabitur sanguinis  
 missione, diureticis, aluū ducentibus, aperietur  
 verò cibo, & medicamentis per os sumptis, atq;  
 exterius applicatis. Ad eundem modum ex reli-  
 quis partibus affectis instrumentorum diuersi-  
 tas inuestiganda erit. Verū cum instrumēto-  
 rum cognitio Medico quoque necessaria sit, nūc  
 ordinae de eis agendum uiderur, ac praesenti qui-  
 dem libro, de Dieta: de pharmacia: vero, & Chy-  
 rurgia sequentibus.



*De Dieta. Cap. 2.*

**I**S curationis ductis contextusque, qui p̄ con-  
suetam materiam efficitur. Dieta, id est vir-  
tus ratio nuncupatur, qua tanquam instrumen-  
to Medicus utitur: debita qualitate, & quantita-  
te obseruata: sub quibus etiam tempus compre-  
henditur. Siquidem pro temporis varietate, in  
quo corpus hac, vel illa affectione p̄ditum est,  
etiam diætæ ipsius quantitas, & qualitas immu-  
tanda erit. Additur & ordo. Verùm cùm Dieta  
sex rebus, quas Medici res non naturales uocāt,  
p̄ficiatur: videlicet aere, cibo, & potu: motu, &  
quiete: somno, & vigilia abundantia, & inanitia  
ne: & animi affectibus, de his nunc ordine age-  
mus, principium ab aere sumentes.

*De Aere, Cap. 3.*

**A** Et medico maximè cōsiderandus uenit, ut  
pote sine quo nec morbus tolli, nec tueri  
sanitas possit. Quare diligenter p̄quirendum e-  
rit quæ qualitas in eo dominetur. Siquidem tē-  
peratis hominibus tēperatus aer saluberrimus  
est: intemperatis nerò & agris contrarius opti-  
mus erit: calidis quidem frigidus: frigidis, cali-  
dus: humidis, siccus siccis, humidus, calidis, & hu-  
midis, frigidus & siccus: calidis & siccis, frigidus

& humidus: frigidis & siccis, calidus & humidus: frigidis, & humidis, calidas & siccus. Quod si per se talis non fuerit, arte præparandus erit. Itaque si calidus & siccus fuerit morbus, cubiculum frigidiorē & humidiorē parabimus, ex myrthis, rosīs, pomīs, citriis, salice, vitis foliis: atq; lactuce, alijsq; floribus frigidis, & fructibus, aquaque fontana, aut rosa cea ex aceto, pauimenta eorum assidue aspergentes. Si diuerso si frigidus & humidus fuerit morbus, cubicula præparabimus ex calefacientibus, & siccanibus videlicet igne ex iunipero, populo, salice, cupresso, thure, ligno aloes, oleis, rosmarino, &c. ita tamen ne ignis plurimus sit, nec faciem versus, sed dorso magis insistent, ne vires ægotantium imminuat, visuique obfit. Porro obseruandum quoque venit, quod temporibus frigidis, calido, aut igne: calidis, frigidis: humidis sicco: & siccis humido aere maxime vti conueniat. In diuturnis etiam morbis nonnunquam solum mutare prodest. Aeris enim & loci mutatione sæpe sanitas amissa recuperatur. Ceterum septentrionalis ventus omnium optimus, & saluberrimus habetur. Proximum locum sibi vendicat orientalis, & quicumque ventus aerem modicè infrigidat, siccatur & serenatur. Quare habitationes orientem versus & septentrionem, meliores & salubriores habentur.

*De ciborum qualitate, Cap. 4.*

**E**quidem fani ad vitæ saltem custodiam alimento opus habere videntur: ægri uerò non solum ad virtutis conseruationem, verum etiam ad morbi oppugnationem cibo & potu maximè indigent. Proinde ægrorum cibus, vt vim etiam medicamentosam obtineat, necesse est, qui egrotantium corpora maximè alterare possit. Quare non solum ciborum qualitas, sed etiam quantitas, tempus, & ordo, Medico summo perè consideranda sunt. Verùm de quantitate, tempore, & ordine deinceps, nunc de ciborum qualitate discernendum videtur. Ciborum itaque qualitas ex ipsius morbi, eiusque causæ notitia præstatur. Bre nimirum vniuersus victus rum morbo, tum causæ contrarius esse debet. Morbus enim calidus, victum exposcit frigidum: frigidus, calidum: humidus siccum: siccus, humidum: calidus & humidus, frigidum & siccum: frigidus & humidus, calidum & siccum: calidus & siccus, frigidum & humidum? frigidus & siccus, calidum & humidum victum exigat. Ad eundem modum obstructio aperientibus cibus curatur: viarum plenitudo euacuantibus, seu laxantibus & emollientibus: dilatatio vero constringentibus. Eadem quoque ratione humor crassus, cibus attenuantibus: tenuis in crassantibus lentus incidentibus: viscosus, detergentibus corrigi-

corrigitur, & emendatur. Porro sanguis per viſum refrigerantem & exiccantem commodè contemperatur: pituita verò per excalfacientem & extenuantem: biliſ per refrigerantem & humectantem: melancholia, per excalfacientem & humectantem non ineptè preparari poterit. Verùm vt Medicinè ſtudioſi in medendo vberiore in promptu habeant materiam omniſ generiſ ciborum qualitates deſcribendas fore putauim.

---

*De cibis temperatis, Cap. 5.*

**C**ibi temperati nulla vincente qualitate ſunt præditi, ij ſolùm ſunt alimenta, non etiam medicamenta, ventrem neq; ſoluunt, nec cohibent: ſtomacho neq; robur, nec imbecillitatem inducunt, ſicuti ſudores vrinamue, nec prouocant, nec coercent: nec aliam quamuis diſpoſitionem calidam, frigidam, humidam, aut ſiccam in animantis corpore ingenerant, ſed quale animantis quod nutritur, corpus aſſumpſerant, tale prorfus conſeruant: cuiuſmodi ſunt triticum, caro agnina annualiſ, hœdina, vitulina, caro gallinæ iuueniſ, ius perdicum, phaſiani, alaуда, lingua, oua mollia, & ſorbilia, poma dulcia, ſaccharum, &c.

*De cibis calidis, Cap. 6.*

**C**ibaria calida sunt, quæcunq; sunt dulcia, vel acria, uel salsa, uel nitrosa, uel amara, &c. Eiusmodi est panis triticeus, caro agnina annualis, cicera, poma dulcie, dactyli, uua dulcis, pasifule, apium, eruca, nasturtium, rapa, raphanus, allium, sinapi, cepa, porrum, pastinaca, caseus antiquus, vinum dulce antiquum, fuluum, rubeum. Calida verò & humida sunt, caro ouilla, hœdina anatis, anseris, pullorum, perdicis, columbarum iuuenum, coturnicum, sanguis, hepar, testiculi; pinguedo, adeps, vitellus oui, butyrum, rapa, nappus, pastinaca, eruca, cicer, amygdalæ dulces, pistacia, dactyli, ficus recens, mulsa, uua dulcis, zizypha, saccharum, &c. Calida & sicca sunt, caro porcina syluestris, vaccina, caprina, leporina, anserina, turdorum, merularum, passerum: pisces saliti, caseus antiquus, beta, fœniculum, ruta, maiorana, rosmarinus, petroselinum, saluia, allium, cepa, portum, raphanus, oryza, capparis, amygdalæ amara, auellana, carica, pîneq; mel, sapa, sal, anisum, cinamomum, zingiber, crocus, caryophylli, galaaga, nux moschata, piper, vinum dulce, rubeum. &c.

De ci-

*De cibis frigidis, Cap. 7*

**C**Ibi refrigerātes sunt: quicūq; sūt insipidi, vel  
 tacidi uel austeri uel acerbi: cuiusmodi sūt  
 hordeum milium panicum cucurbita pepo me-  
 lopepo cucumis pruna ficus persica cerasa mora  
 pyra n' ala aultera &c. Refrigerant autem & hu-  
 mectant: caro elixa, caro porcina cerebrum pul-  
 mo, album ouī lac pisces recentes lactuca endi-  
 uia portulaca spinachia atriplex cucurbita angu-  
 ria faba recens fungi melopepones cerasa fru-  
 ctus recentes: oleum immaturum: persica pyra  
 pruna poma insipida una acerba: uinum aquo-  
 sum &c. Porro frigidi ac sicci sunt: caro bubulæ  
 caro gruis aures cutis guttur cor stomachus in-  
 testina matrix acetosa brassica cichorium faba  
 ficca lenticula milium panicum oryza hordeum  
 zea far hordei, far spelię citonium: mala citria li-  
 monia punica mespila oliua immatura: mala a-  
 cetosa: acetum agresta coriandrum &c.

*De cibis humidis, Cap. 8.*

**C**Ibaria humida sunt: omnia liquida iurulenta  
 insipida aquosa pinguis mollia & elixa: cu-  
 iusmodi sunt: hordeum ptisana hodeacea iuscu-  
 la carniū: caro ouilla hœdina ranarum pisces  
 pinguedo adeps: oua sorbilia, anguria cucurbi-

ta, citrulli, cucumeres, melopepones, nuces virides, vva dulcis, ficus, pruna, mora, malua, lactuca, atriplex, blitum, spinachia, febræ recentes, phaeoli recentes, &c.

---

*De cibis siccis, Cap. 9.*

**P**orro cibaria sicca sunt omnia salsa, acetosa, nitrosa, amata. omnia asca: omne, in quo ponitur plurimū vini, aut salis: omnis caro animalium vetustorum: cuiusmodi est caro omnis salita, leporina, hircina, caprina, assata, pisces sale conditi, lentes, caules, polenta, sinapi, acetum, muria, caseus vetus, salitus, vinum vetus, &c.

---

*De cibis bonis. Cap. 10.*

**B**oni succi cibi sunt, qui bonum sanguinem procreare possunt: eiusmodi est, oryza, alica, triticum, sigillo, ptisana, amyllum, &c. Caro pullorum, caponum, gallinarum, perdicum, phasianorum, coturnicum, hœdina, vitulina, veruecina, capreolorum: aues paruz: iecur omne: oua forbilia: caseus mollis. Ex piscibus sunt medij inter teneros, durosq; cuiusmodi est mullus, perca, lupus, aurata, passeris, cochleæ, ostrea, cancri, &c. Ex oleribus autem, lactuca, lupulus, malua, vitica, portulaca, &c. Ex fructibus cucurbitæ, oliuz po-

uz, poma, neque acerba, neque acida, mala citria, uinum dulce, uel leue, &c.

---

*De cibus mali succi, Cap. II.*

**C**Ibi mali succi sunt, qui uitiosum sanguinem generare consueuerunt: cuiusmodi sunt, milium, panicum, legumina ferè omnia: caro domestica permacra, salsa, antiqua: item caprina, ceruina, anserina, asatum: lienes, renes, intestina, omne salsamentum, garum, caseus uetus, &c. Ex piscibus, stagnatiles, lacustres: ut anguilla, tinea carpiones. &c. Ex oleribus, brassica, asparagus, beta, porrum, eruca, ralsurtium, thymum, nepeta, lactureia, hyssopum, ruta, anethum, sceniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, allium, cæpa. Ex radicibus, radícula, rapa, napi, bulbi. Ex fructibus, cucumis, poma acida & acerba: acetum, omnia acria, & acerba: oleum. &c.

---

*De cibus lenibus, & acribus,*

*Cap. 12.*

**P**orro ibi lenes sunt perhumidi, lenti, glutinosi, & pingues: cuiusmodi sunt sorbitiones, puticulae, laganum, amyllum, pitifana, caro pinguis, & quæcunque glutinosa est. Quod ferè quidem in omni, quæ domestica sit, præcipue amen in unguibus, trunculisque suum



in petiolis, capitulisq; hœdorum & vitulorum,  
& agnorum: omnibusq; cerebellis. Item si qui  
proprie bulbi nominetur: lac defrutū passum nu  
clei pinei malua atriplex blitum cucurbita mora  
cerasa dulcia pepones melopepones vinum dul  
ce &c. Acria uerò sunt omnia ninis austera, om  
nia acida: omnia salsa Item allium cæpa ruta eru  
ca nasturtium beta brassica radiula sinapi, &c.

*De cibis crassis, & subtilibus,*

*Cap. 13.*

**C**Ibaria crassi succi sunt, quibus cum visciditate una succorū bonitas & crassities inest: suntq; omnia serè glutinosa, quæcū ualentissimè alant: tum bonum procreare sanguinem consueuerint: si quidē ea uentriculus, ac iecur probè cōficiat: cuiusmodi est panis sine fermento, & sale caseus omnis lac placentę lagina cochleæ, oua dura cocta & frixa: lolignes supia polypodes pisces cetacei ostrea buccina purpuræ hiattulæ lopades pectines: item brassica lentes fungi tubera amyllum iecur renes testes glandulæ cerebra caro suilla agnina: alica oryza ptisana bulbi glandes palmulæ &c. Hæc inquam omnia crassiozem faciunt pituitam. Extenuat autē eandē omnia salsa, atq; acria & acida. Horū nāq; officium est angustiores uias expedire, tū abtergere, siquid

si quid ex humorib. glutinosi vasis adhaeserit, humorumque crassitie incidere, & extenuare. Eiusmodi sunt, caepa porrum raphanus pastinaca feniapi nasturtium allium eruca fœniculum origanum anethum amygdalæ mel pisces salsi muria acetum vinum punicorum citrorum succus &c.

*De cibis medijs inter attenuantia  
& increassantia, Cap. 14.*

**C**ibaria inter attenuantia & increassantia media sunt, quæ in excessuum medietullo, & attemperantia quadam locantur: cuiusmodi sunt caro hædina gallinarû gallorû gallinaccorû, tum phasianorû auium perdicum columbarum attagenû turturum turdorû merularum & passerulorû omniû: oua in aqua proiecta, hepata pullo- rum & anserû: pisces omnes nõ duræ carnis, nec multû viscidæ, in aquis fluuiorum mundis nutriti: vuz maturæ caricæ endiuiâ lactuca asparagus uinum clarum non nimium vetus. &c.

*De cibis stomacho idoneis, Cap. 15*

**S**tomacho aptissima sunt, quæcunque austera sunt & acida: modiceq; salita. Item panis sine fermento, alica elota, uel oryza vel ptisana oës aues, omnis caro syluestris uel assa, uel elixa: caro bubula, macra potius quàm pinguis. Ex sue,

ungulæ, rostra, aures, &c. Ex oleribus, endiuia, lactuca, pastinaca, fiser, cucurbita, absynthium. Ex fructibus, cerasa, sorbum, morum, pyra, mala cotonea, punica, palmulæ, nuclei pini, oliuæ. Ex piscibus, duri, ut ostregæ, peccines, murices, purpuræ, cochleæ, vinum austerum. &c.

---

*De cibis Stomacho alienis, Cap. 16.*

**A** Lienī cibi stomacho sunt; omnia tepida, oīa pinguia, omnia iurulenta, prædulcia, panis hordeaceus, miliaceus, oleum, defrutū, passum, lac, mel multū, omnis caseus, vua recens, ficus & viridis; & arida, fœnum græcum, legumina oīa, quæcunque inflare consueverunt, beta, blitam, atriplex, thymum, satureia, nepeta, hyssopum, nasturtium, lapatum, lap sana, inglandes, sesamum, batheca, cerebrum omne, medulla osium, uinum nouum crassum, nigrum, ponticum, seu austerum, &c.

---

*De cibis capiti nocentibus, Cap. 17.*

**C**apiti nocent lac, daclyli, vua in uinaceis conseruata, fœnum græcum, ruta, sinapi, raphanus, nasturtium, uinum antiquum, præsertim raspaticum, &c.

*De cibis inflatiuis, & flatu soluentibus; Cap. 18.*

**I**nflant, fabæ, cicera, phaseoli non bene cocti, lentes, hordeū non bene coctum, maza, ficus humidæ, lac, vuc, nuces omnes, palmula, rapa cruda milium, vinum dulce, passum, mel crudum, alium, cœpa brassica, omnes radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi omniſq; caseus. Minimè verò inflant, omnis venatio, pisces, poma, oua sorbilia, vel mollia, conchyliam omnia, fœniculū, anethū, vinum vetus, anilum, cinnamomū, ruta &c.

*De cibis facilis, & difficilis corruptio nis, Cap. 19.*

**Q**uæcūq; cibaria facilè concoquuntur, facilè item alterantur, & corrumpuntur. Facilè autem corrumpuntur panis fermentatus, & quisquis alius, quam ex tritico est, chrysomela, pepones, persica, mora, pruna, præcocia, fructus omnes æstiu, lac, lactoria omnia, pisces teneri, olera, caseus, caro tenera, vinum dulce, defrutū, passum, &c. At minimè intus uiciantur panis sine fermento, aues, & eæ potius duriores, aurati pisces: scarus, lolligo, locusta, polypus. Item bubula omniſque dura caro, & macra, & falsa; cochleg, purpur, murices, uinum austerum, &c.

De ci-

*De cibarijs velocis coctionih. Cap. 20*

**C**oncoctu facilia sunt, quæ facile alterantur: cuiusmodi sunt panis optimè præparatus: caro gallinarum perdicum phasianorû, artagenum coturnicû turdorû merularum columbarû: hepata pullorum anserum gallorum testes bulbis elixi, pullorum anserum & auium pinguium: caro auium montanarum vitulina hœdina agnina oua mollia vinum dulce &c.

*De cibarijs tardæ digestionis,**Cap. 21.*

**D**ifficulter concoquuntur, quæ non facile alterantur: vt caro bubula hircina cervina caprina pecudum pauonum anserum turturum palumborum perfectorum animalium: animalium testa obtestorum: uentres auium, hepata animalium caseus antiquus oua dura oryza lupini lentem milium castaneæ glandes palmulæ siliqua bulbis pisces duriores cochleæ intestina animalium: extrema animalium cor lac acetosum, triticum elixum fabæ sesamum, fructus immaturi rapa paffinaca olera omnia: præter lactucam radices olorum uinum nouum crassum & immaturum &c.

De ci-

*De cibarijs multarum superfluitatum, & non habentibus superfluitates, Cap. 22.*

**C**ibaria multarum superfluitatum sunt, caro pullorum, anserum præter alas interiora omnium animalium, cerebra omnium animalium: aues palustres lacustres fabæ virides ciceres recentes, caro animalis lactantis, omnis caro domestica, pisces sordidarum aquarum. E contra verò superfluitatibus carent, alç animum, pedes quadrupedum, genua quadrupedum, caro animalium syluestrium. &c.

*De cibis multi nutrimenti, Cap. 23.*

**P**orro cibi multi nutrimenti sunt caro bubula, alç pullorū anserum cerebella, medullæ, interiora auis, ventriculi auis pisces crassę substantiæ, fabæ ciceres lentes dactyli glandes castaneæ rapa panis similaceus passulæ ficus lac recens vinum rubrum crassum dulce, &c.

*De cibis pauci nutrimenti. Cap. 24.*

**P**arum autem nutriunt panis hordeaceus, caro antiqua, pedes uentres intestina aures pinguedo pulmo milium panicum oliuz nuces, auella-

auellanz, caules, cappares, pisces, cucurbita, mora, poma, pruna, mala, punica, aurantia, olera omnia, beta, acetosa, portulaca, fabæ recentes, raphanus, sinapi, nasturtium, pastinaca, cæpa, alliū, porrum, medulla, panis loti, amyllum, &c.

---

*De cibis laxantibus, Cap. 25.*

**C**ibaria laxantia sunt omnia aquosa, humida, iurulenta, viscida, lenta, falsa, & nitrosa. cuiusmodi sunt, panis fermentatus, & multi turfuris, decoctum caulium, lentium, galli antiqui, piscium testa intestorum, cochlearum, oliuz, serum lactis, caro paruorum animalium, brassica, beta, atriplex, malua, lactuca, portulaca, asparagus, lappathum, ficus virides, cerasia, cucurbita, pepo, melopepo, vuz recentes, passulæ dulces, nuces humida, mora ante cibum, prima mulsæ, oxymel, vinum dulce, mustum &c.

---

*De cibis astringentibus, Cap. 26.*

**A**stringunt quæcunq; austera & acerbæ sunt edula, & terrena & sicca: vt panis sine fermento, siligineus, simillaceus, bis coctus, oryza, panicum, milium, alica, grana myrthi, lenticula, cotonea, pyra, poma austera, mala punica, palmulæ austera, forbæ, mora rubi, siucus spinæ albæ, castaneæ, glandes, brassica bis cocta, plantago, intybus,

tybus, oua dura, caro assata, caro leporis, bubula  
caprina, aues minuta, merula, palumbus, grus, ier-  
cur, caeleus antiquus, defrutum passum, purpura,  
murices, vinum austerum, &c.

---

*De cibis vrinam mouentibus,*

*Cap 27.*

**C**ibaria vrinam mouentia sunt calida, & te-  
nuium partium: vt apium, petroselinum, z-  
netum, ruta, mentha, ocimum, anisum, hyssopum,  
coriandrum, eruca, sceniculum, nasturtium, aspa-  
ragus, nepeta, thymū, satureia, lapsana, passina-  
ca, radícula, fischer, capa, capparis, sinapi, piper, nu-  
cleipini, caro leporina vinum tenuē, &c.

---

*De ciborum quantitate, Cap 28.*

**H**actenus de ciborū qualitate differuimus, re-  
stat nūc vt de quātitate dicamus. Ita q; cir-  
ca ciborū quātitatē maximē obseruandā veniunt,  
egrotantis vires, morbi natura, tēpus anni regio  
gras, & cōsuetudo, &c. Aliā. n. mēsurā imbecilles,  
aliam robustiores exigunt. Imbecilliorib. nanq;  
plenior, robustioribus verò tenuior victus admi-  
nistrāndus est. Aliā p̄terea morb. acutus, ac celer,  
aliā diuturn<sup>9</sup> exposcit. Quāto n. acutior est mor-  
bus, tātō vigori vicinior, ideoq; minus cibi in eo  
exhibendū. Vnde Hipp. aphorif. I. Vbi morbus p̄  
acutus



acutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu vtendum est. Victū autem tenuem vocat, qui fit per ptisanæ succum: simpliciter tenuissimum verò, qui fit per mulsam, tum aquam: extremè tenuissimum, qui per solam inediā absoluitur. Porro morbus diuturnus tenuè victum respuit. victus enim tenuis in morbis longis semper periculosus. Quare in his pleniori victu vtendum, vt ager perdurare queat. Cæterum tempus quoq; anni aliquam mensuram præscribere videtur, præsertim in sanis. Siquidem hyeme & veris initio ventres natura calidissimi sunt & somni longissimi, quare per ea tempora alimenta copiosiora exhibenda. Etenim calor innatus tum copiosior est. Contrà verò ætate minus cibi ostendendum. Eadem quoq; ratione in regione calida, vel frigida, augendus, vel minuendus victus erit. Quod ad ætatem attinet, & consuetudinem, pueri vberiores: adolescentes minorem: consistetes adhuc minorem: senes minimum victum exposcunt. Consueti verò plurimum comedere vberiores: cõtra incõsueti pauciores cibum exigunt.

---

*De ciborum ordine, Cap. 29.*

**P**orro ægrotis simplex cibus conuenit, nihil enim deterius est, quàm diuersa nutriētia similiter adiungere. Sanis verò ciborum diuersitate deuitare,

deuitare: hæc atate penè impossibile est. Proinde ordinem in eis obseruare decet. Ea itaque alimenta primo loco assumenda sunt, quæ facilius concoquuntur, ut cocta descendant, & relinqua deinde coquantur. Nã si ea antecedant, quæ difficilius coquantur ea, quæ facilius coquantur interim superata & cocta, non descendant, inferioribus nondum coctis. duçque inde sequentur noxæ: prima, quòd coctum crudo miscbitur: secunda, quoniam retentum, quòd iam coctum est, corrumpitur, non gubernatum à natura. Quare edulia: quæ facilius concoctionis sunt, precedere debent. Sunt autem facilius concoctionis, cibaria liquida lubrica subtilia humida, citò permeantia corruptibilia, &c. E contra difficilius concoctionis crassa astringentia sicca aromatica, &c.

---

*De tempore cibationis, Cap. 30.*

**Q**uo autem tempore cibandi sint ægri febrientes, indicabit nobis ipsa accessio. Ægri namque in morborum accessionibus cibandi non sunt, nisi totus paroxysmus remittatur. In continuis uerò febribus, in declinatione cibandi sunt ægrotantes. Virum uerò semel, vel sæpius cibandi sint, uires id maxime ostendere possunt. Siquidem robustioribus rarius: imbecillio-

illiorib. verò sæpius cibis offerendus. Porro qui non febricitat: sed diuturno aliquo morbo laborat, cõsuetam horam, ac illi cõtente appetitu sũt cibãdi.

*De motu, & quiete, Cap. 31.*

**H**actenus de aere, cibo & potu: nunc ad exercitiũ perueniendũ est. Quoniã uerò & grotantes ad exercitationes inepti sunt, earum loco frictions ex usu sunt. Hæ namq; tertie concoctionis excrementa expellũt, membra roborant, meatus aperiunt, calorẽ natiuũ excitant, & ad membra trahũt. Sunt aut frictionũ varia genera, videlicet mollis, aspera multa & modica. Mollis fit palma manus, aut pannis leuibus: quæ sanguine coniungit, & ipsum in membro continet. Aspera uerò asperis pannis pficitur, quæ sanguinem ad exteriora uelociter trahit: vnde ad corporis nutritionem non parũ cõferre uidetur. Sic modica, corpus implet, multa uerò minuit. Porro frictions tibiis, brachiis, anteriori & posteriori parti corporis adhibendæ sunt; in acutis quidẽ & recentib. morbis leniter, & quidẽ in remissione, & ante cibũ. Lõga uerò frictione uti, neq; in acutis morbis, neq; increfcentib. cõuenit, præter quã cũ phreniticis somnus queritur. Sed ut leuata quoq; aduersa ualitudine recte frictio adhibetur, sic nunquã adhibenda est febre increfcente. Verũ si fieri poterit, cũ ex toto corp<sup>o</sup> ea uacabit, min<sup>9</sup> cõtẽ cũ ea remiserit.

Cæterũ

Ceterum gestatio quoque; lōgis etiā, & inclinatis morbis aptissima est; utilisque est & his corporib. que iam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri non possunt, & his quibus lenis morborū reliquæ remanēt: neque aliter eliduntur. Porro ex toto nunquam gestari corpus doles debet, siue id in toto siue in parte est, nisi tamen solis neruis dolentib. neque unquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autē gestationis plura sunt adhibenda. que sunt & pro viribus cuiusque, & pro opibus ne aut imbecillū hominē nimis digerant, aut humili obsint. Gestationum leuissima est nauis, uel in portu, uel in flumine: uehementior in alto mari nauis, uel lectica: ut scanno, acrior uehiculo. Atque hæc ipsa & intēdi, & leniri possunt. Et leuia quidem genera exercitationis infirmis conueniunt. Valentiora uerò his, qui grauiū morborū initia sic sentiunt, ut adhuc febre uacēt. Quod & in tabe, & in stomachi uitijis, & hydrops, & interdum morbo regio fit. Aut ubi quidam morbi, qualis commitialis, qualis insania est: sine febre, quāuis diu manent. Porro quies in sanis ubi immodica fuerit: maximo detrimento existit. Cruditates, n. parit, & uitiosorum humorum in corpore copiam procreat. Est autem ubi & quietis conueniens esse possit usus, tum uidelicet ubi ex multa motione caput defatigatum fuerit.

*De somno, & vigilia, Cap. 32.*

Somnus est relictus spiritus animalis ab instrumentis sensuum, & motus ad principium, unde sensus & motus priuatur. Fit autem somnus, quando vapores a cibis, & potionibus resoluti petunt cerebrum, & inuenientes ipsum frigidum, & densum, congelantur, & condensantur, veluti uapores ab aqua inferius eleuati ad partem superiorem, & graues facti descendunt, obstruuntque meatus sensuum: ut spiritus ad cerebrum a suis instrumentis retrahantur. Quod si fuerit moderatus, naturales facultates reficit omnes corporis interna calefacit, unde ciborum perficitur concoctio: cordis vias humectat, & lassitudines inhibet: animali enim facultati affert augmentum, & humoribus obuians temperatis, calefacit & humectat, corpus impinguat, dolores excutit, & mentem exhilarat. Immoderatus vero, & quidem prolixior, virtutes animales concitat & dissoluit vias laxat, corpus refrigerat & humectat: phlegma auget: calorem debilitat, naturalem corporis calorem corrumpit, motus debilitat. Quod si parcius fuerit iusto, consurgit imbecillitas, infirmitas digestionis corporis siccitas, calor dissoluitur. Porro somnus conuenit post descensum cibi a ventriculo, & quidem nocturnus. ob frigus, calorem ad  
 interna

Interna propellens, & ob cessationem à muneribus. Diurnus enim, infuetis maximè, ad plures preparat morbos. Celebrandus autem est lecto suauis, ac molli corpore: vt decet, contexto, vt mēbra æstate non æstuant, & hyeme non algeant, nec sudorem incurrant, & capite elato, non supinè: sed primò quidem in dextrum latus, deinde in sinistrum decumbant. Cæterùm vigilia corporis humiditatem exiccat, unde in catharris præcipitur, adurit humores, ægrotudines facit acutas, spiritum resoluit, concoctionem impedit, & tum cibi, tum potionis cruditatem efficit.

---

*De repletionem, & inanitionem,*

*Cap. 33.*

**A**bsolute tomno & vigilia, ad repletionem, & inanitionem siue euacuationem progrediendum erit. Est autem abundantia duplex, aut cibi, aut humorum. Cibi abundantia satietas appellatur: humorum verò omnium, plenitudo: vnus verò humoris, cacochymia nominatur. Plenitudo rursus duplex existit, vel ad vasa, vel ad virtutem. Ad virtutem, vbi uidelicet tanta est humorum multitudo, quæ virtutem grauat. Ad vasa verò, vbi tanta est sanguinis copia, vt vasa distendantur. Porro inanitionis varia genera sunt, Vacuamus enim interdum per venæ sectionem,

nem, nunc per scarificationē, subinde per medicamentū purgans, & per sudores, &c. de quibus nunc ordine dicemus, à sanguinis missione orsi.

*De venesectione, Cap. 34.*

**V**enesectio conuenit plethoricis, sanguineis; ætate florētibus, temperaturis calidis & humidis, carnosis, robustis, consuetis, tempore veris, & autumnī, tēpore matutino, hora remissionis febris, dolore uehemēti, inflammatione, febribus ardentibus. Nō conuenit autem inanitis, cholericis, frigidis, macillēus, pueris senibus, debilibus, insuetis, tempore æstiuo, hyberno, nisi opus fuerit: item crudis & ebrijs uenæ incisio obest. Porò in sanguine mittēdo cōsiderandū est, quæ uena sit secanda. Interna autē brachij uena, quam multi basilicā nominant, iis secanda erit, quibus partes collo inferiores patiuntur. Exterior uerò, quam humeralē, & cephalicā appellant, iis aperienda venit, quibus caput aliqua affectione laborat. Media, quæ communem, nigrā & medianam nuncupāt, tū secanda erit, ubi dictarū uenarum aliqua obscurior fuerit. Sic in manu uena pollicis, in capitis morbis: minimi uerò digiti, quæ saluatellā uocāt, in hepatis, uel lienis passionibus; secanda est. In pedibus interdū saphena, uel malleoli uena inciditur, præsertim in uteri uiscerūque affectibus; uel mensibus, & hæmorrhoidibus retentis.

rentis. Cæterùm venæ sectio è directo partis laborantis semper facienda est. Quantitas verò pro ætatis, & virium ratione detrahenda.

---

*De scarificatione, Cap. 35*

**S**carificatio est incisio, quæ fit scalpello in longū. Per scarificationem. n. euacuamus, quādo humores sunt cōpacti, & inuiscati in aliqua corporis parte, vel partes corporis phlegmone, aut dolore vexatæ, aut fluxione affectæ. Prodest autē scarificatio, & oculis diuturna fluxione laborantibus, tum capitis passionibus, quiq; thoraci dorsoq; eueniūt, collo, vel dorso adhibita: Sub mento uerò facta, dentibus, faciei & gutturi conuenit. Eadē ratione super renes adhibitz, apollematib. coxarū, scabiei, podagræ, hæmorrhoidibus, elephātiz, vētositatib. matricis, prosunt. Sic quoq; crurū scarificatio, sanguinē mundificat, mēstrua prouocat. Porrò cuiq; parti corporis cucubitulæ fuerint affixæ, huius sanguine eliciūt, exugūt, atq; euacuāt. Estq; hæc cucurbitularū adhibitio, non tam periculosa, quàm si uenæ sectio tenteretur.

---

*De purgatione, Cap. 36*

**P**urgatio est humorum, qui sua qualitate molestant, euacuatio. Conuenit autē hæc iis, qui malis humorib. sunt reserti, iisq; non crudis, sed



concoctis: item robustis, & assuetis, tempore matutino, & hora remissionis morbi. Et contra uerò minimè ex usu est sanis, præsertim quibus cacochymia nulla adest. item imbecillis, macilentis, siccis, senibus pueris mulieribus grauidis, non assuetis pinguibus dysentericis, diarrhæa laborantibus conuulsis inanitis delinquentibus sæpè animo, mulieribus menstruatis, balneatoribus & sessoribus &c. Porro quibus ventriculus, aut caua hepatis pars laborat, aut materia ad superiora uergit, per vomitum purgandi sunt: quibus uerò intestina aut caua hepatis pars afficitur, aut materia ad interiora uergit, per secessum euacuandi sunt. Sic cerebrum per nares, palatum & oculos commodè euacuatur: pulmo per tussim: renes, per urinam: uterus, per pessos & clysteres. Cauendæ præterea purgationes in morborum principio sunt, nisi materia turgeat: sic quoque in statu, siue vigore morbi à medicamentis purgantibus abstinendum. Tempus autem conueniens in declinatione est. Caterùm quantitas prætatis & virium ratione faciendâ est. Qualitas uerò ab ipsius humoris natura desumenda est. Siquidem si bilis, medicamentis purgantibus bilem: si pituita, pituitam purgantibus: si melancholia, atram bilem purgantibus, euacuandâ erit &c.

**S**vdor pronocatur iis potissimum, quibus humor aliquis noxius circa interiora corporis versatur, ut in febribus, & praesertim pestilentialibus, hydropse, &c. Pronocatur autem uariis modis: aut balneo sicco, aut fomento aliquo calorifico, aut medicamentis sudorem cientibus. Cauendus autem immodicus est, quoniam vires delicit.

---

*De balneo, Cap. 38.*


**B**alneorum vsus non omnibus conuenit. Si quidem balnea nocent macilentis, gracilibus biliosis, crudis, plenis, fatigatis, non purgatis, senibus ualde siccis, pueris interdum. E contra uero conueniunt pinguibus, phlegmaticis, crassis, robustis, purgatis, consistentibus, & feminis. Tempus uero aptum uer, & autumnus, & principium aestatis est: matutinum, uel uespertinum, concoctione transacta. Cauendus autem usus immoderatus. Quoniam corpus debilitat, resoluit syncopen inducit, sitim excitat, febrem inducit. Ingressuri alui prius & vesicae excrementa deponant, pannisque se muniant. In ipso balneo uero neque comedant, neque dormiant. Egressuri autem pannis se cooperiam, in lecto

aliquandiu quiescant. Porro balneorum alia sunt naturalia, alia artificialia: atque hæc vel ærea, vel aquæa: ærea rursus, vel sicca, vel humida. Ærea autem sicca calefaciunt, resoluunt, humiditates exicant, hydropicos iuuant. Ærea verò humida, quæ ab herbis in uase aliquo decoctis, parantur, calefaciunt, fundunt, cutim laxant, siccant. Balnea aquarum dulcium, & quidem moderatè calida, calefaciunt & humectant, lassitudinem soluunt, plenitudinem discutunt, mitigant, emolliunt, & somnum prouocant, mundificant, impinguant, pueris, senibus, vitis & mulieribus conueniunt. Cæterùm balnea naturalia dicuntur, quæ sponte proueniunt, & thermæ nominantur, quorum alia sulphurea, alia salsa, alia aluminosa, alia nitrosa, alia cuprea, alia ferrea. Sulphurea quidè calefaciunt, exsiccant, resoluunt, apoplecticos, & epilepticos iuuant, paralyticis, lethargicis, & catharrhosis conferunt, omnia cutis vitia exterunt. Salsa verò calefaciunt, resoluunt, exiccant: spasmo, epilepsie duriciei splenis, scabiei, vlceribus, podagræ, resolutioni, & asthmaticis conferunt. Aluminosa adstringunt, exiccant, reiectioni sanguinis, vomentibus, menstruis & hæmorrhoidibus superfluis, immodico sudori, itomachicis, fissuris matricis, & scabiei profunt. Nitrosa, calefaciunt, exiccant, incidunt, resoluunt, abstergunt, surditati, resolutioni, & hydropicis opitu-

opitulantur, tibijs ulceratis, scabiei & pruritu conferunt. Cuprea podagricis, nephriticis, asthmaticis, articuloꝝ doloribus, ulceribusq; malignis auxiliatur. Ferrea deniq; in frigidat, exiccant, astringunt, ventriculo, lieni, nec non fluxioni menstruorum, & hemorroidum conferunt. Sic & composita pro cuiusq; vincentis qualitate ratione agunt.

*De animi affectibus. Cap. 39.*

**R**eliquum est, ut ad animi affectus trāscamus. à quibus non parum egrotantes læduntur. Multi enim ob animi passiones commoriantur. Caveant itaq; sibi quàm maximè ab ira, furore, tristitia, timore, & sollicitudine. Ira namque corpus inflamat, calorem nativum ad exteriora effundit. Mœstitia verò parit melancholiam, corpus & ossa exiccant. In timore calor omnis & spiritus ad intima cordis penetralia cōfugiunt, quo fit, ut partes algeant, corpus pallēscat, nervi lædantur, viresq; omnes deiciantur. Præ nimio gaudio multos expirasse legimus pusillanimes, dilatato nimirum corde, forasq; repentè effuso, dissipatoq; spiritu. Sed hæc de animi affectibus sufficiant.



## PRACT. GENERALIS

LIBE IV.

## ARGVMENTVM

De remediorum simplicium qualita  
 t<sup>e</sup>, quantitate, loco, & tempore  
 inueniendo, potissimum  
 tractat. Eius capita  
 hæc sunt.

- D**E remediorum qualitate, Cap. 1  
 De medicamentis tēperatis. C. 2  
 De medic. calidis in gradu primo, C. 3  
 De medic. calidis in secundo, Cap. 4  
 De medic. calidis in tertio, Cap. 5  
 De medic. calidis in quarto, Cap. 6  
 De medicamentis frigidis in gradu pri  
 mo, Cap. 7  
 De medic. frigidis in secundo, Cap. 8

De medicam. frigidis in tertio, Cap. 9

De medicam. frigidis in quarto, Ca. 10

De medicam. siccis in primo, Cap. 11

De medicam. siccis in secundo, Cap. 12

De medicam. siccis in tertio, Cap. 13

De medicam. siccis in quarto, Cap. 14

De medicam. humidis in primo, Ca. 15

De medicam. humidis in secundo, C. 16

De medicam. humidis in tertio, C. 17

De medicam. tenuis essentiae, Cap. 18

De medicam. crassae essentiae. Cap. 19

De medic. dissimilarum partiũ, C. 20

De medicam. acribus, Cap. 21

De medicam. adstringentibus, Cap. 22

De medicam. constringentib. Cap. 23

De medicam. aperientibus, Cap. 24

De medicam. discutientib. Cap. 25

De medicam. condensantib. Cap. 26

De medicam rarefacientib. Cap. 27

De medicamentis emollientib.	Cap. 28
De medicamentis indurantib.	Cap. 29
De medicamentis laxantib.	Cap. 30
De medicamentis abstergentib.	C. 31
De medicamentis adurentibus,	C. 32
De medicamentis attrahētib.	Cap. 33
De medicamentis cientibus,	Cap. 34
De medicamentis deleterijs,	Cap. 35
De alexeterijs,	Cap. 36
De pus mouentibus,	Cap. 37
De emplasticis,	Cap. 38
De medic. obstructione liberātib.	C. 39
De epuloticis,	Cap. 40
De exedentibus,	Cap. 41
De expurgantibus,	Cap. 42
De exterminantibus,	Cap. 43
De incrassantibus,	Cap. 44
De medic. flatus discutientib.	Cap. 45
De extrahentibus,	Cap. 46

8	De glutinantibus,	Cap. 47
9	De incidentibus.	Cap. 48
0	De repellentibus	Cap. 49
1	De roborantibus,	Cap. 50
2	De sarcoticis,	Cap. 51
3	De sistendi vim habentibus,	Cap. 52
4	De urinam cientibus,	Cap. 53
5	De menstrua prouocantibus,	Cap. 54
6	De sistentibus menstrua,	Cap. 55
7	De sudorem cientibus,	Cap. 56
8	De calculum frangentibus,	Cap. 57
9	De lac generantibus,	Cap. 58
0	De medicament. expectorantib. C.	59
1	De tussim sedantibus,	Cap. 60
2	De dolorem sedantibus,	Cap. 61
3	De soporiferis,	Cap. 62
4	De venereis,	Cap. 63
5	De spermaticis,	Cap. 64
6	De medic. m. umbustis medetib. C.	65



- De medicam. digestiuis, Cap. 66  
 De medicam. bilem flauam coquenti-  
 bus, Cap. 67  
 De medicam. pituitam coquētib. C. 68  
 De medicam. atram bilem concoquen-  
 tibus, Cap. 69  
 De seminibus calidis maioribus, & mi-  
 noribus, Cap. 70  
 De seminibus frigidis maioribus, &  
 minoribus, Cap. 71  
 De medicamentis purgantib. Cap. 72.  
 De medicamentis bilem flauam pur-  
 gantibus, Cap. 73  
 De medicamentis pituitam purganti-  
 bus, Cap. 74  
 De medic. atrā bilem purgātib. C. 75  
 De remediorum quantitate, Cap. 76  
 De remediorum loco, Cap. 77  
 De remediorum tempore, Cap. 78

66  
ti-  
67  
68  
en.  
69  
mi  
70  
71  
72.  
r-  
73  
ti-  
74  
75  
76  
77  
78

97  
PRACTICAE GENERALIS  
LIBER IV.

---

*De remediorum qualitate. Cap. I*

**V**ictus ratione absoluta, ad medicamentorum tractationem perueniendum est: quae quidem in eorum qualitate, quantitate, loco, & tempore consistit. Verum de medicamentorum qualitate prius agendum est. Equidem medicamentorum qualitas ab ipsius morbi natura, eiusque causa desumenda est. Auspicari enim perpetuo oportet ab indicatione, quae ab affectu, cui mederi paramus, accipitur, & demum examinare, ac discernere, an causa, quae affectum excitauit, iam desierit, an ipsum quoque nunc tum augeat, tum faciat: his inquam semper comparandum est remedium, quod eis sit contrarium. Sic ergo morbus calidus, postulat remedium frigidum: frigidus, calidum: humidus: siccum: siccus, humidum. Obstructio praeterea requirit medicamentum, facultatem habens aperientem: plenitudo, euacuantem: raritas, densantem: densitas, rarefacientem: astringentem, dilatantem: dilatatio, astringentem. Ad eundem modum, magnitudo aucta efflagitat remedium, quod minuit: imminuta, quod auget.

G

Nume-

Numerus quoque abundans, desiderat remediū facultatem habens auferentem: deficiens veid adijcientem. Sic etiam vlcus sordidum postulat remediū facultatem habens detergentem: cauum replentem: planum, epuloticum, &c. Quod ad morborum causas attinet, humor quidem crassus postulat remediū, facultatem habens attenuantem: tenuis, incrassantem: lentus, incidentem: viscosus, abstergentem. Sic quoque sanguis abundans phlebotomiam exigit: bilis, medicamentum, facultatem habens purgandibilem: pituita, medicamentum, quod pituitam: atra bilis, quod melancholiam purgat, &c. Verum vt Medicinæ studiosi vberiore materiam in promptu habeant, omnis generis medicamentorum qualitates enumerandas quoque esse putauimus, initium à temperatis sumentes.

---

*De medicamentis temperatis,*

*Cap. 2.*

**T**emperatum medicamentum est, quod similem elementorum temperaturam, eucrato, hoc est temperato hominis corpori obtinet, ita vt tale medicamentum temperatum, neque calefaciat, neque refrigeret, neque humectet, neque exicet, sed quemadmodum ipsum accepit, conseruet: cuiusmodi sunt adianthū, asparagus, argenti

genti spuma, argenti recremētum, cadmia cera,  
 citri cortex, eryngiū, faba, glycyrrhiza, graminis  
 radix, létiscus, lini semē, lotus satiuā, lyciū, lēs,  
 mastiche, myza, oleū dulcē, pinei nuclei, sesa-  
 mū terra chia, & samia, trichomanes, zizipha.

*De medicamentis calidis in gradu  
 primo, Cap. 3.*

**M**edicamentum primi ordinis calidum est,  
 quod nos excalescit, non tñ euidenter,  
 vt abfinthiū, aloe, agaricum, althea, amygdala  
 dulcia, beta, brassica, buglossum, cassuta, casta-  
 nea, chamamelū, eupatorium, flores populi ni-  
 grę, ladanū, lini semen, lithospermon, maloba-  
 thrū, nuces virides, oryza, orobus, ppolis quin-  
 quefoliū, saccharū, serum lactis, selamum, spica  
 nardi, vuz maturę, vinū nouum seu mustum.

*De medicamentis calidis in secundo,  
 Cap. 4.*

**S**ecundi à medio recessus medicamenta sunt,  
 quę manifestē & euidenter calescere pos-  
 sunt: vt sunt,

Ambarum  
 Anethū viride  
 Apium

Arthemisia  
 Balsamum. Bitumen  
 Buphthalmus

## 100 PRACT. GENERALIS

Calamus odoratus	Melissa
capparis: carduus	Myrrha
Chamæpitys	Myrrhis
crocus	Nux moschata
Elateriū. Elelisphacus	Nuces siccae
Eruū. Elaphoboscum	Ocymū. Pancratium
Ficus	peucedanum
Fœaumgræcum	pistacia
Galdanum	Polium
Lotus sylvestris	Pix arida
Iychnis coronaria	Rapa. Radix rhodia
marrubium	Sal. Scandrix. Scilla
Mastix	Sifer
mali citri semen	Vinum
Manna thurris	Thus. Teucrium
Mel	Zedoaria.

*De medicamentis calidis in tertio,**Cap. 5.*

**T**ertie classi adscribuntur medicamenta calida, quæ in suo genere vehementer calidissimum tamen exalfaciunt cuiusmodi sunt

Abiotanum	Acori radix
Ami. Amomum	Anisum. Apocynum
Anacardium	Aphodelus
Anechum vltum	Agnus
Afarum. Arifarum	Arum

Amo-

Amomum	Lolium
Careum	Mali citri cortex
Carthamus. castoreū	Meum
castia odorata	Moly
calamincha. cedrus	Mentha
cinamomum	Mentastrum
Conyza	Moschus
chelidonium ma.	Nepera, Nigella
chamædrys.	Origanum, Ononis
chamelenæ	Opopanax
cuminum	paronychia
carpesium	Petroselinum
carnabadium	periclymenum
elinupodium	piper, porrum capitatū
colocynthis	ptarmice
Dictānus. daphmoides	pseudonictamnus
Dracunculus	pulegium
elleborus uterque	raphanus
epithymum, eruca	ruta hortensis
Fœniculum, Folium	Sabina
Galanga, Galbanum	Scorodoprasum
Gariophyllon	Sāpfochū. scorpionid.
helentium	silymbriū. Scolymos
hyssopum	Serpillum, Sefeli
Iris	Smyrnium
Iuniperus	Trifolium
leontopetalum	Thlaspi
leucas	Thymbra

Thymus  
Tragium  
Tragoricanum  
Tripolium

Triffago  
Veratrum alb. & nig.  
Vitex  
Vinum vetus.

*De medicamentis calidis in quarto gradu, Cap. 6.*

**M**edicamenta calida in quarta sede sunt, q̄  
aded exalfacere possunt, vt escaram mo  
liantur, & vrant, vt

Adarces  
Ampeloprason  
Allium  
Calx  
Cedrin<sup>r</sup> liquor  
Cepa  
Chalcitis  
Calchanthum  
Chelidonium  
minus  
Clematisaltera  
Cinis ficulneus  
Ci. farmētitiu  
Costus  
Euphorbium  
Fœx vsta  
Granū cnidiū

Lactaria  
Lanaria herba  
Laureola  
Lepidium  
Melantheria  
Misy  
Nasturtium  
Ochra  
Pityusa  
Porru agreste  
Pforicum  
Pulegium  
Pyrethrum  
Ranunculus  
Ruta sylvestris  
Sandaracha  
Sardonia erba

Sina

Sinapi  
sory  
strutium

Testæ mating  
crematæ  
Tithymalus.

*De medicamentis frigidis in primo*

*Cap. 7.*

**M**edicamēta primi ordinis frigida sūt, quę nos refrigerant, non tamen euidenter, vt

Atriplex

Myrtus

Acini vuæ

Orobanche

Cotonea

Oxyphœnica

Citrei caro

Pruna

Gramen

pira

Hordeum

Rhamnus

Malua

Rosa

miliū

Viola.

*De medicamentis frigidis in secundo,*

*Cap. 8.*

**M**edicamenta secundi recessus frigida sunt quę manifestè & euidenter refrigerare ualent. cuiusmodi sunt

Acacia

Cucumis

Alga murina

Damascena pruna

Blitum

Endiua

Condrylla

Galla. Gingidium

Cucurbita

Hiacinthus. hypocistis

G 4

La-



Lactuca. Lens palu-  
stris

Mala persica

Mala armeniaca

Mala granata

Pepon

Plantago

Polygonum

Potamogeton

Pulicaris herba

Psillium

Solanum horrense.

*De medicamentis frigidis in tertio**Cap. 9.*

**M**edicamenta tertie classi frigida adscribitur omnia ea, que uehementer citra summum tamen refrigerant, ut sunt

Caphura

Papauer satium

Portulaca

Solanum somniferum

Sedum maius

Sedum minus

Solanum hortense

Sandali, &amp;c.

*De medicamentis frigidis in quarto,**Cap. 10.*

**I**n quarta sede frigida collocantur, que uehementer refrigerant, adde ut extinguant, cuiusmodi sunt

Cicuta

Dorycnium

Fungi

Opium

papauer erraticum

papaueris succus

Hyoscyamus

Mandragora, &amp;c.

De

*De medicamentis siccis in gradu primo. Cap. I I.*

**P**orro primi ordinis sicca medicamenta sũt quę nos exiccant, non tamen euidenter, sed cum aliqua rationali demonstratione: ut sunt

Alyssum	Lotus latius
Anthemis	Lotus syluestris
Arum	Manna thuris
Artemisia	Malabathrum
Beta	Myrrhis
Brassica	Myrtus
Castane	Ocymum
Chamaeleuce	Orobanche
Crocus	pseudodictamnus
Faba	Rhododaphne
Feniculum	Saccharum
Foenugrecum	Solanum hortense
Hordeum	Sesamum
Hyacinthus	Thus.

---

*De medicamentis siccis in secundo, Cap. 12.*

**M**edicamenti secundi ordinis sicca, manifeste sc̃a & euidenter desiccare possunt: vt sũt

Agaricus	Amomum
Alga marina	Amurca
	G 5 Ane-

Anethum	Lentes
aphaca	Lolium
apiū montanū	lychnis corona
arthemisia	lycium (ria
Balsamum	mali citrei cor.
balauſtia	malicitrei ſemē
bitumen	malabathrum
bupthalmus	maſtix
burſa paſtoris	mentha
calamus odora	mentaſtrum
carduus (tus	mel
capparis	miliū
condrylla	meū
cotonea	myrrha
caſſutha	Nardū indicū
cinnamomum	nardum celticū
Diſtamnum	nux moſchata
creticum	Orobus
Elaphoboſcū	opopanax
elaterium	oryza
eleliſphacus	Petroſelinum
eruum	phu
Folium	piſtacia
Gingidium	pira
Galbanum	pix liquida
Hypociſthis	pix ſicca
Iris	plantago
Lepidium	polycnemum

Radix

Radix rhodia	scandix
Raphanus	scorpioides
Rorismarinus	scolymos
salvia	spicanardi &c.

*De medicamentis sicccis in tertio gradu, Cap. 13.*

**M**edicamēta tertij ordinis sicca sunt ea omnia, quę vehementer citra summū tamē resiccare possunt; ex quorum numero sunt

Abrotonum	castoreum
absinthium	calamintha
acorus	carnabadium
aloe	carpophyllum
alumen	cedrus
ammi	chamæleō nig.
anctum	chamæpitys
anifum	chamædris
acetum	chelidonium
acacia	maius
apium	clinopodium
asarum	cinis fermentitius
apocynum	cinnamomum
asphodelus	euminum
astragalus	coriandrum
carum	cophura
castia odorata	

## 308. PRACT. GENERALIS

Conyza	Petrofelinum
Cucumis fyl.	ptarmice
epithymum	porrum capitatum
eruca	pyrethrum
Galla	Quinquefo-
Galbanum	lium
Hyssopus	ruta
Iris	rhu. obsoniorum
Iuniperus	Sal
Leontopeta-	Sabina
lum	Sanguis draco-
leucacantha	nis
Leucas	Sampfuchum
Marrubium	Scorodoprasum
Moly	Serpyllum
Macer	Sesamoides maior
Moschus	Sesamoides minor
Milium	Seseli
Myrthus	Sisymbrium
nepeta	Smyrnium
nigella	Sphondrylium
Olus atrum	Stachys
Origanum	Teucrium
Paronychia	Thlaspi
Periclymenum	Thymbra
peucedanum	Thymus
Piper	Trifolium
polium	Tragoriganum
	Trifago

Triffago  
Veratrum album

Veratrum nigrum  
Vitex.

*De medicamentis siccis in quarto.*

*Cap. 14.*

**I**N quarto classe nec sicca, nec humida collocantur medicamenta, quum patientes qualitates sint: proinde ex se summum hoc opus non attentant, neque aggrediuntur, nisi insigni calore, aut frigore adiuentur, alioqui sola patiendi facultate contentæ. Quapropter in tertia classe siccum citra additum calorem vim suam exequitur. Possunt tamen ad quartum ordinem sicca referri.

Adarces  
Allium  
Calx  
Cedrinus liquor  
Chalcitis  
Chalcanthum  
Chelidonium  
minus  
Clematis altera  
Cinis ficulneus  
Euphorbium  
Fex vsta  
Lanaria herba

Laureola  
Melantheria  
Misy  
Nasturtium  
Ochra  
tyusa  
Pforicum  
Pulegium  
Ranunculus  
Ruta sylvestris  
Sandaracha  
Sardonia herba  
Sinapi

Sory

*De medicamentis humidis in primo,**Cap. 15.*

**C**Aeterum primi ordinis medicamenta humectantia sunt, quę nos humectare, non tamen euidenter possunt: ut sunt

Buglossum	Rapa
Citri caro	Saccharum
Glycirrhiza	Satyrum
Intybum	Sesamum
Malua	Helxine &c.

*De medicamentis humidis in secundo, Cap. 16.*

**S**ecundi ordinis humida sunt, quę manifestè & euidenter humectare possunt, vt

Atriplex	Prunadamasce
Elitum	Pepones (na
Cucurbita	Persica
Cucumis	Portulaca
Lactuca	Potamogetum
Lens plaustris	Tamatindi
Melones	Violę
Malaarmenica	Vua matu, &c.

De

*De medicamentis humidis in tertio,**Cap. 17.*

**T**ertio ordine humectant ea omnia, quæ vehementer humectare possunt: cuiusmodi sunt cucumis, cucurbita, lactucæ succus, fungi, papaver sativum, solanum somniferum, &c.

*De medicamentis tenuis essentiæ,**Cap. 18.*

**M**edicamēta, quæ celeriter in tenuia solvantur, tenuium appellantur partium. Sunt autem tenuis essentiæ medicamenta

Acanthus	Ascyrum
Acetum. Acorus	Asplenium
Adiantum	Baccharis
Agaricus	Botrys
Ammi	Calamus odoratus
Anethum	Capros
Anthemis	Carpesium
Arctium	Casia
Argemone	Castoreum
Aparine	Cinamonum
Apium	Circea
Aristolochia rotū-	Clynopodium
Arthemisia (da	Crocus
Asarum	Cyminum
	Daucus



Daucus	Myrrhis
Dicțamnium	Myrtus
Ebenus	Napum
Elaterium	Nepeta
Epithymum	Nasturium
Erica	Nigella
Eryngium	Ocymum
Eupatorium	Onobrychis
Euphorbium	Origanum
Ficus	Paronychia
Geranium	Parthenium
Gramen	petroselinum
Harundo	peucedanum
Hypericum	Pœonia
Hyssopus	phalangium
Jasminum	phalatis
Iris	piper
Iuniperus	pistacia
Iuncus odoratus	polemonium
Ladanum	Populus nigra
Leucoium	propolis
Ligusticum	pseudodi&am-
Macer	num
Mala citria	prarmica
Malabathrum	pulegium
Mentha	Pyrethrum
Milium	Quinque folium
Moly	Rhaponticum

Rho.

Rhodia radix	Tamarix
Rhabarbarum	Tenerium
Sabina	Thapsia
Sagapenum	Thlapsi
Samplicum	Thymbra
Schœnanthos	Thymus
Sefeli	Tordilium
Sisymbrium	Tragium
Sium	Tragoriganum
Spartium	Veratrum
Spina alba	Vitex
Sphondylium	Vitica
Stachys	Xyris, &c.
Sulphur	

---

*De medicamentis crassæ essentiæ.*

*Cap. 19.*

**M**edicamenta quæ in tenuia solui nequeunt,  
crassarum sunt partium: cuiusmodi sunt  
dura & viscosa: vt

Acacia	Atramentum metalli.
Alga	Auri pigmentum
Alumen	Batus
Amurca	Buccina
Arbutus	Cacalia
Argentispuma	Calcus
Arum	Centaureum minus

H

Ca

Cepea  
 cera  
 ceruffa  
 chalcitis  
 chrisocolia  
 cochula Indica  
 eucumis  
 Ephemerum  
 Fex  
 Galla  
 Glaucium  
 Hipecoon  
 Hypocistis  
 Lentiscus  
 ligusticum  
 lycium  
 lysimachia  
 Macer  
 melantheria  
 mespila  
 misy  
 miagrammum  
 myrtus  
 Nitrum  
 Oclira  
 Palturus  
 palma  
 papaueris liquor

Phyllitis  
 picea  
 plantago  
 plumbago  
 plubarius lapis  
 plumbū elotū  
 plumbū vstum  
 pompholyx  
 populus alba  
 potamogetum  
 psoricum  
 Radix Idea  
 rhaponticum  
 reeremētū ferri  
 rubri sinopica  
 rubrica fabrilis  
 Sal  
 sesamum  
 sori  
 sonchus  
 spina Arabica  
 squama aris  
 storehis  
 Terra lemnia  
 terra erethria  
 terra samia  
 terra selinusia  
 testæ marinae

Tubera

Tubera  
 Thuris fuligo

Thuris cortex  
 Viscum.

*De medicamentis dissimilarium  
 partium, Cap. 20.*

Dissimilarem essentiam habeat,

Abinthium	cinis ferment. vitis
acacia	cinnabaris
acclam	coriandrum
as crematum	cratægonos
agaricum	cupressus
aloe	cyperus
anchusa	cytissus
aspalthus	Diphryges
aster atricus	Dracunculus maior
alga	Dryopteris
atramentum sutorium	Ephemerum
Batus	Fax
brassica	Filix
bulbus	Folium
calamus odora	Fumaria
capnos (tus	Gingidium
capparis	Glaucium
centaurium maius	Glans vnguentaria
centaurium minus	Granum tinctorum
chalcitis	Halimos
chysocone	Hedera

Ifatis fatiua	Pforicum
Ifopyron	Rha
Lapis phrygius	Rosa
Lapis gagates	rubia
Lapis oltracites	rumex
ligustrum	rufcus
lycium	Scordium
Macer	senecio
Mala citria	sertula campana
Malabathrum	sideritis
Melilotum	sonchus
morus	sicchas
myrtus	simphytum pe-
Mastix	traum
Nardus	Terra cimolia
Oxyfchenus iuncus	Terra pignitis
Paliurus	Tribulus
Pconia	Tubera
Phu	Vmbilicus Veneris
Pica	Vifcum
Plantago	Vitis alba
Polygonaton	Vitis nigra
Populus alba	Vlmus, &c.

---

*De medicamentis acris, Cap. 21.*

**A**cria fune, quæ mordicant rodumq; cū va-  
lida quadam caliditate. Sunt enim omnia  
acris

æria acida, prout magis vel minus æria sunt. Itaque tum incidunt, tum excalfaciunt, tum à uicinis partibus ad sese sanguinem attrahunt: ut

Abſinthium	Capnos
Acetum	capparis
Acorus	Cardamomum
Adarces	Caros
Aegilops	caſia
Aerugo	Caucalis
Aes vitum	Centaurium maius
Allium	Chalcitis
Alypon	chameleon albus
Ammi	chamepitis
Amomum	Chamædapne
Anagyris	chamæſyce
Anchuſa	chelidonium maius
Anemone	chelidonium minus
Aniſum	Chriſocome
Aqua maris	chryſocolla
Argemone	Cinis ſarment. vitis
Ariſarum	cinnabaris
Ariſtolochia rotunda	coagulum
Aſarum	Conyza
Aſpalathus	Coris
Aſphodelus	Coſtus
Atramentum ſutoriū	Crocodillion
Bdellium	Cupreſſus
Calamus odoratus	Cyclaminus
	¶ 3 Cymi-

## 118 PRACT. GENERALIS

Cuminum	Iuniperus
Daphnoides	Lactaria herba
dictānus cretē-	lanaria
dictānus (sis	lapis phrygius
diphriges	lapis ostracites
dracūculus m.	lapis thyites
dracūculus m.	lapis smiris
dryopteris	laserpitium
Fax	laureola (na
ficus	laurus alexātri
flos æris	leontopetalum
fœniculum	leucas
folium	lolium
fumario	Macer
Galion	malacitria
glycifis	malabathron
gramen	—mel
granū cnidiū	melantheria
Halcionium	mentha
halimos	meon
hauena	moli
hedera	Nardus
hiberis	nardus Gallica
hirundinaria	nardus mōtana
hidropiper	nasturtium
Irion	nepeta
Iris	Oculus bouis
Isatis siluestris	oleū sinapinū

oleum

Oleū laurinū  
 oluat rum  
 ononis  
 onofma  
 onix Indicus  
 orminum  
 Pancratium  
 pzonia  
 peplis  
 peplos  
 periclymenum  
 petroselinum  
 phu, piper  
 pituyfa  
 pix liquida  
 pix ficca  
 polium  
 poligonatum  
 porrū capitātū  
 porrū agreste  
 p pseudobuniū  
 pseudodictān<sup>9</sup>  
 pforicum  
 ptarmice  
 pulegium  
 picnocomo  
 pyrethrum  
 Quinquofoliū

Radicula  
 ranunculus  
 rha  
 raphanus  
 ruta  
 sabina  
 sagapenum  
 salis flos  
 sardoniam erba  
 scandix  
 scilla  
 scordium  
 scorodoprasō  
 serpillum  
 sefeli  
 sinapi  
 smilax aspera  
 smilax lenis  
 smyrnium  
 spongiæ  
 sphondilion  
 spuma argenti  
 stachis  
 staphylinus  
 staphis siluest.  
 Teste marinæ  
 Thlaspi  
 Thapsia



Thymelæa	Veratrum album
Thymbra	Veratrum nigrum
Thymus	Veronica
Tithimalus	Viscum
Tordylion	Vitex
Tragoriganum	Vitis alba
Tripolium	Vitis nigra
Triffago	Zingiber, &c.
Tuffilago	

*De medicamentis adstringentibus,*  
*Cap. 22.*

**A**dstringens sapor tum austeri, tum acerbi est genus: inestq; medicamētis adstringētibis facultas, & qualitas cum acribus pugnantissima. Nam contrahunt, constipantq;, atq; condensant substantiam nostram adstringentia, ac proinde in quamvis corporis nostri partem extrinsecus imposita fuerint, cōtinuo illam rugosam & contractam efficiunt, contra, quam acra, quæ imposita cui perspicuo eam exaltant, atque in molem atollunt, rubente colore, & si diutius immorentur, et vlcera. Porro adstringentia refrigerando, contrahendo, constriungendoq; in illis etiam contentum repellere, ex quo liquet facultatem aduersissimam esse adstringētibis, cum acribus. Sunt autem adstringentia,

Abſia.

bfnthium	bulbus eiculentus
Abrotonum	bolus Armenus
Acacia	bursa pastoris
Acetum	Calamus odoratus
Achillea	Capnos
Acinus	capparis
Aes vftum	centaurium maius
Agnus	centunculus
Aerugo	ceratia
Agaricum	chalcanthum
Aloe	chalcitis
Alumen	chryfocome
Ambrosia	chryfocolla
Anchufa	cichorium
Aphace	cinnabaris
Arbutus	ciftus
Argenti recrementum	clymenum
Argenti fpuma	colymbades
Aspalathus	condrylla
Aitragalus	corallium
Alga marina	coriandrum
Atramētum futorium	cornus
Baccharis	coronopus
Balauftrum	crocus modicē
Beta nigra	cupreffus
brassica	cynosbatus
britannica	cypetus
bromos	Diphryges

Dracunculus maior	Intibus
Driopteris	Isatis
Ebur	Isopyrum
elatine	Iuglans
Ephemerum alterum	Iuniperi baccæ
equisetum	Ilex
eupatorium	Labrusca
Fæx vini	ladanum
ferula	lapis Armeni <sup>9</sup>
filix	lapis phrigius
fumaria	lapis hæmatites
Gallæ	lapis scissilis
gingidium	lapis ostracites
glandes	lapis magnes
glâsinguëtaria	lapis Geodes
glycirrhiza	lens
gnaphalium	lentiscus
granû infecto-	leporinus pes
gypsum (triû)	ligustrum
Halimos	limonium
hedera	lotus arbor
hedyfarum	lycopis
helxine	lycium
hemerocallis	lysimachia
hemionitis	Malû punicum
hieracium	macer
hyacinthus	malicorium
hypocisthis	malû cotoneû

Mala siluestris	Persea
mala persica	personata
mal' abathrum	phoenix
manna thuris	phu
malum	phylliris
maſtiche	picea
medium	pinus
melilotum	pirus siluestris
melantheria	plantago
mentha	plūbarius lapis
meſpila	plumbū elotū
miſi	poligonatum
morus	poligonum
muſcus	polipodium
muſcus marin <sup>9</sup>	portulaca
mirtus	potamogeton
Nardus omnis	pruna siluestris
Nymphæa	psoraleum
Ochra	puniæ mala
olea siluestris	Quercus
oleum acerbū	Radix Idea
oloſtium	radix rhodia
Omphacium	recremētū plū.
oryza	recrementum
oxyacantha	argenti
Paliurus	rhaponticum
palma	rhus, roſc
pzonia	rubia

Rubri-

Rubrica saponica	symphytum petrum
rubrica fabrilis	symphytum magnum
rubus	Tamarix
rubus Idæus	Terebinthus
rumex	Terra lemnia
sal	Terra crethria
Salis spuma	Terra cimolia
salvia	Terra pinguis
salix	Terra melis
scordium	Tilia
sedum maius	Tomentum
sedum minus	Tragium alterum
sentis canina	Tragoriganum
sideritis	Tragos
sifer	Tribulus
solanum	Thuris cortex
solanum uescarium	Thus
sori	Veneris umbilicus
sonchus	Verbascum
spina alba	Vitex
spina arabica	Vitis alba
spodium	Vitis nigra
squama zris	Vitis vinifera
stibium	Vlinus
stœchas	Vinacci
stœbe	Vua acerba, &c.
stratiores	

*De medicamentis constringentibus,**Cap. 3.*

**C**onstringentia seu cōtrahentia seu obstruē-  
tia medicamenta crassæ sunt essentię, hiã  
tia uasorum ora concludunt, exiguosq; meatus  
non subeunt, sed foris incumbunt frigida sunt  
temperie, & substantiam habent terrestrem  
crassarum partium: cuiusmodi sunt

Acacia	Melpila
Arbutus	melantheria
Aes ustum	misy
Agressis olea	myrtus
Alumen	myrtidanum
Atramentum sutoriũ	Nitrum
Balaustium	Palma
Chalcitis	Pinus
Empetron	Pinaster
Flos æris	Quercas
Flos salis	Rubus
Galla	Sorbus
Glandes	Sori
Glans unguentaria	Spina alba
Lapis gagates	Spina Arabica
lapis Thracius	Squama gr̃is
lapis morochthus	Strucia cydonia
lysimachia	Spongię, &c.
Malicorium	

De me-

126 PRACT. GENERALIS  
*De medicamentis aperientibus,*

*Cap. 24.*

**A**perientia seu Anastomorica medicamenta  
vasorum oscula aperiunt. Itaque cōtraria  
sunt medicamentis constringentibus aperien-  
tia, quæ natura sunt calida, acri, atq; mordaci,  
tum crassarum insuper partium: vt

Absinthium	Calamintha
abrotonum	cancamum
acorus	capparis
adiantum	cæpa
agaricus	carduus
aloe	carpesium
allium	cētauriū maius
amaracus	centauriū mi.
ammi	chamædris
anthemis	chamæpitis
apium	cicer rubrum
aristolochia	cichorium
artemisia	cinnamomum,
asarum	costus
asparagus	crithmum
asplenum	cuscuta
asphodelus	cyclaminus
amigdalæ ama	Daucus
Betonica	Eupatorium
Brassica	Eringium

Fœni-

Fœniculum	petroselinum
Fel taurinum	peucedanum
Gentiana	pistacia
Hissopum	polium
Iris	pulegium
Iuniperus	Raphanus
Laurus	rhaponticum
laurus	rhabarbarum
libanotis	rosarum succus
lichen	rosmarinum
ligusticum	rubia
Marrobium	ruscus
melissa	Sabina
melopeponū se	scilla
mētastrū (mēt	scordium
meum	sphondilium
myrrha	sinapi
Napi semen	sium
nardus utraque	smyrnium
niigella	squinanthum
Ononis radix	sulphur
oleum irinum	Thimus
oleū amaraci-	Thimbra
organū (nū	Trichomanes
oxylapathum	Verbenaca
Pastinaca filue	Vrtica, &c.
stris	



122 PRACT. GENERALIS  
De medicamentis discutientibus,

Cap. 25.

**M**edicamenta discutientia calida sunt cum  
substantiæ tenuitate: vt sunt

Abrotonum	Brassica
Acanthus	Bromus
Adiantum	bupthalmum
Althea	butyrum
Ammi	bryonię radię
Anagyris	Cannabis
Androsaces	capparis
Anetum	Chamęmelum
Anisum	carum
Aathenum	Casia
Aparine	Casus uetus
Apium	Castoreum
Apiastrum	Caucalis
Apocynum	Cedrus
Argemone	Cera
Aristolochia	chamęleō alb. & nig.
Asclepias	Chamępitys
Asphodelus	Chamęlyce
Alter Atticus	Chelidonium maius
Atriplex	Chrysanthemum
Beta	Cicer
Bdelium	Cytisus
Bitumen	Clinopodium
	Coagulum

Coagulum	Ifatis fatiua
colus rustica	Iuglandes
coriandrum	Lacca
crocodilium	ladanum
cucumis sylv.	lampfana
cyclaminus	lanaria herba
ciminum	lapis phrigius
Daucus	lapis pyrites
Dictānus creticus	lapis gagates
Ebulus	lapis thracius
Elaterium	lapis alabastr.
Brui fatina	leontopetalum
Fax	leucas
Furfur	libanotis
Fœnum græcum	ligusticum
Galbanum	ligustrum
Galiopsis	Jilij folia
Geranium	lini semen
Gladiolus	lolium
Guta ammoniaca	lupinorū fari:
Halcyonium	lycium
Harundo	Malua
Hauena	marrubium
Hemorocallis	melilotum
Hordei farina	mentha
Hydropiper	meum
Iasminum	mercurialis
Iris	moly

Muscus	piper
Nasturtium	pix liquida
nepeta	pix ficca
nerium	pix zopiffa
nigella	pinguedo ouis
nitrum	pseudobunium
nitri spuma	ptarmica
Ocymum	pycnocomum
oculus bouis	Quinquefoliū
oleum vetus	Radicula
oleum ricininū	radix rhodia
oleum raphaninum	rhamnus
oleum melanthinum	raphanus agre.
oleum picinum	retina [stis
oleum anethinum	ricinus
oleum chamæmeli-	rotū dus iuncus
num	rumex
oleum rutaccū	ruta
olusatrum	ruta fyluestris
onobrychis	sabina
origanum	sagapenum
Paliurus	sal
panax	salis spuma
pancratium	salis flos
paronychia	sambucus
perfonata	sampsuchum
petroselinum	sandaracha
peucedanum	scammonium

sene-

Senecio	Tragium
sesamum	Terebinthina
silybrium	Tragoriganum
sium	Trichomanes
smyrnum	Veneris umbil.
spongia	Verbascum
styrax	Viscum
stachas	Vitis
stercus omne	Vrtica
Terra cimolia	Vua
Terra pinguis	Xyris
terra ampelitis	Xanthium
Tellæ ma. lotæ	Zingiber, &c.
Thapsia	

*De medicamentis condensantibus, Cap. 26.*

**C**ondensantia medicamenta frigida planè sunt, non tamen terrestres essentia, neque aereæ, sed potius aquæ, cuiusmodi sunt

Aqua frigida	Tribulus viridis
Semperuium	Psyllium
portulaca	Lenticula palustris
Mandragora	Altercum
Cicuta	Papauer, &c.

I 2      Deme.

132 PRACT. GENERALIS  
*De medicamentis rarefacientibus,*

*Cap. 27.*

**R**arefacientia medicamenta condensantibus, planè contraria sunt: calida enim sunt modicè & minimè sicca, tenuiumq; partium. Proinde diffundunt, laxant, & cutis meatus dilatant: vt sunt

Adiantum

Althea

Anetum

Abrotonum

Chamæmelū

Fenūgræcū

Farina hordei

Farina trui

Farina tritici

Lini semen

Mercurialis

Melilotum

Oleum chamæmelinū

oleum vetus

oleum cicininum

oleum raphaninum

oleum ex cucum syl.

oleum ex althea, &c.

*De medicamentis extollentibus,*

*Cap. 28.*

**E**Mollientia siue Malactica medicamēta modicè tū calida tū sicca esse conuenit: sed satis est, vt secundi, aut tertij ordinis sint exaltescentium, primi exiccantiū. Sed & his nō secus ac pus mouentibus, emplastica vis, hoc est, poros illinendi inesse conuenit. Ceterū quanto maiorem euacuandi facultatem habere debēt, tantò vtiq; minus etiam meatus illitu obstruere:

frnere, ne actio impediatur: vt sunt

Acanthus	Iris
adeps omnis	Lac
althea	ladanum
ammoniacum	lana succida
amurca	laurus
anthemis	lilium
aqua tepida	lini semen
atriplex	lithargyrum
Bdellium	loci syl. semen
beta alba	Malua
bitumen	maftiche
brassica	medulla ceruina
buglossum	medulla vitullina
buphtalmus	mel
butirum	melilorum
Cera	Nigella
cepa cocta	Oefippus
ceruffa	oleum oliuarum
cucumis fyluefttris	oleum amyg. dulcium
colophonia	opopanax
cydoniorum semen	Pancratium
crocus. cupreffus	phafelus
Picus ficcæ	pix arida
Fœnumgræcum	plumbum vftum
Galbanum	pyllij semen
Hemorocallis	Refinæ omnes
Hippoglossum	Sapa

Scilla	Viola purpurea
Sesamum	Ulmī radix
stercus bubulum	Vuæ passæ
stirax	Viscum, &c.

---

*De medicamentis indurantibus,*

*Cap. 29.*

**I**ndurancia ipsius emollientibus planè sunt cō-  
traria. Sunt enim frīgida & humida, veluti  
semvernum, portulaca, psillium, lenticula pu-  
lustris, solanum, &c. Similiter si quid simul refri-  
geret, & deficcet, & ipsum planè indurabit, at  
non propriè. Nam congelatione potius quàm  
euacuatione durum efficitur corpus. Sin quid  
quòd innatam humiditatem non continet, in-  
duratum est, id siccum aptius quam durum di-  
cemus: constatq; eius sanatio rigatione, & hu-  
mectatione, non emolitione: Sicuti tensio, laxa-  
tione curatur, laxatio tensione. Duritiem verò  
sequitur tensio, mollitiem laxatio.

---

*De medicamentis laxantibus, Ca. 30.*

**M**edicamētorū laxantiū nō una est species,  
sed tot, quot tensionū. Tensionē autē expe-  
riūtur, q̄ p̄frictionū iniuriis patuerūt, aut aridi-  
tate rigent, aut inflammationibus obsidētur, aut  
duritia tumentes occalescunt, aut carnis copia  
partes

partes quibnsdā, non secus, ac in phlegmonis, extuberāt. Idcirco non etiā simpliciter una est species laxantiū remediōrū. s. cum alia humectando, alia calfaciendo, alia uero emolliendo, quædam uacuando, nonnulla tumores p̄ternatū rā purgādo, alia p̄ horū cōiugationē quāpiam agēdo laxare cōsueuerint. Porro laxitatem sentiunt ligamēta, tēdones, cutis ipsa, eiq; subditū musculi, cūm copioso humore imbuuntur.

*De medicamentis abstergentibus,  
& detergentibus, Cap. 31.*

**A**bstergentia medicamēta calida crassarūq; partiū esse debēt, cuiusmodi sunt oīa amara, uel nitrosa, quæ crassos viscososq; humores abstergere ualent: ex quorum numero sunt.

Abinthium	Arction
Abrotanum	Argemone
Acorus	Argenti spuma
Aeris squama	Aristolochia rotunda
Aerogo. Agaticus	& longa
Alyisma. Aloe	Arum. Asarum
Amygdalæ amaræ	Asparagus
Anthyllis	Asphodelus
Anthrinum	Atramentum futoriū
Aparine	Atriplicis semen
Apiastrum	Batis



Beta	Costus
Bdellium	crocomagma
Brassica	cucumis sativus
Buccina	cucumis sylvestris
Bulbus esculentus	cyclaminus
Cadmia	Diphyges
canchamum	dracunculus maior
capparis	dulcis radix
capnos	dryopteris
cardamomum	Ebenus
centaurium minus	elaterium
capa	eliotropium
chamædrys	equisetum
chamædaphne	eruum
chamalcon	eupatorium
chamalea	euphorbium
chamæpirys	Faba
chamætyce	fel
chelidonium maius	Fex
chondrylla	ficus
chrysocholla	filis
cicer	flos æris
cinis fermentitius	fœniculum syl.
cinnamomum	fœnumgræcū
clinopodium	fumaria
colocynthis	Gentiana
conyza	Glans unguentaria
concula indica	Glandes

Granum insectorium	Libanotis
Halcyonium	lichen
harundo	lilium
hedrea terrestris	lithospermon
hedy sarum	lithargyrum
helxine	lotus siluestris
hemerocallis	lupini
hirundinaria maior	lycium
hordeum	Marum
hyacinthus	marrhubium
Iasminum	mel
Isopyron	misy
Labrum Veneris	mirrha
labrusca	Narcissus
lactaria herba	nasturtium
lactuca syluestris	nepeta
lanaria herba	nigella
lampfana	nitrum
lapis Armenius	nitri spuma
lapis chalcitis	nymphæa
lapis pyrites	Oleatellus herba
lapis Asius	oleum amygd. amar.
lapis ostracites	oleum balaninum
lapis ophites	ononis
lapis thyites	onosina
lapis Arabicus	orminum satium
leuacantha	orobus
leucoion	osyris

Panacis radix	sifer
pancratium	sifimbrium
papauer corni.	sifymbriū ale.
parthenium	solaris maior
phu	spuma argenti
pistacia	stachas
pityusa	sulphur
pix vtraque	Tamarix
plantago	telephion
populus alba	terra samia
poterium	terra Chia
pulicaris herba	terra selinusia
purpura	terra melia
pynocomum	tithymalus
Quinquesoliū	triffago
Radicula	Veneris vmbil.
Ricinus	Veratrū album
rubia	Veratrū nigrū
Sagapenum	Verbascum
salis spuma	Veronica
scamontium	Viola alba
scandix	Viscum
scilla	Vitis alba
scordium	Vitis syluestri
sepiæ testa	Vitis nigra
sesamoïdes ma ius & minus	Vitis vinifera
sideritis	Vlmus, &c.
	Cæterum

**C**Aeterum detergentia medicamenta non potius purgant, sed tantum cutis uel uicerum sordes. Huius generis sunt amara, & dulcia quedam, quae tenuium sunt partium: ut fabae, eruum, lupini, iris, mel, hordeum, scilla, vrticæ semen, &c.

*De medicamentis adurantibus,*

*Cap. 32.*

**A**durentia medicamenta quaedam, crustam moluntur, Graecis Escharotica dicta sunt, quod escharas, hoc est crustas, cauterij ritu efficiant, sunt consistentia, crassa, & uehementer calida, & caustica, hoc est vrentia, & non secus atque ignis corpus colliquant, & cuiuscunque sensibili corporis parti inhaerint, pungentis stipitis ritu cruciant, ut

Adarces. Aerugo	Chelidonium minus.
Aesustum. Allium	Clematidis altera
Alius lapis	Chrisocolia
Atramentum futuri	Dracunculus
Auripigmentum	Drioptes
Buprestis	Erucae pinorum
Calx uiua. chalcitum	Euphorbium
Cinis ficulneus	Fax usia
Calamintha	Gidropiper. Iberis
Cantharides	Lanaria herba
Chalcitis	Melateria. Misi. ochsa
	Pan-

Pancreatium	Scilla
psoricum	sinapi
ptarmica	staphisagria
pulegium	Thapsia
pulmo marinus	Thimelza
pirethrum	Tithymali
Ranunculus	Veratrum album
Salia	VrUCA
sardonia herba	VrUCA Romana.

---

*De medicamentis attrahentibus,*

*Cap. 33.*

**A**trahentia medicamenta dicuntur, quæ ex alto corpore uehementius attrahunt, ijs quidem substantia calida est, & tenuium partium, attrahit enim perpetuò calidum. Ceterum quod cum caliditate coniunctam habet partium tenuitatem, trahit uehementius. Ex horum genere sunt

Amaracus	Bdellium. Botrys
Ammoniacum	Bulbus esculentus
Anagallis utraque	Centaurium utrunque
Anagyris	Cicer
Anchusæ radix	Cochleæ terrestres
Anemone. Apium	Cyclaminus
Aristolochia rotunda	Distamnus
Baccharis radix	Dracunculus

Elate.

Flaterium. Eryngium	Panacis radix
Fax vsta	Pastinaca syluestris
Fermentum	Personata. Pix
Galbanum	Propolis
Gentiana	Pseudodictamnus
Gladiolus	Pycnocomum
Harundo	Pyrethrum
Hedera	Ranunculus
Helenium	Refina omnis
Heliotropium	Rubia
Iris	Sagapenum
Lacertæ caput	Scoria argenti
Lascepitium	Seseli Mals.
Magnæ	Siluri falsi caro
Maltiche	Stercus omne
Narcissus	Sinapi. Sulphur
Nepeta	Thapsia. Tragium
Nitrum	Veratrum nigrum
Onosina	Verbaſcum
Opopanax	Viscum
Oxyacantha	Xyris, &c.

---

*De medicamentis cientibus, C. 34.*

**C**ientia medicamenta sunt uehemen et cali  
 da, & substantia tenui. siue urinam, siue mē  
 ses siue sudores cieant: cuiusmodi sunt  
 Ageratum                      Allium

Alif.

Alisma	Carpesium
ammi	Carum
amygd. amaræ	casia
anagiris	castoreum
androsaces	caucali
anemone	cedri fructus
anifum	cētauriū vtrūq;
anthemis	chamæpitis
apium	chamædaphne
apiastrum	chrisocome
Aristol. longa	cicer
artemisia	conyza
asarum	coris
ascyrum	costus
asphodelus	crocus
atramentū sut.	crocomagma
atriplex	crocodilium
Balsamum	cucumis fatiū <sup>p</sup>
bdellium	eu cumis syl.
bitumen	Ciclaminus
brassica	cimum
bulbus vomit.	cyperus
calamus odor.	cytifer
cancamum	Dapnoides
cantharides	daucus
capnos	daucus siluest.
capparis	dictamnus
carduus	dictānus cretē.

Dracunculus uterque	Libanoris
Elaterium	ligusticum
epithimum	lithospermum
eruum	lonchitis
cruca	Malú cidonium
eryngium	mala orbiculata
Fel	mala citria
Ferula	malabathrum
foeniculum	milium
folium	moly
fumaria	mirrhis
Gingidium	Napum
granum cnidiū	narcissus
guta amoniaca	nardum
Helichrisum	nardum celticum
Hypericum	nardū montanum
Jasminum	nepeta
Inula	nigella
Iris	Ocimum
Irio	Oesippus
Iuniperus	olea Aethiop. la.
Iuniperi baccæ	onobrychis
Lactuca syl.	ononis
lanaria herba	origanum
laureola	orminum
laurus Alex.	Paliurus
leontopetalum	panax
leucoion	pancratium

Paffi-



144 PRACT. GENERALIS

Pastinaca sylu.	sampsuchum
pæonia mas	sardonias herba
pæonia femina	satyrium
periclymenum	satyrim alterum
petroselinum	scandix
peucedamum	scilla
phaselus	scordium
phu	scorodoprasum
piper	scolymus
polium	serpillum
porrum capitatū	sefelt
porrum syluestre	Siliquæ
pseudobunium	sinapi
pseudodiſtānus	sison
ptarmica	sifer
puleginm	sifymbriū alterum
Radicula	sium
ranunculus	smilax hortensir
raphanus	smyrniū
rapum	solanū somniferū
ricinus	solanum vesicariū
rubia	solaris maior
rufcus	Terra lemnia
ruta syluestris	thlaspi
Sabina	thymbra
sagapenum	thymus
salis flos	tilia
saluia	tordilium

Tragy-

Tragium	Veratrum nigrum
Tragoriganum	Veronica
Trichomanes	Vitis alba
Trifolium	Vrtica
Trissago	Xyris
Veneris vmbilicus	Zingiber, &c.
veratrum album	

---

*De medicamentis deleterijs. Cap. 35*

**D**eleteria sunt, quæ tota essentia nobis contraria sunt, proinde si vel minimum eorû assumptum fuerit, omnino lædat, necesse est; ceu dryopteris, & pityocampe, & thapsia, & solanum manicum, & hydragirum, & fungorum nonnulli, præterea salua & fel venenatorum animalium. Nam quæ huiusmodi sunt, omnia genere sunt deleteria, non quantitate. Ac propterea eorû nihil in alexiterias antidotos imponitur, veluti ea; quæ sola quantitate deleteria sunt, vtpote papaveris succus, & crocus, &c. Nam si horum aliquod largius hauriatur, demerentur quædam, moriem autem quædam inferent. Cæterùm alijs admittæ cõueniētī quodam pondere, seu inæsura, adiuvabūt. Porro humanæ naturæ recta quidē rōne toto genere deleteria existimāda sunt, q̄ hominē aut p̄ cõtactum aut per putredinē, aut per erosione interficiūt,

non ut frigeſcencia duntaxat quantitate, hæc enim; vt paulo ante dictum eſt, vincuntur interdum, & nutrimentum animali euadunt. Putreſcencia autem etiamſi quantitate minima ſumantur, omnino tamen currumpunt, quia videlicet, quæ putredini obnoxia ſunt, calore, humiditateque putreſcere ſolent. At calidus humidusque ſanguis eſt. Itaque putreſcere nunquam ceſſare poteſt, ſimulque viciffim putreſcere. Iam uerò cum ijs quoque accidat, vt ſenſim incaleſcant, proinde longo etiã poſt tẽpore, à quo ſumpta ſunt, nonnulla interimunt, potiffimum, quæ crassa terrenaque ſubſtãtia. Hæc enim corporibus noſtris in hærentia, inſidentiaque, deinde temporis ſpacio putreſcencia, ex crassitie ſua tenaciter adhærentia, erodunt, currumpuntque vicinas corporis partes. At quæ tenuiora ſunt, etiam excerni interim cum excrementis poſſint. Siquidem medicamenta putredine eroſionẽ necantia quandoq; non interficiunt, idque ob duas cauſas; quarum una eſt, quam modo diximus, nempe quum ſimul cum excrementis excernuntur, priuſquam iniuria corpus afficiant. Altera eſt, ſi cui accipienti bona ſaueat fortuna, uidelicet, aut cibus, aut quæ alioq. cõferunt utenti, aut Medico, qui curando prælit, naſto. Nam, vbi grauis ab ijs noxa illata eſt, malum neq; vicus ratione, neque generorum

forum medicaminum, medicique auxiliantis ope fiti potest Quod si prorsus exile sit deleterium, nihil repugnat, quod minus illud quoque nihil perficiat, propterea quod cum excrementis excerni possit, aut idonea uictus ratione superari. At ex deleteriorum genere sunt

Aconitum	chrisocola
aeris squama	colchicum
Aerugo	colocynthis
agaticus	coriandrum
anacardi	cyclamus
apocynum	Daphnoides
argenti spuma	dorycnium
argentū viuum	dracūculi sem.
arsenicum alb.	Elaterium
auripigmentū	Eruca pinorū
Buprestis	Euphorbium
Bryonia	Flammula
Calx	felis cerebrum
canis piscis sel	ferri scobs
cantharides	fungi
castoreū malū	Gypsum
cerussa	Genistæ semen
chalcantum	Hyoscyamus
chalcitis	Ixia
chamedaphne	Lapis armenus
chamaelea	lapis caeruleus
chamgleon	lapis magnes

148	PRACT. GENERALIS
Lathiris	Salamandra
Lepus marinus	sandaracha
Mandragora	sanguis menstruus
mel heracleoticum	sanguis taurinus
minium	sardonias herba
Nerium	scamonium
Nux vomica	scilla
Opium	solanum manicum
opocalpasum	staphisagria
Papauer corniculatū	sudor quadrupedum
pardi fel	Taxus
pityusa	thapsia
pharicum	thymelæa
plumbi scobs	toxicum
psoricum	turperum
psillium	Viperæ fel
Rana rubeta	veratrum album
Ricinus	veratrum nigrum
Rhododaphne	vitis alba, &c.

---

*De medicamentis alexiterijs, Cap. 36*

**A**lexiteriorū, seu alexipharmacorū natura duplex est. Quædam enim corū, quæ mortiferū est, alterant, & alterado iuuant. Quædam uerò ex corpore patiēte corrūpens uenenū, seu medicamen deleteriū euacuant. Verum alterant una qualitate, aut duarum coniugatione, aut deniq; tota.

tota substantia. Euacuant quoque totius essentiæ similitudine, aut caliditate, & partium subtilitate. At alexiterium, quod qualitatis solum contrarietate auxilio est, manifestum est. Nam si frigidum deleterium, aut venenum animantis ab excoalsaciensibus petendum est remedium; si calidum, à refrigerantibus: si verò humidum, ab exiccantibus: si sicum, ab humectantibus. Sic etiam si frigidum sit & humidum, ab exiccantibus, & calefacientibus, & in reliquis coniugationibus pro portione similiter. Cæterum alexiteria, quæ tota substantia medicamenta deleteria alterant, facultatem seu naturam habent mediam inter corpora affecta & ipsa efficiencia vt scilicet idem sit recessus corporis, ad facultatem alexipharmacam, qui alexipharmacæ ad deleteriam: & rursus deleteriæ ad alexipharmacam, quæ alexipharmacæ ad corpus. Quapropter omnia propemodum, quæ deleteriis aduersantur, si largius sumpta fuerint, grauitè corpus animantis oblectunt, quamobrem in ijs exhibendis considerationem corpus est. Porro omne deleteriū venenum, à foris adhibitis medicamentis euacuatur, vtpote, aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudine. Sed & hic quoad fieri poterit, maximè medium natura alexiterium sit, necesse est. Nam si aduersissimum foret corpori, in ipsum ageretur potius

ceu deleterium non euacuaret venenum. Perro

ex genere alexiteriorum sunt

Abrotonum.	Anisum	Cyminum <sup>syl.</sup>
absinthium		Cyclaminus
aristolochia longa		Daucus
agaricum		Dictamnus
allium		Elleborine
adiantum		Eupatorium
ammi		Erysimum
apium		Feniculum
acorus		Gentiana
amomum		Galbanum
Edellum		Irio
butirum		Iuniperus
brassicæ succus		Laserpitium
bryoniæ radix		Libypticum
betonica		Leucas
bolus armen <sup>9</sup>		Marrubium
Cyperi radix		Mala citria
Castoreum		Iuglans
Cinnamomum		Napi
Cardamomū		Origanum
Citrei mali se.		Pulegium
Chamædrys		Paliurus
Casia		Polium
Carnabadium		Quinquefoliū
Costus		Laserpitium
Calamintha		Piper

Ruta

Ruta  
Rapa semen  
Scordium  
Sulphur

Smilax asp.  
Terra lemnia  
Terra samia  
Vnicornu, &c.

*De medic. pus mouētibus Cap. 37.*

**M**edicamenta suppurātia calida & humida, equè, vt corpus humanum, in quo pus moueri debet, sint oportet, ita vt neque id corpus humectent, neque exiccant, neque calefaciant, neque refrigerent, sed tantum caloris nostri substantiam augeāt Nam qualis est in naturis temperatis calor natiuus, tale esse debet, quod ad mouendum pus adhibebitur medicamentum. At si iusto calidior natura fuerit, medicamentum, quod pus mouebit in eo corpore, calidius fit oportet, tanto nimirum temperamento calidius, quanto & natura eius temperatam in caliditate exuperat. Ex quo liquet, vniuscuiusque singulatum hominis suum, ac proprium esse puris mouendi medicamentum. Porro suppuratorium medicamentum emplasticum quoque esse debet, qua substantiæ caloris effluxus prohibeatur. Nam innati caloris substantiam augere, non intendere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstructos esse necesse est. Sunt autē suppuratoria medicamenta

Adeps porcinius

Adeps vitulinus

K 4

Adeps



Adeps gallinaceorum	Fermentum
Adeps taurinus	Ficus
Adeps caprinus	Fœnumgræcum
Adeps asinerinus	Hydrelcūm
Althea	Ladanum
Amomum	Liliorum alborum ca- pita
Butyrum	Lini semen
Bryoniæ radix	Mastiche
Gera cum oleo aliquo calido	Oesypum
Crocus	Panis coctus cum a- qua & oleo
Chondri farina	Pix cum oleo aliquo
Farina triticea cum a- qua & oleo	Resina cum oleo
Farina hordei	Smyrnium. Styrax
Farina lolij	Thus, &c.

---

*De medicamentis emplasticis,*

*Cap. 38.*

**E**mplasticum medicamentū est, quod poros  
illinendi facultatem obtinet, quod viscosū  
sit & terrenæ consistentiæ, sic ut tenaciter corpo-  
ris poris illitum inhaereat, omni mordacitate va-  
cans. Temperatum igitur sit in caloris & frigo-  
ris differentia: siccæ & terrestri consistentiæ, &  
citra morsum desiccantis, veluti pleraq;, quæ e-  
xactè lota sunt, sunt autem emplastica

Adeps

Adeps omnis recens	Lilium
Adeps suillus	Lupini
Althea	Malua
Amylum	Medulla
Bdellium	Mel
Butyrum	Muccago omnis
Cacalia	Myagrum
Cerussa	Nuclei pinci
Calx lota	Oelipus
Cadmia loea	Oleum
Caseosum lactis	Oui album
Cera	Samius aster
Cimolia terra	Sarcocolla
Condrus	Sesamum
Coclez	Terra c. etensis
Fermentum	Terra fullonum
Fœnumgræcum	Thus
Ficus	Tragacanthum
Gummi	Triticæ farina
Gypsum	Triticæ panis
Iris	Vux passæ, &c.

*De medicamentis obstructione  
liberantibus. Cap. 39.*

**M**edicamentum quod obstructione seu infarctu liberat, emplastico planè contrariū est, quia nec viscosum, nec mordacitatis expert



<i>Zerugo</i>	<i>Eruum</i>
<i>Aes vstum</i>	<i>Frysmi semen</i>
<i>Aloe</i>	<i>Eupatorium</i>
<i>Alumen vstum</i>	<i>Fax vini vsta</i>
<i>Althea</i>	<i>Fornacæ testæ</i>
<i>Amylum</i>	<i>vstæ</i>
<i>Anagallis</i>	<i>Fragaria</i>
<i>Aristolochia</i>	<i>Galla</i>
<i>Aquæ alumin.</i>	<i>Gumini acaciæ</i>
<i>Argentispuma</i>	<i>Gypsum</i>
<i>Astij lapidis flos</i>	<i>Iris Illyrica</i>
<i>Balaustia</i>	<i>Isatis</i>
<i>Bdellium</i>	<i>Lolium</i>
<i>Bolus Armen<sup>9</sup></i>	<i>lycium</i>
<i>Buccinæ puta-</i>	<i>lithargyrum</i>
<i>Cadmia (mē</i>	<i>lupinus</i>
<i>Calx lota</i>	<i>Malicorium</i>
<i>Chamædris</i>	<i>mel coctum</i>
<i>Chalcitis</i>	<i>myrrha</i>
<i>Cerussa</i>	<i>misi</i>
<i>Centaurium</i>	<i>mitulivsti cloti</i>
<i>Cochula Indi.</i>	<i>molybdæna</i>
<i>Corallium</i>	<i>mirabalani</i>
<i>Diphyges</i>	<i>myrti baccæ</i>
<i>Dracunculus</i>	<i>Omphacitis galla</i>
<i>Ebulus</i>	<i>Ostreorum putamina</i>
<i>Equisetum</i>	<i>Palmulæ</i>
	<i>Papyrus vsta</i>
	<i>Penta-</i>

Pentaphyllon	Sarcocolla
perfoliata	spodium
plantago	spongia
pompolix	stibium
plumbum vstum	Simphytū maius
plumbom clotum	Thus
pumex	tormentilla
purpura cremata	terra lemnia
Sanguis draconis	testa oui
sambuci folia	Verbenaca, &c.
sandaracha	

---

*De medicamentis exedentibus.*

*Cap. 41.*

**E**Xedentia medicamenta, Græcis cathartica dicta, extimam tantum superficiē, quā contigerunt, detrahunt, sed in altum subire non valent: ita vt eorum vsus sit ad detrahendam vlcericib. excreſcentibus carnem superfluum, cicatricemq; inducendum. Oriuntur ex calida, sicca, tenuiumq; partium substantia. Ex horum numero sunt

Adarces	Alumen
Aerugo	Aqua saporis
Aeris flos	Argentum viuum sublimatum
Aeris squama	Argentum viuum precipitatum
Aes vstum	

cipitatum	Chalcitis
Arsenicum	Diphryges
Afiz petrę flos	Melanteria
Azius lapis	Mercurij oleum
Auripigmentum	Misy
Calx	Ochra
Cantharides	psoricum
Ceruleus lapis	Sori
Chalcanthum	Subij oleum, &c.

*De medicamentis expurgan-  
tibus, Cap. 42.*

**M**edicamenta expurgantia calida esse debent & substantia crassa, sed minori quã abstergentia: eiusmodi sunt

Abinthium	Atramentum futuriũ
Adiantum	Ballote
Amygdalę amarę	Balsamum
Anagallis	Beta
Auemone	Buccina
Apiastrum	Butyrum
Apios	capparis
Aqua maris	cardui succus
Argemone	caries lignorum
Aristolochia rotunda	carpesium
Arum	cedrinus liquor
Asclepias	centaurium maius
	Centau-

Centaurium min <sup>9</sup>	Eupatorium
Cæpe	Faba
Chamæpitis	Ficus
Chelidoniū maius	Flos æris
Chelidonium mi.	Fumaria
Chryſocolla	Gentiana
Cicer	Geniſta
Cinnamomum	Glans vngueñ.
Circea	Granum cnid.
Clematis altera	Gutta amonia
Cnicus	Hedera (ca
Colocythis	Hedifarum
Colimbades	Hippopheſtū
Côchula Indica	Hippophaes
Crocodilion	Hyſſopus
Cucurbita uſta	Iris
Cucumis fatiuus	Irio
Cucumis ſylueſt.	Iſopirum
Ciclaminus	Iuniperi baccæ
Daphnoides	Lactuca ſyl.
Dictamnus	Ianaria herba
Dictānus cretēſis	lapis Armenus
Dracūculus maior	lapis Indicus
Ebulus	lapis chalcitus
Elaterium	leuacantha
Empetrum	libanotis
Epithimum	lini ſemen
Eruum	lotus fatiuus
	Lichnis

Lichnis fyl.	peplis
Mandragora	peplos
marrubium	peucedanum
mel	piper
melantheria	piptacia
mercurialis	pityusa
mora matura	Polium
mori rad. dec.	polygonatum
myagros	polipodium
myrrha	porrum scapit.
myrrhis	porrum siluest.
Narcissus	pruna
nasturtium	pseudodictamnū
nitrum	ptarmica
Oenanthe	pulegium
Oenomel	pumex
Olusatrum	purpura
Orobus	picnocomum
Origanum	Radicula
Orminum	rhaponticum
Othomna	rhabarbarum
Paliurus	recremētū plū.
pancratium	recrementū ar.
papauer corni.	ricinus
papauerispm.	rubia
parthenum	rufcus
pastinaca	sabina
pæonia	Sagapenum



Sal  
 salis spuma  
 salis flos  
 salvia  
 sambucus  
 scamonium  
 scandix  
 scilla  
 scordium  
 sesamoides m.  
 sesamoides mi.  
 siliquæ  
 solaris maior  
 spartium  
 spodium  
 sphondilium  
 squama æris  
 staphylinus  
 staphisagria  
 stibium  
 stochas  
 sulphur  
 symphitum petrzum  
 Terebinthus  
 testiculus  
 testiculus alter  
 terra mella

Thlaspi  
 thapsia  
 thelypteris  
 thymelæa  
 thymbra  
 thymus  
 tithimallus  
 tordilium  
 tragoriganum  
 trichomanes  
 trifolium  
 tripolium  
 trisago  
 thus  
 thuris manna  
 thuris fuligo  
 Veratrū, albū  
 veratrum nig.  
 verbenaca  
 veronica  
 vitex  
 vitis alba  
 vitis nigra  
 vitis sylvestris  
 vlmus  
 vrtica  
 Zingiber, &c.

*De medicamentis extenuantibus,**Cap. 43.*

**E**Xtenuantia medicamenta calida sunt, & tenuium partium. Suo enim calore & subtilitate, facile meatus subintrât, & crasso occurrētia humori, sese sua humiditatis causa insinuât, hac ratione extenuandi præbent effectum. Ex genere verò extenuantium sunt.

Abinthium seriphium	aristolochia rotunda
Abrotonum	asarum
acetum	asphodelus
acorus	aspalenon
adiantum	Baccharis
allium	balsamum
ammi	brassica sylvestris
amomum	butyrum
amygdala dulcia, & amara	chamæmelum
aparine	cancamum
anchusa	casia
anemone	castoreum
anethum	cedrinus liquor
apium satium	cinnabaris
apium sylvestre	cinnamomum
apium palustre	clinopodium
apium magnum	coris
artemisia	cucumis sylvestris
	cuminum

L Cumi.

Cuminum syl.	Panax
Daucus	paronychia
Daucus sylu.	pastinaca syl.
Dictamnus	peucedanum
Dictamnus cre.	piper
dracūculus m.	polemonia
dracūculus m.	populus nigra
Elaterium	pseudodictān <sup>9</sup>
Elelisphacos	ptarmica
Fel	pulegium
Perula	Quinquefoliū
Ficus	Sabina
Gentiana	sagapenum
Gyffopus	sal
Iris	salis spuma
Iuglandes	sampsuchum
Iuniperi baccę	sinapi
Lacca	sifymbrium
Lapis calcitis	squama aris
lapis spongię	stæchas
laserpitium	symphitū pet.
ligusticum	Thymbra
Marrubium	Thimus
Opopanax	Tragoniganum
Origanum	Trichomanes,
	&c.

*De medicamentis incrassantibus,**Cap. 44.*

**I**ncrassantia verò medicamenta frigida sunt, & crassarum partium. Frigore enim cogunt, & substantiæ crassitudine incrassant, vt Hypecoon Hyoscyamum, &c.

---

*De medicamentis flatus discutientibus, Cap. 45.*

**F**latus discutientia medicamenta calida sunt eum partium tenuitate: vt

Abinthium	Cyperus
Acorus	Daucus
Allium	Enura
Anisum	Epithymum
Apium	Eryngium
Anethum	Fœniculum
Bdellium	Fusfur
Carum	Galanga
Carnabadium	Iuniperus
Castoreum	Iuncus odora.
Chamæmelum	Lauri baccæ
Costus	Lignum aloes
Cinnamomum	Maiorana
Cuminum	Nigella
Cyminum	Nux moscata

164 PRACT. GENERALIS

Origanum	Seseli
Petroselinum	Smirnum
Piper	Spica nardi
Rosmarinus	Vitex
Ruta	Zingiber conditū, &c.

*De medicamentis repllentibus*

*Cap. 46.*

**E**Xtrahentia medicamenta calida quoq; sūt  
 cum substantiæ tenuitate: cuiusmodi sunt

Acutæ spinæ radix	Gutta ammoniaca
Ammoniaccm	Harundo
Anagallis vtraque	Lacertæ caput
Aristolochia	Narcissi radix
Arum	Oleum sinapinum
Bulbi	Opopanax
Cyclaminus	Onosma
Dictamnus	Oroninum
Dictamnus Cret.	Oxyacanthæ radix
Dracunculus maior	Pycnocomum
Dracunculus minor	Piper
Elaterium	Pix
Eryngium	Sagapenum
Fermentum	Scoria argenti
Galbanum	Sinapi
Genista	Sulphur
Gladiolus	Tragium

Thapsia

Thapsia  
Terebinthina  
Verbalci semen

Viscum  
Xyridis radix, &c.

*De medicamentis glutinantibus,*  
*Cap. 47.*

**G**lutinantia medicamenta ex sicca & cogē-  
te constant materia, Eiusmodi sunt

Achillea	bryoniae radix
adanthum	bulbus esculentus
acorus	Caseus
aloe	calamus odoratus
alumen	chamaedris
althea	centaurium maius
amomum	centaurium minus
amylum	clymenum
amura	costus
androsemum	conyza
anthillis	coccum insecta
aristolochia	corallium
argemone	cupressus
asphodelus	cyclamjnus
Batus	cyperis radix
betonica	Distamnus
bitumen	Dapnoides
brassica	Dracunculus
britannica	Equisetum

Eupatorium  
 erigerium  
 as vftum  
 Fagus  
 Filix  
 Fragaria  
 Gentiana  
 glans  
 glycyrrhizæ succus  
 graminis radix  
 Gummi acaciæ  
 gypfum  
 Hedera  
 hipericum  
 hipociftis  
 Ilicis pilulæ  
 Ifatis  
 Lapis gagates  
 lapis thracius  
 lapismorocht<sup>9</sup>  
 lens  
 lonchitis alt.  
 lyfimachia  
 lolium  
 lycium  
 Malicorium  
 Mel  
 Millefolium

Myrrha  
 Myrtus  
 Narciffus  
 Ocimi femen  
 Oefypus  
 Oleo fyluefr.  
 Oua  
 Palmulæ imat.  
 papyrus  
 pentaphyllum  
 picea  
 perfoliata  
 pirus  
 pix ficca  
 plantago  
 plûbum clotû  
 polium  
 policnemum  
 potamogeton  
 poligonarum  
 poligonû vtrû.  
 peterij rad. (q;  
 punicorû cyti-  
 pumex [ni  
 Quinquefoliû  
 Quercus  
 Refinæ omnes  
 Salix

Sambucus	simphitum petreum
sanguinalis	Terra lemnia
sarcocolla	Terra eschtria
scordium	Thuris manna
sideritis	Thus
smirnum	Tiliz cortex
spongiæ	Tormentilla
stœbe	Fragoriganum
stratiotes	Verbascum
sycomorùs	Verbenaca
simphitum	Vitex. Vlmus.

---

*De medicamentis incidentibus,*

*Cap. 48.*

**I**ncidentia medicamenta ex partium tenuitate proficiscuntur: ex quorum genere sunt

Abrotonum	Cedria
Acanthus	Chamæpitis
Acetum	Chelidonium vtrumq;
Agaricum	Cepa
Allium	Cicer
Amig. amaræ	Coagulum
Angiris	Coniza
Anemone	Cucumis siluestris
Arum	Cyolaminus
Casia	Cimum
Castoreum	Ciperus
	L 4 Diſtamum



Dictānus cret.

Elaterium

eruum

eupatorium

Fel

Gentiana

Glans vnguēt.

Hyssopus

Iris

Isopyrum

Iuniperi bacæ

Lepidium

leuacantha

libanotis

ligusticum

Marrubium

marum

meum

moly

Nasturtium

nepeta

nigella

nitrum

nitri spuma

Orobus

ononis

origanum

Paliurus

pancratium

papauer corn.

pastinaca syl.

periclimenum

petroselinum

peucedanum

piper

pityusa

polium

porrum capit.

porrum syl.

pseudodictān<sup>9</sup>

Radicula

Baphanus

Rubia

Ruta

Salis flos

scandix

scilla

scordium

scorodopra-

sum

sinapi

spondylium

staphylinus

Teucrium

Thlaspi

Thymbra

Thymus

Thymus	Vetonica
Tragoriganum	Vinum
Triffago	Zingiber, &c.

*De medicamentis repellentibus.*

*Cap. 49.*

**R**epellentia medicamenta frigida & crassarum partium sunt, facultatemq; habent occurrentes sibi succos in altum repellendi. Si quidem repellit semper frigidum: & quod cum frigiditate partium crassitiem coniunxit, violentius propellit. Ex horum autem genere sunt

Acacia	leporinus pes
acerabulum	limonium
ambrosia	lycopfis
apollinaris herba	lycium
Balaustia	Malicorium
Caseus recens	mali punici flos
centunculus	mespilus
cerussa	mascus marinus
cytus	myrtus
cucurbita	olostium
cytinus	omphacium
Ephemerum	omphacomel
Hordeum murinum	oxyacantha
Lens palustris	Palma
lentiscus	palma elate
	L 5
	Papa-

Papauerfativū	Rubus idcus
papauer syl.	Rumex
Persea	Sal
phillitis	salis spuma
picea	sanguinalis
pirus	sedum maius
plantago	sedum minus
plumbum	sentis canina
portulaca	solanum
Potamogetum	stratiotes millefolia
punica mala	stratiotes aquatica
Quercus	simphitum petræum
Radix Ideæ	Tamarix
Rhus	Terra cimolia
rubrica sinop.	Terra pinguis
rubr. fabrilis	Thuris cortex
rubus	Thuris manda, &c.

---

*De medicamentis roborantibus,*

*Cap. 50.*

**R**oborantia medicamenta adstrictoriam si-  
ue cohibentem facultatem obtinent, sunt  
que crassarum partium: cuiusmodi sunt

Absinthium	Alumen
Acaëia	Amaracus
Agallochum	Arbutus
Aloe	Balaustium
	Bryon

Bryon	Labruscæ flos
Calamus odo.	adanum
Castanea	lagopus
Centauriū ma.	lēuscina refina
Coccū infect.	limonium
Colymbades	lycium
Coralium	lisimachia
Coriandrum	Matabathrum
Coronopus	malicorium
Cornu ceruinū	mala siluetria
Cornus	mentha
Crocum	mespilus
Costus	milium
Cotonea mala	morus
Cupressus	muscus
Cyperus	myrrha
Citius	myrtus
Ebur	nardū indicū
Equisetum	nardum celt.
Fagus	Oenanthe
Galla	Olea siluest.
gallinæ ins	Oliuæ falsę
gypsum	Omphacium
Hedisarum	Oriza
Iaspis	Palma
Ilex	palma elate
Intybus silu.	piper
Iuncus odora.	pista cia

Plantago	Rubus Ideus
platanus	Salvia
Quercus	Spina alba
Quinquefolium	Spina Arabica
Raphonticum	Stæchas
Rhabarbarum	Succinum
Rhodia radix	Symphytum
Rhus	petræum
Rosa	Terebinthus
Rosmarinum alt.	Thus
Rubus	Thuris cortex, &c.

---

*De medicamentis sarcoticis, Cap. 51*

**S**arcotica medicamenta mediocriter citraq; morsum abstergendi vim habere debent, ut cavitates carne impleant. Quæ enim carnem creant medicamenta, & cavitates implent, primam siccantium detergentiumq; sedem obtinent. Talia namque humoris abundantiam resiccare, & sordem detergere possunt. Ex horum autem genere sunt

Abiegna lachryma	Iris
Aloe	Lapis asius
Butyrum	Lentiscus
Cadmia	Mastiche
Fuligo thuris	myrrha
Hypericum	panacis cortex
	Pix arida

Pix arida	Sanguis draconis
Pix liquida	Sarcocolla
Resina pinea	Styrax adustus
Resina strobilina	Thus
Resina terebinthina	Thuris manna
	Thuris cortex, &c.

*De medicamentis sistendi vim habentibus Cap. 52.*

**S**istenta medicamenta adstrictoriam, & co-

gentem vim obtinent: cuiusmodi sunt

Acacia	Coagulum
achillea	condrylla
acini	corallium
adiantum	cornus
agrestis olea	cornu ceruinū
alisma	coronopus
althea	cupressus
alumen	cynosbatus
astragalus	Fax
Brassica	Ferulæ medul.
britannica	Fagus
bromus	Fœniculū syl.
Cinnabaris	Galla
cistus	Galium
clematis prima	Glans vnguēt.
clymenum	Glycisis
	Gramen

Gramē harūd.	Marum
Gypsum	Medium
Hordeū muri.	Mentha
Hyacinthus	Mespila
Hipocistis	Milium
Intybum	Mora immatu.
Isatis sativa	Muscus mari.
Ilex	Myrtus
Labruscē flos	Nardus
lactuca sativa	Nitri spuma
ladanum	Nymphæa
lapis Indicus	Olea syl.
lens	Oleū omphac.
lentiscus	oleū mirteum
leporinus pes	oleū lentiscinū
limonium	oliuz salzē
lotus arbor	olostium
lycium	omphacium
lincurium	Paliurus
lysimachia	palma
Malum punicum	palma clate
Mali punici flores	panicum
Mali punici putamen	pæonia
Malum cotoneum	persea
Mala orbiculata	phyllitis
Mala sylvestria	phœnix
Mala persica	phn
Manna thuris	picca

Pirus	Sentis canina
Plantago	salanum
plübarius lapis	sorba
plumbü clotü	Spina alba
plübum ciem.	spina Arabica
poma cydonia	stibium
portulaca	Stœbe
potamogetum	Stomoma
pruna	stratiotes mil-
punica mala	lesolium
Quercus	Succinum
Radix idea	Simphitü pet.
recrementum	Testicul <sup>9</sup> alter
plumbi	Tilia
recrementum	tomentum
argenti	tragiü alterum
rhus	tragus
rosæ	tribulus
rubrica sinopi.	trichomanes
rubric. faarilis	thuris cortex
rubus.	thuris fuligo
rubus idæus	Verbasum
sanguinalis	Verbenaca
sarcocolla	Vua acerba &c



176 PRACT. GENERALIS  
*De medicamentis urinam cientibus,*  
Cap. 53.

**M**edicamenta urinam prouocantia quodāmodo acria esse debent, & valde calida, nec non sicca, à quibus sanguis non extenuatur solūm, sed & funditur, ac seceritur, non secus atque lac, quod coagulatur, seroso & tenui seorsum segregato, crasso in sese coeunte. Nam vt renes serosum humorem, qui in sanguine existit, facilius ad se trahant, multum confert primum sanguinis fusio, deinde segregatio, quorum vtrunque à ualido calore fit. Ex horum genere sunt

Acorus	Bdellium
Ageratum	Bitumen
Allium	Calamus odo.
Amni	cantharides
Amygdalę amarę	capnos
Androsaces	capparis
Anisum	carduus
Apium fatium	carpesium
Apium montanum	caium
Apium magnum	casia
Asparagus	caucalis
Asphodelus	chamæpitys
Baccharis	cinnamomum
Balsamum	crocus
	Cyperus

Cyperus	Lonchitis
Cytisus	Malum cydonium
Daucus	mala orbiculata
Dicamnus cretensis	mala punica acida
Dicamnus	malabathrum
Draconculus maior	mel
Draconculus minor	mentha
Echinus marinus	meum
Epithymum	miliun
Eruum. Emea	moly
Fumaria	Napum
Feniculum	nardus indica
Folium	nardus Gallica
Gingidium	nardus montana
Gramen harund.	nepeta
Gutta ammoniaca	nigella
Helenium	Ocymum
Iasminum	oleę syl lacryma
Iris	ononis
Iuniperus	organum
Iuniperi baccę	Paliurus
Lactuca sylvestris	panax
lanaria herba	pancratium
laurus Alexandrina	pastinaca sylvestris
leopardalum	periclymenum
libanotis	petroselinum
ligusticum	peucedanum
lithospermum	phu

M

Piper

Piper  
 polium  
 porrum capit.  
 porrum silu.  
 pseudobuniū  
 pseudodiciā<sup>2</sup>  
 pulegium  
 Radicula  
 rāphanus  
 rubia. ruscus  
 ruta  
 ruta siuestris  
 runcicis acuti radix  
 Sabina  
 salvia  
 sampuchum  
 scandix  
 scilla  
 scordium  
 scolimus  
 squinanthum  
 semen apij  
 semē petrosel.  
 semē sceniculi  
 semen dauci  
 semen feselios  
 semen smirnij  
 serpillum

Sefeli.  
 siliquæ  
 sinapi. sison  
 sisimbriū alt.  
 sium  
 smilax  
 smiroium  
 solanū uesicar.  
 solanū sōnifer.  
 sphondilium  
 Terebīthi fru.  
 testiculus alt.  
 thlaspi  
 thimbra  
 thimus  
 rilia  
 tordilium  
 tragoriganum  
 trichomanes  
 trifolium  
 trifago  
 uentris umbil.  
 Vetrica  
 vitis alba  
 Vitis nigra  
 Vrtica  
 Xyris  
 Zingiber, &c.

Deme-

*De medicamentis menstrua prouocantibus, Cap. 54.*

**Q**UAE menstrua prouocant medicamenta uehementer calida tenuiumq; partium esse debent, sed non admodum sicca, ita ut secundi vel tertij quodammodo ordinis calida sint, sicca uero primi, uel etiam secundi. Poterunt mensēs mouentia urinum quoque ciunt, sed inter se differunt, q̄ mensēs mouentia non tam valenter desiccant, ut vretica: uerum vretica ad mensēs prouocandas, atque ad lac generandum minime apta sunt, utpote nimium desiccantia. At ex prouocantium menstrua genere sunt

Absinthium	Aristolochia longa
Abrotonum	Arthemisia
Acorus	Afarum
Adiantum	Ascirum
Agaricum	Asphodelus
Allium	Baccharis
Alisma	balsamum
Amomum	batis. betonica
Amigd. amara	bitumen
Anemone	bryonia radix:
Anisum	brassica. buntū
Anthemis	Calamintha
Apium	calamus odor.
Apialtrum	cauchamum

Capparis. casia	glycifis
castoreum cassutha	Hedera
caucalis. cedri fructus	heliochrysus
centaurium vtrumque	hypericum
chamæpitis	lasminum
chamædrys	Inula. Iris
chamædaphne	Lanaria. Lauendula
chryfocome	lapathum
cicer	laureola. laserpitium
cinnamomum	laurus alexandrina
clinopodium	leucoion libanotis
convza	ligusticum
coris. costus	lij radix
crocodilium	lithospermon
cucumis syluestris	marrubium. meum
cyclaminus	melissa myrrha
cyperus	Napus. Nasturtium
Daphnoides	Nigella
Daucus. dictamnus	Oclypus
dictamnus cretenfis	oleg æthiop. lacryma
Elategium	olusatrum
Elelisphacus	oreoselinû. origanum
epithimum	Panax
eruum	pastinaca syluestris
eryngium	pçonia petroselinum
Fœniculum	peucedamum. phu
Galbanum	piper. polium
glodiolus	portum capitatum
	porrum

Porum siluestre	solaris maior
pseudobunium	spica nardi. staphis
psoudodi&amnus	staphylinus. stirax
Pulegium	Thlaspi. Thimbra
Radicula	Thimus. Tilia
Rotundus odoratus	Tragium
iuncus	Tragoriganum
Rubia. Ruscus	Trichomanes
Ruta siluestris	Trifolium. Trisfago
Sagapenum. Sabina	Veratrum vtrumque
Salvia. sampsuchum	Violæ albæ
Scordium serpillum	Vitex
seseli. sifcu	Vitis nigra
sium. smyrniom	Vrtica, &c.

*De medicamentis menstrua sisten-*  
*tibus, Cap. 55.*

**M**edicamenta quæ menstrua cohibent, an-  
tedictis contraria esse debent: vt sunt

Acacia. Acctum	Cornu ceruinum
Anthera	Fagus. Fragaria
Amurca aceti	Glandium calices
Balaustia. Berberis	Hypocistis
Bursa pastoris	Hyo&sciamus
Cinnabaris	Ilex
Cumium	Lapis hæmatites
Coagulum leporis	Licum

M 3 Limo-

Limonium  
 Ilimachia  
 Malum punicū  
 acidum  
 Manna thuris  
 mediū. myrtus  
 Nymphaea  
 Oxianantha  
 Palma  
 Præonia semen  
 Borbulaca  
 Radix idea

Rubus  
 Rhus obsoniorum  
 Semperuiuum  
 Sedum  
 sanguinalis  
 simphitum  
 solanum  
 spina Arabica  
 Thus  
 Thuris cortex  
 Vua passa cum nu  
 cleis, &c.

*De medicamentis sudorem cientibus*  
*Cap. 56.*

**S**udores eliciunt calida, quæ extenuant & di  
 gerunt humores, meatusque rarefaciunt, vt  
 incusus humor commodè & largè erumpat. Su  
 dor namque natura duce profilit, cum superua  
 cum inant humorem & egerit. Aut cum ea  
 fuerit imbecillior, quam vt humorem contine  
 re valeat hiantibus iam quibus erumpit spira  
 culis, extenuatoque qui excernitur humore.  
 Sunt autem quæ id possunt, aqua calida, vel in  
 vtre, vel in vesica, vel in uasculo, aut æneo, aut  
 cestaceo adhibita, terula, granum cnidum, ne  
 peta, onobrychis, salis flos.

*De me  
 rumipera, buxy, carauy  
 benedictis, carauy, quat  
 cum. apium. absentiis*

*De medicamentis calculum frangentibus, Cap. 57.*

**Q**uæ calculum renum minuunt medicamenta ualenter incidere debent, absque tamē siccitate, & uehementi calore. Calida namq; & sicca calculos procreant, indurantq; Proinde quæ minus exalfaciunt, incidereq; ualent, meliora sunt, ueluti

Adiantum	Lapis ophites
Acetum scillinum	Lapis spongiæ
Alisma	Lithospermon
Amigdalæ amaræ	Malua. marum
Arthemisia	Oculus solis.
Asparagus	Ochra
Abiegna lacrima	Oleū amig. amar.
Althea	Ononis
Batus. Betonica	Paliurus
bdellium	Parthenium
Carpesium	Polium. Pruna
Cerasij gummi	Radicula
Cicer. Ciperus	Rubi radix
Cicadę vstæ	Ruscus
Cortex rad. lauri	Sium
Eringium	Tragium
Fœniculum silu.	Tribulus
Graminis radix	Vetonica
Lanaria herba	Vitrum vstū, &c.



*De medicamentis lac generantibus,**Cap. 58.*

**M**edicamenta, quæ lac generant modicè ex calfacere absq; desiccatione debet. Sin itaq; primi vel saltem secundi ordinis ex calfacientium veluti glaux herba, anethum viride, cruce, fœniculum, apium, iminium, polium, lion, omnia quidem virentia.

*De medicamentis, quæ crassos humores in thorace & pulmone expurgant, Cap. 59.*

**M**edicamenta, quæ expuitionem purulentâ; ac tenacium humorum, crassiorûq; in pectore & pulmone collectorum faciliem efficiunt, vim incidendi habere debent, non tamen multum calidam, nec ualdè desiccantem. Debent autem sorbitiunculis potionibusq; humectantibus admisceri, Ex horum genere sunt

Acetum scillinum  
 adiantum  
 Ammoniacum  
 Apialtrum  
 Amygdalæ amara  
 Aruar

Capillus Veneris  
 Caricæ. Crocodilion  
 Faba. Ficus  
 Glycyrrhyza  
 Gummi Arabicum  
 Hissopum. Helenium  
 Irio

Iris. Iſopyron	Scabioſa ſcilla
Lini ſemen	Tragacanthū
Marrubium. Mel	Terebinthina
Myrtha	Trichomanes
Nalturtium	Tuſſilago
Oleum riciniſinum	Thymus
Palmulæ Penidia	Vriica
peucedanum	Vetonica
pinæ nux	Vua paſſa
sagapenum	Ziziſpha, &c.

*De medicamentis tuſſim ſedanti-  
bus, & prouocantibus,  
Cap. 60.*

**Q**Uæ tuſſim compoſcunt medicamenta, naturaſſam increſſandi habere debent. Proinde frigida, & craſſarum partium vt ſint, neceſſe eſt. Frigore enim cogit, & ſubſtantiaſſe ſuæ craſſitudine increſſat. At quæ tuſſim prouocant, vim extenuandi, acrem, & mordacem habere conuenit. Nam quicquid mordax ac acere eſt, ad tuſſim, impetum prouocat. Quapropter calida, requiſitumque partium vt ſint, neceſſe eſt. At tuſſis remedia ſunt

Allium	Arum
Amygdalæ amare	Aſphodelus
	M 5 Baccha-

Baccharis	Panax. pancratiū
bdellium	papauer fatium
Bitumen	papaueris liquor
buglossum	piper. propolis
Cardamomū	Radicula
cedri fructus	Ruta
cerasij gummi	Sagapenum
cinnamomum	scilla
Daucus	scordium
Galbanum	scorodoprasō
Hipecoon	sefeli
Irio. Iris	stichas
Laserpitium	styrax
lanaria herba	sulphur
lini semen	Trigoriganum
Marrubium	Trisago
mel. mirra	Tussilago
Oleum picinū	Verbasum
Origanum	Zingiber, &c.

---

*De medicamentis dolorem sedanti-  
bus, Cap 61.*

**A** Nodynorum medicamentorum, quædā re-  
uera sunt anodina, quædam nomine dūta  
xat. Reuera anodina calida quidem sunt, & cō-  
iunctam habent partium tenuitatem. Nam te-  
nuium partium, ut sint, & calidiora, quàm quæ  
syme-

symera sunt, necesse est, vt scilicet euacuent, ac digerant, tum rarefaciant, extenuent, concoquant, & aquabile reddant, quicquid in partibus dolore vexatis, aut humorum acrim, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum tenuibus spiritamentis infarctorum, aut etiam vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidi spiritus exitum commodum non inuenientis inhaerit, atque includit. Itaque nihil prorsum adstrictionis, habeant, oportet. Anodyna verò nomine narcotica, hoc est, stupefacientia sunt, qualia sunt refrigerantia omnia. Nam medicamenta quæ soporem exhausta conciliant, ac imposita, partem suam frigiditate stupefaciunt, temperiæ fortita sunt contraria in ijs, quæ reuera sunt anodyna Corpus enim refrigerant omnia, & sensum eousque stupefaciunt, vt si paulò liberalius ebibantur, mortem adierant. At reuera anodyna sunt

Absinthium

Acorus

Anethum

Agallochum

Agaticum

Althea

Amonium

Apollinaris

herba

Asclepis

Atriplex

Chamamelum

Cardamomū

Castoreum

Calamintha

Centaureum

maius

Cuminum

Chamz-

Chamæpitys	Malua
Daurus	Opopanax
Eringium. eruum	Piper. panicum
Fœnumgræcum	peucedanum
Ficus	petroselinum
Iris. iuniperus	Rorismarinum
Juglans	Ruta
Hyosciamus	Sisimbrium
Lini semen. Libycticū	serpillum
Lupus salitarius	sampsuchus
Milium	Vitellum oui ; &c.

---

*De Soporiferis, Cap. 61.*

**S**oporifera medicamenta ex genere anody-  
 norum habentur, vt præcedenti capite dixi-  
 mus. Sunt autem hæc, veluti

Cicuta	Mandragorę liquor
Doricnium	Mofcus arbor recens
Halicacabum	Opium
Hyosciamus	Papauer fatium
Hipecoon	papauer erraticum
Lactuca	perficorum nuclei
lapis Memphites	Solanum somniferum
lolium	Vitex
Mandragora	Vinum recens, &c.
Mādragorę poma	

De me-

## De medicamentsi venerem excitantibus, Cap. 63.

**Q**uæ Venerem excitant medicamenta calida esse debent, & flatulenta, non siccantia. Sunt autem quæ id possunt  
 Acorus. Allium coctū Napus. Nasturtium  
 amygdalę dulces nux Indica  
 anisum. auellanę nux myristica  
 asparagus nux pontica  
 asphodeli radix Orchis  
 Belzoinum oryza cum lacte cocta  
 Bulbus esculentus orminum  
 caparum semen oua recentia  
 cerui genitali. cicer Palmę cerebrum  
 cinarę fructus. costus palmę flos  
 crocus. cynosorchis passerum cerebra  
 Daucus sylvestris pattinaca  
 Dracunculi ma. radix personatę radices  
 Encephalos. Bruca phaseli. pineę nuces  
 Faba. Ferulę corculū pistacia. piper longum  
 Ficus. Fraxini semen porri semen  
 Galanga. Galij radix Rapę semen  
 Gladiolus garyophilli Satyrium primum  
 Lac omne Satyrium alterum  
 Mala insana Scincus.  
 mentha uiridis Scorodoprasson  
 muscus Semen lini

Sifer

Sifer	Tubera
Sepia cum allio	Vrtica semen
Testiculus herba, rad.	Xyli semen
Testiculus alter	Xyphij radix
Testiculi gallorum	Zibetum, &c.
Testiculi aprugni	

---

*De spermaticis, Cap. 64.*

**S**permatica sunt tum cibi qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, totisq; substantijs similes; tum medicamenta flatuosa, & modicè calida, cuiusmodi sunt

Amigd. dulces	Nux indica
Anisum	Oriza cum lacte cocta
Asparagus	Oua recentia
Acorus	Passerum cerebella
Bulbus	Pastinaca
Cicer	Phaseli
Cynosorchis	Pistacia
Encephalos	Rapum
Eruca	Satyrium primum
Ficus	Satyrium alterum
Lacomne	Semen lini
Napus	Sifer
Nuclei	Testiculi gallorú, &c.

*De medicamentis, quæ ambuſtis,  
conueniunt Cap. 65.*

**A**mbuſtorū medicamina ſunt althea, aDean-  
tum, adeps ſuillus, alumē ſoiffile, anchuſa  
arſion, aſciron, atramentū librariū, beta, bul-  
bi, cinnabaris, gallion, glutinum, hedera, heme-  
rocallis, hipericon; hiacinthi, laſuca ſilueſtris,  
lilium, lingua canis, mori arboris folia, muris  
auricula, oleum myrtheum, oliuꝝ ſalſæ. oua, pi-  
cea, platanus, ſambucus, ſedum maius, ſtereus  
ouillum, terra chia, terra ſelinuſia, terra cimo-  
ia, tipha, uerbaſcum, &c.

*De medicamentis ſimplicibus digeſti-  
uis, ſeu concoquentibus, C. 66.*

**N**unc autem de digeſtiuis ſimplicibus, vſua-  
libus dicendum, quæ quidem talia dicun-  
tur, quòd præparent humores ad expulſionē.  
Eſt enim digeſtio, ſiue concoctio nihil aliud,  
quàm præparatio humoris ad expulſionē. Hæc  
autem præparatio fit vel in humoris ſubſtãtia,  
vel in qualitate. In ſubſtãtia quidem, craſſus  
attenuandus ſeu ſubtiliendus, tenuis in craſſon-  
dus, viſcoſus incidendus uenit, & ſic de aliis. In  
qualitate uerò, vt calidus inſrigidãdus, inſrigidus  
calificandus.

UNIVERSITATIS  
CANAD



192 PRACT. GENERALIS  
calefaciendus, humidus exiccandus, & ficcus  
humectandus, &c. Humores autem qui dige-  
stionem recipiunt tres tantummodo sunt, bilis  
scilicet flava, pituita, & atra bilis. Sanguis enim  
digestionem non recipit, cum sit semper ad exi-  
tum preparatus.

---

*De medicamentis bilem flavam  
concoquentibus, Cap. 66.*

I N C A P I T E.

Acetum	Opium
Caphura	Papauer album
Hyoscyamus	Rosa
Lactuca	Salicis folia
Nenupharis folia	Viola purpurea, &c.
Nenupharis flores	

I N P E C T O R E.

Amylum	Papaveris albi semen
Gummi arab.	Sebesten
Iuiubæ	Tragacanthum
Mora celsi	Viola, &c.
Papauer album	

I N C O R D E.

Acetosâ	Acetosæ semen
Acetositas citri	Caphura, Carabe
Acetositas limonum	Citri semen
Acetum	Corallium
	Corian-

Coriandrum	Nenupharis flores
Cotonea mala	Os de corde cerui
Lac acetosum	Pira
lapis hiacinthus	Radura eboris
lapis smeraldus	Rosa
Margaritz	Viola, &c.
Nenupharis folia	

IN STOMACHO.

Acetositas citri	Mespilz
Aurantia mala	Pira syluestria
Citrulli	Portulaca
Cotonea mala	Prunella
Cucumeres	Rosa
Cucurbita	Semperuiuum
Mala punica	Solatrum
Myrthus	Sorba
Melones	Viola, &c.

IN NEPATE.

Berberis	Portulaca
Caphura	Rosa
Cichorij rad.	sandali omnes
Endiuiā	semen melonum
Hepatica	semen cucurbitz
Lactuca	semen cucumeris
Nenupharis folia	semen citrulli
Nenupharis flores	semen endiuiz
	N            semen

Semen lactuce  
Semen scariolæ  
Semen portulacæ

Solatrum  
Spodium, &c.

## I N S P L E N E.

Acetum  
Cichorium  
Endiuiæ  
Lactuca  
sandali omnes  
semen melonum  
semen cucurbitæ

Semen citrulli  
semen cucumeris  
semen endiuiæ  
semen portulacæ  
semen lactuce  
semen scariolæ  
spodium, &c.

I N R E N I B V S,  
& vesica

Endiuiæ  
Lactuca  
Nenupharis folia  
Nenupharis flores  
Portulacæ  
Papauer album  
Plantago  
Semperuium  
semen melonum

semen cucurbitæ  
semen citrulli  
semen cucumeris  
semen endiuiæ  
semen portulacæ  
semen lactuce  
semen scariolæ  
succus citoniorum  
Virga pastoris, &c.

## I N M A T R I C E.

Cucurbita  
Endiuiæ  
Lactuca  
Nenupharis folia

Nenupharis flores  
Papauer album  
Portulacæ  
Rosa

Sem-

Semperuiuum	semen lactuce
semen cucurbitę	semen portulacę
semen melonum	semen scariolę
semen citrulli	succus citoniorum
semen cucumeris	Virga pastoris, &c.
semen endiuicę	

## I N I V N C T V R I S.

Acacia	Hyosciamus
Album oui	Lactuca
Acetum	Pisillum
Bolus armen <sup>9</sup>	Rosa
Endiuia	sang <sup>is</sup> dr <sup>o</sup> .
Folia salicis	sempervivum
folia vitis	solatrum
folia graminis	Terra sigillata
folia myrthi	Viola purpurea, &c.

*De medicamentis simplicibus, pituitam concoquentibus, Cap. 68.*

## I N C A P I T E.

Ambra	Flores meliloti
Betonica	flores betonicę
Chamomilla	folium
Calamintha	Ladannum
Cubebe	lauendulę flores
Feniculum	lauri folia
Flores chamomillę	Maiorana. Melilotum
	N 2 Moschus

Mofcus	Saturegia
Nux mofchata	Serpyllum
Pzonia	Stæchas
Pulegium	Siler montanus
Radix. fœniculi	Semen maioranz
Radix pzoniæ	Semen fœniculi
Rofmarinus. Ruta	Thus
Saluia	Xylobalfamum, &c.

## I N P E C T O R E.

Aristolochia rotunda	Marrubium
Betonica	Meliffa
Capillus Veneris	Paffulæ
Dactyli	Praffium
Enula	Radix aristolochiæ
Ficus	Radix ireos
Flores liliorum	Radix enulæ
flores fcabiofæ	Radix liquiritiæ
flores Betonicæ	Scabiofa
flores meliffæ	Serpentaria
Glycyrrhiza.	Semen vrticæ
Hyllopum	Vrtica, &c.
Iris	

## I N C O R D E.

Ambra	Cinnamomum
Aurum	Citri cortex
Been album	Cotula montana
Been rubrum	Crocus
Caryophylli	Enula campana
	Flores

Flores anthos	Nux moschata
Flores melissę	Ocimum
Folia citri	Rosmarinus
Macis	semen ocimi
Melissa	Xyloaloes
Moschus	Zedoaria, &c.

## I N S T O M A C H O.

Abfinthium	Macis
Ammi	Mentha
Anisum	Nux moschata
Calamus aromat.	piper
cardamomum	Kadix fœniculi
caryophylli	raphanus
cinnamomum	semen anifi
cyminum	semen cumini
Fœniculum	semen ameos
Galanga	serpyllum
Gallia moschata	Zingiber, &c.
Lignum aloes	

## I N H E P A T E.

Abfinthium	Carum
Ammi	cuminum.
Amomum	Cyperus
Anisum	Dauci semen
Apium	Eupatorium
Asparagus	Fœniculum
Asarum	Flores spicę
Cinnamomum	Flores origani

198. PRACT. GENERALIS

Flores sambuci  
Hyssopus  
Origanum  
Petrofelinum  
Radix apij  
radix fœniculi  
radix petrosel.  
radix rusci  
rapix asparagi  
ruscus  
semen anisi

semen fœniculi  
semen cumin.  
semen carei  
semen ameos  
semen amomi  
semen apij  
semen dauci  
semen asparagi  
spica  
squinthum,  
&c.

I N S P L E N E.

Abfinthium  
Acorus  
Aristolochia  
Asarum  
Anisum. Apiū  
Asparagus  
Amygd. amaræ  
Calamintha  
cappares  
cortex caparis  
carum  
Eupatorium  
Fraxinus  
Gentiana  
Nasturtium.

Radix apij  
radix fœniculi  
rad. petroselini  
radix rusci  
radix asparagi  
radix aristolo-  
chiz  
rad. gentianæ  
radix fraxini  
radix acori  
rubia tinctorū  
semen anisi  
semen carei  
semennasturtij  
Tamarix, &c.

L I B E R I V.  
 I N R E N I B V S,  
 & vesica.

299

Brodium cice- rum rubrum	Pentaphyllon saxifragia
Cicer	semen crucæ
Cubebe	semen vrticę
Eruca	semē saxifrag.
Granum pini	spica nardi
Iuniperus	spica celtica
Melilotum	radix quinquefolij
Parietaria	Vrtica, &c.

I N M A T R I C E.

Arthemisia	Opopanax
Calamincha	Pulegium
Iuniperi bacce	rubia tinctorū
Moschus	ruta
Matricaria	Sabina
Melissa	semen rutę
Myrrha	scrapinum
Nux moschata	

I N I V N C T V R I S.

Ammoniacum	flores chamomillæ
Castoreum	Flores meliloti
Chamomilla	Hermodactyli
Costum	Hypericum
Euphorbium	Iuniperus
Eupatorium	Melilotum
Flores anthos	Myrrha

N 4 Nastur-



Nasturtium	Stichas
Oleum iuniperinum	styrax liquida
Radix costi	squilla
radix zingiberis	semen rutæ
radix hermodactyl.	semen nasturtij
ruta	semen sinapi
rosmarinum	stercus caprarum
Salvia	stercus vacarum
Sinapi	Zingiber, &c.

---

*De medicamentis bilem atram con-  
coquentibus, Cap. 69.*

**I N C A P I T E.**

Fumus terræ	Oxymel
Lupulus	Poma dulcia, &c.

**I N P E C T O R E.**

Acorus	Flores melissæ
Dactyli	Melissa, &c.

**I N C O R D E.**

Borrago	Flores melissæ
Buglossa	Melissa
Flores anthos	Radix buglossæ
Flores buglossæ	rosmarinus, &c.
Flores borraginis	

**I N N E P A T E.**

Afarum	Fumus terræ
Cichorium	Lupulus

**Rs.**

Radix cichorij	Radix polypodij
I N L I E N E.	
Acorus	Radix acori
Amygdalę amarę	radix polypodij
Cappares	radix buglossę
Cortex cappararom.	radix tamaricis
Cortex tamaricus	Scolopendria
Cuscuta	Tamarix
Epithymum	Thymus, &c.
Polypodium	

*De seminibus calidis maioribus  
& minoribus, Cap. 70.*

CALIDA MAIORA.

Anisi	Cumini
Fœniculi	Carui.

CALIDA MINORA.

Ameos	Apij
Amomi	Dauci.

*De seminibus frigidis maioribus,  
& minoribus, Cap. 71.*

FRIGIDA MAIORA.

Melonum	Cucumeris
Cucurbitę	Citrulli.

N 5 M I.

Lacuzæ

Scariolæ

Endiuicæ

Portulacæ

RADICES QVINQUE.

communes.

Apij

Asparagi

Fœniculi

Rufci.

Petroselini

*De medicamentis purgantib. Ca. 72.*

**H**A&euus de digestiuis medicamētis simpli-  
cibus, nūc de purgantibus agendum vide-  
tur. Sunt autem medicamēta purgantia omnia  
calida, & attrahētia qualitātū familiaritate, hoc  
est totius substantiæ similitudine. Qua ratione  
attrahunt & stirpes, & unaquæq; plāta, animā-  
tiumq; singularium quæque particula familia-  
re sibi nutrimentum. Hoc modo attrahunt;  
medicamenta purgantia omnia. Siquidem hu-  
morib. sunt familiaria: quæ verò attrahūt quo-  
dammodo sunt efficaciora valentioraque, sicuti  
cuius à pituitæ natura alienus non esse de-  
prehenditur, vt & calore suo præsefert, sed ta-  
men calore ipso quàm pituita valentior, vt tra-  
here quàm trahi magis par sit. Calida itaque  
vt sint id genus omnia, necesse est. Nā inter ea  
quæ sibi substantiis similia sunt, quod calidius  
est, id

est id, potentius attrahit, utpote, quod essentia similitudini calorem adiunxerit, auxiliarium. Porro inter purgantia medicamenta sunt nonnulla, quæ mordicando, irritando, & quodammodo conuellendo purgant, cuiusmodi sunt, vitrum, & flores antimonij, & squama æris, & similia. Hæc namq; quodammodo mordicant. Mordicatio uerò organa ad excretionem excitat quod fit, ut cum superiores uentriculi partes irriterentur mordicante medicamento aliquo per vomitum: cum uerò inferiores, per aluum deiciant id, quod in eo continebatur.

*De medicamentis bilem flauam purgantibus, Cap. 73.*

**M**edicamenta purgantia flauam bilem, quibus communiter prædicantes hodie uentur, sunt

**ALOE**, succus est, optima est pinguis, arenularum expers, rufi coloris, friabilis, iocinoris modo coacta, facile liquefcens, odorata, & amarissima. Dosis est ab aureo semisse ad drachmas duas. in infusione uerò ab aureo vno usque ad drachmas tres. Bilem & pituitam purgat: affectibus uentriculi & cerebri confert hamorrhoidibus & sedi nocet.

**CASSIA** nigra est fructus oblongus; teres fistulo.

fistulosus, intus humorem nigrum continens. Eligenda est pōderosa, plena, quæ cōcussa; clau-  
fis intus granis non strepat. Extrahitur recens,  
daturq; omni ætati: imbecillioribus quidē dra-  
chmæ quatuor: robustioribus autem & adultis  
uncia, vel fescuncia, vel drachmæ decē, mane,  
vel ante cœnam, in forma boli, vel potionis. In  
forma boli hoc modo. ℞. Cassiæ nouiter tractę  
ʒ. ʒ. 10. vel ʒ. 2. cū saccharo fiat bolus. In forma ve-  
rò potionis sic: ℞. Cassię recent. tractę. ʒ. 12.  
Dissoluatur cum decoctione, flor & fructuum,  
fiatq; pot<sup>o</sup> cui adde Syrupi violacei ʒ. 1. Clemē-  
ter & innoxie à ventriculo bilē & pituitā pur-  
gat leniendo, febribus inde ortis confert, &c.

**M A N N A** ros est, qui herbis, arboribus, &  
lapidib. interdū in hære inuenitur. Præfertur  
Calabra. Dosis eius est à drach. sex, vsq; ad vn-  
cias duas in forma potionis hoc modo: ℞. Man-  
nę electę ʒ. 1. s. vel ʒ. 2. Dissoluat cū decoctione  
florū & fructuū, fiatq; potio, cui adde syrupi  
ros. lax ʒ. 1. Eadem cassię nigreūim habet flauā  
enim bilem clementer purgat, daturq; iis, qui  
certa ratione validius medicamentū respiciunt.

**M Y R O B O L A N A Æ** citrinę Arabum fru-  
ctus sunt. Laudantur multum flauę, in viride  
inclinantes, densę, graues; gummosę, corticę  
crasso, os paruum complectēte. Dosis in substā-  
tia est à drachmis duab. usq; ad drachmas quī-  
que

que: in infusione uerò à drachmis quinque vsq; ad viginti. Bilem à uentriculo purgāt, febribus biliolis conferunt. Cauendus tamē eorum usus in uilcerum obstructionibus. Corriguntur, cum amygdalis dulcibus, vel passulis

**S C A M M O N I V M** succus est. Laudatur nitidum, rarum, leue, colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis. Datur per se à granis quinque ad duodecim. Obest cordi, uentriculo ac iecori totius substantiæ suæ proprietate. Corrigitur aniso, mastiche, tragacantho, tum calidis, tum frigidis, quæ cordi, iecori, uentriculoq; opem suam præstant. Deicit bilem ualentissime.

**S V C C V S** rosarum, uel infusio ipsarum datur ab uncia una, vsque ad uncias duas.

**R H A B A R B A R V M** radix est crassa. Laudatur Indicū recēs, graue, confractū, ex rufo & glauco alternans, & croci modo tingens. Corrigitur tertia parte spicæ Indicæ, uel cinnamomi. Dosis in substantia cōiter est pondere duarū, trium, aut quatuor drachmarū, cū sero lactis, uel decocto cichorij, hoc modo. ℞. Rhabarbari electi ℥. 3. uel 4. spicæ Indicæ ℥. j. puluerizentur subtiliter, & cū decoctione cichorij fiat potus, cui adde syrupi uiolacei ℥. i. In infusione uerò à drachmis tribus usque ad sex, uel decem, pro uirium & ætatis ratione. Hac ratione

ratione & Rhabarbari electi  $\frac{3}{4}$ . 5. uel 6. Squinanthi  $\frac{3}{4}$  2. misce puluerizando omnia crasse, infundere per horas septem in sufficiente quantitate uini odoriferi: deinde fortiter exprime, & cum aqua endiuizæ uel decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde sirupi rosati laxatiui  $\frac{3}{4}$  1. Purgat elementer bilem flauam, præcipue à uentriculo, & hepate: obstructionsque liberat.

TAMARINDI dactyli sunt acidi, fructus palmæ syluestris Indiæ Probantur recentes, pingues, non retorridi, ex dulcibus acidi, & uinois sapore. Dosis in infusione uel decoctione serilactis est ab uncis duabus, usque ad uncias quinque. Flauam purgat bilem, sitim restinguit, febresq; acutas sanat.

SERVM lactis siue aqua crassi, est medicinalis lenitiua & laxatiua Dosis eius est ab uncis tribus usque ad uncias quinque.

---

*De medicamentis purgantibus  
pituitam, Cap. 74.*

EX medicamentis pituitam purgantibus, quibus hodie practicantes utuntur, usitatiores sunt  
AGARICVS nascitur in arborum truncis, ne luti fungus. Eligendus est albus, porosus, leuis fragilis, leuis, primo gustu dulcis. Aduersatur uen-

culo, quòd sua leuitate emergens enatet. Infrenatur eius malicia, adiecta tertia parte zingiberis, vel salis gemmæ. Sumitur autem in substantia, vel in infusione. In substantia dosis est à drachma una usque ad duas, hoc modo: ℞. Agarici opt. ʒ 1. salis gemmæ, vel zingiberis ʒ 1 puluerizetur, & cum decoctione florù & fructuum fiat potus, cui adde Mellis rosati colati ʒ 1. Vel sic: ℞. Agarici electi ʒ 1. salis gemmæ ʒ 1. cinnamomi parum, misce & fiant pilulæ, vel puluis. In infusione verò dosis est à ʒ 2. vsq; ad quinq; hoc modo ℞. Agarici electi ʒ 2. uel 3. zingiberis ʒ 2. uel ʒ 1. puluerizentur, & infundantur per horas 7 in sufficiente quantitate oxymellitidis simplicis: fiat omnium fortis expressio, & cù decoctione florum & fructu fiat potus, cui adde mellis ros. col ʒ 1 Purgat pituitam crassam, leuam, putridam, & bilem flauam, &c.

MECHOACHA, radix est Indica, quã aliqui Rhabarbarum albũ appellant. Sumitur in substantia tantũ, scrupulorum duorũ, vel drachmæ unius pondere cum brodio carnis, uel uino absynthiaco, uel dulci odorifero hoc modo ℞. Rhabarbari al ʒ. 1. Gentianæ ʒ 1. Cinnamomi ʒ. 5. Fiat puluis, & cum haustu uini absynthiaci sumatur tribus horis ante passum. Purgat pituitam & aquosos humores sine molestia. Cõfert dolori capitis diuturno, febribus,



bribus, colicis, hydropicis, & asthmaticis, &c.

**TURBITH** laudatur vacuum, arundinum, fragile, & plani corticis turbiti, gummosum & albidum. Dosis in substantia, perinde atque agarici est. Datur cum melle rosaceo, vel passularum decocto. Eodem etiam modo in infusione. Correctio eius pars tertia zingiberis est. Purgat lentam, & crassam pituitam longis morbis medetur: apoplexiæ, epilepsiæ, infantie & furori, &c.

**CNICI**, seu Cartami seminis dosis est à drachmis tribus vsque ad aur quinque. Datur cum aqua malsa, vel iure gallinaceo, vel pituitæ cremore. Pituitam purgat: sed stomacho aduersatur.

**COLOCYNTHIS** est cucurbitæ filue stris fructus. Huius medulla in usu est. Eligenda autem est candida, & recens. Corrigitur nastiche, zingibere, cinnamomo, caryophyllis, tragacanthæ, vel bdellio. Datur saltem robustis scrupulus cum aqua, malsaue, quatuor obolorum pondere. Pituitam, bilem humoremque mucosum purgat: confert cephalagiæ, hemicraniæ, epilepsiæ, apoplexiæ, vertigini, podagriæ, coxendico dolori, adsthemati, tussi, & spirandi difficultati, &c.

**HERMODACTILVS** radix est officina nota. Probatior plenius, candidus, grauis, non carie

carie affectus. Datur drachmæ unius pondere, aut paulò plus minusue pro sumentis viribus, cum melle rosaceo, vel oxymellite scillitico. Corrigitur cinnamomo, mastiche, zingibere, aut pipere longo. Pituitam crassam à iuncturis trahit, &c.

**E L A T E R I V M**, cucumeris sylvestris sucus est. Dosis à granis decem vsque ad drachmā dimidiam cum lacte Pulveris radicis eius à gr. ʒ. ad ʒ. ʒ. Aquæ decoctionis radicis à ʒ. 2. vsque ad 4. Corrigitur tragacantho, vel bdellio, vel mastiche. Datur quoque elaterium in forma pilularum hoc modo: ℞. Elaterij ʒ. i. mastice ʒ. ʒ. cum syrupo de mētha fiant pilulæ. Dentur duæ vel tres ad summum. Purgant pituitam, bilem, & aquam.

**M E Z A E R E I** siue Tymeleş dosis est à ʒ. ʒ. vsq; ad ʒ. i. in decoctionibus. In pulvere verò à Kiratis 2. vsq; ad 5. Malitia eius frāgitur, si per diē in acetū infundatur. Porò p̄ filij mucilagine extinguitur, vel portulacæ, vel endiuic succo

**E V P H O R B I V M** gumi est. Dosis a Kirato 1. usque ad 3. Alij verò a granis quatuor, vsque ad duodecim. Corrigitur autem aniso, mastiche, & spica. Datur ex aqua mulsā. Præstat autem cum melle coctō in pilulas digerere. Pituitam & aquam subducit: medetur colicis, & aliis frigidiorem habentibus.

## 210 PRACT. GENERALIS.

**MYROBOLANA** Chebula pituitam detrahunt. Dosis in substantia est à drachmis duabus, vsque ad drachmas quatuor: in infusione verò à drachmis quatuor vsque ad decem. Teruntur autem cum amygdalis dulcibus vel passulis, &c.

**MYROBALAN.** emblicorum dosis in substantia est ab aureis duobus vsq; ad aureos tres, in infusione verò ab aureis tribus vsque ad sex Pituitam trahunt, profant nervis, & veteriosis, mentis aciem exacuunt, ventriculum purgant, &c.

**MYROBALAN.** Belliricorum dosis per inde est, vt emblicorum & citrinorum: eiusdem que quasi naturæ sunt, vt emblica, &c.

**OPOPANAX** ferulæ liquor est Optimus qui intus albus est, foris flauus, amarus, fragilis, odoris boni Datur à drachma vna ad duas. Corrigitur mastice, & spica. Purgat pituitam crassâ & lentâ à cerebro, nervis, thora ce, & iūcturis.

**SERAPINVM,** vel Sagapenû ferulaceæ herbæ succus est. Eligitur saluum, intus album, acre. Datur à drachma semisse ad drachmam vnâ cum aqua rutæ vel enulæ. Purgat pituitam, humores crassos & lentos, & aquas à ventriculo. Corrigitur mastiche & spica, &c.

*De medicamentis atram bilem purgantibus, Cap. 75.*

**C**OLVTEA siue Sena eligenda est Alexandrina, foliis viridibus, subalbidis, & tenuibus. Dosis pulueris drachma una: in infusione verò vel decocto vncia semis. Corrigitur Zingibere, &c. Purgat bilem atram, tum flauam pituitam citra noxam.

**E**PITHYMVM datur in puluere scrupulorum quinque aut drachmarum duarum pondere cum passo uel oxymellite: in decoctione verò a drachmis quinque ad viginti vsq; Non detur astate, & parum coquatur. Corrigitur adiecta tertia parte salis gemmæ, vel salis Indi: & oleo amygdalarum incorporatur, & exhibeatur cum decoctione myrobalanorum Indorum, mellis & passularum. Atram bilem purgat, vitij flatu turgentibus & hypochondriorum noxis opitulatur.

**E**L E B O R V S niger radicem habeat benenigram, corpulentam, plenam, acrem. Dosis pulueris à siliquis sex vsq; ad scrupulum unum, vel duos cum passo, uel oxymellite. Corrigitur cinnamomo, sceniculo, aniso, mastiche, passo, & oxymellite. Atram, flauamq; bilem è toto corpore trahit, nec tamè citra ullam difficultatem.

**F**V M V S terræ humorum melancholicum euacuat. Succus dosis non debet transcendere

112 PRACT. GENERALIS

unciaſ duas: Decoctionis verò eſt ab uncijs tribus ad uncias quinque uel ſex. Corroboratur tamen in operatione dando ipſum cum ſero lactis; & cum decoctione paſſularum, & cum ſuco abſynthij, &c.

**M Y R A B A L A N A** Inda atram bilem detrahunt. Doſis in ſubſtantia eſt à drachmis duabus ad drachmas quatuor: in infuſione, à drachmis quatuor: uſque ad decem.

**L A P I S** Armenius præparari ſup lapide, vel in mortario debet. lauatur uicies cù aqua, & terendo lauatur decies cù roſarum aqua. Ad miniſtratur, cum diaborraginato, vel aqua bugloſſe, uinoq; odorifero. Dantur ſcrupuli quatuor, aut paulò plus, minusue pro ſumentis uiribus. Atram bilem, & omnem lentum craſſumq; humorem educit, citra omnem moleſtiam.

**L A P I S** Lazuli ſeu Stellatus ſicut lapis armenius præparari debet. Doſis abluti drachma una uſque ad duas eſt. Corrigitur ut lapis armenius. Purgat melancholiam egregiè, ſed magis turbat armenio lapide.

**P O L Y P O D I U M** probatur quercinum, recens, dulce, auſterum. Corrigitur aniſo, zingibere, caryophyllis, & cinnamomo. Doſis à drachmis duabus ad aureos quatuor, cum aqua mulſa: mediocriter verò aluum ciet, & citra moleſtiam, tum in gallinaceo iure, tum in cremore  
ptifana

pitifanę coſta radix. Bilem atram & pituitam extrahit. Hęc de medicamentorum qualitate nobis ſufficiant, reliquum nunc eſt, vt de remediorum qualitate, loco, & tēpore agamus, exordium à remediorum quantitate ſumentes.

---

*De remediorum quantitate, C. 76.*

**L**icet præcedentibus tribus capitibus de purgantium doſi in ſpecie aliquid dixerimus, hic tamen etiam, de remediorum quantitate in vniuerſum agendum eſſe videtur. Niſi enim iuſtam remediorum quantitatem obſeruaerit Medicus, parum aut nihil in praxi proficere videbitur. Eſt itaque Medico remediorum quantitas maximè neceſſaria. Non enim omnibus vna eademque medicamenti meſura conuenit, ſed pro diuerſatione, complexionum, partium læſarum, morborum, virium, ætatis, temporis, & conſuetudinis augenda, vel minuēda eſt. Natura namque calidiores magis calefaciendi: frigidiores minus: ſicciores uerò magis quam humidi ſiccandi ſunt. Quod ad partes læſas attinet, nobiliores, cuiusmodi eſt cor cerebrum, hepatis, & ventriculus, minus ac blandius medicamentum expoſcunt: ignobiliores uerò, ut oſſa, cartilagineſ, crura, &c. maius, ac vehementius

medicamentum desiderant. Sic quoq; partes in  
 superficie positæ, minus: quæ verò in alto absco-  
 ditæ sunt, maius medicamentum efflagitât. Por-  
 rò morbi quoq; tum qualitas, tum quantitas  
 medicamentorum quantitatem immutant. Si-  
 quidē maligni, & magni morbi, maius: benigni  
 verò, & parvi, minus medicamentū poscūt. Ea-  
 dem ratione virtus valida, maius; imbecillis ve-  
 rò minus remedium admittit: nec pueri tā ma-  
 gna, sicuti adulti medicamenta tolerant. Præte-  
 rea tempora tum morbi, tum anni minimè ne-  
 gligenda veniūt. Nam in morborum principio,  
 minus medicamentum offerendū est, nisi mate-  
 ria turgeat valdè: in augmento, & vigore adhuc  
 minus pharmacum dandū, in declinatione ve-  
 rò maius præbendum est. Sic quoque ver, & au-  
 tumnus, maius exposcunt remedium: hyems ve-  
 rò & æstas, minus. Eadem ratione, regio tempe-  
 rata, maius: intemperata verò, minus medica-  
 mentum feret. Rursus consueti maius, insueti  
 minus remedium efflagitant. Quapropter & na-  
 tura tum corporis, tum partium, nec nō morbi  
 qualitas, & quantitas, & virium robor, & ætas,  
 tempusq; tum anni, tum morbi, & consuetudo,  
 circa remediorum quantitatem maximè per-  
 pendenda sunt. Vtrum autem semel vel bis me-  
 dicamentum sit exhibendum, indicabit nobis  
 tum virtus, tum morbi quāntitas & locus affectus.

Siqui-

Siquidem natura seu, virtus ualida, rarius imbecilla; frequentius medicamentū admouendum esse indicat. Sic morbus diuturnus, frequentius breuis uerò, rarius medicamentū exhibendum esse insinuat. Ad eundem modum affectus in superficie corporis, rarò: in profundo uerò, in quem medicamenta non facillè penetrant, frequenter remedium admouendum ostendit.

---

*De remediorum loco, Cap. 77.*

**V**bi autem & quibus partibus remedia sint aptanda, ipse locus affectus indicabit. Partibus namque externis (quo sensui oculorum subijciuntur) affectis, forinsecus medicamenta applicanda sunt. Internis uerò letis partim per ea quæ intrinsecus sumuntur, partim per ea, quæ forinsecus apponuntur, succurrimus. Porro in alterando, caput remedia cephalica: cor, cordilia: pectus, pectoralia: stomachus, stomachica hepar, hepatica: lien, splenitica: uterus, uterina medicamenta efflagitat. In euacuando, uerò, cerebrum per palatum, nares, & aures purgatur. Sic uenter vomitu, deiectione; inanitur. In testina deiectione tantum, sicut iecinoris caua. Pectus, & pulmo, per tussim. Renes uerò, & iecinoris gibba, & vesica, si multo uitioso succo sint repleta per deiectiones, & pharmaca



216 PRACT. GENERALIS  
deictoria expurgantur: fin modico fuerint re-  
ferta, per vrinarios meatus. Verus per clysteres  
vel pessos euacuatur, &c.

---

*De remediorum tempore, Cap. 78.*

**P**ORRÒ in remediis adhibendis, tempus oportu-  
num maximè considerandum venit: id  
autem indicabit nobis morbi tempus tum vni-  
uersale, tum particulare. Siquidem in febrium  
principio, augmento, & statu, alterantibus, & cõ-  
coquentibus utendum est medicamentis, nisi  
materia turgeat, & venenosa sit: in declinatio-  
ne verò euacuantibus. Sic quoq; in tumorum  
principio repellere commodè licebit: In augmẽ-  
to verò repellere, & resolvere simul: in statu, re-  
soluere tantum & discutere conueniet. Ad eun-  
dem modum in accessionum principio, vomitu-  
m prouocare licebit: in augmento, & statu;  
quiescendum omnino erit: in declinatione verò  
concoquentibus, euacuantibus, & corroboran-  
tibus vti non erit inconueniens. Sed hæc de  
medicamentis simplicibus nobis suf-  
ficient, ad compositorum tracta-  
tionem nunc transeun-  
dum est.



PRACTICAE GENERALIS  
LIBER V.

ARGVMENTVM.

Præcepta tradit, quæ ad compositiones medicamentorum, tam eorum quæ intrinsecus sumuntur, quam quæ corpori extrinsecus admouentur, attinent.

Eius capita hæc sunt:

<b>D</b> E Syrupis,	Cap. 1.
De Syrupis concoquentibus bilem flauam,	Cap. 2.
De Syrupis concoquentibus pituitam,	Cap. 3.

N 5 De

- Desyrupis concoquentibus atram bi  
 lem, Cap. 4.  
 Desyrupis digerentibus humores mi  
 xtos, Cap. 5.  
 Desyrupis laxantibus, Cap. 6.  
 De iulapijs, Cap. 7.  
 De eligmatis, Cap. 8.  
 Derob, Cap. 9.  
 De decoctis, Cap. 10.  
 De decoctis alterantibus, Cap. 11.  
 De decoctis alterantibus, simul & pur  
 gantibus bilem flauam, Cap. 12.  
 De decoctis alterantibus & purgan  
 tibus pituitam, Cap. 13.  
 De decoctis alterantibus & purgan  
 tibus melancholiam, Cap. 14.  
 De decoctis alterantibus & purgan  
 tibus humores mixtos, Cap. 15.  
 De infusionibus, Cap. 16.

- De infusionibus purgantibus, C. 17.  
 De potionibus purgantibus, in substantia sumptis, Cap. 18.  
 De medicinis lenientibus, Cap. 19.  
 De medicinis solutiuis, Cap. 20.  
 De potionibus purgantibus partim infusis, partim in substantia sumptis, C. 21  
 De bolo purgatorio, Cap. 22.  
 De pilulis, Cap. 23.  
 De pilulis purgantibus bilem flavam, Cap. 24.  
 De pilulis purgantibus pituitam, C. 25.  
 De pilulis purgantibus melancholicam, Cap. 26.  
 De clysteribus, Cap. 27.  
 De clysteribus alterantibus, Cap. 28.  
 De clysteribus purgantibus, Cap. 29  
 De suppositorijs sine glandibus, C. 30.  
 De pessis, Cap. 31

De errhinis	Cap. 32.
De caput purgijis,	Cap. 33.
De sternutamentis,	Cap. 34.
De apophlegmatismis,	Cap. 35.
De gargarismis,	Cap. 36.
De Trochiscis,	Cap. 37.
De collyrijs,	Cap. 38.
De electuarijs,	Cap. 39.
De tabulis & rotulis,	Cap. 40.
De Trageis, siue tragematis	Cap. 41.
De pulueribus,	Cap. 42.
De pulueribus purgantibus	Cap. 43.
De dentifricijs,	Cap. 44.
De pomis odoratis,	Cap. 45.
De suffimentis,	Cap. 46.
De linimentis,	Cap. 47.
De vnguentis,	Cap. 48.
De fomentis,	Cap. 49.
De epithematibus,	Cap. 50.

De sacculis,	Cap. 51.
De cataplasmatibus,	Cap. 52.
De emplastris,	Cap. 53.
De cerotis,	Cap. 54.
De scutis,	Cap. 55.
De embrochis,	Cap. 56.
De balneis,	Cap. 57.
De collutionibus, seu ablutionibus,	Cap. 58.
De ponderibus, & mensuris,	Cap. 59.



## PRACTICAE GENERALIS

## LIBER V.

*De Syrupis, Cap. I.*

**S**uperiore libro simplicium medicamentorum præcepta tradidimus, reliquum nunc est, ut compositorum, tam intrinsecus sumendorum, quam forinsecus adhibendorum medicamentorum præceptiones doceamus, à syrupis digestiuis originem ducentes. Itaque syrupus digestiuis est potio alterans humores corporis in qualitate. Conficiuntur ex aquis distillatis, & syrupis simplicibus, & compositis, ita ut syruporum dosis sit ab  $\bar{z}$  1. vsq; ad  $\bar{z}$  1. s. vel ad summum  $\bar{z}$  2. aquarum vero ab  $\bar{z}$  2. vsq; ad  $\bar{z}$  3. vel 4 in dupla proportione: exempli gratia: Si Medicus corrigere velit complexionem calidam, dabit syrupi endiuixæ  $\bar{z}$  1. s. aquæ endiuixæ  $\bar{z}$  3. misce, & fiat potus. Si vero duo spectet Medicus, videlicet, ut malam complexionem alteret, & aperiat, pro primo dabit syrupum endiuixæ, cum aqua eiusdem, pro secundo, syrupum Bisantinum cum aqua fœniculi, hoc modo: R. syrupi endiuixæ  $\bar{z}$  1. Syrupi Bisantini  $\bar{z}$  s. aquæ endiuixæ  $\bar{z}$  2. aquæ fœniculi  $\bar{z}$  1. misce. Quod si tria velit efficere Medicus, ammonere complexionem calidam, aperire, & incidere pro primo, dabit syrupum endiuixæ cum aqua eiusdem, pro secundo Bisantinum cum aqua fœniculi:

culi: pro tertio Syrupū acetosum simplicē, cum aqua acetosæ, in hac forma: ℞. Syrupi endiuicę, Syr. Byfantini, syr. acetosi añ. ʒ s. aquarum endiuicę, foeniculi, acetosæ, añ. ʒ i. misce, & fiat pot<sup>o</sup>. Porro aquæ vt plurimū syrupis ꝑ portione respōdere debēt, nisi ꝑꝑ cōplexionē malā auferē dā aliter facere cogatur Medicus exēpli gratia. Si ordinaret syrupum epithymi, aut de stœcha de, miscendæ illis erunt aquę frigidę, vt violarū aut endiuicę, vt syrupi caliditas corrigatur, quæ omnia pro arbitrio periti Medici fiant. Cæterū obseruandū quoq; venit, quòd omnib. syrupis cordialē aliquā aquam cōmiscere oporteat, vt virtus rectorix cordis cōfirmetur, q̄ in corde non aliter, quā rex in suo regna regnat. Sic igitur cōcludamus, syruporū dosim nō trāsgredi oportete ʒ i. s. aut ad summū ʒ 2. idq; raro admodū: a quarū verò ʒ 3. &c. Qualitas aut syruporū ab ipsius morbi causa petenda est. Siquidē bilis, & frigētes: pituita, excalfaciētes, & incidētes: melancholia, excalfaciētes & humectantes syrupos exposcit. Sumitur interdū à morbo, vt cum in obstruētōe, aperiēte utimur syrupo aliquo. Porro locus affectus syruporū aquarūq; varietatē maximē indicabit. Medicus namq; volens ordinare syrupū, debet semp assumere aquā ꝑ portionatā parti affectæ, cui ꝑportionatur syrupo. verbi gratia: accipiēs medicinā stomachicā debet



debet assumere aquam stomachicam: idem in reliquis censendum: Exhibentur autem Syrupi frequenter in aurora, tepidi: interdum etiam vesperi, ubi scilicet somni conciliandi gratia sumuntur. Succos corporis purgationi preparant, meatus referant, obstructions aperiunt, intemperies corrigunt, incidunt, detergunt, &c.

*De Syrupis, & aquis concoquentibus bilem flauam, Cap. 2.*

**S**yrupi & aque digerentes materiam cholericam, in

C A P I T U M

Syrupi	Aque.
Syrup. Rosarum:	Aqua lactuce:
De Nenuphare.	Nenupharis.
De papauere.	Rosarum, &c.

*Exempli gratia.*

<b>R.</b> Syrupi de papauere ℥. i. s.	<b>R.</b> Syrup. de papauere ℥. i.
<b>A</b> quarum	<b>A</b> quarum
Violarum	lactuce
Lactuce	Nenupharis añ. ℥. i.
Nenupharis. añ. ℥. i.	<b>M</b> isce, & fiat potio.
<b>M</b> isce & fiat potus.	

## IN PECTORE.

syrupi.  
 sirup. violarum  
 sirup. de iuiubis  
 Iuleb. uiolatum, &c.

Aquę.  
 Violarum  
 Portulacę.

*Exempli gratia.*

R. syr. violarum  
 De iuiubis ana  $\bar{z}$  s.  
 Aq. violarum  $\bar{z}$  2.  
 Misce, & fiat syrup.

R. syr. de iuiubis  $\bar{z}$  1.  
 Iul. violati  $\bar{z}$  s.  
 Aq. portulacę  
 Viol. ana  $\bar{z}$  1 s.  
 Misce.

## IN CORDE.

Syrupi.  
 De succo acetosę  
 syr. acetosifatis citri  
 Iulapium rosa-  
 ceum, &c.

Aquę.  
 Acetosę  
 buglossę  
 borraginis  
 rosarum, &c.

*Exempli gratia.*

R. syr. acet. cit.  $\bar{z}$  1 s.  
 Aq. acetosę  
 borraginis  
 buglos. ana  $\bar{z}$  1.  
 Misce, & fiat pono.

R. syrupi acetos  $\bar{z}$  1.  
 Iulapij rosar.  $\bar{z}$  s.  
 Aquar. buglos.  $\bar{z}$  1.  
 borrag.  $\bar{z}$  2.  
 Misce.

216 PRACT. GENERALIS  
IN STOMACHO.

Syrupi.

Aquæ

siru. acetosus simp.  
sir. Granatorum  
sirup. rosarum  
Iulapium rosaceum  
Oxyfaccharum  
Miua citoniorum  
syr. mal. aurâtior. &c.

cotoneorum  
Acetosæ  
portulacæ  
Violarum, &c.

*Exempli gratia.*

℞. sir. Granatorum  
Mal. aurât. ana ʒ s.  
Aq. acetosæ  
Portulac. ana ʒ i.  
Misce, & fiat potio.

℞. Sy acetosi simp. ʒ i  
rosar. ʒ s.  
Aq. cotoneorû ʒ i.  
Violar. ʒ 2.  
Misce.

I N C A P I T E.

syrupi.

Aquæ

syrup. endiuic  
sirup. de succo endiu.  
siru. de cichorio, &c.

endiuic, Hepaticæ  
Cucurbitæ, cichorij  
Solatri, &c.

*Exempli gratia.*

℞ Syr. de endi ʒ i s.  
Aq. endiuic  
Hepaticæ  
cucurbite  
ana ʒ i.  
Misce, & fiat sirup.

℞ Sir. de suc. end. ʒ i  
De cichorio ʒ s.,  
Aq solatri  
Cichorij  
endiuic ana ʒ i:  
Misce

De

## De cōcoquentib. pituitam, Cap. 3.

Syrupi & aquæ digerētes materiam phlegma-  
ticum. INCAPITE.

Syrupi	Aquæ
sirupi de betonica	betonicæ, maioranæ,
sirup. de stæcha- de, &c.	saluiç, rorisardini Pço. primul. ueris, &c.

Exempli gratia.

R. Syrupi de betoni- câ ʒ i.	R. syr. de stæch ʒ s.
Aquar. saluic	de beton. ʒ i
Maioranæ	Aq. betonicæ
ana ʒ i	saluic
Misce, & fiat sirup.	Primulç veris
	ana ʒ i.

Misce.

## IN PECTOR E.

syrupi.	Aquæ
syrup. capill. veneris	capillorum veneris
sirup. de hyssopo	hyssopi
De prassio	scabiosæ
De calamentho	adianthi
De glycyrrhiza, &c.	thymi,
	Marrubij, &c.

## INSTOMACHO.

syrupi.	Aquæ
Syr. de mentha	Absynthij
sir. de absinthio	Menthç
Mel ros. colatum	Apij
	P 2 Oxyme.

Oxymel simplex	Fœniculi
Oxymel compositum	chamomillæ
Oxymel scilliticæ, &c.	rutæ, &c.

## I N H E P A T E.

Syrupi	Aquæ.
syrup. de duab. rad.	Eupatorij
sir. de quinque rad.	Prassij
sirup. de eupatorio	Hepaticæ, &c.
sirup. bysantinus, &c.	

## I N R E N I B V S.

syrupi.	Aquæ.
Oxymel compositum	Nasturtij
syr. de duab. rad.	cicerum rubrorum
syr. de quinq; rad. &c.	erucæ, &c.

## I N M A T R I C E.

Syrupi	Aquæ.
sirup. de arthemisia	Arthemisia
sir. de calametho, &c.	Matricariæ, &c.

## I N T O T O.

syrupi.	Aquæ
Sirupus bysantinus	Apij
Oxymel compositum, &c.	fœniculi
	chamomillæ, &c.

## Exempli gratia.

R. syr. bysantin. $\bar{z}$ 1 s.	R. Oxim. compos. $\bar{z}$ 1
Aq. fœniculi $\bar{z}$ 2.	Aquæ chamomil.
Apij $\bar{z}$ 1.	la $\bar{z}$ 2.
Misce, & fiat potio.	Misce pro potu.

De

## De Syr. cōcoquētib. bilē atrā, C. 4.

Syrupi & aquæ digerentes melancholiam,  
IN HEPATE.

Syrupi.	Aquæ.
syr. de fumoterræ.	Fumiterræ
syr. de epithymo	lupulorum, &c.
syr. lupulorum, &c.	

Exempli gratia.

R. syr. de fumoterræ	R. Syrupi lupulo-
De epith. an. $\bar{z}$ 6.	rum $\bar{z}$ 1. s.
Aqu. lupulorum	Aquæ fumiterræ
fumiter. $\bar{z}$ 1. s.	$\bar{z}$ 3.
Misce, & fiat syrup.	Misce.

IN SPLENB.

Syrupi.	Aquæ.
Syr. de fumoterræ	scolopendriæ
shr. de epithymo, &c.	epithymi, &c.

IN CORDE.

syrupi.	Aquæ.
syr. de pomis comp.	borraginis
syr. sapor regis, &c.	buglos. Melissæ, &c.

Exempli gratia.

R. syr. de pomis	R. Syrupi sapor
comp. $\bar{z}$ 1.	reg. $\bar{z}$ 1. s.
Aq. borraginis	Aq. borraginis $\bar{z}$ 2.
buglos. an. $\bar{z}$ 1.	Melissæ $\bar{z}$ 1.
Misce, & fiat potio.	Misce.

P 3 Nota

Nota me non posuisse que sanguinem digerunt, quia cum putrescit, in choleram transit: sufficiat igitur choleram digerentes adscripsisse.

*De Syrupis digerentibus humores mixtos, Cap. 5.*

**S**yrupi & aque digerentes bilem, & pituitam,  
**I N C A P I T E.**  
**R.** syr. de Nenuphare  
 De betonic. ana  $\bar{z}$  i s.

Aqu lactuce  
 Nenupharis  
 saluie  
 Peon. ana  $\bar{z}$  i s.

Misce, & fiat potio  
 pro duabus dosibus.

**I N P E C T O R E.**

**R.** syr. capill. Ven.  
 Iuiub. ana  $\bar{z}$  6  
 Aq. adianthi  
 Thymi  
 Violarum  
 Portul. ana  $\bar{z}$  6  
 Misce, & fiat syrup.

**R.** syr. de papauere  
 rosarum  
 de stœc. ana  $\bar{z}$  s.  
 Aqu. violarum  
 rosarum  
 lactuce  
 primulae ueris  
 maioranz  
 rorism. ana  $\bar{z}$  s.

Misce, pro una dosi.

**R.** Syr. de hyssopo  
 De glycyrrhiza  
 De iuiub. ana  $\bar{z}$  6  
 Aq. capil. Ven.  
 Portulacæ  
 Marrubij  
 Borra. ana  $\bar{z}$  6.

Misce. **I N.**

℞ syr. de absinthio ℞. syr. de menth. ʒs.  
 de mētha ana ʒs. Granatorū ʒi.  
 Acetosi simp. ʒi. Aq menthe ʒi.  
 Aqu. absinthij cotoneor. ʒi.  
 borraginis  
 Accetosæ  
 Cotoneorū ʒi.  
 Miscē, & fiat syrup.

Miscē, & fiat potio.

SYRVPVS PVRGANS BILEM, PITVI-  
 tam, & Melancholiam in hepate.

℞. Sirupi de duabus radicibus  
 De epithymo  
 De cichorio ana ʒs.  
 Aquar. Eupatorij  
 Fumiterræ, lupulorum  
 Endiuæ an. ʒs.  
 Hepaticę ʒi

*De Syrupis laxantibus, Cap. 6.*

Syrupi laxantes simplices sunt,  
 Syrupus rosatus laxatius  
 Syrupus violatus laxatius  
 ℞ Syr. de floriperfice arboris]

Comp.

Syr. de Cichorio cum rhabarbaro



## De Iulapijs, Cap. 7.

**I**ulapium seu Zulapium est Arabum delicatæ  
 potionis genus. Fiunt autem ex aquis stilla  
 titiis, & saccharo, ad syrupi consistentiâ coctis.  
 Vfus tempore aqua largiore, nimirum quadru  
 pla dilui solent, ita ut si Iulapiorum pondus sit  
 3 3. erunt a quarum 2 1 2. vt infra in formulis pa  
 tebit. Vtimur his in febribus potissimum, aliis  
 que morbis, vtili præsertim, vbi vini vices, quo  
 rum abstinere oportet, suppleant.

I.

R. Iul. rosacei  
 Violari an. 3 s  
 Aqu endiuic  
 Acetosæ  
 borrag. an. 3 4

II.

R. Iulapij violacei  
 Syrupi de glycyrrhica an. 3 1.  
 Aquarum scabiosæ  
 Tussiliana 3 4.  
 Aquæ hordei coctæ  
 3 4.

Misce, & fiat iulapus.

III.

R. Aq. cinuamomi  
 stillatitiæ,  
 borraginis  
 buglossæ  
 Acet an. 3 1. s.

Iulapij rosacei 3 1.  
 uel 3 1. s.

Margarit. præparat.  
 coralli rubr. præpa  
 rat.

Fragm. lap. pretiosorum  
 an. 3 5.

Fol. auri N. 3.

Commistis singulis  
 fiat Iulipelus.

De

*De Eligmatis, Cap. 8.*

**L**Inctus siue Eligma Græcis, Barbaris Lech: medicamentum est thoracicum, uel pulmonicum, linguendo, uel lambendo, tandiu in ore retentū, uel lingue subditū, quoad paulatim eliquescat, tabescatue, in spiritus meatum decidens potius, quàm deuoretur, per se, ex dulcibus, tergentibus, ac etiam glutinosis, interdum amaris, & acerbis conflatū. Hodie uerò eis adiunguntur, species, syrupi, & conferuz interdum, ita ut eligmatum dosis sit ab  $\bar{z}$  s. vsq; ad  $\bar{z}$  i. species uerò à  $\bar{z}$  3. vsq; ad  $\bar{z}$  i. plus, minusue. Conferuarum autem ab  $\bar{z}$  2. vsq; ad  $\bar{z}$  3. syruporum, quantum ad excipiendum satis est, ut infra in formulis patebit. Cui nam parti corporis correspondere debeāt medicamenta, ipse locus affectus indicabit, nimirum thorax, uel pulmo. Quare his adiciēda medicamēta sunt, quæ thoracis, uel pulmonis uitis auxiliātur: cuiusmodi sunt. Diapnidium, diatrageanthum, trochisci beccihici, succus glycyrrhizæ, tragacanthum, gummi arabicum, & id genus alia. Qualitas autem ab ipso affectu, uel ipsius causa desumēda erit. Sic asperæ arteriæ asperitas, eligmatiale nientia exposcit: pulmonis ulcera, consolidatis: intemperies calida, refrigerantia: frigida, ex calfaciētia. Ad eundem modum humores in tho-

race crassi, attenuaria efflagitant eligma: visco-  
si, que uim incidendi & adtergendi habent,  
&c Porro exhibentur quouis tempore, ante &  
post cibum, sate quantitate, potissimum vero  
matutino, & uespertino. Ad pulmonis inflam-  
mationem, asperæ arteriæ asperitatem, ulcera,  
spiritus difficulta en, anhelationes, tussim ex  
humoris influxu, ac destillatione ortum, & eos,  
qui difficultes glutinosa excreant, ut praefocari  
videantur.

I.

R. Conseruz capill.

Veneris

hissopi ana  $\bar{z}$  1.

Loch de pulmone

vulpis  $\bar{z}$  s.

Spec diapenidij

diareos ana  $\bar{z}$  1 s.syr. de prassio quan-  
tum sufficit ad exci-  
piendum, fiat loch.

I I.

R. Loch de pino

de pulmo vulpis

sani &amp; experti

ana  $\bar{z}$  2.

De scilla.

Spec. diapenidij

Diatragacanthi

ana  $\bar{z}$  s.Diareos  $\bar{z}$  1.

Trochisc. beechi cor.

succu glycyrr. ana  $\bar{z}$  2.radicu enulæ  $\bar{z}$  2.Diacotij  $\bar{z}$  1.

syr. de hissopo, vel de

glycyrrhiza quantum

sufficit, fiat eligma.

I I I.

R. Conseruz uioleatū

Nenupharis

ana  $\bar{z}$  1.loch de papauer.  $\bar{z}$  s.

Spec diatragacant.

frig.  $\bar{z}$  s.

sir. viol. q. s. fiat elig.

De

## De Rob, Cap. 9.

**R**ob est succus succuum, ignis calore inspissatus, ut asseruari possit, & eo vti liceat, aut p se, aut cū melle, aut aquis stillatitiis siruporū instar, & ita Rob dosis erit ab  $\frac{3}{4}$  t. ad  $\frac{3}{4}$  s. aquarum verò ab  $\frac{3}{4}$  2. vsque ad  $\frac{3}{4}$  3. in dupla portione, ut infra in formulis patebit. Differt tamē rob à sirupo, vel decocto: quòd sirupus fiat ex medicamentorum simplicium decoctione, addito melle, vel saccharo: rob uerò ex herbarū succis, igne, ut antea dictum inspissatis. Porrò rob in materia pituitosa, & melancholica fortior operationis est, quàm sirupus, vel decoctū. Quoniam in succo fortior operatio, quàm in decoctione est. Siquidē ex decoctione partes subtiliores exhalāt, in succo uerò remanent. In materia autem calida, sirupus & decoctum præstantiora sunt, quàm rob. Et contra vero in gargarismis magis laudatur rob quàm sirupus, quoniam fortioris est virtutis ad attrahendum succiliandum, &c. Ceterum cum rob simile, cum sirupis virtutes obtineant, poterūt quoq; propter easdem intentiones, propter quas exhibentur sirupi, dari, & exhiberi, & eadem hora, & eodē tēpore. Porrò rob etiam cum aliis medicamentis, cum simplicibus, tū compositis exhiberi poterunt, ut in formulis uidere licebit.

L. B.

	I.	Conferuz ros.antiq.
R. Rob è riberis		Diaciton. simplicis
è nucibus		Miuz cotoneorum
Miuz citonio-		ana ʒ s.
rum an. ʒ s.		consolidæ maioris
Aq. Acetose		halauftiarum
Plantaginis		Trochiscorum è spo-
Fragorū an. ʒ i.		dia
Misce, & fiat potio.		Trochisc è terra sigil-
II.		lata ana ʒ i.
R. Rob è ribes		Cum syrupo myrtino
Diamoron		q. f. ad mellis consistē-
ana ʒ s.		tiam, fiat rob.

*De decoctis, Cap. 10.*

**D**ecocta, Græcis apozemata, latinis syrapi lōgi, & magistrales dicuntur, sunt potiores non ad syrapi consistentiam decoctæ, sed dilata. Fiunt ex folijs, floribus, radicibus, fructibus, seminibus, corticibus, lignis, interdum etiam succis. Coquuntur autem hæc ex aqua fontana, vel plauia. Foliorum autem quantitas manipulos quinque ad summū: flores pugillos quatuor: radicum vacias tres, ad summum quinque; seminum drachmas quatuor, aut sex nō excedat. Aque mensura rarò libras duas, vel ad summum tres superet. Coquuntur autem omnia in olla vitrea

treata ad tertias, interdum ad dimidiæ partis  
 consumptionem: postea colo transfunduntur,  
 adiecta interdum sacchari convenienti quanti-  
 tate, vt delicatius reddatur decoctum, & cum o-  
 ui albumine clarificatur: & pro qualibet vna do-  
 si decocti  $\bar{z}$  i. syrupi cōuenientis commiscetur.  
 Adduntur etiam interdum decoctis medica-  
 menta purgātia, vbi diligēter ad pondus pur-  
 gantium medicamentorum respiciendum est,  
 adiectis semper ijs, quæ vim eorundem infren-  
 nant. Quibus autem membris medicamēta pro-  
 portionata esse debeant, locus affectus commo-  
 dè ostendet: sic eorundem qualitatem tum  
 affectus ipse, tū eius causa maximè indicabit.  
 Porrò asseruantur vix per septimam decocta.  
 Assumuntur autem instar syruporum, tempore  
 matutino, pondere duarum, aut trium, aut qua-  
 tuor unciarum, pro varia ratione ætatis cōple-  
 xionis, &c. Vtimur autem his ad alterandum,  
 præparandum, concoquendum, & purgandum  
 interdum, vt in sequentibus formulis patebit.

---

*De decoctis alterantibus, Cap. II.*

DECOCTVM ALTERANS

bilem flauam.

℞. rad. cichorij  $\bar{z}$  3.

Fol. lactucę.

Endiuiz

portulacę an M. r.

Sem.

238 PRACT. GENERALIS

sem. melonum  
 Cucurbitæ  
 cucumeris  
 citrul. ana  $\frac{2}{3}$  l.  
 Passularum  
 sebesten  
 Iuiubarum  
 Prunorum ana  $\frac{3}{4}$  s.  
 flor violarum  
 Borra. ana P. l.

Fiat decoctio in mensuris duabus aquæ usq;  
 ad consumptionem tertie partis, de colatura ac  
 cipe lib. l. cui adde sacchari lib. 5. coquantur  
 iterum despumando, & clarificando, fiatq; apo  
 zema pro quatuor aut quinque dosibus, cui ad  
 datur syrupi violacei  $\frac{3}{4}$  vel 5.

DECOCTVM COMMVNE  
 alterans pituitam.

R. Betonicæ  
 Hyssopi  
 Capil. Veneris  
 ana M l. s.  
 R. Flor. borraginis  
 bugl. ana P. l.  
 R. rad. cœniculi  
 Apij  
 Petroselini  
 Rusci  
 Asparagi ana  $\frac{2}{3}$  s.  
 sem. anisi  
 fœniculi  
 Ameos ana  $\frac{2}{3}$  l.  
 Passularum  $\frac{3}{4}$  s.  
 Ficum N 10.

Coquantur in lib. 2. aquæ, vique ad consum  
 ptionem tertie partis. Colaturæ adde mellis ro  
 sati colati q. s. fiatq; potio pro quinque dosibus

APOZEMA COMMVNE  
 mei ancholiam alterans.

R. Fumiterræ  
 lupulorum  
 Scolopendriæ  
 endiuicæ

Seariole ana M. 1.	Prunorum N. 10
rad. polipodij	Passularum $\bar{z}$ 1.
Cichorij ana $\bar{z}$ 1. s.	cort. tamaricis
sem. anisi	capparorum
feniculi ana $\bar{z}$ 2.	ana $\bar{z}$ 5.

Fiat decoctio secundum artem. Colaturę adde  
 sacchari q. s. & fiat potio pro quinque dosib.

*De decoctis alterantibus, & purgantibus simul bilem flavam*

Cap. 12.

**D**Ecocta concoquentia, & purgantia bilem  
 flavam.

I N H E P A T E.

R. Fol lactuce	sem. papaveris albi $\bar{z}$
Nenupharis	3. vel 4.
ana M. 2.	Passularum $\bar{z}$ 1.
R. Flor. violarum	prunorum N. 9
rosar. ana P. 2.	

Coquantur in sufficienti quantitate aque vs-  
 que ad consumptionem tertię partis, de colatu-  
 ra R.  $\bar{z}$  4. quibus infunde

Rhabbari electi  $\bar{z}$  2.  
 spicz  $\bar{z}$  1.

Relinquantur per noctem, mane coletur, &  
 expumatur fortiter, cui adde

Electu



Electuar. de succo  
ros.  $\frac{3}{2}$ .

sirup. violar. lax.  $\frac{1}{1}$ .  
Miscel, & fiat potio.

## I N P E C T O R E.

R. Fol. tussilaginis  
lact. an. M.  $\frac{1}{2}$  s.  
flor. violarum  
borrag. an. P.  $\frac{2}{2}$ .

sebellen  
Iuiobarum an.  $\frac{3}{2}$  r.  
Passularum  $\frac{3}{2}$  s.  
Glycyrrhizæ  $\frac{2}{2}$  r.

Coquantur secundum artem, De colatura

R.  $\frac{3}{4}$ . quibus adde  
Mannæ electæ  $\frac{3}{2}$  r.  
Diaprunis soluti-

ui  $\frac{2}{2}$  vel  $\frac{1}{1}$ .  
Infusionis viol.  $\frac{3}{2}$  r.  
Miscel, & fiat potio.

## I N V E N T R I C U L O.

R. Lactucæ M.  $\frac{1}{1}$ .  
flor. violarum  
borra an. P.  $\frac{1}{1}$ .  
sem. Portulacæ  
scariolæ

Cucur. an.  $\frac{2}{2}$  r.  
Prunorum  
Passularum an.  $\frac{3}{2}$  s.  
Myrrabalanorum  
citrinorum  $\frac{3}{2}$  s.

Coquantur f. a. & fiat potio pro duabus dosi-  
bus cui adde

Castiæ recentis  $\frac{3}{2}$ .  
elect. ros. Mel.  $\frac{2}{2}$ .

sirup. ros. lax.  $\frac{3}{2}$ .  
Miscel, & fiat potio.

## I N H E P A T E.

R. rad. cichorij  $\frac{3}{2}$ .  
fol. endiuæ  
Sonchi an. M.  $\frac{1}{2}$  s.  
flor. cichorij P.  $\frac{2}{2}$ .  
sem. endiuæ  
scariolæ

lactucæ ana  
 $\frac{2}{2}$  s.  
Tamarindorū  $\frac{3}{2}$  r.  
Passularum  $\frac{3}{2}$  s.  
rhabar. electi  $\frac{2}{2}$  6.  
spicæ indicæ  $\frac{2}{2}$  r.  
Co-

Coquantur s. a. & fiat pro duabus dosibus,  
cui adde

Diapruni leniti-  
ui  $\bar{z}$  r.

Syrupi de cichorio  
cū rhubar.  $\bar{z}$  r.

Misce, fiatq; potio, pro duabus macutinis.

## I N S P L E N E .

R. Fol. endiuiz

Sem. endiuiz  $\bar{z}$  r.

caecuminum

corz. tamaricis  $\bar{z}$  r. s.

Impulorum an.

Passularum  $\bar{z}$  s.

M. r.

rhabarb. electi  $\bar{z}$  s.

Flo. borraginis

spicz indicz  $\bar{z}$  r.

buglof. an. P. f.

Decoquantur s. a. & fiat potio pro una dosi,  
cui adde syrupi ros. lax.  $\bar{z}$  r.

## I N M A T R I C E .

R. Fol. endiuiz

Nenupha-

Nenupha-

ris. an. P. r. s.

ris. an. M. r. s.

passularum  $\bar{z}$  r.

Flo. borraginis

Decoquantur s. a. & fiat potio pro duabus do-  
sibus, cui adde

Mannz electz  $\bar{z}$  2.

syrupi violati

electuar. de succo

lax.  $\bar{z}$  2.

ros.  $\bar{z}$  s.

Misce; & fiat potio.

## I N I V N C T V R I S

R. fol lactucz

semen endiuiz  $\bar{z}$  3.

endiuiz an. M. r. s.

Vuarum passa-

flor. Violarum P. 3.

rum  $\bar{z}$  s.

Q.

De

Decoquantur s.a. De colatura accipe  $\bar{3}4$ . qui  
bus adde

Diacatholico-

nis  $\bar{2}5$ .

Electuarij succi ro.

Mes.  $\bar{2}3$ .

syrupi ros. lax.  $\bar{3}1$ .

Milce.

*De decoctis alterantibus, & purgan-  
tibus pituitam, Cap. 13.*

**A** Pozemata concoquentia & purgantia pi-  
tuitam,

**I N C A P I T E.**

**R.** Fœniculi  $\bar{3}1$ .

betonicæ

maioranç ana M. 1

flor. anthos

De stœchade

ana P. 1.

sem. fœniculi  $\bar{2}15$ .

Coquantur s.a. & fiat potio pro duabus dosi-  
bus, cui adde syrui de betonica  $\bar{3}2$ .

**I N P E C T O R E.**

**R.** Rad Ireos

Enulæ

Glycirrizæ

ana  $\bar{2}2$ .

Fol. betonicæ

Hyssopi

Marrubij

ana M. 1.

Flor.

L I B E R V. 243

Flor. scabiosæ	Dactylor. ana $\frac{2}{3}$ s.
betonicæ	Turpeni $\frac{2}{3}$ s.
borrag. ana Pr.	Agarici $\frac{2}{3}$ s.
sem. vrticæ $\frac{2}{3}$ s.	Zingiberis
Passularum	salis gemme
Ficum	ana $\frac{2}{3}$ r s.

Fiat decoctio s. a. pro duab. dosibus, cui adde  
 Diaphœniconis syr. de hyssopo  $\frac{2}{3}$  s.  
 $\frac{2}{3}$  s. Misce, & fiat potio.

I N V E N T R I C U L O.

R. Rad. fœniculi	sem. fœniculi
Petrose. ana $\frac{2}{3}$ s.	Anisi ana $\frac{2}{3}$ r.
Fol. Menthæ M. 2.	Passularum $\frac{2}{3}$ s.
Flor. rorismarini	Agarici $\frac{2}{3}$ s.
borra. ana P. 1.	zingiberis $\frac{2}{3}$ s.
Decoquantur s. a. & fiat potio pro duabus do-	
sibus, cui adde	
Electuarij Indi	Syrupi de mentha
Diaphœniconis	$\frac{2}{3}$ s.
ana $\frac{2}{3}$ s.	Misce, & fiat potio p
	duabus vicibus.

I N H E P A T E.

R. Rad. Petroselini	Asparagi
Apij	Rufci ana $\frac{2}{3}$ s.
Fœniculi	
	Q 2      Fol.

244 PRACT. GENERALIS

Fol. origani	petrosellini ana $\frac{3}{2}$ r.
Hyssopi	passularum $\frac{3}{5}$ .
eupatorij an. M. r. s.	agarici $\frac{3}{5}$ .
flor. borraginis	salis gemmæ
origani ana P. r.	Zingiberis ana $\frac{3}{2}$ r.
semen anisi	

Decoquantur s. a. & fiat potio pro duabus  
dosibus, cui adde  
Diaphœniconis  $\frac{3}{5}$ . Syrups de eupatorio  $\frac{3}{2}$ .

I N S P L E N F.

R. Rad. asparagi	Borraginis
cicho-	ana P. r.
rij an. $\frac{3}{5}$ s.	Sem. anisi
Fol. calaminthi	Carui ana $\frac{3}{2}$ r.
Asari	cort. tamaricis
eupatorij	capparorū ana M. s.
ana M. r.	turpeti $\frac{3}{6}$ .
Flor. buglossæ	Zingiberis $\frac{3}{2}$ .

Fiat potio pro duabus dosibus, cui adde sy-  
rupi de calamintha  $\frac{3}{2}$  r.

I N R E N I B V S, E T V E S I C A.

R. Rad. quinq; com-	Cicerum rub. an. P. r.
muniū	baccarum iuniperi.
Pentaphylli ana $\frac{3}{2}$ r.	$\frac{3}{2}$ .
Flor. borraginis	Ficuum N. r. o.

Decoquatur s. a. De colatura accipe uncias  
4 quibus infunde per noctem.

Agari-

Agarici  $\frac{2}{2}$ .  
 Zingiberis  $\text{ʒ}$  i. s.  
 Mane exprimantur,  
 addaturque  
 Benedictæ laxati-

uē  $\frac{2}{2}$  s.

Syrupi de duabus

rad.  $\frac{3}{1}$ .

Misce, fiatque potio.

## I N M A T R I C E .

R. Artemisiæ sem. petroselini  
 Pulegij Anisi an.  $\frac{2}{1}$ .  
 Sabine baccarum lauri  $\frac{2}{1}$ .  
 Melissæ Agarici  
 rad. Apij ana M. s. Turpeti ana  $\frac{2}{3}$ .  
 Asparagi vel 4.  
 rubic tin- Zingiberis  $\frac{2}{2}$ .  
 & orū an.  $\frac{3}{5}$ .

Decoquantur s. a. & fiat potio pro duabus vi  
 cibus, cui addantur syrupi de arthemisia  $\frac{3}{2}$ .

## I N I V I N C T V R I S .

R. rad. sœniculi Borriginis  
 Ireos ana P. i.  
 cichorij sem. sœniculi  
 Asparagi Anisi an.  $\frac{2}{1}$ .  
 an.  $\frac{2}{2}$ . passularum  $\frac{3}{1}$ .  
 Fol. betonicæ Turpeti  
 Hyssopi Agarici ana  $\frac{2}{2}$  s.  
 menthæ zingiberis  
 eupatorij salis gemmæ  
 an. M. s. ana  $\frac{2}{1}$  s.  
 Flor. anthos Cinnamomi  $\frac{2}{1}$ .  
 Q 3 Deco-

Decoquantur s. a. fiatque potio pro duabus  
dosibus, cui adde

Diacatholiconis

Oxymellis  $\bar{z}$  2.

$\bar{z}$  1

Misce, fiatque potio;

Benedictæ lax.  $\bar{z}$  5.

ro duabus matutinis.

*De decoctis alterantibus & purgantibus melancholiam, Cap. 14.*

**D**ecocta concoquentia, & purgantia atram  
bilem **IN CAPITE.**

R. Lupulorum

Borraginis

Fumiterre

ana P. 1.

ana M. 1. s.

Prunorum N. 10

rad. buglossæ  $\bar{z}$  1.

Passularum  $\bar{z}$  5.

Flor. anthos

Fol. senæ  $\bar{z}$  1 s.

buglossæ

Zingiberis  $\bar{z}$  2.

Decoquantur s. a. & fiat potio pro duabus do  
sibus, cui adde

Syrupi de pomis  $\bar{z}$  2.

**IN PECTOR E.**

R. Fol. Melissæ

Borraginis

Kolmarini

ana P. 1.

Buglossæ

Passularum  $\bar{z}$  5

ana M. 1.

Glycyrrhizæ  $\bar{z}$  1

Flor. Violarum

Ficum N. 6.

Melissæ

Senæ  $\bar{z}$  1 s.

Zingiberis  $\bar{z}$  2.

Co-

Coquantur s.a. & fiat potio pro duabus vicibus, cui adde sirupi violacei  $\bar{z}$  2.

I N H E P A T E.

R. rad. cichorij	Flor. borraginis
polipodii $\bar{z}$ 2	buglossæ
Fol. Asari	ana P. r
Fumiterre	Vuarum passarû $\bar{z}$ 6
lupulorum	Myrobal. ind. $\bar{z}$ s.
ana M. r	Fol. senæ $\bar{z}$ 1 s.
	zingiberis $\bar{z}$ 2.

Coquantur s.a. & fiat potio pro tribus dosibus cui adde

Confect. ha. $\bar{z}$ 1	terre $\bar{z}$ 3.
sirupi de fumo-	Misce.

I N L I E N E.

R. rad. buglossæ	Epithymi
polipodij	ana M. t
ana $\bar{z}$ 3	Cort. tamar. P. r.
Fol. thymi	cappar. $\bar{z}$ 1 s.
Scolopendriæ	sem. anisi $\bar{z}$ 2
Cuscuthæ	senæ $\bar{z}$ 1
	zingiberis $\bar{z}$ 2.

Fiat decoctio s.a. & fiat potio pro duob. haustis, cui adde Confectionis Hamech  $\bar{z}$  s. sirupi de epithymo  $\bar{z}$  1 s.

I N T O T O:

R. Fumiterre	Lupulorum
scolopendriæ	Epithymo ana M. s
	Q 4 flor.



248 PRACT. GENERALIS  
 flor. borraginis Myrtob. ind.  $\bar{z}$  s:  
 buglossę Passularum  $\bar{z}$  6.  
 melissę semen anisi  
 ana P. r. fœniculi ana  
 rad. polipodij  $\bar{z}$  1.  
 buglossę senz Orientalis  
 cichorij  $\bar{z}$  1. s.  
 fœniculi Zingiberis  $\bar{z}$  2.  
 ana  $\bar{z}$  s.

Concoquantur s. a. & fiat potio pro tribus do  
 sibus cui adde  
 Diacatholiconis Manaz electę  $\bar{z}$  2.  
 Syrupi de fumoter-  
 rę  $\bar{z}$  3.  
 Confect. Hamech Miscę, & fiat potio.  
 $\bar{z}$  6.

*De decoctis alterantibus, & purgan  
 tib humores mixtos, Cap. I 5.*

BILEM ET PITVITAM.  
 R. rad. cichorij ana P. r.  
 fœniculi sem anisi  
 endiuiz fœniculi  
 capill. Veneris endiuie  
 ana M. 1. cucurbitę  
 flor. Violarum ana  $\bar{z}$  s.  
 borraginis passularum  $\bar{z}$  6.  
 Tamarindorum  $\bar{z}$  1,  
 Ihabar.

rhabarbari electi	Zingiberis $\frac{2}{3}$ s.
Agarici opt. an. $\frac{2}{3}$ s.	salis gemme $\frac{2}{3}$ s.
spicę indicę $\frac{2}{3}$ s.	
Coquantur f. a. & fiat potio pro duobus hau-	
stis, cui adde	
Diacatholiconis $\frac{3}{4}$ s.	Syrupi ros. lax.
Diaphœniconis	$\frac{3}{4}$ s.
elect. de succo ros.	Misce.
aua $\frac{2}{3}$ s.	

BILEM FLAVAM ET ATRAM.

R. Lupulorum	Scm. endiuiz
Fumiterrę	Anisi an. $\frac{2}{3}$ s.
endiuiz ana M. i	passularum
rad. cichorij	sebesten ana $\frac{3}{4}$ s.
Polipodij	rhabarbari electi
ana $\frac{3}{4}$ s.	$\frac{3}{4}$ s.
flor. violarum	sol. senę $\frac{2}{3}$ s.
borraginis	spicę indicę $\frac{2}{3}$ s.
ana P. i.	Zingiberis $\frac{2}{3}$ s.

Decoquantur f. a. & fiat potio pro duabus vi-

cibus, cui adde

Diasenę $\frac{3}{4}$ s.	Syrupi ros. lax.
elect. succi ros.	syrupi de fumoter-
Mes.	re ana $\frac{3}{4}$ s.
confect. Ha. an. $\frac{2}{3}$ s.	Misce

ATRAM BILEM ET PITVITAM.

R. rad. Apij	buglossę $\frac{3}{4}$ s.
sęniculi	Polypodij $\frac{2}{3}$ s.
	Q 5 Beto-

## 250 PRACT. GENERALIS

Betonicae	Fenic. ana $\frac{2}{3}$ 1
Capill. Ven.	Cort. tamaricis $\frac{2}{3}$
epithimi ana M. 1.	Passularum $\frac{3}{4}$ 1
Flor. borraginis	Fol fenę $\frac{3}{4}$ 1 s.
buglossæ	Agarici $\frac{2}{6}$
Anthos an. P. 1.	Zingiberis $\frac{2}{3}$ 2.
sem. anisi	Salis gemmę $\frac{2}{3}$ 1.

Concoquantur s. a. & fiat potio pro tribus do  
sibus cui adde

Diacatholicon. $\frac{3}{4}$ 1	Syr. de epith. $\frac{3}{4}$ 2
Benedicte lax.	Oxymellis comp.
Confect. hamech	$\frac{3}{4}$ 1.

ana  $\frac{2}{3}$  3.

## BILEM PITVITAM; ET

atram bilem.

R. Capill. Veneris	Viol. an. P. 1. sem anisi
Lupullorum	feniculi
Betonicę	Endiuie ana $\frac{2}{3}$ 1
endiuię ana M. s.	Prunor. Dam. N. 6
rad. feniculi	Passularum $\frac{2}{6}$ .
cichotij	Senę orient. $\frac{3}{4}$ 1 s.
polipod. ana $\frac{2}{3}$ 3	rhabar. electi $\frac{2}{5}$ 5
Glycirr. $\frac{2}{3}$ 3.	Agarici optimi $\frac{3}{4}$ s.
Flor. borraginis	Spicę indicę $\frac{2}{3}$ 1
Buglossæ	salis gemmę $\frac{3}{4}$ 2.
Viol. ana P. 1.	zingiberis $\frac{2}{3}$ 1.

Decoquantur s. a. fiatq; potio pro tribus dosi  
bus, cui addantur

Man-

Mannæ electæ  
sirupi ros. lax.  
ana ℥ s.

Aquæ cinnamomi  
distillatæ ℥ i.  
Misce pro tribus ma-  
tutinis.

DECOCTVM PURGANS  
omnes humores

℞. Turpeti ℥ s.	Fol. senæ ℥ io
Polypodij ℥ 2	zingiberis ℥ 2
Hemada & ylorū	cinnamomi
rhabarb. an. ℥ 2	Anisifana ℥ i.

Concisa coquantur in libra una & semis a-  
qua vsque ad tertie partis consumptionem, co-  
letur & de colatura dentur ℥ 3. tempore matuti-  
no, addendo sirupi ros. lax. ℥ i.

*De infusionibus, Cap. 16.*

**I**Nfusio, siue dilutum est maceratio medicamē-  
torum purgantium in liquore aliquo appro-  
priato per horas aliquot certas. Magnatibus &  
delicacionibus hominibus exhibetur. Quod ad  
compositionem horum attinet, primū necesse  
est, vt purgantū medicamentorū pondus rectē  
teneamus: deinde vt semper purgātib. miscan-  
tur, q̄ vehemētia eorū corrigere possūt, vt in se-  
quētib. formulis patebit. Vt plurimū aut 12. ho-  
ras, nōnunq̄ per integrū diē, vt prōpius, & va-  
lēius tenuiores partes ē se colligāt, macerantur:  
dein-

deinde colantur & exprimantur quibus, deniq; syrups, vt suauior reddatur potio, cōmiscantur. Porro qualitas medicamentorum pro humorū praternaturam in corpore redundantium, ratione variatur. Quātitas verò seu dosis, ex quo libro petenda. Sumuntur autem diluta calidè tempore matutino, & stomacho vacuo, sicuti syrups, & apozemata ab ℥ 3. vsque ad ℥ 4. vel 5.

I.

## INFUSIO PURGANS BILEM.

℞. Rhabarbari electi ℥ 6.

spicæ indicæ ℥ 2.

Concidamur minutim; & macerentur per noctem, in aquis stillatitijs, endiuicę, hepaticę, & borraginis ana ℥ 1. s. Deinde linteolo exprimantur validè, & colentur: expressioni adde syrups ros. lax. ℥ 1. fiatque potio.

II.

## PURGANS PITUITAM.

in capite.

℞. Agarici optimi ℥ 3.

zingiberis

salis gemmæ ana ℥ 5.

Macerentur per horas 12. in

Aquis saluicę

betonicę ana ℥ 1. s.

Exprimantur, & fiat potio, cui addes syrups de stæchadæ ℥ 1.

III.

III.

PURGANS MELANCHOLIAM.

R. Fol. senæ ꝑ 6.  
Zingiberis ꝑ 2.

Macerentur in decocti florū & fructuum ꝑ 4.  
diu noctuq; postea fortiter exprimantur adda-  
turque syrupi de sumo terræ ꝑ 1.

IV.

PURGANS BILEM, ET  
Pituitam.

R. rhabarbari electi ꝑ 5.  
Agarici optimi ꝑ 1. s.  
Spicæ indicæ ꝑ 1.  
salis gemmæ ꝑ 1.

Concidantur singula minutatim, & maceren-  
tur in aquis stillatitiis, endiuicę, & borraginis a-  
pa ꝑ 1. s. Durent in his horis duodecim, deinde  
in oleo mundo exprimantur validè, & colètur,  
fiatque potio, cui addatur syrupi ros. lax. ꝑ 1.

*De potionibus purgantibus in substā-  
tia sumptis, Cap. 18.*

**P**orro circa medicina solutivas, quę in po-  
tionib; sumuntur, quatuor observaanda ve-  
niunt. Primū est, vt iuxta omnium ferè Medi-  
corum sententiam, in qualibet medicina solu-  
tiua, aliquid miscendum curemus quod cor eor-  
fortiare:

fortare possit. Alterum est, quod medicina solutiua proprietatem habere debeat cum illo membro, quod euacuandum est: vt si caput sit purgandum, addenda aqua betonicæ vel saluiz est, vel flores stæchados, uel id genus alia. Tertium, q̄ inter soluentes medicinas, quædam leniendo, quædam attrahendo, vt in sequentibus duobus capitibus videre licet, educant. Quartū quod in medicinæ compositione semper addendum sit suum lenitiuum. Quoniam uolentia solutorum virtutes ad securitatem perducit. Dosis uerò lenitui est à  $\frac{2}{3}$  3. vsque ad  $\frac{2}{3}$  5. vel 6. solutorum autem à  $\frac{2}{3}$  2. vsque ad  $\frac{2}{3}$  3. s. vt in sequentibus formulis patebit.

I.

℞. Diacatholiconis  $\frac{2}{3}$ .  
electuarij de suc. ros.  $\frac{2}{3}$  3 s.

Misce & cum decoctione florum & fructuum in aqua endiuiz facta, fiat potius, cui adde syrupi uiolacei  $\frac{2}{3}$  1.

Hic uides lenitui  $\frac{2}{3}$  5. solutiui uerò  $\frac{2}{3}$  3 s. & dirigitur uirtus eius ad hepar, & cor confortat mediante decoctione facta in aquis proprijs.

II.

℞. Mannæ electæ, uel cassiæ  $\frac{2}{3}$  6  
elect. de succo ros.  $\frac{2}{3}$  3 s.

Cum decoctione florum & fructuum fiat potius, cui adde syrupi ros. lax.  $\frac{2}{3}$  1.

III. ℞.

## III.

R. Diacatholiconis  $\frac{3}{4}$  s.  
 Diaphœniconis  $\frac{3}{4}$  2  
 electuarij Indi  $\frac{3}{4}$  1 s.

Misce, & cum decoctione florum & fructuum  
 in aquis buglossæ, & fœniculi facta fiat pot o,  
 cui adde Mellis ros. col.  $\frac{3}{4}$  1

## IV.

R. Diasenz  $\frac{3}{4}$  s.  
 Consect. hamech  $\frac{3}{4}$  2.  
 Diasenz Nicolai  $\frac{3}{4}$  1 s.

Misce, & cum decoctione florum & fructuum  
 in aqua buglossæ, & scolopendriæ facta, fiat po-  
 tus, cui adde syrapi uiolacei  $\frac{3}{4}$  1.

## V.

R. Diacatholiconis  $\frac{3}{4}$  s.  
 Elect. de succo ros.  $\frac{3}{4}$  2  
 Diaphœniconis  $\frac{3}{4}$  1 s.

Misce, & cum aqua endiuie & borraginis a-  
 na  $\frac{3}{4}$  1 s fiat potio, cui adde syrapi ros. lax.  $\frac{3}{4}$  1.

## VI.

R. rhabarbari electi  $\frac{3}{4}$  2  
 spicæ indice  $\frac{3}{4}$  1 s.

Puluerizentur subtiliter, quibus adde

Cassie

Elect. de succo ros.

Diaphœniconis an.  $\frac{3}{4}$  2

Cum



Cum decoctione florum fructuum fiat potio;  
cui adde syrupi violati lax  $\bar{z}$  1.

---

*De Medicinis lenientibus,*

*Cap. 19.*

**Q**Uæ leniendo humores educunt, alunt, leuiter mouent, atq; sine tumultu exonerant quæ sunt Diaprunis lenitiua, Diacatholicû, Diasena, compositio é Manna, é Cassia, & similia; quorum dosis à  $\bar{z}$  5. vsque ad  $\bar{z}$  1. Exhibetur autem vel in forma boli, vel cum decoctione aliqua, vel aquis destilatis, additis solutiuis (vt antea diximus) tempore matutino, &c.

---

*De medicamentis soluentibus,*

*Cap. 20.*

**Q**Uæ attrahendo purgant medicamenta, cathartica & solutiua nūcupantur. Hæc valente purgant. Proinde absque lenitiuo aliquo addito, sumi non debent. Quomodo autem, & qua dosi commisceantur, supra capite 18. abun- da ostendimus. Sunt autem medicamenta solutiua, præsertim bilem purgantia, quibus serè ho- die vtuntur practicanes,

Electuarium de succo rosarum

Electuarium succi ros. Mesuz.

Electu-

Electuarium de Pſyllio.

Diaprunis ſolutiua.

Diarob cum rhabbaro; &amp;c.

CATHARTICA PHLEGMA  
purgantia.

Diaphœnicum.

Electuarium Indum.

Electuarium Eleſcoph.

Diarob cum turbith.

CATHARTICA BILEM ATRAM  
purgantia.

Confecio Hamecli.

Diaſena Nicolai, &amp;c.

*De potionibus purgantibus partim  
ab infuſis, partim à ſubſtantia  
factis, Cap. 21.*

**N**on rarò etiam utuntur Medici cõmuniter  
practicantes, potionibus, quibus partim in  
funduntur medicamenta purgantia, partim to-  
ta ſubſtantia ponũtur, & ita bibuntur: vt ſequẽ-  
tibus formulis perſpicuè uidere licebit.

℞. Rhabbari electi  $\frac{z}{2}$ .Spicæ indicæ  $\frac{z}{s}$ .

Incidantor minutim, terantur, & infun-  
dantur per horas ſeptem in ſufficiente quan-  
titate

R

titate

titate vini odoriferi, tempore hyemali, in aqua  
endiuiæ estate: deinde fiat expressio fortis, cui  
adde, vel in ea dissolue

Cassie recent. extractæ, vel Man.  $\frac{3}{4}$  s.

Electuarium de succo rosarum  $\frac{3}{4}$  s.

Electuarium psyllij  $\frac{3}{4}$  r.

Misce, & cum decoctione florum & fru-  
ctuum in aqua buglossæ, & endiuiæ facta, fiat po-  
tio, cui adde syrupi ros. lax.  $\frac{3}{4}$  r.

III.

R. Myrobalanorum citrinorum  $\frac{3}{4}$  s.

Spicæ indicæ

Sem anisi ana  $\frac{3}{4}$  s.

Trita in decoctionis passularum  $\frac{3}{4}$  s. per diē  
integrum macerentur: deinde fortiter exprimantur,  
addaturq; Elect. de succo rosarum

Diaprunis solutiæ ana  $\frac{3}{4}$  s.

Mannæ  $\frac{3}{4}$  s.

Syrupi violati  $\frac{3}{4}$  r.

III.

R. Turpeti  $\frac{3}{4}$  s.

Zingiberis  $\frac{3}{4}$  r.

Trita macerentur horis duodecim in vini o-  
dora:  $\frac{3}{4}$  s. deinde exprimantur, addaturq;

Elect. Ind.  $\frac{3}{4}$  s.

Mellis ros. col.  $\frac{3}{4}$  r.

IV.

## I V.

℞. Agarici electi  $\frac{2}{3}$  2.  
 Zingiberis  $\text{ᶒ}$  1.  
 Salis gemmæ  $\text{ᶒ}$  3.  
 Trita macerentur horis duodecim in  
 Vini odoriferi  $\frac{2}{3}$  1.  
 Aquæ fœniculi  $\frac{2}{3}$  2.  
 Exprimantur, addanturq̄;  
 Elect. Ind.  $\frac{2}{3}$  3.  
 Oxymellis scillitici  $\frac{2}{3}$  1.

Misce, & fiat potio.

## V.

℞. Rhabarbari electi  $\frac{2}{3}$  2.  
 Agarici trochiscati  $\frac{2}{3}$  1.  
 Spicæ indicæ  $\text{ᶒ}$  1.  
 Zingiberis  $\text{ᶒ}$  3.  
 Concisa, macerentur horis octo in  
 Aqua endiuicæ  $\frac{2}{3}$  2.  
 Fœniculi  $\frac{2}{3}$  1.  
 Vini optimi  $\frac{2}{3}$  1.  
 Exprimantur probe, addanturq̄;  
 Mannæ electæ  $\frac{2}{3}$  6.  
 Electuarium de succo ros.  $\frac{2}{3}$  1. s.  
 Diaphœniconis  $\frac{2}{3}$  2.  
 Syrupi ros. lax.  $\frac{2}{3}$  1.  
 Misce, & fiat potus.

## VI.

℞. Fol. senz  $\frac{2}{3}$  3.

R 2 Rha-

Rhabarbari electi  $\frac{3}{2}$ .Agarici optimi  $\frac{3}{1}$ .Spicę Indicę  $\frac{3}{1}$ .Zingiberis  $\frac{3}{s}$ .

Concidantur singula minutatim, & macerentur in decoctionis passularum  $\frac{3}{4}$ . per horas duodecim, deinde exprimantur probe, addatur que rhabarbari albi, siue rad. mechoacę  $\frac{3}{s}$ . syrupi ros. lax.  $\frac{3}{1}$ .

---

*De bolo purgatorio, Cap. 22.*

**B**olus est frustulum medicamentorum purgantium, esui aptum, quantum scilicet bucca commodè capere potest. Formatur autem ex lenitius, & solutiuis interdum ex simplicibus tantum medicamentis, cum suis correctiuis, atque syrupo, vel alio quodam liquore excipiuntur, & in formam boli digeruntur, vt formulis sequentibus patebit. Porro qualitas purgantium medicamentorum ab humore peccante desumenda erit. Quãtitas verò augeri minuiq; poterit iuxta egrorantis vires, & medicinę, q̄ exhibetur: ita tamen, vt unciam unam nunquam excedat. Nam uniuersa, una vice deuoranda erit. Quarum verò partium proprietatem medicamentorum habere debeant, ipse locus affectus commodè demonstrabit. Tempus autem assumendi matutinum est.

## I.

R: Cassiæ recenter extractæ  $\frac{3}{4}$  6.  
 Electuarij de succo rosatum  $\frac{3}{4}$  3.  
 Misce, & cum saccharo fiat bolus, au-  
 ro coopertus.

## II.

R. Cassiæ nouiter tractæ  $\frac{3}{4}$  1.  
 Diagridij gr. 3.  
 Misce & cum saccharo fiat bolus .

## III.

R. Diaprunis lenit. uel Diacat  $\frac{3}{4}$  5.  
 Diaphœniconis  $\frac{3}{4}$  3.  
 Misce & cum saccharo fiat bolus .

## IV.

R. Turpeti  $\frac{3}{4}$  1.  
 Zingiberis  
 Mastice ana  $\frac{3}{4}$  s.  
 Cum melle rosaceo quantum suffi-  
 cit, fingatur bolus.

## V.

R. Conseruæ violarum  $\frac{3}{4}$  s.  
 Pul. rad. mechoacæ  $\frac{3}{4}$  1.  
 Cum syrupo ros. lax. formetur bolus

## VI.

R. Rhabar. albi, siue rad. mech.  $\frac{3}{4}$  2.  
 Fol. senz tritorum  $\frac{3}{4}$  1.  
 Zingiberis  $\frac{3}{4}$  s.  
 Cum syrupo uiolaceo fiat bolus.

PRACT. GENERALIS  
VII.

℞. Cassiæ recenter extractæ ℥ 6.  
Confectionis Hamech ℥ 2.

Misce, & cum saccharo fingatur queeta  
auro cooperta.

VIII.

℞. Conseruæ ros. ℥ s.

Florum Antimonij gr. 3. uel 5.

Misce, & cum saccharo fingatur buccel  
lus, auro vel saccharo aspersus.

*De pilulis, siue catapotijs,*

*Cap. 23.*

**P**illula Græcis Catapotia à parvæ pilæ figura  
medicamentum est, quod deglutiendo sumi  
tur, ad fallendam medicamenti insuauitatem  
inuentum. Porrò rarò vnius generis catapotijs  
vtimur, sed variis, potissimum autem tribus in-  
ter se commixtis, additis, quæ uehementiam il-  
lorum augere queant, ut est diagridiû, agaricus  
trochis. aius, & eius generis alia, cum syrupo a  
liquo uel aqua stillatitia in catapotiorû formâ  
coactis, ut in sequentibus formulis patebit. Quos  
verò & quales humores educere debeant, ipsa  
morbi causa indicabit. Ad eundem quoq; modû  
quibus cum partibus correspondere oporteat,  
ipse locus affectus demonstrabit. Modus cæmen  
exti-

exhibitionis cōmuniter drachma una est plus minusue, iuxta materiam simplicem, ex quibus conficiuntur, & virtutem ægroti, itemq; magnitudinem morbi. Fiant autem pilulæ 5. vel plures, vel pauciores pro Medici iudicio. Quæ maior forma paratur pilulæ, vt sunt capitales, tribus aut quatuor horis à leuiori cœna, vel media nocte, vel post primum somnum assumuntur. Miores & leues, ut pestilenciales, & alephangi ne hora una, vel duabus ante cibum commodè exhiberi possunt. Mediocres verò matutinis horis in vsum veniunt: Quoniam aum te non maffiatq; deuorandæ sunt, ob ingratum saporem, tectorio aliquo indigent. Quæ in re saccharo, aut cinnamomi puluere, aut auri foliis vtimur. Ponorum coctorum pulpa inuolui tutò possût vt & pane azymo vino molliter persuso.

*De pilulis purgantibus bilem  
flauam, Cap. 24.*

**P**ilulæ purgantes bilem flauam à

C A P I T U M.

Pilulæ aureæ, Mes.

Sine quibus, Nic.

Arabica.

Assaieret

Lucis, &c.

R 4

Exem-



R. Pilularum Aurearum  
Arabicarum  
Sine quib. esse nolo an.  $\text{ʒ} \text{ i.}$   
Cum syrupo rosarum lax. fiant pilulæ N. 7.  
auro coopertæ.

A B H E P A T E.  
Pilulæ de rhabarbaro.  
Exempli gratia.

R. Pilularum de rhabarbaro  $\text{ʒ} \text{ 2.}$   
Aggregatiuarum  $\text{ʒ} \text{ i.}$   
Diagridij gr. 3.  
Cum syrupo de endiuia fiant pilulæ N. 5  
auro obductæ.

---

*De pilulis purgantibus pituitam,*  
*Cap. 25.*

**P**ilulæ pituitam purgantes, à  
C A P I T E.

Pilulæ Cochiz.  
Hieræ cum agarico.  
De Colocynthidæ.  
Alhandal.  
Ex sex rebus. De octo rebus.  
Exempli gratia.

R. Pil. Cochiarum  $\text{ʒ} \text{ 2.}$   
Hieræ cum agarico  $\text{ʒ} \text{ 4.}$

Cum

Cum syrupo de betonica fiant pil. N. 5.  
 Puluere cinnamomi asperse.

## A P E C T O R E,

Pilulæ de agarico.

Hieræ cum agarico.

Bechicæ; &c.

## A S T O M A C H O,

Pilulæ Alephanging.

Stomachicæ.

Mastichinæ.

Ex turbith.

Pestilentiales.

I.

R. Pilularum alephanginarum,  
 Aggregatiuarum.

De Hiera S. ana  $\mathfrak{z}$  1.

Aloes optimæ  $\mathfrak{z}$  5.

Cum aqua fœniculi fingantur pil. N. 13.

I I.

R. Pilul. de agarico

Stomachicarum ana  $\mathfrak{z}$  5.

Agarici trochiscati  $\mathfrak{z}$  5.

Diagridij gr. 2.

Cum aqua absynthij fiant pilulæ n. 9.

## A I V N C T R I S.

Pilulæ de Hermodactylis.

Arthriticæ

Fœtidæ

R 5 De saga-

De Sagapeno.  
De Sarcocolla.  
Benedictæ  
De nitro, &c.

*De pilulis melancholiam purgantibus, Cap. 26.*

**P**ilulæ atram bilem purgantes, ab hepate & liene,

Pilulæ Indæ

Ex fumoterræ  
De lapide Armeno.  
De lapide laxuli, &c.

Exempla.

I.

**R.** Pilul. de fumoterræ  
Indarum ana ꝑ 1 s.  
Cum syrupo de epithimo, formentur pilulæ N. 9. auro obductæ.

II.

**R.** Pil. de lapide armeno ꝑ 2.  
De fumoterræ ꝑ 1.  
Diagridij gr. 3.  
Cum syrupo de fumoterræ fiant pilulæ N. 7. auro coopertæ.

De

*De clysteribus, Cap. 27.*

**C**lyster vel clysteriū, à Græco uerbo *αλυσσειν* quod est abluere: quibusdam enim uoca tur, ab *κλύμι*, quod illis in iocō significat. Cōponuntur autem ex iusculo, vel decocto, medicamentis purgantibus, oleis, & sale. Interdum etiā mel, aut saccharū, aut vitelli ouorum, aut butyrum, aliāq; eius generis adijciuntur. Decoctū autē iuxta morbi diuersitatem variari solet. Nunc enim ex his, quæ abstergendi, aut obstru- siones liberandi, aut astringendi, aut glutinan- di facultatem obtinent, paratur Medicamentorum purgatiuum vis à morbi causa, siue ipso hu more peccante, probè desumitur. Sunt autem, vel simplicia, vel cōposita. Prioris generis sunt turbitis, colocynthis, agaricus, sal gemmæ, &c. Cōposita sunt, Diaphœnicum, Hiera picra, hie- ra logodium, electuarium eleusoph; electuariū de baccis lauri, Benedicta laxatiua, Elect. In- dum, &c. Porro decocti vel iuris dosis cōmunis est libra magna ex parte una plus minusue pro corporis magnitudine, ventris plenitudine, mor- bi natura, & ætatis ratione. Oleorū uerò ʒ 3. Pin- guedinū, mellis, butyri, sacchari ab ʒ s. vsq; ad ʒ 1. Medic. purgantiū, & quidē simpliciū à drac- hmis duab. ad ʒ 3. cōpositorū autē ad ʒ 1. vel ʒ 1. s. plus minusue pro uirtū tōne, & morbi uhe- mentia.

hementia. In febribus enim, & debilibus, senibus, conualescentibus & intestinorum mordeationibus, minorem dosim præscribimus: è cõtrà in apoplecticis: lethargicis, coxendicũ doloribus, & in ijs, qui exitiale venenũ hauserunt, maiorem dosim imperamus. Vitelli ouorũ maxima ex parte, duo aut tres. Sali communis à ʒ i. usq; ad ʒ. plus minusue prout facultatem excretricem profiteri necesse est. Cæterũ in mortario omnia diligenter permiscẽda sunt, & si quid crassi, aut terreni in fundo resederit, abijciendũ: reliquum autem moderatè calidũ per vesicam uel syringã duab<sup>9</sup>, vel tribus horis ante cibũ injiciendum. Detinẽdi uerò tẽpus non vnum idemq; est: sed pro eorũ diuersitate variatur. Quibus enim abluendi & extergendi vis inest, hi supra horæ dimidiũ in corpore haud retineãtur. Dolores mitigantes longiori tẽpore detineri debent. Omnium longissimo, quibus glutinandi est facultas. Quibus purgandi vis in est sua sponte erumpere solent. Quod si tamen diutius in corpore cunãtur, glandem supponere conuenit, vt facultas expultrix excitetur noxiaque tandem expellantur.

## De clysteribus alterantibus,

## Cap. 28.

Clyster leniens

R. Maluz. Bismaluz  
 Parietariz. Atriplicis ana M. ʒ.  
 Sem. lini. Fœnigræci ana P. ʒ.

Decoquantur in sufficienti quantitate aque  
 ad consumptionem tertiæ partis, fiat colatura,  
 de qua accipe lib. ʒ. cui adde

Sacchari rubri ʒ ʒ.  
 Olei communis ʒ ʒ.  
 Salis ʒ ʒ.

Misce & fiat clyster.  
 I I.

R. Maluz  
 Althez  
 Violariz  
 Mercurialis  
 Hordei ana M s.

Fiat decoctio in sufficienti quantitate aqua  
 ad consumptionem tertiæ partis, fiat colatura,  
 de qua accipe lib. ʒ. cui adde

Cassiz recent. extractæ  
 Saccha. rub. añ. ʒ ʒ. s. Olei violacei ʒ ʒ  
 Misce & fiat clyster.

I I I.

R. Iusculi caponis lib. ʒ.

Vitel.

## PRACT. GENERALIS

Vitell.ouorum N.2.

Mellis ros.col.  $\bar{z}$  1. Olei cōis  $\bar{z}$  3.

Commisceantur singula, fiatq; clyst.

I V.

℞ Decocti hordei lib. 1.

Vitell.ouorum N.2.

Sacchari rubri  $\bar{z}$  1.Mellis ros.  $\bar{z}$  1.Olei communis  $\bar{z}$  3.

Commistis omnibus fiat enema.

E M O L L I E N S E T L E-

niens, in colica.

V.

℞. Olei communis  $\bar{z}$  5.

Anethi

Chamomelini ana  $\bar{z}$  2. s.

Misce &amp; fiat clyster.

L A V A T I V V S.

VI.

℞. Betæ

Brassicæ

Althææ ana M. 1. s.

Hordei M. 1.

Decoquantur in aqua vel leui lixiuio ad tertiz partis consumptionem, fiat colatura, de qua accipe lib. 1. cui adde

Vitell.ouorum N. 1.

Mellis ros.col.  $\bar{z}$  1.

Salis

Salis  $\frac{2}{3}$ .

Misce &amp; fiat clyster.

## A S T R I N G E N S, I N

Dysenteria.

VII.

℞. Rosarum rubrarum

Balauſij

Hordei torrefacti

Baccarum myrthi ana M. s.

Contundenda bulliant in ſufficienti quantitate aqua cum capite caſtrati, donec caput ſit coctū, fiatq; colatura, de qua accipe lib. i. adde

Boli armeni

Sanguinis draconis ana  $\mathfrak{z}$  i.

Olei roſati

Omphacini ana  $\mathfrak{z}$  i. s.Pinguetinis capi  $\mathfrak{z}$  i.Vitell. ouorum  $\mathfrak{z}$  i. s. N. i.

Misce &amp; fiat clyster.

## G L V T I N A N S.

VIII.

℞. Plantaginis

Poligoni

Conſolidæ mediæ

Saniculæ

Rosarum ana M. r.

Rad. conſolidæ maioris  $\mathfrak{z}$  i.Balauſiarum  $\mathfrak{z}$  i.

Coquan.



Coquantur ad tertias, fiatque colatura, de  
qua accipe  $\bar{z}$  14. quibus adde

Succi plantaginis  $\bar{z}$  1.

Sanguinis draconis  $\bar{z}$  2.

Seui caprini  $\bar{z}$  1.

Olei myrthini

Rosacei

Cotoneorum ana  $\bar{z}$  1.

Commistis omnibus, fiat clyster.

D O L O R E M S E D A N S .  
I X.

R. Anethi

Violarie

Flor. chamomille ana M. 1.

Sem. lini

Fœnigræci ana M s.

Fiat decoctio, de qua accipe lib. 1. cui adde

Vitell ouor. N. 1.

Olei anethini  $\bar{z}$  3.

salis  $\bar{z}$  1. s.

Misce & fiat clyster.

X.

R. Olei anethini

Chamomelini ana  $\bar{z}$  5.

Mal aureorum  $\bar{z}$  2.

Misce & fiat clyster.

*De clysteribus purgantibus,**Cap. 29.*

## BILEM FLAVAM. I.

℞. Hordei

Violariæ

Mercurialis ana M. ʒ. i.

Fiat decoctio, de colatura accipe ʒ. 12. quibus  
adde,

Diacatholiconis ʒ. i.

Electuar. de succo ros. ʒ. 6.

Olei violati ʒ. 3.

Salis ʒ. s.

Misce, &amp; fiat clyster.

## PITUITAM. II.

℞. Origani

Chamomillæ

Meliloti

Fœnigræci ana M. ʒ. i.

Coquantur in aqua vsq; ad consumptionem  
tertię partis. De colatura accipe lib. ʒ. i. cui adde

Diaphœniconis

Electuar. Indi maioris

Benedictæ laxatiuæ

Hieræ picræ S. ana ʒ. s.

Olei chamomelini ʒ. i.

Rutacei ʒ. 2.

Salis ʒ. 3.

Misce, &amp; fiat clyster.

S

PRACT. GENERALIS  
III.

R. Betonice. saluic  
Maiorana.  
Serpilli  
Hyssopi. Rutæ  
Flor. stœchadis ana M. s.  
Colocynthidis  $\frac{3}{4}$  r.  
Agarici optimi  $\frac{3}{4}$  3.

Coquantur ad tertias. De colatura accipe  $\frac{3}{4}$   
ss. de quibus adde

Benedictę laxat.  
Hieræ pieræ ana  $\frac{3}{4}$  s.  
Diaphœniconis  
Electuar. indi ana  $\frac{3}{4}$  2. s.  
Mellis ros. col.  $\frac{3}{4}$  r.  
Olei laurini  
Rutati ana  $\frac{3}{4}$  1. s.  
salis communis  $\frac{3}{4}$  2.

Commistis omnibus fiat clyster.

IN MATERIA FRIGIDA,  
& vehementi auctoq; dolore.

IV.

R. Centaurij minoris  
Saluic  
Abrotani  
Calamenti ana M. s.  
Origani.

Marrubij

Sthœchadis ana P. ʒ.

Anisi. Sem. basiliconis ana ʒ ʒ.

Pulpæ colocynthidis ʒ ʒ.

Fururis M. ʒ.

Mellis anacardini ʒ ʒ.

Olei castorei ʒ ʒ.

Salis gemmæ ʒ ʒ.

Hieræ picræ

Hellebori albi ana ʒ 6.

Bulliant omnia in suff. quantitate aquæ, excepta Hieræ, ad consumptionem medietatis, fiat colatura, de qua accipe lib. ʒ. cui adde Hieram supradictam, & tepidè infundatur. Est enim efficax: propterea ultimum. Soluit materiam phlegmaticam. Idcirco paralyfi, & apoplexiæ prodest.

## M E L A N C H O L I A M.

V.

℞. Violarum

Malux. Altheæ

Meliloti ana M. ʒ.

Fiat decoctio, de qua accipe lib. ʒ. cui adde

Vitell. ouor. N. ʒ.

Diacatholiconis

Consect. Hamech. ana ʒ ʒ.

Olei communis ʒ ʒ.

S 2

Salis

Salis  $\frac{3}{2}$  1.

Misce, &amp; fiat clyster.

## VENTOSITATES

resoluens. VI.

℞. Decocti carminantis lib. 1. cui adde

Benedictæ lax.

Sacchari rubri ana  $\frac{3}{2}$  1.Mellis rosat. col.  $\frac{3}{2}$  2.Butyri recentis  $\frac{3}{2}$  3. vel

Pinguedinis Gallinæ

Anseris

Anatis ana  $\frac{3}{2}$  1.Olei rutacei  $\frac{3}{2}$  3.Salis  $\frac{3}{2}$  3.

Misce, &amp; fiat clyster.

## CLYSTER PRO OMNI

infirmate. VII.

℞. Iuris carniū vel

Decocti maluz, violarię, & hor-  
dei lib. 1.Sacchari rubri  $\frac{3}{2}$  1. s.

Vitell. ouorum N. 1.

Olei uiolati  $\frac{3}{2}$  3.Salis  $\frac{3}{2}$  3.

Misce, &amp; fiat enema.

*De suppositorijs, siue glandibus,*  
*Cap. 30.*

**G**Lans, siue βαλανος Græcis, Barbaris à subijciendo, suppositorum: glandium figura conformatum medicamentum, quo aliquando utimur in his, quorum alius ob stercus arrius non purgatur, ad educenda; quæ per clysterem iniecta non redduntur: vel in quibus vires languent, ob id clysteris iniectiorem non tolerant, sedi insita, ut altius impellantur; molliant, extrahant, erodant, & pruriendi vi, non modo cessantia sollicitent excrementa, verum etiam mucosum humorem vehementius extrahant, flatus dissipent, dolores sedent, stupefaciant. Sunt autem quædam leues, quales sunt, quæ ex betæ radice, melle puncta, suillo adipe; sale consperso, ficu inuersa, & butyro adiecto sale, & id genus alijs parantur. Quædam verò mediocres, ut sunt, quæ est vitello oui, addito sale, componuntur. Item quæ est sale & melle duntaxat construuntur. Nonnullæ sunt vehementiores, quales sunt, quæ scammonium, colocynthidem, euphorbium, iisque similia accipiunt. Cum autem omnis ferè generis glandibus vel accedat, sciendum erit, illud sic esse commiscendum ut pondere suo speciebus respondeat. Quare

danda opera, ut drachmæ vni specierum & salis vncia una mellis addatur. Neque dum componuntur glandes, sunt ad mouendam speciem, nisi postquam mel satis concretum fuerit, quod alias vis illarum ignis vehementia dissipetur. Mel autem lento igne in exiguo cacabo ad spissitudinem usque incoquitur: mox in asserem coniectum, in glâdes indicis, aut digiti modo longas, crassasque formatur. Dum autem glandes subiiciuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguedine illitas esse oportet: sic enim minori molestia induntur. Induntur autem ante cibum vna vel duabus horis. Porro species, quas glandium compositiones accipiunt, aut aluum deijciunt, aut flatu discutiunt, aut stupefaciunt, ut ex formulis sequentibus perspicue patebit.

## I.

℞. Mellis cocti, & concreti  $\bar{z}$  2.

Pul. euphorbij  $\bar{z}$  s:

Colocynthidis gr. 4.

Hellebori albi gr. 2.

Salis  $\bar{z}$  1.

Misceantur singula, & formentur glandes.

## II.

℞. Mellis  $\bar{z}$  1.

Spec. hieræ pieræ  $\bar{z}$  1.

Salis gemmæ  $\bar{z}$  s.

Decoquantur mel, donec crassitudinē iustam accipiat.

accipiat: deinde addantur species, & sal, formenturque glandes.

## III.

R. Semen. anisi  
 Cumini  
 Fœniculi ana  $\text{ʒ}$  ʒ.  
 Carei  $\text{ʒ}$  2.  
 Colocynthidis  $\text{ʒ}$  1.  
 Salis communis  $\text{ʒ}$  1:

Poluerizentur singula, & cum mellis concreti  $\text{ʒ}$  1 s. coeant, digeranturque in glandes.

## IV.

R. Opij  $\text{ʒ}$  1.  
 Croci. Castorei ana  $\text{ʒ}$  s.

Tusa & cribrata cum melle cocto aut cera, & oleo nymphæ in unum coeant, formenturque glandes, quibus filum appensum est.

## De pessis, Cap. 31.

**P**essus Barbaris pessarium, pro vterino clysteri quibusdã vsurpari consuevit. Horum tres sunt differentia. Alij siquidẽ emolliunt, alij astringũt, alij aperiũt. Emolliẽtes ex cera, oleis, pinguedinibus anseris, aut gallinæ, butyro salis experte, resina, medulla ceruina, fœnogræco & similibus fiunt, fiunt autem ad crassitudinem instar strigmenti, & paulò spissiolem, deinde



linamento tortili similis duplicata, in medicamento tineta, ori vulvae condenda sic est, ut si lum praelongum alligatum habeat, quod facile possint extrahi, quando visum fuerit: nunc linteo, sericoue tenuissimo obducta, ad digiti formam confuta, genitalibus mulierum partibus induntur. Aperientes verò parantur ex melle, artemisia, dictamno, brassica, glycyrriza, succo ruta, porro, scammonio, & id genus aliis. Astringentes componuntur ex bolo armeno, sanguine draconis, succo plantaginis, bursa pastoris, stercore porcino, &c. Hac autem ratione componuntur, ut ad ceræ, aut mellis cocti unciam unam etiam medicamento morbo accommodari altera misceatur. Subijciuntur autem vesperi, & dum somni tempus appetit, & sex, aut septem horis in utero relinquuntur, ac subinde extrahuntur. Porro emollientes uteri inflammationibus, exulcerationibus, auersionibus, & inflationibus accommodantur. Aperientibus verò utimur, cum suppressos menses euocare, aut uterum coniuentem, aut compressum emendare conamur. Adstringentes contearium aperientibus usum præbent. Nam fluxum muliebrem cohibent, & apertum, laxumue vterum contrahunt, prolapsumque reprimunt, atque propulsant.

PES-

## PESSVS EMOLIENS. I.

- ℞. Butyri falis experti  $\frac{2}{3}$  3.  
 Medullę ceruinę  
 Adipis anseris  
 Gallinę ana  $\frac{2}{3}$  1. s.  
 Mastice. Meliloti ana  $\frac{2}{3}$  1.  
 Semen. lini  
 Fœnigręci ana  $\frac{2}{3}$  1. s.  
 Ouorum vitella N. 3.  
 Olei rosacei  
 Irini ana  $\frac{2}{3}$  s.

Cerę q̄ sufficit ad crassitudinem iustam inducendam: deinde lana duplicata in hoc medicamento intincta, vtero subiiciatur.

PESSVS APERIENS  
 mensesq; prouocans. II.

- ℞. Pul. pil. scordarum  $\frac{2}{3}$  6.  
 Succi mercurialis, quantum sufficit, fiat  
 pessus, & linteolo illigatus, vtero interatur.  
 III.

- ℞. Artemis. Abrotani  
 Dictamni ana  $\frac{2}{3}$  1.  
 Rad. acori  
 Rubię tinct. ana  $\frac{2}{3}$  6.  
 Nigellę  $\frac{2}{3}$  1.  
 Baccarum lauri  $\frac{2}{3}$  s.  
 Rutę  $\frac{2}{3}$  1. Sabinę  $\frac{2}{3}$  s.  
 Castorei gr. 5.

S 5 Myr-

Myrrha. Stactis ana  $\bar{z}$  s.Sagapeni  $\bar{z}$  2.

Tufis, & cribatis ijs, quæ opus est, mellis quantum satis est, vt in coalirum crassiolem, & vnitatem coeant, adijciatur & ubi opus est fingantur pelli, qui in vuluam indantur.

## PESVS ASTRINGENS.

## I V.

R. Cornu ceruini vsti  $\bar{z}$  1.Thuris  $\bar{z}$  2. Gallarum  $\bar{z}$  1.

Balauftiorum

Ros. rub. ana  $\bar{z}$  2.

Gummi. Acaciæ

Hypocystidis ana  $\bar{z}$  1.Boli armeni  $\bar{z}$  s. gr. 5.

Succi plantaginis quatum sufficit ad excipiendum & linteolis deligata fingantur pelli.

## METENCHITA. I.

R. Succi vel decocti arthemisia  $\bar{z}$  3.

Olei liliorum

Ex sem. lini. Laurini ana  $\bar{z}$  1.Myrrhæ  $\bar{z}$  1. s.sagapeni. Castorei ana  $\bar{z}$  1.

Commistis omnibus fiat clyster.

## II.

R. Succi plantaginis  $\bar{z}$  4.

Olei myrtini

Mastichini ana  $\bar{z}$  r.

Succini. Thuris

Boli armeni ana  $\bar{z}$  r.

Trochiscorum e spodio

E terra lemnia ana  $\bar{z}$  r.

Terenda terantur, &amp; commisceantur, fiatque merenchyta.

*De Errhinis, Cap. 32.*

**E**Rrhina, idest per nares purgantia, vulgò nasalia appellantur. naribus indùtur, in pyramidis figuram, pulueribus, melle, adipè, aut cera compactis, vt in sequentibus formulis patebit. Filo alligari solent, vt commodius eliciantur. Vfus est in diurnis capitis affectibus, morbo comitiali, oculorum hebetudinibus, narium obstructionibus, odoratus difficultate, &c. Vt mur autem ijs, corpore prius euacuato.

℞. Nigellæ

Nucis moschatæ

Cubearum

Caryophyllorum ana  $\bar{z}$  s.

Piperis albi

Pyrethri ana  $\bar{z}$  2.

Maioranæ. Cyclamini

Saluię ana  $\bar{z}$  r.Yusa & puluerata terebinthina, & modica  
ccra

cera excipe, & in formam pyramidalem effin-  
ge, filo alligatum naribus inde, valentius fit ad-  
dendo Hel lebori albi  $\frac{3}{4}$  1.

*De caput purgys, Cap. 33.*

**C**Apud purgia sunt, quæ naribus liquida in-  
funduntur, & attrahuntur, capite ad poste-  
riora propenso, post ingentem insufflationem, cum  
spiritu ipso, ne statim deorsum ruat, aliquantu-  
lum continetur, ore prius aqua oppleto: ne sci-  
licet è naribus, per internum meatum ad os cor-  
ruet. E succis herbarum, betæ scilicet, brassicæ,  
cyclamini, maioranæ, foliorum enulæ, liquoribusque  
ijs similibus, oleis, & speciebus medicamentorum  
præcedenti capite commemoratorum, nempe piperis,  
pyrethri, nitri, nigellæ, castorei, hellebori albi,  
& horum similium componuntur. Sufficit autem una  
vice semiunciam succorum infudisse. Vfus idem ut  
errhinorum.

I.

R. Succu betæ  $\frac{3}{4}$  2.

Aquæ maioranæ  $\frac{3}{4}$  4.

Pul sacchari  $\frac{3}{4}$  s. vel

Mellis rosa. col.  $\frac{3}{4}$  s.

Misce, & tepidum per nâres attrahet.

I I.

R. Succu betæ

Bras-

Brassicę. Cyclamini ana  $\bar{z}$  1. s.  
Cōmiscantur, naribusq; infundantur.

## III.

R. Scuci betę  $\bar{z}$  1. s.

Cucumeris syluestris  $\bar{z}$  3.

Aquę maioranę  $\bar{z}$  2.

Cuberbarum. nigellę

Piperis albi ana  $\bar{z}$  1.

Terenda terantur, cōmiscantur, & naribus  
infundantur.

## IV.

R. Rad. cucumeris syluestris  $\bar{z}$  1.

Nigellę. Piperis albi

Myrrhę ana  $\bar{z}$  2.

Tritis & contusis addatur olei de piperibus,  
quod satis est, & naribus illinatur.

*De Sternutamentis, Cap. 34.*

**S**ternutamenta sunt, quę sicca naribus indi-  
ta, aut calamo inspirata sternutamēta ciūt,  
atque aded puitam, ne mucum à cerebro eli-  
ciunt. Confiuntur ex pipere, pyrethro, helle-  
boro albo, castoreo, nigella, maiorana, & id ge-  
nus alijs, vt formulis sequentibus patebit. Ad-  
monendi sunt qui sumūt, vt sursum rapiant. V-  
sus idem vt errhinorum: I.

R. Nigellę. Maioranę

Caryophyllorum ana  $\bar{z}$  2.

Zin-

286 PRACT. GENERALIS  
Zingiberis. Piperis albi.  
Struthij ana ꝑ i. Castorei ꝑ s.  
Tritis & commistis fiat sternutamentum.

II.

R. Cubebarum  
Nucis Moschatæ  
Rad. iridis ana ꝑ s. Pyrethri ꝑ i  
Hellebori albi ꝑ s.  
Piperis albi. Acori ana ꝑ i.  
Tritis vitior.

---

*De apophlegmatismis, Cap. 35.*

**A** Pophlegmatismi, vulgò masticatoria, variij  
vsus medicamina, vel trita, in sacculū cō-  
iecta, dentibus premuntur, & per os diducun-  
tur: vel integra, uel contusa, succo aliquo exci-  
piuntur, & diu in ore retenta, vel masticata, sali-  
uam exciunt, noxiosque humores à capite,  
quod maximè expurgatum, in os deriuant. quo  
tunc deorsum nuere oportet, atque attractam  
materiam expuere. Fiunt ex syrupis, hyssopo, ori-  
gano, thymo, pulegio, mastiche, zingibere, pi-  
pere, pyrethro, radice acori, corticib. capparo-  
rum, vua passa, & id genus aliis. Utendum au-  
tem matutino tempore, corpore prius euacua-  
to. Post vsum illorum, aqua calida os abluen-  
dum erit, &c. Vsus idem vt errhimorum est.

I. R, Py-

## I.

R. Pyrethri. Cubebarum  
 Staphisagria ana  $\mathfrak{D}$  2.  
 Mastice. Piperis albi ana  $\mathfrak{z}$  5.  
 Passularum enucleatarum  $\mathfrak{z}$  2.  
 Contusis singulis, fiat sacculus mandu-  
 tilis, vel ex melle exceptis, fiant pastilli  
 mansiles. II.

R. Origani. Hyssopi ana  $\mathfrak{z}$  1.  
 Sinapi  $\mathfrak{z}$  2. Piperis albi  $\mathfrak{z}$  1. s.  
 Zingiberis  $\mathfrak{z}$  1. Mastice  $\mathfrak{z}$  1. s.  
 Trita excipiantur succo betæ, aut melle  
 & formentur mansiles pastilli:

## III.

R. Staphisagria  
 Cubebarum ana  $\mathfrak{z}$  1. s.  
 Maceris  $\mathfrak{z}$  1.  
 Cort. rad. capparidis  $\mathfrak{D}$  2.  
 Rad. acori  
 Nucis moschatæ ana  $\mathfrak{z}$  5.

Trita excipiantur mastiche, pistillo calido  
 adhibito, finganturque pastilli mansiles.

## De Gargarismis, Cap. 36.

Gargarisma liquidum est medicamentum, spi-  
 rituosè in fauoribus agitandum, at non deglu-  
 tiendum, in synanche potissimum, gulæ, & capitis  
 affecti-



affectibus vsitatum, ex liquoribus stillarijs, uel decoctis, syrupis, aliisque diuersi modè paratur. Quidã obseruant, vt ad succos medicatos, vel syropos, triplum liquorum adijciatur. Verbi gratia si serapiorum, & succorum medicato:ũ  $\bar{z}$  2. sint, liquorum esse debent  $\bar{z}$  6. In horum autem vsu obseruandum, vt tepida quadam caliditate præditi ori admoueantur, id quod tamen in iis, qui destillatione capitis ex tenuibus & acris, humoribus excitato adhibentur, haud fieri debet: nam in illa, quò scilicet citius sistatur, frigidis etiam uti licet. Porrò gargarizatum qualitas pro affectus diuersitate variatur. Alij namq; reprimunt, alij extergunt, aut discutunt: nonnulli aliquid è capite eliciunt. Tempus autem usurpandi matutinum est conueniens, & uesperinum ante cibum.

## I.

℞. Diacorij. Diamori ana  $\bar{z}$  ʒ i. s.  
 Vini granatorum  
 Aceti ros. ana  $\bar{z}$  ʒ i.  
 Aqu. rosar.  $\bar{z}$  2.  
 Aqu. plantaginis  $\bar{z}$  4.  
 Misce, & fiat gargarismus.

## II.

℞. Succu è ribes  
 Ex oxyacantha ana  $\bar{z}$  ʒ s.  
 Diamori  $\bar{z}$  ʒ i.

Syrupi

Syrupi de papauere  $\frac{3}{4}$  s.Succi fragorum  $\frac{3}{4}$  s.Aceti  $\frac{3}{4}$  s.

Aquarum rosarum

Plantaginis ana  $\frac{3}{4}$  i. s.

Acetosæ Lactucæ

Fragariæ ana  $\frac{3}{4}$  i. s.Solani  $\frac{3}{4}$  i.Nymphetæ  $\frac{3}{4}$  s.Prunellæ  $\frac{3}{4}$  i.

Commistis omnibus fiat gargarisma.

III.

R. Prunellæ. Frigariz

Plantaginis. Acetosæ

Polygoni. saluiç ana M. i.

ros rub. M. s.

Gallarum

Balauftiorum ana  $\frac{3}{4}$  s.consolidæ maioris  $\frac{3}{4}$  s.Coquantur in aqua fontana, ad tertias de co-  
latura accipe  $\frac{3}{4}$  s. quibus adde

Diacorij. Diamori

Syrupi myrtini ana  $\frac{3}{4}$  i. s.Aluminis  $\frac{3}{4}$  i.

Bulliant iterum, fiatque gargarismus.

I V.

R. Maioranz. Saluiç

Betonicz. Origani ana M i

T

Pipe-

Piperis longi. cub ebarum ana  $\bar{z}$  i.

Pyrethri. zingiberis ana  $\bar{z}$  s.

Coquantur in libra vna aquæ vsque ad tertiaz partis consumptionem. Colaturæ adde.

Mellis rosati col.  $\bar{z}$  i. s.

Oxymellis scillitici  $\bar{z}$  i.

Commistis omaibus fingatur gargarismus.

V.

R. Aquarum betonicæ

Hyssopi

Origani an.  $\bar{z}$  i. s.

Oxymellis scillitici  $\bar{z}$  i.

Hieræ picræ  $\bar{z}$  s.

Misce, & fiat gargarizatus.

### De Trochiscis, Cap. 37.

**T**rochiscus, uel pastillus, siue placentula Latinis, est medicamentum planū, in rotæ, aut orbiculi, seminisue lupini formam coactum, et si quadrati hodie pluribus fiunt, simplicibus ad compositionem aptis, in pollinem tritis, conueniente humore subiguntur, & in pastillos contemperatè digeruntur: qui quum postulat usus triti ex aqua, aut vino, aut alio quouis cōpetenti liquore, præstantur ebibendi. Porrò pastillorū qui citra aliorum medicamentorum commistionem sumuntur, pondus haud excedat drachmā vnā,

vnam, vcl drachmam vnā & semis. Et ij fanē,  
 quorum compositionem opium ingreditur, pō-  
 dere ꝛ i. aut. ꝛ s. dantur. Nonnunquam antido-  
 tis, succis, saccharis, catapotijs, clysteribus, vn-  
 guentis, aliisque eius farinę commiscuntur. Cæ-  
 terum cum quibus partibus consentire debeāt  
 trochisci, ipsa pars affecta commodē docebit.  
 Siquidem alij respiciunt

## H E P A R.

Trochisci Gallię moschatę

De agarico, &c.

## P E C T V S.

Trochisci Aliptę moschatę

De agarico.

De terra sigillata.

Becchij, &c.

## V E N T R I C V L V M.

Trochisci ramich.

Diarrhod. Abbatis

de berberis

Gallię moschatę

De rosis.

De caphura

De spodio.

## C A P V T.

Trochisci ramich.

De eupatorio

De lacca. De rhabarb.

Diarrhod. Abbatis

De berberis

De rosif

De caphura

De spodio

De absynthio, &amp;c.

S P L E N E M.

Trochisci de capparibus

De eupatorio

De lacca, &amp;c.

R E N E S, ET V E S I C A M.

Trochisci de halicacabo.

De terra sigillata, &amp;c.

M A T R I C E M.

Trochisci de Myrrha.

De terra sigillata

De carabe, &amp;c.

T O T V M C O R P V S.

Trochisci Alhandali, &amp;c.

Porro cum trochisci commodè deglutiri nequeant propter rotunditatem depressam, Medici in forma pilularum, aut electuarij, aut pulveris exhibere consueverunt, hoc modo.

I.

℞. Trochiscorum bechicorum

De terra sigillata ana  $\frac{2}{3}$  s.

Cum syrupo de papauere quantum satis est; fiant pilulę N. 5, vel 6.

II. Pil.

II.

℞. Pil scetidaram  $\frac{2}{3}$  ℞.Trochiscorum è myrrha  $\frac{2}{3}$  ℞.

Cum aqua arthemisiæ formentur pilulæ N. III.

III:

℞. Trochiscorum de eupatorio  $\frac{2}{3}$  ℞.Sacchari in aqua absynthij dissoluti,  
quantū satis est, fiant tabulæ, vel rotuli.

IV.

℞. Trochiscorum è succino

Esordio ana  $\frac{2}{3}$  ℞.

Consolidæ maioris

Boli armeni

Balauftiorum ana  $\frac{2}{3}$  ℞.Tufis & cribratis singulis commisceantur,  
fiatque puluis.*De Collyrijs, Cap. 38.*

**C**ollyria, id est ocularia medicamenta, quædam liquida sunt, priuatim hac voce nuncupata: quædam arida, Barbaris Sief, uel pastillorum more, aut pyramidarum instar cōpacta. Liquida fiunt ex aquis destillatis, ut rosarum, plālaginis, myrthi, portulacæ, caprifolij, &c. aut ex succis herbarum fructuumue repurgatis, quibus parum albuminis ouorum adijcitur: quorum gutta una, aut altera oculorum angulis

instillant. Arida ex metallicis conficiuntur, herbis, floribus, fructibus, aliisque plantarum partibus, tenuissimè tritis, ac liquore aliquo cōpetenti, in pyramidis ferè, vel trochiscorum formam redactis: quæ vsus tempore, vel trita, ac in cote leuigata, & in tenuissimū pollinē coacta; aqua aliqua dissoluta, instillantur: vel arida inspirantur, aut intra palpebras ponuntur. Porrò vtimur his in oculorum diuersis morbis, vlceribus vulneribus, fistulis, suffusionibus, & id genus alijs. Sed formulis res clarior erit.

I.

℞: Aquarum rosarum.

Plantaginis ana  $\frac{2}{3}$  ℥.Collyrij albi in core leuigati  $\frac{2}{3}$  ʒ.

Misce, &amp; fiat collyrium.

II.

℞. Aquarum plantaginis

Rosarum ana  $\frac{2}{3}$  ℥. s.Collyrij è glaucio  $\frac{2}{3}$  ℥.E rosis  $\frac{2}{3}$  s.

cerussæ lotæ

Boli armeni ana ʒ ℥.

Opij gr. 3. Croci gr. 2.

Commistis omnibus, fiat collyrium liquidū.

III.

℞. Aquarum rosarum

Buphragiz

Cheli-

Chelidonij maioris

Fœniculi ana ʒ i.

Vini optimi ʒ i. s.

Aloes ʒ i.

Tutiz preparate ʒ s.

Commistis omnib. fiat collyrium liquidum.

I V.

R. Cerussæ decies in aqua rosa. lot. ʒ l.

Sarcocolle ʒ 2.

Tragacanthæ

Amylli ana ʒ i.

Opij gr. 4.

Leuigata omnia, & succo sœnigreci excepta,  
in collyria digerantur arida.

V.

R. Lycij

boli armeni ana ʒ i

Aloes

Acaciæ ana ʒ i.

Gummi ʒ i. s.

collyrij è glaucio ʒ 6

Cum succo cotoneorū, fiant collyria arida.  
Porro utimur collyrio rosaceo, & è glaucio, cū  
astringendi aut reprimendi necessitas vrget.  
Albo uerò & rubro, cūm glutinandi : viridi ue  
rò cūm erodendi, &c.



*De Electuarijs, Cap. 39.*

**E**lectuaria, antidota liquida sunt. Hodie ferè cõponuntur ex conseruis, conditis, speciebus electuariorum, alijsque medicamentis corroborantibus, additis syrupis appropriatis: ita vt communiter pro qualibet vncia cõseruarũ, drachma vna specierum ponatur, plus minusue pro Medici intentione: conditorum verò dosis  $\frac{3}{4}$  non excedat: syrupi verò, quantum ad electuarij iustam consistentiam sufficit, vt in sequentibus formulis videre licebit. Porò qualitatem electuariorum ipse affectus, siue morbus indicabit. Modus verò exhibitionis à drachma vna, vsque ad  $\frac{3}{4}$  2. pro sumentis habitu & affectu. Dantur duabus horis ante cibum, id quod rectè fit in illis, quæ stomachum confortant. Quæ autem caput iuuant, exhibeantur post cœnam una hora sabę quantitate. Cæterum quibus membris appropriata esse debeant electuaria, ipsa pars affecta commodè demonstrabit. Iuuabunt autem atque exalfacient.

## CAPVT

Aurea Alexandrina.  
 Plurifarcoticum.  
 Theriaca fermentata.  
 Michridatum.  
 Diabolianum.

Dia-

Diacaſtorium.  
 Theodoritum  
 confeſſio anacardina  
 nux indica condita  
 Diambra  
 Diamoſchum  
 diacorum  
 chebuli conditi  
 dianthos  
 conferua ſaluiz  
 confer. flor. ſtœchadis  
 confer. maioranz  
 confer. betonicę  
 conſeru. roriſmarini  
 cõſer. primulę veris, &c.

*Verbi gratia:*

R. Conſeruz maioranz  
 Betonicę  
 Florum roriſmarini ana  $\frac{z}{6}$ .  
 Spec. diambre  
 Diamoſchi ana  $\frac{z}{2}$ .  
 Nucis indicę conditz  
 Myrobalanorum chebulorum con-  
 dit. ana  $\frac{z}{2}$ .  
 Miſce, & cum ſyrupo de betonica, vel  
 de ſtœchade fiat eleſtuarium.

PRACT. GENERALIS  
ELECT. CALEFACIENTIA

*Pectus.*

Diaris. Diapensidium  
diaprasium  
diahysopum  
diacalamentum  
diatragacanthum cal.  
diathamaron  
loch de pino  
loch sanum & expertum  
loch de scilla  
loch de pul. vulpis  
conserua hyssopi  
conserua capill. veneris, &c.

*Exempli.*

R. Conseruæ hyssopi  
capil. veneris ana  $\bar{z}$  r.

Spec. diapendidij

Diareos simp. ana  $\bar{z}$  r.

Syrupi de hyssopo vel de gly-  
cyrrhiza q. satis est.

Commistis omnibus, fiat electuarium.

ELECT. CALEFAC. COR.

Aromaticum rosarum

diambra. dianthos

diamargaritum cal.

Diagemma. dianoschū.

Elect.

Elect. lætificantis.  
 Diaxyloaloes  
 Plirisarcoticum  
 confectio citri  
 cort. citri conditi  
 nux moschata condita  
 buglossum conditum  
 elect. pomorum.  
 conferva borraginis  
 conf. buglos.  
 conf. melissæ  
 conferva anthos, &c.

R. Conseruz anthos  $\bar{z}$  s.

Borragin.

buglossæ ana  $\bar{z}$  i.

Spee. diamarg. calidi

Plirisarcotici ana  $\bar{z}$  2. vel  $\bar{z}$  1.

Cort. citri conditi  $\bar{z}$  s.

Cum syrupo conseruationis citri formetur e-  
 lectuarium auro coopertum.

ELECT. CALEFAC. STOMACH.

Theriaca fermentata

Mithridatum

Aromaticum rosarum

Diagalanga

dianisum

diaciminum

diacinnamomum.

Dia-

## R P A C T. G E N E R A L I S

Diatrion pipereon

Diazingiber

Diaxyaloes

Galanga condita:

Gingiber conditum.

conserua menthæ

diacitonium cōpos. &amp; c.

℞. Conseruæ menthæ  $\bar{z}$  1.Diacitonij compos.  $\bar{z}$  2.

Spec. aromat. ros.

Diagalangæ ana  $\frac{1}{2}$  s.Zingiberis conditi  $\bar{z}$  s.

Cum syrupo de mentha fiat electuariū.

## E L E C T. C A L E F A C. H E P A R.

Diacinnamomum

Diacalamentum

confectio ravedseni

Diacostum

conserua capill. veneris

Dialacca

Diacucurma.

℞. Conseruæ eupatorij  $\bar{z}$  1 scapill. Ven.  $\bar{z}$  s.Spec. diacinnamomi  $\frac{1}{2}$  s.Diacost.  $\bar{z}$  s.

Cum syrupo de eupatoria fiat electua-

rium.

ELE-

ELECT. CALEFAC. SPLENEM.

Diacalamenthum  
 Diacapparis  
 Diacollum  
 conserua borraginis  
 Triphera magna  
 Triphera minor  
 Acorus conditus  
 conserua eupat. &c.

R. Conseruz eupatorij ʒss.  
 Borraginis ʒs.  
 Spec. diacalameti ʒss.  
 Acori conditi ʒs.

Cum syrupo de calamentho fiat electuariū.

ELECT. CALEFAC. MATRICEM.

Electuar. de gemmis  
 Diacalamentum  
 Diambra  
 Tryphera magna  
 Diamoschum  
 Elect. ducis  
 Elect. dulce  
 conserua arthemisia  
 conserua melissa  
 Extractum iuniperi  
 conserua maioranz, &c.

R. Conseruz melisse ʒi.s.  
 Maioranz ʒs.

Spec.

Spec. diagemmæ  $\frac{3}{4}$  l. s.extracti iuniperi  $\frac{3}{4}$  l.

Cum syrupo de arthemisia fiat electuarium.

## ELECT. CALEFAC. IUNCTVRAS.

Confectio anacardina.

Diazingiber

Diacorum

Acorus conditus

conserua saluiz

conserua flor. rosmarini.

conser. flor. stœchados

conser. primulæ veris, &amp;c.

℞. conseruæ saluiz  $\frac{3}{4}$  l. s.Anthos  $\frac{3}{4}$  s.Spec. Diazingiberis  $\frac{3}{4}$  l. s.Acori conditi  $\frac{3}{4}$  s.

Cum syrupo de stœchade fiat electuarium.

## ELECT. FRIGEFAC. CAPVT.

Diacodyon.

loch de papauere

conserua rosarum

conserua violarum

conserua flor. nenuphar.

Philonium persicum, &amp;c.

℞. conseruæ rosarum

Nenupharis ana  $\frac{3}{4}$  lloch de papauere  $\frac{3}{4}$  s.

Cum syrupo de papauere fiat electuarium.

ELE.

L I B E R V. 303  
ELECT. REFRIGER. PECTVS.

Diatragacanthum frigidum  
Diapenidion sine spec. calidis  
Diapapauer.  
loch de farfara simp.  
conserua violarum.

R. Conseruæ violarum  $\bar{z}$  2.  
Spec. diatragacanthi frig.  
Diapenidij ana  $\bar{z}$  1.

Cum syrupo violaceo fiat electuarium:

ELECT. FRIGEFAC. COR.

Diamargariton frig.  
Diatrhod. Abb. sine spec. cal.  
Triaudalium.

Manus Christi perlata

conserua rosarum

conserua buglossæ

conserua acetosæ

Poma condita, &c.

R. conseruæ acetosæ

rosarum. borrag.

buglossæ ana  $\bar{z}$  s.

Spec. diamarg. frig.  $\bar{z}$  1.

Margaritarum præparatarum

corallij rubri præparati ana  $\bar{z}$  s.

Fol. auri N. 3.

Cum syrupo acetosæ fiat electuarium auro  
obductum.

E L E.



PRACT. GENERALIS  
ELECT. FRIGEFAC.

Stomachum.  
Diacitonium sine spec. cal.  
Diarrhod. Ab. sine spec. cal.  
Electuar. de forbis  
confer. rosar.  
confer. violar.  
cotonea condita  
Mespila condita, &c.

℞ conferuz rosarum  
Violarum

Diacitonij simp. ana  $\bar{z}$  s.

Spec. diarrhod. Abb.  $\bar{z}$  s.

Cum miua cotoneorum fiat electuarium.

ELECT. FRIGEFAC. HEPAR.

Triasantal.  
Diarrh. Abb.  
conserua rosarum  
conserua violarum  
conserua cichorij  
rad. cichorij conditi, &c.

℞. conferuz cichorij  
Violarum ana  $\bar{z}$  s.  
rosarum  $\bar{z}$  s.

Spec. Triasantali

Diarrhod. Abb. an.  $\bar{z}$  s.

rad. cichorij condit.  $\bar{z}$  s.

Cum syrupo de endinia fiat electuarium.

E L E-

## ELECT. FRIGEFAC. SPLENEM.

Triasantalum

Diarrhob. Abb.

conserua violarum

conserua buglossæ

## ELECT. FRIGEFAC. MATRICEM.

Triasantalon

Diarrhod. Abb.

conserua nenupharis

conserua violarum

conserua rosarum, &amp;c.

*De Tabulis, rotulis, & morsellis,**Cap. 40.*

**S**olidorum confectionū triplex est forma, rotunda videlicet, quadrata, & oblonga. Quæ rotundam orbicularēq; formam recipiunt, orbiculi, siue rotulæ dicuntur. Quæ quadrata forma effinguntur, Tabulæ nominantur. Quæ figuram oblongam accipiunt, Morselli appellatur. componuntur magna ex parte, ex speciebus electuariorum, & saccharo in aqua stillatitia aliqua conuenienti, dissoluto, & ad perfectionem decoctō. Interdum caponum, & perdicum pulpæ, amygdalæ, nuces pinex, vuz passæ, & id genus alia, commiscuntur. Fiunt nonnunquam ex medicamentis, quæ aluum solunt, in puluerē redactis,

306 PRACT. GENERALIS  
 redactis, & tabule purgantes dicuntur. Porro  
 specierum & medicamentorum qualitas ab ip-  
 so affectu desumenda erit. Proprietas verò ab  
 ipso loco affecto. Quæ autem proprietatem cū  
 capite, pectore, corde, stomacho, hepate, splene  
 matrice, &c. habeant, ex præcedenti capite pe-  
 tēda erunt. In rotulis parandis accipiuntur vn-  
 cię quatuor sacchari ad drachmas duas specie-  
 rū. In tabulis verò & morsulis parādis eadem  
 seruetur quantitas: alij tamen ad libram unam  
 sacchari sumunt specierum drachmas octo: alij  
 duodecim; præsertim in tabulis purgantibus.  
 Tempus exhibitionis ante cibum duabus, vel  
 tribus horis. Purgantes verò tabule tribus, aut  
 quatuor horis cibos præcedere debent. Exhibē-  
 tur ex iis orbiculi duo, aut tres, plus aut minus  
 pro morbi conditione. Morsulus unus, nisi ad-  
 modum exiguus sit pro vice sufficit. Ex purgā-  
 tibus vt plurimum non datur, nisi vncia semis,  
 interdum verò plus, minusq; pro sumentis viri-  
 bus, per se, vel trita in iusculo capi, vel galli.  
 Sed formulis res clarior erit.

TABVLAE CORROBORANTES  
 & calefacientes Caput.

R. Spec. diambrae ℥i  
 Diamoschi ℥s.  
 Cinnamomi ℥i.

Ma.

Macis

caryophyllor. an. ℥ s.

cardamomi minoris

cubeborum ana ℥ i.

Nucis moschat. ℥ i. s.

Sacchari in aqua majoranz dissoluti, &  
ad perfectionem cocti ℥ 3.

Fiant tabule secundum artem.

## PECTVS.

℞. Spec. Diaporeos

Diahyssopi

Diaprasij

Diapenidij ana ℥ s.

Olei feniculi guttas 5.

sacchari in aqua hyss. diss. ℥ 2.

Fiant tabule secundum artem.

## COR.

℞. Spec. diamargaritonis cal.

Pliris arcotici

Letitiz Gal.

Diaxyloeloes ana ℥ s.

cinnamomi ℥ 2.

caryophyl. Macis au. ℥ s.

ligni aloes

cor. mali citri ana ℥ i.

Ossis de corde cerui

ramentorum eboris

Vnicorni ana ℥ s.

308. PRACT. GENERALIS

Fol. auri N. 3.

Sacchari in aqua borraginis, dis-  
soluti ʒ 3.

Fiant tabulae.

VENTRICVLVM.

R. Spec. aromat. ros.

Diagalanga ana ʒ s.

Cinnamomi ʒ i.

Macis

caryophyllorum ana ʒ s.

calami aromatici ʒ i.

Nucis moschatae ʒ s.

Sacchari in aqua men. dissol. ʒ 3.

Fiant tabulae secundum artem.

HEPAR.

R. Spec. Diarrhod. Abb.

Diacurcumae

Dialaccae ana ʒ i.

cinnamomi ʒ i s.

Macis ʒ i.

caryophyllorum ʒ s.

Sacchari in aqua eupat. dis. ʒ 4.

Fiant secundum artem rotulas

SPLENEM.

R. Spec. Diarrhod. Abb.

Diacalamintae

Tro-

Trochiscorum de cappareana ꝑ 1.

cinnamomi ꝑ 2.

Macis ꝑ 5.

Sacchari in aqua scolopendriz dis-  
soluti ꝑ 4.

Fiant rotule secundum artem:

**MATRICEM.**

R. Spec. Diagemmæ

Diamusci

Diambroz ana ꝑ 5.

cinnamomi ꝑ 1. s.

Macis ꝑ 5.

caryophyllorum ꝑ 5.

Nucis moschatæ ꝑ 1.

Saccari in aqua arthemisiz  
dissoluti ꝑ 4.

Fiant rotule.

**ROTVRÆCORROD. ET**  
refrigerantes Ventic. Hepar, Sple-  
nem, & Matricem.

R. Spec. Diasantali

Diarrho. Abb. sine spec.

ana ꝑ 1.

Trochiscorum c' spodio ꝑ 1.

Sem. endiuiz

Cucumerum

Portulacæ ana ꝑ 1.

Marg. preparatarum ꝑ 5.

V 3

Coralli

coralli rubri preparati

santali albi

rubri ana  $\mathfrak{D}$  2.sacchari in aqua ros. dissoluti  $\mathfrak{z}$  4.

Fiant rotulæ secundum artem.

## MORSVLI CORROBORANTES.

R. Pulpæ caponis  $\mathfrak{z}$  1.Perdicis  $\mathfrak{z}$  5.Testiculorum galli  $\mathfrak{z}$  3.

Nucis pineæ

Amygd. dulciū an.  $\mathfrak{z}$  1 s.Pistaceorum  $\mathfrak{z}$  1.Sem. 4. frig. maio. an.  $\mathfrak{z}$  5.

Spec. diamargaritonis

lætitię gal.

Dianthi ana  $\mathfrak{D}$  2.cinnamomi electi  $\mathfrak{z}$  1.

ligni aloes

Macis ana  $\mathfrak{D}$  1.Sacchari in aqua borrag. dissoluti quantū  
sufficit, formētur morsuli, auro obducti.*De Trageis, sine Tragematis,**Cap. 41.*

**T**ragemata, vulgares Trageos, & trituras ap-  
pellant. Componuntur ex speciebus ele-  
guariorū, odoratisq; aliis reb, & medicamētis  
simpli-

simplicibus in puluerem redactis, saccharo ad-  
iecto. In his conficiendis communiter capitur  
ʒi. sacchari ad singulas drachmas specierũ. Spe-  
cierũ qualitas ab ipso affectu sumenda est. Pro-  
prietatem verò ipse locus affectus demonstra-  
bit. Exhibentur drachmę vnus ad duarũ pō-  
dere, cum pane tosto, vino odorato madefacto,  
manè stomacho ieiuno, & vesperi, duabus, vel  
tribus horis ante cõnam: interdum etiam post  
cibum, quando vapores in caput exhalantes  
prohibere volumus, q̄ tamẽ nullo odore, vel sa-  
pore acri prædita esse debent. Nos formulis ali-  
quot, quæ diximus perspicua reddemus.

TRAGEMATA CORROBORANTIA,

& calefacientia Caput.

℞. Spec. diambre  
Diamoschi ana ʒ s.  
Plirisarcotici ʒ i.  
cinnamomi electi ʒ i: s.  
Macis  
caryophyllorum  
Nucis moschatę ana ʒ s.  
cardamomi minoris ʒ s.  
Sacchari albissimi ʒ ʒ.  
Misceantur singula, & fiat trag.

P E C T V S.

℞. Spec. Diaireos  
Diapenidij ana ʒ s.  
V 4 rad.



Rad. iridis  $\text{ʒ}$  2.Pul. glycyrrhizæ  $\text{ʒ}$  1.cinnamomi  $\frac{1}{2}$  1.sacchari albi  $\overline{3}$  3.

Misce, &amp; fiat tragea.

C O R.

R. Spec. dianthos

Diambre

Diaxyloaloes

Pliris arcotici ana  $\text{ʒ}$  1.

Been albi

Been rubri

ligni aloes

ossis de corde certū

rasuræ eboris ana  $\text{ʒ}$  5.cinnamomi  $\frac{1}{2}$  1sacchari albissimi  $\overline{3}$  3.

Misce, &amp; fiat tritura.

V E N T R I C U L U M.

R. Spec. Diagalangæ

Dianisi

Diazingiberis ana  $\text{ʒ}$  1cinnamomi electi  $\frac{1}{2}$  1. s.

Piperis longi

caryophyllorum

Macis ana  $\text{ʒ}$  5.sacchari albifs.  $\overline{3}$  3.

Misce, &amp; fiat tragema.

## HEPAR.

R. Spec. Diacinnamomi  
Dialacoz

Diacucurmana ana  $\mathfrak{D}$  1 s.

cinnamomi  $\mathfrak{z}$  1

Macis

caryophyllorum

Spicæ indicæ ana  $\mathfrak{D}$  s.

sacchari albis.  $\mathfrak{z}$  3.

Misce, & fiat tragema.

## SPLENEM.

R. Spec. Diarthod Abb.

Diacapparis ana  $\mathfrak{D}$  2.

Maceris, Nucis moschatæ

caryophyllorum ana  $\mathfrak{D}$  1.

cinnamomi electi  $\mathfrak{D}$  5.

sacchari candidissimi  $\mathfrak{z}$  4

Misce, & fiat tritura.

## TRAGEMATARE-

frigerantia

## CAPVT.

R. Spec Diarrhod Abb.

Driasantali ana  $\mathfrak{D}$  2.

Flor. ros. rub.  $\mathfrak{z}$  s.

Sem. papaueris albi  $\mathfrak{D}$  1 s.

cinnamomi  $\mathfrak{D}$  2.

sacchari albi  $\mathfrak{z}$  3:

Fiat tritura.

PRACT. GENERALIS  
PECTVS

R. Spec. Diatragacanthi frigidi  $\frac{3}{2}$  r.  
sem. papaueris  
lactucae  $\frac{2}{3}$  s.  
Sacchari candidi, vel penidij  $\frac{3}{2}$  2.  
Misce, & fiat tragea.

## C O R.

R. Spec. Diamargaritonis frigidi  
Margaritarū preparatarū añ.  $\frac{3}{2}$  1. s.  
Frag lap. pretiosorum  
sem mali citri ana  $\frac{3}{2}$  s.  
cinnamomi  $\frac{3}{2}$  r.  
sacchari albillimi  $\frac{3}{2}$  2.  
Misce, & fiat tragema.

## VENTRICVLVM.

R. Spec. Diarrhod. Abb.  $\frac{3}{2}$  i.  
ros. rub. sic.  $\frac{3}{2}$  2.  
coroneorum sic.  $\frac{3}{2}$  r.  
coralli rubri  $\frac{3}{2}$  r.  
Macis  
caryophyllorū ana  $\frac{3}{2}$  s.  
cinnamomi  $\frac{3}{2}$  r.  
Sacchari albi  $\frac{3}{2}$  3.

Fiat tragema.

## H E P A R.

R. Spec. Trisandali  
Diarrhod. Ab. añ.  $\frac{2}{3}$  s.  
Sandali albi, citrini rub.

Ros.

Ros. rub.

sem. cichorij

lactuce

endiuiæ

scariole ana ℥s.

cinnamomi ℥s.

sacchari albissimi ℥2. s.

Misce, &amp; fiat tritura.

*De pulueribus, Cap. 42.*

**P**ulueres Arabibus suffus, & Acchol vocantur ex variis medicamentis simplicibus cōmiscentur, ijq; diuerlis corporis partibus admīnistrātur, veluti, qui à vulgō Medicorū, & phar macopæorum epithemata cordalia, & hepatica vocantur. Alij sunt vtilēs ad vulnera, & vlcera, idq; in variis corporis partib. & variaa ob causas, vt pulueres capitales adstringētes, sarcotici erodentes, &c. Sed formulis res clāior euadet.

**PVLVIS CAPITALIS**

calidus.

℞. Maioranz

betonicæ

Pulegij

calamithæ

stœchados

corr. mali citri

Caryo-

316 PRACT. GENERALIS

caryophyllorum

Gummi iuniperi ana ℥ 2.

Commistis omnibus, fiat pulvis, capiti in-  
spargendus.

PVLVIS CAPITALIS TEM-  
peratus.

R. Stœchados ℥ 1. s.

rosarum robrarum

balauftiatum

Masticis, Macis

olibani, Myrtorum ana ℥ 1

Nucum cupressi ℥ 1. s.

Santalorum ℥ 1.

Fiat pulvis tenuissimus, commissuræ corona  
li aspergendus.

PVLVIS AD VVLNERA  
capitis.

R. Aristolochiæ puluerizata

Iridis, Panacis

Mannæ thuris, Farinæ crui

Squamæ æris ana ℥ 1.

Misce, & fiat pulvis.

PVLVIS PRO EXITV ANI.

R. Masticis, Thuris

Nucum cupressi,

Antimonij

Malicorij

Glan-

Glandium

Balauftiarum ana  $\frac{3}{2}$ .

In puluerem redacta asperge.

PVLVIS AD PRAEGNANTES..

℞. Masticis. Thuris ana  $\frac{3}{5}$ .

sanguinis draconis

Myrtillorum. Boli armeni

Granorum tinctorum ana  $\frac{3}{5}$ .

Tere, & huius drachma lactylum ossis loco  
sepe, vino madefacito, & papyro inuolutum,  
sub calidis cineribus calefac. Da abortum ti-  
mentibus.

*De pulueribus purgantibus,*

*Cap. 43.*

**P**ulueres purgantes sunt ex simplicibus me-  
dicamentis purgantibus, vel speciebus co-  
positorum, additis semper iis, quæ vehementiã  
eorum remittunt, & saccharo. Singulorum ue-  
rò simplicium medicamentorum purgantium  
pondera ex libro 4. petenda sunt. Qualitas ve-  
ro ab ipsa morbi causa sumenda. Dantur in  
vino, vel absynthiaco, vel iusculo, aut alio li-  
quore conueniente, idque ieiunis. Sed formu-  
lis res clarior erit.

℞. rhabarbari electi  $\frac{3}{2}$ .

Spicz indicæ

Cinnæ

318 PRACT. GENERALIS

cinnamomi ana ℥s.

Sacchari ℥ 2.

Misce, & fiat puluis purgatorius

II.

R. rhabarb. alb. siue mechoacz ℥ 1.

Gentianæ

cinnamomi ana ℥s.

Fiat puluis purgatorius, in vino

absynthiaco sumendus.

III.

R. Fol. fenæ ℥ 5.

Hellebori nigri ℥s.

Zingiberis

Maiticis ana ℥s.

Tritis omnibus & commistis,

fiat puluis purgatorius.

IV.

R. rhabarbari albi ℥ 2.

Foliorum laureolæ ℥ 1.

Spicæ indicæ gr. 5.

Misce, & fiat puluis, sumendus

cum uino absynthiaco.

V.

R. Specierum elect. de psyllio

Diaphœniconis

Sacchari ana ℥s.

Commisceantur singula tritura.

V I.

VI.

R. Rhabarbari albi  $\frac{3}{4}$  s.

Fol. senz  $\frac{3}{4}$  s.

rad. esule

Zingiberis

Gentianæ ana  $\frac{3}{4}$  s.

Misce, & fiat pulvis purgatorius.

*De Dentifricijs, Cap. 44.*

**D**entifricia, Græc. οδοντοτριχίματα vel odōtica dicuntur, ad cādidos & immobiles dētes reddendos, expoliendos, extergendos, ad las gingiuas comprimēdas, ad halitūs grauelētiam, diuersimodē etiam ad alia præparātur, vel in tenuissimum pollinem affricata, vel liquida ad abluendum, vel crassiora effecta, & circūfita: vt sequentibus formulis patebit.

I.

R. Cornu ceruini usti  
corallium rub.

Ossis sepiæ

Masticis ana  $\frac{3}{4}$  s.

His exquisitissimē puluerizatis, dentes  
& excarnes gingiuas affricato.

II.

R. Aquarum menthæ

Salniq. Hyssopi an.  $\frac{3}{4}$  s.

Alumi-



Aluminis scissi affati, & vino austero extincti  $\frac{2}{3}$ .

Nitri  $\frac{2}{3}$ .

Salis affi  $\frac{2}{3}$  s.

Misce, & distilla per alembicum, liquorq; ad usum seruetur.

III.

R. Gallarum, balaustiorum

Aluminis rupei

Thuris. Myrrhæ ana  $\frac{2}{3}$  s.

corall. rub. ossis sepiz

Masticis. sanguinis draconis an.  $\frac{2}{3}$  s.

Trita & cribrata excipiantur oxymelite, scyllitico, & usu exigente illinantur.

### De pomis odoratis, Cap. 45.

**P**omum odoratum, est medicamentum, quod citra ignis accessionem naribus adhibetur, cerebrum odore suo alterans, in orbiculum pomi coactum. Componuntur ex ambra, moscho, lasere odorato, styrace, stacte, spica, nigella, maiorana, cariophyllis, ligno aloë, ladano, rosis, santalis, caphura, & id genus aliis, ut sequentibus formulis uidere licebit.

I.

R. Styracis  $\frac{2}{3}$  s.

caryophyllorum  $\frac{2}{3}$  s.

Lase

LIBER V.

317

Lasris odorati  $\bar{z}$  s.

Moschi gr. 5. Ambræ  $\frac{z}{2}$  s.

Cum aqua rosarum, & stacte vniantur,  
singanturq; orbiculi odorati.

II.

AD CATHARKVM.

R. Ladani. Ligni aloes  
Stiracis. Costi. Spicz ana  $\bar{z}$  s.

Thuris

Gallie moschatæ

Myrrhæ ana  $\bar{z}$  s.

Nucis cupressi. Gūmi iuniperi

Nucis moschatæ ana  $\frac{z}{2}$  r.

Cinnamomi. Caryophyllorū

Nigellæ ana  $\frac{z}{2}$ .

Moschi gr. 4. Ambrę  $\bar{z}$  r.

Cum aqua rosarum, & vino odorato, &  
modica, cera, formetur pomum.

III.

AD PESTEM

R. Caphuræ. Ligni aloes

Styracis

Flor. buglossæ ana  $\bar{z}$  r.

Caryophyllorum

Trium santalorum

Been albi, & rubri

Myrrhę. Calami odorati

Spicz. Nucis moschatę

X.

Thuris

Thuris

Gummi iuniperi ana  $\mathfrak{z}$  1.

Succini. Croci

corall. rub.

Antispodij ana  $\mathfrak{z}$  5.Sem. acetosa  $\mathfrak{z}$  3.

Succi portulacæ

Succi mol. aurâtiorû a  $\mathfrak{z}$  4.

Nymphet

coriandri torrefacti an.  $\mathfrak{z}$  2.Terræ sigillatæ  $\mathfrak{z}$  2.Boli armeni  $\mathfrak{z}$  5.

Ambre

Moschi ana  $\mathfrak{z}$  5.Iadani, aqua ros. & aceto insusi  $\mathfrak{z}$  5.

Terebinth. in aqua ros. lotæ

Syr. ex cort. mali citri ana q. s.

est ad pomi figuram inducendam.

*De suffimentis, Cap. 46.*

**S**uffimenta, vel suffitus, aliis suffumigia, vel suffumigationes, Græcis Thymiamata: medicamenta sunt ignitis carbonibus iniicienda; vel in trochiscos coacta, vel pulverata, ad odoris gratiã, ad tetros halitus expurgãdos, ad capitis in subiectas partes defluxus, ad infarctus omnes, aurium tinnitus, & frigidãs quascunque noxas:

noxas: quæ quidem si ad uterinos affectus parē-  
 tur, vel quo muliebria ducant, vel quia euagan-  
 tem uterum stabiliant, diuaricatis cruribus, su-  
 per infundibulum stragulis circumdatum, eua-  
 poratorio intus occluso, & muliere pannis dili-  
 genter succincta, nec ad caput efferantur vapo-  
 res, accipienda sunt. Si autem patulo ore, auri-  
 busuē accipienda sunt, per tubum, fistulamue,  
 capite propenso efferantur, vel per sedem per-  
 foratam. Fiunt autem ex rebus odoratis, ut  
 moscho, ziberto, belzoino, ambra, styrace, lada-  
 no, thure, gallia, mastiche, &c. aut fœtidis, vide-  
 licet castoreo, galbano, bdellio, bitumine, lapi-  
 de gargate, & id genus aliis. Odorata orbicula-  
 ri forma, nunc maiore, nunc minore, interdum  
 glandes representant: interdum auctulas, quæ  
 vulgò cypria uocantur: alias pastillorum, ut  
 qui ex alypta, vel moscho, vel gallia moschata  
 inscribuntur: alias pulueris crassi modo fiunt,  
 quæ è formulis cognoscent studiosi.

## I.

R. Laseric odorati  $\frac{3}{2}$ .

Gallie moschate

Cinnamomi

caryophyllorum an.  $\frac{2}{3}$  i

ligni aloes

Fol. lauri ana  $\frac{2}{2}$  i.

X 2

Tritica

Trita excipiantur stacte, & informentur  
pastilli pro suffimento odorato.

## I I.

- ℞. Gallie moschatæ  $\frac{3}{4}$  ℞.  
 Maioranæ. saluie  
 Rorismarini  $\frac{3}{4}$  ℞. s.  
 Maceris  $\frac{2}{3}$  ℞.  
 Cinnamomi  
 Caryophyllorum ana  $\frac{2}{3}$  ℞.  
 Fol. lau.  $\frac{2}{3}$  s. Ligni aloes  $\frac{3}{4}$  ℞.  
 Moschi gr. 3.

Terantur singula, & commixtis omnibus  
fiat puluis, qui exigente vsu carbonibus  
viuis inspergatur.

## III.

## SUFFITVS VTERINVS.

- ℞. Asæ fœtidæ. Galbani  
 Myrrhæ. Castorei  
 Seminis rutæ ana  $\frac{2}{3}$  ℞.  
 Cinnamomi  
 Unguis odoratæ ana  $\frac{2}{3}$  ℞.  
 Sem fœniculi  $\frac{2}{3}$  ℞. s.

Crassiusculum puluerata, prunis insperge.  
Ori admotus, vteri præosationem  
repentè depellit. Vuluæ adhibitus, men-  
ses prouocat, & eorum dolores paulò  
post sedat.

*De linimentis, Cap. 47.*

**L**inimenta sunt; quæ liquida inunguntur. Fiunt ex oleo, adipe, butyro, seuo liquefactis, uel aliis, quæ olei spissitudinem habent, ut styrace liquida, myrrha liquida. Aliquando additur Terebinthina, vel mucilago, vel medulla quæ adipis temperaturæ, & consistentiæ similis est. Horum autem nulla certa quantitas describitur, communiter tamen Medici ad unciam unam olei, recipiunt butyri, adipis, cremoris ana  $\frac{2}{3}$ . Qualitas oleorum ab ipso affectu desumenda est. Proprietas uero ab ipsa parte affecta accipitur. Utimur his calidè duabus vel tribus horis ante cibum.

OLEA CALEFACIENTIA  
ventriculum.

Oleum nucis moschatæ

Oleum de absinthio.

Oleum menthæ.

Oleum Mastichinum.

Oleum nardinum, &amp;c.

℞. Olei mastichini

Nardini ana  $\frac{3}{4}$  s.Succi menthæ  $\frac{2}{3}$ .

Ceræ parum

Commistis omnibus fiat linimentum.

X 3

PE.

PRACT. GENERALIS  
PECTVS

Oleum amygdalarum dulcium.  
oleum amygdalarum amararum.  
oleum irinum. Liliorum.  
oleum cheirinum, &c.

℞ Olei amygdalarum dulcium  
Iriui ana ʒ 1.

Butyri recentis

Pinguedinis gallinæ

Cremoris sem. lini an. ʒ s

Commisceantur, & fiat linimentum:

H E P A R.

Oleum amygdalarum amararum  
oleum nardinum  
oleum de absinthio  
oleum mastichinum  
oleum nucleorum persicorum, &c.

S P L E N E M.

oleum de capparibus.  
oleum liliorum:  
oleum spicæ.  
oleum de behen.

V T E R V M.

oleum anethinum.  
oleum irinum.  
oleum cheirinum.  
oleum spicæ  
oleum de castoreo, &c.

A R.

## ARTICVLOS.

oleum nardinum  
 oleum tutaceum  
 oleum nucum  
 oleū nucis moschatz, &c.

## NERVOS.

oleum coffinum  
 oleum mastichinum  
 oleum lumbricorum  
 oleum de euphorbio  
 oleum de piperibus  
 oleum anethinum, &c.

## OLEA REFRIGERANTIA

## CAPVT.

oleum de papauere  
 oleum mandragoræ, &c.

## PECTVS.

oleum violarum  
 oleum nenupharinū, &c.

## VENTRICVLVM.

oleum cotoneorum  
 oleum myrthinum  
 oleum myrtillorum  
 oleum rosaceum  
 oleum omphacinum, &c.

## HEPAR.

oleum rosaceum  
 oleum myrtinum

X 4

oleum



Oleum cotoneorum

Oleum lentiscinum, &amp;c.

## RENES.

Oleum nenupharinum, &amp;c.

## UTERVM.

Oleum nymphæ.

Oleum lentiscinum.

Oleum myrtillorum.

Oleum cotoneorum, &amp;c.

## OLEA SICCANTIA.

Oleum nucum.

Oleum nardinum.

Oleum ricinum, &amp;c.

## OLEA HVMECTANTIA

Oleum commune recens.

Oleum amygd. dulcium.

Oleum violaceum.

Oleum sesaminum, &amp;c.

## OLEA ASTRINGENTIA.

Oleum mastichinum.

Oleum menthæ.

Oleum de absinthio.

Oleum rosaceum

Oleum myrtinum,

Oleum œnanthinum, &amp;c.

## OLEA EMOLLIENTIA.

Oleum lini. Oleum narcissinum.

Oleum styracis, &amp;c.

OLEA

**L I B E R V.**  
**OLEA LAXANTIA.**

319

Oleum amygd. dulcium.

Oleum oliuarum.

Oleum iasminum.

Oleum sesaminum, &c.

**RAREFACIENTIA.**

Oleum anethinum

Oleū chamomelinū, &c.

**OLEA DIGERENTIA.**

Oleum amygdalarū amarū,

Oleum nucum.

Oleum oliuarum antiquum.

Oleum rutaceum, &c.

**DETERGENTIA.**

Oleum tartari.

Oleum myrrhæ.

Oleum de frumento.

Oleum ouorum.

Oleum sambucinum

Oleum balaninum.

Oleum ricinum.

Oleum raphaninum, &c.

**GLVTINANTIA.**

Oleum myrrhæ.

Oleum nicotianæ.

Oleum balsaminæ.

Balsamum, &c.

310 PRACT. GNERALIS  
SOMNVM INDVCENTIA.

Oleum de papauere  
oleum mandragoræ  
oleum malorum aureorū  
oleum nenupharinum  
oleum hyofciaminū, &c.

DOLOREM SEDANTIA:

Oleum anethinum  
oleum chamemelinum.  
oleum laurinum  
oleum cheirinum  
oleum sambucinum  
oleum liliorum alborum  
oleum moschelinum  
oleum lini  
oleum mal. aureorū, &c.

R. Olei anethini  
chamomelini  
liliacei

E semine lini ana  $\frac{2}{3}$  2.

Adipis caponis  
Anatis

Cremoris sem. altheæ ana  $\frac{2}{3}$  2.

Commistis omnibus fiat linimentum.

De

LIBR V. 331  
De vnguentis, Cap. 48.

Vnguenta crassioris consistentiæ sunt, quam linimenta, & ualentiora, quæ unguinoso suo corpore partibus illita, & cereo quodam lētore crassitudinem adepta inhaerent. Fiunt ex oleis, pulueribus, & cera: interdum etiam adipe, butyro, mucilagine, lacrymis, & gummi, &c. Species & olea iuxta affectuum, quibus adhibentur vnguenta, diuersitatem uariantur. Sic quoque eorum proprietates, pro locorum affectuum varietate immutanda est. Cera, ut conuenientem nāciscatur consistentiam, adiicitur. in his autem componendis hodie plerique obseruant, ut unicuique oleorum; drachmam unam specierum; & drachmas duas ceræ commisceant. Sed præstat ceræ quantitatem eius qui componit arbitrio, ac iudicio relinquere, ut is scilicet addat, quantum ad iustam unguenti consistentiam satis est, ut in sequentibus formulis patebit. Porro utimur his calidè duabus, uel tribus horis ante cibum:

I.  
℞. Olei massichini  
Nardini ana ʒ s.  
Nucis moschatæ. Macis  
caryophyllorū an ʒ i.  
Ceræ quantum sufficit.  
Fiat vnguentum.

R. Olei cottoncorum  
 Rosacei  
 Myrtini ana  $\bar{z}$  s.  
 Balauftiorum  
 Sanguinis draconis  
 Boli armeni  
 Rosarum rubrarū ana  $\bar{\text{D}}$ . r  
 Cerae albæ, quod satis est.  
 Misce, & formetur vnguentū.

## III.

R. Olei de capparibus  
 Liliorum alb.  
 Irini ana  $\bar{z}$  s.  
 Cremoris altheæ  
 Fœnigreci  
 Sem. lini ana  $\bar{\text{D}}$  2.  
 Pinguedinis gallinæ  
 Anseris  
 Traxi ana  $\bar{z}$  s.  
 Medullæ cruris bubuli  $\bar{\text{D}}$  2  
 Cort. rad. capp.  
 Tamaricis ana  $\bar{z}$  s.  
 Centaurij minoris  $\bar{z}$  r.  
 Costi  $\bar{\text{D}}$  s.  
 Ammoniaci  $\bar{\text{D}}$  r.  
 Galbani  
 Bdellij ana  $\bar{\text{D}}$  r.

Dissolutis gummi in aceto, cum cera quā-  
tum satis est, formetur vnguentum.

**VNGVENTA VSVALIA CALIDA.**

Vnguentum Arrogon.

Vnguentum Marciaton.

Vnguentum stomachicum.

Vnguentum Philagrij.

Vnguentum dialthea.

Vnguentum ex bdellio.

Vnguentum Bernardinum, &c.

**FRIGIDA.**

Vnguentum rosatum.

Vnguentum violatum.

Vnguentum refrigerans.

Vnguentum populeon

Vnguentum caphuratum, &c.

**ASTRINGENTIA.**

Vnguentum comitissæ.

Defensiuum magistrale, &c.

**EMOLLIENTIA.**

Vnguentum dialthea.

Vnguentum resumptiuum.

Vnguentum de artanita minus

Vnguentum ex bryonia, &c.

**ABSTERGENTIA.**

Vnguentum apostolicum.

Vnguentum album.

Vnguentum de minio.

Vnguent-

## PRACT. GENERALIS

Vnguentum basilicum.  
 Vnguentum Aegyptiacum.  
 Vnguentum viride.  
 Vnguentum citrinum.  
 Vnguentum rubrum.  
 Pforicum.  
 Vnguentum de lethargyro.  
 Vnguentum de rutia.  
 Vnguentum ad pediculos  
 Vnguentum mercuriatū, &c.

## SARCOTICA.

Vnguentum aureum.  
 Vnguentum diapopholygos.  
 Vnguentum ceraseos.  
 Vnguentum apostolicum, &c.

## GLVTINANTIA.

Vnguentum potabile.  
 Vnguentum aureum.  
 Vnguentum citrinum.  
 Vnguentum desiccatiuū rub. &c.

## ERODENTIA.

Pforicum.  
 Vnguentum Aegyptiacum  
 Vnguentum apostolicum.  
 Vnguentū ex cātharidib. &c.

## EXTRAHERENTIA.

Vnguentum fuscum, &c.

## DOLOREM SEDANTIA.

Vnguentum anodynum.

Vnguentum D. Gereonis.

Vnguentum ad hemorrhoides.

Vnguentum pectorale.

Vnguentum ad oculos, &amp;c.

## SOPORIFERA.

Vnguentum populeum.

Vnguentum somniferum, &amp;c.

## PVRGANTIA.

Vnguentum Agrippæ.

Vnguentum de artanita maius.

Vnguentum ad vermes, &amp;c.

*De Fomentis, Cap. 49.*

Fomenta, hoc est, decocta partibus applicata, illas suo calore soluentia, & flatus dissipantia, vel per halitus digerentia, humectantia, lenientia, atq; alia ex vi coctorum prestantia, in vesica excipi, vel spongia, linteoné filo duplicato, aut laneo panno crassiore imbuto, & expresso, adhibentur, & liquida vocari possunt. Fiunt auté vel ex aqua calida, vel uino, vel oleo, vel decoctis herbarum, florum & seminum, ad tertias, vel dimidias: interdú etiam ex decoctis cataplasmatú. Adhibetur auté oculis, thoraci, vètri, iecori, lieni, renib, vesicæ, vtero, &c. Vtimus his.



his sæpe ante quàm vel cataplasmate, vel unguentis utamur, quo pori aperiuntur, partes relaxentur, & quodammodo viam muniant aliis remedijs. Ante tamen corporis euacuationem non sunt temerè adhibenda: tunc enim plus humorum ad calefactam partem traheretur, quàm id sit, quod discutitur. Præterea in febribus ante accessionem ipsis utendum, sed nõ statim perinita, neque cum copia humorum in toto corpore superat. Quod ad ingredientium quantitatem attinet, pro singulis manipulis vel duobus herbarum, libra una humoris addenda est. Sed formulis res clarior erit.

℞. Florum chamomillæ  
 Meliloti. Anethi  
 Altheæ. ana M. s.  
 Sem. lini. Fœnigræci  
 Anisi. Fœniculi ana ʒ s.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ usque ad consumptionem mediæ partis deinde spongia, vel linteo duplicato adhibeatur parti.

I l.

℞. Maluæ M. i.  
 Flor. chamomillæ  
 Meliloti. Anethi ana M. s.  
 Sem. lini. Fœnigræci an. ʒ ʒ.

Co

Coquantur in lib. 2. aquæ ad medietatem usque, fiatque somentum, quod vel in vitro, vel vesica, vel panno laneo, vel linteo duplicato adhibeatur.

I V.

R. Rutæ M. s.

Lingæ cervinæ

Centaurij minima M. r.

Rad. althææ ʒ i.

Sem. en. lini ʒ s.

Cort. capparorum ʒ s.

Coquantur in aqua, & aceto q. s. ad tertias, deinde spongia in iure decocti madefacta leniter applicentur.

### De epithematibus, Cap. 50.

**E**pithemata, id est liquida medicamenta, componuntur ex aquis destillatis, affectui, & parti affectæ proprijs, adiectis pulveribus, vel speciebus aliquot, interdum etiam vino, & croco, interdum aceto, pro partis affectæ natura. Quibus omnibus simul mixtis, & agitatis, intinguntur panni linei tepidi, & madefacti, leniterque expressi parti applicantur, & subinde mutantur, ne calefacti corpus calefaciant. Nunc sindone, vel laneo panno ex chermes insectis, iisdemque immeris admouentur. Admouentur sæpius rectori & cordi: rarius autem fronti, pectori, ventriculo,

Y

triculo,

triculo, lieni, renibus, & testibus, His quæ cordi applicantur, aliquid vini optimi, & croci miscetur: alijs verò, quæ iecori, vel lieni, acetum parū, & astringentia aliqua: quæ autem ventriculo, astringentia aromatica, ad robur parti induendum. Applicantur autem post euacuationem factam, vel post sanguinis missionem, & potissimum in febrium statu, in quo omnia sunt scitissima. Frequenter ijs vtendum, serò & manè. In summa, quoties pars aliqua inflātur, aut alia calidæ affectione afficitur, mensura epithematum libram non excedit: communiter autem se libram, vel  $\frac{2}{3}$  10. continet. Sic autem ea magna ex parte miscentur, vt libræ vni liquorum  $\frac{2}{3}$  1. s. aut  $\frac{2}{3}$  2. specierum respondeant. Quæ vinum, & crocum (vt cordialia epithemata) recipiunt, eum modum in illis miscendis seruant vt libræ liquorum vncia vna vini, & croci aliquot grana, adijciantur. Quæ verò acetum (vt in epithematis hepaticis, & splenicis) exposcunt, ijs pro libra una aquarum vncia semis acetum sufficit, vt in formulis patebit.

Vtuntur autem his in febribus heceticis, & squalidis, ardentibus, pestilentialibus, viscerum inflammatione, & totius corporis incendio: item in cordis palpitatione, cordiaca passione, erysipelate, & virium imbecillitate, &c.

## I. EPITHEMA PRO FRONTE.

R. Aquarum rosarū ʒ 4.

Aceti albi ʒ 2.

Olei rosati ʒ 1.

Misce, & hoc linteis duplicatis imbutis  
fronti tepidè admoveatur.

## II. PRO CORDE.

R. Aquarum rosarum ʒ 4.

Borraginis

Buglosse

Melissæ ana ʒ 3.

Vini odorati ʒ 1.

Aceti ʒ s.

Spec. diagemmę ʒ 1.

Ligni aloes

Cort. mali citri

Offis de corde cerui

Eboris an. ʒ s. Croci gr. 6.

Committis omnibus fiat epithema.

## III. PRO HEPATE.

R. Aquarum endiuizę ʒ 4.

Cichorij

Lactucę

Absynthij ana ʒ 2.

Acetosę ʒ 3.

Solani ʒ s.

Aceti ʒ s.

Spec. diarrh. Abb ʒ 1.

Y 2

Dria-

Driafantali ꝑ i.

Santali rubri ꝑ s.

Miftis omnibus, formetur epithema.

*De Sacculis, Cap, 51.*

**S**acculi fiunt aut ficci, fiue aridi: aut liquore aliquo madidi, ex herbis, floribus, radicibus, feminibus, & id genus aliis, concifis, & leuiter contufis, quadrati frequentius, vel ad membrorum patientium formam figurantur: ex ferico videlicet cordi, & capiti admouendi: alij verò ex panno lineo: confuunturq; acu tranfuerfum miffa, ne fcilicet ea, ex quibus constant, in vnâ omnia partem labantur ac declinent. Sicci verò ante admotionem, tella calente fuperponi, vino, aut aceto irrigata, ad vnciam vnâ, vel vnciam vnâ & mediam, ac fubinde cōtracto calore partibus adhiberi. Humidi autem locis dolentibus applicantur, ad dolores fedandos, humores crudos concoquendos, ad modificandum, ac difcutiendum. Prius autem comprimendi funt, quam loco dolenti admoucantur. Sed formulis res clarior erit.

## CAPITALIS I.

℞. Maioranę

Florum chamomille

Storchados ana M. s.

Mallicis

Masticis. Macis

Cubebatum

Nucis moschat

Cort. mali citrij

Rosm. rub.  $\text{ʒ}$  1.Corall. rub.  $\text{ʒ}$  1.Salis usti  $\text{ʒ}$  4.

Contusa in sericum demittantur, formeturq; sacculus, siue cucupha.

I I.

R. Lauendule

Rosmarini. Betoni.

Chamom. an. M. 1.

Saluię. Maiorane

Meliloti ana M. s.

Rosarū rub. M. 1. s.

Stęrhados M. s.

Fol. senz  $\text{ʒ}$  2.

Caryophyl. Macis

Nucis mosc.  $\text{ʒ}$  2.

Contusis omnibus, fiat e serico sacculus capitalis.

## III. CORDIALIS.

R. Florum borraginis

Melisse

Buglosse

Santalorū omnium

Beb. albi, &amp; rubri

Y 3

Bo

Boli armeni

Offis de corde cerui an.  $\frac{3}{4}$  r.Ros. rub.  $\frac{3}{4}$  r.

Flor. chamæmeli

Rorismarini ana  $\frac{3}{4}$  r. s.

Corall. rub.

Sem. acetose

Cort. mali citri ana  $\frac{3}{4}$  s.

Ligni aloes

Antispodij ana  $\frac{3}{4}$  r.

Croc. serici crudi an. gr. 10.

Caphuræ  $\frac{3}{4}$  s.

Cōcritis oībus fiat ē serico sacculus

## IV. CORDIALIS CALIDVS

℞. Florum borraginis

Buglossæ

Rosarum

Melissæ ana M. r.

Cinnamomi electi

Caryophyllorum

Macis ana s.

ligni aloes  $\frac{3}{4}$  r.

Cort. mali citri

Spec. diambre ana  $\frac{3}{4}$  r.Offis de corde cerui  $\frac{3}{4}$  s.Croc.  $\frac{3}{4}$  r.Terantur omnia, & fiat ē serico sacculus cor  
di admoꝛendus.

V. COR.

LIBER V.

343

V. CORDIALIS FRIGIDVS.

- R. Rosarum rubrarum  
 Flor. buglossæ  
 Borriginis ana  $\frac{2}{3}$  2. s.  
 Fol. myrthi. cort. citri  
 coral. alb. & rub.  
 coriandri preparati  
 Santalorū omniū ana  $\frac{2}{3}$  1. s.  
 caphuræ  $\text{ʒ}$  2.

Misce, & fiat sacculus cordialis.

VI. CORDIALIS TEMPERATVS.

- R. Santalorum alborum  
 Ros. rubrarum  
 corall. amborum  
 Antispodij. caphuræ  
 Fol. myrti  
 Flor. borraginis ana  $\frac{2}{3}$  1.  
 Ben albi, & rubri  
 cort. mali citri  
 Nucis moschatæ  
 Serici viti. Spicz  
 Ossis de corde cervi  
 Granorum tinctorum  
 Fol. lauri  
 caryophyllorum  
 ligni aloes  
 Rorispatini  
 Melisæ. cubebarum añ.  $\text{ʒ}$  1.

Y 4 Moschi



## R P A C T. G E N E R A L I S

Moschi gr. 4.

Ambrę. Croci ana gr. 3.

Contritis omnibus, fiat sacculus cordialis.

## VII. SACCVLVS AD FLATVS

Ventriculi.

℞. Sem. anisi

Apij. Fœniculi

Seseleos. Olusatri

Rutę ana M. s.

Calamin origani añ. M. i. s

Hyssopi. Pulegij ana M. i.

Rutę sicce. Sthæchados

Chamedryos

Chamepithyos ana M. i. s

Absinthij M. 2.

Cinnamomi

Caryophyllorum

Calami aromat. ana  $\frac{2}{3}$ .Macis  $\frac{2}{3}$ .

Tritis omnibus, fiat sacculus stomachalis.

## VIII. SACCVLVS HYMIDVS

ad fluxum ventris.

℞. Myrtillorum Rhois

Coriandri

Chamomillę

Origani

Balaustiarum ana M. i. s.

Cort.

Cort. granatorum

Hypocistidis

Sem. rosarum ana M. 1.

Rad. verbasci

Dipsaci

Cort. &amp; rad. mori ana M. 2.

Concisis & tritis, fiat sacculus, in uino nigro  
austero coquendus, cui expresso supsedeat æger.

IX. SACCVLVS HVMDVS AD

dolores, mollificationem, & discu-  
tionem.

℞. Florum chamomillæ P. 2.

Summitatum anethi

Origani

Melliloti ana P. 1.

Fænigreci

Sem. lini ana ʒ 1.

Maluz. Althææ

Violariæ ana M. 5.

Contusis omnibus, fiant sacculi duo, in aqua  
vel lacte vaccino coquendi, qui expressi alter-  
natim loco dolenti applicentur.

*De Cataplasmatibus, Cap. 52.*

**C**ataplasmata fiunt ex herbis uiridibus, radi-  
cibus, floribus, fructibus, & seminibus, ad  
Y 5 mol-

mollitudinem vsque coctis, in aqua, oleo non adiecto.

Fiunt autem cataplasmata, ad varias intentiones, quodocunq; ad doloris sedationem, ad remolitionem durtici, ad resolutionē, ad maturationem, ad exiccationem, & consumptionē humorum, & vaporum in promiscuis affectibus promiscuæ intentiones in cataplasmata cōmittentur: vt remollientia cū discutientibus, & discutientia cum remollientibus, vt sequentibus formulis videre licebit.

Porro cataplasmata supra omnes partes dolentes aut inflammantes applicari possunt. Quod si hypochondrijs calefacientia, & discutientia cataplasmata applicanda sint, nisi antea vacuato corpore, adhiberi minimē debent. Attrahunt enim totius corporis excrementa.

I.

R. Maluę. Altheę

Violarię. chamomil. an. M. i.

Rad. altheę  $\bar{z}$  i.

Fœnigræci

Sem lini ana  $\bar{z}$  s.

Coquantur in aqua donec mollescant, deinde contundantur, & fiat cataplasma.

II.

R. Rad. altheę

Liliorum alb, Ireos ana  $\bar{z}$  r.

Flor.

Flor. chamomille

Meliloti. Anethi ana P. 1.

Maluz. Bismaluç

Violariz ana M. 2.

Sem. lini

Fœnigræci ana  $\bar{3}$  s.Baccarum lauri  $\frac{1}{2}$  2.Croci  $\bar{3}$  s.

Coctis, &amp; contusis, fingatur cataplasma.

III.

R. Plantaginis. Polygoni

Bursę pastoris Numulariz

Saniculę

Consolidę medię. Viridiũ an. M. 1:

Coctis & contusis omnibus, formetur  
cataplasma.*De emplastris, Cap. 53.*

**E**mplastra hodie dicuntur, quę ex herbis, floribus, radicibus, fructibus, seminibus, & farina in aqua coctis componuntur, additis axungis, vel oleis, prout res exposcit.

Plantarum autem, vel alterius materię singulis fasciculis olei, vel adipis singulę vncię, vel fescuncię miseri debent.

Possunt etiam supra omnes partes dolentes, aut inflammatus applicari, euacuato prius

prius corpore, & quidem ante cibum.

Doloribus leniendis, tumoribusque conco-  
quendis, vel digerendis maximè accommoda-  
ta sunt.

I.

R. Malug. Althee  
Meliloti  
Chamomillæ ana M. r.  
Rad. altheæ  $\bar{z}$  s.

Contusa coquantur in aqua usque ad iustam  
crassitudinem, cui adde

Olei chamomelini  
Liliorum alb. ana  $\bar{z}$  2.

Iterum bulliant, fiatque emplastrum.

II.

R. Flor. anethi  
Chamomille  
Verbasci ana M. r. s.  
Meliloti M. s.

Farine sænigreci  
Sem. lini ana  $\bar{z}$  s.

Contusa bulliant in aqua, donec in crassitu-  
dinem iustam coeant, deinde adde

Olei anethini  
Chamomelini ana  $\bar{z}$  2.

Ebulliant iterum, & formetur emplastrum.

III.

R. Maluc. Bismaluz  
Violariæ ana M. r.

Rad.

Rad. altheæ

Liliorum alb. ana  $\bar{z}$  i

Flor. anethi

Chamomillæ

Meliloti ana P. i.

Farinæ hordei

Fœnigræci ana P. i.

Farinæ hordei

Fœnigræci ana  $\bar{z}$  s.Croci  $\bar{z}$  s.

Contusis, &amp; coctis, adde

Axungie Anatis

Anseris ana  $\bar{z}$  i.

Medulle cruris vituli

Butyri recentis ana  $\bar{z}$  s.

Olei liliorum alb.

Iriani ana  $\bar{z}$  i.

Bulliant iterum, fiatque emplastrum.

R. Micæ panis in lacte remollitæ, &amp; in-

coctæ quantum sufficit,

Vitellorum ouorum N. i.

Olei de papauere q. l.

Croci gr. 12.

Misce, &amp; fiat emplastrum.

*De Cerotis, Cap. 54.*

**C**eratum olim à cera nuncupatum, hodie ex  
pulueribus, oleo, cera, resina, pice, & id ge-  
nus

nus aliis concinnatur. In huius compositione idem, quod in vnguentis, pondus nonnulli obseruant Medici, vt scilicet vncia una oleorum, drachme vni, aut drachmæ uni & semis specierum respondeat. Cera uerò quarta pars olei esse debet: ut potè si acceperit olei  $\frac{3}{2}$ . cera sit vncia media. Si uerò scribatur cera parum, sit eius sexta pars, aut septima. At si liquidum ceratum, vt in fracturis paretur, duplicatum: si ad emplastri figuram, olei & ceræ tantundem: atque iuxta ambientis & ceræ naturam, idque magis & minus, pro Medici scopo, id quod in pice, resina, terebinthina seruandum. Porro specierum, & oleorum qualitas, ab ipso affectu defumenda est. Adhibentur uentriculo, hepatis, lieni, pectori, utero, & ossibus fractis, ita tamen, vt eorundem figura, cui admouentur, similis sit: vt uentriculo scutiiforme: iecinori, lunatum: lieni, soleatum, ceratum effingatur. Ac uerum trās uersim transmissio, consumuntur: atque ante cibum stomacho ieiunio applicantur. Stomachica cibi tempore seponuntur.

I.

R. Calami odorati  
 Cinnamomina  $\frac{2}{3}$  r.  
 Macis  
 Caryophyllorum ana  $\frac{2}{3}$  s.  
 Nucis moschatæ  $\frac{2}{3}$  r.

Rosa-

Rosarum rub.  $\frac{3}{4}$ . 2.

Masticis

Ladani ana  $\frac{2}{3}$  r.

Olei absinthini

Masticini ana  $\frac{3}{4}$  r. s.

Menthæ

Cotoneorum ana  $\frac{3}{4}$  rCeræ  $\frac{2}{3}$  10.

Resinæ terebinth. parū.

Commistis omnibus, fiat cerotum ven-  
triculo adhibendū, & serico obducatur.

II.

R. Croci

Chrysolcolle ana  $\frac{2}{3}$  r. srPiperis albi  $\frac{2}{3}$  r.

Ammoniaci, succo rutæ sol.

Medullæ cruris vituli an.  $\frac{3}{4}$  r.

Pinguedinis gallinæ

Anseris

Anatis ana  $\frac{3}{4}$  s,

Olei de capparibus

Cotoneorum

Nardini ana  $\frac{2}{3}$  6.

Ceræ quantum satis est, misce & fiat ce-  
rotum pro splene.

III.

R. Artemisissæ

Sabinæ. Abrotani ana  $\frac{2}{3}$  r.

Nucis



Nucis moschate  
 Calam. aromatici  
 Cinnamomi ana  $\mathfrak{z}$  2.  
 Serapini  
 Opopanacis añ.  $\mathfrak{z}$  1. s.  
 Olei nardini  
 Irini liliorum alb. añ.  $\mathfrak{z}$  1.

Dissolutis gummi in vino, cum cera, quod factis est, formetur ceratum vtero applicandum.

---

### De Scutis, Cap. 55.

**S**Cuta ex pulueribus medicamentorum siccorum conficiuntur. Pulueres autem non debent excedere vnciam unam, & semis, ad summum: sæpè sufficit uncia una, aut drachmæ sex, vt ex formula sequenti patebit. Fiunt autem pro stomacho, ad intemperiem aliquam corrigendam, & ad robur illi addendum. Vires suppleant vel vnguentorum, vel emplastrorum.

**R.** Absinthij. Menthæ  
 Maioranæ. Siccorum añ.  $\mathfrak{z}$  2.  
 Caryophyllorum  
 Galangæ  
 Xyloaloes ana  $\mathfrak{z}$  2.  
 Cumini  
 Corallorum rub. añ.  $\mathfrak{z}$  1.  
 Cinnamomi. Ros. ru. añ.  $\mathfrak{z}$  1.

Fiat

Fiat puluis, ex quo fiat seutum, cum pauca  
bombice, acu transuersim confuto, inter duas  
findones.

*De embrochis, Cap. 56.*

**E**mbrocha, Latinis irrigatio dicitur est, ubi  
ex alto pluuia instar in partē aliquā sic di-  
stillatio Differt à fomento humido, quòd hoc  
spongia, vel pannis densis, in decoctione made-  
factis utamur, illa uerò pars ex alto irrigetur.

Componitur ex herbis, floribus, radicibus, se-  
minibus, & id genus alijs, decoctis in aqua, aut  
vino, aut lixiuio, uel oleo.

Adiicitur autem magna ex parte ad manipu-  
los duos plantarum, libra una liquorum, atque  
quoad medietas absumatur, decoquitur. Ut-  
mur ut calidis, ad somnum conciliandum, ad  
dolores capitis finiendos, aliarumque partium  
fracturas, & contusiones.

I.

R. Laſuca. Violarum

Saluia

Rosarum

Anehi ana M. 3.

Cort. rad. mandragoræ  $\frac{3}{6}$ .

Flor. nymphæ

Cucurbitæ ana M. 2.

Z

Sem.

Sem. papaveris albi  $\frac{3}{2}$ .  
 Lactuce. Portulacæ  
 Cucurbitæ ana  $\frac{3}{2}$  s.

Coquantur in lib. 10. aquæ fontanæ vsq; ad dimidij cōsumptionē, fiatq; irrigatio somnifera.

II.

R. Florum rosarum  
 Violarum  
 Nymphæ ana M. s.  
 Fol. salicis M. r.  
 Sem. Lactucæ  
 Portulacæ  
 Cucurbitæ ana  $\frac{3}{2}$  r.  
 Papaveris  $\frac{3}{2}$  s.

Coquantur in lib. 1. s. aquæ fontanæ ad tertie partis vsq; consumptionem, fiatq; embrocha.

III.

R. Betonicæ. Maioranæ  
 Lauendulæ. Chamomillæ  
 Origan. Hyssopi ana M. r.

Coquantur in tribus lib. aquæ ad consumptionem partis dimidiæ, fiatque irrigatio.

*De Balneis, Cap. 57.*

**I**nseffio, inseffus, Græcis ἐγκέβιο μα, vulgò semicupium, balneum particulare est, cui ægræ ad uentriculum vsque tantummodo insident, cruri-

cruribus & brachijs exemptis. Fiunt ex deco-  
 ctione herbarum, florum, radicum, & seminum,  
 quæ omnia pro morbi natura uariantur. Herba-  
 rum autem quantitas sit à manipulis quinq; ad  
 octo, vel decem: radicum ab 3 2. ad 3 4. seminum  
 à 2 6. ad 3 5. vel 3 6. aquæ uerò quantum pro  
 infessu sufficere uideatur. Imponuntur medica-  
 mēta sacco, & in aqua ad tertias vsq; coquuntur

Vtuntur his in renum, vesicæ, coli, ani, & vte i-  
 malis: & quidem temperatè calidis, duabus, aut  
 tribus horis ante cibum, corpore prius purga-  
 to, vel saltem alui, & vesicæ excrementis depofi-  
 tis non autem vbi crudis & malis humoribus  
 corpus est refertum. Mora autem in eo, ad huius-  
 iam esse debet, plus minusue, tum pro affectus  
 vehementia, tum virium imbecillitate, capite  
 aperto, ne eo oppleatur.

### I. PRO DOLORE NEPHRITICO.

R. Maluæ

Altheæ

Parietariz ana M. r.

Chamomillæ

Meliloti

Anethi ana M. r.

Betonicæ

Origani

Calamenthi

Abrotani ana M. r.

Z 2

Rad.

Rad. altheæ ʒ ʒ.

Sem. lini

Fœnigræci

Anisi

Fœniculi ana ʒ ʒ.

Furfuriz P. 4.

Ponantur omnia in sacculo, & fiat decoctio in sufficiente quantitate aque, pro semicupio.

II.

R. Saxifragiz

Maluç. Parietarię

Altheæ ana M. i. s.

Cicerum rub. ʒ ʒ.

Sem. petroselini

Lini

Fœnigræci ana ʒ ʒ.

Coquantur singula in aqua iustæ quantitatis ad tertias, pro infusione.

II. PRODOLORE COLICO.

R. Chamomillæ

Anethi. Origani

Calamêchi ana M. i. s.

Mal. Parietarię an. m. i

Sem. lini

Fœnigræci ana ʒ ʒ.

Sem anisi

Fœniculi. Carui

Cumini ana ʒ ʒ.

Bac-

Baccarum lauri  $\bar{z}$  s.

Quæ omnia inclusa facculo, coquantur in aqua ad tertias, pro semicupio.

## III. PRO MENSIBVS RETENTIS.

R. Arthemisæ sabinæ

Calamenti. Marrubij

Chamomillæ. Meliloti

Pulegij. Saluiæ

Matricariæ ana M. 1.

Rad petroselini

Arij ana  $\bar{z}$  s.

Ciperi M. 1.

Granorum iuniperi M. 2.

Coquantur pro infusu.

IV. PRO FLVOREM NIMIO  
mentruorum.

R. Bursæ pastoris

Plantaginis

Polygoni

Equiseti ana M. 1.

Consolidæ maioris  $\bar{z}$  2.Malicorij  $\bar{z}$  s.Balaustiorum  $\bar{z}$  s.

Coquantur omnia in tribus aquæ pluuiialis partibus, &amp; quarta vini nigri austeri pro infusione.

## V. PRO DOLOREM ARTHRITICO.

R. Bætonicæ

Z 3

Ma-

Maioranę

Rorifmarini

Sthæchados

Saluię. Hyperici

Chamædryos

Chamepityos

Fol lauri

Origani

Setpylli

Chamomillę ana M. iij

Rad. acori

Althęę ana ʒ 2.

Fœnigręci ʒ 4.

Omnibus in sacco positis, coquantur ad tertias pro balneo.

## *De collutionibus & ablutionibus,*

### *Cap. 58.*

**C**ollutionibus utimur in doloribus dētium: ablutionibus vero ad prouocandū somnum & lassitudinē discutiendam.

Abluuntur caput, pedes, manus, & axillę. Capitales ablutiones, ex herbis, & floribus capitalibus, in lixiuio coctis, componuntur: axillarū, ex astringentibus: vt oleastro, lentisco, additis quibusdam odoratis, vt rosis, in lixiuio. Pedum verb, ex herbis, floribus, vel calidis vel frigidis, in aqua,

in aqua, vel lixiuij coctis. Horum autem quantitas communiter à manipulis 4. ad manus octo vel decem. Qui frigidi & humidi natura sunt, capitalibus lotionibus, rarius: qui verò calidi, & sicci, frequentius vtantur.

Capitis autem lotiones calidè exhibendæ manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, sic tamen, vt statim caput abstergatur linteis ca bidis, & exiccetur. Pedum verò lotiones, manè vel vespèri ante cibum, vel euam ante somnũ: non autem pedes rursus abstergendi, sed linteo humido inuoluendi sunt.

Porrò collutiones fiunt ex herbis, radicibus; corticibus, speciebus aromaticis, & aliis, id genus, in vino, vel aceto decoctis, vt in sequentibus formulis patebit.

I.

R. Piperis albi

Longi

Cubebærum

Pirethri  $\frac{z}{2}$  s.Sem hyoscyami  $\frac{z}{2}$  s.

Cort. rad. capp.

Mori

Mandragoræ ana  $\frac{z}{2}$  s.

Contundantur subtiliter, & in vino nigro coquantur ad dimidij consumptionem: teneatur in ore, & cum infrigidari ceperit, expuatur.

Z 4

℞. ℞. ℞.



H.

℞. Hyssopi M. s.  
 Absynthij M. r.  
 Mastice  
 Malicorij  
 Zingiberis ana  $\frac{2}{3}$  r.  
 Macis  $\frac{1}{2}$  s.

Contusis omnibus, coquantur in aceto, vel  
 aqua & aceto, æquis partibus, ad dimidij vsque  
 consumptionem.

III. ABLVTIO CAPITIS, IN  
 materia frigida.

℞. Origani  
 Calamenti  
 Pulegij ana M. i. s.  
 Sæluæ  
 Rorismarini  
 Maioranz ana M. r.  
 Chamomillæ M. r.  
 Baccarum lauri M. i. s.

Coquantur in lixiuio ad tertias, fiatque capi  
 tis ablutio.

IV. PEDVM ABLVTIO  
 ad somnum.

℞. Fol. salicis  
 Vitis.  
 Maluz  
 Violariz

Flor,

Flor. chamomillæ

Nenupharis ana M. i.

Cort. papaueris  $\frac{3}{4}$ .

Fiat decoctio cum aqua, qua lauentur pedes  
genua, & brachia bis, vel ter, ante cœnam.

*De ponderibus, & mensuris, Cap. 59.*

**P**ondera, quibus hodie Medici vtuntur, hæc  
sunt:

**LIBRA**, vncias duodecim pendet, & hæc est  
officinis vsitata: huius autem hæc est nota, lib.

**DEVN X**, vncie undecim

**DODRANS**, vncie nouem.

**BES**, quasi bis triens, vncie octo.

**SEPTVN X**, vncie septem.

**QVINCVN X**, vncie quinque.

**TRIENS**, quatuor vncie

**QVADRANS**, tres vncie.

**SEXTANS**, duæ vncie.

**SESCVN CIA**, seu sescunx, vncia una,  
& semis. nota  $\frac{3}{4}$  r. s.

**SEMISS**, vel Semissis, id est dimidium. Sic  
scribitur S.

**VNCIA**, duodecima pars libræ, constat  
drachmis octo, cuius talis est nota  $\frac{3}{4}$ .

**AVREVS** Arabum, & Denarius Romanus  
pendet drachmam vnã, & insuper septima m

Z 5 eius

eius partem, vnde septem denarij, vel aurei, cōstitunt vnciam. sic notatur, X

**DRACHMA**, pendet grana sexaginta, seu scrupulos tres, & est octaua pars vnciæ. Huius hæc est nota, ʒ.

**SCRVPVLVS**, pendet obulos duos, seu grana uiginti. Sic notatur, ʒ.

**OBVLVS**, pendet grana decem, seu scrupulum dimidium. Sic autem scribitur, ʒ.

**GRANVM**, minimum pondus est, quo utimur. Sumimus autem grana piperis albi, si alia pondera defunt, quorum, viginti scrupulum, sexaginta drachmam constituunt: atque eius hæc est nota, Gr

**ANA** idem potest, quod singulorum tantundem, vel partes æquas: cuius nota est, añ. vel ana.

Quod ad mensuras attinet, sunt vel liquidorum, vel aridorum.

**ARIDORVM** mensura.

**MANIPVLVS**, qui dicitur fasciculus herbarum, aut similium, qui manu compræhendipotest. Sic scribitur, M.

**PVGILLVS**, sit digitis simul in extremitate compressis. Nota eius est, P

**LIQVÍDORVM** verò est mēsurā est,

**LIBRA** ciuilis, quæ pendet uncias sedecim.

**HEMINA** Italica, est dimidius sextarius

Atticus,

Atticus, & pendet uncias nouem: tantundem, quoque pendet cotyla Attica. Cotyla Italica est libra mensuralis, seu duodecim uncia.

SEXTARIUS Atticus continet duas heminas, seu uncias decem & octo.

CHOENIX, sextarij duo.

CHVS, chœnices duo.

CONGIUS, Sextarios sex continet:

CICONGIUS, duodecim sextarios.

TRICONGIUS, octodecim sextarios.

COCHLEARE maximū, pendet drachmas quatuor: magnum sesquidrachmam: paruum drachmam unam: minimum drachmam dimidiam.

*Sed hæc de ponderibus, & mensuris sufficiant.*



P R A-



## PRACTICAE GENERALIS

## LIBER VI.

## ARGUMENTVM.

De instrumentis chirurgicis potissimum agit. Eius capita hæc sunt

- D**E instrumentis chirurgicis, C. 1  
 De cauterijs, Cap. 2.  
 De instrumentis incidentib. & excidentib. & primò de scalpello, phlebotomia & scarificatione, Cap. 3.  
 De nouaculis, forficibus, serris & ossium sectione, Cap. 4.  
 De instru. extrahētib. videlicet forcipib<sup>9</sup>, tenaculis, & volsellis, Cap. 5.  
 De

De specillis,	Cap. 6.
De acubus, cannulis, & sutura vulne- rum,	Cap. 7.
De instrumentis ad deligationem a- ptis,	Cap. 8.
De fasciis, & ligaturis vulnerum, & fracturarum,	Cap. 9.
De splenijs,	Cap. 10.
De puluillis,	Cap. 11.
De penicillis, seu turundis,	Cap. 12.
De ferulis,	Cap. 13.
De fibulis,	Cap. 14.
De instrumentis extendentibus,	Cap. 15.



368  
PRACTICAE GENERALIS

## LIBER VI.

*De instrumentis chirurgicis, Cap. I.*

**Q**uamuis hodie chirurgia à medicina separata esse uideatur, est tamē Medico Physico summopere necessaria. Quoniā medicina pars chirurgia est Quare Medicū nō tantū Phisicum (vt hodie loquuntur) esse oportet, verū etiam chirurgum, non quidem, vt manu operetur, sed ut tanquā imperator, alios monere possit. Instrumenta autem chirurgica, quaedam cōmunia sunt, quaedam propria. Ex communibus quaedam medicinalia, quaedam ferrea Medicinalia sunt tum Dieta, tum pharmacia. Verū de instrumentis dixititicis, libro tertio, de pharmaceuticis uerò, libro quarto, & quinto egimus: restat nōc, vt de ferreis, aliisq; quib. chirurgus munitus esse debet differamus. Itaque ferrea instrumenta quaedam ad incidendum: quaedam ad utendum: quaedam ad extrahendum, quaedam ad probandum, seu explorandum: quaedam ad suendum sunt apta. Sunt & alia instrumenta non ferrea, quorum alia ad ligandum inuenta sunt, vt fasciæ: alia ad utendam carnem, vt acus, fibulæ, cannulæ, splenia, puluilli: alia ad unieada ossa fracta, vt ferulæ: alia ad extendendum

dendum vt habent, scalæ, aliaq; id genus machinæ. Sic capiti proprium instrumentum est modiolus: sedi, talx: matriçi, speculum: de quibus omnibus nunc ordine agemus, ab iis, quæ urendi vim habent, exordium sumentes.

*De Cauteriis, Cap. 2.*

**C**Auterium duplex est, actuale videlicet, & potentiale. Actuale fit metallo ignito: auro quidẽ, & argẽto, leuius: ferro uerò acius existit. Potentiale fit ex medicinis causticis, & erodentib. Sed actuale potentiãli melius & securius est. Variant autem pro locorum, & morborum diuersitate, aliud enim punctuale est: aliud rotundum: aliud planum, & longum: aliud cuspitate, ad formam cultelli factum: aliud oliuare: aliud triangulare: aliud dactylare: aliud ab acu, acuale: aliud circulare, &c. Porro castra, punctim cauteria imprimuntur: adiguntur longius, & latius, & in circulum circumscribuntur: vno loco vel pluribus: semel ac saepius, vt natura partium sustinet, & vitia requirunt. Fiunt cauteria in capite cõtra epilepsiam, maniam, melancholiã, dolorem capitis diuturnum, hemicranium, oculorum lachrymas, &c. Quæ in humeris sunt cauteria, cõtra humerorum & spatularum dolorem valent. Circa radicem uerò gutturis, asthmatis, & pulmonum vitis conferunt: Contra dolorem, & vitia hepatis



hepatis, supra ipsum hepar cauteria sunt faciēda: contra vitia splenis, supra lien: contra lumborū dolorē, sub ipsis, in fontanella: contra ischiadā passionē, in coxēdice: cōtra arthriticam passionē sub genu, &c. Cæterum cauteria tempore matutino sunt adhibenda, corpore nō repleto, sed prius euacuato. Locū igni circumscribere oportet, nucali testa, vel re simili, q̄ suis marginibus constans pateat in medio. Cerato rosa ceo, lana uino tincta muniendæ sunt partes vicinæ, ne iusto latius euadat ignis violentia. Alioqui splenijs, imbutis oui cādido, mucagine psyllij, cerussa, è rhodostagmate lota, refrigerāte succo, & iis omnino quæ ἀφλεγμαινοντα Græci uocant. Crusta non statim detrahenda, sed nutare prius oportet, ac veluti maturitate sua exidere. Alioqui vis afferri solet, profundum ulcus relinquitur: dolor, fluxio, phlegmone irritantur. Tempestiua deduci potest butyro, & rhodostagmate loto, farina tritici in porri, vel ruti succo, &c. Postquam ceciderit escara mūdificetur. Porrò cauteria per dies quadriaginta, aut tribus mensibus aperta maneant. Seruabuntur autem aperta cum reniis, & nodis, ex cera simplici factis, vel piso, uel gentiana Et desuper ponuntur scilia caulium, aut hederæ, supra panni triplicati, bis in die mutati. Potentialia cauteria ab octo horis vsq; ad duodecim relinquentur.

quenda sunt: & postea remouenda. Vesicæ uerò,  
 à vesicantibus cauteris eleuatæ, incidendæ, &  
 aperiendæ sunt, cum torficibus, aut cum acu. Et  
 postea supra solum caulis & panni applicandi  
 & sicut placebit remutandi.

*De instrumentis incidentibus, exci-  
 dentibus, scalpello, phlebotomia,  
 & scarificatione, Cap. 3.*

**I**nstrumenta chirurgica ferrea, ad incidendū,  
 & excidendū, sunt torfices, nouacula, ferra,  
 & scalpellum, quod phlebotomō appellant. Ve-  
 rùm de phlebotomō hoc loco dicendum venit,  
 de reliquis uerò tribus instrumentis sequenti ca-  
 pite ageatur. Scalpellorum itaque tria sunt gene-  
 ra: oliuare, myrtinum, & cultellare. Cultellare  
 quod Italis Lācetta appellatur, uel latum; uel  
 subtile est, pro uenarum amplitudine, & stric-  
 ta. Myrtini forma lata est: & conuenit ad inci-  
 dēdas uenas cōcavas, plenas, pcedentes, appa-  
 rentes, magnas. illasq; quæ sanguinem crāssum  
 continent. Forma uerò oliuaris phlebotomi est  
 minoris latitudinis, & subtilioris extremitatis:  
 & conuenit ad uenas paruas incidendas, & quæ  
 sanguinem tenuiorem continent. Cultellari uti-  
 mur in uenis incidendis, quibus uel nerui, uel  
 arteriæ subiacent, quò securius, & minori cum

periculo sanguis extrahatur. Quomodo autem phlebotomia sit perficienda, & quantum sanguinis sit extrahendum: item quibus conueniat, & quibus non: & quæ venæ, & quibus in morbis sint incidendæ, & quo tempore, libro tertio abudè diximus. Porro scalpellis quoque vtitur in abscessibus suppuratis aperendis, vt libro sequenti docebimus.

Ceterum balneatores apud nos quoque scalpellis ad scarificandum utuntur, verum non tam acuminatis & subtilibus, vt in uenarum sectione, sed latoribus, & rotundioribus in aciei extremitate. Cucurbitula autè prius vacua applicanda est, & tandiu relinquenda, donec pars rubeat & attollatur: qua deinde ablata, pars secundum eutem scarificanda est ordinatè, semel atque iterum, scarificationibus paulo profundioribus factis, præsertim si sanguis fuerit crassus, & æger robustioris nature. Quibus autem scarificationes conueniant, & quibus non: item quos morbos inuent: & quæ partes scarificandæ, & quo tempore, ex libro tertio petenda sunt.

---

*De nouaculis forficibus, ferris, & osium sectione, Cap. 4.*

**F**orficibus & nouaculis maximè indigēt chirurgi. Forficibus namq; utuntur ad incidendas

das telas, fascias, fila, pilos, capillos, vngues, eum, coria, membranas, ligamenta, & q̄ in faucibus, & gula adnascuntur, verò putrescunt, & id genus alia, &c. Nouacula verò culter rasorū dicitur à nouo, quod faciem nouare, id est, nouā quodammodo, & iuniorē facere videatur. His utimur ad pilos, qui vlcerum, vniuerum, & tumorum sanationem impediunt, radendos: item ad cutem denudandam: carnem putridam excidendam cutem (vt in Gallia, & Italia fieri solet) scarificandam, & id genus alia exhibēda. Porro serra est instrumentum dentatum, quò ossa, & membra putrefacta secantur. Serrarum, quibus ossa corrupta secantur, pro vario situ ossium, crassitudine, magnitudine, duritie, & cauitate, varie quoque existunt differentie. Quibus verò extrema membra corrupta adimuntur unicum genus serræ commune est: Verum non in omnibus quibus membrum aliquod eō putruit, huiusmodi sectio faciēda est. Senes. n. pueri, debiles, & quibus iam ultra genu corruptio progreditur, morti potius relinquēdi sunt, quàm secandi.

Fortiores verò, & robustiores matutino tempore sunt secandi, & quidē in hunc modū. Pars (brachium videlicet, vel crus) inferius & superius ligamento constringenda prius est, deinde caro intra duas has ligaturas spatium lato ad

os usq; separanda, & denudanda. mox ferra, ad id genus ordinata, os abscindendum. Cauendū tamen ne ferra carnem sanam tangat, dolorem & inflammationem inferat, quod facile impeditur, si pannus linteus ab omni parte interponatur. Abscisso membro, pars vulnerata ligamēto conuenienti liganda est, & curanda, donec omnino perfanetur. Quod si inter operandum, fluxus sanguinis vehementer irruat, velociter locus cauterizandus, vel ora venarum filo liganda, uel pulueribus astringentibus fluxio impedienda erit.

---

*De instrumentis extrahentibus, forcipibus, seu tenaculis, & volsellis, Cap. 5.*

**D**E instrumentis vrentibus, & secantibus tribus præcedētib; capitibus diximus, nūc de attrahentibus, videlicet forcipibus, siue tenaculis, & volsellis dicendum videtur, quæ pro rerum extrahendarum & particularum affectarū diuersitate plurimum etiam variant. Sunt nāq; forcipes, quibus dentes exesi, vel putrefacti eradicari solent: alij ad spinas è gutture extrahendas fabricati: alij, quibus sanguisugas: alij, quibus lapides ex vesica: alij quibus scærum mortuum,

tuum, vel secundinam ex utero extrahimus: alij sagittas, tela, & spicula. alij globulos ferētarios ex corporibus nostris extrahunt. Verum, licet multa sint instrumenta, telis, atq; infixis aliis rebus extrahēdis accommoda, oīdo tamē apud recentiores chirurgos sunt magis communia.

Primum, sunt forcipes, seu, vt vulgò loquuntur, tenacula, quæ denticulatae sunt, & cæpita habent ad instar limæ.

Secundum sunt forcipes Albucasis, in modū rostri avis, etiam denticulatae.

Tertium, sunt forcipes in modum cānæ, siue arundinis, aut scriptorij calami, concauæ, quas vulgò tenaculas cānulas appellant, ad sagittas spiculis cinctas & globos ferentarios (quas barbatulas nominant) extrahendos accommodæ.

Quartū est, terebellū inuersum, q̄ in ferri infixi tubulum (quam doliam appellant) imponitur: ubi autem sic tubulo immisium, ferrum apprehenderit leuiter ferro sequaci educitur.

Quintum instrumentum, est terebra in longū porrecta, dilatandis ossibus (quibus tela firmiter inhærent) apprimē idonea.

Sextum, est incisorius culter, ad amplificanda carnis vulnera, quò facilius infixa eximātur.

Septimum est propulsatoriū instrumentum, quod geminum est, nempè cauum, & solidum, siue surdum: illud fœminam, hoc marem appel-

tant. his tela profundius, donec ab altera parte apprehendi, & extrahi possint.

Octauum est in modum arcus illius, quem balistam vocitant. Hoc autem, istum telum excutitur.

Forcipes autem, pro eradicandis dentibus sint subtiles, longarum extremitatum, breuis manubrij, crassi, ut non duplicentur, quando eū eis premitur. Sint autem ex ferro optimo facti, directarum extremitatum. Et in eorum extremitatibus sint dentes, quorum quidam ingrediantur in quosdam, & stringant decenti & soni constrictione. Quandoque sunt extremitates, sicut forma restri auis, quę ciconia nominatur, qui fortis sunt constrictiois.

Ad spinas de gula extrahēdas, quidam instrumenta ex plumbo cōficiunt, Radio similia, paulo tamen maiora, & in extremitate curva.

Instrumentum verò sanguisugis, qua sub vim cadunt extrahendis idoneum, simile esse debet forcipibus restri auis, quę ciconia appellatur, in quo limę tamen asperitas it sit.

Fœtus autem mortuus extrahitur vncinis, & forcipibus accommodatis, matrice prius aperta. Aperitur verò instrumento, quod antiqui Vertiginem uocitant.

Porro Volvella instrumenti chirurgici genus est, quo caro ex vlcerebus putrida præcideda,  
 appre-

apprehenditur. Sed hæc de instrumentis attrahentibus nobis sufficiant.

*De Specillis, Cap. 6.*

**S**pecillum, quibusdam proba, tenta, & intromissum vocatur, instrumentum est teres, & paruum, quo chirurgi ad scrutandum, siue tentandum vulnerum, & fistularum viâ, & profunditatem videntur, quod cum nouissimum sit, de hoc pluribus agere non est necesse.

*De acubus, cannulis, & futura  
vulnerum. Cap. 7.*

**A**cus, & cannula vulneribus suendis accommodata sunt. Acus autem longa, ac leuis esto, cuspide triangulari, cauda verò excavata, vt in ea filum recondatur, & transitum acus non remoretur. Ita, n. mitius corpori infidet. Ceterum cannula habeatur fenestrata cui incubat, ac innitatur altera pars labij vulneris, ne scilicet huc atq; illuc euagetur, dum acus intromittitur & vt per fenestellâ videri possit, quando acus pertransierit. Atq; ubi iam acus traiecta fuerit, vnâ cum filo trahatur: sed interim vulneris labrû, quod prope filum est, specillo huic parti applicato, veluti fulcimento, & adminiculo



innitatur, ne dum filum extrahitur, labrum etiã consequatur. Ligaretur autem primò duabus inuolutionibus, secundò vna duntaxat, deinde filum scindatur, aliquantulum remotè à nodo.

Sutura autem fiat filo forti, & equali, & leui, cuiusmodi est sericum in communibus saltè vulneribus, primum punctum faciendo in medio diuisionis vulneris, deinde alterum in medio spacio vtriusq; lateris, & ita deinceps procedèdo, vt inter duo quęcunq; puncta, punctum intercedat, donec vulneris labra ritè cõmissa fuerint. itaque nec nimis rara, neq; nimis crebra futura esse debet. Si enim nimis rara est, nõ cõtinet: si nimis crebra est, vehemèter afficit. Quia quò sæpius acus corpus transiit, quoque plura loca iniectum vinculum mordet, eò maiores inflammationes oriuntur. Sic igitur sutura oras iungat, vt ne ipsę quidem inter se ex toto contingant. Quod scilicet, si quid intus humoris cõcreuerit, sit qua emanare, ac effluere possint. Solent autem communiter unius digiti transuersalis spacium interiecta vincula relinquere.

---

*De instrumentis ad deligationem*

*aptis, Cap. 3.*

**I**N deligandi arte ueteres quàm plurima vsu diuersa suis etiam nominibus distinxerunt: linthcola,

theols, fascias hypodesmidas, splenia, serulas, spatulas, habenas, laqueos, puluinas modo scorteos, modò molliusculos, nodos, & id genus alia; de quibus quoq; dicendum venit.

*De Fascijs, & ligaturis vulnerum,  
& fracturarum, Cap. 9.*

**F**ascijs utimur in vulneribus, vlceribus atq; fracturis. At fascia ad vulnus deligandù, lin tea aptissima est, quæ nec nimium mollis, nec nimium dura sit. Quod enim molle nimium est, & alga ritu fragile, non iudè continet. Quod uerò durum nimis est, premendo offendit. Sit igitur ex pãno veteri, nõ tamen nimis detrito, suavi, leni & mundo, ea q; latitudine, & longitudine, quã natura partis desiderat. Ut si humerus tibi deligandus sit, fasciam, quæ latitudinem sex digitorum habeat assumes: at si semur, quinque; si tibiã, quatuor; si brachium, trium digitorum. Si uerò digitus ligari debeat, vnus digiti latitudine fascia assumenda erit. Eius uerò longitudo sit, pro rone numeri iniectionum, hoc est, pro necessitate reuolutionum. Sed & ad hoc non parum confert cognitio conformationis ipsius particulæ laborantis. Quod ad fracturarum deligaturam, at tinet, tuta non erit deligatio, si uel nimis arcta, uel laxa nimis fuerit. Quandoquidem per laxio

rem ossibus moueri licet: per arctiorem verd, & vehementius adstringentem, & alimenti in locum affectum distributio prohibetur, & dolor (qui humorum in agram partem affluxus euacuat, & phlegmonas erit) excitatur. Danda itaq; opera est, vt utrunq; excessum declinemus. Cōstrictio igitur mediocris esto, tum nostri sensus, tum ipsius ægrotantis iudicio. Ac si quidem equalis esset crassitudinis membrum quodque, vtique latissima fascia commodissima esset, vt pote quæ totum æqualiter, continenterq; ex omni parte fractū os complecteretur. Sed quoniam id non est, quod deest nobis, ex fasciarum latitudine, circuituum numero pensabimus, vt in artibus ipsis, qui omnium maximè fracturæ trāuersum factæ, expositi sunt. In talibus namq; utilior est angusta deligatura, quàm valdè lata, & remissa. Quippe que nec rugas, vt ea, quæ latiore fascia fit, contrahat, & totius membri, cui circumdata est, cutem contegat. Eò igitur vsq; augere tibi latitudinem fasciæ licet, quoad nulla eius pars laxior efficiatur. Ceterum in eiusmodi deligatura quæ fracturis (in medio præsertim brachij, vel tibiæ, aut femoris existentibus) adhibetur, duabus fascijs lineis mollib. opus est. Hanc aut Hippocrates hypodésmidas, id est, subligamina seu malis subfasciatores appellauit. Primæ fasciæ initiū super fracturā injeci debet,

bet, ac circa eam bis, ter, & conuoluta, sursum  
versum ferri, & quasi in cochlea serpente, at-  
que illic desinere. Id tamen perpetuò obseruan-  
dum est, vt multum parus sanę fascia hęc com-  
plectatur. Ita enim fiet, vt & firmus reposita, ac  
conformata ossa contineantur, & magis ab affe-  
cto loco in circumuicinas partes humores eli-  
dantur, magisque ne hi à superiori parte eò de-  
fluant, impediantur. Altera etiam superfasciurā  
debet incipere priori aduersa, deorsumq; (vbi  
primos complexus superfasciuram fecit) tende-  
re, atque inde iterum reducta in superiore par-  
te ultra priorem fasciam desinere. Quocirca  
dimidio longior priore esse debet. Terminus au-  
tem longitudinis eorum faciatur, non vnus ac  
certus statui potest, sicuti nec etiam latitudi-  
nis, sed pro magnitudine fracturę, & perfracti  
membri crassitie, vtriusque dimensio varianda  
est. Sunt autem eiusmodi fascię duę prolon-  
gę, nempe quatuor, aut quinque, aut sex cubi-  
torum, & circa tres quatuorue digitos latę, a-  
qua, aut postea potius madefactę, & postea ex-  
pressę, presertim si fractura inflammatione  
vacet, recensq; sit. si uerò dolor vehemens,  
aut inflammatio adest, lanis tenuibus molli-  
busq; , aut stupis leuibus, oleo, vel oxycra-  
to imbutis, membrum contegendum est, &  
non ita arctę deligandum. Satis enim fuerit  
tunc,

tunc si deligatura adhibeatur, quæ & membrū  
 utcunq; sulciat, & admota medicamēta, ad hæc  
 symptomata profliganda idonea, contineat.

---

*De Splenijs, Cap. 10.*

**S**plenium ab oblonga splenis figura nomē ha-  
 bet. Varijs corporis partibus, potissimum  
 uerò ossibus fractis, carnibusq; exulceratis, ac-  
 commodatur, & pro earum diuersitate plurimū  
 uariatur. Splenia namq; pro ulceribus, pannorū  
 lacinię sunt, in linamenta formatę, unguento  
 albo rhafis illitę, aut unguento, quod sextā par-  
 tem lithargyri recipiat, uel unguento, quod dia-  
 pompholygos nuncupatur, supra uicus ipsum  
 positę. Verū supra eiusmodi linamenta ulceri  
 imposita, puluillus, quem plumaecolum uocāt  
 (de quibus deinceps dicemus) posca aquosa  
 imbutus, adhibendus erit: deinde cōueniens de-  
 ligatura. Cæterū splenia, à splenis forma: ita  
 appellata, ad fracturarū tutelā, stabilimentūq;  
 plurimum faciūt, maximè si huiusmodi plagu-  
 læ unā cū exterioribus fascijs, quas epidesmas,  
 id est, superligamina appellant, desuper adhi-  
 beātur. Splenia enim eiusmodi siue plagulę, dua-  
 rum primarū fasciarum, quæ peculiari nomi-  
 ne hypodesmidę, id est subligamina appellātur  
 firmamenta sunt. Non mediocriter præterea auxi-  
 lium

lium ferunt splenia in magnis ossium abscellitibus, præsertim vino nigro, subaustero insuccata quæ deinceps, atq; continenter, hinc inde adhibenda sunt, non ut hoc illi infideat. Longiores sunt, quàm quæ solùm ambitum membri comprehendant. Nam si quadrantalibus est partis, paulò longiores splenes trientalibus esse oportet. Obliquè inseruntur membro, & aduersa parte decussant.

---

*De puluillis, Cap. II.*

**P**uluilli, qui vulgaribus chirurgis plumaceo li nuncupantur, ad multa viles sunt. Quandoquidem dissolutas, ac diductas partes succiunt, & comprimunt membri, quod suæ unionis diuortium patitur, geminum calorem fouent, & conseruant. Deniq; à graui molestoq; vinculo- rum, ac fasciarum pondere, vulneratam particu- lam tuentur. Fieri autem quondam solebant ex pluma inter duos pannos candidos & mundos confuta, vnde & nomen illi à veteribus inditum est. Verùm quoniam eos subinde mutare & in- nouare (quod valdè tediosum erat) cogebat ne- cessitas, magis postea placuit eiusmodi puluil- los ex stupis canabinis conficere, præsertim di- ligenter, ac studiose pexis emundatisq;. Fiunt etiã interdum ex lana, vel xylo, quod cotoneam  
 appell-

appellant. Plerique autē hodie loco pilulorum panniculos admouent læues, duplicatos, aut triplicatos: alij uerò spongiā adaptant. Porro duo vel tres, pluresue, prout res expostulat, apponuntur. Quandoque quidem sicci, ac nullo madentes liquore: nonnunquam uerò imbuti oui candido, uel uino, uel posca; aliquoties etiā in oleo, iuxta ipsius dissolutionis exigentiam. Inueniuntur autem huiusmodi puluilli, ex triplici differentia, quod ad figuram attinet. Alij enim triangularem, alij rotundam, alij uerò quadratam habent. Qui in figura constant triangulari, glutinandis uulnibus sunt dicari. Ita autem disponi debent: vnus ex utroque latere orarum seu labrorum uulneris, constituitur ita, ut super plagam, inter se iungantur lateribus. Qui rotundam habent figuram, sicci aliis superponuntur, natini caloris particula læsa conseruandi gratia, & ut saniosam proluuiem ac sordidos ichores in se recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideò apponuntur, ut partem læsam à fasciarum & uinculorum iniuriis vindicent.

---

*De penicillis, seu turundis,*

*Cap. 12.*

**T**urundas seu penicilla, & linamenta, quas vulgò

vulgo tentas appellant, maximo esse vsui in curandis vulneribus, & precedentia luce clarius ostendunt, & omnibus in aperto est. Proinde quando, quomodo, & ad quos fines illis fit utendum, chirurgus haudquaquam est ignorandum.

Ad hec ex qua materia, & qua figura formari debeant itaque illis utimur, in iis octo præsertim vulnerum generibus.

Primo cum vulnera vel amplianda sunt, vel detergenda, vel cum aliquid ab eorum fundo vacuandum est: ut in profundis vulneribus, in quibus necessum est alibi vulnus aperire, ut ex fundo, & sinu ipsius ichores, id est saniosa colluvies, inibi collecti vacuentur.

Secundo illis cogimur uti, in cauis vulneribus in quibus necessaria est carnis deperditæ regeneratio.

Tertio in vulneribus alteratis ab aere, & fordibus, quæ deterfione egent.

Quarto in vulneribus contusis.

Quinto, prædictorum usus vtilis est in vulneribus, quæ cum phlegmone, aut quouis alio tumore præternaturam fatigant.

Sexto in vulneribus, quæ per morsus fiunt. Talia namque vulnera non sunt festinanter agglutinanda, & ad cicatricem perducenda. Quin potius longo tempore aperta & hiantia



hiantia manere debent. Quandoquidem mor-  
sus ferè omnis quoddã virus habet, quod foras  
semper euocandum est, non intrò repellendum  
nec occluso vulnere intus relinquendum.

Septimò turundis, & linamentis vtitur, in  
vulneribus, in quibus persanandis circa ossa  
manus admoenda est,

Octauò in vulneribus, quæ iam vetustate in  
vlcera defluxionib. scaturientia degenerauerũt  
Porro in omnib. aliis reliquis vulneribus, in-  
ducendæ cicatrici studemus, absq; eiusmodi tu-  
rundis, & linamentis. Aduertendum autem est,  
in ijs diuersitatem non paruam esse, pro rōne si-  
nis, cuius gratia sũt & admoũetur. Fiũt aut̃ in-  
terdũ, ut diximus, ad detergẽdas sordes vulne-  
rũ, atq; tum ex pãni nõ asperi, & præsertim ve-  
teris, laciniis, vel floccis euulsis, formantur. Nõ  
nunquam verò idèò fiunt, & in vulnus immittũ-  
tur, vt ipsum hians, & apertum maneat. At tũc  
quidem ex stupis benè pexis, & à fordibus ritè  
emundatis, vel ex prædicti panni frustulis, effor-  
mantur: vel etiam ex xylo, quem cotonẽ vocant  
sed & ex canna çnea, vel argentea perforata  
sũt penicilli ad eundem finem: vt verbi gratia,  
in naribus, ad aeris inspirationẽ: & in altis vul-  
neribus, vt sanies, & purulenta colluuiò, per hãc  
velut emissarium feratur, non autem intus rei-  
neatur. Quãdoq; etiam hæc linamenta inquã,  
& pe-

& penicilla, plagę inferuntur, vt ipſius os magis dehifcat, & amplicetur, fiuntq; tunc, aut ex ſpō giolis uehementer compreffis, & intortis, aut ex radice gentianę: hęc enim dum multum humorem, quo ſcatet vulnus, combiberint, turgeſcunt, & ita magis hiantem plagam reddunt.

Cæterum forma linamentorum æqualis eſſe debet. turundarū ve:ò inequalis, in modum clauiculi lignei, quem Latini impagem uocant, ne ſcilicet intrò labantur. Hęc autem aliquoties quidem ſicca, quandoq; ve:ò quopiã delibuta vngueto admouentur, prout res ipſa exigat. Reliqua quę ad eiufmodi operationes ſpeñant, medentis conſilio, & ſolertię committuntur.

*De ferulis, & quomodo in fracturis  
adhibeantur, Cap. 13.*

**F**erulis ad membra perfracta chirurgi maxime utuntur. Nam vt perfracta membra in naturali figura immota proſus (quoad expediet) perſiſtant, recentiores chirurgi ſecundum deligaturam protinus ferulas etiã circumponunt, ipſas quidẽ conſtringentes, prout ſenſus, & tumor ex inflammatione (ſi qua adſit) poſtulat. veteres autem à die tantum ſeptimo, vel etiã nono, & undecimo ferulas accommodabant. Verum non abs re factum putamus, ſi ſtatim

ab initio post deligaturam, ferulæ iniiciantur, modo nimis premendo dolorem non excitent, aut phlegmonē) quæ maximè arcenda erat) accersant, vel presentem (si adsit) exacerbent. Quæ igitur à principio adhibentur à recentioribus ferulæ, non eo nomine adhibentur, circumponunturue, vt astringant, sed vt adaptationis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita, vtcunque fulciant. Primis namque diebus cum phlegmones deuitandę consilium vinceret, tutum non erat perfractum membrum ita ferulis premere. Cùm verò nullus iam amplius futurę inflammationis metus sit, aut ea, quæ prius fuit discussa, membrum aliquantò gracilius quàm pro naturali habitu apparuerit, (quòd intra septimum diem ferè solet contingere) tum licebit ferulas circumponere, & eas (vt fracturam stabiliant) validè satis astringere. Ferularum enim vsus idem est, qui & plagularum, seu spleniorum, nempe vt fractum os contineant, & deligationem stabiliant, ac firment. Suinto autem ferulæ, vt rectè præcipit Hippocrates, leues, id est, leuigatæ & planę: æquabiles, id est, neque in latus, neque in superiorem, aut inferiorem partem, distortę: in summis partibus, id est, extremitatibus, resimæ, id est leuiter deralesq; ac retusæ: minores hinc inde quàm deligatio est: & ea parte crassiores, id est, latiores, &

res, & ualentiores, quâ fractura erupit. Leues autem ferulas, idest, non asperas, adhibendas esse censet Hippocrates, ne sua asperitate, & inæquabilitate fractis partibus negotium facessant. Vtroque enim modo comprimunt. Ceterum quoniam fieri potest, ut ferulæ leues sint, non tamen æquabiles, ideo non solum leues, sed etiam æquabiles, id est, non distortas assuendas esse ferulas, monet. Quæ enim distortæ sunt, similiter, ut aspera, lædunt, ac illud insuper efficiunt, quod deligationem simul distorquent: qua distorta, pars etiam fracta distorqueatur necesse est: Simas præterea in extremis partibus eas deligi uoluit, id est, leuiter derasas, ac retusas in extrema parte, ac sua acutie articulum lædant, & æqualiter ubique partem fractam, propter æqualem suam crassitudinem, comprimant, quod certè fieri nullo modo debet. Vult enim Hippocrates ut supra locum fracturæ, hoc est media parte, ferula deligationem magis astringat. Hinc ea parte crassiores esse iubet. Quia scilicet locus is potissimum compressione ipsarum indiget. Vult itè minores eas esse longitudine, id est, aliquantò breuiores, quàm sit ipsa deligatio, ne cutem ultra deligationem attingant: quæ sepe numero ex eo, quod humores à fasciis expressos suscipit, paulò altiù turgescit, atq; extat. Sed &

breuioribus ferulis vtendum præcepit, ne pars eminentior, idest gibba, & carne nudata, attingatur, vt circa cubitum, & malleolos, vbi offiũ extuberationes sunt. Porro ferulæ ex ligno abietis, vel salicis, vel medietate canne latæ, vel de vaginis gladiatorũ, vel de cornu: vel ex ferro, vel corio constare debent. Modus autem ac ratio adhibendi ferulas, talis esto. Splenia triplicia, aut quadruplicia oleo delibuta, super fascias similiter atq; æqualiter, si membrũ in crassitie fuerit æquale, circũdato: si vero Inæquale partibus magis cõcauis, per splenia repletis, mēbrũ vndiq; æquale ferulis accõmodandis efficit. Deinde, ferulas lana, aut stappa mediocriter inuolutas in orbẽ, nõ minore, quã vnus digiti spatio inter se distantes fracturę circũdato, easq; leniter ac moderatẽ constringito. Sed & in hac ferularum accommodatione summopere cauet, quatenus fieri potest, ne articulus aliquis, & præcipuẽ interior flexus pars, ab eis attingatur. Ulcera siquidem in ipsis nonnunquam, & nervorum inflammationes pariunt. Itaque illic, hoc est, iuxta articulos ipsos deligatione aliquanto (vt diximus) breuioribus, tenuioribus, laxioribus, & magis flexibus ferulas esse oportet. quemadmodum valentiores, quã fractura excidit, atque inclinat. Cæterũ si nulla prurigo, nulla inflammatio, nulla suspecta exulceratio, nullus

nullusue dolor adest, & ossa rectè commissa sue  
 rint, fracturaque rectè procedat. sic manere fe-  
 rulas & ligamenta, ad decimum vsque diem,  
 vel quintum & decimum, aut etiam vigesimū,  
 vtile est. Si uerò in membro perfractio præter so-  
 litum cooperto, vel dolor excitetur, vel pruri-  
 tus creetur, vel eius, quod iam infixum fractu-  
 rz est, perspiratio prohibeatur, (propter quam  
 non modo noxius pruritus quibusdam accidit,  
 sed etiam erosa à saniei acrimonia nonnunquã  
 cute, exulceratio concitatur) non abs re fece-  
 ris, si tertio quoque die, vt iussit Hippocrates,  
 deligationem solueris, & membrum ipsum a-  
 qua temperata perfuderis, ac foueris. Hac n.  
 perfusione, & acrem atque erodentem sanie[m]  
 discuties, & dolorem mitigabis, & prurigini pul-  
 chre medeberis.

*De Fibulis, Cap. 14.*

**F**ibulis, quas Græci *πλατῆρας* vocant, in vul-  
 neribus interdū chirurgi vtantur, præsertim  
 ijs, quorum labra nimium sunt diducta. Si nã-  
 que in carne vulnus est, hiatque, neque in  
 vnum orz facile attrahuntur, sutura quidem  
 aliena est, imponendæ verò fibulæ sunt, quæ o-  
 ras paulum tamen contrahunt, quò minus la-  
 ta postea cicatrix sit: ferè autem fibulæ latius

vulnus esse patiuntur. Suntu autem fibule ipse, vel maiores, vel minores, pro ratione partis vulneratæ: ab vtraque verò parte recurru, figaturque hamus vnus in altero vulneris labro, & uersus alterum ducatur, in quo & alter hamus infigatur: vt facere solent, qui pannos tundendo apparant. Hæ autem (fibulæ inquam) qui bus hiantis plagæ oras sic contrahimus, nullam vim desiderant, sed eatenus vtilis sunt, quatenus cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Adhibentur autem fibulæ in vulneribus maiorib. & rectis in transuersis verò futuris, & fibulis opus est. Porrò præputium assuitur, & infibulatur, vt & carnosum genus, vbi nimium dehiscit vulnus, nec oræ facillè coniunguntur.

*De instrumentis extendentibus,*

*Cap. 15.*

**L**uxata membra, in solitam sedem extensione reduci à chirurgis solent: Verùm nō vna eademq; in omnibus extendendi ratio est, sed alia atque alia pro natura scilicet partis luxatæ, prout nerui ac tendines valent, aut ossa huc illucue sederunt. Modò enim manibus solis, modò habenis iniectis vtendum est, modò verò quædam alia machinamenta adhibenda sunt, vt ex uno Hippocrate lecto libro de luxatis & fractis, discere poteris.



## PRACTICAE GENERALIS

## LIBER VII.

## ARGUMENTVM.

De morborum curarione potissimum agit. Eius capita hæc sunt.

**D**E morborum curatione. Cap. 1.  
 De curatione morborum similium, Cap. 2.  
 De curatione tumorum præternaturam, Cap. 3.  
 De abscessum curatione, Cap. 4.  
 De curatione morb. instrumentalium, præsertim in cõformatione, secundum figuram vitiatam, Cap. 5.

Bb 4

De



*De curatione morborum in compositione, secundum cavitatem vitiatam, Cap. 6.*

*De curat. morborum in compositione ex superficie aspera, uel leui, C. 7.*

*De curatione morborum in compositione, secundum numerum, Cap. 8*


*De curat. morborum in compositione secundum magnitudinem, Cap. 9.*

*De luxationum curatione, Cap. 10.*

*De curatione vulnerum, Cap. 11.*

*De curatione vlcerum, Cap. 12.*

*De curatione fracturarum, Cap. 13.*



393  
PRACTICAE GENERALIS  
LIBER VII.

---

*De morborum curatione,*

*Cap. I.*

**S**uperioribus libris breuiter admodum, & quantum instituto nostro sufficere arbitrati sumus, causarum cognitionem, quae per signa habetur, perstrinximus, nunc reliquum est, ut in postremo hoc libro curandorum morborum praecepta tradamus. Itaque curatio id quod praeternaturam in corpore est, contrario illius tollit. Contraria enim contrariis curantur. Sunt autem in corpore nostro tria praeternaturae, Morbus, Causa, & Symptoma: & morbus quidem sui curationem: causa, sui ablationem, symptoma correctionem postulat. Morbus ille est, qui primo & per se actionem laedit: quare illi ante omnia incubendum. Causa vero morbifica est, & morbum fouet. Quare ante morbum est remouenda. Symptoma post morbi extirpationem corrigatur, nisi vehementia sua Medici curam ad se trahat. Verum cum morborum alij sint partium simularium alij partium instrumentalinum: alij vtriusque partibus communes; prius de simularium morborum curatione agere instituimus: deinde etiam de reliquis.

394 PRACT. GENERALIS  
*De curatione morborum simi-*  
*larium, Cap. 2.*

**S**imilium partium proprius morbus vitium  
temperaturæ est. Vitiata igitur temperatura  
curari debet. Curatio unam præcipuam, ac cõ-  
munissimam habet intentionem, ad id, quod  
est dispositioni auferendæ contrarium: indica-  
tiones verò habet varias, prout varijs confi-  
deratur modis: Quæ namque intemperies  
causas suas habet antecedentes vel procatarsi-  
cas, quæ ipsum morbum fouere possunt, prius  
quàm morbus curetur, causa remouenda est, a-  
lioqui morbus subinde recrudescet: quæ cum  
sit & ipsa præternaturam, nõ nisi contrario suo  
tolli potest. Quod si verò intemperies causas suas  
non amplius habeat, totus ad morbum aufer-  
endum incumbet. Quare intemperies simplex  
simplici contrario curanda erit: composita ve-  
rò, cõtrario mixtæ facultatis corrigenda. Curabi-  
tur enim id, quod ad calidius est conuersum,  
refrigeratione: quod ad frigidius inclinatum  
est, calefactione. Pari modo quod ad siccius est  
alteratum, humectatione & quod ad humidius  
est uersum, siccatione. Rursus quoque siccabit  
pariter, ac calefaciet, quod humidum est reddi-  
tum & frigidum: siccabit pariter, & refrigerabit  
quod humidius simul & calidius euasit, & sic in  
reliquis

reliquis duabus coniugationibus. Semper enim pro eo, quod exuperat inducendum eò vsq; cõriarium est, quoad particulam in symmetriã, & naturalem habitum uindicaueris. Cæterùm si intemperias materialis fuerit: qualicunque humor, vel qualitate, vel quantitate sua peccet, nõ solũ alterãda, sed etiam euacuanda erit, vi sequenti capite docebimus. Porrò quantum sit agendum indicat morbi quantitas. Refrigeratũ quinque gradibus, totidem calidis reducetur. Quomodo uerò, seu quo instrumento agendum sit, indicat morbi qualitas, causarum varietas; corporis situs, &c. Quando & quo tempore sit agendum, indicat morbi tempus tum vniuersale, tum particulare. Vbi denique agendum sit, locus affectus promptè indicabit. Atque hæc quidem omnis ægritudinis, quæ in similaribus consistit, methodus medendi existit.

---

*De tumorum præternaturam curatione, Cap. 3.*

**T**umor præternaturam, incrementum est, naturalem statum in corpore excedens, & lesionem actionis inducens. Horum differentia ex praxi speciali sunt petendæ,

Causæ

Causæ verò tumorū, recētoribus medicis & chirurgis geminæ statuuntur generales scilicet & speciales. Generales causæ sunt, fluxio, & cōgestio.

Rursus fluxionis causæ quatuor numero constituantur. Nempe membri propellentis robor: excipientis imbecillitas: humoris fluentis conditio: & spaciū, per quod fit defluxio.

Cæterū fluxio concitatur ratione membri expellentis, vel propter robor facultatis expultricis ipsius, vel propter connexum naturalē, quā habet cum membro excipiente, vel propter priorum meatuum angustiam.

Pars verò aliqua fluxionem excipit, quia vel dolens, aut calida, vel imbecillior, vel rarior, atque ignobilior, vel in inferiori loco sita.

Porro ratione humoris fit defluxus in aliquā partem, quia sit copia superuacua, qualitate molestus, substantia tenuis.

Spaciū autem fluxionis causa existit, ob meatuum amplitudinem, utpote venarum, articularum, & pororum.

Congestionis verò causæ geminæ assignantur, nempe error virtutis, quæ alteratrix dicitur: & imbecillitas expultricis.

Cæterū speciales tumorum causæ, tres vulgò assignantur. Primitiivæ, quæ & progressivæ, & evidentes nobis dicuntur: antecedentes: & coniunctæ, siue continentes.

Pro-

Progressæ seu primitiæ causæ dicuntur, quæ dum aduersam valetudinem seu morbosos affectus creant, separantur, vt casus, percussio, fractura, distensio, luxatio, aut error, qui in victus ratione committitur.

Antecedentes causæ dicuntur; quæ paratæ sût morbos efficere, ut sunt humores quatuor tam naturales, quàm non naturales.

Causæ uerò coniunctæ, seu continentes, sunt materiæ, quæ particula ipsa laborante aggregatæ, & infarctæ reperiuntur, quæq; adhuc permanent, postquam tumorem excitarunt: ac dum crescunt tumores ipsi augentur: cum decrescunt, minuuntur: & cum desinunt, finjuntur. Atque hæc de causis tumorum præternaturam dicta sufficiant: nunc postulat ordo, vt eorum signa, & iudicia subijciamus.

Itaq; tumores præternaturâ summa corporis occupantes; iudicio sensus, conspecta, ac manibus contrectata laborante particula, statim deprehenduntur. Tumores uerò, quæ vera apostemata appellant, tumore, dolore, & calore, magis, vel minus intensis dignoscuntur.

Non uera autē præter tumorem, malignitate quoq; & sequestratione etiâ maiore, vel minore determinata, deprehenduntur.

Sed iam quæ in uniuersum de tumoribus ipsis sumuntur iudicia subijciamus.

Periodi,

Periodi, paroxysmi, & crises tumorum, qui præternaturam sunt, humorum, ex quibus constantur, analogiam sequuntur.

Tumores eiusmodi præsertim salubres, & qui ex humorum influxu fiunt, quatuor temporibus distinguuntur: principio, augmento, statu & declinatione. Principij nota est, cum particula incipit distendi, & fluxionis adest initium, cum dolore adhuc exiguo.

Incrementum adesse iudicabis, cum videaris tumoris molem attolli, locumque affectum impleri, ac symptomata manifestè augeri.

Status verò iudicium est, cum prædicta omnia, tumor scilicet, & symptomata, vigorem suum obtinent, nec amplius possunt incrementum assumere, quin materia læciens tumorem, in alterius generis substantiam degeneret, & transmutetur.

Declinatio autem tunc adesse cognoscitur, cum tumoris moles, & propria ipsius symptomata, imminuuntur: vel materia, quæ tumorem facit, in altam substantiam incipit transmutari.

Porro tumores huiusmodi, qui ex humorum præsertim fiunt influxu, nisi fieri prohibeantur, reprimendo materiam influentem, vel sponte, & citra ullam manifestam occasionem intrò re  
currente

currete fluxione delitescant, aliquo istorum quatuor terminari necessum est, insensibili exhalatione seu resolutione, vel facta suppuratione, vel corruptione, vel induratione.

Omnium autem. istorum modorum optimus is est, qui per sensu imperceptibilem fit dissolutionem: post illum vero, qui per suppurationem.

At quæ per indurationem fit terminatio, absolute mala dicitur. Quæ autem fit per corruptionem particulæ laborantis, omnium pessima censenda est.

Resolutionis indicia sunt, leuitas membri, & deficiens pulsatio.

Signa, tumorem verti in suppurationem, indicantia sunt, dolor internus, pulsatio, & caloris incrementum.

Fluxionem vittricem, esse, & particulæ laborantis corruptelam, testantur nigror, & liuiditas, quibus nonnunquam & graucolentia accedit.

Tumorem in lapideam abire duritiem, aperte demonstrat, tumoris imminutio, & cum hac, durities remanens.

Regressionis vel delitescentiæ nota est, subita tumoris diminutio, quæ interdum propter nimiam refrigerationem, nonnunquam vero propter venenositatem accidit. Ad hanc autem subitam atque affaam factam tumoris imminutionem,



tionem, febris statim consequitur, ac multa alia praua symptomata. Haecenus de signis & iudiciis eorum tumorum, quos vulgò apostemata nuncupant: tempestiuum nunc est, vt ad eorum curationem accedamus.

Principium itaque curationis tumorum, ex humorum influxu procreatorum, ab inuentione occasionis ipsius affectus, desumemus, vt scilicet, quae eum excitant causae abscindantur: quod verò in eo iam factum est, tollatur. Quare ex omnibus his, tres colliguntur recentiorum chirurgicorum turbæ, curandorum tumorum, qui ex defluxione ortum habent, intentiones,

Prima est, fluxionem auertere, ac eam omnino intercipere.

Secunda est dolorem demulcere, atque eam occasionem, propter quam particula fluxionem excipit, vel etiam attrahit, in totum sum mouere.

Tertia est, totum eum humorem, qui in partem affectam confluit, vacuare.

Quomodo autem prima intentio perfici debeat, appositè docuit Galenus lib. 13. methodi medendi, ad hunc modum scribens. Vbi magna sanguinis copia in toto corpore appareat, vt in phlegmonosis tumoribus, sæpenumero fieri cōtingit, sanguinis missione succurrim⁹. Curatur etiā pleni-

plenitudo, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum multa frictione. Preterea digerentibus medicamentis, modò febris non adfit, & præter hæc omnia inedia, ac proba victus ratio ne. Cum uerò flaua bili, vel atra, pituitane, aut serosis humoribus refertum corpus est, purgatione, quæ cuiq; suppuranti succo sit accommodanda, vacuatio molienda est.

Ceterum in contrarium reuulsio, commune est in omnibus huiusmodi tumoribus auxiliū, dum fluxio adhuc ualenter irruit: utpote in principio morbi, & in augmento. In fine uerò status & in ipsa declinatione, dum scilicet iam fluxio restiuit, atque in membro inhæsit, & corpus totum abundè vacuatum est: uel ab ipsa, quæ affligitur particula, uel à maximè uicina vacuatio molienda est.

Secunda intentio completur anodynīs remedijs, item astringentibus, & intercipientibus fluxionem. Ad hæc relaxantibus naturales meatus, per quos membrum affectum consueuerat reprimari.

Tertiam uerò intentionem assequemur, ijs, quæ materiam, tumorem excitantem à loco affecto euacuant. Euacuantur autem contenta iam in loco materia non solum medicamentis resoluentibus, sed etiam repellentibus. Itaque incipientibus tumoribus, qui ex influxu hu-

morum procreantur, magis utendum est reprimentibus, quàm euaporantibus, nisi tumor eiusmodi fuerit in emundatoriis: vel materia fuerit venenosa: vel crassa, & repulsiōi inobediens: vel uehementer impacta, tunc enim repellere non licei, sed potiùs discutientibus lenibus, ac moderatè calidis, & humidis utendum: In augmento verò ipsis repellentibus, nonnihil exijs, quæ discutunt, admiscendum.

At in statu, & paulò ante statum, æquis portionibus miscenda sunt reprimentia discutientibus.

Cum autem declinatio, vel finis status adfuerit, solis resoluentibus, & relaxantibus uti licebit. Breuiter quandiu humor adhuc affluit, repellendum est: ubi uerò iam restitit fluxio, digerendum. Verùm si medio modo res sese habeat, mixtis auxilijs uti oportebit.

Porrò hæc omnia sanè intelligenda sunt, utpote si tumor præternaturam resolutione terminari debeat. Auxilia autem, quibus singulas modo dictas intentiones exequimur, pro uaria materia tumorem excitante, in praxi speciali describentur.

*De abscessuum curatione,**Cap. 4.*

**A**bscessus, qui Græcis apostemata, & vulgò exituræ dicuntur, sunt dispositiones, in quibus abscedunt, atque inuicem distant, quæ priùs se contingebant corpori. Materia enim quæ eiusmodi tumores excitat, extra carnem musculi propulsa, continentia à subiectis diducit, & abscedere facit. Duplex autem est eiusmodi abscessuum genus. Vnum quando inflammatione in pus versa, pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum: alterum cum nulla præcedente inflammatione, humor aliquis, vel spiritus aliquis vaporosus, aut substantia ex utrisque mixta, in parte aliqua colligitur. Quod bifariam accidit. Nam vel in spacio ipso eiusmodi substantia, sine præuia fluxione generatur: aut aliunde in ipsam laborantem particulam confluit. Spatium autem sibi molitur eiusmodi substantia, quæ abscessum creat, vel inter duas tunicas, vel sub quibusdam membranis. Abscessuum verò iudicia, ac signa, quæ vel statim eos futuros denunciant, vel iam presentes adesse demonstrant, hæc sunt.

Cum uideris pulsationem, aut duritiem, in longum iam tempus productam, uel caliditatem, aut dolorem incrementem, tunc

existima proximum esse, vt apostema in suppurationem vertatur, & fiat abscessus. Cùm autè deprehenderis leuitatem quandam affectæ particulæ, & doloris sedationem, ac remissum calorem, quodque tumentis loci pars aliqua ceteris emineat, atque in mucronem subducatur: adhuc cùm premendo digitis velut inundationè perceperis, viderisque gibbi illius seu mucronis colorem iam albescere, tunc iudicatus est loci subesse, & tumorem iam abscessisse.

Cæterùm in pure ipso cognoscendo, ac diiudicando, maximè te attentum esse oportet.

Quandoquidem suppuratio ipsa seu puris in loco aliquo comprehensi notitia, sæpiùs occultatur, ac Medicum latet, ob loci scilicet, & puris crassitudinem.

De abscessuum autem iudiciis hæc à veteribus, & recentioribus tradita sunt.

Abscessus, qui iuxta membrum aliquod nobile, vel prope iuncturas sit, atque ad eò in venosis aut nervosis ipsis partibus, quibus in imbecilli particula, & natiuo calore propemodum deslituta prædura quoque & densa cute obiecta, consistit: ad hæc qui crassiore materia, & ad motum tardiore constat: planus etiam, seu æquabilis, & in coniformulam non subductus, suspectus admodum est, ægreque ac tarde maturatur. Qui vero huic ex aduerso respondet, boni moris est, & lauda-

laudabilis. Itaq; si abscessus tendit in acutiem, & puris substãtia tenuis fuerit, & acris, nec prædura, aut densa cutis extiterit, natura, sua facultate alienorum expultrice, & citra aduentitiũ aliquod subsidium, conceptum humorem foras propellet, nisi quis facta incisione protinus ipsam spontaneam apertionem anteuertat. Quæ autem à natura fit apertio, multò tutior est, ea quæ manus opéra fit: quod si arte molienda sit, securius multo, & melius scalpello illam efficiet, quàm adurente medicamento, quod ruptorium appellant. Ceterùm pus optimum illud censetur, quod album, æquale, lenèque, & quàm minimè fœtidum est. Quod uerò huic maximè contrarium apparet, pessimum est. Sed hæc de signis, & iudiciis abscessuum sufficiãt. Quod ad eorum curationem attinet, ea per initia præstatur per mitigatoria auxilia, quæ Græci chalastica uocant, id est, relaxantia, cuiusmodi est tetrapharmacum, molle quidem, & anodynum.

Procedente uerò tempore, ad ea, quæ concoquendi, seu maturandi, ac suppurandi vim habent, transeundum est. Auxilia autem quibus mouere pus expediat; ex libro quarto petenda sunt.

Porro suppurato iam abscessu, aut transmutato, vel ualèter impacto, si pus, aut alia quæuis materia ibi contenta non discutiatur, vel si tem

pore conuenienti, & dum iam tempeſtiua adefſe  
 occaſio, citra manus operam, nō aperiatur, ſeca  
 re exitum ei, quod digeſtioni nō ceſſit, oportet.  
 Cōiter autem eiufmodi tumores ſcalpello inci  
 duntur. Apertio uerò ipſa, pro ratione tum co  
 piz materię ibi collectę: tum etiam ipſius loci  
 affecti, fieri debet. Fiunt autem huiufmodi ſe  
 ctiones, myrtaceum foliū imitantes, in ijs potiſ  
 ſimū tumoribus, qui in axillis, & bubonibus  
 ſuppurant. Et in ijs quidē lōgitudō per trāſuer  
 ſum ducta eſſe debet, nō aut per cruris, aut cor  
 poris reſtitudinem. In aliis uerò locis incifione  
 ſimplici ſerē ſemp utimur. In ipſa aut apertio  
 ne, ſine incifione, ſeptē potiſſimū ſunt attēdēda  
 Primum, vt ſectio fiat eo loco; quo materia  
 contineatur.

Secundum, vt fiat in loco inferiori, quò me  
 lius purulenta illa uacuari poſſint.

Tertium, vt fiat ſecundum rugas, & procef  
 ſum muſculorum.

Quartum, vt vitentur nerui, uenę, & arterię,  
 quoad fieri poterit.

Quintū, vt nou tota materia ſemel, atq; affa  
 tim educatur, pſertim in magnis abſceſſibus, ne  
 ſcilicet ex nimia ſubitaq; inanitione, & ſpiri  
 tuū reſolutione, uirtutis ſequatur proſtratio.

Sextum, vt blandius, & minimo quā fieri  
 poteſt, dolore, locus tractetur.

Septi-

Septimum, vt facta a pertione, locus detergeatur, carne impleatur, & ad cicatricem perducat. Auxilia autem deterforia accommodata, sunt mollia tomenta, vel lintea, concerpta linimenta, emplastra, & vnguenta, quæ in speciali praxi censentur. Primis diebus sufficit vitellus oui alumine zuccharino inspissatus. Polleã verò deueniendum est ad mel rosatũ, & mũdificatiuum ex apio: & postremò, ad vnguentũ Apostoloiũ, & Aegyptiacum, si res ita desideret. Suprà verò admouenda vnguenta, basilicũ, diachylum, & diaphœnicũ vulgò nũcupatũ, atq; alia id gen<sup>o</sup> quæ ad vlcera instituũtur. Sed & mitigare prius incisam partẽ, quãtũ poscere videbitur, oportebit: fomentis primũ, deinde cataplasmatibus, mox humectante aliquo medicamento, aut non siccate, singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere tum manna, tũ ex præsijs, quæ linteolis excipiũtur, primũ quidẽ ea, quæ pus mouent, deinde ea, quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si cauitas etiam mansit, quæ impleant adhibenda sunt: sin aliter ea, quæ cicatricẽ inducunt. Porrò si laborans, scalpello sectionem fieri præ mollietate, non admiserit, medicamentis adurentibus erit emollienda a pertio. Ad hoc autem conducit semẽ lini, fermentũ, & stercus columbinum. Hæc præstantiora efficies, si cum sapone molli, aut muccagine seminis sinapis miscueris.



Quod uerò ex calce, & sapone fit ruptorium, in hac re principatum obtinet.

*De curatione morborum instrumenta-  
tialium præsertim in confirma-  
tione, secundum figuram  
vitiatam, Cap. 5.*

**P**ost morborum similarium curationem, succedunt morbi in compositione vitiata, quæ instrumentalium partium propria est. Verùm cum uariæ sint compositionis differentiæ, primum de ijs morbis agemus, qui conformatiõnem uitiant. Hæc autem in cavitare superficte, potissimum uerò in figura posita est. Membri itaque figura uitiatur, uel in utero matris, uel post generationem, à causa aliqua uel interna, uel externa, ut Medico, uel obstetrice. Quod in utero matris uitiatũ est membrum, ante augmenti finem, cum corpora adhuc crescunt, emendari potest, in aliquibus partibus, non in omnibus. Verbi gratia vari quidã, aut ualgi: post augmentum uerò corrigi nequit, præsertim cum iam obdurerũt mēbra. Quod uerò ab obstetricis, uel chirurgi in curia, os fractum male coaluit, ita ut figura sit uitiata, & intorta: & siquidẽ callus obductus fuerit recens, corrigi potest, si os de-

quò

nudè perfringatur, & tum demum per conueniē-  
tis calli superinductionem curetur. Si uerò cal-  
lus obductus fuerit antiquus, & inueteratus,  
morbus erit desperatus.

Porro pro curatione uitiatę figurę, tres no-  
bis intentiones considerandę erunt: quod scili-  
cet sit agendum: quibus instrumentis: & ubi sit  
agendum.

Quid sit agendum; indicabit morbi natura.  
Conformatio secundum figuram uitiata est. Re-  
stituenda ergo, siue curanda suo contrario: hoc  
est, contraria figura ei, quę nunc est, molienda e-  
rit, ut à figura non naturali in naturalem com-  
mutetur siue transferatur.

Quibus autem instrumentis figura uitiata cor-  
rigatur, ars chirurgica docebit: utpote ligatu-  
ris, ferulis, puluillis, uinculis, frictionibus, &c.

Ubi uero sit agendum, locus affectus indica-  
bit, qui sensui oculorum subijcitur.

*De curatione morborum in compositi-  
tione, secundum cavitatem vi-  
tiam, Cap. 6.*

**C**avitates uitiantur, quia uacuum tollitur.  
Tollitur uerò obstructione, uel angustia, à  
quibus actio immediatè leditur: Fit autem ob-  
structio à materia aliqua replente. Angustia ue-

ro meatuum à materia distendente. Curantur  
 contrario: angustia quidem dilatante: obstru-  
 ctio verò aperiēte aliquo. Sic ergo quinque no-  
 bis indicationes sunt perpendendæ: uidelicet  
 Quid sit agendum: Quantum sit agendum: Quo  
 modo: Quando, & Vbi.

Prima indicatio p̄cipua est. Quoniã à morbi  
 causis sumitur: atq; ad illam reliquæ quatuor  
 indicationes ueluti famulæ referuntur. Cavitas  
 enim necessario à materia aliqua obstruitur,  
 aut repletur. Qualiscūq; ea fuerit, auferēda est,  
 ut ad naturalē habitū pars affecta redeat. Hoc  
 autem fiet, si id quod obstruit, remoueatur per  
 euacuationē, & educationē extra corpus. Ut lapis  
 in uesica per sectionē auferatur: stercus durum,  
 intestina obstruēs, pharmaco leniēte educitur.

Quantum autem sit agendum, indicabit no-  
 bis, virtus, ætas, anni tempus, morbi natura, &  
 causa, &c.

Quomodo uerò, quibus instrumentis agen-  
 dum sit, indicabit nobis tū causa morbi, an vi-  
 delicet pharmaco, an phlebotomia cōmodiūs  
 educi queat: tum pars affecta. Intestina namq;  
 tum per clysteres, tum iis, quæ per os sumūtur,  
 euacuari possunt. Vterus uerò pessis, & clysm-  
 atibus. Caput apophlegmatismis, & errhinis: tho-  
 rax eligmatis: renes, & uesica, diureticis, &c.

Porro tempus oportunum agendi erit, cūm

nihil impedit actionem istam, nec ratione materiae nec ratione viarum. Vt si materia fuerit crassa, prius incidenda: viscida detergenda: bilis acrimonia prius retundenda: stercus durum prius emolliendum: viz, per quas educenda est materia, prius lubricanda: obstructa, prius aperienda, &c.

Per quas autem vias, materia sit educenda; anatomicae ipsa nobis demonstrabit. Nam cerebrum per nares, & os purgatur: ventriculus vomitu, & secessu: thorax, & pulmo, tussi: intestina per secessum: hepar, & renes, per urinam: lien, per haemorrhoides: cutis, per sectionem, per cauteria, &c. Atque haec de obstructione in uniuersum nobis sufficiant.

*De curatione morborum, in compositione, ex superficie aspera, & leui. Cap. 7.*

**Q**uemadmodum superficies partis instrumentalis, vel leuis, vel aspera, pro membri ipsius usu, a natura primum conformata est, ita quoque vitatur, & praeternaturam efficitur superficies ista, quia vel mutatur naturalis illius leuitas, vel asperitas.

Causae asperitatis sunt vel internae, vel externae. Internae causae sunt humores acres, & erodentes

dentes, qui cuticulam exteriorē impetentes, illam erodunt. Potest itidem melancholicus, & adustus, aut pituitosus & falsus aliquis humor ad cutim protrudi, vt in senib. fieri videre licet, qui idcirco scabie frequenter laborāt: præterea in ijs, qui elephantiasi tenentur. Interdum à capite in pulmones huiusmodi humores destillant, atque sic guttur, & asperam arteriam exasperant.

Externæ causæ sunt, medicamenta abstergentia, erodentia, & astringentia, puluis, tumus, secantia, frangentia, &c. Leuitatis uerò causæ sunt, humor pinguis, vel viscosus.

Signa manifesta sunt, cùm oculis & tactu deprehendantur.

Iudicia uerò ab ipsa parte affecta sumuntur. Siquidem in osse caries periculosior: & ob id difficilius, quàm in cute asperitas curatur.

Quod ad curationem attinet, curatiuæ eliciendæ sunt indicationes, vt sciamus tum Quid sit agendum: tum Quomodo seu quibus instrumentis curatio sit aggredienda: tum Quantum: Quando. & ubi sit agendum. In asperitate itaq; Quid faciendum sit indicat primo morbi causa: deinde morbus ipse. Morbi causa, siue interna, siue externa fuerit, indicat sui ablationem. Morbus uerò ipse, indicat nobis, id quod exasperatum est, esse denuò leuigandum.

Quo-

Quomodo autem, seu quibus instrumentis sit agendum, nobis ostendet particula affecta, & morbi causa. Siquidem cutis ab astringentibus aspera reddita, tollitur ijs, quæ eam laxare, & terrenam frigiditatem leuiter remittere possunt, qualia sunt oleosa, & pinguia omnia. Humore verò acri, vel erodente inæqualis facta, qualifcunque is fuerit, per pharmacum conueniens auferendus erit: deinde cutis asperitas, per lotiones, vel munctiones, remouenda. Sic os, quod ex vulnere, aut fractura inæquale, aut ab humore acri cariosum est redditum, abradendū erit. Ad eundem modum aspera arteria lenienda erit medicamentis liquidis, quæ non mordeant, sed lentorem habeant, &c.

Porro Quantum sit agendum, indicabit morbi ipsius magnitudo; deinde etiam affecti loci natura, prout magis, vel minus leuis pars antea erat.

Quando verò agere oporteat, indicabit morbi causa, & instrumenti qualitas. Siquidem morborum causæ semper prius auferendæ erūt: deinde topica administranda. Sic lotionibus, balneis, sudoribus, frictionibus, &c. ante cibum utendum erit.

Vbi denique sit agendum, oculorum sensus demonstrabit, in parte scilicet affecta.

Cæterum interdum naturalis superficiæ aspe-

ritas vitatur, & leuis fit, ab iis, quæ leuiter non naturalem inducere possunt: cuiusmodi sũt humores viscosi, & pinguia omnia. Pro huius curatione, Quid agendum sit, constat: uidelicet causas prius esse auferendas: deinde id quod leuigatum est, denuò esse exasperandum. Hoc quidem ijs fieri poterit remedijs, quæ leuiter incidunt, & detergeant. Reliquæ indicationes à præcedentibus fontibus perantur.

*De curatione morborum in compositione, secundum numerum,*

*Cap. 8.*

**I**N numero morbus accidit, cum pars instrumentalis, vel integra & tota, vel aliqua illius particula, deficit, aut excedit numero.

Quod numero superabundat, vel secundum naturam est, vel præternaturam. Secundum naturam est sextus digitus: caput geminum, &c. Præternaturam uero, ut calculus in vesica, lumbrici in intestinis: uaticæ, tuberculæ, pterygion in oculo, &c.

Causæ numeri superabundantis; & quidem naturalis, utilis materiæ multitudo est: præternaturalis uero, inutilis materiæ copia.

Causæ numeri deficientis, sunt, vel vstio, resectio, putrefactio, vel refrigeratio.

Sig

Signa numeri abundantis, vel deficientis manifesta sunt.

Iudicia verò, ab ipsius morbi & particulæ affectû natura, & tempora sumuntur. Caput enim geminum citra vitæ periculum curari nequit: suffusio, citra oculi læsionem vix adimitur. Pars quæ à primo ortu deficit, restitui nequit. Ad eundem modum spermaticæ partes non restituantur verè, sed substantia diuersi generis, quàm callum vocant.

Quod ad curationem attinet, ea secundum indicationes suas dirigenda est. Quare in numero abundante, Quid sit agendum, morbus indicat. Numerus superadditus est: itaque suo contrario tolletur, ablatione videlicet, quæ prima est, & potissima intentio in hoc morbo.

Quomodo verò, seu quibus instrumentis auferenda sit pars, ferro, igne, an caustico, docebit particulæ natura, & dignitas. Vbi sit agendum, partis affectû constructio indicabit.

Porro numerus deficiens, siue integra pars, siue partis particula fuerit, restituenda est. Restituitur autem pars, & quidem carnosâ, per substantiam similem: spermatica verò per eam, quæ callum generant.



*De curatione morborum in compositione, secundum magnitudinem,**Cap. 9.*

**M**agnitudo partis, interdum præter modum naturæ à prima generatione increfcit, vel minuitur, vt actionem impediat. Nonnunquam post ortum animalis augetur plurimum, vt in priapismo, carne supercrescente vlcera: mammas, & testiculis auctis videre licet: interdum verò minuitur, vt in tabe, atrophia, phthisi oculorum, &c.

Causæ autem, ob quas partes augentur, sunt utilis materiæ multitudo, uel virtus ualida. Imminutæ uerò magnitudinis, utilis materiæ defectus, uel uirtus imbecilla.

Signa visui manifesta sunt.

Iudicia uerò à morbi tempore desumuntur. Nam quæ à prima generatione plurimum auctæ uidentur partes, uel imminutæ, diuque ita permanferint, cura tionem non recipiunt: quæ uerò post animalis ortum originem traxerunt, magnitudines, uel imminutiones, curari aliqua ex parte possunt. Porro similes ferè habent intentiones curatiuas, morbus in magnitudine, & numero uitiato. Vtrobique enim est uel excessus, uel defectus: quare et uel additio, uel ablatio.

Diffc-

Differunt tantum, quod in numero aucto interdum tota pars auferenda est: at in quantitate aucta nunquam tota pars, sed id tantum, quod in parte redundat, sic ergo in magnitudine aucta indicationes eliciendæ sunt. Quid videlicet agendum sit: Quantum: Quomodo, seu quibus instrumentis: Quando: & Vbi

Prima, & præcipua intentio est Ablatio, quæ eadem quoque erat in numero aucto.

Porrò quantum sit auferendum, indicabit partis magnitudo naturalis.

Quomodo verò, Quando, & Vbi, partis atque morbi natura demonstrabit.

Cæterum magnitudo partis imminuta est. Reficienda igitur est, per generationem similis, aut certè dissimilis substantiæ. Cuius eadem est ratio, & idem medicamentorum vsus, quæ etiã in numero erant deficiente.

---

*De curatione luxationum. Cap. 10.*

**L**uxatio inter morbos compositionis refertur: quoniã situs mutatus est. Luxatio enim est articuli è natiuo positu, seu proprio acetabulo, in alienam, atque insolitam sedem prolapsus, quo motus arbitrarius impeditur: Græci exarthrema vocant.

Causæ luxatorum ossium, sunt vel intrinsecæ, vel extrinsecæ. Extrinsecæ sunt casus, percussio, & violenta, atque incongrua membri alicuius

extensio, aut distortio, seu peruerso. Internæ sunt, ut cum mucosus aliquis humor, & pituitosus, in articulis, seu iuncturis acervatur, qui articulationis ipsius ligamenta primùm madefacit deinde laxiora reddit, & tandem ob eius multitudinem, sua sede os ipsum protrudit.

Signa sunt, tumor ea parte, qua os prorūpit, & sinus, seu cavitatis insolita ea, à qua recessit dolor: motus priuatio, aut difficultas &c.

An verò curari valeat, indicabit nobis pars affecta: symptomata: ætas: & tempus. Nam caput si in posteriorem partem prolabitur (ut inquit Celsus) nunquam in suos sinus compellitur, sed mortem statim adfert ineuitabilem. Sic neque in spina vertebræ cum toto loco mutatae sunt: neque etiam maxilla, quæ vtraque parte prolapsa est, & antequam reposita sit, inflammationem concitauit. Genu ut facile prolabitur, sic non magno impendio in suam rursus sedem compellitur. Digitorum luxatio nullum etiã facessit negotium. Cubitus verò ut taruius quidem, ac difficilius excidit, ita prolapsus negotij plurimum exhibet. Humerus autem, ut neque difficulter admodum præsertim in macilentis, elabitur, sic nec difficillimè in sedè suâ reponitur. Porò quibus luxationibus inflammatio, aut vulnus, aut dolor ingens, & acris accedit, hæ præterquam quòd curatu admodum difficiles sunt, periculo quoque non vacant. Lu

xatio præterea, in qua ossium margines franguntur, pessima indicatur. Articuli qui neruorum, ac ligamentorum vitio prolapsi sunt, & postea in suas sedes repulsi, iterum excidunt. Quo loco suo non sunt, caro ea increfcit, magisque in proximo membro, quam in vltiore. Quibus in pueritia articuli exciderunt, neque repositi sunt, minus, quam ceteri crescunt.

Vetustæ omnes luxationes, & quæ spatie temporis iam callo obdaerunt, vel difficillimè, vel nunquam consanescunt. Proinde statim, si fieri potest, reponi luxata debent.

Indicium autem euidentis ossis in suam naturalem sedem reducti, est, cum veluti strepitus aliquis auditus est, dum in natium suum acetabulum ingrediebatur, & membri nuper luxati figura, & conformatio, suæ ipsius, aut alterius paris figuræ, quam similima tum visu, tum tactu deprehenditur.

Quod verò ad curationem attinet, tres luxationis intentiones curatiuæ nobis occurrunt.

Prima, luxati articuli in naturalem sedem reductio. Secunda, conseruatio articuli in sua sede, ne amplius excidat. Tertia, symptomatum correctio, quæ impediunt scopos prædictos, siue ante repositionem ossis, siue post repositionem accidant. Porro vt scopum, seu intentionem primam assequaris, luxatum membrum in diuersas partes deceuter extendendum est, donec

spatium inter ossa liberum sit. Tum id os, quod suo loco excidit, ab ea parte, in quam pro lapsum est, in contrariam impellere oportet, atque ita in germanum suum acetabulum restituere: ut sinus seu cavitatis insolita vacuitas impleatur. Hæc autem leniter, & sine dolore, quatenus fieri licet, agenda sunt. Cæterum non vna eademq; in omnibus extendendi ratio est: sed alia atque alia pro natura scilicet partis luxatæ prout nervi, ac tendines valent, aut ossa hoc illucue federunt. Modo enim manibus solis, modò habenis iniectis utendum est, modo verdò, quædam alia machinamenta adhibenda sunt, ut ex uno Hippocrate discere poteris.

Secundus scopus est, ut membrum, quod exciderat, & iam repositum est, non amplius deinceps sua sede plabatur, sed inibi psillat. Repositi igitur articuli iunctura, modis omnib. statim firmâda ac roborâda est. Firmabitur autè optimè si rosaceo plinaur, ac postea pannus aliquis lineus gracilis, vetus, & lenis rhodino delibutus, ipsi applicetur: deinde si supra lenes, ac panni multiplices, ouorum candido perfusi, super accommodentur, & postrenò, si fascijs postea madentibus, pro ratione particula lōgis latisq; subligetur. Quinetiam serula ex corio, aut deâta papiro facta, si necessitas requiret, circumdandæ sunt. Nec verdò ante diem septimum, aut decimum, ipsum resolvere oportet, sed ita sinere.

Porro

Porro luxato in suam sedem reposito, ipsum a dolore, & inflammatione vindicandum est: qui tertius est scopus in curandis luxatis, medenti propositus. Hunc igitur consequeris, si quæ roborant & repellunt, parti luxatæ adposueris: si præterea tenuem ab initio probamque victus rationem ægro imperaueris, illique venam, si nihil prohibeat, secueris: & ventrem, si opus est, purgante medicamento subduxeris. Verum si ante quam ad curationem voceris luxata pars iam dolore infestetur; aut inflammatione occupetur, non prius eam in locum suum, a quo exiit, reponere tentabis, quam dolor finitus fuerit, & inflammatio conquiescit. Cæterum si luxatis ossibus vulnus quoque accessit, multa diligentia opus est. Si verò cum fractura luxatio euenierit, hæc primum si fieri possit: illa verò secundo curanda erit. At si antè fracturæ administrationem luxatum commodè reduci non possit, fracturam ipsam primum curabimus, deinde cū fractura callo iam obfirmata fuerit, luxationis curationem aggrediemur. Quod si luxatio inueterauerit, & callosa inibi durities contracta fuerit, ea decocto maluz & althez perfundenda est: deinde vnguento dialthez collinenda: post hæc emplastrum diachylon super apponendum erit: vel eius loco lana succida mucilage quapiam emoliente delibuta: vel id genus aliu emolientia. Loco verò sufficienter

422 PRACT. GENERALIS  
emollito, luxatum in suam sedem dandum est.

*De curatione vulnerum, Cap. II.*

**H**Aecenus de morborum similarium, & instrumentalium curatione: reliquum est, ut quomodo soluta unitas sit curanda, doceamus, initium à vulneribus sumentes. Itaque vulnus solutio est continuitatis, recens, cruenta, sine pure, in particulis mollioribus extrinsecus incidens. Continui autem solutio, morbus communis est tum partibus similaribus tum instrumentalibus: primo tamen ac magis proprie similaribus partibus conuenit, atque attribuitur, quàm compositis.

Causæ verò recentium vulnerum sunt, quæcunque extrinsecus aduentitia vulnerare, perforare, incidere, abrumpere, contundere, ac distendere possunt: cuiusmodi sunt, ensis, baculum, lapis, globulus plumbeus vel ferreus, tela, sagittæ, morsura, &c.

Signa vulnerum non aliunde petenda sunt, quàm ex iudicio sensus, sed visus maximà.

Iudicia verò, seu signa prognostica, desumuntur ex substantia, usu, atque actione affectæ, cuiusque particulæ. Et præterea ex propria ipsius affectus essentia: item ex symptomatis, quæ vulneribus ipsis accidunt. Sunt enim quædam læthalia ex necessitate, quædam verò non ex necessitate, sed magna ex parte talia esse cõsueverunt:

runt contrà verò quædã omnino sanabilia: quædam, vt plurimum. Ex necessitate læthalia sunt, quæ cordis substantiam penetrant: item vulnera magna, ac profunda substantiæ cerebri iecinoris, diaphragmatis, stomachi, ventriculi, æspere arteriæ, pulmonis, lienis, cystis, fellis, renum, & tenuium intestinorum. Vulnera verò ea non ex necessitate, sed secundum plurimū mortalia dicuntur, quæ ad regionem prædictarum partium peruenerunt, vel eas leuiter ac superficialiter duntaxat attingunt non autem præaltè adiguntur, nec affatu digna sunt. Ad hæc quæ in capite musculorum accepta fuerūt, Spasmus ex vulnere lethalis est, id est, valde periculosus. Membra autè particularia ex accepto vulnere iudicantur emortua, quando principes, ac maiores venæ, arteriæ quoque & ossa, à quibus vitam, nutritionem, & fulcimentū accipiebāt, penitus excisa sunt, & destructa. Iudicantur itidem membra ad vsum à natura institutum fore inepta, & perpetuè impotentia, quando nerui, tendones, & ligamenta penitus sunt abscissa, & destructa: suamque protinus actionem perdunt.

Porrò vulnera ea omnium tutissima sunt, quæ in boni succi corporibus, & in locis carnosis accepta sunt, vbi & nerui pauci, & venæ, & arteriæ non multæ reperiuntur. Ad hæc quæ diuisionis magnitudinem non habent. Vulnera autem,



quæ vt plurimum sanabilia dicuntur, mediâq; inter duo dicta extrema (nempe omnino sanabilia, & ex necessitate lethalia) naturam sortiuntur, ea sunt, quæ in capite musculorum carnosorum longè à iuncturis & temporibus: item quæ in caluaria, thorace, & ventre incidunt, &c.

Cæterùm vulneris communis curandi indicatio, vnitio est. Contraria enim contrariis curantur. Hæc autem prima ac generalis indicatio perficitur partim à natura, partim à Medico, partim ab vtrisque. Sic ergo vt propositum finem assequamur, quinque nobis intentiones obseruandæ sunt,

Prima, vt ea, quæ vnionem impediunt prius amoueamus.

Secunda, vt solita vnitas reficiatur, seu colligatur.

Tertia, vt ea in unum iam commissâ, & coacta, ita conseruemus.

Quarta, vt ipsam partis læsæ substantiam tueamur, ac salubrem seruemus.

Quinta, vt accidentia, vulneribus succedere consueta, corrigamus, ac propulsemus.

Primam intentionem assequemur dilatando vulnus, si non satis dehiscat, aut si eius labris aliquid intercidat extraneum, vt pote pili, lordes vel ossis particula aliqua pvgens, & aspera, aut telum aliquod infixû, vt sagitta: vel mucro, vel aliquod aliud extrinsecus incidens, cuiusmodi

est spina, vel harundo. Atque vbi satis diducta fuerint labra vulneris, digitis aut vossella, vel forcipe, aut alio id genus instrumento, quod infixum est, aut labris vulneris intercudit, apprehendi debet, & leuiter, ac (si fieri possit) citra dolorem euelli.

Secundam intentionem in curandis vulneribus (quæ est commissio dissidentium, seu distantium partium coniunctio) assequimur per orarum adductionem, seu labiorum vulneris iuicem distantium attractionem, & applicationem, membrum ipsum læsum quàm fieri poterit lenissimè tractando, Quæ autem diducta sunt in idem adducuntur, aut fascia sola, orbiculatim circumdata, præsertim si vulnus fuerit paruum: sin magnum, aut futuris, aut fibulis opus est; impositis simul glutinatoriis remediis. Huc etià puluilli possunt referri. Quomodo autem vulneris futura, deligaturaq; item puluillorum applicatio, fibularumq; affigatio sit perficienda, lib. 9. ca. 7. 9. 11. & 14. dictum est. Facta hac coniunctione labiorum à Medico, natura ipsa per se coalitum, & conglutinationem molitur, expellitq; per pus ea, quæ obstant. In actione enim chirurgica manifestè mutua opera chirurgi & naturæ conspicitur: in reliquis duobus instrumentis, in diætâ videlicet & pharmacia, non item. Quoniã non purè agentes sunt causæ, sed patientes quoque, & prima sui ratione opus habent naturæ auxilio,

Tertius scopus, qui in curando simplici vulnere chirurgus proponitur, est, vt diductorum oræ; ita vt in vnum per adductionem coniunctæ sunt, conseruentur, & maneat. Conseruatur autem, si tantisper labia vulneris coniuncta seruentur arte, donec natura cōglutinuerit. Termin<sup>9</sup> huius cōglutinationis incertus est, pro diuersitate partiu, temperaturarū, regionum, constitutionis anni & aeris, omnium deniq; causarum, tam externarum, quàm internarum, quæ morbū vel sonere, vel augere possunt. Conseruabuntur autē optimē huiusmodi extrema, quæ in vnum coacta sunt, iisdem serē auxiliis, quibus & in idē adducta sunt: nempē decenti ligatione, appposito mēbri situ, & futuris, si necessariæ videbūtur.

Quarta intentio est, particulæ læsæ substantiam cōseruare ac prohibere ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio prauo symptomate infestetur. Hunc autem scopum assequemur, si primum dolorē partis mitigemus, calorē partis restinguam<sup>9</sup>, ne humores attrahātur: secūdò, vt plenitudinē tollam<sup>9</sup> vt vitiosos humores purge mus, ne humores trāsmittātur. Hac rōne fiet, vt cū nullum terminum habeat humor, nec à quo fluat, nec ad quē fluat, fluxio omnino tollatur, & proinde partis tēperatura conseruetur. Dolorē autem partis mitigabimus, caloremq; partis restinguemus emplastris, & linamentis ex oīi candido, & aliis huiusmodi refrigerantibus  
pri-

primis saltē diebus. Postea verò vino styptico  
 parti cula perfundēda, & figura aptissima collo-  
 canda est. Sed & proba vltima ratio in primis est  
 obseruanda, si quartū hunc scopū cupis assequi.

Quinta & postrema intentio est, vt omnia ea  
 quæ post factam vniōem superuenire possunt  
 symptomata, tam in toto, quàm in parte vulne-  
 rata, siue à principio statim, siue post comitetur  
 ex affluxu nimirum alicuius humoris: quem na-  
 tura ad partem vulneratā expellit, vel è contrā  
 à parte vulnerata in reliquum corpus, & ad par-  
 tem aliquā principem propellit, remoueamus.  
 Symptomata autem, quæ consueuerunt eueni-  
 re post accepta vulnera; hæc ferè sunt: Dolor,  
 phlegmone, febris pruritus, cōuulsio, paraly-  
 sis, syncope, delirium, durities, & impotentia mem-  
 bri vulnerati. Nisi enim symptomata ista prius  
 abigantur, vulnus rectè curari nequit. Sympto-  
 mata enim quæ magnitudine superant suas cau-  
 sas, ordinem curationis sæpe peruertunt, immu-  
 tant, atq; interpellant. Abiguntur autem tripli-  
 ei instrumento, diæta: pharmatica, chirurgia,  
 vel omnibus simul, vel certè aliquibus. Porro  
 compositorum morborum (ex solutione vni-  
 tatis, & compositione vitiata, & ex cōpositione,  
 vnitatis, & temperie) curatio, ex simplicium mor-  
 borum curatione elici potest.

*De curatione vlcerum, Cap. 12.*

**P**recedēti capite de cruentorum vulnerum, quæ ī carnoſa parte ſiūt, curatione diximus nunc tranſeundum ad id vnionis diuortium, q̄ nec recēs eſt, nec cruentum: ſed iam inueteratum, & in quo una, uel plures conſiſtunt diſpoſitiones, quę vnionem remorantur, atq; impediunt, ex quib. ſanioſa, & purulenta quędā colliuies, putredoq; excitatur. Vocāt autē vulgares chirurgi talem vnionis ſolutionem, cōmuniter vlcus. Horum cauſas in vniuerſum geminas chirurgi ſtatuūt: nēpe antecedētes, & coniūctas. Antecedētes vlcerū cauſę ſunt, cacochymia, i. ſuccorū vitiū, qđ corporis ipſius particulas arrodere, & tandē corrūpere poſſit. Cauſę vero coniunctę ſunt, intēperies illę quas malitias cōplexionū vocant, in vulneratas particulas, ex cauſis antecedentibus vel etiam ex ipſis vulneribus, aut abſceſſibus, aliisue præternaturam tumoribus, ruptis, & apertis, excitatę.

Porro vlcera quęcunq; diuturniora ſunt, os abſcedere neceſſariū eſt, & cicatrices cauas fieri. Vlcera dura mala iudicantur, & q̄ ad virorē, aut nigritiem vergūt. Vlcera, quę aliis morbis ſuccedunt ægrē ſanabilia ſunt. Vlcera circūglabra praua ſunt. Vlcera, in quibus poſt longam ſaniei fluxionē, pus laudabile apparere incipit, bonū nobis portēdūt. Vlcera, quę in extremitatibus

tibus musculorū dorsi, vel tiliarū, aut brachio-  
rum sunt, periculo non vacant. Quibus vlceri-  
bus ante absolutam deterfionem sarcotica me-  
dicamenta administrantur, mala, ac superflua  
caro in illis generatur. Quæcunque verò probe  
& oportune expurgata semper ad siccus pro-  
mouentur, his caro magna ex parte non super-  
crescit. Vlcerata in orbem circumducta, pessima  
esse solēt, ac tardè magnoq; negotio ad cicatri-  
cem perducuntur. Arruum siue extremarum par-  
tium vlcerata, sæpenumero phlegmonas in ade-  
nosæ partibus accersunt. Cùm medicamēta vl-  
ceribus adhibita conferunt, argumentum est,  
ea ritè administrata esse: cum verò noxæ aliquid  
adserūt, & vlcerus humidius reddunt, aut siccus,  
calidus, aut trigidus, indicium est, ea non esse  
præsenti morbo idonea. Cæterū si vlcerus erodit,  
& profundius efficitur, sedulò aduertendū est,  
nū id ex acrimie succorum vitio, & vlceris mali-  
gnitate accidat, an ex facultate medicamento-  
rū. Porro inter cætera, quæ magis officiūt vlceri-  
bus, vêtus est meridionalis, atq; aeris ambiētis  
humiditas caliditatis adiuncta. Cæterum in vlce-  
rum curatione duobus speçanda proponun-  
tur, nē, e ipsius vlceris, quæ vlcerus est contē-  
ptio, & vlceris cū sua causa, aut symptomate ali-  
quo, aut alia quavis dispositione cōplicati, aut  
etiam hanc, vel illam occupantis consideratio.  
Sic ergo quatuor curandi intentiones erunt.

Prima

Prima ſitque rationem, ſanandis eiufmodi vlceribus accommodatam præſcribit.

Secunda, materiam antecedentem, auerit, & intercipit:

Tertia ſymptomata, & diſpoſitiones, quæ cū vlceribus compli cantur, corrigit.

Quarta correctis, & proſtigatis ijs diſpoſitionibus, quibus vlcera complicantur, ea more vulnerum concauorum ſanare præcipit.

Primam autem & ſecundam intentionem aſequimur, humores, copia aut praua qualitate noxios, tum corrigendo tum vacuando & auertendo, fluxionemque iſtam intercipiendo. Porro auxilia quibus commodè ſuccorum abūdantiam & vitium tollimus, corrigimus atque auertimus, ſunt venę ſectio, purgatio, proba victus ratio, cauterium, vomitio, & id genus alia. Fluxiones verò intercipimus ligaturis, perfuſionibus, & epithematis: item vnguentis ex bolo Armeno, atque aliis refrigerantibus, atque aſtringentibus. Deligatio verò inchoanda eſt, à laborante ipſa particula; deducendaque verſus ſanam. Tertia intentio, qua ſymptomata, & diſpoſitiones, quæ cum vlceri complicantur, corrigit ac ſummouet, perficitur prout cuiuſque ſymptomatis, & affectus cū vlcere complicati natura requirit, ac deſiderat.

*De curatione fracturarum, Cap. 13.*

**Q**uandoquidem duobus præcedentibus capitibus de continuitatis solutione, quæ in carnis & mollioribus corporis partibus accidit, abundè satis dictum est, ordo iam postulat, ut de solutione continui, quæ ossibus contingit, hoc est, fracturis, disseramus. Est enim fractura, unionis solutio quæcunque in osse, quam Græci catagma vocant. Fracturarum autem alia est transversalis: alia per longitudinem, quæ fissura dicitur.

Causæ verò fracturarum sunt omnia ea, quæ contundere, vel dividere ossa possunt.

Signa autem ossi fracti, & præsertim per transversum atque in artubus, hæc ferè sunt.

Tactu ossis partes disiunctæ separatæque, ac variæ reperiuntur, membri figura inæqualis percipitur: dum membrum dimouetur, & manu variè tractatur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex ea collisione auditur. Pars affecta cō tacta dolet, corpus membro fracto hæudquaquā inniti potest: causæ quæ frangunt, aut contundunt, præcesserunt. In osse verò, quòd per longitudinem fractum est, substantia eius crassities non naturalis tactu percipitur: cætera signa nõ adfunt præterquam quòd dolor, & inæqualitas iudicio sensus etiam deprehenduntur. Prognostica ab ipsa particula affecta, morbo, sympto-  
mati-



matibus, ætate & tēpore sumuntur. Ossa liqui-  
dē minimē periculosē media frāgūtur in hume-  
ris, brachijs, femoribus, cruribus & digitis. Si to-  
ta costa p̄fracta est, casus asperior est. Nariū fra-  
ctura peior est, vbi aut ossi, aut cartilagini fra-  
ctæ, cutis quoq; vulnus accessit. Cranei fractura  
malū portēdit. Fractura trāsuersa maximē tole-  
rabilis est. Obliqua peior: acuta vero pessima e-  
xistit. Fractura cū dolore, uel inflāmatione, aut  
carnis contusione, mala est. Fractura senibus in-  
primis, biliosis, conualescētibus difficillima est:  
decrepitis verò, & valde senibus, impossibilis.  
Porro fractura quò vetustior, eo deterior est.  
Caluaria 35. diebus glutinatur: brachium, & ti-  
bia, si ritē curentur, diebus circiter 40. coales-  
cunt: cubitus firmatur plurimum diebus 30. os  
in naribus per fractum 18. dierum spacio con-  
solidescit: costa post 21. maxilla, iugulum, scapu-  
la, os tali, calx, manus planta serā inter decimū  
quartum, & vnum uigesimum diē sanescunt:  
humeri, & femina inter 27. & 40. coxa diebus  
50. coalescit: pes sexaginta dierū spacio, si que-  
scat: consanescit. Quod ad curationem atinet,  
fracti ossis soluta continuitas est, quare eius sa-  
natio, vnitio est, vt igitur hunc assequamur fi-  
nem, 4. intentionibus opus erit.

Prima intentio est, vt fracti ossis partes re-  
ctē committantur, & in naturalem situm eca-  
ptentur.

Secun-

Secunda, vt ritè commissa ossis perfracti extrema, coniuncta, atque immota maneant.

Tertia, vt callo interueniente disiunctæ ossis partes agglutinentur, coalescantne.

Quarta est, symptomatum, quæ fracturam sequi consueuerunt, correctio.

Primam autem intentionem assequemur, si fracti ossis partes, in figuram pristinam, naturalemque situm reducerimus. Id autem fiet, si membrum perfractum, decenter intendatur, vel manibus, aut habenis: deinde os depressum attollatur, & eleuatum deprimatur; atque id quatenus fieri licet sine dolore, donec ossis fracti fines rectè concurrant, & in naturalem situm coaptentur. Ossis autem repositi certum indicium est, dolor sublatus. Ossibus fracturæ iam sic probè coaptatis, membrum deligandum erit, modo eo, quo supra libro sexto, cap. 9. diximus.

Secundus scopus est, vt ossibus iam sic probè coaptatis, & à directo admotis, eorum positura seruetur, & exactè coniuncta maneant. Os fractum propter duritiem, siccitatem, & paucitatem alimenti difficulter vnitur. Quare ne dilabantur denuò partes commissæ, oportet perfractum membrum prorsus immobile consistere. Quod quidem præstabitur deligatura opportuna per fascias, & serulas, quæ consentiat adamussim cum rectissima figura membri, quam ei natura indidit. Tantisper deligatura hæc seruetur, donec natura callum induxerit firmissimum.

Tertius scopus ad calli generationem pertinet. Nā

cum nec ferulis, nec deligatione, nec figura situe mē  
bri appposito, diuise ossis partes citra glutinum aliquod  
coire, ac concrefcere possint, maxima calli gignendi  
solicitude habenda est. Ad hunc igitur gignendum  
concrefcere aliquid proprij ossium alimenti, crassi ter  
reniq; oportet, quod in labris fracturæ coalescit. Cras-  
sa autem hæc terrenaque substantia, ex genuino, ma-  
ximeque idoneo ossis alimento redundans, diem circi-  
ter duodecimum, aut decimumquintum ab ossis fractu-  
ra serè gigni, atque accrescere incipit. Adiuuabitur au-  
tem maximè victus ratione, secundum qualitatem,  
quantitatem & tempus administrationis, probè insti-  
tuta.

Alimenta autem talia sint, ex quibus non solùm suc-  
cus bonus prouenire soleat, sed etiam tenax, ex quali  
fieri callum maximè expedit. Quippe cum ex seiosa  
humiditate, & tenui gigni prorsus nequeat, ex crassa  
verò, sed que fragilis sit, ac pinguitudinis expers gigni  
quidem poterit. Circa initium fracturæ vsque dum cal-  
lus gignitur, ægrum tenuissimè cibato. Venam inter-  
dum cum scilicet res postulat, secato, & per uentrem  
superuacua expellito. Carne & vino vsque ad dies de-  
cem, abstineto. Magnitudo calli nec minor quam par  
est, nec maior iusto sit, sed mediocritatem ad vnguem  
feruet. Cæterùm huius generatio ijs serè notis depre-  
henditur. Dolor, qui prius aderat, sedatur: nullus am-  
plius inflammationis, aut tumoris alicuius metus ad-  
est, in membro perfractò bonus ac natiuus color efflo-  
rescit, &c.

Quartus

Quartus & vltimus scopus est remotio symptomatum, quæ fracturam comitari solent, & particula affectæ accidunt. cuiusmodi est inflammatio, pruritus, vulnus, immoderata siccitas, aut humiditas, callo pignendo obsistens: gangræna, durities, calli magnitudo excedens, vel deficiens. Quare si inflammatio, aut dolor adfit, deligatio soluenda erit, & lana, oleum, & acetum vel id genus alia parti dolenti admouenda. Sedata inflammatione, & dolore sublato, deligationes, & ferule iterum adhibendæ. Si pruritus accidit, aquam temperatam superintundere oportet, vel aquam balsam, vel oleo populeo membrum illini. Cum vulnus quoque accessit, vt ossium fragmenta, & ea, quæ pungunt extirmantur. Si carnes contusæ sint, partem affectam scarificato: si gangræna iam occupauit, conuenienter occurrato, vt in speciali praxi doceditur. Cum valenter nimis siccantur ossa, callus egré prouenit: expedit igitur iis tertio: vel quarto die modicè aquam calidam infunderd. Si verò humiditas calli generationem impedit: ibi hanc siccare conuenienti deligatura, & perfusione aquæ conabimur. Porus seu callus augetur vel minuitur vicijs commoda ratione. Siquidem ex ossis proprii alimenti superfluitate à natura generatur, obseruata quantitate, qualitate, & tempore administrationis debito. Porro augetur quoque medicamentis, vim emplasticam habentibus, cuiusmodi est emplastrum ex pice: minuitur verò iis, quæ vim digerendi habent. Quòd si indecens membri figura fuerit, ea immutanda erit: quod fiet, si callus prius frangatur, deinde com-

de commodè membrum restituatur. Frangitur autem medicamentis emollientibus, Sed de fractis ossibus hæc nobis sufficiant.

**H**Actenus viam quandam ac rationem vniuersalem perueniendi ad praxim, quam breuissime potuimus, septem perstrinximus libris hac potissimum ratione, vt medicina studiosis ac candidatis prodessemus. Precamur itaque Deum opt. max. vt is noster labor quamplurimis vsui esse possit. Quod cum intelleximus, specialem quoque praxim, in qua non solum Hippocratica, verum etiam Theophrastica, quorum iam per multos annos certam habuimus experientiam breui Deo volente, in lucem dabimus.

PRACTICAE GENERALIS

F I N I S.



# AD NOBILEM ET

prælustrem virum D. IO. IACOBVM  
VVECKERVM, Cæsarij Palatij  
Comitem, & Medicum  
Colmariensem.

## ELEGIA

IOACH. ROSALECHII, à nome  
*Treptatio Pomeranorum.*



Axime summorū victor VVE-  
CKERE, dolorem,  
Quo medicante fugit morbus  
& ægra lues:  
Quem magnis titulis decorāt  
regesq; scolæq; :

Quemq; *Palatinum CAESARIS* aula vocat,  
Ut tua perpetuò te fama superstate crescens,  
Plus sensim veteri lumine lucis habet.  
Sic studiosorum iuuenumq; scientia crescēs,

Fit magis ex libris ingeniosa tuis .

Vtq; senex, nomenq; tuum miratur & artes

Sic colit & laudat teq; tuosq; libros .

Et tua cū fructu perdocta volumina versans ,

Plurima, quę nusquam viderat antè, videt .

Nūc quoq; post multos alios sūmosq; labores

Promis ab ingenio *Practica Scripta* tuo .

Quæ mala sanandi monstrāt feliciter artem ,

Et ducunt medicas instituuntq; manus .

Ttq; feruntur apes in mellea pascua florum :

sic hac lectores in tua scripta runnt .

Et veluti dulces succos in floribus ipsis

Querit, & inuentos sedula carpit apis :

sic quoq; te lector relegens hūc auspice librū,

Carpit de studijs commoda multa tuis .

Quām benè diuinus sua munera cōtulit in te

CAESAR, vt ingenij sint monumenta tui ,

Sic decorat nostri Domini clementia doctos ,

sic noster sapient REX sapienter agit .

Tunc artes & tunc veneranda scientia floret ,

Tunc fiunt celebres magnificæq; scholæ :

Cū Reges, placidiq; Duces, Procereq; benigni

Artibus & studijs ingenijsq; fauent .

Di-

Dignus es illorū sūmo VVECKERE fauores  
Debetur meritis gratia tanta tuis ,  
Tu Medicinarū grauis & possessor:& herbas,  
Et vires harum,certus in arte,doces .  
Tu quoq; nunc certam subtili pectore praixin  
Edis:& hęc multum dexteritatis habet .  
Cum tua te pareret genitrix feliciter,& cūm  
Aspiceres primum,luce fauente,diem ,  
Tunc in te magnum clementer & vrile donū  
Humano generi prębuit ipse D E V S  
Tunc promisit opem morbis, egrūq; salutē :  
Nunc,quę promisit,te medicante,facit .  
Perge tuas magnis meritis extendere laudes,  
Perge tuum posthęc multiplicare decus .  
si modò laus fieri poterit tuā maior:& id si,  
Quod summum nunc est, altius esse potest .  
Viue diu,pergatq; fauens,te sospite Parca  
Nere tibi fulis stamina longa suis .  
sis felix,huius decus admirabile terre ,  
Vir meritò claris annumerande viris .  
Per te p̄q; tuā sint prospera pharmaca dextrā,  
Pareat arbitrio qualibet herba tuo .  
Atq; tuis absint malefida pericula rectis ,




Et desint domui gaudia nulla tuæ .  
Cumq; satur mûdi fueris, dâdusq; sepulchro ;  
Contingat tumulo pax requiesq; tuo .  
Egrediensq; tuo sursum de funere, cœtu  
Ductus ab angelico, spiritus astra petat.  
Plura tuo posthac de nomine carmina scribā,  
Nam cupio tanto charior esse viro .  
Hæc nûc sufficiant, & si placet, accipe finem ;  
Vtq; piè claudam tàm pia vota , vale .



E I V S D E M

A D M E D I C I N A E  
C A N D I D A T O S .

**G** Rex iunior, lectorq; candidissime,  
Hippocratisq; cohors, & huic Galeni  
proximi,  
Quæ sedulis & impigris laboribus  
Quæris habesq; modum morbis medendi  
languidis.



Post

Post cognitās herbasq; resq; plurimas,  
Quas medicinæ solet aptare vestris vsibus,  
Nihil absq; Praxi, quod fateris, proficis,  
Nil medicina iuuat, q̄ praxim ipsā nō tenet.  
Hanc ecce nunc VVECKERVS optatissimus  
Edit, & ingenij fœtus nouos gignit sui.  
Hanc maximo nunc accipis cum gaudio,  
Assiduoq; legis hanc plurimis cum fructibus  
Hæc te regit, manumq; prosperat tuam.  
Deniq; te medicis parem facit clarissimis  
sic noster, omnis fons scientiæ, Deus  
Vnius arte viri prodesse terris omnibus  
Potest: & vnus sic Deo vir auspice  
Commoda tāta potest p̄bere mūdo maxime.  
sed plura mox vir hic dabit: viuat modò:  
Viuat vt ergò diu, Patrem precare cœlitum.



INDEX

UNIVERSITATIS  
GRANATAE

# INDEX

Capitum & rerum in hoc opere præcipuarum.

<p><b>A</b>bscessus Gracis Apo stemata fol. 403</p> <p>Abscessus quid sit. 403</p> <p>Abscess. genus dupl. 403</p> <p>Abscess. signa dupl. 403</p> <p>Abscessu iudicia veterum &amp; recentiorum. 404</p> <p>Abscess. cura. 405 406</p> <p>Abscessu aperto quò procedendum. 47</p> <p>Ablutionum forma, usus, &amp; exempla. 359</p> <p>Acus ad futuram qualis esse debeat. 375</p> <p>Aeger nū seruandus ut moriturus. 303</p> <p>Aeger quo tempore sanandus. 33.34</p> <p>Aeris rō et q̄ circa eū Medico cōsiderāda. 64.65</p> <p>Affectus Animi. 91</p>	<p>Agarici electio. 206</p> <p>Agarici infrenatio, &amp; do sis. 207</p> <p>Alcohol Arabibus quid pag. 355</p> <p>Alexiteriorum genus. 159</p> <p>Alexiteriorum usus. 149</p> <p>Aloes electio, usus et no xa. 203</p> <p>Anodyna qua 186</p> <p>Anodynorum diuisio. 187</p> <p>Anody. reuera qua. 186</p> <p>Anody. noīe tm̄ qua. 187</p> <p>Anody. verorum. cogn. 187</p> <p>Apophlegmatismorum cō positio, usus. 286</p> <p>Apostematū apert. o. et quales optima. 405</p> <p>Apostematū apertiones quò fieri deant. p. 406</p> <p>in Apost. aptione septē</p>
--	---

I N D E X.

<p>Speſtanda . 406.407          Apoſtemata quid . 236          Aqua concoquētes bilem          flauam . 215          Aqua concoquentes pi-          uitam . 227          Aqua concoquentes bilē          utram . 229          Balanos ſiue glans . 277          Balnea qbus noceāt . 89          Balnea qbus cōducāt . 89          Balnea inſeſſoria qd &amp;          quomodo ſiant . 353          Balneorum uſus &amp; exē-          pla . 356.357.          Balneorum genera . 90          Bolus qd et quō ſiat . 360          Boli qualitas , quātitas          &amp; aſſumēdi tps . 260          Boli exēpla varia . 262          Cacechymia quid . 85          Cannula quid . 475          Cannula uſus . 475</p>	<p>Caput purgia qd &amp; quō          ſiant eorūq; uſus . 284          Cartami pparatio . 208          Cartami uſus . 208          Caſſia nigra qd ſit . 203          Caſſia nigra quomodo e-          ligenda . 204          Caſſia nigra doſes . 204          Cathartica qua . 156          Cataplaſmatū confeſtio          &amp; uſus . 341.346          Catapotia quid . 262          Cauſa quando ante mor-          bum remouenda . 394          Cauſa moriendi . 35.36          Cauterium eiufq; genera          modi, adhibitiones, &amp;          operationes . 367.368          Ceroti confeſtio, uſus et          exempla . 350.351          Chirurgia pars Medici-          na . 366          Cibi temperati . 67</p>
---	---

Cibi

I N D E X.

<i>Cibi calidi .</i>	68	<i>Cibi laxantes.</i>	78
<i>Cibi frigidi .</i>	69	<i>Cibi astringentes.</i>	78
<i>Cibi humidi .</i>	69	<i>Cibi urinā mouentes.</i>	79
<i>Cibi sicci .</i>	70	<i>Ciborū qualitas q̄ cuius</i>	
<i>Cibi boni succi .</i>	70	<i>affectus cōueniat.</i>	69
<i>Cibi mali succi.</i>	71	<i>Ciborum quantitas in ge</i>	
<i>Cibi lenes &amp; aeres</i>	71	<i>nere .</i>	79.80
<i>Cibi crassi et subtiles.</i>	72	<i>Ciborū ordo in gñre</i>	81
<i>Cibi medij inter attenuā</i>		<i>Ciborum quantitas.</i>	791
<i>tia &amp; in rassantia.</i>	73	<i>Cibor.ordo generalis.</i>	81
<i>Cibi stomacho idonei.</i>	73	<i>Cibationis tempus.</i>	81
<i>Cibi stomacho alieni.</i>	74	<i>Citrinorū Myrobalana-</i>	
<i>Cibi capitis nocentes.</i>	74	<i>rum electio dosis .</i>	206
<i>Cibi inflatiui .</i>	75	<i>Citrinorum correctio My</i>	
<i>Cibi flatus soluētes .</i>	75	<i>robalanorum.</i>	200
<i>Cibi facilis corruptio.</i>	75	<i>Clyster vñ dicatur.</i>	267
<i>Cibi difficilis corrupt.</i>	75	<i>Clysteris compositio et do</i>	
<i>Cibi velocis cōcoct.</i>	76.81	<i>sis .</i>	262
<i>Cibi tarda digest.</i>	76 81	<i>Clyst.exhibēdi mod.</i>	268
<i>Cibi humorib.abundātes</i>		<i>Clysteres alterantes.</i>	269
<i>Cibi superfluitatum ca-</i>		270.271.272.	
<i>rentes.</i>	77	<i>Clyst. purgantes.</i>	273
<i>Cibi pauci nutriment.</i>	77	<i>Coci cum pituita simili-</i>	
		<i>tudo .</i>	

I N D X.

tudo.	202	Corp. superficies id est ca-
Collusionū forma, vsus et		tus lasa, quō in genere
exempla.	359	percuranda. 412. 413
Collyria quid, eorū q; for-		Corpori tria prater natis
ma et cōpositiones.	293	ram accidunt. 393
Colocynthidis electio, cor-		Corpori agro in gnere qd
rectio, & dosis	208	agendum. 99
Colutea electio, dosis, &		Crisis future p̄cognitio
correctio.	211	39. 40. 41.
Congestionis causa gemi-		Crisis prenotio per fluxū
na.	396	sanguinis narium. 43
Contra contrarijs curan-		Crisis per vomitum. 44
tur.	393. 424.	Crisis p̄ deiection. alui. 45
Contrarium pro eo quōd		Crisis p̄ mōstruorū purga-
exuperat quousq; indu-		tionē et hemorrhoid. 46
endum.	395	Crisis per sudores. 46
Conual. scendi rō.	35. 36	Crisis p̄ abscessū. 46. 47
Corpus quomodo efficia-		Cure quātitas, qualitas,
tur durum.	134	modis, tempus, & locus
Corporis obstructionis cu-		quō iudicentur. 395
ra vniuersalis.	40. 41	Curandi indicationes im-
Corporis figura vitata		propria. 75
cura generalis.	401	Curadi instrumē. 62. 63

I N D E X .

Decocta quid & quomodo fiant. 236	Dies In icatorij. 47
Decocta alterantia 238	Dies decretorij. 48
Decocta alterantia et purgantia bilē flauā. 239	Digestior quid. 48
Decocta alterantia et purgantia patuitam. 242	Digestio in humoris substantia. 190
243. 244 245.	Digestio in humoris qualitate. 191
Decocta alterantia et purgantia melancholia. 247	Elateriū quid eiusq; dosis & usus. 209
Decocta alterantia et purgantia humores mixtos 249 250	Electuaria quid. 295
Decocta exhibēdi tps eorūq; vires in genere. 235	Electuariorū qualitas et exhibēdi tempus. 295
Deleteriorum usus. 146	Electuariorū calefaciēt exempla. 298 299 300
Deleteria genere. 145	Electuariorū frigefaciēt tū exempla. 303. 304
Deleteria quantitate. 146	Eligmata quid. 233
Deleteriorum series. 147	Eligmatum dosis, usus & qualitas. 233
De dentifricijs. 319	Eligmata quo tēpore exhibeantur. 234
Detegētū potestas. 139	Ellebori usus. 211
Diata quorū modum perficiatur. 46	Embroscha quid. 353

Em-

I N D E X.

- |   |  |
|---|--|
| <p>47 Embrocha cum formeto<br/>humido differētia. 353</p> <p>48 Embrocharū confectio,<br/>48 usus &amp; exempla. 353</p> <p>90 Emplastra qd. 347. 348</p> <p>ua Epidēma quid. 380</p> <p>91 Epithemata quid, et quo<br/>do. modo fiant. 336</p> <p>09 Epithem. variatio. 336</p> <p>26 Epithematum usus &amp;<br/>et exempla. 338. 339</p> <p>26 Epithymi dosis eiusq; cor<br/>rectio. 211</p> <p>00 Errhina quid corrig. cō-<br/>ciē positio &amp; usus. 283</p> <p>04 Escharotica quid. 139</p> <p>33 Euphorbij usus. 209</p> <p>us Fascia ad fracturas deli-<br/>33 gandas. 179</p> <p>ex. Fascia qualis esse debeat<br/>34 ad deligandum. 377</p> <p>14 Febriētes quō cibādi. 81</p> <p>3 Ferula quō in fracturis</p> | <p>adhibeantur. 285</p> <p>Ferula post deligaturā<br/>inijcienda. 386</p> <p>Ferula in quem finem à<br/>secentioribus adhibean-<br/>tur. 386</p> <p>Ferula quamdiu manere<br/>debeant. 389</p> <p>Ferularum materia 388.</p> <p>Ferularum usus idem q;<br/>&amp; plagularum. 386</p> <p>in Ferularū accommoda-<br/>tione qd cauendū. 388</p> <p>cas quo tempore antiq;<br/>accommodarint. 385</p> <p>Forulas quare Hippocra-<br/>tes Leues, Aequales, Si-<br/>mas, In media parte<br/>crossiores, Breuiores q;<br/>deligatio esse voluerit.<br/>387. &amp; 388.</p> <p>Ferulas adhibendi mo-<br/>dus ac ratio ibidē. 388</p> |
|---|--|



# I N D E X.

<p><i>Fibula</i> quibus in vulnere bus adhibeantur. 300</p> <p><i>Fibularū</i> form. qual. 390</p> <p><i>Fibularum</i> vsus. 390</p> <p><i>Fibulas</i> Græci ancteras vocant. 389</p> <p><i>Fluxio</i> qua ratione conci tetur. 396</p> <p><i>Fluxionis</i> causa q̄. 396</p> <p><i>Fluxionē</i> quare pars ali qua excipit. 396</p> <p><i>Fomētorū</i> cōpositio, vsus exhibitio. 335. 336</p> <p><i>Forcipes</i> Albucasu. 373</p> <p><i>Forcipes</i> dentales. 372</p> <p><i>Forcipes</i> ad extrahendos globos. 373</p> <p><i>Forcipes</i> terebelli inuersi forma. 373</p> <p><i>Forcipes</i> ad spinas de gu la extrahendas. 374</p> <p><i>Forcipes</i> ad fœtus mor tuos extrahendos. 374</p>	<p><i>Forficum</i> vsus. 370</p> <p><i>Fracturā</i> græci Catagma vocant. 431</p> <p>ob <i>Fracturam</i> figura mē bri indecens quomodo immutanda. 437</p> <p><i>Fracturę</i> quomodo deli gende. 179</p> <p><i>Fractur.</i> genus dup. 431</p> <p><i>Fracturarum</i> causa. 431</p> <p><i>Fracturarum</i> signa. 432</p> <p><i>Fractur.</i> prognostica. 432</p> <p><i>Fractur.</i> curādi t̄ps 433</p> <p><i>Fracturas</i> curādi quatu or intētionēs. 433. 434</p> <p>eas quomodo assequa mur. 435. 436</p> <p><i>Friētienis</i> genera. 82</p> <p><i>Friēt</i> ubi adhibende. 82</p> <p><i>Fumi</i> terra vsus. 211</p> <p><i>Gargarismat.</i> vsus, cōse ctio, qualitas, et t̄ps. 288</p> <p><i>Gargarismatum</i> aliquod exem-</p>
--	--

I N D E X.

370	exempla.	289	Infusio purgans bilem et
gma	Gaudium nimium quo-	91	pituitam. 253
431	modo officiat.	91	Infusiones quomodo pra-
a mē	Gestationis genera.	83	parentur. 251
nodo	Gestationes quomodo ad-	83	Infusiones adhibendi tē-
437	hibendę.	83	pus & quantitas. 252
deli-	Gladiū preparatio.	277	Instrumenta cura. 62.63
179	Glandium dosis & eas	278	Instrumenta incidentia eſt
431	subſciendi tēpus.	278	excidentia. 369
431	Hermodactylis proba, do-	209	Instrumenta vrentia. 367
432	sis & correctio.	209	Inſtr̄a extrahentia. 372
432	Humores digestionis ob-	192	Inſtr̄a extendentia, 390
433	noxij.	192	Instrumenta non ferrea
atū-	Hypodesmida quid.	380	quędam. 367
434	Inanitionis genera.	86	Instrumenta ad delegatio-
qua-	Indicationes curandi im-	57	nem apta. 377
436	proprie.	57	Inſtr̄orum Chirurgicorū
82	Infusio quid & quibus	251	diuiſio generalis. 366
82	exhibeatur.	251	Instrumentorum ferreorū
211	Infusio purgans bilē.	252	diuiſio ſpecialis. 366
cōſe-	Infusio purgans pituitā.	252	Ira quid noceat 91.
288	252		Iulapium quid. 232
quod	Infu. purg. bilē atrā.	253	Iulapij dosis & vsus. 232.
n-			

## I N D E X.

- Lapidis arm. usus.* 212  
*Lapidis lazuli usus.* 211  
*Linamētorū forma qualis.* 385  
*Linimenta qd eorū cōpositio & usus.* 325. 326  
*Loch quid.* 233  
*Luxatio Græcis est arthrema.* 417  
*Luxatio quid sit.* 417  
*Luxatio ante fracturam si fieri possit semper curanda.* 419  
*Luxatio indurata quomodo emollienda.* 419  
*Luxationis causa, signa.* 418.  
*Luxationis restituta indicia.* 419  
*in Luxatione curādo prius inflammatio si ea adfit auferenda.* 419  
*in Luxatione curanda tria attendenda.* 419  
*Luxationes prorsus in sanabiles.* 418  
*Luxationes haud periculosa.* 418  
*Luxat. difficillima.* 419  
*Luxata statim reponenda.* 410  
*Luxatum caput in posterioriorem partem secū dū Celsis incurabile.* 418  
*Manna quid.* 204  
*Mechoaca quid.* 207  
*Medici officium.* 366  
*Medicina lenientes.* 256  
*Medicinę soluentes.* 256  
*Medicinas solutivas machinantibus quatuor cōsideranda.* 254  
*Medicamēti suppurātis qualitas.* 151  
*Eius usus.* 151  
*eorum series.* 152  
*Medicamenta temperata.*

I N D E X.

- |   |   |
|---|---|
| <p>ta queenam. 98<br/>         Medicamēta calidi i pri<br/>         mo gradu queenam 99<br/>         calida in secundo. 99<br/>         calida in 3 gradu 100.<br/>         calida in 4 gradu 102.<br/>         Medicamenta frigida in<br/>         primo gradu 103. frigi<br/>         da in secundo 103. fri<br/>         gida in tertio 104 frigi<br/>         da in quarto. 104.<br/>         Med sicca in primo 105.<br/>         sicca in secundo. 105.<br/>         106 sicca in tertio 107.<br/>         sicca in quarto. 109<br/>         Medic. humida in primo<br/>         110. humida in secūdo<br/>         110. humida i tertie 111<br/>         Med. tenuis essentia 111.<br/>         112. crasse essentie. 113<br/>         Medicam. dissimilariū<br/>         partium. 115<br/>         Med. acria 117 118. 119.</p> | <p>constringentia. 125<br/>         aperientia 126. 127. di<br/>         scutiētia. 128. 129. 130<br/>         condensantia 131. rare<br/>         facientia 132. 133. in<br/>         durantia 134. laxan<br/>         tia 134. abstergētia 135<br/>         136. 137. adurātia 134.<br/>         attrahentia 140 dien<br/>         tia. 141. 142. 143<br/>         Med. emplastica quid est<br/>         qualia esse deat. 1521<br/>         Med delateria quid. 14.<br/>         alexiteria quid. 145<br/>         pus mouentia. 151<br/>         Med. emplastica qd. 155<br/>         eorū enumeratio. 135<br/>         Med. obstructione liberā<br/>         tia. 154 epulotica. 155.<br/>         Medic excedentia. 156<br/>         Medicamenta expurgan<br/>         tia. 157. 158. 159<br/>         Medicamenta extenuan<br/>         tia.</p> |
|---|---|

I N D E X.

<i>tia.</i>	161. 162	<i>Medicamenta crassos hu-</i>
<i>incrassantia.</i>	163	<i>mores in thorace et pul-</i>
<i>Medicamenti status di-</i>		<i>monē expurgantia.</i>
<i>scutientia.</i>	163	<i>Medicamenta tussim se-</i>
<i>Medicamenta extraher-</i>		<i>dantia.</i>
<i>tia.</i>	164	<i>Medicamenta tussim pro-</i>
<i>Medicamenta glutinan-</i>		<i>uocantia.</i>
<i>tia.</i>	165	<i>Medicamenta dolorem</i>
<i>Medic. incidentia.</i>	167	<i>sedantia.</i>
<i>Medic. repellentia.</i>	169	<i>Medic. soporifera.</i>
<i>Medicamenta roborantia.</i>		<i>Venerē excitantia.</i>
170. 171		<i>spermatia.</i>
<i>Medic. sarcotica.</i>	172	<i>His utilia.</i>
<i>Med. sistendi vim haben-</i>		<i>191. concoquentia.</i>
<i>tia.</i>	173. 174. 175.	<i>191. bilem flavam con-</i>
<i>urinae ciētia.</i>	176. 177.	<i>coquētia.</i>
<i>mēstrua prouocantia.</i>	179.	<i>192. 193. 194.</i>
<i>180. mēstrua sistētia.</i>		<i>pituitam concoquentia</i>
<i>181. sudorē ciētia.</i>	182	<i>195. 196. 197. 198. 199</i>
<i>Medicamenta calculum</i>		<i>simp. bilem atram con-</i>
<i>frangentia.</i>	183	<i>coquentia.</i>
<i>Medicamenta lac gene-</i>		<i>200. 201</i>
<i>rantia,</i>	184	<i>purgantia in genere qua</i>
		<i>sint.</i>
		<i>202 purgantia quo-</i>
		<i>modo attrahant.</i>
		202

Me-

# I N D E X.

<p><i>Medicamenta bilem flauam purgantia.</i> 206</p> <p><i>Medicamenta atram bilem purgantia.</i> 211</p> <p><i>Medic. quantitas.</i> 213</p> <p><i>Medicamentorum quantitas à morbi tum qualitate tum quantitate desumenda.</i> 214</p> <p><i>Medicamentorum astringentium cum acribus cõparatio.</i> 120</p> <p><i>Medic. astringentium series.</i> 120. 122. 123. 124</p> <p><i>Mel grandibus omnigenis accedit.</i> 277</p> <p><i>Mensura Medica aridorum.</i> 362</p> <p><i>Mensura Medica liquidorum.</i> 263</p> <p><i>Metærei dosis eò infrenatio.</i> 209</p>	<p><i>Mœstitia quid pariat.</i> 91</p> <p><i>Morbus quomodo dignoscatur.</i> 13. 14</p> <p><i>Morbus num curari valeat.</i> 27. 28. 29</p> <p><i>Morbo unico quomodo occurrendum.</i> 50</p> <p><i>Morbo cum symptomate quõ occurrendum.</i> 52</p> <p><i>Morbo prasente ipsius causa quõ procedendũ.</i> 53. 54. 55</p> <p><i>Morbo, eius causa, atq; symptomate concurrentibus quid medico conãdum.</i> 51</p> <p><i>Morbi per se.</i> 9. 16</p> <p><i>Morbi p̄ consensũ.</i> 10. 11</p> <p><i>Morbi p̄ consensum quoe modis fiant.</i> 10. 11</p> <p><i>Morbi instrumentales in compositione secundum figuram vitiatam quomodo</i></p>
---	---

# I N D E X.

- modo eueniant. 408  
 ex his q̄ curari possint  
 qui nō. 409. In ijs curā  
 dis quid cōsiderandum  
 409
- Morbi in cōpositione se-  
 cundum cauitatem vi-  
 tiatam quō fiant. 410  
 in his curandis quinq;  
 spectanda. 410. 411
- Morbi in cōpositione ex  
 superficie aspera vel le-  
 ui quō accidant. 412
- Morbi in compositione se-  
 cundum numerū quo-  
 modo contingant. 414.  
 eorum causa, signa, iu-  
 dicia, & curatio. 415
- Morbi in compositione se-  
 cundum magnitudinem  
 quomodo fiant. 416
- Morbi à magnitudine u-  
 tiatā à quō differūt ab
- alijs qui à numero alte-  
 rato procedunt. 417
- Morborū istorum causa,  
 signa, iudicia, & curā-  
 di ratio. 416. 417
- Morborū diuisio genera-  
 lis. 15. 16
- Morborum diuisio specia-  
 lior. 393
- Morborum signa 6. 7. 8
- Morborum signa propria  
 12. 13.
- Morborum cause in uni-  
 uersum. 21. 22. 23
- Morborum finis per cri-  
 sim. 36
- Morborum finis absque  
 crisi. 36
- Morborum similariū cu-  
 ratio. 394
- Morborum, ex alterata  
 superficie curatio quo-  
 modo inuestigari deat.

# INDEX.

<p>412 413  Morbis pluribus simul  cōcurrentibus quomodo  occurrendum . 51  Mordicatio quid efficiat  pag. 203  Morsuli quid 310  Morsuli vsus 305  Morsuli exemplum. 310  Motus egrotantium 82.  Myrobalana B llyrica et  eorum vsus . 210  Myrobalana Emblica eo  rumq; adhibitio. 210  Myrobal Chedula quo  modo adhibenda. et in  frenanda, 210  Myrobalana Inda 212  Nouacularum vsus 371  Ocularia medicamenta  293 294.  Olea calefacientia 325.  326.</p>	<p>Olea refrigerantia. 327  Olea siccantia, 328  Olea humectantia 328  Olea astringentia . 328  Olea emollientia . 328  Olea laxantia 329  Olea rarefacientia. 329  Olea digerentia . 329  Olea detergentia. 320  Olea glutinantia. 350  Olea somnum inducen-  tia . 330  Olea dolorem sedantia .  330  Opopanax quid. 210  Ossium sectio . 372  Pars corporis quo nobi-  lior eoblandius esse de-  bet medicamentum, 213  Pastilius quid. 290  Penicilla quid eorumque  vsus octuplex . 215  Pessus qd, eorū vsus. 279  Ef 4 Pef-</p>
---	--



I N D E X.

<p>Pessorum confectio. 280                  Pessorū exēpla. 281. 282                  Phlebotomię instrumen-                  ta. 369                  Pilula quid &amp; quomodo                  fiant. 26                  Pilulę purgantes bilem.                  flauam. 263                  Pilula purgantes pituitā                  264                  Pilula purgantes Melan-                  choliam. 266                  Pilulas sumēdi qualitas,                  quātitas, tempus. 263                  Plenitudo quid. 85                  Plenitudo quotuplex. 85                  Polypodij vsus. 21                  Poma odorata 220. 221                  Pondera Med. 361. 362                  Potiones lenitiuę. 250. 255                  Potiones purgātes in sub-                  stantia sumpta. 255                  Potiones purgātes partim</p>	<p>ab insusis partim à sub                  factis: 258 259                  Puluerum confectio, &amp;                  vsus. 315                  Puluerum exempla. 315                  Pulueres purgantes. 317                  Puluilli quid &amp; eorū for-                  ma apud antiquis. 371                  Puluillorum forma hodi-                  erna, vsus &amp; figura va-                  ria. 381. 382                  Purgationis modi. 88                  Purgationis tempore. 88                  Purgationis quātitas. 88                  Purgationis qualitas 88                  Purgatio quid, &amp; quibus                  conueniat &amp; quō tem-                  pore. 87                  Purgatio quibus dānosa                  &amp; quo tempore. 88                  Puris Iudicium. 405                  Qualitas Remediorum                  unde desumenda. 97</p> <p style="text-align: right;">Quan-</p>
--	--

I N D E X

Quantitas remediorum . 213	213	nerē.	85
Quantitas remediorū ex morbo, anni tempore, & aetate quoq; desumenda .	214	Rhabarbari electio, correctio, dosis.	305
Quantitas remediorum a locorum, regionumue situ ex parte quoq; petenda .	214	Rob quid sit et eius dosis	235
Quantitas sanguinis mis- sionis unde desumenda	87	Rob quomodo differat à syrupo .	235
Quies egrotantium.	82	Rob exhibendi modus & tempus .	235
Quies immodica sanis de- trimentosa .	83	Rotuli quid.	308
Radices quinq; commu- nos.	202	Rotularum exēpla.	308
Remediorum qualitas un- de decernenda.	67	Sacculorum cōfectio, for- ma, usus & exhibitio- nes.	340. 341
Remediorum quantitas medico necessaria.	213	Sacculorum exempla no- uem ad varios usus .	343. 344
Repletio & inantio in ge- nere.		Sagapenum quid.	210
		Sanguis putrescens in clo- leram transit.	230
		Sanguis non recipis dige- stionem.	192
		Satietas quid.	85

INDEX.

Scalpellum quid, eiusq; hic labarent.	412
genera.	369
Scamoniij electio, dosi	Serapinum quid. 210
& correctio.	205
Scarificatio quid et quo modo adhibeatur.	78
Scarificationis modus.	370.
Scuta quomodo fiant, eorumq; usus & exempla.	352
Semicupium vulgi quid	356
Semina calida maiora.	201
Semina calida minora.	201.
Semina frigida maiora.	201
Semina frigida minora	201
Sena quid.	211
Senes cum frequenter sca	Serra quibus adhibenda, quibus non. 372
	Serra ut adhibenda, 372
	Serra adhibita quid faciendum. 372
	Serrarum differentia. 371
	Serũ lactis quomodo sumendum. 206
	Sief barbaris quid. 293
	Signa morborum in genere. 6.7.8
	Signa crisis presentia. 37.38.
	Signa crisis precedetia. 37.38
	Signa salutaria 31.32
	Signa lethalia. 31.32
	Solidorum confectioinum forma triplex. 305
	Solutio continui morbus com-

I N D E X.

412	communis est .	421	285
210	Somnus quomodo fiat .	84	Stupescientia quomodo mortem adserant. 187
da,	84		
372	Somni qualitates .	84	succi rosarum operatio- nes. 205
372	Somni moderati effectus	84	succi rosarum dosis 205
fa-	84		
372	Somni immoderati ope- rationes .	74	sudores quibus & ad qua prouocandi. 89
a .	Somni deficientis noxe .	54	sudores quomodo prouo- candi. 89
su-	54		
206	somni tempus .	84	suffimenta quid. 323
293	somni usus .	84	suffimentorum compositio . 323
ene	soporifera sunt ex gene- re anodynorum. 188		suffimentorum usus. 324
7.8	specillum quid. 475		suffimentorum exempla. 324
a .	splenia quid . 380		
ia.	splenia vnde dicta. 380		suffus Arabibus quid . 315
32	spleniorum forme. 381		
32	spleniorum usus. 381		suppositoria seu glades 277
um	sternutamenta quid. 285		
05	sternutamentorum com- positio. 285		symptomata in vniuer- sum. 17.18.19.20
us	sternutamentorum usus		symptomata que magni- tudi-

I N D E X.

<p>tudine superant suas causas curationis ordinem saepe peruertunt. 428</p> <p>Symptomatibus pluribus occurrentibus quid agendum. 5</p> <p>Syrupus digestiuus quid 221</p> <p>Syrupus unde conficiatur pag. 222</p> <p>Syrupi digerentes humore mixtos. 230. 231</p> <p>Syrupus purgans bilem, pituitam, &amp; melancholia in hepate. 231</p> <p>Syrupi laxantes. 231</p> <p>Syrupi concoquentes bilē flauam. 225</p> <p>Syrupi concoquentes pituitam. 227</p> <p>Syrupi concoquentes bilē atram. 229</p>	<p>Syruporum dosis ad diuersos effectus. 222</p> <p>Syruporum qualitas unde petenda. 223</p> <p>Syruporum exhibendorū tempus. 224</p> <p>Syruporum efficacia. 224</p> <p>Syrupis omnibus cordialis aliqua aqua commiscenda. 223</p> <p>Tabula quid &amp; quomodo fiant. 306</p> <p>Tabularum usus &amp; exhibitio. 306</p> <p>Tabularum exempla. 307</p> <p>Tamarindorum electio &amp; usus. 205</p> <p>Tempus quo morbus, vel cura vel morte terminetur. 33. 34</p> <p>Temporis oportunitas in remedijs adhibendis quomodo animaduertenda.</p>
---	---

I N D E X.

<p>212 Thymiamata quid. 322 Timor quomodo nocivus 91 Tragea sive Tragemata quid. 16 Tragematum forma, ex- hibitiō, vsus 311 Tragmatum exempla . 312 311 Trochiscaris forma, vsus &amp; exhibēdi modi. 291 Tumor p̄ternaturā qd sit. 395 Tumorū p̄ter naturā differētia unde peten- da. 395 Tumorū causę specia- les quid. 96 Tumorū causa primiti- ua seu regressa quanā. 397 Tumorū causa antece-</p>	<p>dentēs quā. 397 Tumorū causa coniun- ctę seu continentes quā nam sint. 397 Tumorū p̄ternaturā signa &amp; indicia. 397 Tumorū incrementum quando adesse iudica- tur. 398 Tumorū principij nota quę. 398 Tumorū status quod- nam sit iudicium. 398 Tumorū declinatio quā do cognoscitur. 398 Tumorū regressiōnis no- ta. 399 eius operatio. 400 Tumorū curationis ini- tium unde sumendum 400. eius tres intentio- nes. 400 in Tumorū declinatione quid.</p>
--	--

I N D E X.

quid faciendum	402	Vene sectio è directo par	
Tumores quatuor tempo		tis laboratis semper fa	
ribus distinguuntur.		cienda.	87
398		Vena sectio quibus con	
Tumores quibus modis		ueniat, quo tempore.	
terminari necesse sit		86	
399		Vene sectio quibus noccat	
Tumores terminandi mo		& quo tempore	86
dius quis optimus isto		Vene quarum sectanda.	
rumq; modorum signa		86	
399		Venena deleteria	147
Tumores curandi prima		Vigilia usus.	84
intentio secundum Ga		Vigilię operationis	85
lenum.	401	Virtus rectorix in cordo	
Secunda intentio quo		semper confirmada.	
modo fiat.	401	223.	
Tertia quomodo perfici		Vlcus est unionis tuor	
ciatur.	402	tium vetus & irruen	
Turbith electio, dosu &		tum.	428
correctio.	208	Vlcerum causa geina.	
Turundas vide.	383	429.	
Turundarum forma qua		in Vlceribus diutnis os	
lis.	385	abscedit.	429

Vlc  
Vlc  
Vlc  
in  
Vng  
tic  
33  
Vng  
Vng  
Vng  
33  
Vng  
33  
Vng  
134  
Vng  
Vng

I N D E X.

<i>Vlcerum iudicia.</i>	429	134
<i>Vlceribus quid officiat.</i>	430	<i>Vnguenta dolorem sedã</i>
		<i>tia.</i>
<i>Vlcera curandi quattuor</i>		134
<i>intentiones.</i>	430 431	<i>Vngueta soporifera.</i>
<i>Vnguentorum compositio,</i>		134
<i>usus &amp; exhibitio.</i>		<i>Volsella quid.</i>
331		474
<i>Vnguento calida.</i>	333	<i>Vulneris unio.</i>
<i>Vnguenta frigida.</i>	333	424
<i>Vnguenta astringentia.</i>		<i>Vulnera quid sint</i>
333		422
<i>Vnguenta emollientia.</i>		<i>Vulnera letalia et quasi</i>
313		<i>letalia.</i>
<i>Vnguenta abstergentia.</i>		423
333		<i>Vulnera tutiora que ã</i>
<i>Vnguenta sarcotica.</i>	134	<i>sint.</i>
<i>Vnguenta glutinantia.</i>		424
134		<i>Vulnera quomodo deli-</i>
<i>Vnguenta erodentia.</i>	134	<i>ganda.</i>
<i>Vnguenta extrahentia.</i>		377.378
		<i>Vulnerum cause, signa et</i>
		<i>iudicia.</i>
		422
		<i>Vulnerum curationem</i>
		<i>quomodo assequamur.</i>
		425.426.427.
		<i>Vulnerum futura quo-</i>
		<i>modo fiant.</i>
		475

F I N I S.



FERRARIÆ,

---

Excudebat Victorius  
Baldinus,  
Typographus Ducalis.



Edo. Cornadani

