

MORIS
HISTO
PLAN


TOMI

A
47
308



~~38~~
~~45~~
~~35~~

A-VI-8



29
—
2-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

11.2.243
BIBLIOTECA
HOSPITAL REAL
GRANADA

b 198 5500 X
i 2142892 X

~~32~~
~~45~~
~~35~~

A-VI-8



29


2-3




b1185500X

62142892X

TIME'S
ARTIFICE
REPRODUCED
BY
PHOTOGRAPHIC
PROCESS





R-2495

PLANTARUM

HISTORIÆ UNIVERSALIS OXONIENSIS

SEU

HERBARUM DISTRIBUTIO NOVA,

PER

TABULAS COGNATIONIS & AFFINITATIS

Ex Libro Naturæ Observata & Detecta.

A U C T O R E

ROBERTO MORISON

Medico & Professore Botanico Regio, nec non Inclytæ & Celeberrimæ
Universitatis Oxoniensis P. B. ejusdemque Hort. Botan. Præfecto primo.

TOMUS PRIMUS.



OXONII,

E Theatro SHELDONIANO

ET PROSTANT LONDINI.

Apud PAULUM & ISAACUM VAILLANT.

M D C C X V.



МУЯАТИАЛ

аииного злая птицы от гибели

ула

ЛЮИ ОГУАЯТС МУЯАТИ

ЛЛ

БТАКИНА в СЛОВАНИ

Слово в слово

И я отсуда

МОЛХОМ ОРЯДОЯ

Молхом орядоя

ЗУМЛЯ ЗУМОТ

ЕМОХО

ОДИНОДАНСОИТ Д

ЛЮСИОАТИЛЮТ Д

ЭНДЛЛАУМЧАКОЗ МУДЛЯ Б

МДСК

Люсио
Люсио

ILLUSTRISSIMO PRINCIPI
JACOBO
ORMONDIAE DUCI, &c.
Universitatis Oxonienfis
CANCELLARIO
DIGNISSIMO.

Illustriſime Princeps,

CUM tanto choro Doctissimorum hominum authoritate & consilio
Tuo præfis, etiamsi ego de facie vix adhuc sim Tibi notus, Tuum tamen
aspectum literis & literatis gratum & propitium fore cur dubitem, nullus
mihi relinquitur locus. Cum enim sis Musarum Oxoniensium caput, atque post
Regem Dominum nostrum Serenissimum fautor benignissimus, eo ipso no-
mine in summa veneratione apud omnes Musas hic degentes habendus es.
Prosapia Tua Antiquissima, facultates opulentissimæ, animi candor, actionumq;
splendor, & super omnia fides Tua integerrima erga Patrem Patriæ (cui semper
tanquam fidus Achates foris & domi adhæſisti) Te satis laudant: quid ni Te
laudabunt tam dignum Mæcenatem Musæ Oxonienses; præcipue cum sub Tuis
auspi-

auspiciis floreat Universitas, adjvantibus conatibus, vigilantia & modera-
mine Vicecancellarii Tui Dignissimi, aliorumque Rectorum & Gubernato-
rum consultissimorum, qui omnes ad nutum dicto Tuo audientes morem ge-
runt. Teque diu incolumem ipsis præesse efflagitant. Floreat Gratia Tua
decens, floreant conatus omnium Rectorum ac Gubernatorum sub Tua
tutela, floreant Scholares sub eorum moderamine.

ROMANUS
Universitatis Oxoniensis
GARIBOLDI
Illustrissime Princeps

Tuus humillimus & devotissimus
Servus

ROBERTUS MORISON.

DOMINO
VICE-CANCELLARIO

Vigilantissimo

Collegiorum & Aularum
Præfectis, Doctoribus,
MAGISTRIS.

*Aliusque cujuscunque Ordinis aut Tituli Viris Dignissimis omni literarum genere
imbutis, Benefactoribus suis in Universitate Oxoniensi Munificentissimis.*

S. P. D.

INGENUI hominis est fateri (Viri Candidissimi & Doctissimi) per quos profecerit. Hunc Umbellarum tractatum olim sub Tutela & Patrocinio Serenissimi Ducis Aurelianensis conceptum, sub Auspiciis D. Domini Regis nostri Caroli II. nutritum, tandemque sub vestra Clientela partum, jam publici juris facere audeo. Hic partus qualis qualis fit, sine vestra obstetricatione lucem non vidisset. Quicquid enim luminis Reipublicæ literariæ Botanicæ, ex hac nostra nova umbellarum methodo advenerit, non minùs vestræ liberalitati, quam nostris peregrinationibus, ac lucubrationibus, sese debere necesse est fateantur omnes, quibus volupe est studium Botanicum. Favore & benevolentia quorundam inter vos huc vocatus, propriâ & pronâ Reipublicæ Botanicæ beneficiendi inclinatione quorundam inquam inter vos in gregem vestrum adscitus, concomitante Providentiâ Divinâ hoc contigisse nullatenus dubito. Homines non solum Doctissimos, sed etiam utilitati Publicæ Universitatis studentes hic offendimus, quibus hoc specimen novum, seu tractatum umbellarūm, secundūm tabulas cognitionis & affinitatis constructum inscribimus & nuncupamus; munus quidem levidense, nec tanto Heroe Cancellario vobisque fautoribus nostris dignum, quod tamen versatis in arte Botanica, atque eidem etiam initiandis, propter methodum facilem, gratum fore expectamus. Omnibus tam hic inter vos, quam alibi terrarum, eo fine perlustrandum & examinandum exhibemus, ut quibus hi nostri conatus arrideant, vestro exemplo prioniores reddantur ad reliquas sectiones promovendas, quas in lucem nos daturos primo quoque tempore pollicemur, nisi designatorum aut Chalcographorum obstant labores; nos in procinctu sumus. Prodeat interim primò sub vestris auspiciis Umbellarum doctrina jam restituta, & ab infinitis erroribus & gravibus hallucinationibus (quibus hucusque scatebat) purgata, & ad novem genera summa redacta, à diversâ formâ & figurâ seminum sic à nobis constituta, & composita, ac ex libro naturæ observata, cum intermediis suis distributionibus à foliorum diversa etiam facie notatis & oblatis, secundūm regulam à Naturâ ipsâ præscriptam, nec hucusque à quovis Botanico ante nos detectam. Si Serenissimus Dux Regius Aurelianensis Princeps (post Salomonem) in Botanicis oculatissimus hodie in vivis fuisset, nullius ope indiguisset hæc nostra Opella, nec cætera nostra proditura opera tamdiu latuissent. Sed Proh dolor! tam Charo Mæcenate

extincto

extincto, tam firmo Atlante dejecto, tam solido à nobis fundamine sublato, cùm nullus mihi adhuc apparuerit Herculeo animo præditus, qui Celsitudini ejus succedere dignatus fit, coactus fui ad Vos tanquam ultimum asylum confugere, ut primus hic apparatus Umbellarum methodicè per genera, & species dispositarum, publico exponetur, utque doctis & in arte Botanica tam hic quam alibi locorum versatis communicaretur; quorum examen in hoc nostro umbellarum specimine non detrecto, sed idem libens lubensque subire audeo. Denique ne prolixa verboruni congestione utar (Viri Doctissimi & Candidissimi) vestros labores omnes, ad majorem Dei Gloriam, Reipub. literariæ Emolumentum, Serenissimi Domini Regis nostri incolumitatem & salutem, subditorum suorum sanctam & sanam educationem dirigi animitus opto; quin & vobis vestrisque laboribus bene vortere Deum precor. Quidquid est hoc nostrum specimen, vobis vovet ac dicat

*Vestrum omnium humillimus Servus
& Cliens*

ROBERTUS MORISON.

PRÆFATIO

A D Lectorem.

NATURALIS Historiae eam partem, quæ de plantis agit, BOTANICEN nempe tradituri, quandoquidem prolixè nimis & confusè hucusque ab authoribus in scriptis suis monumentis exhibetur; nos animo ratum & statutum habemus, ea in medium proferre, quæ longâ experientiâ, & diutinâ inspectione, atque debito examine ex libro naturæ didicimus; quin & plantas omnes meliori methodo (quād à quovis haētenus factum) in lucem edere decrevimus, initium faciendo ab umbellis, quæ nondum ad genera subalterna, aut species intermedias, à Botanicis scriptoribus reducuntur: fortasse quia difficile admodum est dissimilitudinem adinvenire, ubi nimia est similitudo, aut propinquitas, qualis hic in hac sectione cernitur. Nos idcirco hoc plantarum umbelliferarum specimen publico exponere impræsentiarum nobismet ipsis proposuimus, atque idem omnibus doctis, & mediocriter in arte Botanica versatis perpendendum, & examinandum offerre æquum duximus; quod si probaverint, animum nobis addent, nosque incitabunt ad majora (quæ meditamus) edenda; quin & si quæ ibidem contenta displiceant Botanicis, saltem in arte versatis, certiores ab eisdem rationi & experientiæ innitentibus facti, eadem emaculabimus, & emendabimus, atque scopum nobis propositum attingere conabimur, operamque dabimus sedulam, ut omnes sectiones simul junctæ completum (quantum nos penes est) opus Botanicum effiant, secundūm methodum à natura nobis propositam. Hoc intendimus & hic, & alibi in singulareum sectionum enucleatione, nec spretâ tamen authorum lectione assiduâ. Omnes omnium plantarum (nobis saltem hucusque visarum) Sectiones rudi penicillo delineatas, & descriptas penes nos nunc habemus. Primo non solum edimus hoc specimen, trigesimam operis quod intendimus constituenſ partem, sed etiam nonam ordine sectionem, umbellarum omnium doctrinam continentem eo fine damus, ut (quemadmodum aiunt ex ungue leonem) de ceteris à nobis emittendis, versati in Botanicis facilius possint judicare. Porro si hæc Sectio doctorum in arte applausu in scenam admittatur, reliquæ uberiori formâ traditæ sequentur. Doctos omnes Botanicos ubique locorum in consilium admittimus, eorum judicium, eorum existimatio valebit, dummodo ratio & experientia ipsos concomitentur. Neque nos (aliorum scriptorum mcre) longâ serie verborum in hoc nostro tractatu umbellarum utimur, sed breviter & succinctè (primo & ante omnia assignatâ notâ genericâ) adscribimus notas specificas, quibus singulæ species, sub suis propriis generibus militantes, tanquam sub eodem vexillo, seu tessera, possint facili aut nullo negotio ab invicem distingui. Hac enim methodo ex libro naturæ instructi Botanicæ rei studiosi, imposterum perspicue clare & methodice addiscere possunt plantas distinctè digestas per genera supraea, media, & species infimæ, descendendo usque ad singularum specierum varietates; adeo ut sine magnis impensis librorum, dispendio & jactura temporis, certâ hac methodo scientificâ citius cognoscant, & firmius memoriâ retineant Botanici hanc nostram doctrinam novam notis infallilibus eodem modo sese habentibus, à natura datis, & à nobis primo observatis distinctam. Insuper quorundam amicorum in arte versatorum precibus rogati, natales, tempus floredi, temperamenta, & vires, atque nomina magis nota addidimus. Hæc omnia ad oculum ex ipsis umbellis demonstravimus in horto publico Universitatis, eodem ordine quo in hoc tractatu exhibentur. Reliquas sectiones pari facilitate percipiendas & ediscendas (favente divino Numine) trade-

mus : singulis annis unam aut alteram edendo , modo faveant cæptis nostris homines ingeniosi , atque bonum publicum affectantes , nec sine ope (candidè , planè & sincerè loquor) possunt exhiberi icones ad vivum (ut loquuntur) ex origine sculptæ , & non ut hucusque desumptæ ab iconibus vitiosis mendosisque , ex Botanicorum scriptorum libris male delineatis , & sculptis mutuatis . Modo fiat quod petimus , laboribus nostris nullatenus parcemus , ut publico pro- desse queamus , atque ut plantas tam indigenas , quam exoticas , ad cœnæ methodumque facilem , & optimam redigamus , quâ naturalis Historiæ pars hæc , Botanice facilime addisci , & firmiter retineri possit , assignatis indiciis ratione & experientia innixis , atque ex univer- sali naturæ methodo petitis , quam tam hic in hac sectione Umbellarum quam in aliis quas in- tendimus , mihi primo vendico . Non paucos observamus posterioribus hisce seculis de re herbaria scribentes , qui chartas potius inutiliter consumpsere , quam mortalibus profuere . Etenim si eorum labores diligentius pensentur , nihil novi aut eximii in medium proferunt , sed aliorum tantum scripta , in volumina ingentia compilata pro suis venditant : quos equidem inanis Gloriolæ , aut lucri viles cum Typographis faciendi impellit cupidus , reputantes apud se dulce , ex qualibet re qua- stum facere : ita modo stirpes prolixis descriptionibus exhibitas proferant , partes toti generi com- munes recitando , atque singulis speciebus iterum atque iterum adaptando , notam genericam aut specificam , seu peculiarem in perpaucis assignando ; egregiè Botanographorum officio sese functos esse putant , de ordine autem stirpium , parùm sunt solicii . Cum nullam hucusque sibi ipsis proposuere methodum veram , aut genuinam , qua instructi Botanices studiosi , scienti- ficè (id est per genera & species) addiscant . Cumque methodi omnes adhuc propositæ à Bo- tanicæ rei scriptoribus , secundariò tantum plantis convenienti , ut clare quivis cernere potest apud authores , Historias Generales edentes . Nam quidam à loco in quo proveniunt plantæ ; alii à viribus , & facultatibus ; alii denique à quatuor anni tempestatibus methodum ge- neralem desumpseré , sed neutra harum est admittenda , nam prior Medicinam facientibus inservire poterit , ac proinde Medicis & medicantibus quodammodo est pernecessaria : alte- ra Botanicis hortulanis , quorum curæ plantarum cultura demandatur , observatu etiam perdigna ; hisce enim Methodis prædictis , plantas toto cœlo genericè differentes junctas vi- demus , & vice versa genericè conformes , longo intervallo separatas pariter observamus . Cum inquam jungendas separant , & separandas conjungunt ; omnes hucusque in medium metho- di allatæ , secundariò sunt tantum observandæ , ac proinde nos easdem rejicimus , & veram ac genuinam methodum , primo & per se inservientem , & à naturâ ipsa vegetabilibus communicatam , tessera , seu notâ infallibili , in omnibus sub eodem genere contentis per- ceptibilem proponimus . Cumque methodus , seu ordo sit omnis doctrinæ anima ; idcirco nos tam in hac umbellarum dispositione , quam in universalí omnium stirpium digestione , quam pollicemur , notas genericas & essentiales à seminibus eorumque similitudine petitas per tabu- las cognitionis & affinitatis disponentes stirpes exhibebimus . Differentias autem specificas à partibus ignobilioribus , scilicet radice , foliis , & caulis , odore , sapore , colore desumptas adscribemus : singulis generibus singulas accersendo species , ita species diversa facie cognoscibles sub generibus intermediis , genera intermedia sub supremis , notis suis essentialibus & semper eodem do sese habentibus distincta militabunt . Hic est ordo à natura ipsâ stirpibus ab initio da- tus , à me primò jam observatus . Dum enim omnium stirpium tam in agris & campis sponte na- scientium , quam in hortis Serenissimi Regii Ducis Aurelianensis per plures annos educa- tarum promptuarium construerem seminarium , ex frequenti omnium , & singularum stir- pium seminum inspectione , & ad invicem collatione , graviter authores hallucinatos fuisse , tam in plantis denominandis , quam digerendis , aut disponendis animadverti . Quod cuili- bet mecum infrà in hoc umbellarum tractatu consideranti , atque proprius intuenti apparebit . Promptuarium meum seminarium bis mille diversarum specierum seminibus , & amplius , sin- gulís speciebus , singulis pixidibus inclusis ornatum est . Eodem ordine in loculamentis disponun- tur ,

tur, quo in tabulis offeruntur, atque ut in horto publico Botanico Universitatis impræsentiarum collocantur umbellæ. Passim in hâc sectione sequenti tria præstamus, quæ ab aliis ante nos scribentibus neglecta, nèdum detecta fuere, quæque non parùm hucusque cupientibus stirpes methodice discere offecerunt. Primo genericam seu universalem, tam generum longe patentium, quam intermediorum assignamus notam unicuique generi convenientem. Secundò specificam unicuique speciei propriam, aut peculiarem adaptamus tesseram. Tertio durationem omnium, & singularum specierum denotamus; assignatis Charactismis approprias. V. g. ♂ denotat vivaces seu perennes, ♀ annuas indigitat umbellas. Quibus autem affigitur Charactismus & sunt aut non scriptæ, aut male ab authoribus denominatae, ac proinde male dispositæ, id est extra classem aut seriem congenerum. Denique natales omnium umbellarum, earumque temperamentum, & vires, nominaque diversa authorum saltem præcipuum precibus quorundam Botanicorum, ut dictum, assignamus. Nec eadem hæc, sed methodum novam & inanditam, nobis solummodo vendicamus, quæ multis perdoctis Botanicis fortassis arridebit; etiam si difficile, imo impossibile sit, omnibus placere. Hac ratione intuendo tabulas nostras dictâ metodo constructas, quivis percipere poterit, quæ umbellæ sunt perennes, quæ annuæ, quæ denique sub auspiciis Serenissimi Regii Ducis Aureleanensis, Gastonis Franciæ collectæ, & observatae, & nunc demum à nobis exhibitæ. Ipsi ejusque memorie easdem acceptas referto. Cætera pollicemur sub auspiciis Serenissimi & Potentissimi Domini, Regis nostri Caroli II. accidente benevolentia, fautorum, & amicorum in inclita & Celeberrima nostra Universitate, aliorumque Botanices studiosorum alibi degentium, Vale

Dat. ex Musæo nostro in Collegio
dicto Universitatis. XV. Kal.
Febru. 1672.

*Tuus, tuisque inserviens
commodis*

ROBERTUS MORISON.

derenfeld mit seinen ersten Schriften zu beginnen.
In der V. K. sind natürlich einige
neue Werke hinzugekommen.

P R A E F A T I O

A D

LECTOREM.



VM primum animum serio ad studia Botanica appulimus, sub auspiciis Serenissimi Principis Gastonis Franciae, observavimus complures, imo omnes pene, Authores de re Botanica confuse & sine ordine ac methodo scribentes, etiamsi in edendis ac illustrandis lucubrationibus operam posuerint non pauci, iisque exquisitae eruditionis viri; ut inter Italos, Petrus Andreas Matthiolus, Andreas Cœsalpinus, Fabius Columna: inter Gallos, Johannes Ruellius, Jacobus Dalechampius: inter Germanos, Otho Brunfelsius, Valerius & Ericius Cordus pater & filius, Hieronymus Tragus, Leonardus Fuchsius, Theodorus Tabernæmontanus, Joachimus Camerarius: apud Helvetios, Bauhinus uterque frater Casparus & Johannes, Conradus Gesnerus: inter Flandros, Carolus Clusius, Rembertus Dodonæus, Matthias de Lobel: inter Anglos, Gulielmus Turnerus, Johannes Gerardus, Thomas Fansonius, Johannes Parkinsonus: omnes hi cum trecentis aliis minoris notæ apud varias Nationes in re Botanica desudarunt, nondum tamen omnes, nec quivis eorum id assequutus est, ut methodum veram & genuinam, semper & constanter eandem, seu eodem semper se modo habentem, à tertio mundi creationis die, detexerit. Quamobrem non exiguum operæ pretium nos facturos identidem reputavimus, post omnes supra recitatos, atque multos alios recentiores authores evolutos, Historiam generaliorem Plantarum aggredi, aliquot abhinc annis (dum operam dabamus per decennium Celsitudini ejus, nempe Aurelianensem Duci præfato) incæptam. Quanquam & laboris magnitudo & difficultas perficiendi nos ab hujusmodi cœpto deterrebant; adde expensarum immensam summam, & fastidiosam ac nauseosam Pictorum, Chalcographorum, Typographorum, aliorumq; id genus hominum artes manuariæ exercentium turbam; nihilominus quidam amici hic animum nobis addiderunt, viri satis per orbem terrarum clari, non solum pereruditæ, sed etiam bono publico studentes (quorum judicio, a prima cum ipsis notitia, multum tribuimus) qui id a nobis tanto felicius faciliusque præstitum iri sibi pollicebantur, quod fama nostra per totam Europam inter Botanicos ante aliquot annos evolaverat, quodq; etiam è longinquo ad magnum hoc opus suscipiendum à quibusdam majoris notæ excitati fuimus: horum igitur partim consilio atque hortatu, partim studio atq; affectu erga rem publicam Botanicam stimulati, ad immensum hunc laborem non sine faustis auspiciis accingimur. Intelligent rei Botanicæ studiosi nihil apud Botanicos supra citatos, aliosque quorum nec dum meminimus, hucusque nisi chaos confusum & æneos in disponendis & rite associandis plantis inveniri; atque multum interesse reipublicæ Botanicæ, ut methodus vera & genuina, a primordio mundi a Deo & natura data, imo numeris suis omnibus absoluta prodeat. Observeare præterea velim Lectorem me non detractum ire tot tantorumque hominum doctorum conatibus, quibus si in multis offendissent danda esset venia, cum faciem nobis prætulerunt sequuturis; ac quod semel pro sæpe à nobis offerendum erit, cum officio suo strenue perfuncti sint, superest ut ea quæ illi sibi excidisse testantur ex Hallucinationibus ipsorum a nobis allatis, & Methodo nostra exhibita, disponente plantas per genera & species, definiendo genera & describendo species, per Tabulas cognationis & affinitatis exhibeamus; & genera & species, inquam, a tessera seu symbolo notâve essentiali, à fine ultimo petità, omnium plantarum hisce quinque Sectionibus contentarum, cum cohærentia Sectionis cum Sectione (quantum fieri potuit) disponamus.

In describendis hisce nostris de stirpibus Tabulis quid præstitum sit observabunt Botanici; licet plerique fortassis à nobis prolixa oratione enarratas plantas existiment, maluimus tamen, imo elegimus id aliorum versatorum in arte Botanica ac & qui cuiuslibet judicio potius deferre, quam de nostris lucubrationibus multa prædicare, affirmare tamen ac profiteri (& quidem uti speramus contra arrogantiæ notam) audemus, nos laborasse omni魁 studio annixos esse, ut clare, dilucide & quam commode fieri potuit breviter (succisis superfluis) singularium stirpium historiæ

P R A E F A T I O

sive descriptiones proponerentur, præmisso classibus sectionibusve ordine quām licuit commodissimo atque expeditissimo, digerente plantas secundum genera & species, præmittendo itidem generibus longe patentibus, imo & intermediis, suas notas essentialias à Natura datas, quæ plantas certo indicio notu faciles reddunt. Hæc autem quo labore, quā cura ac industria a nobis sunt digesta, facile is cognoverit, qui stirpium multitudinem in hisce Tabulis nostris exhibitarum ac descriptarum, earumque varietatem, observare & attentius expendere voluerit. In immensa Herbarum multitudine illud desiderari video quod in alio quocunque agmine incomposito maxime expeti solet; nisi enim in ordines redigantur & veluti castrorum acies distribuantur in suas classes, tumultu & fluctuatione omnia perturbari necesse est. Id etiamnum maxime in plantarum examine contingere videmus: cum enim inordinata multitudine obruatur intellectus, errores inextricabiles, & morosæ altercationes ut plurimum exoriuntur: ignorato utique proprio genere nulla descriptio, quamvis accurate tradita, plantam certam demonstrat, sed plerumque fallit; nam confusis generibus omnia (saltem species) confundi oportet. Cum igitur scientia omnis in similiū collectione & dissimiliū distinctione consistat, hæc autem distributio est in genera & species veluti classes secundum differentias rei naturam indicantes, conatus sum id præstare in universa plantarum historia, ut si quid pro ingenii mei tenuitate in hujusmodi studio profecerim, ad communem utilitatem proferrem. At ordo, qui secundum naturarum societatem assignatur, omnium facillimus, tutissimus, utilissimusque reperitur tum ad memoriam adjuvandam, tum ad facultates contemplandas: facillimus quidem, quoniam differentiæ ex ipsamē natura prodeentes maxime sensibiles sunt & unicuique manifestæ, neque fallunt ut adventitiæ conditiones, quæ non sunt perpetuae: ad memoriam etiam pollet, quoniam in compendio sub generibus ordinatis clauditur pene immensus plantarum numerus, adeo ut eas quæ nunquam antea visæ sunt unicuique liceat in suam classem redigere, & si innominatae sint, nomine sui generis appellare: tandem & facultates quas Medici maxime querunt & expetunt, tanquam proprietates innotescunt ex naturarum cognitione; quæ enim generis societate junguntur, plerumque & similes possident facultates. Persequendo autem secundum hunc ordinem plantarum historiam, fit ut brevior descriptio satisfaciat, non enim cogimur in singulis ea repetere quæ communiter generibus convenient, atque adeo ex certa & brevi descriptione paratur notitia, ut pictura certiore efficeri non possit: nam non omnes differentias pictura exprimit ut oratio.

Ad curationem variorum morborum adhibuerunt ac utiles stirpes observarunt antiquitus Medici; reliquæ artis partes post natæ sunt: quæ tametsi Medicum aptiorem & perfectiorem reddit, a nonnullis tamen negleñtæ vel etiam contemptæ sunt, non minus quam hodie stirpes. Medicorum autem veterum nemo fuit qui non & stirpium & simplicis medicinæ notitiam sibi comparare studuerit, si non omnium, saltem earum quas ad medicationes adhibuerunt. Atque hinc est quod Galenus omnes Medicos artis que medicæ studiosos ad stirpium cognitionem adhortetur. Medicus (inquit l. i. de Antidotis) omnium stirpium (si fieri potest) peritiam habeat consulo; si minus, plurium saltem quibus frequenter utimur. Nobis autem stirpium Historiam universalem meditantibus de methodo ac ordine non exigua accessit solicitude. Nam quemadmodum artes omnes ac scientiæ, si methodico aliquo ordine distribuantur, non exiguum ornatus ac lucis inde refertunt: sic stirpium historiæ hinc plurimum gratiæ ac decoris accedere posse haud dubium est. Tametsi facile sit inventis addere, qui tamen inveniat quod non inventum prius, non invenitur facile. Quem penes jus & norma plantas detectas recte disponendi aut vere riteque describendi, nisi eum qui frequenti atque iterata inspectione, earum flores, capsulas seminaque diligenter & summa cum attentione consideraverit? Quod mihi objicit ignavus forte stupidusque Botanicus, factu facillimum, quandoquidem patebant fores a tertio creationis die, ex nostra supra allata assertione, in hodiernum; at nullus in hæc penetralia ante me ingressus, nullusve secreta methodi vere hucusque, etiamsi in propatulo fuere, detexit. Vana hæc a quibusdam haberi possunt, ast sunt vera, atque eo fine hæc Posterioris relinquo ut sciant Christophorum Columbum Indianam occidentalem, cuius ante ipsum nulla unquam fuit mentio, primo de texisse Hispanis, ipsis tamen tempore ab ipsis nihilominus exprobratum, inventionem fuisse facillimam; ipse vero Columbus, ut modeste illorum ingratitudinem, simul & imperitiam arrogantiamque ostenderet, ipsis ovum porrexit, ut sagacissimus inter ipsos id rectâ erigeret aut stare angulo acuto per se faceret, quod captum illorum superare observans, vel depresso ovi an-

gulo

A D L E C T O R E M.

gulo acuto paululum frangendo, vel ut aliter perhibetur, assumpto modico salis stare recta fecit ovum; sic illorum arrogantiam simul & inscitiam posteris detexit. India Occidentalis extabat à condito mundo, at nullus ante Christophorum de eadem unquam cogitavit. Sic plantæ eadem nota generica à tertio creationis die officiebantur; at nullus ante me à nota illa generica ac essentiali in methodum easdem per tabulas cognitionis & affinitatis reduxit. Sed de his satis, ad magis seria pergamus.

Inter Medicinæ partes, quæ haud paucæ existunt, stirpium ac simplicium notitia, ut nec minima, nec postrema, sic præcipua semper habita fuit, utpote antiquissima, quæque ipsi arti originem contulit ac præbuit. Cum enim nulla ars medica esset, à notitia nonnullarum stirpium initium sumpsit, quas veteres illi Heroes quibus artis inventio adscribitur, vel casu aliquo monstrante, vel alio modo cognoverunt: & deinde frequentibus experimentis ad curationes variorum morborum adhibuerunt ac utiles observarunt. Nunc tandem quamin harum quinque Sectionum herbarum historia vobis Subscriptoribus ac Benefactoribus obstrinxeram fidem libero, serius haud dubie quam multi exoptassent, & quam ipse constitueram. Sed multa subinde præter spem incident, quibus nostra consilia perturbari atque iis moram injici contingit: sic mihi variis ac diutinis negotiis occupato, ac frustrationibus impedito, historiam harum quinque Sectionum hoc tenus absolvere non licuit. Maximam harum Sectionum quas hic complexus sum partem, quoad earum dispositionem à nemine (cujus lucubrations legerim) hactenus observatam certus sum. Ingenue insuper profiteor meam hanc methodum non ex libris Botanicorum scribentium, sed ex Libro Naturæ mire & mere deproprietam. Ceterum meos labores, quales quales sunt, tametsi lectorum quorundam malevolorum expectationi fortassis non respondeant, bonos boni consulturos & candide, sicubi lapsus sum, interpreturos confido: quod si fecerint, reliquam quam mihi Deus optimus maximus concederit vitam ad studia Botanica pro meo modulo promovenda impendendam esse sciant.

Plantarum & aliorum simplicium cognitionem apud priscos & etiam inter neotericos celebrem fuisse, ac summo in honore habitam; imo perjucundam & delectabilem, atque ad vitam tuendam summopere necessariam, non à philosophis tantum & medicis, sed etiam à regibus, veteres testantur historiæ. Siquidem Plantæ in medendo primum obtinent locum, cum sint illæ basis & fundamentum Medicinæ; quin & illis sanitas præsens incolunis servatur, vitaque in multis annos producitur: iis quippe omne morborum genus depellitur, ac deplorati etiam interdum, quorum in extremo spes salutis est posita, luci auræque natali redduntur. Hinc authores multi stirpium facultates summo studio sunt prosequuti, & earum formas & imagines affabre sculptas exhibuerunt, & anxia cura medendi explorarunt vires, scriptisque easdem posteritati consecrarunt. Ac cum quilibet pro ingenii excellentia sententiam suam publicæ utilitatis causa scriptis divulget, nec mihi id censeo vitio datum iri, cum aliorum, imo doctorum, sententias convellam atque improbem, quum nullius lucubrationibus quicquam derogem, sed potius quicquid à me profertur, illud omne virorum ingenuorum, candidorum & eruditorum (non autem momorum atque ignavorum cavillatorum) judiciis subiectum atque adeo commendatum velim. Itaque tantum abest, ut qui hoc stadium ante nos sunt ingressi, quanquam perdocti, gnavi & seduli Scriptores, nos deterruerint, ut nobis potius facem, imo lampadem hanc tradidisse & ad eundem cursum invitasse videantur: sicuti nec noster hic labor improbus ad alios avertendos institutus fuit, sed ad acendum potius aliorum ingenium, majoremque diligentiam. Sed cum plerique mortalium, etiam doctissimi, in plerisque plantis hæsitant, atque sæpen numero earum cognitionem non solum ignorent, imo modum ipsas ad peculiaria, propria & genuina genera speciesque reducendi omiserunt. Nullus omnino est inter mortales qui omnia norit, nec nisi soli Deo convenit Plantarum omnium simul, earumque virtutum perfecta scientia. Cum memoriam impediatur, atque obruat tanta plantarum copia & varietas absque methodo certiore, quam à prædictis omnibus Botanicis hucusque traditur, inde multi à plantarum studio absterrentur: quippe studium hoc arduum & difficile est, partim ob magnum plantarum numerum, partim vero ob nominum apud Authores diversitatem, sed multo magis ob defectum veræ & infallibilis methodi. Hinc Plantæ memoria facilius excidunt, cum unius ejusdemque Plantæ tot varia nomina ab authoribus proponantur, & propter tot nominum diversitatem plantis impositam non tantum appellaciones genuinæ, sed & notitia & cognitio tota confunditur, quæ studiosos ac etiam professores rei Botanicæ ab hoc studio adeo Medicis necessario seducunt. Quare studiosi complurimi, imo & Professores ipsi, sæpius & ardenter

summis

PRÆFATIO AD LECTOREM.


summis precibus efflagitarunt, ut hos nostros labores communicaremus, atque methodum hanc nostram, omnium adhuc propositarum (absit jactantia) faciliorem certioremque ipsis exhiberemus, per tabulas cognationis & affinitatis dispositam; tandem ipsorum precibus vieti, manus dedimus. Cum itaque omnium plantarum, tam ab antiquis, quam recentioribus descriptarum & nostris observationibus detectarum & exhibitarum Historiam hanc universalem contexendam in me suscepimus, primum Herbis antiquitate reliquis stirpibus lignea materia constantibus preferendis inter omnes dare locum statui, in hac secunda historiae nostrae generalis parte; quia notu & distinctu arboribus sunt difficiliores, easque numero longe excedunt. Et quod prioritate naturæ excellant Herbae, facile probatur ex sacris paginis Genesios cap. I. v. 11, 12. ubi leguntur haec verba. Germinet terra herbam virentem & facientem semen, & lignum pomiferum faciens semen juxta genus suum, cuius semen in semetipso sit super terram, & factum est ita, & protulit terra herbam virentem & facientem semen juxta genus suum, lignumque faciens fructum & habens unumquodque segmentum secundum speciem suam; & vidit Deus quod esset bonum, &c.

Cum enim Herbae (uti dictum) notu & distinctu difficiliores sint, & numero longe excedant arbores, frutices suffruticesque lignea materia constantes; ideo Herbas numero plures, difficiliores & confusius apud autores traditas aggredimur, ne idem nobis contingat, quod Dalechampio & Joannis Bauhino præmaturâ morte ablatis, atque eorum operibus in manus male versatorum in Botanicis incidentibus contigit. Porro observantes suffrutices bacciferas scandentes primæ Partis agmen claudere; idcirco ab herbis bacciferis Historiam herbarum incipere animus fuit. Prima Sectio continet Herbas bacciferas tam scandentes quam non scandentes: scandentes campanulatas lactescentes & non lactescentes: scandentesque pomiferas. Secunda sectio, Legumina seu siliquosas, tam scandentes quam non scandentes & Trifolia leguminosa seu Legumina trifoliata, &c. Tertia, tam siliquosas quam siliiculosas bicapsulares tetrapetalas. Quarta, tricapsulares hexapetalas. Quinta, tricapsulares plantas monopetalas pentapetalasque: bicapsulares monopetalas: quadricapsulares tetrapetalas: pentapetalas quinquecapsulares & multicapsulares: pentapetalasq; unicapsulares &c. Primo in generibus longe patentibus singularum Sectionum notam genericam & communem unicuique generi superiori assignamus: Secundo, Notas subalternorum generum: Tertio, Tabulas cognationis & affinitatis cum duratione plantarum singularum, cum notis suis characteristicis earundem durationem indigitibus (scilicet & vivaces, & annuas) proponimus: nomina in uniuscujusque speciei principio adjicimus: natales versus finem: denique Temperamentum & Vires, Hallucinationes Caspari Bauhini aliorumq; authorum tandem addimus: quæ omnia authoribus pene inusitata methodum nostram omnino novam facilitant, cum ad memoriam adjuvandam, tum etiam plantas earumq; facultates retinendas. Vale amice Lector & harum quinque Sectionum dispositione multis peregrinationibus ac lucubrationibus acquisita fruere, donec reliqua prodeant eadem methodo per Tabulas cognationis & affinitatis dispositas.

Datum ex Museo nostro
in Collegio dioto Uni-
versitatis, Idibus No-
vembri, 1680.

Tuus tuisque inserviens commodis
ROBERTUS MORISON Medicus
& Professor Regius Botanicus, nec non
Universitatis Oxon. P. B. ejusdemque
Horti Praefectus primus.

TABVLA VMBELLARVM GENERALIS. cognationis, S: affinitatis Tab: I



TAB. I.

ELENCHUS UMBELLARUM IN TAB. I.

Generali contentarum, semine striato, fungosa substantia inclusa
donatarum, cognitionis & affinitatis.

Genus primum.

CAchrys semine fungoso lœvi, foliis Ferulaceis.
A. Frankinsence with fungous smooth seed, & leaves like Fennell. G. Cachrys vray, ou Libanotis de Galien à graine fungueuse, lissée, & à feuille coupée, comme fenouil, ou Ferule de Matthiol.

Cachrys semine fungoso, sulcato, aspero, foliis Peucedani latiusculis. A. Frankinsence with furrowed rough seed, & leaves like Sowfennell somewhat broad. G. Cachrys, ou libanotis à graine fungueuse, cane-

lée & aspre, à feuille de Peucedanon plus large. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, foliis Peucedani tenuioribus. *A. Frankinsence with fungous, furrowed, smooth seed, with leaves like Sowfennell somewhat narrow. G. Cachrys, ou Libanotis à graine fungueuse, canelée & lissée, à feuille de Peucedanon plus estroite, ou menuë.*

Vide Tab. Generalem suprà pag. adversa præcedenti.

E L E N C H V S T A B. II.

Cognitionis & affinitatis,

U M B E L L Æ semine striato majore,
foliis fœniculaceis donatæ.

Genus 2.

Foeniculum vulgare. *A. Common Fennell. G. Fenouil commun.*
Foeniculum dulce. A. Sweet Fennel. G. Fenouil doux.
Cuminum. A. Cumin. G. Cumin cultivé.
Meum Athamanticum. A. Spignell. G. Meon.

U M B E L L Æ Semine striato minore
foliis fœniculaceis donatæ.

Meum spurium. *A. Bastard Spignell. G. Meon faux ou bastard.*
Bulbocastanum. A. Earth chesnut. G. Bulbocastanon masle.
Selinum pumilum montanum. Clus. A. Clusius his small montaine Parsley. G. Petit Persil de montaigne de l'Ecluse.
Visnaga, seu Gingidium. A. Strange Persil, or rather pick-tooth Umbell. G. Gingidion de Matthiol.
Saxifraga Pannonica. Clus. A. Breake-stone of Hungaria. G. Brise-pierre d'Hungarie.

U M B E L L Æ Semine majore striato, foliis lobatis seu pinnatis donatæ.

Levisticum. *A. Lovage. G. Leveche commun, Lou Hipposelinon de Matthiol.*
Siler montanum majus. A. Greater Sermontaine.
G. Grand Ligusticon de Matthiol.
Siler montanum minus. A. Lesser Sermontaine. G. Petit Ligusticon, ou Sermontaigne.
Siler Aquilegia foliis. A. Sermontaine with columbine leaves. G. Sermontaigne à feuille d'Ancholye.
Angelica sativa seu major Dod. A. Angelica. G. Angelique cultivée.
Angelica sylvestris Dod. A. Wilde Angelica. G. Angelique sauvage.
Angelica maxima seu montana, C.B.P. & Archangelica. A. Archangellica. G. Archangelique.
Angelica Canadensis. Corn. A. Angelica of Canada. G. Angelique de Canada.
Angelica sylvestris minor repens seu erratica, C.B.P.

A. Goutwort, Herbe-gerard, or Achweed. G. Petite Angelique trainant.

Imperatoria. A. Masterwort. G. Imperiale.
Astrantia, seu Imperatoria nigra, major. A Great Starre-masterwort. G. Grand Imperiale noir.

Astrantia, seu Imperatoria nigra, minor. A. Little Starre-wort. G. Petit Imperiale noir.

Smyrnium majus. A. Alexander, or Alissanders.
G. Smyrnion de Matthiol.

Smyrnium minus seu Creticum. A. Throughwax-alissanders. G. Smyrnion de Dioscorid & Dodon.

U M B E L L Æ Semine striato minore, foliis lobatis seu pinnatis donatæ.

Sifarum. *A. Skirrets. G. Cherui grand.*
Pimpinella Saxifraga major. A. Great Burnet Saxifrage. G. Pimpinelle Saxifrage grande.
Pimpinella Saxifraga major degener. A. Great Burnet Saxifrage with cut leaves. G. Pimpinelle Saxifrage grande, à feuille coupée, ou fendue.

Pimpinella Saxifraga minor. A. Lesser Burnet Saxifrage. G. Pimpinelle Saxifrage petite.

Pimpinella Saxifraga minor crispa. A. Lesser Burnet Saxifrage with cut leaves. G. Pimpinelle Saxifrage petite, coupée.

Sison. A. Wilde Parsley, or Amomum of the Germanes. G. Sison, ou Persil de Macedoine de Dodon.

Sium terrestre seu segetale. A. Corne Parsley, or Honewort. G. Berle ou vray Sion des bleds.


Sium aquaticum, latifolium. A. Large water Parsley. G. Berle, ou Sion aquatique à large feuille.

Sium aquaticum angustifolium. A. Narrow-leaved water Parsley. G. Berle ou Sion aquatique à estroite feuille.

Sium aquaticum ad alas floridum. A. Water Parsley flowing at the joints. G. Berle, ou Sion aquatique, fleurissant aux aisles.

Sium aquaticum foliis rugosis, trifidis, & dentatis. A. Water Parsley with rough leaves parted in three & cut like a saw. G. Berle, ou Sion aquatique, avec les feuilles rugeuses, partagées en trois, & dentelées.

Sium aquaticum pumilum foliis fœniculaceis. A. Dwarfe water Parsley with leaves like Fennell. G. Sion aquatique petit, ou Berle à feuille menue, coupée comme celle de fenouil.



TAB. III.

ELENCHUS TAB. III.
Cognitionis & affinitatis.

UMBELLÆ Semine majore striato,
foliis plurifariam divisæ.

Sefeli Æthiopicum, frutex. A. Woodie Hart-wort. G. Seseli d'Æthiopie ligneux.

Seseli pratense. A. Medow Hart-wort. G. Seseli des prez.

Seseli montanum, seu Pannonicum ^{1um Clus.} A. Montaine, or Hungarie Hart-wort. G. Seseli des montaignes ou d'Hungarie de l'Ecluse.

Cicuta latifolia foetidissima. A. Broad leaved stinking Hemlocke. G. Ciguë, ou Cicutaire à large feuille puante.

Cicuta major. A. Great common Hemlocke. G. Ciguë commune.

Cicuta minor. A. Foolish Hemlocke, or counterfeit Parsley. G. Petite Ciguë.

Cicuta palustris tenuifolia. A. Small water Hemlocke. G. Ciguë des eaux, ou Phellandryon de Pline.

Oenanthe maxima odore viroso. A. Water Dropwort, or Oenanthe of a high virulent smell. G. Oenanthe veneneuse, & tres-grande, tirant à la Ciguë.

Oenanthe Apii folio. A. Dropwort with Parsley leaves. G. Oenanthe à feuille de Persil.

Oenanthe angustifolia. A. Dropwort with long narrow leaves. G. Oenanthe à feuille estroite & longue.

Oenanthe Millefolii palustris folio. A. Dropwort with leaves like water Yarrow. G. Oenanthe à feuille de Mille-feuille d'eau.

Crithmum marinum. A. Sampierre, or sea Purfleane; rather sea Parsley. G. Fenouïl marin, Crithmon, Bacille, & Batis de Pline.

Crithmum spinosum. A. Pricklie Sampierre, or sea Parsley rather than sea Parsnep. G. Fenouïl marin, ou Crithmon espineux, selon aucuns, Pastinade marine.

UMBELLÆ Semine striato minore,
foliis plurifariam divisæ.

Apium sativum planum. A. Plaine garden Parsley. G. Persil des jardins lisse.

Apium sativum crispum. A. Curled Parsley. G. Persil des jardins crespu.

Apium sativum, seu montanum angustifolium. A. Montaine Parsley with narrow leaves. G. Persil des montaignes à feuille estroite.

Apium latifolium degener, foliis dissectis. A. Garden Parsley with cut leaves. G. Persil des jardins, large & à feuille coupée.

Apium hortense maximum. A. Greatest Garden Parsley. G. Le plus grand Persil des jardins.

Apium umbellâ luteâ. A. Yellow tufted Parsley. G. Persil à fleur jaune.

Apium palustre Italicum, seu Selleri. A. Italian Smallage, or Selleri. G. Persil des marais d'Italie, ou Selleri des jardins.

Apium palustre nostras. A. Smallage, or water or marsh Parsley. G. Persil des marais, ou Ache commune.

Apium semine villoso & incano, Macedonicum. A. Macedonian Parsley with white hoarie seed. G. Persil de Macedoine à graine blanche, & veluë.

Apium semine villoso fusco. Selinum peregrinum. ^{1um Clus.} A. Strange Parsley with winged leaves & brown hoarie seed. G. Persil estranger, premier de l'Escluse à graine brune & veluë.

Ammi annuum vulgare. A. Bishopsweed. G. Ammi de Dalechamp, selon quelques-uns.

Ammi perenne. Nobis. Ammi Fuchsii Dalpii in Hist. Lug. A. Long Lasting, or perennall Bishopsweed. G. Ammi perennel, ou Ammi de Fuchs.

Carum & Carui. A. Caraways. G. Carui de Matthiol.

Anisum. A. Anise. G. Anis.

Pyrethrum. A. Pelletory of Spaine. G. Pyrethre vray.

UMBELLÆ Semine striato, foliis
quid peculiare referentibus.

Bupleurum perenne latifolium. A. Large Hares-eare Perennall. G. Bupleuron perennel à large feuille.


Bupleurum perenne angustifolium. A. Narrow, perennall Hares-eare. G. Bupleuron perennel à feuille estroite.

Bupleurum annum minimum. Col. A. Lesser Hares-eare annual. G. Petit Bupleuron annuel de Columna.

Perfoliata perennis Alpina angustifolia majori C. B. P. A. Great narrow leaved Through-waxe perennall. G. Grande Perce-fuelle perennelle, & à feuille estroite des Alpes.

Perfoliata annua vulgatissima. A. Common great Through-waxe annual. G. Grande Perce-fuelle annuelle.

Perfoliata annua minima Bupleuri folio, Col. A. The least Through-waxe annual with leaves of Bupleuron. G. Tres-petite Perce-fuelle annuelle, à feuille de Bupleuron.



TAB. IV.

ELENCHUS TAB. IV.
Cognitionis & affinitatis.

UMBELLÆ Semine alis folia-
ceis cincto.

Genus 3.

Laserpitium lobis latioribus, Seseli Æthiopicum,
herba, Dod. Libanotis Authoribus vulgo dicta.
A. Broad leaved Laserwort with plaine seed-filmes.
*G. Laserpitium nommè Seseli Æthiopicum, herba, par
Dodon. & Libanotis, par la plus grande part des Au-
theurs.*

Laserpitium lobis latioribus, libanotidi simile, semi-
ne criso, seu Costus amara, J.B. *A. Broad leaved Laser-
wort with curled rough seed-filmes.* G. Laserpitium à
large fueille, ayant les semences undoyées ou cres-
pues & rugeuses.

Laserpitium lobis angustioribus saturatè virenti-
bus & lucentibus, semine criso. *A. Laserwort with
narrow sad-green shining leaves, and curled seed-filmes.*
*G. Laserpitium, ayant les fueilles estroites, de cou-
leur obscure, vertes, & luisantes, & à la graine
crespuë.*

Laserpitium lobis angustioribus dilutè virentibus,
& multifariam divisis. *A. Laserwort with narrow-
cut light-green leaves.* G. Laserpitium à fueille e-
stroite, coupée, de couleur verte-lavée.

Laserpitium lobis longioribus dilutè virentibus,
conjugatim dispositis. *A. Laserwort with long light-
green leaves, set opposed.* G. Laserpitium à fueille
longue estroite, de couleur verte-lavée, directement
opposée l'une à l'autre.

UMBELLÆ Semine ala folia-
cea cincto.

Genus 4.

Thapsia latissimo folio. C. B. P. & 3^{ia} Clus.
A. Thapsia, or scorching fennell Gyant. G. Grand-
de Thapsie.

Thapsia latifolia villosa. C. B. P. 1^a Clus. *A. Tha-
psia, or scorching Fennell with large hoarie leaves.*
G. Thapsie à large fueille veluë.

Thapsia minor carotæ effigie Lob. *A. Little scorching
Fennell with the leaves like Carrots.* G. Petite Tha-
psia à fueille de carote.

UMBELLÆ semine villoso,
seu hispido.

Genus 5.

Pastinaca tenuifolia, sativa, alba. *A. Carrott with
a white root.* G. Carote commune à la racine
blanche.

Pastinaca tenuifolia, sativa, lutea. *A. Carrott with
a yellow root.* G. Carote commune à la racine jaune.

Pastinaca tenuifolia, sativa, rubra. *A. Common Car-
rott with a red root.* G. Carote commune à la racine
rouge.

Pastinaca tenuifolia, sylvestris, genuina *Dioscoridis.*
A. Wilde carrott. G. Carote sauvage, ou la vraye de
Dioscorid.

Pastinaca tenuifolia, sylvestris, lucida. *A. Wilde
Carott with shining leaves.* G. Carote à fueille lui-
sante.

Pastinaca tenuifolia, sylvestris, radice, & umbella
lutea. *A. Carott with a yellow root, & umbell.*
G. Carote sauvage à la racine & ombel jaune.

Pastinaca tenuifolia Cretica, umbellæ radiis Gingidi-
i longioribus. *A. Carott with the stemmes of the um-
bell longer then those of Gingidium.* G. Carote avec les
rayons de l'ombel, plus longs que ceux de Gingidion.

Pastinaca Cretica capitulis globosis. *Nobis. Cu-
minum sylvestre.* Tab. *A. Carrot of Candie with
winged leaves & round tufts in it's umbell.* G. Ca-
roote de Crete ou Candie à fueille aislée, & ayant
les testes des ombels rondes, en guise de boules.

UMBELLÆ Semine echinato,
seu aculeato.

Genus 6.

Caucalis major Platypyllon purpurea, & alba.
*A. Great bastard Carrott with large leaves and
red, or white flowers.* G. Grand Caucalis à large fueille
& à fleur rouge ou blanche.

Caucalis major leptophyllum, Monspeliana, magno
fructu. C. B. P. *A. Bastard Carott with narrow lea-
ves & Great thicke feed.* G. Le grand Caucalis à
fueille coupée, & aux graines grosses.


Caucalis major Leptophyllum, echinata, magno
flore, Clus. *A. Bastard Carott with narrow leaves
and a bigg white flower.* G. Le grand Caucalis à fueille
coupee, avec la fleur grande, blanche.

Caucalis minor arvensis, parvo flore, & fructu.
C. B. P. *A. The lesser feild Caucalis, or bastard Ca-
rott with little flowers, & seeds.* G. Le petit Caucalis
des champs, à la fleur & graine petite.

Caucalis nodosa, echinato semine. C. B. P. *A. Lesser
bastard Carott with lesser seed, growing together in
knotts.* G. Caucalis, avec beaucoup de graines he-
rissonnées, jointes ensemble, en guise de grappe.

Caucalis Daucoides Tingitana. *A. Bastard Carott
of Tangers with leaves of the true carott.* G. Caucalis
de Tanger, avec les fueilles de carote.

Minor fuit hæc quando primò vidi, sed jam hoc
anno, quo hæc scribo, major & grandior omnino
provénit in horto Edwardi Morgan pone Monaste-
rium Westminster dictum.



T A B . V.

E L E N C H V S T A B . V.

Cognitionis & affinitatis.

U M B E L L Æ Semine membranaceo,
subrotundo, compresso, fol. fæni-
culaceis donatæ.

Genus 7.

Ferula Matthiol. Dod. A. Fennell Gyant. G. Fe-
rule de Matthiol.

Ferula Galbanifera, Lob. A. Fennell Gyant bear-
ing the Galbanum. G. Ferule portant le Galbanon.

Panaces peregrinum, seu Panax. Dod. A. Wound-
wort, or All-heale. G. Panax Asclepion de Matthiol.

Anethum. A. Dill. G. Anet.

Peucedanum majus Italicum, Lob. A. Sow-fen-
nell, or Sulphurwort. G. Grand Peucedanon d'I-
talie.

Peucedanum minus Germanicum. A. Lesser Sow-
fennell, or Sulphurwort of Germanie. G. Petit Peu-
cedanon, ou Fenoüil de pourceau d'Alemaigne.

Peucedanum minus, foliis conjugatim dispositis.
A. Sowfennell, or Sulphurwort with two leaves set
opposed upon the chief rib. G. Petit Peucedanon,
avec une couple des fueilles opposées, l'une à l'autre.

U M B E L L Æ Semine membranaceo,
subrotundo, compresso, foliis lobatis,
seu pinnatis donatæ.

Sphondylium vulgare hirsutum. C. B. P. A.
Cowparsnep. G. Sphondilion de Matthiol.

Sphondylium hirsutum foliis angustioribus. C. B. P.
& Prod. A. Cowparsnep with narrow cut leaves.
G. Sphondylon velu à fueille estroite.

Pastinaca latifolia sativa. A. Garden Parsnep.
G. Panais, ou Pastenade cultivée, Elaphoboscon, ou
Baucia de Dodon.

Pastinaca latifolia sylvestris. A. Wild Parsnep.
G. Panais, ou Pastenade sauvage.

Tordylium majus vulgare, limbo quasi lœvi. A.
Common greater wilde Bucklerwort. G. Panais
des champs, produisant semences sans chapelet au
bord, portant les fleurs blanches.

Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum.
A. Syrian Bucklerwort. G. Tordilion ou petit Pa-
nais de Syrie à graine plus grande, portant comme
des grains de chapelet au bord.

Tordylium minus limbo granulato, seu minimum
Apulum, Col. A. Bucklerwort of Apulia in Naples.
G. Tordilion, ou petit Panais d'Apuile, à graine
plus petite, portant comme des grains de chapelet au
bord.

Panax Pastinacæ folio, an Syriacum, C. B. P. Pa-
naces peregrinum, Dod. A. Allheale with parsnepe
leaves. G. Panaces Chironion de Dodon.

Panaces, seu Panax costinum, seu costus Matth.
A. Allheale with leaves of Sphondylium. G. Costus
bastard de Matthiol, ou grand Panais sauvage.

Hæc umbella & aliæ hic in Casp. Baubini pinace
contentæ, cum sint ex prædictarum familia, semine
membranaceo, subrotundo, compresso, præditarum:
cæteris sui Generis debent adjungi, quemadmodum
in aliis omnibus subalternis Generibus præstan-
dum relinquo.


U M B E L L Æ Semine membranaceo,
subrotundo, compresso, foliis pluri-
fariam divisis donatæ.

O Reo-selinum. Clus. A. Montaine parsley with
flat seed. G. Persil de montaigne à graine
plate.

Libanotis Theophrasti Libanotidis alterum genus
Dod. Gall. Saxifragia Venetorum. Lob. ad. A. Break-
Stone of the Venetians. G. Brise-pierre des Vene-
tiens.

Thysfeliu Dod. A. Milkie Parsley. G. Persil des
Marraiz rendant laict.

Seseli palustre lactescens. C. B. P. & Prod. A.
Marsh, or meadow Hart-wort. G. Seseli des prez ren-
dant laict, ou plutoft un suc laicté.



T A B. VI.

E L E N C H U S T A B. VI.

Cognitionis & affinitatis.

U M B E L L Æ Semine rostrato.

Genus 8.

Myrrhis perennis semine striato, alba, major,
odorata. A. Sweet Chervill, or Cicely. G. Myrrhis
ou cicutaire de Matthiol.

Myrrhis perennis sem. striato, alba, minor, foliis
hirsutis. A. Lesser montaine Chervill, or Cicely with
hairie leaves. G. Petit myrrhis des montaignes à
fueille velue.

Myrrhis perennis sem. striato, alba, minor, foliis
hirsutioribus. A. Lesser montaine Chervill with more
hairie leaves. G. Petit Myrrhis des montaignes aux
fueilles plus veluës.

Myrrhis perennis sem. striato, alba, minor, foliis
hirsutissimis. A. Lesser montaine chervill with white
flowers & most hairie leaves. G. Petit Myrrhis des
montaignes, aux fueilles tres-veluës.

Myrrhis perennis sem. striato, lutea, daucoides.
A. Montaine Chervill, or Myrrhis with a yellow tuft
or umbell, & leaves like carrots. G. Myrrhis pe-
rennel à fleur jaune & à fueille de carote.

Myrrhis annua semine striato, aspero, oblongo,
nodosa. A. Annall Chervill with rough, long, fur-
rowed seed, and knottie joints in it's stalke. G. Myrrhis
annuel, avec une tige noueuse, & ses graines
longues, aspres, & canelées.

Myrrhis annua semine striato, aspero, brevi,
Nobis. Nova Æquicolorum, Colum. A. Wilde annall
Chervill with short, blacke, rough furrowed seeds.
G. Petit Myrrhis à graine courte, noire, aspre, &
canelée.

Myrrhis annua nodosa, semine striato, lœvi, Nobis.
Anthriscus Plinii Hist. Lug. A. Annual Cicely with
furrowed smooth seeds. G. Anthriscus de Dalechamp,
Myrrhis à tige noueuse, & à graine canelée, &
lisseé.

Myrrhis annua semine striato, villoso. A. An-
nall Cicely with hoarie furrowed seed. G. Myrrhis à
graine canelée & velue.

Cerfolium sativum Trag. A. Chervill. G. Cer-
fueil commun.

Cerfolium sylvestris seminibus lœvibus, nigris, Nob-
bis. Cicutaria(forte) alba Hist. Lug. A. Wilde Cher-
vil with black smooth seed. G. Cerfueil sauvage à
graine noire & lisseé.

Scandix seu pecten Veneris. A. Shepheards needle.
G. Aiguille de Berger, ou Scandix de quelques
uns.

U M B E L L Æ Semine rotundo, seu
testiculato.


Genus 9.

Coriandrum sativum, seu majus. A. Common or
Garden Coriander. G. Coriandre cultivé de Mat-
thiol.

Coriandrum sylvestre foetidissimum. C. B. P.
A. Wilde & most stinking Coriander. G. Coriandre
sauvage tres-puant.

Umbellæ Rostrata

cognitionis S. affinitatis Tab. 6



TAB. VII.

ELENCHUS TAB. VII.
Cognitionis & affinitatis.

UMBELLÆ Impropræ dictæ.

Genus 1.

Valeriana major hortensis. A. Great garden Valerian or Setwall. G. Valeriane grande ou phu grand des jardins.

Valeriana major sylvestris foliis latioribus. A. Great wilde Valerian or Setwall with large leaves. G. Grande Valeriane sauvage à fueille large.

Valeriana major sylvestris foliis angustioribus. A. Great wilde Valerian or Setwall with narrow leaves. G. Grande Valeriane sauvage à fueille estroite.

Valeriana minor annua, seu aestiva. A. Lesser annual Valerian or summer Setwall. G. Petite Valeriane annuelle d'esté.

Valeriana minor perennis palustris. A. Lesser perennall marsh Valerian. G. Petite Valeriane perenne des prés humides.

Valeriana marina latifolia, seu major rubra. A. Great sea Valerian or Sea Setwall with red flowers. G. Grande Valeriane estrangere ou maritime à fleur rouge.

Valeriana marina latifolia, seu major alba. A. Great sea Valerian or Setwall with white flowers. G. Grande Valeriane maritime à fleur blanche.

Valeriana marina angustifolia, seu minor rubra. A. Lesser sea Valerian with narrow leaves & red flowers. G. Petite Valeriane maritime à estroite fueille & à fleur rouge.

Valeriana marina angustifolia seu minor alba. A. Lesser sea Valerian with narrow leaves & white flowers. G. Petite Valeriane maritime, à estroite fueille, & à fleur blanche.

Valeriana montana folio lœvi, glauco. A. montaine Valerian, or Nardus with smooth skie-couloured leaves. G. Valeriane des montaignes, ou Nard à fueille lissée, & de la couleur du ciel.

Valeriana montana folio aspero, radice Olivari. A. Montaine Valerian, or Nardus with rough leaves & roots knobbed like Olives. G. Valeriane des montaignes, ou Nard à fueille aspre & à la racine noueuse comme des Olives.

Valeriana montana folio aspero, radice fibrofa. A. Montaine Valerian, or Nardus with rough leaves and fibrous roots. G. Valeriane, ou Nard des montaignes, à fueille aspre & à la racine fibreuse.

Valeriana Canadensis urticæ folio. Corn. A. Valerian of Canada with leaves like nettles. G. Valeriane de Canada à fueille d'ortie.

UMBELLÆ Impropræ dictæ.

Genus 2.

Valerianella cornucopoïdes flore galeato. Nobis, rubra indica, Clus. A. Strange lambs lettuce, or Corne sallet with a red flower, helmet like. G. Doucet estranger à fleur rouge en guise de heaume.

Valerianella cornucopoïdes, echinata, alba. A. Lambs lettuce, or corne sallet with white flowers & seed like cornucopia. G. Doucet blanc, à graine piquante en guise de corne d'abondance.

Valerianella Scabiosæ semine, major Lusitanica. A. Great lambs lettuce, or corne sallet of Portugal, with seeds like seeds of Scabious. G. Doucet grand de Portugal à graine de Scabieuse.

Valerianella Scabiosæ semine, minor, seu tenuifolia, Col. A. Lesser Corne sallet with seeds like Scabious seeds. G. Petit doucet à fueille coupée, à graine de Scabieuse.

Valerianella sem. umbilicato, nudo, rotundo. A. Lambs lettuce with bare round seed like a navell. G. Doucet à graine nuë, ronde comme un numbril.

Valerianella sem. umbilicato, nudo, oblongo. A. Corne sallet with bare long seed like a navell. G. Doucet à graine nuë, longue, en guise de numbril.

Valerianella sem. umbilicato, hirsuto, majore. A. Corne sallet with bigger rough seed like a navell. G. Doucet à graine velue, grande, en guise de numbril.

Valerianella semine umbilicato, hirsuto, minore. A. Lambs lettuce with a lesser hairy seed like a navel. G. Doucet à graine velue, & petite en guise de numbril.

Valerianella arvensis, prœcox, humili, sem. compressio. A. Lesser lambs lettuce, or common corne sallet. G. Doucet plus commun, ou d'hyver à graine plate.


Valerianella arvensis, serotina, altior, sem. turgidiori. A. Bigger & later lambs lettuce with bigger or greater seed. G. Doucet plus grand des champs, ou plus tardif à graine plus grosse.


UMBELLÆ Impropræ Dicte.


Genus 3.

Valeriana Græca violacea. A. Greek Valerian with a blew flower. G. Valeriane de Grece à fleur bleue.

Valeriana Græca alba. A. Greek Valerian with a white flower. G. Valeriane de Grece à fleur blanche.







T A B. VIII.
ELENCHUS TAB. VIII.
Cognitionis & Affinitatis.

U M B E L L Æ *Improprie dictæ.*

Genus 4.

Pimpinella sanguisorba major, spica longiori, Canadensis, alba. *A. Great Burnet of Canada, with a long head and white flowers.* *G. Pimpinelle grande de Canada, à l'espèce long & à fleur blanche.*

Pimpinella sanguisorba major, spica longiori, Canadensis, rubra. *A. Great Burnet of Canada with a long head & red flowers.* *G. Pimpinelle grande de Canada, à l'espèce long, & à fleur rouge.*

Pimpinella sanguisorba major, spica breviori, seu glomerata, rubra, nostras. *A. Common great Burnet with a short head & red flowers.* *G. Grande Pimpinelle commune, à la teste courte, & à la fleur rouge.*

Pimpinella sanguisorba major, spica breviori, rubra, Canadensis. *A. Great Burnet of Canada, with a short head & red flowers.* *G. Pimpinelle grande de Canada, à l'espèce court, & à la fleur rouge.*

Pimpinella sanguisorba major, spica breviori, seu glomerata, Agrimonoides, Nobis. *A. Great Burnet, with a short head, & leaves like Agrimony.* *G. Pimpinelle grande, à l'espèce court & à feuille d'Agrimoine.*

Pimpinella sanguisorba minor, pilosa. *A. Lesser Burnet with hairy leaves.* *G. Pimpinelle commune, petite, à feuille poilue.*

Pimpinella sanguisorba minor, non pilosa. *A. Lesser Burnet with smooth leaves.* *G. Pimpinelle petite à feuille sans poil.*

Pimpinella sanguisorba minor, spinosa, sempervirens. *A. Lesser prickly Burnet with ever-green leaves.* *G. Pimpinelle petite, espineuse, ayant les feuilles toujours vertes.*

U M B E L L Æ *Improprie dictæ.*

Genus 5.

Flipendula. *A. Dropwort.* *G. Flipendula ou Fénanthe de plusieurs.*

U M B E L L Æ *Improprie dictæ.*

Genus 6.

BArba capræ floribus oblongis. *A. Goats-beard with long tufted hanging flowers.* *G. Barbe de chevre à la fleur longue & pendante.*

Barba capræ floribus compactis. *A. Medowsweet.* *G. Barbe de chevre à la fleur courte & compacte, ou Reyne des préz.*

U M B E L L Æ *Improprie dictæ.*

Genus 7.

Thalictrum siliqua seminis striata, major, foliis lœvibus, muscariis purpureis. *A. Great medow rue with smooth leaves & violet tufts.* *G. Grand Thalictron à feuille lissée & fleur pourpre.*

Thalictrum siliqua seminis striata, majus, foliis lœvibus, muscariis, seu floribus luteis. *A. Great medow rue with smooth leaves, & yellow tufts.* *G. Grand Thalictron à feuille lissée, & à la fleur jaune.*

Thalictrum siliqua seminis striata, majus, foliis rugosis, trifidis. *A. Great Medow rue with wrinckled leaves, divided in three.* *G. Grand Thalictron à feuille rugueuse & divisée en trois.*

Thalictrum siliqua seminis striata, minus, Dod. C. B. P. *A. Lesser medow rue with furrowed seed-coats.* *G. Petit Thalictron de Dodon.*

Thalictrum siliqua seminis striata, minimum, foetidissimum. C. B. P., & Prod. *A. The least stinking medow rue.* *G. Thalictron tres-puant, & tres-petit.*

Thalictrum siliqua seminis triquetra, Nobis. Canadense, Corn. *A. Meadow rue of Canada, with triangular or three corner'd seed-pods, or huskes.* *G. Thalictron de Canada, ayant les couverts des graines triangulaires.*

PLANTÆ UMBELLIFERÆ

SECTIO IX.

CAPUT I.

FINITA Sectione octavâ *Corymbiferas* constitente Plantas, jam operæ pretium est, ut *Umbellas*, constituentes Sectionem nonam, disponamus exactiori methodo quam à quovis hucusque ante nos factum. Et ut facilius præsternus quod pollicemur, dicemus quid sit *Umbella*.

Umbella est plantæ Summitas rotunda, caulis fastigio innixa, ex quo plurimi radii ex eodem centro (Caulis scilicet summate) orti, superficiem ut plurimum planam, nunc convexam, nonnunquam concavam constituunt, ex floribus saepius albis, aliquando luteis, perraro purpureis conflatam; quibus evanidis, succedunt constanti & invariabili naturæ ordine, unicuique Flori, quinis petalis seu foliolis conflato, bina Semina simul juncta, cujuscunque sit Semen formæ aut figuræ, pronâ parte quâ junguntur concava, supinâ convexa.

Umbelliferas disponemus habitâ ratione Figuræ Seminum: & secundum formam & figuram eorundem, Classes noveni, subalterna Genera *Umbellarum* proprie dictarum constituentes, proponemus; quippe nullus adhuc inventus est ordo hujus vasti & longè patentis Generis, qui certiora dabit indicia, quam Seminis eadem forma idem subalternum Genus constituens. Porro animadverte nos hanc elegisse methodum à Seminum figuræ identitate seu similitudine (ex modo crescendi) desumptam, quia Semina sunt Plantæ partes nobiliores, cum propter ipsa reliquæ omnes partes fiant; hisce enim perpetuantur Stirpes, cujuscunque Generis. Folia autem, Radices, & Caules (cum partim per accidens, partim per se tantum inserviant fructificationi, cumque ejus gratiâ sint data) aliò remittemus, ut ex iis specificæ aut genericæ intermediaz plantarum desumantur differentiaz, ut prolixius passim infrâ docebimus.

UMBELLÆ PILIFERÆ.

Primum Genus Umbellarum.

Cachrys, seu *Liba-* {
notis Cachryphoros} {
Semine fungoso {
Lævi ○
Sulcato {
Aspero ○
Plano ○

Explicatio Tabulæ superioris.

Primum Genus *Umbellarum* subalternum esto *Cachryphorum*, seu *Piliferum*; *Cachrys*, seu *Libanotis Cachryfera* dicta, quod semina fungosâ substantiâ obducta, oblonga, binatim juncta, & compacta gerat, figuramque pilulæ oblongæ, seu nucis myristicæ parvæ instar habeat. Consule Tabulam tertiam Iconum à nobis exhibitam.

A

Umbella

UMBELLIFERÆ.

Umbellæ Piliferæ nobis cognitæ duplicitis sunt classis; prior humilior foliis ferulaceis constat, seminaque fert substantiâ fungosâ, lævi, & æquali, oblongâ obducta; *Viridia* adhuc arte invicem adeo sunt conjuncta, ut unicum videatur, nec prius abscedunt, quam sint perfecta; tandemque exsiccata, hinc inde singula semina, striata intus, in fungosâ substantiâ lævi contenta, à duabus fibrillis, quibus nutriuntur, dependent. Hoc familiare est omnibus omnium *Umbellarum* pene seminibus binis. Perpende attentè figuram primam Tabulæ tertiaræ, cui superscribitur *Cachrys* semine fungoso lævi, & quam affabre delineatam & sculptam percipies *Umbellæ* superficiem convexam, seminibus arte adhuc sibi invicem adhærentibus onustam. Ibidem quædam exsiccata & disjuncta à fibrillis pendentia clarè cernere licet, atque post bina decidua semina, binas restantes fibrillas pariter nobis summa cum arte exhibuit strenuus noster *Chalcographus*. Juxta ad dextram, folium pariter ejusdem delineatum habes *Ferulaceum*.

Altera autem altior proceriorque folia gerit *Peucedani* instar, ast tenuiora; Semina itidem oblonga habet striata (ut superioris) in Gremio fungosâ substantiæ torulis canalatæ, seu sulcatæ. Eaque duplex est, ratione æqualitatis & inæqualitatis seminis fungosi: nimirum, vel semine fungoso sulcato aspero, vel sulcato plano, hinc duæ sulcato semine prædictarum species, pro torulorum seu sulcorum æqualitate vel asperitate, utraque foliis *Peucedani* tenuioribus donatur. Unde à foliorum dissimilitudine, seminumque lævitate & asperitate, in seminum torulis fungosis, cuilibet manifesta apparet harum trium *Umbellarum Piliferarum* differentia specifica: Genericam autem, substantia fungosa obtegens semen intus striatum, omnium patet facit notam. De figura convexa seminum omnium harum trium *Umbellarum* consule Tab. 3. Iconum.

Locus & tempus.

Priores due hæ Libanotidis species in montibus celsis Italiae, Galliae, etiam in Africa, & in insulis Candia, & Sicilia, proveniunt. *Cachryos* semine fungoso sulcato aspero semina nobis communicata habuimus Româ à doctissimo & peritissimo Botanico, Jacobo Barillier *Sacro-Sanctæ Theologie Doctore*. Postea ipsam plantam semine prægnantem Parisis apud Dominum Morinum, Anglum dictum, confeximus. *Cachryos* semine fungoso sulcato plano semen ex Mauritania Tingitana à Generoso Anglo Botanices valde studiose Alexandro Balam ad me missum. Dum hæc scribo in horto Edvardi Morgan, pone cænobium Occidentale Westminster dictum, omnium hortulanorum Botanicorum quos unquam adii peritissimi, seminibus oneratur, triplo seminibus adultæ plantæ à nobis in Tab. 3. iconum exhibetæ minoribus, quia tertio tantum post sationem anno semina hæc tulerit, adultior majora geret. Flores omnes edunt seminaque perficiunt sub finem aestatis.

Nomina

Libanotis dicitur, quod thus libanum seu olibanum olet. Hoc commune est multis aliis umbelliferis. Prima Libanotis *Cachryfera* Cam. *Cachrys* verior Lob. Sic dicta quod sit ardoris facultatis instar pilula ferrea, quâ cauteria cuti inurebantur, quæ *cachrys*, seu *canchrys* Græcis dicebatur. *Libanotis* candida dicitur *Cæsalpino*. Hujus icon à nullo authore bene exhibetur, ideo *umbellam*, & folium hujus & duarum sequentium, de novo delineanda & sculpenda judicavi. Folia secunda à Parkinsono in appendice ad theatrum suum exhibentur sub titulo, *Libanotis Galeni petalon Genuinum*, sed nulla appinguntur semina. Prior etiam à Park. exhibetur sub nomine, *Libanotis cachryfera*, seu *cachrys* veriar; ejusdem itidem icon à F. Bauhino cum semine: sed cum nullibi bene appingitur, ideo haud abs re fore putavi omnium harum trium libanotidum icones cum foliis & seminibus differentias specificas constituentibus exhibere, qui plures hujus Generis species detexerit, easdem addat. De non visis (ut maxima pars Botanicorum ex aliis transribentium præstigit) non loquor. Vide Tabulam tertiam iconum, & consule Tabulam Generalem seminum *umbellarum*. Aa Bb Cc.

Vires & temperamentum.

Est temperamenti calidi & siccii, atque vehementer calefacendi & exsiccati habet vim, ut omnes *Umbelliferæ*, menses provocat, urinam dicit, sudoresque excitat. De viribus consule Joh. Bauh. Pag. 38. Part. pr. Tom. tertii Col. 1. qui ibidem prolixè describit facultates seu vires *Libanotidis*.

UMBEL-

UMBELLÆ STRIATO SEMINE DONATÆ.

Secundum Genus Umbellarum.

CAPUT II.

Secundum Genus *Umbellarum* subalternum, est earum, quæ semina edunt striata, hæque tertiam constituunt hujus Sectionis (*Umbellarum* scilicet) partem. Secundum quadruplicem foliorum situm & dispositionem, quadrifariam easdem partiemur.

Umbellæ semine striato præditæ, vel sunt foliis ferulaceis, fœniculaceisve, id est, folia sunt quam tenuissime divisa & dissecta ferulæ aut fœniculi instar. Vel secundo loco sunt foliis lobatim, pinnatim, seu conjugatim dispositis, id est, foliorum plurimi è regione seu alternatim lobi, hinc inde nervo medio seu rachi apponuntur, extremum uno claudente. Vel tertio loco, medio modo se habent, nec sunt ferulaceis, nec lobatis, sed intermediis plurifariam divisis. Quarto & ultimo loco adjicientur *Umbellæ* striato semine donatæ, quarum folia quid peculiare referunt. Primo loco nobis occurunt *Umbellæ* striato semine ditatæ, foliis fœniculaceis præditæ; eæque sunt duplices, semine crassiore & longiore, vel breviore & minore striato: de illis nunc, de his inferius dicemus.

UMBELLÆ FOLIIS FŒNICULACEIS

Semine striato majore donata.

Fœniculum { *Vulgare* ○
 { *Dulce* ○

Cuminum ♀*Meum athamanticum* ○

Explicatio Tabulæ præcedentis.

FŒniculum est *Umbellarum* semine majore striato foliisque Ferulaceis præditarum *Umbellifera* prima planta. *Fœniculum* adeo omnibus est notum, ut multis in ejus communibus cum aliis Ferulaceis assignandis notis immorari non est operæ pretium. Odore & sapore, à cæteris suæ classis notu quam dictu facilius. Estq; vel vulgare, cuius odor est remissior; vel dulce, in omnibus suis partibus vulgari accedens, excepto solo Gustu dulciori, & odore fragranti intensiore, cùm in foliis, tūm feminibus.

Locus & tempus.

Vulgare in rupibus maritimis Armoricis aliisque calidis & saxosis, dulce in Italia, & regionibus calidis provenit. Ad Septentrionales regiones delatum, & cultura ex satione iterata propagatum, degenerat in vulgare, Utrumque floret estate, & semen profert sub Autumni finem.

Nomina.

Primum est *vulgare* Ger. commune Gesn. Hort. Hortense Cæf. Hoc ex sylvestri seu Marathro veterum tantum satione discrepat, quemadmodum multæ aliae stirpes sylvestres ex mangonio & cultura in hortos translatæ, hortenses devenere. Secundum est *dulce* Matib. Lob. ad. Ger. Dod. Habemus & dulce Azoricum cuius

UMBELLIFERÆ.

4

cujus radii, seu petioli, sustinentes semina sunt multo crassiores & longiores, & constituent superficiem concavam, semina sunt pariter multo majora.

Temperamentum & vires.

Fæniculum calidum & siccum est. Semen ejus decoctum ac bibitum contra serpentum ictus auxilio est, menses cit, nutribus lac auget, Teste Trago. Consule Joh. Bauh. sub initium partis secundæ, Tomi tertii, qui prolixè satis docet fæniculi vires à diversis authoribus traditas.

Cuminum foliis semineque striato majore, priori (Fœniculo scilicet) valde aequaliter cedit. Omnium sui Generis est humillima planta, semipedalis aut vix pedalis est altitudinis, in summis caulium semina sunt longa, striata, forma & magnitudine fœniculi seminum æmula, sed acris & ingratissimi Gustus est, teterimum quid redolentis, atque palato valde injucundum est etiam ipsius semen.

Locus & tempus.

In insulis Mediterraneis, Melita, Creta, Cypro, variisque regionibus Orientalis Syriae copiose provenit. Æstate floret, & sub ejusdem finem semen perficit suum.

Nomina.

Cuminum officinarum Cæs. sativum Tragi, Matth. Dod. vulgare Park. Dioscoridis Ger. quod non potest esse nostrum quippe ori ingratum & injucundum, Dioscorides de sativo Cumino inquit, ori gratum est.

Temperamentum & virco.

Cuminum calidum est & siccum. Ejusque semen flatus discutit, colicosque sanat dolores. De viribus Cumini consule Joh. Bauh. Pag. 23. Partis secundæ Tom. 3. colum 1.

Meum Athamanticum Cumino est multo altius, fœniculo autem humilius, à quo foliorum divisionibus seu incisuris (quippe densioribus) ipso itidem colore differt, habet enim folia dilutius virentia, tenuius dissecta ipsius fœniculi foliis, multoque breviora. Præcipue autem accedunt sapor & odor à fœniculo & cumino omnino diversi, radices interdum singulæ, interdum plures, dodrante longiores, nunc tenuiores, nunc crassiores; ex harum lateribus oriuntur aliæ radices obliquæ, satis longæ, nec in aliis radicibus sic adnatæ provenire solent, quin & sursum tendere ut plurimum conspicuntur.

Locus & tempus.

Crescit in montibus Arvernia, aliisque Italia, Gallia, Britanniæque locis altis. Semen producit aestate, sed non in uberiore copia, quia radice est copiosa, huc illuc se spargente, non repente, sed superiora perente, ideo natura non est tam intenta ejus productioni per semina.

Nomina.

Meum Matth. Hist. Lugd. Dod. Ger. vulgatus Park. Meu vulgare sive radix ursina F. B. Athamanticum. Dioscor. ducus Creticus Fuch. Trag. Lob. icon.

Temperamentum & vires.

Meum calidum & siccum est in tertio gradu, urinam ciet, & provocat menstrua, radix ejus in cervisia infusa & macerata fluxionibus thoracis, & anhelis medetur, vide J. Bauh. Pag. 2. Part. 2. Tom. 3. col. 1. qui prolixius illic agit. De seminibus striatis majoribus, vide Tabulam Generalem Iconum seminum D d E e F f ejusdemque explicationem. De foliis ferulaceis vide Tabulam Icon. 4. ubi fœniculi depingitur folium, ad instar ceterorum semine maj. striato foliisque ferulaceis donatarum Umbellarum.

UMBEL-

U M B E L L Æ F O L I I S F O E N I C V L A C E I S
Semine striato minore donatae.

Meum spurium seu adulterinum. ⊖

Bulbocastanum. ⊖

Selinum montanum pumilum, Clus. ♀

Saxifraga pannonica, Clus. ⊖

Visnaga. ♀

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Meum spurium. Umbellarum Ferulacearum, semine striato minori & breviori donatarum, est prima. Folia vulgaris habet duriora, crassiora, & habitiora, subvirosi odoris, pegani, seu rutæ Narbonensis, tenuifoliæ quodammodo æmula, ex quorum sinu exeunt caules obliqui, pedales, nonnunquam sesquipedales, sustinentes semina striata minora. Radix major, Peucedani facie & concretione, pulla foris, tetri & injucundi cum saporis tum odoris. Nescio quo iure authores Mei spurii indidere nomen, cum nec odore, nec sapore, nec cæteris notis, cum Meo Athamanco aliquid habeat affinitatis.

Propius ad seselion accedit classeni (cum Johanne Pona) & odore, & sapore; sed cum sit Planta Umbellifera foliis fœniculaceis, & semine striato minore donata, nos parum solicii de nominibus ad sibi consimiles reduximus.

Locus & tempus.

Meum spurium in collibus aridis passim in Gallia provenit. Floret sub finem aestatis. Ineunte autumno semen suum perficit.

Nomina.

Meum spurium alterum Italicum Lugd. meum spurium Italicum, Park. Spurium alterum Italicum quibusdam, F. B. Lob. Hist. Lugd.

Temperamentum & vires.

Est temperamenti calidi & siccii, ijsdemque pollet viribus, quibus Pimpinella & Saxifraga omnes tenuifoliæ.

Bulbocastanum. Planta est Ferulaceis foliis, semine striato minori & breviori etiam prædicta, à cæteris suæ classis notu perquam facilis, quod sola fit Umbella radicem habens tuberosam, nodulis bulbiformibus constantem, quæ alias producit tuberis effigie, exterius nigras, seu fuscas, intus candidas, teneras, sapore grato satis, & dulci: estur & cruda, & cocta, ut castaneæ fructus, marones dicti.

Locus & tempus.

Provenit inter segetes, & in aridis montosis, argillosis, neglectis. Circa Parisios, & Londinum, Bulbocastanum satis frequens. Floret & semen perficit sub exitum aestatis.

Nomina.

Bulbocastanum ut plurimum ab authoribus nuncupatur. Bunium Gesn. Bouviov Diosc. Nucula terrestris Septentrionalium, Lob. ad. Pancaseolus vulgo Italorum, Ces. nomine ex pane & caseo confecto, quorum vicem in cibis explet radix tuberosa è terra eruta, sive cruda sive cocta. Bulbocastanum à forma bulbi & odore castanea nomen invenit suum.

Temperamentum & vires.

Bulbocastanum calida & sicca est facultatis, moderate astringit, radix ejus conspuentibus aut megentibus sanguinem prodest. Vide prolixius apud J. Bauh. Pag. 30. Tom. 3. Part. 2.

Selinum pumilum montanum. Omnium Ferulacearum semine striato minore & breviori donatarum, Umbella est minima; vix enim spithamæ superat altitudinem. Insuper sese in plurimos ramusculos findit, & foliis ferulaceis brevibus donatur.

Locus & tempus.

Provenit in collibus aridis & glareosis circa Rupellam, & caput Borbonum, alibique in agrorum marginibus, & nudis, gramineisque montibus Austriae, Pannoniae, teste Clusio. Floret Maio exente. Semina producit versus estatem medium crassiora & turgidiora, quam pro proportione plantæ; Vide Tabulam Generalem iconum seminum II.

Nomina.

Daucus montanus multifido folio, selini semine, C.B.P. Selinum montanum pumilum, Clus. Hist. Oreoselinum, Tab.

Temperamentum & vires.

Calidi & siccæ est Temperamenti, proinde aperit, attenuat, sudoresque movet.

Saxifraga pannonica, Clus. Foliis est ferulaceis, superioris selini pumili multo longioribus & tenuioribus. Caules emittit cubitales & sesquicubitales. Forte eadem est hæc planta cum caecalide Anglica Penæ; sed quam male caucalis diceretur, cum non sit semine hispido vel echinato, sed striato minore & breviori, videat infra lector, in hac nostra doctrina Umbellarum, per Tabulas cognitionis seu affinitatis dispository.

Locus & tempus.

Saxifraga pannonica provenit satis obvia in sylva regia Fontaine belleau dicta Bois Bouronne. Est calidi & siccæ temperamenti, ut selinum Pumilum montanum, quod cuiilibet semina utriusque gustanti statim appetet. Proinde non minus prodest ejus semen calculosis, quam reliquæ Saxifragæ species.

Nomina.

Daucus montanus multifido longoque folio, nobis. Perperam brevi, Casp. Bauhino. Saxifraga pannonica Clus. Hist.

Temperamentum & vires.

Iisdem donatur viribus quibus Saxifragæ umbelliferæ omnes, quantum ex masticatione seminum parifervore & sapore præditorum haurire potuimus.

Visnaga seu Gingidium. Planta est Umbellifera Ferulacea semine striato minore & breviore donata, cuius radii, seu pediculi, è caulis summitate orti, flosculos albos sustinentes, planam constituunt superficiem, semina autem matura concavam, nidi aviculæ instar, ad modum Carotæ, aut tordylii Syriaci semine granulato majore nobis, quod Caucalis Syriaca authoribus dicitur. Superficies concava aliquibus paucis aliis Umbellis est familiaris. Visnagæ radii seu pediculi caulis fastigio superiori innixi, sunt Umbellarum omnium rigidissimi, non nihil odorati: unde Hispani post matura semina, cum tandem duri redduntur, ad expurganda ea quæ dentibus à cibo inhærent, dentiscalpii vice iisdem utuntur. Folia ejusdem viridia contrectata graveolent cicutæ ritu, quin & folia & radices amara sunt.

Locus & tempus.

Inter segetes calidarum regionum Hispaniae, Gallie, Narbonensis, Galloprovincie, sponte oritur.

Nomina.

Gingidium, seu visnaga, ab omnibus quasi authoribus vulgo denominatur. Cumini sativi alterum Genus Cæsalpino dicitur.

Tem-

UMBELLIFERÆ.

7

Temperamentum & vires.

Visnaga teste Galeno siccata ordine secundo. Quatenus est amara, caliditatem possidet manifestam & astringentem. Consule Tabulam Generalem Icon. sem. Gg Hh Ii Kk Ll ac ejusdem Tabulae Explicationem de seminibus. Quoad folia Ferulacea minora vide Tab. Icon. 4. ubi meum spurium ad instar cæterarum foliis ferulaceis minoribus præditarum umbellarum adscriptimus, ejusque folium ferulaceum sculpendum curavimus.

UMBELLÆ LOBATAE MAJORES,

Semine striato majore donatae.

Levisticum. ◎

Siler montanum { *majus.* ◎
 { *minus.* ◎

Siler aquilegiae foliis. ◎

{ *Sativa*, seu major Dod. ♀
 Sylvestris Dod. ♀
Angelica *Maxima montana* C. B. P. ♀
 Lucida Canadensis, Cornuta. ♀
 Sylvestris minor repens, seu erratica. ◎

Imperatoria. ◎

Astrantia { *major.* ◎
 { *minor.* ◎

Smyrnium { *majus, seu Matth.* ♀
 { *Creticum.* ♀

Explicatio Tabulae præcedentis.

Secunda divisio Umbellarum semine striato donatarum, erit earum quæ lobatim, conjugatim, seu pinnatim folia sua costæ mediæ, seu rachi, nunc è regione, aliquando alternatim apposita, & eidem adnascentia gerunt, uno semper extremum claudente; eæque sunt duplices pariter, majores, majoreque semine donatae, vel minores, minoreque semine præditæ; de iis prius, de his posterius.

Levisiticum. Omnia Umbellarum lobatarum, semineque majore striato præditarum, est maxima; adeo ut ipsius caulis sit rotundus, crassus, geniculatus, humanam altitudinem excedens, cavus, striatus. Folia à radice profert longis pediculis erecta, foliis apii latifolii longiora, & candidiora, seu dilutius virentia; iidem pediculi sunt odore valde medicato, nec sine jucunditate, si rupti naribus admoveantur. Umbellas fert luteas, planas. Fatiscentibus floribus singulis, quinis petalis reflexis luteis, conflatis, binatim succedunt semina farcta, fœniculi majora, striata, multum odorata, quæsiue resinaceum quid redolentia.

Locus & tempus.

Ubi sponte oriatur non constat hucusque Botanicis; in hortis tantum observatur. Flores producit luteos, reflexos media estate, qui vix bene expansi observantur, propter nimiam festinationem naturæ ad seminum formationem, & perfectionem. Semen perficit decadente estate.

Nomina.

Levisticum, Matth. Dod. Lob. vulgare, Park, Libysticum vulgare, Fuck.

Tem-

Temperamentum & vires.

Levisticum est ex ordine exsiccantum & calefacentium, ad Venena propulsanda non minus utile quam *Angelica*. *Levistici* radix stomacho frigido est utilis, coctionem adjuvat, superfluas humiditates consumit, in vino pota pondere 5 ss. venenum educit, urinas & menses trahit. In sessionibus & balneis adhibetur ad urinam ciendam, menses provocandos, calculos educendos. Interna omnia membra calefacit. Puerperæ semen in potu & cibo usurpant, & balneis sudatoriis adjiciunt, ut à partu recte purgentur. Hac ex *Trago*. Qui plura de hujus viribus desiderat, consulat *F. B.* pag. 123. Tom. 3. Part. 2. qui omnes ab omnibus authoribus Botanicis vires eidem assignatas, prolixe satis ibidem in medium ad fert.

Siler montanum. Prior (levistico scilicet) quām proxime accedit quoad caulis altitudinem: ipsa vero folia ex pediculis palmaribus aut sesquipalmaribus in alas oppositas dividuntur. Segmenta externa semper fere terna, oblonga, latiuscula, mucrone leviter obtuso, instar cithys Tragi foliorum. Semen magnum, oblongum, striatum, sapore ingrato, cumino valde accedente. Infimam caulis partem prope terræ superficiem ornat coma fibrosa, & rugosa, ut cernere licet in Peucedano, & variis aliis odoriferis Umbellis.

Locus & tempus.

Ligusticum à Ligurinis, seu Appenninis montibus sic dictum, quod ibidem proveniat. Haud procul Genua in asperis montibus. Etiam in monte Thermis Badensis imminentib[us] ubi copiose, & nusquam abundantius nascitur. Per totam Austriam crescere observabatur. Carolo Clusio floret mense Junio, & semen perficit Julio, & Augusto.

Nomina.

Siler montanum, Trag. Lob. Dod. Seseli sive *siler montanum vulgare, F. B.* *Siler montanum vulgo Seselios, Park. Ligusticum, Matth. Lugd.*

Temperamentum & vires.

Hujus seminis vis est excalefactoria atque resiccans ordine tertio, urinas & menses potu ducit. Concoctionem promovet. Vide Joh. Bauh. pag. 169. & 170. Tom. 3. Part. 2.

Siler aquilegiæ foliis, nobis. Sic dictum, quia magis congruit cum filere, seminis odore & Gustu, quam cum ulla Libanotidum (proprie à nobis sic dictarum ab initio hujus tractatus de *Umbellis*) specie, quæ semina fungosæ substantiâ inclusa habent. Inadvertenter Libanotis C. Bauh^{no} dicitur, nisi quod succum fundat ex medulla, medium quid inter aroma & Aristolochiam sapore redolentem; atqui succum odoriferum multis diversarum *Umbellarum* speciebus diversis effundere contingit. Aptius ex odore, ad filer, quam ad ligusticum cum J.B. aut ad seseli cum Camerario reducitur. Sit Siler, sit ligusticum, sit seseli, est semine striato majore, ac proinde non admitto esse Libanotidis speciem Semine fungoso, si secus si sub uno & eodem nomine militarent omnes thuriferæ *Umbellæ*, nulla habita ratione conformatiois seminum, sed odoris thuriferi quem eructant, eadem confusio maneret, quæ fuit posterioribus hisce seculis. Nos inter observationes generaliores exhibebimus nomenclaturam *Umbellarum*, cum liquoribus gratos & jucundos, tum ingratos & fastidos suggerentium. Inter omnes *Umbellas* hæc Sileris species primo intuitu cognoscitur, quod folia sint crassa, rigida, glabra, viridia, & splendentia suprà, subtus candicantia, quæ instar foliorum aquilegiæ dividuntur, inferiora in vegetiore planta, plerumque quinos habent lobos, ex triplici pediculi divisura, alias ternos lobos, tribus pediculis insidentes. Caulis ei est unicus, cubitos binos, raro ternos superans, in plura brachia distributus, *Umbellam* magnam floribus albis parvis

parvis compositam sustinens. Semina bina, longa, compressa, striata, gustu subamara, cumini saporem imitantia, aromaticum quid redolentia profert, quæ si masticentur, modice excalefaciunt, & salivam cident.

Locus & tempus.

Nascitur in Gargano monte Apulia. Floret aestate.

Nomina.

Siler aquilegia foliis, nobis. Libanotis latifolia aquilegia folio, C. B. Prod. desc. Park. desc. Seseli Æthiopicum, Cam. ligusticum, Rawolffii foliis aquilegia, J. Bauh. à quo exhibetur figura manca.

Temperamentum & vires.

Excalefacit & siccatur ordine secundo, aperit, incidit, attenuat, amara & acris appetet ex masticatione.

Angelica. Folia habet magna lobata sub exortum, ter tripartita (prædictarum more) nunc plus, nunc minus divisa, & ramusculis annexa, uno semper extremum claudente. Si pediculi aut folia rumpantur, gratum naribus suffundunt odorem. Semina præcedentium seminibus multo sunt breviora, magisque odora, striis, sive sulcis altioribus donantur, id est, alæ seu striæ paleaceæ, aut membranaceæ, altius attolluntur quam in quibusvis aliis *Umbellis* striato magno semine præditis.

1. Prima est sativa, seu officinalium, nec dicta à cultura, odore, sapore, succo croceo ex incisione manante, lippis & tonsoribus nota; quare in communibus ejus (cum aliis) notis assignandis diutius non immorabimur; videte plantam in hortis cultam.

2. Secunda sylvestris, quod in sylvis udis vegetet, aut ad fluviorum ripas & in uliginosis proveniat, sativæ per omnia similis, nisi quod nec odor, nec sapor illi tam vehemens, multumque odore sativæ cedat. Foliis, & semine, cæterisque omnibus (excipe colorem & parvitatem) sativæ est æmula.

3. Tertia Angelica sylvestris montana, seu Archangelica, Clus. Hæc foliorum amplitudine, & singularium frequenti numero, sativam superat. Plurima folia hujus ramusculi suppeditant. Semen est latum, longius, & crassius: alta radix. Folia & caules, exigui & obscuri sunt odoris. Qui sylvestrem, & hanc montanam decumanam, eandem speciem, natalibus differentem fecerit, per me non stabit. Si quis eandem *Umbella* lutea præditam (ut vult Lobelius) in medium attulerit, erit absque dubio species distincta.

4. Quarta Angelica lucida Canadensis Cornuti. A cæteris primo intuitu quam facilime distinguitur, quod folia gerat lucida (caulis ejus vix cubitum implet) & adeo luentia, ut visco aut aliquo liquore splendente obduci, cuilibet ipsa intuenti appareant.

5. Quinta ab effectu podagraria dicta, quæ radice per terram sepe diffundente, & semine nigro cæterarum suæ classis seminibus minore, rugoso, striis adhibitæ tantum Microscopio visibilis, facile à prædictis distinguitur. Atque nullis *Umbellis*, (præter animi Fuchsii, Imperatoriam, cæterasque perpaucas) repere est proprium. Semen ejus est nigrum & oblongum, duplo minus cæteris præcedentium, fortassis propter defectum alimenti, cum natura tam sit intenta ejus multiplicationi radicibus repentibus sub terram.

Locus & tempus.

Prima Angelica sativa in Scandinavia, Norvegia, & Alpibus excelsis, perpetua nive testis, sponte oritur. 2^{da} sylvestris in sylvis humidis & in uliginosis marginibus rivulorum, & ripis fluviorum nascitur. 3^a in Alpinis aliisque

aliisque montibus reperitur. 4^a ex Insulis Americanis, ex Canada ad nos delata. 5^a seu podagraria, in humectis & secus sepium radices provenit. Florent omnes in eunte estate, semenque paulo post perficiunt, nec nisi secundo, aliquando tertio post sationem anno, semina sua perficiunt; at post maturum semen, penitus omnes pereunt præter vivacem podagrariam.

Nomina.

Prima dicitur Angelica sativa, C. B. P. Matth. Trag. Park. odorata, Cam. major, Lob. Dod. 2^a sylvestris major C. B. P. sylvestris, Tragi. Matth. Fuchs. Dod. 3^a Angelica montana, sylvestris, seu Archangelica, Clus. Dod. 4^a Canadensis, lucida, Cornut. 5^a sylvestris minor, seu erratica C. B. P. podagraria Lob. Ad. erratica, Thal.

Temperamentum & vires.

Angelica calida est & sicca, venenum educit, sanguinem dejicit, corpusque calefacit. Si quis repentina peste aut sudore immodico corripiatur, is capiat radicis Angelicæ in pulverem redactæ 3 ss. cum Theriacæ 3 j. miscantur in 3. aut 4. cochlearibus aquæ ex radice Angelicæ destillatæ, bibat, deinde in lectum se conferat, & se bene contegat, ac ad minus tribus horis jejunet, & solatum percipiet. Radix in aceto macerata, & tempore pestis odorata, etiam nonnunquam aceto cum illa poto, si jejunus sit, præservat à peste. Omnibus internis affectibus prodest aqua ejus destillata, & radix in pulverem redacta; semen ejus denique summæ est cum radice efficacia: vide Tragum, & consule Joh. Bauh. pag. 142. Part. 2. Tom. 3. & pag. 143. ejusdem Tom. Angelica sativa, sylvestris, Canadensis, & Archangelica montana, postquam deflouerint, semenque ad maturitatem produixerint, quod (ut dixi superius) secundo, aut tertio fieri solet anno, putrilagine in terra corrumpuntur, & totaliter, id est, penitusquoad caules, radices, omnesque partes pereunt, sese anno vertente ex semine de novo in terram decidente renovantes.

Imperatoria. Ab imperatoriis quibus pollet viribus sic dicta. Folia angelicæ foliis multo ampliora, terna ut plurimum juncta, rugosa, & subaspera, quorum singula rursum in tria segmenta ferrata, seu lobos alias laevius, alias profundius divisos, distribuuntur. Caules vix bipedalem, aut ad summum tripedalem attingunt altitudinem. Flosculos (de liquum patientibus petalis) in Umbella gerunt albos. Semen est candidum, latiusculum, compressum, striis depressoibus, & quasi acerosum, nec bene nutritum; quod contingit propter nimiam rependi facultatem in radicibus. Quin & radices sunt rugosæ, lateralibus fibris serpentibus donatae; quibus sese propagant: summa tellure actæ carne sunt candida, aromaticæ, linguam vellicante, & os calefaciente. Quare concludendum est Imperatoriam veram & genuinam Angelicæ esse speciem, ab odore, sapore, & consequenter viribus.

Locus & tempus.

Imperatoria in montibus Italiae, Galliae, & Germaniae provenit, semina sub finem aëtatis perficit, sed raro bene nutriuntur, nec sunt pulpa repleta. Consequenter sterilia, propter supra dictam rationem hic, & in podagraria deductione.

Nomina.

Dicitur Imperatoria major, C. B. P. Imperatoria Matth. Tab. Ger. imperatoria seu astrantia vulgaris, Park. Magistrantia, Cam. Herba rena, Cæf.

Temperamentum & vires.

Imperatoria calida est & sicca in 3o Gradu, menses & urinam provocat, fatus mortuos educit. Uteri & intestinorum flatus, etiamque ventris, mirifice discutit, quapropter colicruciatibus & ventriculi terminibus maxime utilis est. De ceteris consule J. Bauh. pag. 138. & 139. Tom. 3. Part. 2.

Astrantia. Planta est Umbellifera, omnesque Umbellæ proprie dictæ conditions possidet, & ideo negligenter à Doctiss. Casp. Bauhino collocatur in Pinace suo (suffragantibus aliis ante se scribentibus authoribus) cum Helleboro. Vide hallucinationes Casp. Bauh. in Pin. pag. 377. & 370. Prælud. Nostr. Botan. Hujus folia in 5. vulgariter

ter, aliquando 7. lobos dividuntur, arcte sibi invicem junctos versus pediculum, fasciculæ montanæ vulgaris in modum, obscurius virentia; è quorum centro exeunt caulinæ sesquipedales, in cimis sustinentes foliola plurima, latiuscula, brevia, subviridia, cingentia stellatim basin radiorum semiuncialium, gerentium flosculos minimos, quinis petalis (aliarum Umbellarum ritu) conflatos, persicæ florum coloris, totidem staminulis apicibus rubellis ornatos. Floribus singulis deciduis succedunt semina bina, striata, aspera, seu rugosa. Hujus datur minor species spithamea, quoad prædictas omnes partes minor, semenque duplo minus ferens, ut observavimus in horto Regio Blæsensi.

Locus & tempus.

Crescit utraque in Alpibus, florentque Maio & Junio, paulo post semina ad maturitatem perducunt. Vide Tab. generalem seminum R. r. & Tab. Iconum 4. ubi de novo delineandam & sculpendam ipsam plantam seminibus onustam curavimus, ut observarent Botanici docti incuriam & negligentiam prædictorum neotericorum authorum, mordicus adhærentium veteribus, appellando veratrum aut helleborum nigrum cum Dioscoride, propter scilicet (si diis placet) radices nigras, & purgandi facultatem.

Nomina.

Astrantia nigra, Lob. *Sanicula fæm.* Gesn. Fuch. *Imperatoria nigra* & *Sanicula fæmina* Tab. *Helleborus niger*, *Sanicula folio major*, C. B. P. *osteritium montanum*, Trag. desc. Altera nominatur *Helleborus niger sanicula folio minor*, C. B. P. Nobis autem aptius cum *Tabernemontano* denominabitur *imperatoria nigra major*, & altera *nigra minor*, easdem collocando & nominando inter congeneres.

Temperamentum & vires.

Tota hæc planta naturam habet calidam & acrem. Radix & semen plus habent acrimonie quam caules & folia, quod, notatu dignum, omnibus Umbellis convenit, efficacius scilicet operari semine & radice quam foliis, quia omnium semina sunt calida; nec cicutam nec coriandum excipio, etiamsi folia & hujus & illius, dum adhuc sunt viridia, & succo alimentitio abundantia, odorem teterrimum edant, & quasi venenatam qualitatem suffundant, odoratui ingratam & noxiā, hujus tamen semen exsiccatum, gratum odore & sapore est, imo se se calidum & siccum esse ostendit, etiamsi viride adhuc ingratum sit, & quasi nauseabundum, atque venenata qualitate præeditum; cicutæ semen pariter calidum & siccum in remissiore gradum asticatum palato' appetit, amissa & deposita venenata illa qualitate, quæ in partibus omnibus adhuc viridibus, succo illo alimentitio destructivo abundantibus latebat. Atros autem aliosque humores radices hujus Imperatoria nigra expurgare, testes suppeditat Germania nonnullos exercitissimos medicos, qui hisce melancholicos purgatos, feliciter ad sanitatem reduxere. Purgandi huic facultatem adesse testatur etiam Gesnerus in epistola ad Occonem, in qua astrantia nigra, hellebori albi fere similes vires, sed tamen mitiores & per alvum purgatrices primùm se expertum refert, quæ sententiam Dodæi, Dioscoridis scilicet veratrum esse nigrum confirmant. Hæc Dodonæus. Fabius Hildanus ad curationem schirrhi lienis in Apoæmate præscribit. Fuchsius affirmsat saniculam suam fæminam formam & facultate ad veram saniculam proxime accedere, & in ea, ut in mare, amaritudinem & astringitionem esse. Flores sunt candidi diluto colore, nonnihil purpurascentes, sive ut Dioscorides ait, λόνοι επιτρόπου. Habeat facultates alterutrius veratri, seu Hellebori, & ad omnia efficacius, neutiquam tamen accedit veratro, saltem quoad partes principales, flores scilicet & semina (ut patet ex libro naturæ) quæ omnino accedunt umbellæ osteritium dictæ Trago. Habita ratione facultatis purgativa, quam contra experientiam Gesneri non pernego, potest disponi inter purgantes, sicut & Thapsia (à radice cui Turpetum indidere nomen) aliæque umbellæ plurimæ, sed ratione partium ad umbellam perfectam constituendam requisitarum, contendō jure optimo, eandem esse umbellam, atque à sapore & odore reliquarumque partium essentialium formâ omnino accedere Imperatoria nigra, à nigredine radicum apte satis sic dictæ. Vide Tab. 4. Icon. ubi habes plantam ipsam, id est folia, caules, & umbellam seminibus striatis asperis onustum.

SMyrnum. A natali loco nomen est adeptum. Hujus duæ dantur species; Prima major radice innititur crassa, foris & intus alba, odorata, acri, cum quadam amaritudine. Caules producit farctos, plusquam cubitales. Folia apii palustris ampliora, atrovirentia, supra terram sub exortum sparsa, ter tripartita pediculis seu petiolis suis innascuntur, antequam caulescere incipiatur planta ipsa. Flores caulium cubitalium (plus minusve secundum solum cui committitur) summis fastigiis, ex petalis 5. albis conflati infistunt. Semina crassa, nigra, striata, seu angulosa & parum rugosa, solida, duplo omnium prædictarum suæ classis seminibus crassiora, majoraque, binatim sibi invicem adhærent; parte qua junguntur curva; atque eo ipso nomine à cæteris suæ Gentis cognitu facile est Smyrni.

nium. Secunda hujus species à priore notu facillinia, propter radicem quam in terram anno primo post germinationem demittit napiformem, secundo aliquando. Insuper notandum, quod nire ludat natura in hujuscce foliorum appositione: prima enim folia, quæ edit per terram strata, plurifariam apii palustris ritu altiuscule sunt incisa; quæ immediate ex radice pronascuntur in ambitu sunt serrata; quæ autem ramusculorum divaricationibus subsunt, circinatæ sunt rotunditatis, perfoliatæ foliorum instar, à caule ramisque transaddacta, seu transfoſſa. Semen fert fuscum, seu subnigrum, subrotundum, Brassicæ majoris semini par. Inter omnes *Umbellas* similem huic reperire non licet, propter mirandam variationem foliorum inferiorum per terram stratorum, & superiorum caulinum, seu ramorum alas infrà amplectentium, forma acetabuli in Periclymeno. Semina utriusque, & majoris, & hujus, tribus striis, seu carinis eminentioribus, fulcisque depressoſoribus afficiuntur, suntque nigra, rugosa, calida, & valde aromaticæ.

Locus & tempus.

Provenit prius in Insulis adjacentibus potentissimæ & florentissimæ illi Insulae, ubi nos primo aëra hausimus Magnæ Britanniæ. 2dum ex Insula Creta ad nos delatum.

Nomina.

Prius dicitur Smyrnium, Matth. Lug. Cam. Petroselinum Alexandrinum, Trag. Hipposelinum, Fuch. Dod. Hipposelinum, seu Smyrnium vulgare, Park. Smyrnium Jemine magno nigro, son Macerone, f. R. 2um Smyrnium Creticum, Matth. Lugd. Cam. Ger. Park. Smyrnium Amani montis, Dod. perfoliata altera, Lugd.

Temperamentum & vires.

Primum calidi & siccii est temperamenti. Angelicam, & ligusticum acrimoniam & fervorem, vique expulsiva antecellit, quod ad cetera parium sunt facultatum. Vide Ioh. Baub. pag. 124. Tom. 3. Part. 2. col. 1. qui ibidem diffuse de usu Smyrnii veterum agit. De seminibus striatis majoribus predictarum umbellarum consule Tabulam generalem iconum seminum M m Nn Oo Pp Qq Rr Ss. De foliis lobatis umbellarum hujus membra vide Tab. icon. 4. ubi levisticum & astrantia ad instar ceterarum omnium umbellarum lobatarum hujus membra offeruntur.

UMBELLÆ LOBATÆ MINORES,
semine striato minore donatae.*Sisarum.* ◎

<i>Pimpinella saxifraga</i>	<i>Major, Tragofelinum majus, Tab.</i> ◎
	<i>Major altera, degener.</i> ◎ ☈
	<i>Minor.</i> ◎
	<i>Minor crispa, Tragofelinum petreum Tab.</i> ◎

Sison. ♀

<i>Sium Aquaticum</i>	<i>Terrestre, seu segetale.</i> ♀
	<i>Latifolium.</i> ◎
	<i>Angustifolium.</i> ◎
	<i>Ad alas floridum.</i> ◎ ☈

Rugosis foliis multifidis & dentatis. ◎

Pumilum Ferulaceis foliis. ♀ ☈

Expli-

Explicatio Tabulæ superioris.

Sisarum inter Umbellas lobatas, semine minore striato ditatas, locum vendicabit primum; quodque notatu dignum, ipsumque à cæteris suæ familias distinguit, radices habet carnosas, ex uno capite plures, versus terræ superficiem pendulas, tenueras, fragiles, cortice tenui pallidoque obductas, pulpa candida, digitali crassitudine, pedales, aliæ breviores, sapore dulci, aromatico, & satis grato. Frequenter in culina per hiemem expetuntur, & butyro, aceto, pipereque frixæ, & mēnsæ appositæ, quadragesimali tempore cum deliciis manduntur, atque pastinacæ latifoliæ Germanicæ præferuntur, & propter majorem suavitatem in cupediis pluris habentur. Foliis lobatis, minoribus, glabris, nervo medio ex adverso adhærentibus, & semine minore striato, sed præcipue radicibus prædictis, inter cæteras hujus membra subalterni umbellas facile discernitur sisarum.

Locus & tenipus.

Sisarum sponte in Gallia Narbonensi provenit, teste Lob. Floret & semen perficit media aestate.

Nomina.

Sisarum, Dod. Trag. Lob. Siser, Matth. Cord. Gesn. Cam. Siser vulgare, Park. Sisarum multis, F. B. Sisarum Germanorum, C. B. P.

Temperamentum & vires.

Sisarum est temperate calidum & humidum. Radices facile concoquuntur in stomacho, nutriunt medicocriter, excitant ad venerem, nec sunt pravi succi, flatulenti tamen aliquid possident, promovent urinam.

Pimpinella saxifraga. Sic dicta ab effectu authoribus, Nobis autem Umbellifera ab essentiali nota, ut distinguatur à pimpinella sanguisorba (authoribus ab effectu sic dictâ, nobis spicatâ, de quâ ad calcem Umbellarum dicemus,) quæ quidem est Umbella à dispositione foliorum lobatorum, sed spicâ recedit à recta regula Umbellarum, ab initio hujus tractatus posita, cum nec flores nec semina bina habeat, more Umbellarum proprie à nobis dictarum; ut prolixius postea suo loco, de Pimpinella sanguisorba discutiemus.

Pimpinella saxifraga major. Est Umbellarum lobatarum semine striato minore donatarum prima. Costam obtinet medianam pedalem, aut semipedalem, pro terræ fertilitate aut sterilitate; cui hinc inde è regione adneqtuntur plurimi lobi, uno costæ extremum claudente, quod omnibus hujus fortis est familiare & vulgare. E centro pediculorum exurgit caulis bipedalis, aliquando tripedalis, in cuius fastigio post flores evanidos, singulis radiis (aliarum Umbellarum omnium more) innascuntur bina semina minora, striata, brevia, quæ tamen, comparata cum classis suæ cæteris, sunt majora; quin & ipsa planta quoad omnes partes suas major est, foliaque majora, magisque ferrata, excepto degener possidet. Altera est major etiam ex prioris seminis fatione degener; in omnibus priori accedit, nisi quod folia habeat magis dissecta seu laciniata; unde apte satis à nobis major altera degener dicitur. Tertia minor, cujus folia sunt è regione conjugatim seu lobatim disposita secundum costam, seu nervum medium, uno pariter extremo annexo. Hujus folia sunt Pimpinellæ sanguisorbae minoris foliis adeo similia, ut vix ac ne vix quidem, ab invicem (antequam caulescant & flores expandant

D

dant



UMBELLIFERÆ.

14

dant) discerni queant nisi à Botanices peritissimis ; unde versiculus antiquus inter Botanicos usurpatus , Pimpinella pilos Saxifraga non habet ullos. Hujus minoris datur & altera etiam varietas , cuius folia sunt plurifariam dissecta , suntque magis incana , & quasi cinere obducta , quæ , sub exortum lobatim , seu pinnatim , pariter rachi , seu costæ mediæ adhærent , etiam si caulescente planta , tenuius dissecantur : unde à Theod. Tabernemontano apte satis Tragofelinum petreum , seu crispum dicitur. Quicunque hanc crispam minorem à priore minore degenerem dixerit (prout in majore supra à nobis dictum) per me non stabit ; quandoquidem hæ duæ (an species distinctæ , an varietates , parvo discrimine refert) proveniant in collibus aridis , minime herbidis. Nos observavimus prioris minoris varietatem , cuius lobi fuerunt profundius serrati , quam in vulgari prius à nobis citato. Hoc me movet ad conclusionem hanc faciendam , omnes ex eodem semine deciduo subinde variare ; observabis insuper quod quamvis & majoris degeneris , & hujus minoris crispæ , folia sint dissecta & laciniata , ludente sic natura , conjugatim tamen petiolis adhærent nervo foliorum. De foliis , earumque forma , consule Tab. Icnum. 5. ubi omnium quatuor prædictarum Umbellarum singulatim proponuntur folia.

Locus & tempus.

Pimpinella Saxifraga maj. in sylvis humiis, & nubibus proponit. 2da Altera major ex satione seminum prioris Lobati vulgaris, in hortis cultis degener provenit. Minor , & minor altera crispa , promiscue in collibus aridis & siccis ubique proveniunt. Florent omnes media aestate , atque versus ejusdem finem semina sua perficiunt. Nota quod nos propter omnimodam conformatiōnem in seminibus striatis , & magnitudine æquali , omisimus (ex proposito) exhibere , aut sculpenda dare semina in Tab. Generali seminum congenerum in hoc membro contentarum umbellarum.

Nomina.

Prima Pimpinella Saxifraga major umbella candida , C. B. P. Saxifraga magna , Dod. Saxifraga hircina major , F. B. Park. 2da altera major degener , nobis sic dicitur. 3ia Pimpinella Saxifraga minor , nobis ; etiam dicitur Saxifraga hircina media F. B. apud quem melior ejus effigies observatur. Pimpinella minor , Fuch. Tragofelinum minus , Tab. 4da minor crispa , nobis , Pimpinella Saxifraga hircina minor , Park. Saxifraga hircina minima , Pimpinella crispa , Tragi , F. B. Saxifraga parva , Dod. Tragofelinum Petreum , Tab. Hæc radice , caule , flore , semine , odore , sapore , plane similis est minori vulgari prædictæ , hoc solo nomine à priore differens (ut dictum) quod folia habeat minutius per segmenta dissecta , ac serrata ; atque sic facile discernitur à Pimpinella minore , seu tertia , à sanguisorba ex gustata radice foliisve pariter distinguitur. Hæc duas degeneres à sapore , non obstante lusso hujusmodi naturæ , Pimpinellas Saxifragas esse concludere facillimum erit.

Temperamentum & vires.

Pimpinella Saxifraga est temperamenti calidi & siccii. Usus ejus frequens ad sudores elicendos. Tormina ventris sedat , calculum & Menstruorum retentionem sanat. Eximum est præsidium contra ittericos , hydroponicos. Iis qui angustiam præcordiorum sentiunt , valde confert. De cæteris ejus facultatibus consule Foh. Bauh. Tom. 3. Part. 2. cap. de Pimpinella Saxifraga hircina.

Sison. Umbellarum in Tabula prædicta contentarum tertium vendicabit locum. Hujus lobi , seu pinnæ sunt in ambitu serratæ , ut in sisaro , costis mediis (quibus annectuntur conjugatim folia) per terram stratis appositæ. Inter pediculos foliorum sese erigit caulis ramosus , cubitalis , & sesquicubitalis , in cuius fastigiis proveniunt pluri- mi flosculi albi , aliarum Umbellarum more , quibus decidentibus , singulis succedunt bi- natim semina striata , brevia , simul juncta , quæ omnium Umbellarum (pyrethro ex- cepto) sunt fervidissima : unde in officinis Germaniæ amomum dicitur. Qua nota facile à cæteris suæ sortis distinguitur : à semine scilicet acri , ac aromatico.

Locus

UMBELLIFERÆ.

Locus & tempus.

Ad radices sepium, & fossarum margines sponte provenit, & in locis humectis, in aggeribus fossarum circa Blasas, Parisios, & Londinum, & passim alibi. Floret versus finem aëtatis, semenque paulo post perficit.

Nomina.

Sison, Tab. Cam. Lugd. Sinon sive Sison Cordi in Dioscor. petroselinum Macedonicum, Fuch. Sison vulgare, seu amomum Germanicum, Park. Sison, seu amomum officinarum, J. B. amomum Germanicum, Trag.

Temperamentum & vires.

Sison calidum & siccum est in 3^{io} gradu. Lienis obstructions tollit, menses provocat, urinam cit, digestionem adjuvat.

Sium. Quàm proxime priori accedit quoad dispositionem foliorum, estque duplex, ratione loci, terrestre unum seu segetale, alterum aquaticum. Terrestre constat lobis, seu pinnis dilutè virentibus, aliquatenus (sub exortum) cumino capitulo globoso accendentibus ; estq; planta bipedalis in arvis humidis segetibus consitis, & secus sepium fossarumq; humidarum margines proveniens, quin & eandem foliorum appositionem cum Sio aquatio obtinet. Optime sium terrestre à Jansono in Gerardum dicitur, cum nunquam in aquosis reperiatur. Totâ plantæ facie, odore, & sapore, sese sium declarat : quare minus apte selinum ab authoribus huculque nuncupatur, cum nec dispositionem foliorum, nec saporem, nec odorem selino, apiove convenientem habeat, sed Sio ; ideoq; Sium terrestre aptius appellandum judicavimus in Tab. nostris cognitionis & affinitatis.

Locus & tempus.

Natales supra indicavimus. Floret versus finem augusti, semen paulo post perficit.

Nomina.

Sium terrestre Jansono in Gerardum appositi satis denominatur. Selinum sii foliis, Ger. Fig. & selinum sii foliis, Park.

Temperamentum & vires.

Calidi & siccii est temperamenti, eisdem pollens viribus quibus & aquaticum.

Sium aquaticum. A locis in quibus provenit, à priori terrestri nullo cum negotio distinguitur ; estque quintuplex. Fluviale quadruplex ; quorum primum est latifolium majus, & bicubitale, vel tricubitale, latioribus & longioribus pinnis ferratis ornatum. *Umbellas* in summo gerit albas, majores, & semina striata majora. 2^{um} Angustifolium foliis minoribus angustioribus, pinnatim etiam è regione dispositis, ferratis, fortasse idem cum priore, à quo sola magnitudine partium differt. 3^{um} ad alas floridum prioribus duobus multo humilius, & ad singulas alas caulum procumbentium, & aquis innatantium, *Umbellas* gerit florum candidorum, (fere sine pediculis, ut in apio vulgari) quibus deciduis succedunt semina striata, brevia, prædictorum seminibus minora. 4^{um} Pumilum foliis ferulaceis tenuissimè dissectis. Omnium est minimum, vix palmarem excedens altitudinem. Folia habet ferulacea, seu fœniculacea, crassa, biuncialia, aut triuncialia. Cauliculos edit parum, aut nihil palmum superantes, in quorum fastigiis nascuntur flosculi albi, quorum singulis deciduis succedunt bina semina, minuta, striata, aliarum hujus generis *Umbellarum* more. Datur & 5^{um} non in flu-

viis aut fontibus, rivulisve proveniens, sed in stagnantibus aut paludosis locis. Hujus folia sunt rugosa, oblonga, serrata, per plures lobos divisa, in margine dentata, è re- gione pediculis suis pendentia, quæ caulinis apponuntur bipedalibus aut tripedali- bus. In summis caulinis cimis flores, & semina, priorum floribus & seminibus (in omnibus) similia sunt.

Locus & tempus.

Priora duo in fluviis & fluviolis proveniunt. 3^{um} ad alas floridum ibidem & in fontibus & aquis fontanis! 4^{um} minimum, seu pusillum ad fluvii dicti Couson (intra septa Regiae Chambort) margines conspicuum nobis fuit, anno 1659. nec hucusque alibi nobis apparuit. Ultimum, seu 5^{um}. in paludosis & stagnantibus aquis com- muniter reperitur, nunquam autem idem in fluentibus aquis nobis cernere licuit. Sub finem aestatis flo- rent omnes; ineunte Autumno, aut paulo post, semina sua perficiunt.

Nomina.

Primum dicitur sium maximum latifolium, F. B. Sium Dioscoridis, seu pastinaca aquatica major, Park. 2^{um} Sion Dod. Sium medium, F. B. Sium minus alterum, Park. 3^{um} Sium ad alas floridum, seu repens, umbellis ad geniculos dispositis, nobis sic dictum. 4^{um} pumilum foliis ferulaceis, nobis etiam dicitur. 5^{um} Sium foliis rugosis, trifidis, seu multifidis, dentatis, nobis. Sium majus alterum angustifolium, Park. sium alterum, Dod. alterum olusatri facie, Lob. cicuta aquatica Gesn. F. B.

Temperamentum & vires.

Sium est excalafacientis facultatis, gustu odoratum est. Crudum coctumque esu calculos (teste Dioscoride) conterit & expellit. Comeustum etiam dysentericis utile. De foliis lobatis trium umbellarum si scilicet supra de- scriptarum, consule Tabulam Iconum 5.

UMBELLÆ FOLIIS PLURIFARIAM DIVISI,
Semine striato majore donatæ.

Seseli { Frutex, Æthiopicum. ◎
Herba, { Pratense. ◎
Montanum pannonicum 1. Clus. ◎

Cicuta { Latifolia fætidissima. ◎
Major. ♀
Minor. ♀
Palustris tenuifolia. ♀

Oenanthe { Maxima succo viroso cicutæ facie, Lob. F. B. ◎
Apii folio { Caule { firmiori. ◎
flexuoso & fistuloso. ◎
Angustifolia. ◎
Millefolii aquatichi foliis, nobis. ◎

Critchmum { Marinum. ◎
Spinosum. ◎

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Succedit tertio loco enumeratio, & explicatio *Umbellarum* foliis plurifariam divisis, & semine striato majore donatarum: quarum folia, nec sunt ferulacea, nec lobata, sed multifariam divisa; id est, foliola pediculis adhærentia non sunt tam tenuiter divisa, aut dissecta, quam *Umbellæ* ferulaceis præditæ foliis, sed multo magis incisa & divisa, quam quæ pinnatum, seu lobatum disposita sunt; ergo medio modo inter utrumque se habent. Hæ sunt duplices, secundum magnitudinem seminum, & aliarum partium; nempe vel longiori & crassiori semine præditæ, aut breviore & tenuiore semine donatæ. De illis primò, de his secundò dicemus.

Seseli. Est vel frutex, vel herba. Fruticem, seu potius subfruticem hunc, lignea constantem substantiâ, licet non habeat folia multifariam divisa, (reliquarum *Umbellarum* hujus subalterni generis more) tamen quia flores, & semina *Umbellatum* disposita, striata, majora fundit, ejusdem formæ, odoris, & saporis cum aliis seselion speciebus, inter congeneres collocavimus. Hoc passim in pluribus aliis præstare cogimur, ut in divisione superiori. V. g. si oium foliis ferulaceis, propter omnimodam cum reliquis omnibus sis, folia lobata gerentibus, in partibus nobilioribus, odore, & sapore, conformitatem, eisdem adjunximus: idem de aliis observabis. Quin & seseli prædictum à cæteris sequentibus præcipue hoc duplii nomine facile distinguitur, primo quod sit frutex, secundò quod perpetua fronde vireat. Folium producit integrum, nulla ex parte scissum, nec serratum, quod tamen in aliis omnibus ferulaceis seu *Umbelliferis* contingit. Pediculus foli geniculos cingit, quod est instar umbelici oblongum, cavum, ut in pereclymeno. Quoniam vero caulis folia permeare videtur, quidam vulgo perfoliatam vocant.

Seseli, herba. Vel est pratense, vel montanum. 1^{um} pratense. *Umbellifera* est planta semine striato, majore ornata, cuius folia sunt multifariam divisa; quæ, si contrentur, gravem emittunt odorem. In omnibus pratis humidis satis est obvium. 2^{dum} Montanum pannonicum 1. Clusii. Hujus folia sunt plurifariam dissecta cicutæ ritu, semina breviora, & crassiora prædicti seminibus. Ejus datur & alia species, seu varietas, cuius folia multo tenuius adhuc scinduntur. Omnia seselion flosculi sunt lutei, aut ex luteo herbacei, petalis reflexis donati.

Locus & tempus.

Seseli frutex, Aethiopicum, in aridis & neglectis circa Monspessulum provenit, pedalis & sesquipedalis altitudinis, at in hortos translatum ad bicubitatem & tricubitalem ascendit altitudinem. Seseli herba, pratense, in pratis & ad margines vinearum, sylvarum humidarum, & in aliis humectis locis copiose provenit. Montanum pannonicum 1. Clus. ejusque altera species foliis tenuioribus, in montibus Hungariae nascitur. Florent estate, semina perficiunt Autumno, omnes hæ seselion species.

Nomina.

Seseli frutex, Aethiopicum, Dod. Ger. Park. Aethiopicum, Lob. ad. Tab. verum, Lugd. Cam. Aethiopicum fruticosum folio pereclymeni, F. B. 2^{dum} seseli herba, pratense Monspeliensium, ad. Lob. Lugd. Cam. pratense forte silaus Plinii, C. B. P. 3^{um} montanum pannonicum 1. Clus. Hist. montanum cicutæ folio glabrum, G. B. P. Park.

E

Tempo.

Temperamentum & vires.

Seseli calidum & siccum est. Stranguriam adjuvat, difficultatem spirandi tollit, menses, secundinas, fætumque educit. Cum radix tum semen vino pota flatus discutiunt, intestinorumque dolores sedant, si contrita & in pulverem redacta, vino misceantur, & bibantur.

Cicuta. Pro nota generica (qua à cæteris suæ fortis in hac Tabula contentis distinguitur) virosum habet odorem. Est autem vel maxima, seu latifolia fætidissima, vel tenuifolia. Prioris folia sunt latiora, plurifariam dissecta, & ferrata, in margine pinnatim adhærentia pediculis longioribus; atque alii petioli minores cum lobis, alternatim pediculis, seu petiolis, brevioribus apponuntur. Caules edit 4. pedes altos, fistulosos, cavosve, nodis, seu geniculis distinctos, in quorum summis Umbellæ sunt luteis floribus oneratæ, quorum singulis deciduis succedunt bina semina curva (hoc illi cum Smyrnio solo inter Umbellas est commune) striata, duplò reliquarum suæ fortis seminibus majora, in quorum singulis conspicuntur striæ altiores, & sulci profundiores. 2^{da} est major domestica, passim secus suburbiorum aggeres fossasque nascens; caule est bicubitali, tricubitali, aliquando multo altiori, maculis fuscis consperso. Virosum & maxime injucundum odorem caput impetentem contrectata ejus folia eructant. Flores sunt in Umbella albi. 3^{ia} minor adeo apium hortense seu sativum refert, ut ab ineptis domesticis, pro eodem in hortis (in quibus sponte saepe provenit) colligatur, & esui exhibeat; unde Trago non inepte petroselini dicitur vitium. 4^{ta} est palustris, in paludosis tam stagnantibus quam fluentibus aquis proveniens, nunquam in sicco. Foliis est tenuiter dissectis, caulibus flexuosis, bipedalibus & tripedralibus, geniculatis, in multos ramulos sparsis, adhærentibus, in quorum cimis sunt plurimi flosculi albi pentapetali, quibus fatiscentibus succedunt semina striata, oblonga, multo cæterarum hujus ordinis seminibus tenuiora & longiora, binatim (alias Umbellarum more) juncta, adeo arcte fibinvicem adhærentia, ut post multos annos exsiccata, non facile separari possint, nisi ope acus pungentissimæ; nec frictu digitorum in palmam manus ab invicem disjungi poterant, quamvis in multos annos in promptuario nostro seminario ejusdem semina pyxidi inclusa asservavimus. Hoc nos errare fecit in præludiorum nostrorum Botanicorum, pag. 371. Palindiam canimus. Dum beneficio acus, seminum, striarum, & fulcorum numerum iniuste cuperemus, acum pungentissimam in centrum seminis, in quo est germe, addigentes, sponte bina semina distincta, parte qua junguntur, cava apparuere. In omnibus hujuscem seminibus hoc observare licet admovendo acum, ut supra monuimus.

Locus & Tempus.

Prima est cicutaria latifolia fætidissima, quæ nascitur in Peloponeso. 2^{da} Domestica passim secus pagorum, oppidorum, suburbiorumque aggeres, fossasque. 3^{ia} in sylvis humidis & hortis, seu viridariis, sponte sine satione provenit. 4^{ta} in paludosis, & aquis stagnantibus passim reperitur. Florent omnes sub finem aestatis; incunte Autumno colligi possunt semina.

Nomina.

Prima, cicutaria latifolia, fætidissima, Lob. Hist. Lugd. Cicuta latifolia, Ger. Fig. cicutaria fætida, Tab. maxima, Park. desc. seseli Peloponiacum recentiorum, Park. Peloponense Matth. sive cicutaria quorundam, F. B. 2^{da} Cicuta major, C. B. P. vera, Gesn. Hort. cicutaria vulgaris, Clus. vulgaris major, Park. 3^{ia} cicuta minor petroselino similis, C. B. P. petroselini vitium, Trag. cicutaria minor sive fatua, Park. 4^{ta} cicutaria palustris tenuifolia, C. B. P. Park. cicutaria palustris, Lob. Tab. Ger. Phellandryum, Dod. Lugd. Phellandryum, vel cicutaria aquatica quorundam, F. B.

Tem-

Temperamentum & vires.

Cicuta frigidæ habetur temperamenti, nec sine mortis præsentî periculo ejus folia intus administrantur; unde Athenienses Socratem è medio tollendum (exhibito ejus succo) curarunt, quod sinistræ de eorum Diis haberet cogitationes. Si quis folia pro selini foliis, aut radicem loco pastinacæ radicis comederit, bibat acetum, & curabitur. Hæc Tragus. Vide plura apud Job. Bauhinum, qui prolixius de cicutæ viribus agit. pag. 178. & 179. Tom. 3. Part. 2.

Oenanthe. Notam genericam, quâ ab omnibus *Umbellis*, foliis plurifariam divisis, & semine striato majore donatis distinguitur, hanc habeto, quod ejus radix asphodeli instar radicis sit multipartita. Ex uno capite plures radices arcte dependent, latiusque (subtus terræ superficem scilicet) quam profundius propagantur, tunica subnigra contextæ, intus albæ, adeo ut singulæ singulis fusis carnosis assimulentur. Hoc in nulla *Umbellarum* integra classe reperitur, nisi in hac sola.

Oenanthe maxima, succo viroso, cicutæ facie. Hæc omnium est maxima. Ad altitudinem trium quatuorve pedum, aliquando altius, caules suos producit, fusosque pœoniæ pares gerit, gustu acres & ingratos, succo lacteo primum, deinde flavescente, viroso, & exultante prægnantes. In luctuosa & riguis, ubi paludarium, provenit, cui foliis non absimilis; sed rutæ pratensi similius, unde male à Lobelio denominatur cicutæ facie. Notis prædictis à cæteris infra dicendis facilime distinguitur. 2^{da} est foliis apii, aut cerefolii; eaque duplex, una major bipedalis planta, caule recto, & firmo, nonnunquam ad cubitalem & sesquicubitalem altitudinem ascendentem, donata. Radices sunt glandulosæ, longis filis pendulæ, longius quam altius protensæ, atque his notis à priore & sequenti varietate discernitur; quæ caule constat flexuoso, & fistuloso, seu cavo, juncis quodammodo simili; pro foliis sunt pauci, tenues, inanes quasi pediculi, *pæzæs*, aut costæ, à quibus parva aliquot & angusta promuntur foliola. In hortis aut locis siccis sata brevior est, foliaque terræ proxima, cerefolio similia producit, sed tenuiora; superiora autem folia, ut ejus, quæ in aquis exit. Radices habet crassas, parvis sylvestribus rapis similes, verum minores & breviores, à quibus serpentes exeunt fibræ, ab his vero radiculæ emittentes folia. 3^{ia} est angustifolia foliis longioribus angustis, crithmi, aut peucedani instar. Radices habet oblongas, biunciales, & triunciales, ex uno capite plures, quæ sub exortum graciliores sunt, inferius crassescunt, fibris à parte crassiore & inferiore sese demittentibus, quibus succus è terra ad nutritionem totius plantæ attrahitur. 4^{ta} & ultima millefolii aquatrici foliis, quæ perperam primò Dalechampio, & postea aliis ipsum sequentibus, daucus pratensis millefolii palustris foliis dicitur; etenim cum dauco proprio loquendo, cuius semen debet esse hispidum, seu villosum, nil habet affine quoad notam essentialē, odorem, aut saporem; oenanthen autem sese declarat, ex universali suâ structura, cum sapore, tum odore; potiore ergo jure *Umbellam* hanc ad oenanthes classem retulimus, ut à nobis dictum, pag. 366. Prælud. nostr. Botanicorum. Insuper à radice ejus asphodeli æmulâ, & semine in summitate aculeato (sicut sunt omnium prædictarum oenantherum species) sese manifestat non esse daucum. Porro variæ *Umbellarum* species ab authoribus, sub nomine dauci (ut in loco citato docuimus, & ut infra hic docebimus) confunduntur.

Locus

Locus & tempus.

Oenanthe maxima, secus quam maritimam, ad ostium Ligeris, in fossis humidis, fluxum maris decumanum recipientibus nascitur, illuc quinos aut senos pedes excedentem offendimus. Ad ripam Tamesis, & alibi pas- sim in Septentrionalibus humidis fossis, prope fluvios, sed humilior, provenit. 2^{da} in sylvis humidis, intra septa Regiae Chambort consistit. 3^{ia} in pratis aqua frequenter riguis, & humectatis. 4^{ta} in pratis elatioribus, qua etiam aliquando descendit ad convallium prata. Ultima in humidis tam pratis quam sylvis passim in Gallia. Florent omnes sub finem aestatis, paulo post semen suum perficiunt, striatum, paulo compressum, pusillis aculeis in superiore parte praeditum, binis ut plurimum. Quibusdam aliis umbellarum speciebus hoc etiam est familiare, at in omnibus seminibus singulatim singuli conspicuntur aculei, post nutritionem eorum deceduorum.

Nomina.

1^a *Oenanthe succo viroso cicutæ facie Lobelii* J. B. at nobis potius apii folio. *Cicutæ facie Lob.* ad. Park. *filipendula* 3^{ia} seu *œnanthe selinophyllos*, Tab. 2^{da} & 3^{ia} *œnanthe*, ut à nobis supra in Tabula exhibentur, apii folio, caule firmiori, erecto, & caule flexuoso, procumbente. Vide infra hallucinationes Casp. Bauhini, aliorumque authorum de *œnanthe cherophylli* folio, & *angustifolia*, & apii folio, ubi ostendo ipsum confuse valde nobis tradidisse synonyma harum omnium. 4^{ta} *angustifolia*, Lob. 5^{ta} *œnanthe millefolii palustris* foliis, nobis. Perperam *daucus pratensis millefolii palustris* foliis, C. B. P. *daucus pratensis*, Dalp. Hist. Lugd. vide pag. 366. prælud. nostr. Botanicorum.

Temperamentum & vires.

Oenanthe temperate est calida & sicca, ideoque aperiens & detergens, sapore amariuscuso, cum levi adstrictione, proinde radices urinam. & arenulas intrinsecus, & extrinsecus usurpatæ movent, aperiunt obstructions, expurgantque meatus urinaros: *œnanthes* radix trita, redacta in putacrem, & macrata, ex vino pota, sanguinis stillicidio convenit, teste Dioscoride, medetur spiriosis & anhelantibus.

Critmum maritimum. Cum Umbellæ omnes habeat conditions, jure merito inter Umbellas accenserí debet, nec aptius quam huc reduci potest: quippe folia habet plurifariam divisa, & semine majori donata. A spissis & crassis ejus foliis trifariam vulgo partitis, & pediculo adhærentibus, in scopolis, seu rupibus maritimis vegetantibus, & falsuginem maris redolentibus (quæ aceto & sale confici, & mensis hemalibus pro acetario adhiberi solent) notu facile est. De ejusdem mala dispositione à Casp. Bauhino, vide prælud. nostr. Botan. pag. 402. & de hallucinationibus Casp. Bauh. aliorumque authorum infra hic à nobis observatis. Alterum, spinosum marinum, caules habet procumbentes, geniculatos admodum. Folia in rariora, spissiora, & acutiora segmenta divisa; semen striatum, majus, binatim junctum, oblonga theca cartilaginea, sursum spinosa, obductum habet. Cum nondum capsulam hanc aperuisse, unico semine constare putavi, sed eadem scissâ, bina semina ibidem latentia, magna, striata inveni. Contrarium in præludiis Botanicis nostris asseruimus, nunc oculatores, quod ibi dictum de critimi spinosi semine retractamus. Vide infra in hallucinationibus Casp. Bauh. aliorumque authorum de critmo.

Locus & tempus.

Copiose provenit in scopolis maritimis, mari armorico objectis, item versus Occidentem Angliae oram maritimam, & alibi in scopolis maritimis Scotie, Hybernia, & Norvegia nascitur. Floret versus aestatis finem, semenque paulo tardius perficit. Alterum, spinosum maritimum, ad oram maritimam Gallæ Narbonensis provenit. Radices erutas plebecula ibidem estat.

Nomina.

1. *Crithmum*, seu *fæniculum marinum*, minus, C. B. P. *Crithmum marinum*, Dod. Ger. *Crithmum*, seu *fæniculum marinum*, J. B. *maritimum vulgatum*, Park. *Crithmum* & *herba sancti Petri*, Dod. Gall. *Creta marina* Lon. *Baticula*, quasi *parva batis*, Cæs. 2^{da} dicitur *Crithmum maritimum spinosum*, Dod. C. B. P. *mari-*
timum

ithum spinosum, seu pastinaca marina, Park. Pastinaca marina secacul quibusdam, & Crithmum spinosum, F. B. Hec mihi videtur species distincta à crithmo maritimo spinoso prædicto vulgari. Etiam si semine gauderet spinoso, ob imparem foliorum dispositionem pastinacæ tenuifoliae accendentium, & à reliquorum duorum foliis discrepantium, concludere quivis poterit esse à foliis speciem diversam; sed si semine donaretur spinoso (quod nobis non appareat, neque ex descriptione Rawolfi, neque ex appendice Dalpii ad Historiam Lugd.) forte eadem esset cum pastinaca echinophora Apula Colum. cui in omnibus partibus suis valde accedit, ex figura exhibita in appendice, Hist. Lugd. sed cum nec Rawolfius, nec Dalechampius, seminis ullam faciant mentionem in descriptione, nec figuræ appingantur, in dubio relinquimus quo sit reducendum. Vide hallucinationes Casp. Baubini infra à nobis observatas in capite de Gingidio.

Temperamentum & vires.

Crithmum calidum & siccum est. Obstructiones hepatis & lienis tollit, menses provocat, calculosam edicit materiam. Semen & radix crithmi in vino cocta & pota, urina difficultati, & morbo regio auxiliantur: estur crudum & coctum, oleris modo; ejus folia conditam uria servantur, & præcipui sunt usus ad stranguriam. Si folia cocta veluti cappares oleo & aceto condiantur, & mandantur pro acetario, gratum sunt ciborum condimentum. Ventriculo bene faciunt, viscera ab obstructionibus liberant, & ciborum appetentiam excitant. De seminibus umbellarum in prædicta Tabula contentarum consule Tab. generalem icon. seminum Tt Vu Xx Ty Zz & t A A A B. CCCD. E. F. G. H. Ejus explicationem quoad folia plurifariam divisa vide Tab. icon. 6. ubi cicutæ majoris, & maxima fætidissima repræsentatur folium, & œnanthe duplex sculptur.

UMBELLÆ FOLIIS PLURIFARIAM DIVISIS,
semine striato minore & breviore donatae.

Ammi { *Annum vulgare, Dod.*
Perenne, nobis. Ammi quorundam.

<i>Apium</i>	<i>Sativum, seu hortense</i>	{ <i>Latifolium</i> { <i>planum.</i> <i>vulgatus</i> { <i>crispum.</i>
	<i>Latifolium, seu hortense</i>	{ <i>Baub. in Prod.</i> <i>maximum</i> { <i>Umbella lutea.</i>
	<i>Palustre</i>	{ <i>Degener, foliis longis dissectis.</i> <i>Seleri dictum.</i>
	<i>Semine villoso, seu incano</i>	{ <i>Macedonicum.</i> <i>Peregrinum i. Clus.</i>

Carum seu carui.

Anisum.

Pyrethrum.

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Ammi annum. Foliis est longioribus, serratis, seu crenatis, flore albo in Umbellis; semine striato, parvo, amaro, apii palustris seminum (quoad figuram)

Fæmulo,

æmulo, nisi quod sit paulo crassius, ammioselinum proinde quibusdam authoribus satis apte dicitur. Folia sunt lobis plurifariam divisæ, & in plura segmenta quam sequentis folia, cujus lobi sunt pauciores, terni ut plurimum, atque profundius serræ ad modum secti.

Ammi perenne. *Umbella* reptatu radicum longe lateque in hortis odiosa. Folia in tria (ut plurimum) segmenta serrata, angusta, nonnunquam plura dividuntur. *Umbella* satis magnæ, colore albido. Semen gracile, oblongum, striatum. Qua ratione authores quidam cum C. Bauhino eryngiis adscribant non video, cum sit perfecta *Umbella*, ut vel Botanices mediocriter peritis evidenter appareret. Vide pag. 421. prælud. nostr. Botanicorum.

Locus & tempus.

Ammi annuum, copiose in Pictorum arvis segetalibus provenit: quin & prope Salamanticum, teste Carolo Clusio. *Ammi perenne* copiose etiam inter segetes circa Pictaviam sponte proveniens à nobis repertum.

Nomina.

I. *Ammi annuum*, seu *vulgare*, nobis. *Ammi majus*, C. B. P. commune seu *vulgare*, Dod. Cam. Ger. *vulgatus*, Lob. Park. *Ammi vulgare majus latioribus foliis semine minus odorato*, F. B. 2um *Ammi perenne*, nobis. dicitur *ammi quorundam Fuchii*, Hjst. Lugd. 1591. folio 14. *Eryngium*. C. B. P. *Eryngium*. 4. Dod. Cri-
thmum. 4. Matth. Tab. Cam. *Critchmum* 4. Matth. *umbelliferum*, F. B.

Temperamentum & vires.

Ammi calefacit & siccatur 3^{io} Gradu, urinam & menses provocat, tormina alvi sedat, cum melle si admisceatur, vibices seu stigmata tollit.

Apium. Odore & sapore, à reliquis *Umbellis* hujus classis, semine striato minore, & foliis plurifariam divisæ, distinguitur. 1^{mo} occurrit sativum, seu hortense *vulgatus*, quod est, vel latifolium, vel angustifolium. Prioris folia sunt vel plana, vel crispa, ludente sic naturâ. Angustifolium montanum, seu tenuifolium, respectu duorum priorum in hortis cultorum, etiam si sponte in montibus proveniat, cultura devenit hortense, atque expeditur propter radicem hyemali tempore esui porrectam; cumque sit flore herbaceo, seu luteo pallido, facile à reliquis, foliis angustis, & flore dignoscitur. Datur & latifolium maximum hortense, cuius omnes dimensiones sunt majores, præcipue autem ejus semen duplo cæterorum seminibus majus est, teste Bauh. in prodromo. Habemus & alterum *Umbella* lutea, valde prioris novissime dicti æmulum, nisi parvitate seminum, & colore *Umbella* herbaceo. Ex præcedentis hortensis latifolii semine, reperitur nonnunquam & degener, cuius folia sunt oblonga, sinuata, in multa segmenta divisa, ludente sic natura, quemadmodum supra in pimpinella saxifraga majore, multisque aliis in immenso vegetabilium Oceano. Aliud est à locis palustribus, in quibus provenit, dictum palustre, seu paludarium; estque duplex, Italicum, seleri dictum, & *vulgare* nostras. Dealbatum dulcius fit stramine & terra foliis involutis, & ab aëre defensis; hoc etiam præstatur compressis & arcte ligatis ejusdem foliis, arcendo ab ipsis aëra, quod contingit in multis mangonio & hortulanorum industria; ut videre licet in foliis cinaræ, betæ, endiviæ, lactucæ Romanæ, Smyrnii, myrrhidis, & cichorei &c. Imo natura ipsa hoc nobis monstrat in Brassica, & lactuca capitata: folia enim interna squamatim & arcte se invicem amplectentia, & frigidum aerem accedere pro-

prohibentia, sponte dealbescunt, dum folia exteriora & nondum adhuc in se complicata (ut Brassicæ, lactucæ, aliarumque hujus farinæ) sunt viridia; propterea quod libero fruantur aëre, qui est causa viriditatis in omnibus vegetabilibus. Hoc patet in omnibus frumentaceis in antris, & speluncis maritimis vegetentibus, à columbis, pipiones suos nutrientibus, frequentatis. Apud nos in Scotia, dum in antris per aliquot centenos pedes subtus terram penetratis à natura, columbæ gregatim (quæ rupestres dicuntur) nidos suos in prominentiis saxosis condunt & componunt, pipionesque avena, hordeo, piso nutriunt, atque tenellos suos hujusmodi granis, aliisque plurimis diversis ingurgitant, quædam præterlabuntur, & in terram decidunt, pullulantque, atque ob defectum aëris, folia omnium conspicuntur alba, in obscuris illis locis latentia. Nec sine laternis conspici poterant in antris illis infernibus; hisce enim uti cogebamus, tam ad nosmetipso conductos, gressusque dirigendos per varios illic meandros, via fatis salebrosa, & crypta abscondita, quam ad nidos prospiciendos, pipionesque tenellos inde extrahendos. Memini me adhuc juvenem hujusmodi antra ad centenos aliquot pedes penetrasse, ubi altra nox, tam die, quam nocte semper erat, & hujusmodi frumentacea folia ibidem vulgo sub pedibus calcasse, alba & omni viriditate exuta. Idem etiam observavi in montanis sylvis versus Octobrem & Novembrem, ubi aliqui fuerunt loci depressores. Ex agitatione venti, folia ex arboribus decidua, eo compellebantur, atque ab ipsis, grama, aliæque indiscriminatim stirps concava, remoris foliis incumbentibus, apparuere omnes dealbatæ, nec viriditatem, seu pristinum colorem induunt, quoad penetraverint folia arida, dense ipsis incumbentia, ut aëra captent. Sed ne longior digressio fiat, revertamur ad apium nostrum palustre, Italicum selleri, forte corrupto nomine selleri ab Italib[us] & Gallis pro selino, quod est proprium & genuinum nomen tam Græcis quam Latinis usurpatum. Hoc dum adhuc crescit, folia dilutius virentia habet quam palustre nostrum vulgare, quod ex mea opinione à cultura & satione in hortis contingit. Nostras, seu apium palustre, paludapium dictum, majore amaritudine præditum est, atque foliis obscurius virentibus donatur; quicunque unum & idem cultura & mangonio differens, & tantum unius ejusdemque Umbellæ varietatem constituerit, illi dabo manus. Sequitur Apium sem. villoso, quod vel est Macedonicum, à natalibus sic dictum, vel peregrinum. Illud folia edit tenuius in margine laciniata, per lobos suos disposita, quam apium hortense vulgare, folia etiam ferris densioribus cinguntur, atque cinere quasi obducta & veluti incana apparent. Quin & caules, & bina semina, striata minora, villosa, incana conspicuntur, quibus notis specificè ab omnibus prædictis & sequenti quam facile distinguitur. Ultimum selinum peregrinum I^{um} Carolo Clus. sic dictum, folia habet subrotunda, lobatim seu pinnatim disposita per intervalla, secundum pediculum, seu costam medium, ferrata in margine. Semina producit etiam striata, minora, atque in singulis carinis villosa, ut in Macedonico, sed fusca. In villositate seminum convenient, atque hac ratione hæc duo postrema ab omnibus præcedentibus enarratis distinguuntur: at inter se, primò dissimilitudine foliorum, tam structura quam colore, secundò seminum villosum colore albo, seu incano & fusco. Odore & sapore selino convenient, etiamsi seminis colore differant. Posterius hoc collocatur hic cum suis congeneribus, ab odore & sapore ut jam dixi, etiamsi folia inferius sint pinnatim disposita, & costæ mediæ adhærentia, uno ampliore rotundo, ferrato, extrellum costæ claudente. Quin & folia non nisi in superiore parte caulum plurifarium sunt dissecta; cum consimilibus tamen hic collocavi, etiamsi repugnet titulo à nobis assignato sub initium hujus membra. Hoc in aliis subalternis generibus contingit, ut monimus suprà de seseli Æthiopico frutice, & pimpinella saxifraga, & sio ferulaceis foliis prædicto.

UMBELLIFERÆ. II

24

Locus & tempus.

Apium sativi natales nos latent. 2um seu Crispum ex Sardinia ad nos delatum. 3um in montibus tumultisque saxosis versus Gratianopolin teste Lob. 4um & 5um ex Virginia & insulis eidem adjacentibus advenit in Angliam. 6um est tantum varietas ex satione degenerans cuius folia deveniunt longa, sinuata. 7um selleri dictum (corrupte forte pro selini) ab Italib & Gallis, cuius etiam nomenclatura in Angliam delata. Nominetur in Anglia selini imposterum, atque aptius quadrabit ipsi hoc nomen, quam depravata & corrupta vox Gallis & Italib selleri aut seleri. Provenit satum in hortis Italiae, Galliae, & Angliae. Ex satione apii palustris vulgaris degener, atque ubique locorum prædictorum dealbatum, per totum hemicale tempus, a melioris sortis hominibus in acetariis expeditur. Macedonicum, ut vult ipsius nomen, ex Macedonia prius allatum fuit. Peregrinum in agro Salmanticensi sponte provenit teste Car. Clus. Flores & semina omnium perficiuntur versus aestatis & Autumni finem.

Nomina.

1. *Apium hortense, seu petroselinum vulgo, C. B. P. petroselinum vulgare seu sativum, Lon. apium hortense, Matth. Dod. Lob. Ger. Fuch. Petroselinum vulgare, Park. petroselinum vulgo planum, F. B.*
2. *Apium vel petroselinum crispum, C. B. P. apium hortense crispatum ad. Lob. Lugd. Hist. crispum vel multifolium, Ger. Tab. petroselinum crispum, Cam. F. B. Park.*
3. *Apium montanum folio tenuiori, C. B. P. apium montanum Daltii, Hist. Lugd.*
4. *Latifolium hortense, seu maximum, C. Bauhini in prodromo. Apium sativum Anglicanum Colum. petroselinum majus seu virginianum, Park. Hortense magnum seu Anglicanum quibusdam, F. B.*
5. *Apium umbella lutea, nobis.*
6. *Apium Degener foliis longis dissectis, nobis.*
7. *Apium palustre, selleri aut seleni dictum.*
8. *Apium palustre nostras, seu officinarum. C. B. P. palustre, Matth. Tab. Hist. Lugd. Eleoselinum, Dod. paludarium, Tab.*
9. *Apium Macedonicum, C. B. P. petroselinum Macedonicum, Matth. Dod. Lugd. Tab. Ger. Apium sive petroselinum Macedonicum multis, F. B. Daucus secundus Dioscoridis, Col. Ultimum apium folio subrotundo, C. B. in Prod. peregrinum 1. Clus. semine hirsuto. F. B.*

Temperamentum & vires.

Apium temperate calefacit & siccatur, menses provocat, urinam cit, alvum solvit. Hujus radix aperiens est, semen ejus calidum, ad urinam ciendam efficax, inflammationes stomachi deprimit, ab obstructionibus liberat, hydropticis & ictericis conducebit. Vide Tragum, in ceteris. De viribus apii consule Johannem Bauhinum, pag. 96. Tom. 3. part. 2. & pag. 99. ejusdem Tom. 3. Part. 2. pag. etiam 101. qui de usu & viribus apii prolixo satis agit à pag. 95 usque ad pag. 166.

CArum, sive carui. Ab odore & sapore seminum vel cæcutienti notum. Radicem profert singularem, longam, crassitudine pollicari, & majorem, albam, sapore aromatico. Caules profert multos, cubitales, striatos & geniculatos, in ramulos divisos. Folia pediculo longo innitentia, staphilini angustiora gerit. Umbellæ floribus albis, ex quinis petalis cordatis conflatis, constant, non ingrato odore. Unicuique flori succedunt bina semina oblonga, tenuia, striata. Masticata sapore acri & aromatico sunt.

Locus & Tempus.

Carum passim sponte in arvis Germanie reperitur referente Trago. Junio & Julio floret, brevi post semen suum perficit.

Nomina.

Carum Matth. Dod. Lugd. Tab. Ger. Carui ad. Lob. Cæs. cuminum pratense carui officinarum, C. B. P. caros, F. B.

Temperamentum & vires.

Carum flatus discutit, concoctionem adjuvat, urinam cit, ventriculo & ori gratum est. De carui viribus & usu, vide Joh. Bauh. pag. 69. & 70. Tom. 3. part. 2.

Anisum

Anisum. Huius folia inferna longis hærent pediculis, ut plurimum binatim; subrotunda tamen, & ferrata, odorata, albicantia; superiora folia sunt tenuiter insecata. Caulis rotundus, concavus, hirsutus, striatus; cuius fastigio innascuntur ramificuli multi, quorum extremis inhærent Umbellæ minutis candidisque floribus conflatae; nec non semina parva striata, colore cinericeo ferme, odore & sapore grato, & palato dulci.

Locus & tempus.

Anisum in Creta, Syria & Aegypto, aliisque Orientis regionibus feliciter gignitur, floret Julio ac Augusto, paulo post semen suum perficit, sed minus plenum in Septentrionalibus regionibus; est enim ipsius semen magis acerosum, & minus aptum ad extrahendum oleum quam in Orientalibus regionibus.

Nomina.

Anisum dicitur omnibus authoribus.

Temperamentum & vires.

Calefacit & exsiccat, flatus discutit; semen ejus nutribus lac auget, cum decoctione liqueritæ, ficuum, Pthysi conductit, &c. Consule Joh. Bauh. Tom. 3. part. 2. pag. 92. & 93. ubi prolixè sententias & veterum & neotericorum docet de viribus anisi. Vide Tabulam generalem iconum seminum 11. 22. 32. 44. 52. & quoad folia consule Tabulam 7^{mam} de apii triplici diversitate, & ceteris in v. 2. & 3. annis.

Pyrethrum radice constat nigra, brevi, divisa in fibras Mei specie, odorata, amara, linguam non statim exurente, nisi cum plusculum mansa fuerit. Folia fert staphylini sylvestris tenuiora; caulem emittit cubitalem, rectum, levem; Umbellas complures in cacumine. Flores fert rubentes; semina compressa, rotunda, figurâ lentis, nigra & ferventia. Hæc ex Cæsalpino. Pyrethrum Guilandinus alebat in horto Patavino, cui radices & folia cotulæ foetidæ, Umbellæ quasi centro multis pediculis innixæ, anethi, aut pectinis veneris ritu, flosculis candidis, fervido & amaricante gustu: hæc ex Lob. adversariis. Pyrethrum folia habet cerefolij sylvestris, fervidæ & quasi urentis facultatis, ad instar lepidii. Flores gerit in Umbella albos. Radicem habet pollicarem, in plurimas fibras terminantem: florem producit in muscariis prorsus candidum veluti cicuta, semen majus aniso: hæc Tragus. Unde ex descriptionibus supra allatis appareat duplex pyrethrum, unum foliis pastinacæ tenuifoliæ, seu staphylini flore rubenti, semine compresso lentis instar, quod refertur ad caput 7^{mum} inter congeneres semine membranaceo, compresso, rotundo, & foliis plurifariam divisis. Alterum est foliis cerefolii & semine striato minore, majore anisi, quod nos hic collocamus. Datur & aliud Gesneri, cujus folia sunt anethi foliorum æmula, ut in Dioscoridis exemplaribus legendum sit οὐαδὸν τροχίδες, id est rotundæ circinitatis, non τριχίδες, id est capillacea Umbella. Hujus seminum non fit mentio apud authores, ac proinde in dubio relinquimus: si fit semine striato, minore præditum, ad congeneres, sub initium hujus tractatus contentas, referatur; si semine membranaceo, subrotundo afficitur, inter congeneres, anethum, panax, asclepium, &c. in initio cap. septimi collocetur.

Locus & tempus.

Pyrethrum copiose in Apenninis montibus reperitur. Floret versus aestatis finem, & paulo post semen suum perficit.

Nomina.

Pyrethrum umbelliferum, C. B. P. verum Matth. Lugd. F. B. *Pyrethrum* Diosc. Cam.

Temperamentum & vires.

Pyrethri semen est calidum & siccum ad tertium usque ordinem ; hujus radix cum melle sumpta adversus epilepsiam, apoplexiā, & contra omnes inveteratos & frigidos cerebri morbos valet. Commansā pituitā copiam ex cerebro elicit, unde salivaris à Latinis dicta. Dentium immanes cruciatus sedat, si aceto cocta & eodem percolato os colluatur. Oleum ex recenti radice eductum mirifice dentium dolori confert, præcipue si semina staphidis agriae contrita admisceantur radicibus pyrethri pariter tritis, atque sacculo indantur, & contineantur intra dentes ad aliquod spatum ; etiam in aceto si coquantur (atque idem si adhuc calidum in ore retineatur) eundem habent effectum.

Quarto loco agetur de *Umbellis* semine striato donatis, quæ nec folia habent ferulea, nec lobata, nec plurifariam divisa, sed peculiare aliquid imitantia. Propter semen striatum, binatim junctum, quo gaudent perfoliata & bupleurum, huc ad calcem consimilium rejecimus. *Umbellas* sese declarant notis ad *Umbellas* requisitis. Quam male à Casparo Bauhino, aliisque authoribus, ab *Umbellis* disjunguntur, Botanicorum in arte versatorum legentium & perpendentium nostra præludia Botanica, pag. 399. esto judicium.

UMBELLÆ FOLIIS QVID PECULIARE
referentibus, semine striato donatae.

<i>Perennis</i>	<i>Alpina angustifolia major</i> , C. B. P. ◎
<i>Perfoliata</i>	<i>vulgatissima</i> . ♀
	<i>annua</i> <i>longioribus foliis</i> , F. B. ♀
<i>Bupleurum</i>	<i>minima Bupleuri folio</i> , Col. ♀.
<i>Perenne</i>	<i>Latifolium</i> , Tab. ◎
	<i>Angustifolium</i> , Dod. ◎
<i>Annuum minimum</i>	<i>Col.</i> ♀

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Perfoliata. Est *Umbella* seminē striato, minore donata ; sic dicta, quod ejus caulis sit ita circumvallatus foliis, ut eodem illa non solum videantur perforari, sed sunt perforata. Prima perennis *Alpina*, cuius folia sunt oblonga, palmaria; quin & amplitudine ad perfoliata filiosæ folia accedunt. Flores in *Umbellis* luteis, foliolis rotundis inferius obvallantur. Semina oblonga, striata, nigra, majora quam sunt perfoliata vulgatae semina. Radices sunt crassæ, perennes. 2^{da} annua, *vulgatissima*; caulem habet cubitum aut sesquicubitum altum, levem, teretem, striatum, geniculatum, concavum, in multas alas divisum. Folia producit lævia, viridia, subrotunda, quæ transadigunt caules vel rami, sustinentes in summa parte flosculos luteos *Umbellatim* digestos, quorum singulis deciduis, succedunt semina bina simul juncta, pulla, seu subnigrigantia, multo

multo pluribus striis & sulcis planis ornata, quam sequentis majoris, de qua jam dicemus. Vulgaris hujus habetur & alia species, cuius folia sunt multo longiora, latiora; caules in multo plures ramos reflexos divaricantur, atq; seminibus duplo prædictæ perfoliatæ vulgaris majoribus, rugosis & valde asperis, non nigris, sed subfuscis; tribus carinis etiam rugosis in dorso, seu seminis exteriori parte ornatur; concava etiam pars est rugosa, atque hoc nomine à vulgari quam facillime discernitur. 3^{ta} Annua perfoliata minima Bupleuri folio Col. Plantula hæc radice innititur tenui, pusilla, ex qua folia oblonga, angusta, nervosa, bupleuri angustifolii modo oriuntur, bina, inordinatim disposita. In summo caule *Umbellam* gerit luteam, foliolis stellæ modo ipsam radiantibus; ut videre est in prædictis perfoliatæ speciebus. Singulis floribus luteis succedunt bina parva semina striata, subnigra, lævia.

Locus & tempus.

Prior perfoliata in Alpibus, & montibus altis provenit. Annua vulgatissima, & altera ejus species in segetibus passim videntur arvis. Minima bupleuri folio Colum. in collibus aridis minime herbidis circa Blæsas, prope cellam Eremitarum non longe ab oppido. Florent, & semen perficiunt mense Augusto & Septembri.

Nomina.

Prima perennis, dicitur perfoliata Alpina, *Angustifolia*, major, C. B. P. 2^{da} annua vulgatissima, seu arvensis, C. B. P. perfoliata major *Trag. vulg. C. B. P. annua*, f. B. altera hujus species dicitur annua longioribus foliis, F. Bauhino. Sexta, seu minor ramis reflexis, C. B. Prod. & Pin. 3^{ia} annua est, minor *angustifolia Bupleuri folio*, C. B. P. perfoliatum *angustifolium montanum*, Col. fig. pag. 247. Perfoliata minima bupleuri folio eidem, pag. 84. minus cognitarum.

Temperamentum & vires.

Perfoliata calida & sicca est, proinde vulneribus & ulceribus exsiccandis apta; umbilici affectibus aliquaque rupturis aptissima: pro internis rupturis vino decocta & pota laudatur. Consule *Tragum*. Vide plura in Ioh. Banh. Tom. 3. part. 2. pag. 198.

Bupleurum. A foliorum forma costam bovis referentium, sic dictum est. Auricula leporis vulgo dicitur, quod folia rigidiora & nervosiora gerat (saltem majora) modicè in acumen desinentia, leporinam surrectam auriculam quodammodo referentia. Primum est perenne, idque duplex, latifolium omnibus suis partibus majus: vel angustifolium priori duplo minus. Caulis huic est tenuis, teres, lævis, striatus, crebris geniculis donatus, cubitalis, aut sesquicubitalis, cui adhærent folia longiuscula, stricta, nervosa. Flores lutei sunt in *Umbella* minus patulâ: quorum singulis succedunt bina senina, petroselini æmula, acria. 3^{um} annum est angustissimo & longiusculo folio præditum, cuius caules humili sunt procumbentes, dodrantales, aut paulo maiores: flosculos gerit subluteos in *Umbella* itidem minus patula; semina pariter minuta, striata, nigra, binatim juncta.

Locus & Tempus.

Primum nascitur in aridis circa Monspessulum. 2^{dum} secus sepium margines, & in aridis collibus sylvosis. 3^{um} in humidis circa Blæsas.

Nomina.

I. *Bupleurum folio rigido*, C. B. P. *majus Gesn.* in *hortis*, *latifolium*, Tab. Park. *latifolium Monspeliensium* Ger. *auricula leporis altera*, Ioh. B. 2^{dum} *Bupleurum angustifolium*, Dod. Tab. *angustifolium Monspeliensium*, Ger. *angustifolium herbariorum*, Lob. *auricula leporis umbella lutea*, Ioh. B. 3^{um} *angustissimo folio*, C. B. P. *minimum* Colum. *auricula leporis affinis*, *odontitis lutea Valerandi & Dalpii*, Ioh. B.

Tempe-

Temperamentum & vires.

Bupleurum moderate calidum est & siccum; vulneribus & ulceribus medetur. De seminibus perfoliatae & bupleuri consule Tab. Generalem icon. sem. 66. 77. De foliis vide primam figuram Tabulae 7^{ma} iconum, & ultimam figuram ejusdem Tabulae iconum. Haec duas figurae poni debuerunt simul ad calcem Tabulae, sed incuria sculptoris fuerunt disiectæ.

UMBELLÆ SEMINE ALIS FOLIACEIS CINCTO DONATÆ,
3. Genus Umbellarum constituentes.

CAPUT III.

<i>Laserpitium</i>	<i>foliis</i>	<i>Latioribus lobatis</i>	<i>Seseli Æthiopicum, herba, Dod.</i> ○
		<i>Angustioribus</i>	<i>Libanotidi Simile, semine criso, J. B.</i> ○
		<i>Saturate virentibus & lucidis.</i> ○	<i>Dilute virentibus</i> { <i>multifariam divisis.</i> ○ <i>conjugatim dispositis.</i> ○ <i>conjugatim dispositis.</i> ○ }

Explicatio Tabulae superioris.

Laserpitium. Pro nota generica habeo, quod bina semina simul juncta, alis foliaceis seu membranaceis cincta, pinnas rotæ molendinæ fluvialis referant. Est duplex ratione foliorum, vel donatur foliis latioribus per lobos latiores dispositis; vel minoribus & angustioribus lobis tenuius dissectis, & pediculis suis adhaerentibus. Quæ latioribus afficiuntur lobis, sunt etiam duplia, quorum prius authoribus male seseli Æthiopicum dicitur; sed cum ejus semen sit pluribus alis foliaceis (aliorum laserpitiorum more) cinctum, nullibi aptius poterit collocari quam inter congeneres plantas; ut & alterum sequens, quod perperam itidem ab authoribus pro libanotide habetur. Prius, seseli Æthiopicum dictum, radicem habet crassam, valde longam, sub exitum è terra comatam. (Hoc valde familiare est omnibus *Umbellis* thuriferis succo lacteo, luteo abundantibus.) Cauli edit nodosum, duorum aut trium cubitorum. Folia singularia majora, subrotunda, serrata, inferius glauca, superius viridantia, longo pediculo inhærentia, quæ in foliola ex adverso sita rursus subdividuntur. *Umbellæ* ex pluribus floribus albis constant; atque singulis floribus quinis petalis conflatis, succedunt bina semina alis pluribus foliaceis prædicta, cum quadam acrimonia & amaritudine. 2^{dum} costus amara semine criso, J. B. Hujus folia sunt multò prioris foliis longiora, latiora, crassioraque, unde quam facillime his notis primo intuitu à cæteris suæ fortis distinguitur; præcipue vero seminibus alis suis foliaceis crispis & rugosis. Vel est foliis angustioribus, quod pro triplici foliorum facie, triplex à nobis exhibetur. Vel est foliis lucidis & saturatè virentibus plurifariam divisis. Vel est foliis multo dilutiis virentibus respectu prioris, paulo etiam latioribus. Ultimum foliis priorum foliis, multo angustioribus prædictum est, per lobos longiusculos, angustos, ex adverso dispositos, & Rachi, seu costæ mediæ, adhaerentes. Caulium altitudine, aut seminum magnitudine, parum inter se differunt, nisi quod omnium horum trium semen sit alis crassis, undulatis, lœviter ornatum. Haec tres ultimæ laserpitii species omnes radicem habent prægrandem, intus albam, foris cinericeam, succo prægnantem, mollem, pinguem, odora-

odoratam. Hoc convenit multis *Umbellis* sub diversis generibus militantibus, ut clarius infra docebimus in observationibus generalioribus *Umbellarum*. Omnia pariter horum trium laserpitiorum seminum alæ foliaceæ, sicut & reliquorum latifoliorum alæ, sunt numero 8. videlicet binæ erectæ in singulis Seminibus, hinc inde, & binæ aliæ ad basin, qua jungitur semen binatum; adeo ut in singulis seminibus appareant duæ semper in dorso, seu convexa parte seminis, totidem versus basin: dum seorsum considerantur, dumque adhuc sunt viridia & conjuncta, numerantur 6. binis alis ad basin arcte sibi conjunctis, quæ hinc inde numerari possunt pro duabus; cum in seminibus singulis exsiccati & decidui apparent quatuor.

Locus & tempus.

Primum provenit in monte Baldo, aliisque Italiae, & Gallie montibus. Nos copiose provenientem hanc Libanotidis (sed potiore jure laserpitii) speciem invenimus ad vinearum margines meridiei oppositos, in collibus seu monticulis prope pagum Sencerre, secus Ligerem in monte situm. Frequenter etiam in Arvernia montibus conspicitur. 2^{um} crescit in monte Summano in Italia. Tria sequentia in montibus Italiae & Gallie Narbonensis, & Galloprovincia.

Nomina.

Primum laserpitium foliis latioribus lobatis, nobis dicitur. Authoribus seseli, & seseli Aethiopicum, herba Dod. multi libanotidis indidere nomen. 2^{dum} laserpitium libanotidi simile semine criso, nobis in tabulis. Libanotida similis costis amara dicta semine criso. F. B. a quo bene figuratur. Libanotis latifolia minor sem. criso C. B. Prod. desc. 3^{um} laserpitium foliis angustioribus lucidis, & saturate virentibus nobis. 4^{um} laserpitium foliis angustioribus dilute virentibus, nobis. Laserpitium Gallicum, C. B. P. Massilioticum, Tab. è regione Massilia allatum, F. B. ultimum prout in tabula à nobis exhibetur, explicatur supra, & est laserpitium foliis conjugatim positis semine criso.

Temperamentum & vires.

Laserpitium calidum & siccum est, proinde urinas movet, etiam mulierum menstrua; colicos sedat dolores, secum myrrha & pipere comedatur. De lasere ex laserpitio extracto consule Ioh. Bauhinum, Tom. 3. Part. 2. pag. 135. ubi prolixè de viribus & usu ejusdem agit more suo. De seminibus consule tabulam generalem iconum seminum 8. 8. 9. 9. 10. 10. Folia appendi non curavimus, quia ex descriptione & explicatione supra exhibita, possunt facile enucleari.

UMBELLÆ SEMINE ALA FOLIACEA CINCTO DONATÆ.

Quartum Genus *umbellarum*.

CAPUT IV.

<i>Thapsia</i>	<i>Maxima latissimo folio, C. B. P. 3^{ia}. Clus. ◎</i> <i>Latifolia villosa, C. B. P. 1. Clus. ◎</i> <i>Minor carotæ effigie, Lob. ◎</i>
----------------	---

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Thapsia 4^{um} constituit *Umbellarum* subalternum genus. Ejus nota generica esto semen pene circulariter, seu orbiculariter ala foliacea, per extremum tamen bifida cinctum, & eo nomine præcipue distinguitur à laserpitio, cuius semina alis pluribus foliaceis cinguntur minoribus, & depressioribus, Angelicæ semina multum acerositate

H

carina-

UMBELLIFERÆ.

30

carinarum membranacearum superantibus. Est autem triplex, una maxima latissimo folio, & semine omnium suæ familias maximo. Folia habet hæc obscure viridia, cinere quasi, aut villofa lanugine obtecta, humi diffusa, & plurifariam divisa, ingratia admodum saporis; inter eadem caulis emergit cubitalis, & bicubitalis, crassus, rotundus, nodosus, cavus, ut in maxima parte *Umbellarum*. In fastigio summo *Umbellam* sustinet magnam, luteis floribus oneratam, quæ semine prægnans constituit superficiem seminibus ala foliacea rotatim, seu orbiculariter cinctis, binatum junctis, compressis oneratam. Radice est crassa, longa (summa parte capillata, seu comata, ut pleræque *Umbelliferæ* crassiore libro vestitæ) foris subnigra, vel fusca, intus candicante, lacteo succo plena. Gustu est amarissimo, acri & ingrato, adeo ut nauseam etiam moveat. 2^{da} major respectu sequentis; ejus folia cicutæ majoris, montanæ, fœtidæ foliis sunt latiora, dilute virentia, hirsutie lævi obducta. Semina prioris duplo minora. 3^{ia} omnium minima, tota facie (si foliorum dispositionem intuearis, quæ sunt effigie carotæ, seu foliis plurifariam divisis) à præcedentibus duabus diversa: quin & semina compressa, ala foliacea cincta, binatum juncta, triplo præcedentium seminibus minora sunt.

Locus & tempus.

Prima & secunda in collibus petroso Hispanie, Lusitanie. aliisque multis locis editioribus & incultis, tercia in montibus Gallie Narbonensis provenit. Florent & semen perficiunt versus Autumnum.

Nomina.

Prima Thapsia maxima latissimo folio, C. B. P. 3. Clus. in Hist. 2^{da} Thapsia latifolia villosa, C. B. P. latifolia, Tab. I. Clus. in Hist. latifolia Hispanica Park. Thapsia, I. Clus. latifolia flore luteo, semine lato, similis seseli Peloponensi Lobelii, J. Bauh. Seseli Peloponesiacum, Tab. 3^{ia} Thapsia carotæ effigie, Lob. ad. carotæ foliò, C. B. P. vulgaris carotæ effigie, Park. Omnium harum trium & folia & semina designari, & sculpi de nova cuperemus, cum multis aliis iconibus male ab authoribus oblatis, atque à posterioris hujus seculi compilatoribus, earundem iterum icones & descriptiones male delineatas & pictas exhibentibus; quod non parum officit Reipublicæ literariae Botanicae. Tertia semen habet foliaceum, minus quam secunda, & folia ferulae foliis magis accedentia.

Temperamentum & vires.

Thapsia calida est & secca. Perperam ab impostoribus in Hispania pro turbith vendebatur ejus radix, magno Reipublica detimento. Vetulae Salmantenses hujus radice utebantur ad provocandos menses, aliasque dejectiones moliendas teste Clusio, sed tanta vi æwæ nātæ purgat, ut sumentes in maximum periculum conjiciat. Ideo ab hujusmodi medicamentis mochlicis omnino abstinendum est, & semper, & omni data occasione benignioribus, & tutioribus uti consulerem. De seminibus consule Tabulam Generalem iconum seminum II. II. quandoquidem familia facile distinguunt species ex explicatione Tabulae præcedentis. Thapsia 2^{da} exhibuisse semina sufficit.

UMBELL-

UMBELLÆ SEMINE VILLOSO SEU HISPIDO DONATÆ.
Quintum Genus umbellarum.

C A P U T V.

<i>Pastinaca tenuifolia,</i> <i>Daucus, seu carota.</i>	<i>Sativa</i>	$\left\{ \begin{array}{l} Alba. \text{ ♀} \\ Lutea. \text{ ♀} \\ Rubra. \text{ ♀} \end{array} \right.$
	<i>Sylvestris</i>	$\left\{ \begin{array}{l} Genuina Diosc. \text{ ♀} \\ Lucida. \text{ ♀} \text{ ♂} \\ Radice & umbella lutea. \text{ ♀} \text{ ♂} \end{array} \right.$
	<i>Cretica</i>	$\left\{ \begin{array}{l} Radiis umbellæ, gingidii longioribus. \text{ ♀} \text{ ♂} \\ Capitulis globosis. Cuminum sylvestre globosum, Tab. \text{ ♀} \end{array} \right.$

Explicatio Tabule precedenter.

Pastinaca tenuifolia, daucus, seu carota. Folia habet hirta, plurifariam divisa, veluti in alas. Caules emittit duos cubitos altos, hirsutos, striatos, concavos, ramosos; in quorum cimis flores proveniunt pusilli, albi, convexam superficiem constituentes, in margine rotundam. Floribus fatiscentibus succedit Umbella semine villoso prægnans, concava, nidi avis instar. Vide tabulam secundam iconum à nobis exhibitarum. Seritur hodie apud omnes Europeos, & colitur propter radicem, quæ est pedem longa, pyriformis, seu coniformis inversa, intus medulloſā substantiâ, extra carnosâ, friabili, albâ, luteâ, aut rubrâ constans, & maximoperè in culina expetita. Secundo anno ex eadem radice exurgunt caules sustinentes Umbellam albam: in sylvestri, seu genuina Dioscoridis, conspicitur macula purpurea in meditullio.

Pastinaca tenuifolia est triplex, 1^{ma} sativa, seu hortensis, cuius radicum potissimum est cura; quare cultura & mangonio in hortis educatur. Majore & crassiore prædicta est radice turbinata, quæ à colore est alba, lutea, aut rubra, ludente sic natura ex satione. Altera est sylvestris; quæ triplex etiam est: prior sylvestris genuina dicitur Dioscoridi; expetitur propter semen, jucundum & gratum admodum naribus odorem suffundens, & in medicina variis usibus adaptatum. Exceptâ maculâ purpureâ in medio Umbellæ, & radicis parvitate, quæ mutantur à solo fertiliori tantum, nullatenus specie differunt. Datur alia sylvestris cuius folia non sunt hirta, sed paucio latiora, spissiora, magis dissecta, & lucida; semen hujus multo est priorum seminibus majus. Datur etiam 3^{ia} sylvestris, cuius radix & Umbella dilute sunt luteæ. Umbellæ colore à prædictis specie distinguitur; quatenus prædictæ Umbellæ albæ omnes constanter cernuntur. Daucus creticus, seu carota cretica, duplex etiam observatur; prima hac nota præcipue cognoscitur, quod radios Umbellarum producit quinas un-

cias

cias longos, crassiores, rigidiores quam sunt visnagæ radii; atque hi concavam consti-
tuunt superficiem nidi avis instar, dum sunt adhuc semine prægnantes; atque semina vil-
losa, hispida, carotæ vulgaris more, sed multo majora & crassiora ferunt. Carota, seu
daucus ^{2^{da}} creticus, est capitulis globosis, sola hac nota ab omnibus Umbellis pro-
prie dictis notu facilis. Folia habet pinnatim rachi, seu pediculo medio adnascentia,
humi procumbentia, glabra, serrata, sii terrestris seu segetalis Park. foliorum quo-
dammodo æmula: è quorum humi procumbentium centro, exit caulinus semipe-
dalnis, in summis fastigiis sustinens globulos ex multis seminibus singularibus, oblon-
gis, in superiore & tenuiore parte hirsutis (non binatim junctis) conflatos, atque
propter præcipuam deficientem conditionem, concludo eandem non esse Umbellam
proprie dictam, huc tamen retulimus ob semen villosum, quid aromaticum redolens,
carotarum more. Si quis ad finem Umbellarum inter impropte dictas Umbellas collo-
caverit, per me non stabit. Insuper cum cumino nullam habet affinitatem, ex odore
propius accedit carotæ: semina ut dixi producit singularia, villis, seu pappis pluri-
mis in apice donata, atque semen ipsum reticulo quodam, à natura eleganter constru-
cto circumvallatur; fortassis non inepte post valerianam (quippe semine papposo
donatam) inter Umbellas impropte dictas collocaretur.

Locus & tempus.

Pastinaca sativa tenuifolia in hortis colitur, *sylvestris* in pratis passim provenit. *Sylvestris lucide natales* sunt
in humectis & pinguibus pratis ad oram maritimam Armoricanam, cuius semen satum in horto regio Blæensi pasti-
nacam produxit foliis lucidis, magisque dissectis, ex cuius semine ad me dato anno elapsi (cum mille aliis mihi
communicatis à generoso & Nobili viro Patricio Murray de Levingston) planta ipsa in horto publico Universi-
tatis impræsentiarum viget: sicut & in horto Edwardi Morgan post Ecclesiam Cathedralem Westmonasterensem.
Nam cernere licet (non obstante hyeme) folia ejusdem carotæ glauca, lucida, absque villis aut pilis; ergo non est
varietas per accidens tantum, quia non degenerat in sylvestrem foliis & caulinibus hirtis affici solitam. Carotæ ra-
dice, & umbella lutea semina, ex agro Patavino ad nos missa à D. Alexandro Balam, sicut plurima alia semina ra-
riora, Cretica & Ragusiana. Carotæ radiis umbellæ gingidii longioribus semina ex Creta, & anno elapsi ex
Mauritania Tingitana, ab eodem Generoso Anglo, Domino Alejandro Balam, fuerunt in Angliam delata, & mihi
communicata. Ultima pastinaca cretica, seu daucus creticus capitulis globosis nobis dicitur, aptius quam cumi-
num, cum quo nec convenit foliis, nec odore, nec sapore, multo minus seminibus. Est planta umbellifera im-
propte loquendo. Dicitur cuminum sylvestre, Park. Dod. Lob. icon. Ger. sylvestre primum valde odoratum,
globosum, f. B.

Nomina.

Prima pastinaca tenuifolia sativa radice alba, lutea, vel atrorubente, C. B. P. *tenuifolia sativa*, Dod. *carota*
nosta Cam. vulgaris radice flava, ad. Lob. *staphilinus luteus*, Dod. Gall. 2^{da} *pastinaca sylvestris* Dioscoridis,
Lob. *staphilinus sylvestris*, Trag. *daucus vulgaris*, Clus. *tertia* & *quarta* à nemine ante nos observatae. 5^{ta}
prout à nobis supra exhibetur sub nomine *daucus*, seu *pastinaca cretica*, *radiis umbellæ*, *gingidiis longioribus*. Ulti-
mus *daucus creticus capitulis globosis* nobis. *Lagochymeni*, id est leporis cubile in Insula Lemno, Bellon. Vide
supra cætera Synonyma. De seminibus dauci, consule Tabulam Generalem Iconum seminum 12. 12. 13. 13. de fo-
liis, umbella concava, & seminibus, vide Tabulam secundam iconum.

Temperamentum & vires.

Pastinaca tenuifolia sativa calidi & humidi (cum dulcedine) est temperamenti, flatus generat, ad venerem
excitat. *Sylvestris urinam & menses ciet*, aquam intercutem discutit. Colico dolorà, suffocationibus matricis auxi-
liatur. Vide facultates Carotarum apud Joh. Bauh. Tom. 3. part. 2. pag. 66.

UMBELLÆ SEMINE ECHINATO, SEU ACULEATO DONATÆ.
Sextum Genus Umbellarum.

CAPVT VI.

<i>Caucalis</i>	<i>major</i>	<i>Platypbyllon</i>	<i>purpurea, Col. ♀</i>
			<i>alba. ♀</i>
		<i>Leptophyllum</i>	<i>Monspeliaca echinato magno fructu, C. B. P. Lappa</i>
			<i>Boaria Plinii Hist. Lugd. ♀</i>
	<i>minor</i>		<i>Echinata magno flore, Clus. ♀</i>
		<i>Daucoïdes Tingitana.</i>	<i>♀ ♂</i>
		<i>Sarvensis parvo flore & fructu.</i>	<i>♀</i>
		<i>nodoso echinato semine C. B. P.</i>	<i>♀</i>

Explicatio Tabulæ præcedentis.

CAUCALIS. Umbella est, (quoad seminis figuram) priori generi, daucos scilicet, valde accedens, ideoque huic eandem subjunximus. Semine est echinato, seu aculeato, multo præcedentis dauci semine rigidiore, & longioribus & solidioribus aculeis donato. Radicem habent fibrosam omnes caecalidum species; qua nota præcipue junctis aculeis rigidioribus, à dauco distinguuntur; adde quod semina sunt multo majora, spissioraque. Quin & præter Dioscoridem etiam Galenus dauco sylvestri caecalidem sapore & facultate similem esse scribit; quod nempe calefacit & ficit; verum ex libro naturæ nos hausimus aliqualem illam conformitatem in facultatis à seminum & aliarum partium similitudine. Est autem duplex, πλατύφυλλον, cuius folia sunt cæterarum foliis duplo majora, flos etiam major, cæteræque partes majores, unde per διχότομiam est major vel minor; major à foliis est aut πλατύφυλλον seu latifolia, flore saepius purpureo, rarius albo: vel λεπίδηφυλλον, seu tenuifolia, cuius flos est albus; eaque duplex, magno fructu, & parvo flore, duplo minorum infra describendarum majore fructu; vel magno flore, semine etiam magno compressiore. Sequitur Daucoïdes Tingitana. Sub primum exitum è terra, & antequam caulescat, ejus folia adeo dauci, seu carotæ foliorum sunt æmula, ut pro dauco accipi possit. Caules pedales & bipedales producit, in quorum summis proveniunt flores albi, qui antequam expandantur, purpurascunt; horum singulis deciduis succedunt bina semina, oblonga, compacta, longissimis & tenuissimis aculeis donata. Vide Tabulam I^{mam} generalem iconum seminum 17. 17. Minor vel est parvo flore, & fructu parvo, villoso, seu hispido, cuius caulis est pedalis, & bipedalis, sustinens in summis ramulis, flosculos minutos albos, perraro purpureos, fructumque hispidum parvum; vel est procumbens, ad singulos caulis nodos florida, & semina plurima villosa, & rugosa, racematim ad nodos, seu geniculos, compacta gerens; unde illi nomen caucas nodoso echinato semine.

Locus & Tempus.

Caucalides haec omnes inter segetes (præter nodosam, que saepius secus aggeres, fossas, murorumque radices,

in suburbis sponte oritur) proveniunt. Flores edunt & semina perficiunt maturo tritico in Gallia , partim in Septentrionalibus , partim in Meridionalibus regionibus ; maxima pars etiam sponte in Anglia , tam in arvis segetalibus , quam sepibus conspicitur. 4^{ta} semina ex Mauritania Tingitana ab amico meo Roberto Spotswood illuc degente , oppidano Chirurgo , & Apothecario , ad me missa 5^{ta} passim in arvis segetalibus , & fossis sepium , ultima ad radices murorum , & margines fossarum frequenter provenit.

Nomina.

Prima majorum est arvensis echinata , latifolia , C. B. B. echinophora major platyphyllos purpurea , Col. caudalis echinophora major purpurea , Park. Abundat inter segetes circa Blæsas , perraro eadem reperitur flore albo. 2^{da} Monspeliaca echinata magno fructu , C. B. P. lappa boaria Plinii , Hist. Lugd. Echinophora Platycarpos altera asperior , Col. Transposita sunt nomina à Columna , pag. 94. de minus cognitis , nam debet πανώργαπτος superscribi huic figura à dextris , & πλάγιοπτος est figura à sinistris inscribenda ; ita ut caudalis Monspeliaca magno fructu Bauh. sit echinophora πανώργαπτος , & altera caudalis arvensis echinato magno flore , C. B. P. caudalis albo flore , Clus. vulgaris albis floribus , Park. sit echinophora πλάγιοπτος , Col. 4^{ta} ut à nobis in Tabula cognitionis supra denominatur , caudalis major Daucoides Tingitana. 5^{ta} caudalis arvensis parvo flore & fructu , C. B. P. caudalis flore minuto , Cam. Lappula Canaria flore minore sive tenuifolia , F. B. 6^{ta} caudalis nodoso echinato semine , C. B. P. Matthi. ed. Bauh. & F. Bauh. eidem , anthrisco Hispano affinis , si non ejus varietas.

Temperamentum & vires.

Caudalis calidi & siccii est temperamenti , urinas ciet , lienis & hepatis tollit obstructions. Vide authores de caudalidis viribus. Quoad figuræ , seu icones seminum , consule Tabulam generalem iconum seminum 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. ejusdemque explicationem. Folia omnium sunt plurifariam divisa , ut carota.

CAPUT VII.

Septimum Genus Umbellarum constituent plantæ Umbelliferæ semine membranaceo , subrotundo , compresso donatæ ; quæ pro triplici foliorum dispositione & situ , trifariam à nobis dividendæ veniunt. Vel sunt 1^o loco foliis ferulaceis fœniculaceisve. Vel secundo loco sunt foliis lobatis. Vel denique tertio loco folia gerunt , nec fœniculacea , nec lobata , sed intermedia plurifariam divisa. Atque primo de ferulaceis semine foliaceo , seu membranaceo , subrotundo , compresso prædictis dicemus. Peucedanum quamvis folia non gerat omnino ferulacea , tamen quia foliis gramineis tenuissime divisis ternatim , & ter ternis , longis constat , semineque membranaceo , subrotundo ornatur , sub eodem militabit signo cum prædictis.

UMBELLÆ SEMINE FOLIACEO SUBROTUNDO
foliis fœniculaceis Donatæ.

Septimum Genus Umbellarum.

Ferula { Matth. ◎
tenuiore folio. ◎

Panax Asclepium. ◎

Anethum. ♀

Peucedanum { majus Italicum. ◎
minus { Germanicum. ◎
humilius foliis conjugatim dispositis. ◎ ☐

Explicatio

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Ferula major, seu fœmina. Primum obtinebit locum inter Umbellas semine membranaceo, compresso, rotundo, seu oblongo, foliis ferulaceis, aut fœniculaceis præditas. Omnia suæ classis est altissima, quippe caulem edit quinos, aut senos aliquando cubitos altum, crassum, fungosâ substantiâ plenum, ramosum. Folia habet fœniculacea, segmentis latioribus & brevioribus, dilutius etiam virentibus donata. Umbellæ latæ, rotundæ, florum luteorum, reflexorum, quibus delapsis succedunt semina magna, foliacea, rotunda, oblonga, subnigra, matura, gemina semper, exteriori parte tripli linea depresso, interiori dupli fibrilla donata, qua junguntur, quaque adhuc viridia nutriuntur, quæ, post matura & decidua semina, hinc inde apparent exsiccatæ seorsum in apice superiore; quod conspicere licet in gemina omnium Umbellarum ut plurimum combinatione, post exsiccationem semen. Videte & perpendite Umbellas cachryon trium in 3^{ia} Tabula iconum à nobis propositarum, & observabitis semina adhuc viridia sibinvicem conjuncta, & quædam haec tenus exsiccata & hiulca, quædam denique per maturitatem decidua, superstitionibus fibrillis binis, aridis, apertis. Radix hujus, sicut & cachryon trium, vulnerata lachrymam fundit lacteam. Odor ejus gratus; sapor acris. 2^{da} est ferula minor tenuiori folio: caule striato fœniculi, intus inani; foliis etiam fœniculi latioribus, amplioribus, minoribus tamen quam in ferula, ad ramulorum exortum prodeuntibus, quod contingit in omnibus ferulaceis, alternatim nunc ex hac, nunc ex illa parte. Flore est luteo, in Umbellis reflexo; semine etiam oblongo, foliaceo, subflavescente per maturitatem, striis depresso notato.

PAnax asclepium. In montibus provenit, foliis brevioribus, & dilutius virentibus fœniculi. Caulem fert rotundum, cavum, cubitalem, & bicubitalem, geniculis crassis. Flores fert luteos, semina ampliora subflava, compressiora, striis tribus depresso exterius. Ex hujus radice incisa emanat succus croceus, qui coagulatus an sit opponax, examinent diligentes & curiosi in re Botanica, & consulant Andream Cæsalpinum, pag. 272. & 280.

Locus & tempus.

Ferula major in rupibus torrefieri solitis, tam in Gallia Narbonensi, quam Apulis, aut Florentinis agris nascitur. Ferula tenuiori folio & panax asclepium in Italia, & Gallia montibus, & in Insulis maris Mediterranei, Creta, Sicilia, &c. sponte reperiuntur. Florent circa finem Fulii; semina omnes perficiunt circa finem aestatis.

Nomina.

Prima ferula Matth. Cord. in Dioscor. Dod. Lob. Lugd. Cam. Tab. 2^{da} ferula folio tenuiori, seu ferulago, C. B. P. ferulago Tab. 3^{ia} panax asclepium, Dod. Cæs. Tab. Libanotidis ferula folio & semine, C. B. P. ferulam malim appellare Libanotidis odorem & succum fundentem.

Temperamentum & vires.

Ferula calida & sicca est, ejusque gummi sagapenum & galbanum distillans ex radice calidum etiam est & siccum in 3^{io} gradu, quod in jure ruta dissolutum, urinas, & menses ciet, fætusque mortuos educit. Vide plura de omnibus hisce tribus (qua iisdem pollut viribus, secundum magis & minus) apud Johannem Bauh. & consule Andream Cæsalpinum de usu panaçis asclepii.

Anethum



Anethum. Semen pariter habet foliaceum, subrotundum, compressum, minusculum, atrovirens, striis depresso tribus in parte exteriori notatum. Folia fœniculi foliis adeo habet similia, ut nisi colore obscurius virenti, & odore alieno à fœniculi odore, juncta partium parvitate, haud facile distingueretur à fœniculo ante productionem seminis: tunc à seminis figura, ejusdemque odore, & sapore, quam facile à fœniculo secernitur, & hīc cum congeneribus collocatur. Anethum insuper sola est planta annua semine foliaceo subrotundo, & foliis fœniculaceis, seu tenuiter divisis praedita.

Locus & Tempus.

Anethum in hortis Heleraceis sponte provenit; inter segetes in meridionalibus regionibus. Flores sub luteos, seu ex herbido luteos: semina subviridia, seu atroviridia producit, eadem autem perficit estate. Anethum sculptum in superiori parte Tabula 8^{ra} debuit claudere Tabulam, atque immediate ante hoc, perfoliata, & Bupleurum, atque priora ante illa carum, & anisum, fuissent collocanda; sed (me absente) post delineationem singularum umbellarum in hac Tab. contentarum, rite satis factam, confuse admodum collocavit sculptor; observandus est ordo noster hic traditus in doctrina, & Tabulis singulis insertus.

Nomina.

Anethum hortense, C. B. P. Anethum Math. Dod. Lugd. Tab. Ger. F. B.

Temperamentum & vires.

Est calidum in tertio, siccum in 2^{do} gradu. Lac auget teste Dioscoride, decoctum ejus partum adjuvat. Semen flatus, & tormina alvi discutit, apostemata & ulcera desiccat. Vide de ejus facultatibus, Joh. Bauh. pag. 6. & 7. Tom. 3. Part. 2.

Pucedanum. Planta est ferulacea, folia sua graminea, ter tripartita, dissecta, seu diversa gerens; cumque semina foliacea, subrotunda, compressa, striis leviter in exteriori seminis parte ternis notata, aliarum hujusmodi ferulacearum, seu fœniculacearum Umbellarum more, in summis caulinis ramis bipedalium, nonnunquam tripedalium (secundum solum cui committitur) ferat, idem huc retulimus, nec alio aptius revocari posse autumamus. Est triplex, prius Italicum, omnium maximum; quod est radice prolonga, alte in terram demissa, succosa, & amara, supra terram barbam, seu comam canam, setis porci similem obtinente. Caule est terete, foliis pineis, potius quam fœniculaceis; cum pino enim plus similitudinis, quam cum fœniculo habet, referente Trago. Umbellam habet in muscariis luteam, cuius singuli flores singulis pediculis, seu radiolis insistentes, conflati sunt ex quinque petalis reflexis, (quod contingit in maxima ferulacearum parte, luteis foliolis praeditarum.) Hisce singulis evanescentibus, succedunt bina semina foliacea, compressa, oblonga, tumidiuscula, seu exteriori parte, striis depresso ovatim rotata. 2^{dum} minus Germanicum priori magnitudine cedit, cætera ei par. Datur & 3^{ium} humilius foliis conjugatim dispositis, divisionum pinnarum partibus, linariæ folio latitudine & longitudine fere paribus: hoc ipsi plantæ contingit ineunte vere. Folia in pediculo medio densius disponuntur, versus terram lobatim seu conjugatim (non autem præcedentium more trifariam) dividuntur, caulescente tamen hac eadem planta, tenuius finduntur folia. Si radix cujuslibet vulneretur, succum emitit fulvum, odore piceo, viroso.

Locus

Locus & tempus.

Primum in Italia & Sicilia, unde primò translatum ad Italos ejus semen, & in Germania Sylva Hyrcinea crevit.
 2^{dum} in omnibus (quas unquam adii) sylvis annosis, in Gallia passim; præsertim in opacis & humidis provenit. 3^{ium}
 in montibus Arvernæ, inde ad nos missum à Nobili viro, & stirpium scrutatore diligente Domino de Fontain,
 Abbe Dignissimo, viro probo & docto; quin & multæ alia stirpes ab eodem prædicto Domino commu-
 nicate (transmissis seminibus) Domino Marchant College meo Blæsi degenti, prædicto Domino Abbati fa-
 miliari & intimo amico. Florent sub finem aestatis; ineunte Autumno semina perficiunt membranacea, oblonga,
 acerosa, triplo saltē ferulæ seminibus angustiora, tenuiora, leviora, minoraque.

Nomina.

Peucedanum majus Italicum, Lob. Icon. C. B. P. J. B. Park. 2^{dum} peucedanum Germanicum, C. B. P. minus
 Germanicum, J. B. fæniculum porcinum Tab. cui & cauda porcina. Peucedanum vulgare, Park. descr. 3^{um}
 Peucedanum foliis conjugatim dispositis, nobis sic dicitur, seu minus foliis lobatis angustis. Vide descriptionem,
 pag. 293. pralud. nostr. Botan.

Temperamentum & vires.

Peucedani radix calida in 2^{do} & sicca in 3^{io} Gradu; radix ejus cum semine cupressi in vino macerata & hausta
 suffocationi matricis medetur, exomphalo prodest ejus succus. Vide de ejus viribus Joh. Bauh. Tom. 3. Part. 2.
 pag. 37. qui copiose satis easdem illic docet. De seminibus umbellarum semine foliaceo, subrotundo, compresso, &
 foliis fæniculaceis donatarum, consule Tabulam Generalem Iconum seminum 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24.
 De foliis, vide Tabulam iconum 8. anethum. & 7. peucedanum italicum.

Septimi generis subalterni Umbellarum secundum membrum constituent Umbellæ
 semine foliaceo, subrotundo, foliis lobatis (id est pinnatim, seu conjugatim, è
 regione hinc inde adnascentibus nervo medio, impari semper extremum claudente)
 ut plurimum in hoc membro hirsutis donatæ. Sicut docuimus in distributione numerosi
 istius subalterni generis Umbellarum, striato semine præditarum, eandem hic obser-
 vabimus methodum desumptam à triplici foliorum facie, quæ sunt fæniculacea, lo-
 bata, vel plurifaria divisa; de fæniculaceis supra dictum, jam restat ut de lo-
 batis semine compresso, membranaceo, subrotundo ornatis dicamus.

UMBELLÆ SEMINE FOLIACEO, SUBROTUNDO,
 foliis lobatis donatæ.

Sphondylium	{ vulgare hirsutum. ♀ hirsutum fol. angustioribus, C. B. in Pin. & Prod. ♀
Pastinaca	{ sativa. ♀
latifolia	{ sylvestris. ♀
Tordylium	{ majus, limbo quasi lœvi & minus granulato. ♀ ♂ minus, limbo granulato { Syriacum. ♀ ♂ Apulum minimum, Col. ♀ ♂

Panaces peregrinum, Dod.

Explicatio Tabulæ superioris.

Sphondylium. Prima est Umbelliferarum semine foliaceo, subrotundo, compresso, foliisque lobatis præditarum. Caulem habet striatum, rectum, hirsutum, bicubitale, geniculatum, intus concavum; folia per terram strata acanthi, hirsuta, altius laciniata, & ex pluribus lobis singularibus, in alas, seu pinnas digestis, costæ adhærentibus sine pediculis. Flores Umbellæ latioris orbem suggerunt & circinant candidi, quorum singula petala quinque cordatis petalis, seu foliolis, ad medium bifidis constant. Vide sphondylium florens in Tabula secunda Iconum à nobis exhibitum: ibi distincte observabis passim quinque petala cordata, ingeniose & summa cum arte à chalcographo Universitatis nostræ delineata & sculpta. Unicuique flori succedunt bina semina membranacea, rotunda, parte convexa tribus striis nigris, ovatis, insignita, binis intus. Radicem alte in terram agit crassam, rugosam, succum emittem subcroceum, fervidi gustus, & subamari, linguam vellicantem. ²dum solâ foliorum divisione à majore sphondylio differt; cum enim prioris folium ex 5. partibus latis, subrotundis, componitur, hujus folia abeunt in laciniis oblongas, angustas, & acuminatas, hæque in alias inordinate partitas, & per marginem crenatas; in omnibus cæteris suis partibus, cum priore congruit, cuius est tantum varietas, ludente sic natura.

Locus & tempus.

Sphondylium vulgare in pratis humidis, & ad fossarum humidarum aggeres, passim sponte provenit. ²dum in pratis Rhæticis & Lusatia, in Comitatu Angliae Shropshire repertum fuit, Parkinsono citante D. Bowles; illius credulitatem detracto, atque accedo sententia D. F. Raii, qui fideliter natales omnium stirpium in Anglia & Insulis eidem adjacentibus nobis exhibuit: sed quandoquidem characterismo notatum observo, an sponte in Anglia proveniat dubitandi mihi reliquitur locus. Florent Junio, & Julio; ac Septembri semina sua perficiunt.

Nomina.

Primum *Sphondylium vulgare*, *hirsutum*, C. B. P. *Sphondylium Dod. Lob.* ad. *Branca ursina*, *Trag. Cord.* in *Diosc. acanthus vulgaris*, seu *Germanica*, *Fuch.* ²dum aliud *majus*, *foliis laciniatis*, Park. *hirsutum* *foliis angustioribus*, C. B. Prod.

Temperamentum & vires.

Sphondylium calidi & *incisivi* est temperamenti; proinde tussi & asthamati medentur ejus semina. Consule Joh. Bauh. Tom. 3. part. 2. pag. 161. qui plura dabit.

Pastinaca latifolia. Inter cæteras suæ familias facile cognoscitur à radice carnosa, turbinata, oblonga, quæ in culinis omnibus Europeis maxime expetitur quadagesimali tempore; sativa saltem in omnibus prædictis locis in hunc usum colitur, cuius caulis est bicubitalis, striatus, inanis. Pediculos foliorum per terram stratos gerit pedales, & longiores, quibus è regione adhærent folia triuncialia longitudine, & sesquiunciam lata, plus minusve serrata, impari extremum claudente, cum sobole foliorum majoribus sub exortum junctorum. Ex medio foliorum exilit prædictus caulis, sustinens Umbellas luteis floribus reflexis ornatas, quibus deciduis succedunt semina acerosa, subrotunda, compressa, multò sphondylii seminibus minoris.

UMBELLIFERÆ.

39

nora. 2^{da} sylvestris minor est quoad omnes suas partes. Ex sylvestris semine sato, & iterum sato in pinguiori & fertili solo, provenit sativa, seu vulgaris in hortis culta, quemadmodum ex staphylino, seu carota sylvestri, carota sativa. Semen suum utraque 2^{do} post sationem anno perficit, sese de novo propagando. Utraque etiam maturo semine exsiccatur, & moritur. Hoc familiare est multis biennalibus, & triennalibus, quæ perfecto & exsiccati semine totaliter (id est penitus & radicatus) pereunt, nulla restibili radice in terra, ut in vivacibus, seu perennibus. Mangonio & cura hortulanorum seritur verno tempore in hortis, ut ejusdem sativæ radix per totam hyemem sequentem venum in foro olitorio publico exponatur; deinde æstate sequenti semen suum perficit.

Locus & tempus.

Pastinaca latifolia sativa, uti dictum est, colitur in hortis, culinariis. *Sylvestris* in arvis satis, & pratis, passim obvia. Flores & semina perficit utraque mense angusto, nunc citius, nunc tardius, pro sationis tempestate, agris fertilitate, aut sterilitate: idem dicendum de aliis omnibus.

Nomina.

Prima *Pastinaca latifolia*, sativa, Park. Ger. Dod. C. B. P. *sativa latifolia Germanica luteo flore*, F. B. (*domestica latifolia*, *vulgaris* dicitur, ut distinguatur à carota, quæ *Pastinaca tenuifolia* nuncupatur) *domestica vulgaris* Lob. *fissarum sativum magnum*, Fuch. *fissor* *Dioscoridis*, Colum. *Elaphoboscum sativum*, Trag. 2^{da} *Pastinaca sylvestris*, *latifolia*, Dod. Ger. Park. desc. *Elaphoboscum branca Leonina*, Tab. *Baucia pastinaca sylvestris*, ad. Lob. *Pastinaca Germanica sylvestris*, quibusdam *Elaphoboscum*, F. B.

Temperamentum & vires.

Pastinaca est temperamenti moderate calidi, & humidi. Multum nutrit, sed flatus generat, & ad venerem stimulat, urinam provocat, præcipue *sylvestris*. Cervos eandem adversus serpentum venenosos ictus in pabulo usurpare scribit *Dioscorides*, unde ei *Elaphoboscum* nomen ab authoribus impositum.

Tordylium. Tertium vendicabit locum inter Umbellas lobatas semine foliaceo, subrotundo, compresso ditatas: hujus duæ nobis innotuere species, una major, quæ multos emittit stolones bicubitalis, & tricubitalis, interdum plures, striatos, intus cavos, multis geniculis per intervalla interceptos, & in plures ramos divisos. Sub exortum ineunte æstate pediculos emittit pedales, sustinentes lobatim plurima folia subrotunda, hirsuta, costæ mediæ adhærentia, extremum uno claudente, *Pastinacæ* sativæ latifoliæ instar. In summis ramis Umbellatum proveniunt candentes flores, ad carneum calorem, antequam expandantur, subtus nonnihil accedentes; quorum singulis deciduis succedunt binatim semina membranacea, rotunda, in exteriori & media parte subhirsuta, & summo mucrone bifida, & aculeata. Hanc Clusius denominat caudalidem majorem; rectius vero librum naturæ & finem ultimum consideranti subiit animum Jacobo Plateau propter semen cartilagineum, gemellum, rotundum, ad tordylii genus referre. Vide pag. 268. prælud. nostr. Botan. Altera tordylii species est minor, semine rotundo foliaceo seu membranaceo, limbo granulato (id est limbo exteriori rotatim, seu circulariter, granulis concatenatim cincto) prædita, estq; duplex, I^{um} tordylium Syriacum, semine majore, crassiore, albo, hirto, in margine granulato præditum. Hujus flosculi candidi sunt. Foliola plurima, angusta, biuncialia, paulo infra basin, seu ortum radiorum sustinentium semina, enata habet, ipsosque radios ad unciam excedunt longitudine, quæ simul cum radiis ipsis concavam consti- tuunt superficiem avis nidi instar. Planta est vix dodrantalis, trimestri spatio se-

minæ

U M B E L L I F E R Æ.

40

mina sua perficit ; quæ, si microscopio observentur, sunt exterius hirta, majora, alba, & limbo granulato ornata. ^{2^{dum}} est Apulum, granulato etiam præditum semine, caule constans bipedali, semine itidem foliaceo, seu membranaceo, intus aureo colore prædicto, limbo exteriori granulis plurimis albis cincto : orbis interior omnium horum trium tordyliorum pilis lanuginosis, seu hirtis, scatet. Quare Bauhini Fratres, & reliqui authores fibinvicem mordicūs adhærentes, seseli, caucalidem, aut gingidium has Umbellas appellavere, non capio ; consule hallucinationes Casp. Bauh. prælud. nostr. Botan. pag. 368. & 371. & 372.

Locus & tempus.

Tordylium sem. minus hirto & limbo quasi lavi, seu parùm granulato (perperam caucalis major Clus.) in marginibus fossarum & aggeribus sepium, sponte passim circa Blasas, Londonum, & alibi provenit. 2^{dum} ex Syria ad nos missum inquit Lobelius, qui ait Venetias Aleppo Syrie missum, Sequini Martinelli opera. 3^{um} in Italia & Galliae regionibus calidis provenit, sicut in Apulia teste Columna. Florent, seminaque perficiunt ineunte & durante aestate, ac citissime postea pereunt.

Nomina.

1. *Tordylium maximum sphondylii semine aculeato, Nobis. Caucalis major, Clus. Hist. caucalis major semine minus pulchro hirsuto, f. 2. Quam inceptè à Clusio primò, & ab aliis authoribus cœcutientibus, ipsumque gradatim sequentibus caucalis denominatur, videant & præponderent emuncta naris Botanici ea que suprà à nobis dicta sunt. 2^{dum} *Tordylium Syriacum, nobis. Male à quibusdam authoribus seseli aut gingidium, ab aliis caucalis. Cum intuenti librum naturæ Tordylii omnes omnino notas ei quadrare manifestum sit, potiore jure Tordylium nobiscum nuncupabitur. 3^{um} *Tordylium minimum Apulum, Col. Inepte hoc idem etiam seseli creticum authoribus dicitur. Consule prælud. nostr. Botan. pag. 371. & 372.***

Temperamentum & vires.

Tordylium ejusdem mihi videtur esse temperamenti cum pastinaca latifolia, easdemque obtainere vires, at in remissiore gradu. Propter symbolum commune, atque omnimodam omnium partium dispositionem (præter radicem carnosam, turbinatam, friabilem, crassam, qua pollet pastinaca latifolia) eidem debet subjungi.

PAnax, seu panaces peregrinum. Ultimam hujus generis intermedii constituet speciem. Hujus folia sunt pastinacæ sativæ, latifoliæ (quoad foliorum costæ mediæ è regione annexionem & figuram) omnino æmula, glabriora tanien, & dilutius virentia, & longa, acuminata : Lapathi folia quodammodo æmulantur multò tamen sunt minora. Caulis geniculatus, quaternos, quinos cubitos altus. Flores in Umbellis lutei, ampli, reflexi. Semine constat binatim juncto, membranaceo, compresso, pastinacæ sativæ latifoliæ majore. Ex hujus vulnerata radice succus æstivis mensibus manat sponte concrescens, odoris quidem exigui, sed gustu excalefaciens ; est autem facile notu, quod cæteris suæ fortis diutius duret, quippe radice crassa sub terram descendendo in multos annos sese propagat.

Locus & tempus.

Panaces peregrinum in Italia & Sicilia sponte crescit. Floret sub finem astatis, semenque ad maturitatem paulo post perducit, nisi cælum aut solum refragentur, nam in hoc & similibus repellibus plantis, natura adeo productioni seu multiplicationi per radicem ut raro semen ejusdem ad perfectionem per est intentaveniat, saltem in Borealibus tractibus.

Nomina

UMBELLIFERÆ.

41

Nomina.

Panax pastinacæ folio an Syriacum Theophrasti, C. B. P. Panax alterum recentiorum olusatris aut pastinaca folio ad. Lob. panax Heracleum alterum, seu peregrinum Dodœi, Park. peregrinum, Dod.

Temperamentum & vires.

Panaces peregrinum calidum est in 3^{io} siccum in 2^{do} gradu; præcipue gummi, quod ex ejus radice extrahitur opopanax dictum, vulneribus ulceribusque prodest, urinas cit, menses provocat. De seminibus Umbellarum semine foliaceo, subrotundo, compresso, foliis lobatis donatarum, consule Tabulam Generalem iconum 25. 25. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. ejusque explicationem. De foliis, vide Tab. iconum. 8^{am} in qua, ad instar reliquarum umbellarum semine membranaceo, compresso, rotundo, & foliis fæniculaceis præditarum, sculptur aethnum, & Tab. icon. 9^{am} in qua delineatur & sculptur peucedanum. Consule pariter Tab. icon. 9. ubi ad instar reliquarum umbellarum semine membranaceo, compresso, rotundo, foliis lobatis præditarum, sculptur sphondylium vulgare, pastinaca latifolia, & Toraylium Syriacum.

Septimi hujus generis subalterni tertium membrum esto Umbellarum semine foliaceo, subrotundo, & foliis plurifariam divisis donatarum.

UMBELLÆ SEMINE FOLIACEO SUBROTUNDO & foliis multifariam divisis donatae.

Oreoselinum. ◎

Libanotis nigra Theophrasti, saxifragia Venetorum. Lob. ◎

Thysselium, Dod. ◎

Seseli palustre lactescens, C. B. P. ◎

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Oreoselinum. Folia habet plurifariam divisa, magisque incisa quam saxifragia venetorum, & minus quam duæ sequentes. Semen foliaceum, subrotundum, compressum gerit, ergo male ad apii classem refertur, cum omnes apii species sint semine rotundo, striato præditæ, aptiusque huc à nobis amandatur ad congeneres. Spreta digestione authorum retinebimus nomina ab iisdem assignata, ne multitudine nominum recenter assignatorum obruatur lectoris memoria. Jungenda jungendis jingo, parum solitus de nomine hoc in loco, quemadmodum passim in doctrina generali omnium vegetantium.

Locus & tempus.

Oreoselinum nascitur in monticulo dicto Mont-Valerian, quarto ab urbe Lutetia lapide, pago Sureno immixtum, & in sylvis sabulosis intra septa regie Chambort. Floret citius, semina sub exitum aestatis perficit.

Nomina.

Oreoselinum majus Clus. Dod. Lob. Lugd. apium montanum Dalechampii, Lugd. Oreoselinum Parisiense Hist. Lugd. & apium montanum nigrum, C. B. P. Quamvis Casp. Bauhinus duas distinctas in Pinace facit umbellas, est una & eadem, foliis dilutiis aut obscurius virentibus, aut à natalibus diversa facie conspicua.

L

Tempo-

UMBELLIFERÆ.

42

Temperamentum & vires.

Oreoselinum calidum & siccum est in 2^{do} gradu; crassos, & phlegmaticos attenuat humores, splenis, seu lienis tollit obstrunctiones, urinam ciet, menses provocat, iterum abigit. Ejus semen, aut radix in ore masticata aquosos educit humores.

L*Ibanotis nigra, seu saxifragia Venetorum, Lob. ad. Huic folia sunt plurifariam divisa, longis appensa pediculis, aliquatenus petroselini Macedonici divisuræ aut effigie, rigidiora, glabra, crenata, sapore remissiore quam ejusdem radix. Caules sunt striati, binos vel ternos cubitos alti, & in alas divisi. Umbellæ sustinent amplissimas flosculorum albicantium (more vulgato Umbellarum) foliolis quinis constantium. Semen fert subrotundum, compressum, foliaceum, ad pastinacæ latifoliæ semen nonnihil accedens. Quam male synonyma hujus traduntur à C. Bauh. & quam negligenter dicitur in descriptione fileris montani 2^{di} à Clusio esse semine fileris, vix capio; nunquam enim observavi hanc plantam nisi semine compresso, membranaceo; nec Lobelius, Clusius, aliique bene observarunt hujus semina.*

Locus & Tempus.

Provenit in montibus Helveticis, Sabaudicisque; invenimus in sylva Aurelianensi. Floret ineunte Autumno, & semen perficit versus initium Octobris.

Nomina.

Libanotis nigra, Dod. Gesn. in Hort. Libanotis nigra, cervaria nigra, Thal. Libanotis Theophrasti quorundam folio minus rotundo, F. B. Daucus montanus apii folio major, C. B. P. daucus selenoides. 2^{dus} obs. & Icon. Lob. saxifragia Venetorum ad. Lob. Ejusdem facultatis est cum Oreoselino, & circa idem tempus floret.

Temperamentum & vires.

Libanotidis, seu saxifragæ hujus Venetorum semen, calefaciendi vim obtinet; in vino potum urinas movet & tormina alvi sedat, tussis diutinas lenit; ademata illita succo hujus discutiuntur. Radix & semen in vino macerata & pota contra venenata plurimum valent; at radix & folia vim obtinent semine inferiorem. Hoc familiare est omnibus seminibus stirpium, quod viribus & facultatibus folia antecellunt; idque contingit ob aquam humiditatem, aut succi alimentitii mixturam, à qua retunditur vis activa in foliis; hoc magis evidenter apparet in foliis & radicibus paululum exsiccati, quam adhuc recenter humore alimentitio abundantibus. Idem in ceterarum omnium stirpium seminibus exsiccati observatur.

T*hysselinum. Folia duarum priorum Umbellarum foliis tenuius incisa habet, dauci vulgaris, carota dicti, ritu. Radices habet varie furcatas, quod paucis aliis Umbellis convenit. Succum lacteum folia ejus iupta fundunt. Umbellam gerit flosculorum petroselini instar albidorum. Semen est subrotundum, compressum, foliaceum.*

Locus & tempus.

In alnetis humidis passim circa Blasas, & juxta lacus in uliginosis & humidis locis, in scrobibus aquas rediles habentibus provenit. Junio ac Julio flores profert; paulo post semina matura producit.

Nomina.

Thysselinum, Plinii. Lob. Thysselium, Dod. daucus palustris. Gesn. in Hort. olsenichium, Cordi in Historia. That. apium sylvestre lacteo succo turgens, C. B. P. Thysselinum sive apium palustre, Park. apium sylvestre, Dod. Apium sylvestre, Dod. & Thysselinum quorundam, planta lacteo succo turoens, in locis humidis proveniens, F. B.

Tempe-

Temperamentum & vires.

*Radix hujus calida est, & sicca ordine 3^{io} teste Dod^{eo}; masticata & commanducata multum ex ore pituita pro-
licit, & dentium dolores sopit; attenuat, incidit, & aperit. Urinas & menses movet, eademque etiam que genera
reliqua, nec segnius sed efficacius præstat. Teste Plinio lib. 25. c. 11. Thysselinum apio non est dissimile. Radix
purgat capitis pituitam. Valerio Cordo dicitur Olsenichium, Thysselinum vero quia per eius modum, id est per loca
palustria sese extendit.*

Seseli palustre lactescens. Radice provenit singulari, longa, subfuscata, ingratia
admodum gustu, fervore non exiguo, fauces vellicante. Caulem profert ramo-
sum, cubitalem, flores candidos in Umbellis, & semen foliaceum, oblongum, com-
pressum. Folia habet multo tenuius incisa, & longiora quam sunt Thysselini. Utra-
que hæc Umbella Thysselinum, & seseli pratense, lactescunt, & eo nomine à cæteris
hujus membra facile discernuntur: à seinvicem autem distinguntur à foliorum ma-
gnitudine & parvitate, radicumque dissimilitudine.

Locus & tempus.

*Provenit in omnibus pratis humidis circumiacentibus Blesas, semenque fert sub finem aestatis. Est ejusdem
facultatis cum Thysselino.*

Nomina.

*Seseli palustre lactescens, C. B. P. & Prod. Park. Cam. Seseli palustre lactescens acre, foliis ferulaceis,
flore albo, semine lato, F. B.*

Temperamentum & vires.

*Seseli pratense lactescens calidum est & siccum, ejusque semen stranguria conduceit, anhelis & suspiriosis mede-
tur, matricis obstructionibus opitulatur menstrua educendo. fætum mortuum expellit, tusses veteres, aliosq; do-
lores internos sedat. Si aut radicis aut seminis pulvis in vino albo administretur, concoctionem pariter adjuvat,
flatusque expellit, tormina alvi tollit, frigidos humores discutit. Si cum vino & pipere modice mixto bibatur,
cum sit siccus & calidi temperamenti, iisdem gaudet facultatibus & viribus, quibus & seseli Massiliense & An-
glicanum dictum saxifraga pratensis, aut seseli pratense nostras. De seminibus umbellarum semine foliaceo, subro-
tundo, compresso, foliis plurifariam divisa, consule Tabulam Generalem iconum seminum 31. 31. 32. 32. 33. 33.
33^a 33^b. De foliis, vide Tabulam 9^{am} peucedanum Italicum, sphondylium, pastinacam latifoliam, & tordy-
lium Syriacum & Tab. 10. oreoselinum & Thysselinum atque utrinque Tabulae explicationem.*

Octavum Genus subalternum Umbellarum constituent rostrata (id est Umbellæ
quarum flores singuli semina rostrata bina, oblonga, avicularum rostri in-
star producunt. Easdem Umbellis villoso, seu hispido, echinato, seu aculeato se-
mine præditis, dauco, seu carotæ, & caecalidi (propter foliorum similitudinem, cum
omnium sint plurifariam divisa) adjunximus.

UMBELLÆ ROSTRATÆ.

Octavum Genus Umbellarum.

CAPVT VIII.

<i>Myrrhis</i>	<i>annua semine striato</i>	<i>aspero</i> { <i>oblongo, nodosa. ♀ ♂</i> { <i>brevi, nobis. Nova equicolorum, Col. ♀</i>
		<i>tævi, nobis. anthriscus, Plinii Hist. Lugd. ♀ ♂</i> <i>tævi, tuberosa, nodosa, coniophyllum, nobis. ♀ ♂</i> <i>villoso, nobis. ♀ ♂</i>
<i>perennis</i> <i>sem. striato</i>	<i>Alba</i>	<i>major odorata. ○</i>
		<i>minor</i> { <i>foliis hirsutis. ○ ♂</i> { <i>hirsutioribus. ○ ♂</i> <i>hirsutissimis. ○ ♂</i>
		<i>Lutea daucoides. ○ ♂</i>

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Myrrhis. Adeo supra dictis generibus intermediis pastinacæ tenuifoliæ , seu carotæ , forma & incisura foliorum accedit , ut antequam semen producat , ex earum classe esse quivis diceret. Myrrhis tamen pro nota genericâ ab ultimo fine (fructificationis similitudine) petita hanc habeto , Omnis Myrrhis debet habere bina semina striata , oblonga , inferius crassiuscula , superius in mucronem desinentia , avicularum rostris similia : dum adhuc vitescunt juncitum adhærent , exficcata sese separant ; quod in omnibus Umbellarum seminibus proprie dictarum infallibiliter contingit. Consule Tabulam generalem iconum seminum 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 39.^a 39.^b A duratione per διχοπūas erit nobis annua , vel perennis. Annua prima dicitur , myrrhis annua semine striato aspero , oblongo , nodosa. Hujus caules ad genicula crassescunt , nodosque gerunt turbinatos , medulla vacuos , crassiores tamen quam in ulla Umbellarum specie. Flores gerit albos in summis caulum bipedalium & tripedralium , quibus fatiscentibus succedunt semina rostrata bina , striata , aspera in convexa parte , imo omnibus reliquarum myrrhidum seminibus (præter myrrhida odoratam) crassiora & majora : unde à nodositate caulum , flore albo , & semine striato , aspero , quam facillime à reliquis myrrhidum speciebus distinguitur. 2^{da} est foliis apii similibus , hirsutis. Semen habet asperum , parvum , breve , striatum , binatum juncitum ; estque milii majoris magnitudine , aut seminis anisi , vestibus prætereuntium adhærens , sapore aromatico , acri parum , & dulci , amaro quodam mixto , non ingrato. Caulem profert ineunte vere (nam folia virent per totani hyemem , hirsutie rara mollique obducta) bicubitalem , in locis terrenis ; in saxosis vero & glareosis , brevem , pedalem & bipedalem. Cicutæ foliis (nisi quod parum minora , & dilutius virentia , hirsutie obducta sunt) valde accedunt hujus myrrhidis folia , cum hoc tamen intercedente discrimine , quod hujus Umbellæ secus alas ut in

(palustris apii & sii ad alas floridi ritu) hærent, non in summis fastigiis caulum, ut in cicuta, & aliis *Umbelliferis*. 3^{ia} Myrrhis annua semine striato, lævi. Hujus folia sunt petroselini foliis similia quoad divisuram, hirsuta, maculis cyaneis, subfuscis conspersa. Caulem ineunte vere emittit bipedalem. Ad radices sepium, & fossarum aggeres frequenter occurrit, in omnibus quas unquam adii regionibus; copiose etiam in omnibus sylvis cæduis provenit. Flosculos gerit albicantes, semina bina-
tim juncta, striata, lævia; atque ad caulum geniculos singulos nodos gerit tur-
binatos, multo minores, & graciliores quam sunt myrrhidis nodosæ semine striato,
aspero, suprà hic à nobis descriptæ; adeo lævitate seminum striatorum, & gracilita-
te tuberositatis ventricosæ, turbinatæ, myrrhis posterior 3^{ia} annua distinguitur
à priori; quod cuilibet hæc consideranti appareat. Consule pag. 288. Prælud. Bo-
tanorum nostr. sub finem pag. & observabis ab authoribus male & inattentè hanc
Umbellam, Cerefolium sylvestre dici. Vide descriptionem à Dalechampio allatam,
in Hist. Lugd. de anthrisco Plinii. 4^{ta} est nobis myrrhis tuberosa, nodosa, conio-
phyllon, semine striato, lævi. A semine striato, lævi, ab omnibus (præter prædictum
Anthriscum Plinii) cæteris myrrhidum speciebus distinguitur, & ab Anthrisco
Plinii à tuberositate radicis, nodositate caulis ad singula genicula majore, & à binis
internodiis versus terram villositate scatentibus, cæteris sursum versus cicutæ instar
lævibus, & foliis omnino cicutæ foliorum æmulis ab omnibus reliquis suæ sortis
quam facillime distinguitur. Vide caput 2^{dum} hujus tractatus infrà de cicutaria bulbosa
inter hallucinationes Calp. Bauhini in cap. de cicutaria. 5^{ta} annua, est nobis myrrhis
annua semine striato, villoso. Hujus folia primo anno ex semine villoso, striato, oblongo
pullularunt plurifariam divisa, ut carotæ, sed multo tenuioribus divisuris prædita. Præ-
cipue sese myrrhidem, non daicum declarat, quod seminal longa, striata, rostrata gerat,
(est enim nota generica omnium myrrhidum speciebus communis, semen longum, rostra-
tum, striatum producere) at hæc insuper incanum seu villosum, acre, aromaticum
fert, adeoque à cæteris distinguitur. Male daucus Creticus semine hirsuto Johanni
Bauhino, & aliis authoribus dicitur, secundum doctrinam nostram ex libro naturæ
desumptam. Perennis est alba, major, odorata, semine striato: hæc radicem
habet insigniter crassam, albam, sapore dulci, subacri, grato, aromatico. Ineun-
te vere caules fuggerit bicubitales, nonnunquam tricubitales, brachiatos, hirsutos,
cavos; folia magna plurifariam divisa è pediculis alata, & pinnatim pendentia,
tactu mollia, hirsuta, seu pilosa, sapore anisi. Flores gerit candidos, lævitet odo-
ratos, quorum singuli quinis constant petalis bifidis (ut sphondylii) seu cor-
datis. Hoc quarundam *Umbellarum* floribus peculiare est; quemadmodum & aliis,
donari foliis seu petalis reflexis pariter contingit, præcipue floribus luteis
donatis. Vide & consule Tabulam 2^{dam} Generalem iconum *Umbellarum* à no-
bis exhibitam, in quâ exhibuimus carotani florentem petalis planis, fœniculum
florens petalis reflexis, & sphondylium florens petalis bifidis, aut cordatis: illic
observabis extimum petalum intimis duobus oppositis utrisque simul junctis
majus, lateralibus medio modo se habentibus. Floribus deciduis succedit semen
notatu dignum, magnum, longum, fulcatum, fulcis profundius ductis præditum,
quod masticatum est sapore dulci & jucundo anisi: Folia & flores manibus con-
trectata, & tam gustui quam olfactui porrecta, omnino sunt grata & jucunda; hinc illi
nomen odoratæ myrrhidis. A semine triplò cæterarum suæ sortis seminibus majore,
major non sine ratione dicitur. Perennis altera minor à semine minore, striato,
nunc aureo, nunc subfusco. Hujus striæ, fulcive sunt depresso, nec tam alte im-

primuntur, quam superioris majoris. A foliorum hirsutie majori vel minori distinguuntur ejus variæ species. Prior est, cicutæ foliis, cuius caulis striatus assurgit ad binos ternosve pedes. Flores albos, & semina rostrata, striata, semiuncialia, in cimis gerit exterius lutea, cavâ parte quâ junguntur subcærulea; est foliis hirsutis, pinnis latioribus, plurifariam divisus. Secunda hujus datur varietas, cuius folia sunt hirsutiora, medio modo, secta pinnis angustioribus respectu prioris. Est & tertia hujus species, seu varietas si mavis, cuius folia adhuc sunt tenuius dissecta, & semen tenuius, longius, subfuscum. Harum omnium perennium myrrhidum flores sunt albi. Ultima perennium est myrrhis lutea daucoides; cuius folia quam proxime carotæ, seu daucoides accidunt, ideoq; daucoides à nobis nuncupatur. Flores habet luteos, quibus semina rostrata, striata, myrrhidis montanæ seminibus longiora, & minus tumida succedunt.

Locus & tempus.

Prima Myrrhidis nodosa semine oblongo, aspero, natales ignoramus. 2^{da} semine brevi, aspero, provenit in suburbis ad fossarum aggeres & murorum radices sponte, & alibi passim. 3^{ia} semine striato, lœvi, in sepibus & sylvis annosis & cœduis passim. 4^{ta} Myrrhidum annuarum provenit in Viennensis agri locis herbidis, & similibus itidem Hungariae; folia ibidem producit glabra, aliquando hirsuta: floret Maio, & semen ad maturitatem perdicit Junio & Julio. 5^{ta} provenit in Genevensium collibus, & in rupibus circa Furam, & copiose in monte Selene, aliisque Geneva vicinis. Floret maio, & paulo post semina sua perficit. Major odorata sponte provenit in Germania. Montana minor & ejus varietates ore asperae, & aliis Galliae, ut Arvernia montibus celsis. Ultima lutea ignoratur locus natalis.

Nomina.

Prima myrrhis annua nodosa, semine aspero, longo, nobis primo dicta & scripta. 2^{da} myrrhis annua semine aspero, brevi, nobis. Sylvesteris seminibus asperis, C. B. P. sylvesteris nova equicolorum, Colum. 3^{ia} Myrrhis annua semine striato, lœvi, nobis. Anthriscus Plinii Lugd. Perperam cerefolium sylvestre Neotericis, seu modernis mordicus adherentibus Casp. Bankino, & eundem errorem cum ipso errantibus dicitur, vide pag. 288. Pralud. Botan. nostr. 4^{ta} dicitur myrrhis tuberosa, nodosa, coniophyllum, semine striato, lœvi, nobis, Bulbocastanum coniophyllum, Cam. cicutaria Pannonica, Clus. Myrrhis cicutaria Tab. 5^{ta} dicitur nobis myrrhis annua semine striato villoso & incano. Daucus Creticus, Cam. ep. Daucus Creticus, sem. hirsuto, F. B. daucus 2^{dus} Dioscoridis, Matth. ed. Bauh. prima myrrhidum perennium, major, seu cicutaria odorata, C. B. P. myrrhis Matth. Lugd. Dod. sativa Cam. 2^{da} 3^{ia} 4^{ta} perennium, ut à nobis in Tabula, assignata habent nomina. Ultima ab umbella, lutea; à dauci pariter foliorum similitudine, Daucoides à nobis apte dicitur.

Temperamentum & vires.

Myrrhis calida in 2^{do} gradu est, & partium subtilium, seu tenuum. Teste Galeno radix myrrhidis odorata, si ebulliat & cum oleo comedatur, pthysicis opem fert; eadem comepta preservat à peste. Qui plura desiderat consultat Joh. Bauh. Tom. 3. Part. 2. pag. 77. & 78. De seminibus umbellarum rostratarum, consule Tabulam Generalem Icon. seminum 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 39.^a 39.^b ibi finiuntur myrrhidum semina. Consule etiam ejusdem Tab. explicationem.

Cerefolium *Sativum, Trag.* ♀

Sylvestre, perenne, seminibus lœvibus nigris. ♂

Scandix. ♀

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Cerefolium. Nulla aut exigua nota quoad folia, à myrrhido potest distingui, ac proinde de ejusdem potest accenseri species, solo semine lœvi, nigro, aut subfuscō differens.

UMBELLIFERÆ.

47

ferens à myrrhide, cuius in genere omnia semina sunt striata, seu sulcata. Est autem duplex, vel sativum, minus, hortis familiare, tam in jusculis quam in acetariis expetitum, annuum, singulis annis ex satione propagatum, ab hortis culinariis aut holeraceis præfatis. Vel sylvestre, quod multo majus est, foliaque habet majora, caules majores & solidiores, medulla duriori plenos, striatos, bicubitales & tricubitales. Semina lœvia, nigra, duplo cerefolii sativi semine majora producit, duratque in multos annos. Vide hallucinationes Casp. Bauh. supra citatas.

Locus & tempus.

Prius sativum apud omnes gentes in hortis colitur, ut culinae inserviat miscendis partim jusculis carnium et lixis, partim acetariis condiendis. Secundum in pratis & fossarum aggeribus passim tam in Gallia quam in Britannia maximo detimento pratorum, in quibus copiose aliquando provenit. Flores edunt aestate, & paulo post semina perficiunt.

Nomina.

1^{um} Cerefolium sativum, C. B. P. Joh. Bauh. vulgare, Ger. 2^{dum} sylvestre perenne seminibus lœvibus, nigris, nobis. Magnopere confundit Baubinus synonyma cerefolii & myrrhidis sylvestris; ut alibi supra innuimus.

Temperamentum & vires.

Cerefolium moderate calidum & humidum sanguinem extravasatum, sive intus sive extra congelatum, discuit & dispellit, stigmata tollit; si simul jure ejus intus administrata applicatur exterius folia contrita, & parti affectae admota, pluritidi aliisque laterum doloribus medentur. Ad icterum accipe succi cerefolii cochlearia 8. quibus infunde 3 j. triti Marrubii, & calide propina diebus aliquot continuis. Cum melle succus remistus & haustus confert tussi; si in Butyro frigatur cerefolium, & superponatur abdomini, certum est contra tormenta alvi remedium. Qui plura desiderat consulat Joh. Bauh. Tom. 3. Part. 2. pag. 76. & 77. qui pralixe satis ibidem de cerefolii viribus agit.

Scandix. Ultimum est rostratarum Umbellarum genus intermedium. Flores gerit cerefolio proximos, albantes minimos, quorum singulis succedunt cornicula tenuia, longissima, triuncialia, recta, acuminata, acubus, quæ in geranio Cretico emicant, non dissimilia; quemadmodum in cerefolio majore, odorato visuntur; licet Scandici longe tenuiora & fragiliora innascantur: quo fit ut recte inuentibus & bene considerantibus, specie tantum, non genere differre hæ plantæ haud dubie appareant: id quoque indicant eorum sapor & odor. Quæ omnia nos movere, myrrhidem, cerefolium, & scandicem in eadem Tabula Generica exhibere. Ad basin rostri sunt bina semina lœviter striata, quæ à fibrilla media hinc inde maturo semine & exsiccatu defiliunt in duas partes, manente in medio fibrilla membranacea, tenui, alba, simili quodammodo aceri tritici, aut hordei. Consule Tabulam Generalem seminum. ubi 42. indicat rostrum seminis scandicis ex fibrilla & binis quasi lateralibus glumis conflatum, & in mucronem pungentem terminatum. B. demonstrat fibrillam in medio, hinc inde semina adhuc viridia nutrientem, radiorumque partem. A. A. indigitant bina semina striata, ad basin hiulca, & aperita, C. C. monstrant seninis singularis partem cavam, ejusque productionem glumosam, cavam itidem, in qua cavitate canalata, resupinata cernere licet fibrillam cuius beneficio semina adhuc viridia, nutrimentum suscipiebant.

Locus & tempus.

Scandix provenit in Arvis segetalibus passim. Floret sub exitum veris & per totam astatem. Semina versus finem astatis perficit.

Nomina

Nomina.

Scandix semine rostrato vulgaris, C. B. P. *Scandix Dod. Tab. Cord. in Dioscoridem. Pecten veneris Matth.*
Lugd. Ger. f. B. Scandix vulgaris, seu *pecten veneris*, Park.

Temperamentum & vires.

Radix scandicis, cum malva tusa, omnia corporis infixa extrahit, id quod per signaturam ostendisse creditur natura (in acibus seminum) authoribus si credere fas est. *Folia antequam floreat cum butyro & oleo*, una cum petroselini foliis in patella calefacta, & cum vino albo publi adhibita, remorantem urinam, pueris præsertim provocat. De seminibus cerefoliorum, consule Tab. Generalem Icon. seminum 40. 40. 41. 41. ejusque explicationem. De semine scandicis consule Tabulam Generalem seminam 42. AA. B.

UMBELLÆ ROTUNDÆ, SEU TESTICULATÆ.
Nonum Genus Umbellarum.

CAPVT IX.

Coriandrum { *sativum*, seu *majus*. ♀
sylvestre foetidissimum. ♀

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Coriandum. Ab omnibus Umbellis prædictis facile dignoscitur, quod folia, cæteræque partes virentes, cimices odore tetterimo (si contrectentur) redoleant, ac insuper semine rotundo donetur. Est autem duplex, vulgare unum, seu sativum, cuius caulis est cubitalis, aut sesquicubitalis. Folia primùm anisi, aut potius petroselini more vigent, deinde in superioribus ramis tenuius dissecantur, & ad chamæmeli accedunt folia. Umbellæ florum colore sunt propemodum carneo, magis tamen ad album vergente, semen exakte rotundum, striatum, vacuum, ac binatim junctum, cuius singula semina separata cotylen intus referunt. Semina exsiccata odo-re sunt & sapore gratissimo, ac aromatico; aceto macerata, ventosos flatus per intestina expellunt, proinde ex carminativis seminibus sunt efficacissima. Alterum est sylvestre foetidissimum, à priori discrepans in hisce; foliis est multò tenuioribus donatum, virens multo magis putidum edit foetorem; semina bina, rotunda, in singulis radiolis, testiculorum in modum simul juncta sunt, parte qua junguntur binis foraminibus pervia. Vide Tabulam Generalem Iconum seminum 43. 43. 44. 44.

Locus & tempus.

Prioris, seu *sativi natales nos latent*. *2dum inter segetes circa Pictaviam copiose provenit*. Flores & se-mina media æstate perficiuntur.

Nomina.

Prins, seu *sativum coriandum majus*, C. B. P. *Coriandum vulgare*, Park. *coriandum*, Ger. f. B. *2dum coriandum foetidissimum sylvestre*, C. B. P. *sylvestre Myconi Hist. Lugd. f. B.*

Tem-

Temperamentum & vires.

Semen ejus vino maceratum vermes in intestinis latentes interimit. Stomacho (quippe calidum & siccum) confert , eumque corroborat , cibum in ventriculo retinet , donec probe concoquatur. Semen stomacho proficuum , concoctionem juvat , vaporum sursum eruptionem , flatuumque impetum sistit. Vide plura apud Joh. Bauh. pag. 89. 90. & 91. De seminibus coriandrorum , consule Tab. Generalem icon. seminum. 43. 43. 44. 44. & φ. χ.

CAPITULUM

UMBELLÆ IMPROPRIE DICTAE.

Cum ab initio (ut in descriptione *Umbellæ* dictum fuit) omnis *Umbella* , post flores ex quinis petalis conflatos evanidos , debeat constanti & invariabili naturæ ordine *Umbellis* præscripto , producere bina semina , cujuscunque formæ aut figuræ fint eadem , ex defectu hujus ultimæ conditionis , sequentes delineandæ plantæ , non sunt pro proprie dictis *Umbellis* accensendæ. Verum cum valeriana & valerianella flores producunt quinque petalis constantes , atque folia lobatim dissecta , instar , *Umbellarum* hic collocabuntur. Item valerianam Græcam (propter folia pinnatim rachi , seu costæ mediæ adhærentia , quarundam *umbellarum* more , etiam si per se sit planta sui generis) sicut & Pimpinellam sanguisorbam , filipendulam , barbam capræ , & thalictrum , propter conformitatem in foliorum dispositione cum quibusdam *umbellis* , tanquam appendicem ad calcem *umbellarum* rejecimus. Alicubi sunt collocandæ , nec aptius ex mea opinione quam huc reduci possunt ; qui melius easdem disposuerit , quam post *umbellas* proprie dictas superius collocatas , & ad novem genera subalterna redactas , per me non stabit. Jam tandem adjungo primum Genus *umbellarum* improarie sic dictarum ; estque earum , quarum semina unica & singularia in apice superiori pappo donantur.

N^o PRIMUM

PRIMUM GENUS UMBELLARVM IMPROPRIE DICTARVM
est earum quæ abeunt in pappos.

VALERIANÆ.

CAPUT I.

		<i>hortensis</i> ○
	<i>major</i>	<i>sylvestris</i> { <i>foliis</i> { <i>latrioribus</i> . ○ { <i>angustioribus</i> . ○ &
	<i>minor</i>	<i>annua aestiva</i> , Clus. ♀ { <i>perennis palustris</i> . ○
<i>Valeriana</i>		<i>latifolia</i> , seu <i>major</i> { <i>rubra</i> . ○ { <i>alba</i> . ○
	<i>marina</i>	<i>angustifolia</i> , seu <i>minor</i> { <i>rubra</i> . ○ { <i>alba</i> . ○
		<i>lævi</i> , <i>glaucō</i> . ○
	<i>montana</i>	<i>folio</i> { <i>olivari</i> . ○ { <i>aspero</i> { <i>radice</i> { <i>fibrosa</i> . ○
		<i>Canadensis urticæ folio</i> , Corn. ○

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Valerianæ nota generica & essentialis esto papposum semen; quod quia non est geminum, seu binatim junctum, Umbellam propriè dictam non constituit: verum quia Valerianæ flores ferunt, ut Umbellæ propriè dictæ, quinis petalis constantes, & folia binatim mediæ costæ adhærentia habent, easdem ad Umbellarum propriè dictarum calcem reduximus. Valeriana est primò major, eaque duplex, hortensis una, quæ folia inferiora & prima per terram strata habet integra, media centaurii majoris modo profunde dissecta, flores in umbella suaveolentes, albos, aut ex albo purpurascentes, quorum singuli quinis petalis, seu foliolis constant & apiculis concoloribus. Semina unice & singulatim cum lanugine quadam pappa- fa avolant. Radix subest crassa, rugosa, multis fibris transversis donata, albiantibus, sapore & odore aromatico, radicum fere asari. Altera, seu 2^{da} est sylvestris, in humidis proveniens, cuius radix ex pluribus fibris albis, gustu aromatico, compo- fita est; rependo sepe propagat, caules multo altius superioris ascendunt, ad quinos ali- quando

quando pedes ; ad quorum genicula , folia valerianæ sativæ foliis magis pinna-ta , & saturatius virentia proveniunt , nonnihil aversa parte hirsuta. Flores pariter in *umbella* sativæ sunt similes , quinquefolii , seu pentapetalii , albidi , colosinive coloris. Ingratum edunt odorem quasi hircum olenem , tandemque cæterarum more in pappos facesunt. Est hujus duplex varietas , una foliis latioribus , & dilute virentibus , hirsutis ; altera foliis lobatim etiam sectis , minus hirsutis , angustioribus , & saturatiis virentibus. Valeriana 3^{ta} est minor annua , seu æstiva , quæ folia habet laciniata , instar foliorum calcitrapæ vulgo sic appellatæ , inter quæ exsurgunt caules ramosi , bipedales , quos ex adverso amplectuntur folia , inferioribus minora , etiam laciniata. In summis caulibus sustinentur flores pentapetali prædictarum more. Semina itidem paria papposa vento avolantia. Est 4^{ta} minor , perennium una , quæ radicem serpentem , caulem pedalem & sesquipedalem , folia ima & versus terram strata habet , integra , parva , subrotunda , Violæ Martiæ pene similia ; alia in caule conspicuntur binatim juncta , in summa parte laciniata , lobata , & oblonga , è regione pediculo adnexa. Sapore est nonnihil amaro & viscido. Marina duplex est , latifolia prior , cujus caules cubitales & sesquicubitales sunt , ad quorum genicula folia sunt bina , adversa , ex lata basi caulem amplectentia , & in acumen desinentia , perraro laciniis divisa , pinguis , glauca , papaveris spumei vulgo dicti folia utplurimum referentia. Flores in muscariis conspicuntur conferti , peramœni , colore purpurascente ; singuli etiam quinquepartiti , tubulo oblongo , sed admodum tenui , virenti pedicello agglutinantur , corniculum insuper calcaris instar protendentes. Semina papposâ cristâ , cæterarum suæ fortis modo , ornata succidunt. Gaudet communiter flore rubello , aliquando albo. Altera Marina est angustifolia , seu minor , quæ in omnibus cum priore quadrat , nisi quod folia producat palmi fere longitudine , latitudine culmi compressi. Variat etiam (sed rarius conspicitur) flore albo. Proxima est Montana , quæ ratione levitatis & asperitatis foliorum est aut folio levavi , glauco , bellidis montanæ foliorum ferme amulo , laciniis perrard in margine crenato , è quorum medio caulis assurgit pedalis , rara habens folia dissecta , inter se opposita , angustiora , & minora. In supremis ramulis flosculi proveniunt albi , reliquis valerianæ sylvestris speciebus similes. Semen itidem par ; radix non minus odora. Vel est folio aspero , eaque duplex , radice olivari , & fibrosa. Prima nardus montana major , tuberosam habet radicem , cui aliæ minores adnascentur , olivæ magnitudine tanquam soboles. Fibris capillaribus sese nutrit & propagat , multa edit folia in principio integra , oblonga , atrovirentia , aspera (non splendentia) superne. Deinde caules alis in laciniis dissectis (uti in valerianæ sativæ majoris foliis) sed minoribus ornantur. Flores & semina cæterarum valerianarum modo proveniunt. Radix etiam odorata , valerianæ sylvestris radicibus odore valde accedit. Est & altera ex radice fibrosa assurgens caulinculo pedali , tereti , rotundo , viridi , quem ambiunt subrotunda folia in aliquot crenas profundiores divisa in inferiore parte , at in superiore caulis parte folia binatim è regione proveniunt , profundius crenata , in acumen desinentia. Flores & semina ut in aliis valerianæ generibus producuntur. Radice serpit nodosa , albicante , odorata , ex qua capillares fibræ dependent , beneficio quarum nutritur ipsa planta , quibusque præcipue distinguitur à priore , olivari radice. Nec ego distinctionem inter valerianam & nardum montanam , essentialem invenio , ideo indiscriminatim verbo valeriana , aut nardus , utor. Ultima in superiori Tabula contenta , est Canadensis urticæ foliis , Corn. Hujus radix , ut in maxima valerianarum parte cernere licet

licet, in summa terræ superficie leviter hæret, aliquando fibras detegendo apricationis tam est avida, supra terram apparent fibræ, quæ odorem, & saporem nardo haud inferiorem suffundunt, contrectatæ manibus & masticatæ. Caules emittit in umbrosis bicubitalis, qui in ramulos multos, seu alas finduntur, quibus innascuntur *Umbellatum*, seu corymbatim innumeri flosculi albi, pentapetalii, apicibus ejuſdem coloris è fundo florum emergentibus, quibus flaccescentibus succedunt singulis, singula minuta semina nigra, acerosa, pappo suo in apice prædita, seu ornata. Folia autem caulem binatim ex adverso à caulis radice ad ejusdem summum fastigium ambiunt, & ex pediculis semiuncialibus à caulis dependent, folia latiora versus pediculum tandem in acumen desinunt, urticæ instar ferrata, ejusdemque figuræ cum urtica majore.

Locus & tempus.

Prima, seu valeriana major mas oritur sponte teste Dioscoride in Ponto, in humidis illic vallis, ad montium radices sitis. 2^{da} & 3^{ia} in humidis sylvis, frequenter etiam ad crepidines aminium, 2^{da} rarius tertia; inter numerosam catervam vulgaris sylvestris conspicitur in sylvis umbrosis humectis. 4^{ta} est à Clusio depicta, & exhibita: sed natales ab ipso omittuntur. 5^{ta} in pratis humidis passim occurrit. Marinorum latifolia & angustifolia ignoratur locus natalis peculiaris, nisi quod marina in genere dicantur. 8^{ta} in monte Baldo (referente Bauhino in prod.) reperitur. 9^{ta} inter sarcæ ad fluvium Mintæ, qui Monasterium Neubourg alluit teste Clusio. 10^{ma} in monte Virgineo reperta, & ad Clusum Neapole, à Ferrante Imperato missa. 11^{ma} in Stiria, & Austriae montibus, & in Alpibus, locisq; umbrosis reperitur. Ultima ex Canada Parisios missa, culta & propagata Mangano & vigilantia præceptoris mei (quinis abhinc lustris) meritissimi, & Botanices peritissimi Vespasiani Robini, qui Parisis omnes Canadenses plantas in horto Regio Botanico (à Jacobo Cornuto præceptore meo sub idem tempus concinne & succincte descriptas) coluit, multaque alias rariores postea apud ipsum ibidem observavimus. Florent omnes ab ineunte aestate, ad ejusdem exitum; semina sua perficiunt paulo post.

Nomina.

Prima dicitur valeriana hortensis, Dod. Ger. valeriana major odorata radice, F. B. Phu majus, seu valeriana major, Park. valeriana vera, seu nardus agrestis, Trag. Phu verum, Fuch. 2^{da} valeriana sylvestris major, C. B. P. sylvestris, Dod. Cam. Eyst. Phu majus commune, Gesn. hort. hujus datur varietas latiore folio à Park. descripta, quæ in horto Regio Blæfensi ad multos annos distincta semper apparuit. 4^{ta} valeriana foliis calcitrata, C. B. P. annua, seu astiva, Clus. in Hist. valeriana petrea, Park. 5^{ta} valeriana palustris minor, C. B. P. sylvestris seu palustris minor Cam. sylvestris, Park. minor pratensis vel aquatica, F. B. Phu minimum Matth. Lugd. 6^{ta} rubra C. B. P. Dod. Tab. Ger. rubra Dodæi Park. rubra latifolia, F. B. ocystrum valerianthos, Lob. ad. Phu peregrinum, Cam. Epit. variat flore albo. 7^{ma} est marina rubra angustifolia, C. B. in Prod. F. B. ab autore posteriore figuratur. 8^{va} valeriana folio laevi glanco, nobis. Nardus montana radice oblonga, C. B. P. Valeriana minima nardifolia, F. B. Nardus montana longiori radice, Park. 10^{ma} valeriana montana radice olivari, nobis. Nardus montana radice olivari, C. B. P. Matth. Lob. ad. Lugd. Clus. Nardus montana primum germinans, Park. Clus. 11^{ma} valeriana Alpina altera, C. B. P. sylvestris Alpina 1. latifolia, Clus. Alpina, F. B. ultima valeriana, urticæ folio, flore albo, Corn. cacalia americana Park. qui falso afferit contra Cornutum hujus radicem non esse odoratam, penes experientes & olfactientes esto fides.

Temperamentum & vires.

Radix valeriana vim habet calcificandi; arida, trita & potui data ciet urinas; quod, & idem præstat ipsius decoctum, folio & radices oris & gingivarum cum inflamatione exulcerationibus decocta & gargarisata profundit. Radicis succus flatus pellit; ejus decoctum lateris compunctionibus auxiliatur; idem præstat adversus stranguiram. Tussim veterem & asthma cum glycyrrhiza, uvis passis & aniso decocta tollit. Additur quoque in potionibus pro internis vulneribus in vino aut aqua decocta. Miscetur antidotis, ut Theriacæ & Mithridatio, aliisque medicamentis præservativis à veneno venetatarum bestiarum; atque ipsi posti resistat. De ceteris ejus facultatibus consule Joh. Bauh. Tom. 3. Part. 2. pag. 210. De valerianæ semine papposo consule Tab. Generalem Icon. secundum 45. 45. 46. Vide tabulam Icon. 11. De valerianis:

Secundum

Secundum genus *Umbellarum* improprie sic dictarum constituunt valerianellæ. Cum flosculos *Umbellatim* in summis caulum ramusculis ferant, atque eosdem pentapetalos, aliquam habent cum umbellis analogiam; sed cum bina non producant semina (una excepta arvensi præcoci, humiliori, semine depresso) easdem hic inter umbellas impropriè dictas disposuimus.

VALERIANELLÆ.

Secundum Genus subalternum *Umbellarum* improprie dictarum.

CAPUT II.

<i>Valerianella</i>	<i>Cornucopoïdes</i>	{ <i>rubra</i> , seu <i>Indica</i> , Cluf. ♀ <i>echinata</i> , alba, Col. ♀.
	<i>scabiosæ sem.</i>	
		{ <i>major Lusitanica</i> . ♀ ♂ <i>arvensis nostras</i> . ♀
	<i>nudo</i>	{ <i>rotundo</i> . ♀ <i>oblongo</i> . ♀
	<i>umbilicato sem.</i>	{ <i>birsuto</i> { <i>majore</i> . ♀ ♂ { <i>minore</i> . ♀ ♂
	<i>arvensis</i>	{ <i>præcox</i> , <i>humilior</i> , <i>semine depresso</i> . ♀ { <i>serotina</i> , <i>altior</i> , <i>semine turgidiore</i> . ♀ ♂

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Valerianella. Sic dicta authoribus modernis, quasi parva valeriana. Hoc solum cum valeriana habet commune quod flosculos producit *Umbellatim* pentapetalos, ut & omnes *Umbellæ* proprie dictæ, & propter hanc analogiam cum *Umbellis* huc ad calcem *Umbellarum* cum valeriana rejecimus. Semina diversiformia sunt, etiam si flores sint fere omnes consimiles. Primum valerianellæ genus subalternum est, seminis capsula membranacea præditum, cornucopiæ quadantenus simile, unde ei nomen cornucopoïdes. Est duplex, *Indica rubra*, vel *echinata alba*. Valeriana rubra *Indica*, cubitalis est planta, radice nititur tenui, brevi, candida, multis fibris capillata, sapore amaricante; caules habet repandos, supinos, inanes, & subrubentes, foliis ex adverso conjugatim caulibus adhærentibus, superioribus crenatis, inferioribus sine crenis nascentibus, valerianæ sativæ similibus. Flores quasi in *Umbella* inodori, suaverubentes, in quina petala, seu foliola dissecti, ex longo tenuique corniculo pendentes: hisce decidentibus succedunt vascula oblonga, fungosa, per articulos distincta, in calyces plures divisa, in quibus vasculum appetit, velut in foliaceum corniculum bipartitum, in quo latitat semen cartilagineum, longiuscu-

O lum

UMBELLIFERÆ.

54

lum. Vide in Tabula Generali Iconum seminum A B C , D E . 47. 2^{da} cornucopoides echinata , alba , Col. Caulium omnium plantarum partes superiores natura sunt tenuiores , ast in priori nuperrimè traditâ , & hac , sunt crassiores ; idem observavimus in hieracio 9^{no} Clus. cuius caulis est ad calycom floris triplò major , & fistulosior quam sub exortum è terra ; deinde ob rariorem capsulæ cartilagineæ formam , cornucopiam ab antiquis memoratam , & depictam expimentem , valerianella dicitur (apte satis) cornucopoides. Folia , & flores aliarum modo profert , sed tam floribus quam fructibus onusta planta cornucopiam æmulatur cacuminibus in quibus , tubuli parum compressi , nunc crassiores , & breviores inversam pyramidem effigiant , nunc latiores & crassiores in summo sunt hi fructus corniculati , qui ad uncis insident capsulis cornucopiae instar. Vide Tabulam Generalem Icon. seminum 48. & G. 2^{dum} Genus subalternum valerianellarum est scabiosæ capitulo , quod semina ejus stellata arcte sibi invicem adhærent , ita ut scabiosæ capitulum rotundum referant. Estque pariter duplex , major , & minor , sola magnitudine & parvitate discrepantes ; major Lusitanica aut Italica , quæ respectu seminis duplo est major nostrate Gallica ; post enim sationem utriusque in eodem pingui solo , foliis non multum inter se discrepant. Lusitanica folia habet serrata , quod non contingit in nostrate , quæ in omnibus Lusitanicæ est par , exceptis foliis non serratis , & magnitudine seminum. 3^{ium} Genus subalternum est semine umbilicato , seu (si mavis) in medio concavo ; estque duplex , alterum semine umbilicato , nudo : atque hoc etiam vel semine est umbilicato , nudo , rotundo ; vel oblongo. Rotundum semen nudum est umbilici ad modum , in medio concavum , parte prona videlicet , parte autem supina convexum : vel est oblongum etiam nudum & umbilicatum , quod in longitudinem porrigitur cavum prona itidem parte , supina autem convexum : hoc albidiore tingitur colore , illud rufo magis afficitur. Alterum membrum semine umbilicato est hirsutum. Vel majus cavum in medio & extremo superficie pronæ , vel hirsutum minus , cavum , simpliciter in medio superficie pronæ . 4^{tum} Genus subalternum , est valerianella arvensis , eaque duplex , præcox , & serotina , præcox est humilior , semine binatim juncto (more Umbellarum perfectarum & propriæ dictarum) compressiore , parum convexo ; (hoc non conspicitur in ulla alia valerianellarum specie .) Flosculos producit non-nunquam albos , sed ut plurimum subcæruleos , parvos , & quasi obtutum fugientes , quinis segmentis constantes. Exente hyeme floret , & paulo post semen perficit suum , semper binatim arcte sibi invicem junctum. Consule Tab. Generalem seminum 58. & 59. ubi eadem offertur visui , semine dupli adhuc juncto , & semine dupli hiulco , & binatim à fibrillis suis pendente , est enim perfecta umbella , ac ptoinde à cæteris omnibus suæ sortis cognoscitur. Altera arvensis serotina altior semine turgidiore dicitur nobis ; est enim pedali aut sesquipedali caule , (prior arvensis est tantum plantula palmaris aut sesquipalmaris) flores candicantes ferente , in umbellis satis dense dispositos. Omnium tardissime provenit. Floret enim sub augusti initium inter segetes circa Blæfas , atque paulo post semen crassiore & turgidiore prægnans reperitur. Consule infra ; ubi omnium harum succinctam & brevem inter cæteras Umbellas non delineatas in hoc tractatu descriptio- nem annexuimus. Omnes hæ valerianellæ facillime à seminibus diversimode constructis distinguuntur. Consule Tab. Generalem Icon. seminum 47. A B C . D E . 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Explicatio ejusdem Tabulæ Generalis icon. seminum omnium harum , sicut & prædictarum Umbellarum semina indigitabit.

Locus

Locus & tempus.

Valeriana, seu *valerianella Indica*, seu *rubra*, *Clus.* in *Sicilia* & aliis maris *Mediterranei Insulis* sponte *provenit*. *2da* *cornucopoïdes* inter *segetes Gallie Meridionalis*, & in *regno Neapolitano*. *3ia* *scabiosa capitula*, *Lusitanica*, in *Italia* & *Hispania* locis frugiferis provenit. Altera *scabiosa capitula*, nostras, in *agris frumentaceis* circa *Blaſas*, citra *pontem*, & copiose in *agris frumento* consitis circa *Pictaviam*. Quinta in *agris cultis* circa *Monspessulum*. *6ta* in *collibus aridis minime herbidis*, quibus inaedificatur *cella Eremitarum*, juxta *Blaſas*. *7ma* & *8va* in *planities dicta Vatan*, in *Picardia*. *Arvensis præcox*, & *serotina altior*, *passim* in *agris cultis* circa *Blaſas*, alibique etiam in *hortis* *cultis*.

Nomina.

Prima *valeriana cornucopoïdes peregrina*, seu *Siciliana*, nobis. *indica*, *Clus.* *Indica*, *sive Mexicana*, *Park.* *peregrina purpurea*, *albave*, *f. B.* *2da* *valerianella echinata Casp. Baub.* in *Pin.* *valerianella cornucopoïdes echinata*, *Col.* *3ia* *valerianella semine stellato*, *C. B. P.* altera *tennifolia semine scabiosa stellato*, *Col.* *stellato semine*, seu *scabiosa major Lusitanica*, nobis. *4ta* *valerianella Arvensis scabiosa semine nostras*, nobis, ut in *Tabula* *exhibitetur*. *5ta* *valerianella semine umbilicato, rotundo, nudo*, nobis. Altera *nudo, umbilicato*, & *brevi semine*, *Col.* *Casp. Bauhinus modo dubitandi an sit eadem cum majore inodoro campestri querit*, sed sunt omnino *diversæ species*, ut cuilibet facile est videre ex *seminibus diversis exhibitis in Tab. Generali Icon. seminum*. *Vide ibidem 50. 51. 58. & 59.* *6ta* *valerianella semine umbilicato, nudo, oblongo*, nobis. *7ma* *valerianella semine umbilicato, hirsuto, majore*, nobis. *8va* *valerianella semine umbilicato, hirsuto, minore*, nobis. *9na* *valerianella arvensis præcox, humilis, semine compresso*, nobis. *Lactuca agnina*, *Park. Ger. Tab.* *locusta altera foliis serratis*, *f. B. olus album*, *Dod.* *10ma* *valerianella serotina, altior, semine turgidiori*, nobis.

Temperamentum & vires.

Valerianelle ha omnes refrigerant, ac humectant in acetariis. Germinant Autumno, atque hyemis rigorem cum segetibus maxima pars tolerat; ac sub exitum hyemis cum aceto, oleo & sale in Gallia, Italia, & Germania & etiam hic in Anglia, ab infima sortis hominibus cum voluptate comeduntur.

V A L E R I A N A G RÆC A.
Tertium Genus subalternum umbellarum improprie dictarum.

CAPUT III.

Valeriana Græca { *violacea.* ◎.
 { *alba.* ◎

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Valeriana Græca. Sic authoribus neotericis dicta. Nullam habet cum Umbellis similitudinem, nec cum valeriana, nisi quod folia valerianæ sylvestris foliis conjugatim, seu pinnatim dispositis similia & conformia gerat; nam flores confertim multos in caulis fastigio suggerit radix, non in unum folium continuos, campanulæ ritu, verum è quinis petalis compositos. Magis gratia coloris cœrulei, vel albi, quam alicujus usus aut in culina, aut Medicina in hortis coluntur & conservantur, nam foetidum olfaciens afflant odorem. Ex florum medio exeunt (præter tricipitem stilum violaceum productiorem) stamina concoloria apicibus croceis. Floribus fatiscentibus succedunt capsulæ membranaceæ, continentis in se plurima minuta semina subnigra. Radix constat plurimis fibris nigris, nullatenus valerianam redolentibus. Ab omnibus qui de ea scripsere dicitur valeriana Græca, aut pegrina

regrina. Nascitur in Græcia, floret apud nos Julio mense, semenque paulo post perficit; est planta heterogenea & omnino sui generis, ideoque inter heteroclitas collaudanda. Alicubi esset disponenda, nos hic collocavimus; ubicunque doctiores in arte disposuerint per me non stabit. De valerianæ Græcæ capsula seminali & seminibus, consule Tab. Generalem Iconum seminum 62. 63. 63.

P I N P I N E L L A S A N G U I S O R B A.
Quartum Genus subalternum Umbellarum improprie dictarum.

C A P V T I V.

<i>Pimpinella sanguisorba</i>	<i>Spica longiori</i>	<i>foliis laevibus</i>	<i>alba, Canadensis.</i> ○	<i>major</i>	<i>Canadensis.</i> ○
	<i>spica breviori,</i> <i>seu glomerata</i>		<i>rubra, Canadensis.</i> ○		<i>nostræ.</i> ○
				<i>minor</i>	<i>vulgaris pilosa.</i> ○
					<i>non pilosa.</i> ○
				<i>spicata,</i> <i>seu semper virens.</i> ○	
					<i>Asperis,</i> <i>seu agrimonoides.</i> Tab. Col. ○

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Pimpinella spicata, nobis sic dicta; Authoribus ab effectu, sanguisorba. A pimpinella Umbellifera, nobis sic dicta, ab effectu authoribus saxifraga capite, aut spicâ distinguitur. Omnimodam quoad foliorum dispositionem habent inter se hæ duæ pimpinellæ conformitatem; hujus enim & illius lobi, seu pinnæ septenæ aut novenæ, nunc plures nunc pauciores, utrinque ex adverso disponuntur, nervo medio, seu costæ adhærentes, impari semper extremum claudente; secundum magnitudinem partium, laevitatem, vel asperitatem foliorum, longitudinem, vel brevitatem spicarum, in subalternas species easdem partiemur.

Prima dicitur pimpinella sanguisorba, spica longiori; estque duplex, una Canadensis alba, maxima. Caulem habet (vere desinente) procerum, rotundum, geniculis articulatum, ex quo egerminant ramuli plures, per intervalla foliorum pediculis donati, pimpinellæ sanguisorbæ nostræ majori effigie, & colore similes, quin & caulinorum apices in longiore spicam palmarem fastigiantur. Flores singuli quatuor foliolis, crucis modo constant, ex viridi subalbescentes; inferiores primo aperiuntur, & gradatim superiores postremo. Folia dena, duodena, nunc plura, nunc pauciora costæ mediæ adhærent, serrata, oblonga, dilute virentia. Radix est tuberosa; sapor & odor à vulgaris nostratis majoris odore aut sapore parum aut

nihil
differt.

nihil differunt; vide in Tabulâ 11. Iconum. Pimpinella Canadensis spica longiori rubra, ubi ad vivum exhibentur prædictæ pimpinellæ folia cum pediculo, & spica longiori. Est maxima spica longa rubra à nobis in præludiis Botan. descripta pag. 294. & infra hic inter non descriptas. Sequitur Pimpinella spicâ breviori, seu glomeratâ; eaq; est folio lævi, vel aspero; 1^a folio lævi est, vel major Canadensis, pimpinellæ sanguisorbæ nostrati in omnibus accedens præter folia, quæ sunt majora, & magis serrata; vel nostras major, quæ capitulum habet & folia Canadensis æmula, sed minora. 2^{da} folio lævi est minor vulgaris, quæ duplo est majore minor in omnibus suis partibus. Folia pilis ut plurimum obducuntur, quandoque sed raro iisdem destruuntur. 3^{ia} folio lævi est, Pimpinella peregrina spinosa semper virens. Folia gerit pimpinellæ vulgaris, sanguisorbæ dictæ similia, superne virentia, inferne paululum candicantia, spinas molles hinc inde per supremos surculos transversim & oblique sparsas, eoque nomine pimpinella spinosa appellatur. Semina fert in summis alis racematum rotunda, subrufa, viciæ magnitudine. Vide Tabulam Generalem Iconum seminum: 64. 65. 66. Ultima est Pimpinella foliis asperis, seu agrimonoides. Hujus folia agrimonæ foliis & odore & sapore accedunt, sunt enim aspera, villosa, rachi, seu pediculo medio è regione adhærentia, impare extrellum pediculi claudente; ideoque antequam caulescat planta quivis diceret à tota consistentia foliorum agrimonæ, juncto perjucundo odore, esse agrimonæ speciem odoratissimam. Caules habet hirsutos, striatos, pedales & altiores, è quorum cimis emergunt spicæ rotundæ, aut glomeratæ, seminibus striatis (grati odoris) onustæ. Vide Tabulam Generalem Icon. semin. 65. & Tabulam 12. iconum; umbellarum. A nobis pimpinella dicitur à nobilioribus partibus, scilicet floribus & seminibus, quæ sunt striata, oblonga, racematum in spicam congesta, pimpinellæ in modum, & cum adjectione agrimonoides, seu folio agrimonæ odorata, ut facilius à cæteris suæ classis distinguitur.

Locus & tempus.

1^a Pimpinella sanguisorba maxima spica alba, Corn. ex Canada primum delata. 2^{da} pimpinella spica oblongiore rubra, forte illinc, aut ex Lusitanica allata. 3^{ia} illinc pariter cum prædictis duabus. 4^{ta} provenit in pratis humidis. 5^{ta} in collibus aridis passim. 6^{ta} lævis rarius invenitur ibidem. 7^{ma} ex Syria, & Orientalibus Insulis defertur; provenit etiam in Delphinatu & meridionalibus Gallie tractibus. Ultima locus natalitus nos latet. Florent omnes ha species Augusto; semina sub exitum aestatis & versus initium Autumni producunt.

Nomina.

1^{ma} Pimpinella maxima Canadensis alba, Corn. 2^{da} Canadensis spica longiori rubra, nobis. 3^{ia} major Canadensis spica brevi, nobis. 4^{ta} nostras spica brevi, rubra, nobis. Pimpinella sanguisorba maj. C. B. P. Dod. Italica major Clus. in Hist. Thal. sideritis. 2^{da} Dioscoridis major Col. 5^{ta} pimpinella sanguisorba minor Matth. Cam. sideritis Dioscoridis minor Col. 6^{ta} pimpinella sanguisorba lævis; C. B. P. pimpinella sativa lævis, Gesn. Hort. 7^{ma} pimpinella spinosa, Clus. Hisp. Cam. χαλκειον, seu chalceion Luga. Clus. Hist. poterion ad. Lob. Lugd. Ger. Ultima pimpinella agrimonoides, seu agrimonia foliis, nobis sic dicta.

Temperamentum & vires.

Pimpinella refrigerat & siccat; ad sanguinis profluvia supprimenda & sistenda est efficacissima. Ad mulieria menstrua sedanda nullum reperitur præsentius remedium. Pimpinella sanguisorba vulneribus & fistulis medetur. Ad dysenterias, & reliquos ventris fluxus strenuum esse præsidium, si aut ex vino aut aqua bibantur.

UMBELLIFERÆ.

58

tur folia & radices, nemini medicinam administranti non est notum. Ex pulvere foliorum sanguisorba cum melle, vel Saccharo sumat 3 ji. omni mane cum 3 jii. aqua sanguisorba. Vide Joh. Bauh. qui diffuse agit de ejus viribus, pag. 119. & 120. De seminibus pimpinellæ sanguisorba consule Tab. Generalem Icon. seminum 64. 65. 66. Vide Tab. Icon. 11. ubi pingitur pimpinellæ Canadensis folium cum spica ejusdem. Vide Tab. 12. ubi pingitur pimpinella agrimonoides.

Quintum Genus subalternum Umbellarum impropre dictarum.

CAPUT V.

Filipendula. ◎

Barba Capræ { *floribus* { *oblongis. ◎*
 compactis. ◎

Explicatio Tabulo precedentis.

Radices filipendulæ magis in latum, quam in altum sunt sparsæ, glandularum olivarium, ventriosarum instar, rotunda capitula, ac nodulos extuberantes instar asphodeli aut pœoniæ fœminæ gerentes, quibus tamen minores hinc inde sparguntur fibris juncti, iisque filamentis fit penitus connexio inter eosdem, unde filipendulæ nomen. Folia ex segmentis pluribus longiusculis, ambitu serratis composita, veluti potentillæ, seu argentinæ, duriora tamen & saturatius virentia, & atro, quasi virore splendentia, angustiora, profundius laciniata, nullis pediculis alternatim costæ mediæ adnascuntur. Caules sunt cubitales & bicubitales, solidi, teretes, subrubentes, flores sustinentes in paniculæ modum sparsos, albos, seu potius ochroleucos, suaveolentes; semen sequitur asperum, compressum, rhombi irregularis figurâ. Vide Tab. General. Icon. sem. 67.

Locus & tenpus.

Filipendula in pratis & sylvis humectis passim provenit. Floret aestate, & incunte Autumno semina sua perficit.

Nomina.

Filipendula vulgaris, Eyst. filipendula, Trag. Dod. Matth. F. B. Tab. cui & saxifraga rubra.

Temperamentum & vires.

Filipendula est calida & sicca in 3^{io} gradu; stranguria auxiliatur; calculosam expellit materiam. Contra tormina & intestinorum flatus convenit, addito fæniculi semine. Sylvaticus pulverem adversus morbum comitiale commendat, atque cibis frequenter mixtum valde utilem & efficacem refert. Suspiriosis & ardentibus, & omnibus

omnibus morbis à causa frigida concitatis medetur. Pulvis radicis cum vino haustus dolores stomachi saturat & iliacam ex causa frigida, & ex flatu etiam adjuvat. Easdem & efficaciores huic filipendulae vires, quam oenanthæ umbelliferæ (quæ filipendula etiam dicitur) attribuit Cæsalpinus, propter amaritudinem.

BArba capræ folia sunt castaneæ æmula, oblonga, acuminata, serrata, plura ad costam è regione alligata, nullis intercedentibus minoribus foliolis, ut in ulmaria, à qua in hoc, & foliis floribusque satis evidenter differt. Caules habet duos aut tres cubitos altos, multis alis confertim in summo donatos; radicem fortita est mediocriter crassam, fibrosam, cortice intactam crassiusculâ, ad rufedinem declinante. Flosculos plurimos, seu muscarios subluteos gerit: estque duplex, major montana, quæ quatuor pedes excedit altitudine, & in cimis floribus, seu muscariis oblongis minus odoratis ornatur; vel est minor pratensis floribus compactis subluteis quam suavissimum eructantibus odorem, ob quem ei nomen regina prati inditum. Folia lato virore nitentia, quina, aut septena ad costam connexa sunt, intercedentibus complusculis minoribus: singularia folia sunt serrata, interdum vero crispo contextu plicata ad ulmi folia accidunt; sapore citra morsum strenue fificant. Flores suaveolentes spicatum positi & formâ filipendulae vulgaris, albidi, quinque foliolis constant albis, aut potius in luteum vergentibus. Succedunt utrique barbæ capræ semina oblonga, contorta in capsulis mucronatis circulariter dispositis, & caulis fastigio veluti basi innitentibus.

Locus & tempus.

Prima in Sylvis montanis Hungariae, Austriae, Stiriae, nec non in montibus Arvernie, aliisque Gallia transalpibus altis. 2da in pratis humidis passim provenit. Florent sementque perficiunt sub aestatis fine.

Nomina.

Prima barba capræ floribus oblongis, C. B. P. Barba capræ Fuch. Ger. J. B. Barba capræ Lugd. Cam. ulmaria major, seu altera Park. 2da Bárba capræ floribus compactis, C. B. P. ulmaria, ad & Icon. Lob. J. B. Regina prati, Dod. Ger. ulmaria vulgaris, Park.

Temperamentum & vires.

Barba capræ calidi & siccii est temperamenti, Hæmorrhagiam & immodicos fluxus sanguinis, fluoresque albos fistit. Has plantas judicat Johannes Bauhinus esse potius frigidas contra opinionem Tragi. Vide Joh. Bauh. pag. 489. De semine filipendulae consule Tabulam Generalem Iconum seminum 67.

THALICTRUM.

Sextum Genus umbellarum impropte dictarum.

CAPVT VI.

<i>Thalictrum</i>	<i>siliqua striata</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"><i>majus</i></td><td><i>floribus</i>, seu</td><td><i>purpureis.</i> ◎</td></tr> <tr> <td><i>muscariis</i></td><td><i>luteis</i> { <i>foliis</i> { <i>levibus.</i> ◎</td></tr> </table> <table border="0"> <tr> <td rowspan="2"><i>minus</i></td><td><i>Dod.</i> ◎</td></tr> <tr> <td><i>fætidissimum</i>, <i>B. Prod.</i> ◎</td></tr> </table> <i>siliqua triquetra, Canadense, Corn.</i> ◎	<i>majus</i>	<i>floribus</i> , seu	<i>purpureis.</i> ◎	<i>muscariis</i>	<i>luteis</i> { <i>foliis</i> { <i>levibus.</i> ◎	<i>minus</i>	<i>Dod.</i> ◎	<i>fætidissimum</i> , <i>B. Prod.</i> ◎
<i>majus</i>	<i>floribus</i> , seu	<i>purpureis.</i> ◎								
	<i>muscariis</i>	<i>luteis</i> { <i>foliis</i> { <i>levibus.</i> ◎								
<i>minus</i>	<i>Dod.</i> ◎									
	<i>fætidissimum</i> , <i>B. Prod.</i> ◎									

Explicatio Tabulæ præcedentis.

Thalictrum propter folia plurifariam disposita, atque uni nervo medio, multarum Umbellarum more adnexa, huc retulimus; estque duplex; vel semen thecâ, seu filiquâ striatâ, vel triangulari. Prioris semen est cylindriacæ figuræ planæ utrinque in acumen definens, majus floribus vel muscariis purpureis, seu ex meris staminulis purpureis, vel floribus, seu muscariis luteis; Hocque duplex, estq; 1º unum foliis latioribus lævibus, subnigris in exortu, in pratis humidis emergens; alterum foliis asperis, seu rugosis, trifidis, longioribus, cujus caules cæteris sunt altiores, striati, seu angulosi. Hujus cernitur minor species foliis multo angustioribus, pariter asperis, rugosis & trifidis, multoque in tenuiores mucrones definitibus. Hanc speciem observavi anno 1644. inter multas alias stirpes, apud medicum Doctissimum Franciscum Bloundel Scholarum Medicinalium Parisiensium Professorem dignissimum & Botanices peritissimum, præceptorem meum consultissimum. Vel est minus respectu priorum, cujus folia sunt etiam plurifariam divisa, latiora tantum habita ratione sequentis. Vel est minimum omnium foetidissimum, cujus foliorum lobi sunt trifariam divisi, per terram strati, multo angustiores præcedentis, à pediculis pendentes. Ultimum est filiquâ vel foliculo feminis triquetro, lapathi, acetosæve quodammodo instar. Caulibus violaceis præditum est, seu atro-purpureis, geniculatis per intervalla, in quibus hinc inde plures nascuntur caulinuli. Folia hoc thalictrum habet aquilegiæ tum ordine tum figurâ similia, colore tamen glauco diversa. Flores seu muscarii in caulum cacumine, globulis multis dilute purpurascientibus conflantur, qui dum dehiscunt mille alba filamenta ostendunt, quibus singulis luteus apex præficitur. Filamentis illis deficientibus totidem succedunt capsulæ, seu filiquæ formæ triangularis, extante quâdam per singulos angulos striâ membranaceâ, atque semina inibi contenta sunt plana, lævia,

UMBELLIFERÆ.

cylindriaca ut sunt semina singularia omnium prædictorum Thalictrorum siliquâ striatâ obducta. Vide Tab. Generalem Iconum seminum à nobis exhibitam. 68. 69. 70. & 71. Nota insuper multorum prædictorum Thalictrorum radices repentes esse luteas.

61

Locus & tempus.

Thalictrum primum in montibus Sabaudie, & in monte Saleve nascitur. 2^{dum} in pratis humidis passim Gallie, Germanie & Anglia. 3^{ium} in Hispania, Pannonia, & Austria. 4^{tum} in collibus circa Blœsas satis frequens. 5^{um} in sylva Madritana Regia dicta le Bois de Boulogne, & in sylva Fontaine-Belleau passim est obvium. 6^{um} ex Canada. Florent & semina perficiunt exente aestate.

Nomina.

Primum Thalictrum majus florum floccis, seu muscariis purpurascens, C. B. P. Thalictrum, 4. Dod. majus seminibus angulosis caule laevi, f. B. 2^{dum} Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata, C. B. P. majus vulgare Park. Thalictrum nigrius caule & semine striato, f. B. ruta pratensis herbariorum ob. Lob. 3^{ium} Thalictrum majus flavum staminibus luteis vel glauco folio, C. B. P. Thalictrum speciosissimum glaucum semine & caule striato, f. B. foliis asperis & trifidis, nobis. 4^{tum} Thalictrum minus, C. B. P. Dod. Ger. Ruta pratensis tenuifolia ad. Lob. Thalictrum minus Dod. 5^{um} Thalictrum minimum fastidissimum, C. B. P. & prod. Nota omnium Thalictrorum folia habere lobos trifidos, sive sint glabri, sive asperi, aut rugosi, atq; more umbellarum lobatarum pediculis suis insistunt iidem, & propter hanc rationem huc ad calcem umbellarum revocavimus, floribus autem & seminibus ab umbellis multum recedunt. Ultimum Thalictrum Canadense, Corn. Thalictrum Canadense siliqua seminis triquetra & caulis subrubentibus, aquilegiae foliis, nobis, eoque nomine facile a ceteris suis consortibus distinguitur.

Temperamentum & vires.

Thalictrum est moderate calidum & siccum; folia oleribus admixta alvum solvunt. Radicis ejusdem decotum id potentius præstat teste Dioscoride. Thalictri folia trita, ulcera vetera ad cicatricem perducunt. De pericarpis & seminibus Thalictrorum, consule Tab. Generalem Icon. seminum. 68. 69. 70. 71. capsulam, seu siliquam striatam & siliquam triangularem 68. 71. ibidem indigitant. Consule prædictæ Tabula explicationem. vide etiam Tab. 12. iconum ubi sculptur Thalictrum majus foliis rugosis, trifidis. Hujus minor species impresentiarum viget in horto Edwardi Morgan pone Cænobium Westmonasteriense, sicut plurime aliae rariores plantæ, quæ ex semine à me communicato, ab ipso educata, & nutrita, atque summa cum vigilantia, cura & industria conservata sunt.

Q

UMBELLÆ

UMBELLÆ

S E U

PLANTÆ
UMBELLIFERÆNON DUM DESCRIPTÆ,
aut perperam locatæ.

UMBELLÆ in hac sectione contentæ, aut à nobis primo scriptæ, aut alioquin ab authoribus perperam nominatae & collocatae, ob rationes passim in hâc nostra doctrina allatas, mutata habebunt nomina, à nobis imposita, reducendo singulas ad proprias & genuinas suas classes, quarum tesseram aut symbolum gerunt.

A Achrys semine fungoso lœvi, foliis ferulaceis. Hæc à foliis brevioribus & crassioribus instar fœniculi, sed pallidius virentibus & caule cubitum, aliquando sesquicubitum æquante, primo intuitu à fœniculo; sed à duabus sequentibus suæ classis speciebus præcipue differt, primò foliorum tenuitate, secundò semine lœvi fungosæ substantiæ, seu pericarpio fungoso inclusi, nucem parvam myristicam (quemadmodum ab initio hujus tractatuli diximus) imitante, ab omnibus aliis umbellis, semine fungosæ substantiæ inclusi differunt. Omnes hæc quatuor prædictæ species hoc etiam habent commune quod sint omnes gustu aromatico, resinaceo, & acri.

A Achrys semine fungoso, sulcato, aspero, foliis peucedani latiusculis. A seminis asperitate, & foliis peucedani ritu divisis, à priori ferulaceis foliis præditâ facile dignoscitur, à tertiatâ, seu sequenti (cum quâ in foliis quasi convenit) seminum inæqualitate, seu asperitate disconvenit & omnino recedit hæc secunda.

A Achrys semine fungoso, sulcato, plano, majore, foliis peucedani angustis. Hæc à priori foliis, & semine sulcato plano differt. Cum 2^{da} semina sint sulcata aspera, utraque foliis peucedani donatur, una latiusculis, altera angustis.

A Achrys semine fungoso, sulcato, plano, minore, foliis peucedani. Hæc nulla ratione à præcedenti distinguitur nisi seminis parvitate, in cæteris omnibus convenit, & si adultior planta eandem seminis magnitudinem acquirat, haud dubie specie non distinguetur.

Foenicum dulce, Azoricum, à vulgari nostro fœniculo differt, primo quod fit dulce ut Italicum cum quo convenit dulcedine, sed gratiore, at ab eodem & vulgari differt Azoricum, quod caules habeat crassiores & breviores multo magis

magis fungosos, atque in caulis summitate producat petiolos, aut radiolos sustinentes semina majora, gratissima, atque multum semina vulgaris vulgo dicti Italici dulcedinis gradu superantia; Azorici inquam semina vulgaris duplò sunt crassiora, etiam si ejusdem quasi longitudinis, fragrantiorisque cum odoris tum saporis masticata in ore appareant; ut percipere possunt gustantes eadem in horto Botanico Oxoniensi maturescere incipientia. Semen hujus optimi fœniculi à Generoso & Botanices Studiofissimo viro Patricio Murray ex Gallia ad nos transmissum, atque illuc ex Insulis meridionalibus maris Mediterranei ad Dominum Nicolaum Marchant (Collegam nostrum amantissimum quondam Blæsis commorantem) nunc Parisiis degentem, & ibidem Christianissimæ majestati Gallicanæ Professorem Botanicum dignissimum pariter missum; plura indies speramus illinc semina.

Pimpinella saxifraga major degener. Hæc pimpinella saxifraga ex seminis majoris vulgaris satione degenerans est, cui in omnibus partibus essentialibus accedit, videlicet flore, semine, odore, sapore; nisi quod folia solummodo habeat magis dissecta, seu laciniata: nihilominus non inepte collocatur cum sua genitrice planta, foliis lobatis donata, non obstante foliorum compositione à natura sic ludente. Hoc contingit in plurimis aliis umbellis, foliis sc. variare ex satione (ut supra dictum in doctrina umbellarum) quas separare à congeneribus propter dissimilem foliorum dispositionem, æquum fore non duximus, sed propter partium essentialium, odoris insuper & saporis conformitatem, easdem congeneribus associavimus.

Sium aquaticum ad alas floridum. Hujus sii varietas à reliquis facile percipitur, primo quod quasi rependo & aquis innatando vigeat (aliis rectâ ascendentibus;) 2^{do} quod non in summis caulinum cimis (aliorum more) sed ad alas, umbellas curtis petiolis seu radiolis infistentes gerat, adinstar apii. Partibus autem essentialibus, nec non odore & sapore, congeneribus est par.

Sium aquaticum foliis rugosis, trifidis, dentatis. Hujus folia sunt oblonga, serrata, pronâ & supinâ parte rugosa; ternatim ut plurimum divisa, & à pediculis saepius terna nonnunquam plura pendentia, à caulis bipedalibus, aut tripedralibus. Proveniunt in summis caulinum ramis flores, & semina priorum floribus & seminibus in omnibus similia. Non bene indigitatur à Lobelio sium olusatri facie, nec ab aliis erucæ folio, ideo nomen mutavimus, & convenientius eidem adaptavimus; examinent judiciosi Botanici hanc nostram appellationem, & ipsam melius huic plantæ quadrare percipient, ad eandem rite & specifice ab aliis suæ fortis distinguendam, quam prædictæ appellationes.

Sium pumilum foliis fœniculaceis. Sola dispositione & incisura foliorum à cæteris suæ familias, foliis lobatis distinguitur, juncta exiguitate partium. Vide explicationem supra in tractatu hoc, & prælud. nostr. Botan. Pag. 309.

Oenanthe millefolii palustris folio. Perperam hæc umbella authoribus daucus pratensis &, daucus millefolii palustris foliis dicitur. Bauhini fratres, & Par-

kinsonus

kinsonus Dalechampium sequentes ex Historia ipsius Lugdunensi, sic nominarunt. Vide supra in hoc nostro tractatu caput de cœnanthe.

A *Pium sativum* degener, seu foliis longis, dissectis. Hoc ex semine apii sativi, seu hortensis, majoris, habemus in hortis degenerans, cuius folia sunt oblonga, & profunde sinuata, aut scissa in multa longa segmenta mucronata, ludente sic natura in hoc, sicut in aliis multis, non solum umbellarum, sed & aliarum classium, seu tribuum speciebus: ut supra notavimus in pimpinella saxifraga majore, & minore crispa, degenerantibus, & in apio hortensi tenuifolio, Sio (forte) foliis fœniculaceis, cæterisque similibus. Consule Tabulam 7^{am} icon. ubi legitur apium degener foliis longis dissectis, & Tabulam 5^{am}, ubi ostenduntur pimpinella saxifraga major degener; & minor crispa.

A *Pium hortense* seu sativum majus, latifolium, umbellâ luteâ, quoad partes essentiales, parum aut nihil differt ab hortensi vulgari, nisi umbellarum colore luteo herbaceo, atque hac nota à cæteris, albis donatis floribus, parvo aut nullo negotio distinguitur.

A *Mmi* quorundam Dalpⁱⁱ Hist. Ingd. aut Crithmum 4. Matth. quam inepte ab authoribus eryngiis adscribatur, & eo nomine inter eryngia à Casp. Bauhino collocetur, judiciois Botanicis discutiendum relinquimus; cum ammeos habeat omnimodam conformatiōnē, nos ad ammi retulimus. Vide prælud. nostra Botanica, pag. 421. & explicationem Tab. de ammi supra in hoc tractatu.

L *Aserpitium majus* lobis latioribus, nobis. Seseli Æthiopicum herba, Dod. cum hujus semina viridia sint (more aliorum laserpitiorum) ex alis foliaceis sex conflata, magis apposite huc ad suas congeneres umbellas reducitur, quam ad seseli, aut libanotidem cum aliis authoribus. Vide caput 3^{um} de laserpitio supra.

L *Aserpitium majus*, seu latifolium (id est lobis latioribus) semine crispo & rugoso, nobis. Libanotidi similis costus amara semine crispo, J. B. Et hanc & priorem libanotidis speciem inter laserpitia collocavi, non quod sint umbellæ indescriptæ, sed quod male nominatæ & dispositæ ab authoribus inter libanotides sint: cum enim sunt vera & genuina laserpitia à seminibus, odore simul & sapore, inter laserpitia secundum regulam à natura præscriptam sunt disponendæ, consule prælud. nostr. Botan. pag. 370. & 443.

L *Aserpitium lobis angustioribus* dilute virentibus plurifariam divisis, à laserpitio Gallico seu Massiliotico Lob. distinguitur solo foliorum colore dilutius virenti.

L *Aserpitium lobis angustioribus*, longioribus, & dilute virentibus conjugatim positis. A cæteris, angustioribus foliis præditis, primò sola positione foliorum discriminatur. Secundo semina producit aliis foliaceis undulatis, aut rugosis, sed non verrucosis ut costus amara J. B. vide Tab. Generalem icon. sem. 8. 9. 10. de seminibus laserpitii.

Pastinaca

PAstinaca tenuifolia sylvestris lucida. Hæc folio est crassiore, lucido, glabro, & atrius virente sylvestris vulgaris, quæ pilis scatet & in foliis & caulis. Semina etiam habet majora, crassiora, magisque hispida, seu villosa, quibus notis facile à carota sativa seu sylvestri vulgari distinguitur.

PAstinaca tenuifolia, seu carota radice & umbellâ luteâ. Hæc à cæteris carotæ speciebus solo umbellæ colore dilute luteo, seu ὄχρολεύκῳ primo intuitu florens discernitur: antequam floreat neutiquam ab oculatissimo Botanico à carotâ vulgari distingui potest.

PAstinaca Cretica radiis gingidii longioribus. Hæc carotæ species radios producit quinas uncias longos, crassiores multo & rigidiores quam sunt gingidii aut visnagæ radii, concavam pariter ut visnaga & carota vulgaris constituit superficiem, nidi avis instar, præcipue dum umbella seminibus oneratur. Semina villosa, hispida carotæ ritu fert, eaque multo majora, & crassiora, unde ab umbellæ & seminis formâ ad daicum seu carotam reduximus; quin & à longitudine & crassitie radiorum, semina ferentium in cimis caulum, specifica oritur differentia, quâ à reliquis omnibus dauci speciebus quam facillime distinguitur.

CAUCALIS major Daucoides Tingitana. Hæc umbella sub exitum è terra, & adhuc dum folia per terram strata gerit, dauci vulgaris, seu carotæ adeo similia habet, ut quis Botanicus peritus eandem daucum esse concluderet, antequam caulescat & semina producat; caules enim producit sesquipedales & bipedales, si fertili terræ committatur, in quorum summis nascuntur flores albi (qui antequam expandantur purpurascunt) ex quinis petalis, bifidis conflati: singulis deciduis floribus succedit bina semina oblonga, paululum compressa, longissimis & tenuissimis aculeis donata; quin & singula semina binis carinis in dorso, & binis infra ad basin (quâ adhærent) afficiuntur, ita ut duobus seminibus fibi invicem adhuc arte conjunctis octo carinæ aculeis longioribus donatae appareant: propter ampliorem distantiam in parte quâ junguntur, non coeunt in unam Carinæ duæ ad basin hinc inde sitæ, ut cernere licet in laserpitiorum seminibus. Insuper umbella hæc concavam constituit superficem, sicut carota vulgaris; atque hæc omnium caecalidum semina habet maxima, longioribus aculeis, & altioribus cartilagineis membranis donata. Cum triennio aut quadriennio ab hinc ejus semen ex Mauritania Tingitana acceptum terræ commisit Edvardus Morgan, ineunte vere produxit caulem pedalem, & semina duplo minora seminibus quæ hic in Tab. Generali icon. seminum 17. 17. exhibentur: anno vero elapso pullulavit Autumno (quandoquidem per clementiam hyemis nondum perierat) & hoc anno, quo hæc prelo committo, provenit duplò grandior, & semina duplò crassiora produxit; adeo ut congeneres suas omnes caecalidum species longitudine aculeorum & latitudine seminum supereret.

PEucedanum humilius foliis conjugatim positis. Folia producit longiora hæc peucedani species, è regione rachi, seu nervo medio adnascentia, & quina

R. Senave

senave, nunc plura nunc pauciora, è regione gerit, impari longiori etiam extremum claudente. Ex summa radicis parte exit coma seu barba densis capillamentis compacta, cæterorum peucedanorum reliquarumque thruriferarum umbellarum sub diversis generibus contentarum more: ex quorum capillamentorum meditullio sese erigit caulis bipedalis, sustinens flosculos luteos, reflexos in umbellis. Semina fert membranacea, compressa, oblonga, peucedani vulgaris instar (consule Tab. Generalem Icon. seminum 24. 24.) à quo præcipue differt dispositione foliorum per pinnas seu lobos longos conjugatim dispositorum, non autem ut in vulgaribus, Italico scilicet & Germanico tripartitorum, quod satisclare supra innuimus. Semen itidem producit minus.

Tordylium majus vulgare, seminis limbo quasi lævi, nobis. Caucalis major Clus. Hist. Hæc omnium hujus generis maxima est species, si altitudinem spectes. Multos à radice producit stolones rectos, bicubitalis & tricubitalis, interdum 4. cubitorum altitudinem attingentes, striatos, intus cavos, geniculis interceptos, & in plures superius ramos divisos, sub quibus lata sede adnascuntur conjugatim, seu binatim è regione magna, alataque folia, in ambitu incisa, seu serrata, instar pastinacæ latifoliæ (cuius & hæc, & duæ alteræ Tordylii varietates, pastinacæ sylvestres apparent etiam esse species) nonnihil etiam hirsuta. Summis ramis innascuntur umbellæ candicantium florum, subtus parum purpurascens, & utilloquuntur, ad carneum colorem accendentium; quibus singulis succedunt bina semina lata, fere ut sphondylii vulgaris, spissiora in margine, & crassiora, in convexa & exteriori parte subhirsuta, quod etiam conspicitur in reliquarum Tordylii specierum seminibus à nobis exhibitis, estque hujus semen limbo paululum protuberante, quasique lævi, granulisque minus conspicuo, quam in Tordylio Syriaco & Apulo nobis, in Tabula 7^{ma} descriptis. Consule Tab. Icon. seminum 27. 27. 28. 28. 29. 29. ubi trium horum Tordyliorum semina optime sculpta conspicuntur, in summo mucrone bifida, seu aculeata. Radicem hæc habet albam, duram, multis fibris lignosis præditam. Ex hac descriptione penitus quasi ex Clusio allata, omnino appet Tordylii species perfecta & genuina, ergo male à Casparo Bauhino aliisque authoribus, ex Carolo Clusio transribentibus & denominantibus, nuncupatur adhuc in hodiernum usque diem caucalis major. Cum ex libro naturæ manifestum sit caucalidum omnium semina esse aculeata, seu echinata, hujus autem semen membranaceum, compressum, rotundum, seu orbiculatum, justiore titulo inter congeneres pro Tordylii specie nobiscum habebitur, & cum Jacobo Plateau, qui ejus semen ad Carolum Clusium misit, atque Tordylii nomine insignivit.

Myrrhis perennis alba minor, foliis hirsutis, semine aureo. Hæc myrrhis montanæ species inter cæteras congeneres suas perennes facile distinguitur, quod folia læviter hirsuta, & semen rostratum, striatum, brevius, aurei coloris producat. Dantur duæ aliæ hujus varietates, quæ hac nota à præcedenti distinguuntur, quod folia unius sunt multo prioris hirsutiora, seminaque striata multo sunt seminibus aureis prioris longiora. Ultima folia habet hirsutissima, & semina longa, etiamque subfuscata.

Myrrhis

Myrrhis perennis, lutea Daucoïdes. Inter cæteras omnium myrrhidum species perennes facile cognoscitur, quod folia producat dauci vulgaris, aut carotæ omnino æmula, atque umbellam ferat luteam, cum omnium reliquarum umbellæ floribus constent albis: adde quod hujus semina striata sunt reliquarum (majore odorata, & annua nodosa aspero semine exceptis) myrrhidum seminibus longiora, minus tamen tumida seminibus aureis montanæ prioris descriptæ.

Myrrhis annua, nodosa, semine rostrato, aspero, oblongo. Hujus caules ad geniculos crassescunt, nodosve gerunt turbinatos, seu pyriformes omnium myrrhidum maximos. Flores fert albos in summis caulum bipedalium, quibus singulatim evanidis succedunt bina semina striata, aspera, seu rugosa, ruffa, seu potius sublutea in parte gibba, seu convexa, suntque multo cæterarum myrrhidum seminibus (præter majoris odoratæ semen) majora & crassiora. Vide Tab. Generalem Icon. seminum 38. 38.

Myrrhis annua semine striato lævi. Hæc est caule hirsuto, bicubitali, ad fini gula genicula etiam nodolo, turbinato, seu in medio crasso, intus vacuo. Folia ei sunt apii modo dissecta, hirsuta, maculis subrubentibus aut fuscis (caulis etiam subcæruleus) conspersa. Semina in summis ramusculorum cimis sunt rostrata, læviter striis obducta, ac si lineis tribus singula semina atramento tingerentur; ac proinde cum carinæ & sulci vixdum apparent, lævi dicitur semine nobis, ut & sequens.

Myrrhis tuberosa, nodosa, coniophyllum, nobis. Hæc à cæteris omnibus hisce notis sequentibus dignoscitur, primo tuberositate radicis (quæ ipsi & Smyrnio Cretico inter umbellas annuas, inter perennes Bulbocastano solummodo convenit) 2^{do} nodositate caulis ad genicula, quæ ipsi cum prædictis duabus myrrhidum speciebus communis est; sed hujus omnino folia sunt cicutæ foliorum æmula, & quod notatu dignum, ipsam cum prædictis notis à cæteris distinguit. Bina aut terna internodia versus terram pilis hirsutis & incanis scatentia habet, cætera sursum versus fert lævia, & subfuscis maculis distincta aut notata, cicutæ vulgaris ritu. Quam inepte ab authoribus cicutaria dicuntur discutiendum relinquo Botanicis Doctis in arte, quos remitto ad hallucinationes Casp. Bauh. aliorumque authorum de hac umbella, cap. infra de cicutaria, à nobis observatas.

Myrrhis annua semine striato, villoso, incano. Uno aut altero verbo hæc est myrrhis à semine, odore, & sapore; ergo male daucus creticus authoribus dicitur. Vide plura infra inter hallucinationes Casp. Bauhini aliorumque authorum cap. de dauco & Meo à nobis allatas.

Cerefolium

Cerefolium sylvestre perenne semenibus lœvibus nigris, Nobis. Hoc primò du ratione à Cerefolio sativo differt, secundò quod sponte proveniat in pratis & fossis, in omnibus provinciis quas unquam adii, notatim circa Biturigum, Pictonum, Blæsenfum, Aurelianensium caput, omniumque horum caput Lutetiam Pariforum, item in Anglia sponte passim in suburbiorum & pagorum (adjacentium Londino, Oxonio, aliisque oppidis) fossis & pratis. Est autem sativo seu hortensi multo majus hoc cerefolium, foliaque multo longiora, duriora, caulesque maiores, solidiores, magisque striatos, atque intus medulla duriori plenos, bicubitales, & altiores producit, ad quorum singula genicula proveniunt etiam tubercula nodosa. Semina sunt lœvia, nigra, duplò fere cerefolii sativi seminibus crassiora. Durat (uti dictum) in multos annos, atque his notis à cerefolio vulgari seu sativo hortensi facile dignoscitur; at in hoc convenient, quod utriusque semen sit lœve, nigrum, aut subnigrum, sine striis, seu carinis vel sulcis, quod soli huic ac Tordylio inter umbellas convenit. Non potest dici myrrhis (ut volunt authores omnes) cum non habeat semen striis praeditum, sed potius cerefolium, cum ejus semen sit cerefolii modo lœve & nigrum; atque his notis distinguuntur inter se myrrhis & cerefolium. Vide prælud. nostr. Botanicorum, pag. 288. & infrà hallucinationes Casp. Bauhini aliorumque authorum de cerefolio & myrrhide. Consule etiam Tab. Icon. seminum 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 39^a. 39^b quibus denotantur semina myrrhidum, & 40. 40. 41. 41. quibus indigitantur cerefolii sativi & sylvestris perennis semina.

VAleriana major sylvestris foliis latioribus. Hæc est tantum varietas valerianæ majoris sylvestris, cuius folia sunt tantum latiora, minus hirsuta, dilutius virentia, costæ mediae lobatim ut in vulgari adhærentia. An species distincta, an varietas hæc tantum habeatur, parvo discrimine refert, in sylvis & in hortis diversa facie cognoscibiles tamen nobis apparuere.

VAlerianella semine umbilicato, nudo, oblongo. Hujus semen est oblongum nudum, cavum in prona parte, gibbum seu convexum in supina, sicut cernere licet in valerianella semine umbilicato rotundo. Quatenus in longitudinem porrectum & cavum est hujus semen, non difficulter distinguuntur à consorte sua valerianella semine umbilicato, nudo, rotundo, quod insuper colore conspicitur ruffo, at illius albido, ut alibi dictum est, donatur: vide Tab. Gen. Icon. 50. 51. 52. 53.

VAlerianella semine umbilicato hirsuto. Est duplex, hirsutum majus cavum in medio & extremo superficie pronæ, vel hirsutum minus cavum in medio superficie pronæ tantum. Hisce notis præcipue distinguuntur, cum à foliis (quæ colore aut textura parum differunt) vix cognosci possint. De harum seminibus, consule Tab. Generalem icon. seminum 54. 55. 56. 57. ejusdemque explicationem, quæ omnium prædictarum & sequentium valerianellarum (præter lactucam agninam, seu olus album Dod.) singularia & unica indigitat semina.

VAlerianella Arvenis serotina altior, semine turgidiori. Hæc est caule bipedali, aut sesquipedali, qui in summo candentes fert flores umbellatim dispositos omnium tardissime provenientes; floret enim maturo frumento sub exi tum

tum Julii, aut circa initium augosti aliquando citius, aliquando tardius, semine singulari, crassiori, & turgidiori prægnans reperitur. Præcox autem humilior, semine compresso & parùm convexo binatim juncto afficitur, quod in nullis aliis valerianellarum speciebus observare nobis licuit. Flosculos producit parvos, pentapetalos, seu quinis segmentis in margine divisos, subcæruleos, aliquando albos, & quasi obtutum fugientes; exeunte hyeme maturius floret cæteris, & brevi post semen binatim junctum, aliarum umbellarum proprie dictarum more perficit; quod etiam supra à nobis in doctrina valerianellarum observatum & notatum, ut diligentius observarent Botanici discrimen inter hanc præcocem arvensem, seu oleracea (lactuca agrina, olus album, aut locusta, dictam,) & serotinam nostram, semine singulari turgidiori præditam. Hanc præcocem, etiam si ab omnibus quasi authoribus neotericis describitur, de novo descripsimus, atque ejusdem semen delineandum conjunctim & separatim curavimus, quia ejus differentia neutiquam ab aliis authoribus ante me scribentibus bene observatur. Jam è longinquò suboleo aliquem plantarum nomenclaturæ compilatorem, ex Theatris, pandectis, & Historiis Generalibus transribentem mihi objecturum, hanc præcocem valerianellam (cum sit umbella proprie dicta) male collocatam, nec secundùm methodum à natura datam esse dispositam. Ipsum docuisse quid sit pro hac vice sufficiet, rationes in medium proferre alias non nos pigebit, unum hoc addo impræsentiarum, quod quoad foliorum dispositionem, odorem, & saporem cum prædictis convenit, ab ipsis quoad duplex semen recedit. Hoc contingit multis aliis speciebus in pauculis differre quæ in multis aliis maxime convenient; cum nullo subalterno genere umbellarum proprie dictarum melius & aptius hanc collocari posse assero. Si transcriptores illi quicunque fuerint, meliorem rationem addiderint, aliquid ipsos ex proprio cerebro deprompsisse dicam.

VAlerianella scabiosæ semine, seu stellato, major Lusitanica. A valerianella scabiosæ semine minore, à Doctissimo Fabio Columna descripta, & picta, sola magnitudine seminum præcipue differt: suntque majoris Lusitanicæ semina stellata duplo seminibus ipsius valerianellæ à Fabio Columna descriptæ majora. Semina omnium harum valerianellarum delineanda, & sculpenda curavimus, quandoquidem omnium harum differentia præcipua consistat in seminibus, diversimode à natura factis: folia quasi omnium ad eundem modum constructa sunt; etiam si poterit aliqua ex foliis itidem decerpi distinctio, semina certissima dant indicia.

PImpinella sanguisorba major, Canadensis, spicâ longiori rubrâ. Hæc à sanguisorba majore vulgari, seu sorbestrella in hoc differt, quod spicam gerat duplo aut triplo longiore, ternis aut quaternis aliquando unciis constanter. Folia habet etiam majora, & ampliora, cæterà par est.

PImpinella major agrimonoides. Est foliis asperis, & hirsutis, agrimonæ instar. Primo intuitu, seu facie primâ, agrimonæ speciem præ se fert, quandoquidem cum foliis tûm odore agrimonæ omnino accedat. Folia inquam habet rugosa, seu aspera & hirsuta, costæ seu nervo medio è regione adhærentia (aliarum pimpinellarum more) quæ contrectata gratissimum eructant odorem, agrimonæ Italicae odoratæ quam proxime accidentem. Caules sunt pedales & in solo fertili sesquipedales,

UMBELLIFERÆ.

70

non rectâ ascendentes, sed procumbentes: in quorum cimis proveniunt spicæ breves, seminibus striatis & quasi undulatis (gratissimi etiam odoris) onustæ. Vide Tab. Generalem Icon. semen 65. & Tab. Icon. umbellarum. 12.

T *Halictrum majus* siliqua seminis striata, foliis rugosis, trifidis. Hoc Thalictrum facile inter cætera distinguitur, quod foliis donetur asperis, rugosis, trifidis, mucronibus acutioribus, quam qui in foliis cæterorum conspiciuntur. Caules sunt striati admodum, seu angulosi. Siliquæ quibus semina cylindriaca, lævia, seu plana, subfuscæ, seu rubra in medio crassa, & tumida, versus extrema gracilescens includuntur, sunt striis majoribus etiam donatæ. Vide de filiis striatis & triquetris, & seminibus inde exemptis Tab. Generalem iconum semen 68. 69. 70. 71.

OBSERVATIONES
GENERALIORES
EX UMBELLARUM
SECTIONE COLLECTÆ.

UMBELLÆ LUTEOS
gerentes flores.

<i>Libanotis cachryophoros</i> floribus luteis J. B.	<i>Pyrethrum</i> fol. longioribus umbella lutea, C. B. P.
<i>Fæniculum</i> , ejusque species.	
<i>Levisticum</i> .	<i>Thapsia</i> .
<i>Siler montanum</i> .	<i>Panax asclepium Apulum</i> , Col.
<i>Seseli Æthiopicum</i> , frutex.	<i>Ferula galbanifera</i> , ejusque species.
<i>Seseli pratense</i> , herba.	<i>Panax Asclepium</i> .
<i>Cicutaria maxima</i> fætidissima.	<i>Panaces Asclepium alterum Dalpii</i> , J. B.
<i>Angelica sativa</i> .	<i>Anethum</i> .
<i>Archangelica</i> , J. B.	<i>Peucedanum</i> , ejusque species.
<i>Apium peregrinum</i> luteum & angustifolium.	<i>Pastinaca latifolia</i> , ejusque species.
<i>Perfoliata</i> .	<i>Panaces peregrinum</i> .
<i>Bupleurum</i> .	<i>Pastinacæ latifoliæ affinis panax</i> sive <i>pseudocostus</i> fl. luteo, J. B.
<i>Daucus</i> 3 ^{ius} fol. coriandri fl. luteo, J. B.	<i>Apium montanum nigrum</i> , J. B.
<i>Pastinaca Syriaca</i> seu <i>secacul Arabum</i> , J. B.	<i>Libanotis</i> quibusdam, fl. lut. sem. ferulæ, J. B.
<i>Pastinaca tenuifol.</i> seu <i>daucus syl.</i> umbella lut. C. B. P.	<i>Pastinaca tenuifol.</i> radice & umbella lutea.
<i>Daucus montanus</i> apii folio fl. luteo 1 ^{ius} in Prod. B.	<i>Caucalis hispanica</i> sem. rugoso Clus. Hist.
<i>Daucus creticus</i> nodosus umbella lutea Hon. Belli Ponæ.	<i>Lappa Canaria</i> sive <i>cacalis maritima</i> J. B.
	<i>Myrrhis daucoides</i> lutea, nobis.

UMBEL-

UMBELLÆ FLORE PURPUREO CARNEOVE DONATÆ.

<i>Meum Alpinum umbella purp.</i>	<i>Pimpinella saxifraga major umbel. rubenti.</i>
<i>Daucus montanus Clus. fl. carneo semine seleno hortensi æquali.</i>	<i>Cicutaria palustris rubra, C. B. P.</i>
<i>Fæniculum tortuosum.</i>	<i>Sphondylium, nonnunquam.</i>
<i>Caucalis fl. rubello Clus.</i>	<i>Coriandrum</i>
<i>Caucalis latifolia purp. Col.</i>	<i>Reliquæ omnes umbellæ gaudent fl. albo, præter predictas luteo & has rubro donatas, nec umbellam cœruleo colore donari unquam observavimus.</i>
<i>Caucalis leptophyllospurp. Col.</i>	
<i>Caucalis sem. aspero flosculis rubentibus.</i>	

UMBELLÆ QUARUM RADICES, ALIQUANDO
folia succum reddunt album, aut lacteum, croceum, ruffumive.

<i>Cachrys, ejusque species.</i>	<i>Laserpitium, ejusque species.</i>
<i>Siler Montanum.</i>	<i>Thapsia, ejusque species.</i>
<i>Siler aquilegiae foliis.</i>	<i>Ferula, ejusque species.</i>
<i>Oenanthe succo viroso cicutæ facie Lob. J. B.</i>	<i>Peucedanum, ejusque species.</i>
<i>Fæniculum.</i>	<i>Panax asclepium, ejusque species.</i>
<i>Cicuta.</i>	<i>Panaces peregrinum.</i>
<i>Smyrnium.</i>	<i>Sphondylium.</i>
<i>Crithmum.</i>	<i>Oreoselinum.</i>
<i>Levisticum.</i>	<i>Thysselinum.</i>
<i>Angelica.</i>	<i>Seseli palustre lactescens,</i>
<i>Caucalis Hispanica sem. rugoso, Clus.</i>	<i>Saxifraga cernaria nigra.</i>
<i>Caucalis Hispanica, Clus. lac reddit teste Cam.</i>	<i>Myrrhis major odorata.</i>
	<i>Cerefolium.</i>

UMBELLÆ QUARUM RADICES IN SERVIUNT
culinæ, seu umbellæ edules radicibus.

<i>Bulbocastanum.</i>	<i>Carui.</i>	<i>Crithmum spinosum.</i>
<i>Sisarum.</i>	<i>Pastinaca tenuifolia.</i>	<i>Pastinaca latifolia.</i>
<i>Apium hortense.</i>	<i>Smyrnium majus.</i>	

UMBELLÆ QUARUM SEMINA
culinæ aut pharmacis inserviunt.

<i>Fæniculum.</i>	<i>Sison.</i>	<i>Pyrethrum.</i>	<i>Laserpitium.</i>
<i>Cuminum.</i>	<i>Sium.</i>	<i>Daucus seu carota.</i>	<i>Anethum.</i>
<i>Levisticum.</i>	<i>Ammi.</i>	<i>Seseli prat.</i>	<i>Myrrhis.</i>
<i>Siler.</i>	<i>Apium.</i>	<i>Meum athamti.</i>	<i>Myrrhis villoso sem. seu</i>
<i>Angelica.</i>	<i>Carum.</i>	<i>Smyrnium.</i>	<i>daucus Creticus.</i>
<i>Pimpinella saxif.</i>	<i>Anisum.</i>	<i>Thapsia.</i>	

UMBELLÆ

UMBELLIFERÆ.

UMBELLÆ QUARUM FOLIA INSERVIUNT
culinæ, & pro acetariis conditæ mensæ inferuntur.

<i>Fœniculum.</i>	<i>Apium.</i>	<i>Anisum.</i>	<i>Cerefolium.</i>	<i>Valerianella.</i>
<i>Critmum.</i>	<i>Carui.</i>	<i>Myrrhis.</i>	<i>Scandix.</i>	<i>Pimpinella sanguisorba.</i>


UMBELLÆ CONCAVAM CONSTITUENTES
(nidi avis instar) superficiem.

Pastinaca tenuifolia, seu *carota*. *Gingidium*, seu *visnaga*. *Fœniculum azoricum*. *Tordylium Syriacum*. *Daucus creticus*, & si quæ aliæ.

UMBELLÆ RADICE REPENTE PRÆDITÆ.

Angelica erratica Thal. *Imperatoria major*, C. B. P. *Ammi perenne*, *nobilis*. *Ammi quorundam Dalpii Hist.* *Lugd.* & si quæ aliæ. Reliquæ omnes umbellæ proprie dictæ aut pollent radice carnosâ, turbinatâ, longâ aut singulari aut pluribus simul junctis, multifidis, furcatis, aut bifurcatis; vel fibrosâ: per paucæ tuberosâ donantur radice, ut *myrrhis nodosa*, *tuberosa*, *coniophyllum*, & *bulbocastanum*.

Nota omnium umbellarum semina esse calida & sicca in remissiore aut intentiore gradu de veritate hujus assertionis, penes palatum eadem gustantium esto fides. Inter umbellas improprie dictas reperiuntur *valerianæ* & *Thalictri* quedam species repentes.



TAB. PRIMÆ GENER ICONUM SEMINUM EXPLICAT

Nota prima genera novem intermedia contineri
inter ☉ & ☉ genera intermedia secunda di-
stingui * eorumque varietates distingui *

Nota 2^{do} notas majusculas tam in Alphab̄eto, quam
figuris, designare semina adhuc viridia conjunctim
adherentia, ut videantur quasi unum; minusculas autem,
eadem arida & exsiccata, hiulca, & à fibris pendentia
exhibere.

A. a Indicant semina cachryos foliis ferulæ, sem. fungoso,
pericarpio lœvi incluso.
E. b. Ind. semina cachryos, foliis peucedani, sulcata,
aspera.
C. c. Ind. sem. cachryos foliis peucedani, fungosa, sulca-
ta, plana, majora.
D C. d. c. Ind. sem. cachryos foliis peucedani, fungosa,
sulcata, plana, minora.

D. d. Ind. semin. fœniculi vulgaris.
E. e. Ind. sem. cumini.
F. f. Ind. sem. Mei Athamantici.

G. g. Ind. sem. Mei spurii.
H. h. Ind. sem. Bulbocastani.
I. i. Ind. sem. felini montan. Pumili.
K. k. Ind. sem. visnaga.
L. l. Ind. sem. faxifragæ Pannonicæ.

M. m. Ind. sem. levisticæ.
N. n. Ind. sem. Angelicæ sativæ.
O. o. Ind. sem. Angelicæ Canadensis.
P. p. Ind. sem. Smyrnii majoris.
Q. q. Ind. sem. Smyrnii Cretici.
R. r. Ind. sem. astrantiae, seu imperatoriae nigrae.
S. s. Ind. sem. fileris, seu libanotidis fol. aquilegiae.

Quoniam sequentis schematis, seu tabulae in doctrina nostra
contentæ suprà, semina quoad formam & figuram omnino sibi in-
viciem sunt similia, ideo nec delineanda nec sculpta ipsa cu-
ravimus; suntque sifaram, pimpinella faxifraga, sison, & siam.
Omnia haec semina sese habent ut apii quasi, cum faciliter
inter se distinguantur foliis, radice, odore, sapore, dura-
tione, &ceteris que ut observare licet in cap. 2. doctrinæ supra tra-
ditæ de umbellis lobatis minoribus, sem. striato, minore præ-
dictis.

T. t. Ind. sem. seselios Æthiopici fruticis.
V. u. Ind. sem. seselios prænensis herbae.
X. x. Ind. sem. cicutæ maximaæ fetidissimæ.
Y. y. Ind. sem. cicutæ minoris sativæ.
Z. z. Ind. sem. cicutæ palustris.
& Ind. sem. œnanthes odore viroso, cicutæ facie.
†. †. Ind. sem. œnanthes millefol. palustr. folio.
a. c. a. b. Ind. sem. crithmi marini vulgaris.
d. & e. Ind. crithmi spinosi marini part. convexam, &
cavam.
A A A B. Ind. capsulam cartilagineam crithmi spinosi.
C C C D. Ind. capsulam scissam crithmi spinosi.
e. locum vacuum indicat unde semen est exemptum.
F. G. Ind. bina semina conjuncta & exempta crith. spi-
nosi.

1. 1. Ind. sem. ammeos vulgaris.
2. 2. Ind. sem. ammeos perennis, nobis.
3. 3. Ind. sem. apii hortensis maximæ B. in Prod.
4. 4. Ind. sem. apii Macedonici.
5. 5. Ind. sem. apii peregrini.

6. 6. Ind. sem. perfoliatæ longifoliæ, J. B.
7. 7. Ind. sem. perfoliatæ vulgatissimæ.
7. 7. Ind. sem. Bupleuri angustifoliæ.

8. 8. Ind. sem. laserpitii foliis saturate viridibus.
9. 9. Ind. sem. laserpitii fol. dilute virentibus.
10. 10. Ind. sem. laserpitii lob. laticribus, sem. crispo.

11. 11. Ind. sem. Thapsiæ latifol. villosæ 1. Clus.

12. 12. Ind. sem. Dauci seu carote lucideæ.
13. 13. Ind. ejusdem sem. reticulo suo involutum, & te-
ctum.
14. 14. Ind. sem. caudalidis maj. purpur. Col.
15. 15. Ind. sem. caudalidis Monsp. seu lappæ Boaricæ.
16. 16. Ind. sem. caudalidis tenuifol. mag. fl. albo.
17. 17. Ind. sem. caudalidis maj. Tingitanæ, nobis.
18. 18. Ind. sem. caudalidis parvo fl. & fructu, C. B. P.
19. 19. Ind. sem. caudalidis minoris sem. nodoso.
19. 19. Ind. semina prioris in capitulum congesta.

20. 20. Ind. sem. ferulæ Matth.
21. 21. Ind. sem. panacis Asclepii.

22. 22. Ind. sem. anethi.
23. 23. Ind. sem. peucedani Italici.
24. 24. Ind. sem. peucedani fol. conjugatim positis.

25. 25. Ind. sem. sphondylii.

26. 26. Ind. sem. paſtinacæ latifoliæ sativæ.

27. 27. Ind. sem. Tordylii maj. vulgaris, nobis.

28. 28. Ind. sem. Tordylii Syriaci limbo granul.

29. 29. Ind. sem. Tordylii Apuli minimi, Col.

30. 30. Ind. sem. panacis peregrini, Dod.

*

31. 31. Ind. sem. oreoselinæ, Clus.

32. 32. Ind. sem. Thysselii, Dod.

33. 33. Ind. sem. seselios palustris lactescens, C. B. P.

33. 33. Ind. sem. libanotidis nigræ, Dod.

*

Nota barum omnium umbellarum ab ☉ supra, bu-
cusque ad ☉ semina membranacea, compressa, rotun-
da, aut subrotunda orthographicè depingi, & sculpti, u-
numque tantum visu offerri dorso ad dorsum adhærens, cum
autem exsiccata sunt, hiulca dependent ex fibrillis bi-
natim, & sciagraphicè pinguntur & sculptuntur.

34. 34. Ind. sem. myrrhidis maj. albæ, odoratæ.

35. 35. Ind. sem. myrrhidis semine striat. aureo.

36. 36. Ind. sem. myrrhidis Daucoidis luteæ.

37. 37. Ind. sem. myrrhidis annuæ, sem. striat. lœvi.

38. 38. Ind. sem. myrrhidis nodiflæ, sem. aspero longo.

39. 39. Ind. sem. myrrhidis sem. asp. brevi.

39. 39. Ind. sem. myrrhid. sem. villoso, seu incano.

*

40. 40. Ind. sem. cerefolii sativi.

41. 41. Ind. sem. cerefolii sylvestris, sem. lœvibus.

*

42. Ind. scandicis, seu pectinis veneris rostrum in mu-
cronem pungentem definens.

A A Indicant bina semina striata oblonga ad basin fi-
brillæ mediaæ aperta, & hiulca, visu lateraliter ap-
parentia.

B. Indicat tres radioles quæ fibrillas sustinebant, qui-
bus semina adhuc viridia nutriebantur.

C C Indicant semen & rostrum seminis inversa & repa-
nda, in convexam partem resupinata; atque in ven-
tricostitate cava appetit fibrilla quæ fuit seminis
adhuc viridis nutritiva.

*

43. 43. Ind. sem. coriandri sativi.

44. 44. Ind. sem. coriandri sylvestris, testicul.

V M B E L L Æ impropriæ dictæ.

⊕

45. 45. Ind. sem. valerianæ hortensi. cum pappo.

45. 45. Ind. sem. valerianæ palustris cum pappo.

46. 46. Ind. sem. valerianæ marinæ maj. cum pappo.

⊕

47. Semen valerianellæ Indicæ monstrat situm inter ra-
diis A & B divaricatos.

A B C Indigitant substantiam fungosam, seu mem-
branaceam, continentem semina valerianæ Indicæ.

E Ostendit semen inde exemptum.

48. Exhibit valerianella cornucopoïdis, Col. semina
membranacea, spinosa, seu echinata, in capitulum
congesta, habita ratione seminum singularem. A
summitate in spinas sursum versus definunt, & ad
basin lata sunt, crassa, unde cornucopoïdes ei no-
men est.

G Indicat partem caulis, prædicta semina adhuc viridia
sustinentis, & nutrientis.

49. indic. valerianellæ stellato semine maj. semina in
capitulum congesta scabiose ritu.

50. Ind. sem. valerianellæ sem. umbilic. nudo, rotund.
partem convexam.

51. Ind. ejusdem partem concavam.

52. ind. sem. valerianellæ sem. umbilic. nudo longo
part. convexam.

53. Ind. seminis ejusdem part. concavam.

54. Ind. sem. valerianellæ sem. hirsut. maj. umbilic.
in medio & extremo part. convexam.

55. Ejusdem sem. part. concavam indicat.

56. Ind. valerianellæ sem. umbilic. minore hirsuto semi-
nis partem convex.

57. Ejusdem seminis part. concavam indicat.

58. Valerianellæ Arvensis, præcoci humilioris bina sem.
conjugata indicat.

59. Ejusdem bina semina hiulca offert.

60. Ind. valerianellæ ferotinæ, altioris sem. turgid.
præditæ, partem convexam.

61. Seminis ejusdem partem concavam indicat.

⊕

62. Ind. capsulam valerianæ Græcæ.

63. 63. Ind. semina, quæ ibidem fuere contenta.

64. Pippi. sanguisorb.

65. Ind. sem. striatum

66. Ind. sem. pimp. sp.

67. Semen exhibit

68. Involucrum stria-
vulgar. fl. luteis.

69. Ejusdem semen d

ceum, planum.

70. Involucrum triq

indicat.

71. Ejusdem semen ex-
oblongum, ad utrum

Icones seminum quæ

nunc concavam exhib

72. Cachryos sem. fu

tem fungosam in

tam offert; atque

visum ostenditur.

73. Seminis singulari

fungoso exempti

74. Seminis cachryos p

inclusi, partem c

75. Ejusdem seminis j

ungebantur bina

76. Indicat seminis ca

planu tedi, parte

76. Ind. sem. foenicul

76. Ind. ejusdem sem

77. Ind. foeniculū vulg

78. Ejusdem seminis i

79. Sem. Mei Athama

80. Ejusdem sem. par

80. Ind. sem. fileris

80. Ejusdem sem. par

81. Ind. sem. fileris(

thorum) aquileg

82. Ejusdem seminis

83. Seminis imperato

84. Ejusdem seminis p

85. Sem. astrantiae, se

striat. rugosam o

86. Ejusdem seminis p

87. Sem. seselios A

ostendit.

88. Ejusdem partem c

89. Ind. sem. cicute

90. Ejusdem sem. part

91. Ind. seminis cicat

92. Ejusdem seminis p

93. Indic. seminis p


convexam striata

94. Indic. ejusdem se

phice.

TABULA GENERALIS ICONUM SEMINUM UMBELLARUM.

Tab. I. Icon.



Auspicijs R. viri Dni Petri
Mem. LLD. Coll. D. Io. B. Pres.
Dec. Roff. & Univ. Oxon. Vicecan:

TAB. PRIMÆ GENERALIS ICONUM SEMINUM EXPLICATIO.

Nota prima genera novem intermedia contineri inter \oplus et \ominus genera intermedia secunda distinguuntur coramque varietates distinguuntur *

Nota 2^{do} notas majusculas tam in Alphabeto, quam figuris, designare semina adhuc viridia conjunctim adharentia, ut videantur quasi unum minusculas autem, eadem arida et exsecata, hiulca, et a fibris pendentia exhibere.

A, a Indicant semina cachryos foliis ferulæ, sem. fungofo, pericarpio levæ incluso.
E. b. Ind. sem. cachryos, foliis peucedani, sulcata, aspera.
C. c. Ind. sem. cachryos foliis peucedani, fungosa, sulcata, plana, majora.
D C d c. Ind. sem. cachryos foliis peucedani, fungosa, sulcata, plana, minora.

D. Ind. semin. forniculi vulgaris.
E. c. Ind. sem. cuminii.
F. f. Ind. sem. Meï Athamanicae.

G. g. Ind. sem. Meï spuriæ.
H. h. Ind. sem. Bulbocastani.
I. i. Ind. sem. felini montan. Pumilli.
K. k. Ind. sem. vifrage.
L. l. Ind. sem. faxifrage Pannonicae.

M. m. Ind. sem. levifisci.
N. n. Ind. sem. Angelicae sativæ.
O. o. Ind. sem. Angelicae Canadenæ.
P. p. Ind. sem. Smyrnæ majoris.
Q. q. Ind. sem. Smyrnæ Cretei.
R. r. Ind. sem. astrantiae, seu imperatoriae nigre.
S. s. Ind. sem. fileris, seu libanotidis fol. aquilegiae.

Quoniam sequentis schematis, seu tabula, in doctrina nostra contenta supra, semina quoad formam et figuram omnino sibi incic sunt similia, ideo nec delinenda nec sculpenda ipsa curviorum, sicutque sifaram simplicella saxifraga, spongia, & sicut. Omnia hec semina sese habent ut apii quafi, cum facili inter se distinguantur foliis, radice, odore, sapore, duritate, & certe siquies sit observare licet in cap. 2. doctrina supra traditæ de umbellis lobatis minoribus, sem. striato, minore praeditis.

T. t. Ind. sem. felios Aethiopici fruticis.
V. u. Ind. sem. felios pratinis herbe.
X. x. Ind. sem. cicutæ maxima tertiidissima.
Y. y. Ind. sem. cicutæ minoris satuæ.
Z. z. Ind. sem. cicutæ palustris.
& & Ind. sem. cantharæ odore virolo, cicutæ faciæ.
†. †. Ind. sem. cantharæ millof. palustris. folio.
a. a. b. Ind. sem. crithmi marini vulgaris.
d & e. Ind. crithmi spinosi marini part. convexam, & cavam.
AAA B. Ind. capsulam cartilagineam crithmi spinosi.
CCC D. Ind. capsulam sciam crithmi spinosi.
e. locum vacuum indicat unde semen est exemptum.
F. G. Ind. bina semina conjuncta & exempta crith. spinosi.

1. 1. Ind. sem. ammeos vulgaris.
2. 2. Ind. sem. ammeos perennis, nobis.
3. 3. Ind. sem. apii hortensis maximæ B. in Prod.
4. 4. Ind. sem. apii Macedonici.
5. 5. Ind. sem. apii peregrini.

6. 6. Ind. sem. perforata longifolia, J. B.
7. 7. Ind. sem. perforata vulgarissima.
7^a 7^b Ind. sem. Bupleuri angustifoliæ.
8. 8. Ind. sem. laferpitæ foliis saturate viridibus.
9. 9. Ind. sem. laferpitæ foli. dilute viridentibus.
10. 10. Ind. sem. laferpitæ lob. latioribus, sem. criso.
11. 11. Ind. sem. Thapsia latifol. villosæ I. Clus.

12. 12. Ind. sem. Dauci seu carotæ lucidae.

13. 13. Ind. ejusdem sem. reticulo suo involutum, & tecum.

14. 14. Ind. sem. caudalis maj. purpur. Col.

15. 15. Ind. sem. caudalis Monsp. seu lappæ Boarie.

16. 16. Ind. sem. caudalis tenuifol. mag. fl. albo.

17. 17. Ind. sem. caudalis maj. Tingitanæ, nobis.

18. 18. Ind. sem. caudalis parvo fl. & fructu, C. B. P.

19. 19. Ind. sem. caudalis minoris sem. nodoso.

20. 20. Ind. sem. ferula Matth.

21. 21. Ind. sem. panacis Asclepii.

22. 22. Ind. sem. amethi.
23. 23. Ind. sem. peucedani Italici.

24. 24. Ind. sem. peucedani fol. conjugatum positum.

25. 25. Ind. sem. sphondylii.

26. 26. Ind. sem. pastinacæ latifoliae sativæ.

27. 27. Ind. sem. Tordylii maj. vulgaris, nobis.

28. 28. Ind. sem. Tordylii Syriaci limbo granul.

29. 29. Ind. sem. Tordylii Apuli minimi, Col.

30. 30. Ind. sem. panacis peregrini, Dod.

31. 31. Ind. sem. oreocelinæ, Clus.

32. 32. Ind. sem. Thysellæ, Dod.

33. 33. Ind. sem. felios palustris lastescens, C. B. P.

33^a 33^b Ind. sem. libanotidis nigrae, Dod.

34. 34. Ind. sem. myrrhis maj. albæ, odorata.

35. 35. Ind. sem. myrrhis feminine striatæ, aureo.

36. 36. Ind. sem. myrrhis Daucoïdis luteæ.

37. 37. Ind. sem. myrrhis annua, sem. striatæ, levæ.

38. 38. Ind. sem. myrrhis nodosa, sem. aspero longo.

39. 39. Ind. sem. myrrhis sem. alp. brevi.

39^a 39^b Ind. sem. myrrhis sem. villosæ, seu incano.

40. 40. Ind. sem. cerefolii sativæ.

41. 41. Ind. sem. cerefolii sylvestris, sem. levibus.

42. 42. Ind. scandis, seu pectinis veneris rostrum in mucrone pungente definiens.

A A Indicant bina semina striata oblonga ad basin fibrilla media aperta, & hilum, visu laterali apparetia.

B B Indicant tres radiolos quæ fibrillas sustinebant, quibus lemina adhuc viridia nutritabantur.

C C Indicant semen & rostrum semina inversa & repanda, in convexam partem resupinata; atque in ventricositate cava appareat fibrilla quæ fuit feminis inter se distinguantur foliis, radice, odore, sapore, duratione, & certe siquies sit observare licet in cap. 2. doctrina supra traditæ de umbellis lobatis minoribus, sem. striato, minore praeditis.

43. 43. Ind. sem. coriandri sativæ.

44. 44. Ind. sem. coriandri sylvestris, testiculæ.

UMBELLÆ improprie dilia.

45. 45. Ind. sem. valerianæ hortensi, cum pappo.

45^a 45^b Ind. sem. valerianæ palustris cum pappo.

46. 46. Ind. sem. valerianæ marinae maj. cum pappo.

47. Semen valerianellæ Indice monstrat situm inter radios A & B divericatos.

A B C Indigant subtantiam fungosam, seu membranaceam, continentem semina valerianæ Indicæ. Oftendit semen inde exemptum.

48. Exhibit valerianellæ cornucopoides, Col. semina membranacea, spinosa, seu echinata, in capitulum congesta, habita ratione seminum singularium. A summitate in spinas sursum versus definiuntur, & ad basin lata sunt, crassa, unde cornucopoides ei non men est.

G Indicat partem caulis, prædicta semina adhuc viridia sustinentis, & nutritientis.

49. indic. valerianellæ stellato semine maj. semina in capitulum congesta cibaria ritu.

50. Ind. sem. valerianellæ sem. umbilic. nudo, rotund. partem convexam.

51. Ind. ejusdem partem concavam.

52. ind. sem. valerianellæ sem. umbilic. nudo longo part. convexam.

53. Ind. seminis ejusdem part. concavam.

54. Ind. sem. valerianellæ sem. hirsut. maj. umbilic. in medio & extremo part. convexam.

55. Ejusdem sem. part. concavam indicat.

56. Ind. valerianellæ sem. umbilic. minore hirsuto seminis partem convex.

57. Ejusdem seminis part. concavam indicat.

58. Valerianellæ Arvensis, præcos humilioris bina sem. conjuncta indicat.

59. Ejusdem bina semina hiulca offert.


60. Ind. valerianellæ ferina, altioris sem. turgid. prædictæ, partem convexam.

61. Seminis ejusdem partem concavam indicat.


62. Ind. capsulam valeriana Græca.

63. 63. Ind. semina, quæ ibidem fuere contenta,

TAB. PRIMÆ GENERALIS ICONUM SEMINUM EXPLICATIO.



Auspicio R. viri Dni Petri
Mense LLD Coll D. Io. B. Praes.
Dec. Roff. & Univ. Oxon. Viccan.



N

No
figura
adher
eadem
exhibe

A. a I
P
E. b.]
a
C. c.]
t
D C. d
f

D. d.
E. e.
F. f.

G. g.
H. h.
I. i.]
K. k.]
L. l.

M. m.
N. n.
O. o.
P. p.]
Q. q.]
R. r.]
S. s.]

Quo
content
vicem
revimi
Omnia
inter
iōne. &
ditæ
ditib.

T. t. I
V. u.]
X. x.
Y. y.]
Z. z.]
& &
†. †.
a c. a b
d & e
c
A A A
C C C
e. loc
F. G.]
noſi

1. 1. I
2. 2. I
3. 3. I
4. 4. I
5. 5. I

6. 6.]
7. 7.]
7^a 7^b]

8. 8. I
9. 9. I
10. 10.

11. 11.

12. 12.
13. 13.
a
14. 14.
15. 15.
16. 16.
17. 17.
18. 18.
19. 19.
19² ...

20. 20.
21. 21.

TABULA GENERALIS ICONUM UMBELLARUM.

QUOAD TRIPLOCEM DIVERSUM SITUM
superficierum, & triplicem varietatem florum Umbellarum.

TABULÆ II.

Iconum Umbellarum explicatio.

FOENICULUM semine prægnans. Hic exhibuimus adinstar omnium reliquarum, superficiem planam representantium, foliis fœniculi umbellam, planam referentem superficiem, seminibus striatis binatum junctis onustam. A. ejusdem umbellulam cum seminibus arcte binatum adhuc conjunctis, ac in quibusdam exsiccatis & hiulcis decidere incipientibus: restantibus binis fibrillis, beneficio quarum semina (dum adhuc fuerunt viridia) nutrimentum suscipiebant ex radiolis caulis fastigio inhærentibus. Hoc est commune omnibus pene umbellarum seminibus, atque non minus necessariae sunt haec fibrillæ nutritioni seminum, quam sunt vasa umbilicalia nutrimento fetus animantium.

FERULA semine prægnans. Hic ferulae galbaniferæ folius instar omnium umbellarum reliquarum superficiem convexam offerentium umbellam, superficiem convexam constituentem in medium produximus. Præter representationem superficie convexe, videre licet sparsim semina compressa exsiccata & hiulca; atque post quædam decidua, fibrillæ binæ apparent aperte. B. ejusdem umbellulam seminibus aliquot membranaceis, oblongis, compressis, binatum junctis onustam, quibusdam etiam apertis, & decidere in terram tanquam propriam matricem incipientibus obtutui exhibet: quin & fibrillas post semina decidua restantes observare licet.

DAUCUS, seu carota semine prægnans. Cuilibet intuenti appareret hic manifeste umbella carotæ, seu pastinacæ tenuifoliae sativæ, concavam constituens superficiem nidi avis instar, radiis exterioribus internis multo longioribus, & his & illis seminibus hispidis, seu villosis onustis. Nota quod daucus florens constituit superficiem convexam, sed paulatim dum ad semina vergit, radii exteriores longiores, beneficio foliorum angustiorum basin radiorum cingentium coarctantur, atque cavitatem nidi avis instar efformant. Hoc etiam in quibusdam aliis umbellis observavimus, ut in Gingidio, seu visnaga; Tordylio Syriaco; & caucalide Daucoidè Tingitana; dauco Cretico; & fœniculo Azorico: cæterisque observatu dignis. Nota omnia dauci proprie diætæ semina striata villis in carinis seu striis obduci, & quæ non similia producunt semina, ad alias classes relegantur ex doctrina supra tradita, ut observavimus in Prælud. nostr. Bot. pag. 355. 356. C. ejusdem dauci seu carotæ umbellulam exhibet seminibus villosis seu hispidis distincte onustam, aliis adhuc arcte sibi invicem adhærentibus, aliis hiulcis, & aliis deciduis, restantibus fibrillis inutilibus.

SPHONDYLIUM florens. Hic cernere licet Sphondylii umbellam, floribus quinis peralatis ad medium bifidis prægnantem. E. ejusdem umbellæ florem unicum distinctius monstrat, cuius singula petala manifeste apparent bifida; quod etiam conspicitur in multis aliarum umbellarum floribus notato itidem dignis: imo nisi me animus, fallit maxima pars umbellarum albidis floribus preditrum habet florum petala aut bifida, cordata, aut saltem aliquid deliquii patientia.

FOENICULUM florens. Hic videre licet clare fœniculi umbellam, ejusque radios singulos, singulos flores luteos sustinentes, qui quinis petalis reflexis constant. Hoc omnibus umbellis floribus luteis donatis fere contingit. D. ejusdem particularē umbellulam cum floribus & petalis reflexis distinctius radiis suis infestibus ostendit.

DAUCUS florens. Hic sepe offert cuilibet intuenti Daucus seu carota umbellam suam floribus onustam gerens, quinis petalis quasi planis, parum bifidis, quod cernere quis poterit ex primo hujus iconis intuitu. Daucus dum adhuc floret convexam constituit superficiem, at vero dum semine prægnat, concavam, ut figuris ipsis ostenditur. F. umbellam prædicti Dauci offert floribus & feminum rudimentis onustam; G. folia basin seu summi caulis fastigium amplestentia offert.

TABULÆ III.

Iconum Umbellarum piliferarum explicatio.

IN hac Tabula tertia iconum exhibetur triplex diversitas cachryos, seu libanotidis piliferæ. 1^a icon ostendit cachrym semine fungoso levæ. Non hic intelligo semina ipsa esse fungosa, eorum enim involucrum constat tantum pericarpio fungoso, seu substantia fungosa, quæ pro duplice externa facie, est, vel levæ vel sulcata; hæc pariter duplex, aspera, vel plana; semina autem in omnium harum specierum involucris latentia sunt modicè striata, quæ pericarpis testa binatum sunt juncta. In prima icona ad finistram apparent semina dum adhuc sunt viridia sibi invicem arcte adhærentia, quædam exsiccata decidere incipiunt, quædam jamjam deciderunt, relatis binis fibrillis, quæ plane delineatae & sculptæ exhibentur. In omnibus omnium umbellarum pene seminibus adhuc viridibus binatum junctis cernuntur, atque tanquam vasa sunt umbilicalia in animantibus, suntque quasi ductus seu canales vehentes alimenta radicibus, caulis & foliis ad nutritionem seminum, eorumdemque perfectionem, & post exsiccata bina semina, ac ad maturitatem perducta relinquuntur fibrillæ haec tanquam inutiles. Hæc omnia uno iœtu oculi apparent clare in Tabula oblate iconibus summa cum arte & valde affabre sculpta à chalcographo imitante naturam ad unguem. Cachrys seminis pericarpio fungoso levæ & foliis ferulaceis primum in Tabula obtinet locum; Cachrys seminis pericarpio fungoso sulcato aspero & foliis peucedani latiusculis secundum possidet locum; cachrys seminis pericarpio fungoso sulcato plano majore & foliis peucedani angustioribus tertium haber locum in hac Tabula tertia. Prima cachryos folium est è regione umbellæ seminibus levibus onustæ, ferulae instar dissectum; secunda folium est peucedani foliis latioribus paulo sequentis; cachryos tertiæ folium est etiam peucedani sed paulo angustius precedentis foliis, quæ in utriusque foliis sunt graminea ternatim, aliquando binatum peucedani ritu divisa, & pediculis suis innitentia; in summo caulin fastigio omnium harum trium umbellarum semina exhibent superficiem convexam.

TABULÆ IV.

Iconum explicatio.

FOENICULUM vulgare. Hic representantur pediculus & folia fœniculi pro paradigmate umbellarum foliis fœniculaceis, seu foliis tenuiter dissectis, fœniculi instar, & semine majore striato donatarum. Huic sunt congeneres cuminum, meum athamanticum, & si qua alia.

MEUM spurium. Hic offeruntur pediculus & folia tenuiter dissecta Meij spuri pro paradigmate umbellarum foliis fœniculaceis, & sem. striato minore præditarum. Huic congeneres sunt umbellæ sequentes, Bulbocastanum, selinum montanum pumilum, Clus. saxifraga pannonica, Clus. visnaga, seu gingidium, & alia sub nomine Dauci, aut saxifragæ infra nominanda.

EVISTICUM. Hic ostenditur pediculus, cum foliis lobatis levistici pro paradigmate umbellarum lobatarum majorum, semine majore striato donatarum. Huic congeneres sunt filer montanum, & filer aquilegia foliis, angelica, ejusque species, Imperatoria, Smyrnium, astrantia; etiam posterior non aliarum hujus subalterni generis umbellarum more, foliorum lobos dispositos habeat, sed quinos, senos, aliquando septenos lobos in unum centrum pediculi videlicet fastigium concurrentes gerat, non autem binatum aut ternatum congenere modo; de novo proinde delineandam & sculpPENDAM curavimus, principie quod apud omnes autores Theatra, Historias Generales, & pandecta scribentes male collocetur, atque pro helleboro seu veratro nigro exhibeat; vide supra hallucinationes C.B. aliorumque authorum. A. indicat Astrantia caulis partem superiorum abscissam, cum umbellis feminibus striatis, asperis, oblongis binatum junctis onustis. Quandoquidem inquam ab omnibus Botanicis in hodiernum usque diem scribentibus male sic nuncupata, & digesta haec umbella (umbellam appello cum omnes possident conditiones ad perfectam umbellam constituantur)

EXPLICATIO TABULARUM

stituendam facientes) & inepte helleborus niger dicitur, nullam prorsus cum helleboro habet conformitatem, multo minus sanicula dici potest propter rationes diffuse satis alibi à nobis allatas. Vide figuram ipsam in Tab. exhibitam. Consule Prælud. nostr. Botan. 370. & 377. Nullus est vel mediocriter in Botanicis versatus, qui hac nostra scripta legendo non concludat nos rationes & experientiae innixos, inelius ex libro naturæ hic inter congeneres collocaſe, atque cum Tabernæ montano apposite satis imperatoriam nigram denominasse. De feminibus prædictarum harum 4 umbellarum consule Tab. Generalem Icon. feminum D. d. G. g. M. m. R. r.

TABULÆ V.

Iconum explicatio.

PIMPINELLA saxifraga major. Hic indigitatur pediculus cum foliis lobatis conjugatim è regione pediculo, seu petiolo adhaerentibus, prædictæ pimpinellæ saxifragæ maj.

PIMPINELLA saxifraga major degener. Hic offertur etiam pediculus cum foliis lobatim etiam positis, sed dissectis & laciniatis. Ex femine prioris degenerans à natura sic producitur, sicut in plurimis aliis per se contingit.

PIMPINELLA saxifraga minor. Hic itidem ostenduntur folia lobata, crenata pimpinellæ, seu tragoselini minoris Tab.

PIMPINELLA minor degener, seu crispa. Visui offeruntur folia lobata profunde dissecta ejusdem prædictæ pimpinellæ saxifragæ ex satione (ut arbitror) pariter degenerantia.

SUUM aquaticum angustifolium. Hic repræsentantur pediculus & folia lobata ferrata sii aquatici angustifoliæ è regione pediculo adnexa, una cum impari extremum pediculi occupante, more plurimorum umbellarum.

SUUM foliis rugosis, trifidis, & dentatis. Hic etiam offeruntur visui prædicti sii folia rugosa in margine dentata, ternarim ex uno pediculo excurrentia. Reliquæ sii species folia producent binatum costatum adhaerentia, ut videre est in fisaro, & Sifone. Atque has supra dictas umbellas adinstar omnium umbellarum lobatarum minorum sem. minore striato prædictarum in hac tabula exhibuimus, sicut & in præcedenti seu Tab. 4^a levisticum, & astrantiam, seu Imperatoriam nigram adinstar omnium umbellarum lobatarum majorum semine striato majore donatarum obtulimus.

TABULÆ VI.

Iconum explicatio.

CICUTA latifolia fœtidissima. Hic ostenditur pediculus cum aliis foliis plurifariam divisis onustis prædictæ cicutæ.

CICUTA maj. vulgaris. Hic repræsentatur pediculus cum aliis & lobis è regione dispositis etiam plurifariam divisis vulgaris cicutæ majoris modo, & ritu prædictæ latifol. fœtidissimæ.

ENANTHE angustifolia. Hic visui offeruntur radices fusiformes, caules & pediculi sustinentes folia angusta plurifariam divisa (sileris montani modo) prædictæ enanthes angustifoliae.

ENANTHE millefolii palustris folio. Hic exhibentur radices tuberosæ, caules & umbellæ una cum foliis millefolii palustris foliis similibus & quam tenuiter dissectis. Male à Dalechampio in Hist. sua Lugd. & aliis neotericis ipsum sequentibus Daucus pratensis dicitur, ut docuimus in Prælud. nostr. Botan. pag. 366. Etiam si hæc umbella folia per lobos plurifariam (cæterarum more) non habeat divisa, sed peculiari ritu instar millefolii palustris foliorum, eandem tamen cum propter odorem & saporem, tum seminis & radicis strukturam cum congenieribus hic locavimus. De feminibus prædictarum umbellarum consule Tabulam Generalem iconum feminum x. x. y. y. & t. t.

TABULÆ VII.

Iconum explicatio.

AMMI quorundam Dalp. Hist. Lugd. Hic ostenduntur ammos prædictæ pediculus, & folia oblonga, ferrata bifida & trifida.

APRUM hortense planum. Hic indigitatur apii hortensis plani pediculus cum foliis suis plurifariam divisis binis ternis lobis sinuatis, & angulosis.

APRUM degener fol. dissectis longis. Hic offeruntur pediculus & folia sinuata, seu laciniatim dissecta è regione petiolo seu pediculo adhaerentia apii hortensis, ex femine vulgaris degenerantis, nondum hucusque exhibiti.

APRUM Macedonicum. Hic ostenduntur pediculus & folia apii Macedonici serrata, seu plurifariam divisa.

APRUM peregrinum, Clus. Hic indicantur pediculus & folia lobata, subrotunda, ferrata apii prædicti peregrini. Et hoc & Macedonicum semina producunt striata, minoria, villosa, & proper conformitatem odoris & saporis, utriusque icones hic sculpendas (foliorum saltē) curavimus; etiamsi dispositio foliorum apii peregrini non sit cæteris apii speciebus conformis. De feminibus prædictarum umbellarum hic contentarum consule Tab. Icon. feminum I. i. 2. 2. 4. 4. 5. 5.

TABULÆ VIII.

Iconum explicatio.

CARUM. Hic repræsentantur pediculus & folia plurifariam diffracta carui sem. striato minore prædicti.

ANISUM. Hic offertur caulis cum pediculis foliis oneratis anisi, & cum umbellula floribus onusta.

PERFOLIATA. Hic ostenduntur caulis & folia perfoliata vulgaris semine striato donatae.

BUPLEURUM. Hic videre licet caulem, & folia Bupleuri majoris, cum umbellula semine onusta.

ANETHUM. Hic ostenduntur pediculus & folia fœniculacea anethi. De feminibus perfoliata & Bupleuri, vide Tab. Generalem Icon. feminum 6. 6. 7. 7. 7^a 7^b. & de femine anethi consule ibidem 22. Nota quod semina carui & anisi adeo apii feminibus quoad formam & figuram accedunt, ut sculpere eadem supervacuum fore judicaverimus; semina etiam fissari, pimpinellæ, sii, & fons eadē ratione ducti omisimus. Anethum debuit sculpi in ultimo loco versus dextram Tabulæ, proper semen compressum, membranaceum, rotundum, quo convenit cum peucedano in initio Tab. IX.

TABULÆ IX.

Iconum explicatio.

PECEDANUM majus italicum. Hic fistitur pediculus peucedani maj. cum foliis granineis ternatim infistentibus petiolis.

SPHONDYLIUM. Hic offertur visui pediculus cum foliis lobatis binatum ex opposito à petiolis pendentibus sphondylii hirsuti vulgaris.

PASTINACA latifolia sativa. Hic pariter offertur pediculus pastinace latifolia cum foliis lobatis è regione dispositis cum lobulis etiam minoribus, majoribus annexis, uno extremum pediculi claudente.

TORDYLIUM Syriacum. Hic cernere licet caulem in binos ramulculos divisum, & folia lobata, subrotunda, sinuata in margine, & umbellam majorem concavam cum foliolis longis ipsam cingentibus versus basin, feminibus membranaceis, compressis, rotundis, granulatis seu fimbriatis in limbo onustam. Ibidem conspicitur umbellula florens, cum foliolis pariter longioribus angustis basin radiorum cingentibus, & floribus longe supereminibus. De feminibus umbellarum in hac tab. prædicta contentarum, consule Tab. General. Icon. feminum 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27.

TABULÆ X.

Iconum explicatio.

OEOSELINUM. Hic fistitur caulis oreofelini cum foliis à petiolis pendentibus plurifariam divisis.

THYSSELIUM. Hic conspicitur pediculus cum foliis plurifariam divisis Thysselii. De feminibus membranaceis compressis & subretundis prædictarum binarum hatum umbellarum, consule Tab. Generalem Icon. feminum 31. 31. 32. 32.

A Indigitat primum folium valerianæ maris integrum.

B Indicat ejusdem folium superius lobatim, seu pinnatim proveniens.

C Monstrat pediculum & folia valerianæ fœm. seu sylvestris lobata & rarioribus ferris ornata.

D Refert prima folia integra valerianæ pratensis minoris.

E Offert caulis partem truncatam, & folia pinnatim adhaerentia petiolis, uno longiori extremum claudente.

TABULÆ XI.

Iconum explicatio.

VALERIANA marina. Hic indigitantur caules & folia cum umbella floribus onerata valerianæ marinæ majoris, qui sursum, versus marginem sen circuitum quinquefariam divisi sunt, deorsum versus fundum apparent cornicula veluti calcaria linariæ.

PIMPI.

ICONUM UMBELLARUM.

PIMPINELLA Canadensis spica longiori rubra, nobis. Hic indicantur pediculus & folia lobata, oblonga, crenata è regione disposita, una cum foliolis binis (juxta appositionem petiolorum majorum) & spicâ (à latere) longissimâ versus imam partem florente, in superiori spicæ parte flores adhuc inexpansos habente.

TABULÆ XII.

Iconum explicatio.

PIMPINELLA agrimonoides. Ostenditur hic caulis pimpinellæ agrimonoidis cum foliis lobatis asperis & hirsutis, petiolis annexis, una

cum spicis brevibus, & glomeratis, floribus adhuc inexpansis in superiori spicæ parte, expansis autem in inferiore ejusdem spicæ parte versus basin.

HALICTRUM foliis rugosis, trifidis. Hic videre licet caules una cum foliis lobatis, rugosis, trifidis, è regione adnexis petioli, uno semper impari extremum pediculi claudente. In summis caulinum ramulis nascuntur flores, seu muscarii lutei quasi ex tot floccis seu staminulis compositi, expansi in summo & majore caule, in minoribus ramulis inexpansi sunt.

EXPLCATIO NOMINUM AUTHORUM

in tractatu umbellarum citatorum.

Ad. & Adv. Lob. Lobelius in adversariis.

C. B. P. & C. B. Pin. & C. B. Casparus Bauhinus in Pinace.

C. B. Prod. Casparus Bauhinus in Prodromo.

Cæf. & Cæsalp. Andreas Cæsalpinus.

Cam. Ep. & Camer Ep. Camerarius in Epitome Matthioli,

Cam. Hort. Camerarius in Hortis.

Cluf. & Cluf. Hist. Carolus Clusius in Historia rariorū.

Col. & Colum. Fabius Columna in Historia de minus cognitis.

Cord. & Cord. Hist. Valerius Cordus in Historia.

Corn. & Cornut. Jacobus Cornutus de Plantis Canadensis.

Dal. & Dalech. & Dalpⁱⁱ Dalechampius in Historia sua Lugdunensi.

Diosc. & Dioscor. Dioscorides.

Dod. Dodonæus in Historia Pemptadum, editione latina in folio.

Dod. Gall. Dodonæus in editione Gallica.

Dod. Descr. Dodonæus descriptione latine in folio.

Descr. & Descri. denotant plantam ab ipso auctore citato scrip-
tiam, non figuratam, ut Lob. Dod. Cluf. Descr. significat plantam

a Lobelio, Dodonæo, Clusio descriptam, non figuratam.

Eyst. & Eystet. Hort. Hortus Eystettensis a Beslero editus.

Fuch. & Fuchs. Fuchsius in folio in Historia sua latina.

Ger. Johannes Gerardus Emaculatus à Jansono.

Ger. non Emac. Johannes Gerardus non Emaculatus.

Gef. & Gefn. Gesnerus in corollario Historiae Cordi addito, & in libello de collectione stirpium.

Hist. Lugd. & Lugdun. Historia Lugdunensis edita in folio.

Hist. Lugd. App. Historia Lugdunensis in Appendice in folio latine.

Hort. Eyst. hortus Eystettensis.

Icon. Lob. Lobelius in Iconibus in volumine oblongo.

Joh. Bauh. & J. B. Johannes Bauhinus in universali sua Historia tribus Tomis digesta.

Lob. icon. Obs. & Ob. ad. & adver. Lobelius in iconibus forma oblonga, observationibus, & adversariis stirpium in folio.

Lugd. & Lugdun. Hist. Historia Lugdunensis Lugduni excusa lingua latina in folio 2. Tomis.

Matth. Matthiolus Matth. Ed. Bauh. Bauhinus editione sua in Matthiolum.

Obs. & icon. Lob. Lobelius in observationibus, & iconibus.

Obs. Lob. & ad. Lob. Lobelius in observationibus & adversariis.

Park. Johannes Parkinson in suo Theatro Botanico.

Plin. Plinius in sua Historia naturali.

Pon. & Ponæ. Johannes Pona in editione sua latina.

Tab. & Tabern. Theodorus Tabernæmontanus in iconibus suis in forma oblonga.

Thal. Johannes Thalius in sylva sua Harcinia.

Theophr. & Theophr. Theophrastus.


Trag. Hieronymus Tragus in Historia plantarum.

Col. & colum. columnam designat pinacis Caspari Bauhini in Hallucinationibus ejusdem.

i. & ii. iii. pl. primam secundam & tertiam ibidem designat plantam, post paginam designatam prædictæ plantæ.


Quicunque plura desiderat, de authorum nominibus curte exhibitis, consulat Casparum Bauhinum sub introitum Pinacis sui, ibi diffuse satis docet qui fuere authores omnes, qui ante suum seculum de re Botanica scripsere, & quo volumine, & quando ipsorum opera in lucem prodiere.

Nota insuper quando Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, Matthiⁱⁱ, Dalpⁱⁱ & cæterorum id Genus authorum aliorum nomina ab aliis citantur, scribuntur ad longum, ut videre est supra, & citantes ipsos, curte in Botanographorum monumentis in medium adferuntur, ut passim à nobis, & aliis ante nos scribentibus factitatum.




Ferula semine prægnans

Fæniculum semine prægnans




A




B

Daucus carota semine prægnans.




C

Fæniculum florens




D

Sphondylium florens



E

Daucus florens




F

G



Cachrys Semine fungoso lèvi





Folium Cachryos 1^a




Iconum Tab: 5

Cachrys Semine fungoso Sulcato aspero




Folium Cachryos 2^a

Cachrys Semine fungoso Sulcato piano




Folium Cachryos 3^a



Auspicio R. Viri Dni
Tho. Yates S.S. Th.D.
Coll. Aeneas Principi



Fæniculum vulgare



Meium spurium




Levisticum



Astrantia S imperatoria nigra



*Auspicijs R. Viri D^m Ric. Allestree S.S.
Th: D: in vnu: Oxon: Prof: Theol: Reg:
Eccl: Chr: can: Coll: Eton: prop:*



Pimpinella saxifraga maj.




Pimp. saxifr. maj. degener



Ican Tab. 5

Pimp. saxifr. minor crispa
Pimp. saxifr. minor




Sium aquaticum angustifolium

Sium aquat. fol. rugosis trifidis & dentatis



*Auspicijs R. Viri Dⁿⁱ Rud:
Bathurst MD. Coll: S. Trin:
Pras: Dec: Wellens.*



Cicuta latifol. fætidissima



Cicuta maj. vulgaris




Xnanthe millefol. palustris folio



Xnanthe augustifolia



Auspicijs honoratis & v. viri
D^m Hen^r Compton S.S. Theol D.
Cœnob. S. Crucis Magisteri Ecclesie
Christi Ox: Canon:



Apium quadrangulum Inst. lugd.




Apium hortense planum.




Icon. Tab. 7.


Apium Degener fol-dissectis longis




Apium macedonicum.



Apium peregrinum.




Auspicijs Clariss: viri Dñi: Tho:
Willis Med:D: & Professoris
Suffolcian: in Univ: Oxon:.



Bupleurum



Anethum



Arium




Carum

Perfoliata



Auspicijs reverendi viri D^mi Gilb^tronfide
S. S. Theol. D. Coll. Wadham Gardhami.



Peucedanum italicum.



Sphondylium.



Pastinaca latifolia sativa.



Tordylium Syriacum.



Auruncus Clariss: viri Dñi
Iohannis Lamphare Med:D.
Aulae Cervinae Princip: & Pro-
fessoris Camden: in lino Oxon:



Oreoselinum



Thyschium



A



B




C



E



D




Auspicio P. Viri D^mi Sebast:
Smuth S.S.T. D.Ecclesiar Christi
Canonici.




scollab. II


Valeriana marina latifolia rubra.



Pimpinella sanguisorba maj-Canadens rubra.




*Auspicio R: viri D^m Rob: South S.S.Th.D.
Eccler^e Christi Oxon & D: Pet: Westmon:
Præbend: universit: Oxon Orat Publici*



Pimpinella sanguisorba
mag. agrimonoides.



Auspicijs Clariss. viri Dni Petri
Eliot Med: Doctoris Oxon:



HALLU^{TA}CINATI^{ON}E^S

HALLUCINATIONES CASPARI BAUHINI, ALIORVMQVE AVTHORVM.

73

CONDITA hâc nostrâ novâ, & inauditâ umbellarum doctrinâ, ex libro naturæ observatâ, in quâ plerque umbellæ, quæ à Caspary Bauhino, aliisque authoribus confusè tractantur, restitutæ per genera & species, secundum tabulas cognationis, & affinitatis dispositæ exhibentur; non abs re fore putavimus hallucinationes ejusdem authoris, in singulis capitibus admissas præmonstrare; nec non in prælimine cujusque capitatis Nomina antiquorum, cum Græca, tûm Latina, ex Theophrasto, Dioscoride, & Plinio, aliisque authoribus à Bauhino desumpta offerre.

CAPVT I.

De Libanotide.

Libanotis, quod radix ô̄ci ȝibâr, thus redoleat, duplex est, latifolia, & ferula folio: latifoliae Theophrastus lib. 9. c. 12. Genera duo fecit, alterum sterile, alterum fertile, & alterum, tam fructu, quam folio utile, alterum tantum radice: fructiferum, folium apio palustri simile, sed majus habet: sterile, folio lactucæ amara constat. Plin. lib. 19. c. 12. de libanotide confuse egit, sicut & l. 20. cap. 16. cum concycis miscuit.

BAUB. Pin. pag. 157 col. i. pl. i. libanotis latifolia major, C. B. P. major Theophrasti, Hist. Lugd. & ibidem Pl. ii. altera latifolia sive vulgator, C. B. P. Seseli Æthiopicum, Dod. Hæc duæ sunt veræ & genuinæ laserpitiæ species, quia utriusque semina pluribus alis foliaceis rotæ molendinæ fluviatilis pinnarum instar conjunctim constant: differunt inter se magnitudine, colore, & incisura, seu laciñis foliorum.

Pag. eādem col. ii. Pl. iii. Libanotis latifolia minor sem. criso, C. B. P. & Prod. Libanotidi similis costus amara, sem. criso, I. B. Hæc umbella pariter propter rationem antedictam debet pro laserpitio accenseri; quin & à prioribus latitudine foliorum (quæ sunt amplissima) & seminum rugositate & crispitudine facile distinguitur, quia bina semina floribus singulis albis succedentia producit crassa, crista, verrucosa in alis suis foliaceis, undas quasi maris referentibus: hoc præcipue nomine & hanc, & duas præcedentes umbellas, quum laserpitorum gerant tesseram, juncto odore, & sapore laserpitio consimilibus, ad congeneres amandavimus, ex libro naturæ edo&ti, non obstante denominatione atq; dispositione authorum sub libanotidis nomine. Non enim cum libanotide verâ & genuinâ à nobis sub initium hujus tractatuli propositâ (cachrifera scilicet) sunt disponenda, propterea quod sint thurifera, ut volunt authores, quia hoc secundario ipsis contingit, quemadmodum aliis multis umbellis sub diversis omnino signis militantibus; ut demonstravimus supra in observationibus generalioribus umbellarum succum album, luteum, rufumve, thus olementum fundentum.

Pag. eādem col. ii. Pl. iv. Libanotis minor apii folio, C. B. P. Libanotis Theop. Lob. Adv. Cum hujus semen sit anethi candidum ex Lobellii loco citato, atque latum ad pastinacæ latifoliæ semen non nihil accedens ex I. Bauhino, ex libro naturæ ad genus septimum hujus tractatus præcedentis, releganda est, & inter congeneres illuc collocanda.

Ibidem col. ii. Pl. v. Libanotis apii folio semine aspero, C. B. P. Rosmarinus folijs selino similibus sive filer creticum Hon. Belli Ep. i. ad Clus. cuius hæc sunt verba; Rorismarini hujus folia sunt selino familia, serrata, floresque in umbella albi, quibus evanidis succidunt semina oblonga, aspera; radice nititur crassa, foris nigra,

intus alba, thus maximè olente; hinc colligere quivis poterit, hanc umbellam esse laserpitiæ speciem. Ex feminine & tota facie foliorum, cum præcedentibus congenieribus suis collocandain, nemo mediocriter in arte Botanica versatus inficias ibit.

Ibidem col. ii. Pl. vi. libanotis latifolia aquilegia folio, C. B. P. & Prod. Paucis perstringemus hanc nec esse ex genere libanotidum, nec laserpitorum; habet enim semina oblonga, depressa, striata, ergo aptius ad filer refertur, cum quo omnino conformis est umbella ex structura seminum; nam filer hoc habet peculiare, quod ejus singula semina septem carinis fivescuntur (id est tribus majoribus & quatuor minoribus) donentur: hoc non conspicitur in prædictis laserpitorum generibus, aut speciebus, quorum semina duabus alis foliaceis erectis in dorso uniuscujusque feminis, & una hinc inde in basi donantur, quæ in binis seminibus adhuc viridibus nec dum exsiccatis arte fibinvicem junctis, constituant rotatim sex alas adinstar pinnum rotæ molendinæ fluviatilis, ut supra à nobis dictum in cap. de laserpitio. Cumque igitur hæc libanotis, authoribus sic dicta, at nobis filer aquilegia foliis, omnino habeat conformitatem cum filere montano majore in seminibus, cum filere in tab. nostris collocavimus. Neque in toto dispositione umbellarum semine striato donatarum, aliae conspicuntur hæc nota prædicta in seminibus affectæ præter fileris species; arque proinde conformitas in seminibus mihi in hoc filere aquilegia foliis (sicut in aliis omnibus umbellis) conformitatem generis detexit: adde quod hujus semen odore & sapore cinamonum repræsentet, atque masticatum quid aromaticum redoleat, sicut & majoris, & minoris fileris semen; adeo ut i^a ii^{da} iii^{da} & vi^{ta} harum libanotidum species ad laserpitiæ familiam remitti debat: per consequens ad cap. 3. doctrinæ superioris. iv^{ta} autem species ad 7. caput doctrinæ nostræ novæ. vi. & vii^{ma} ad secundum caput nostrum, non obstante (inquam) lachryma thurifera, quæ emanat ex radicibus harum omnium, quandoquidem hoc sit commune hisce, & multis aliis infra dicendis, sub diversis ramentis generibus disponendis, habita ratione ultimæ figuræ seminum cum libanotidis latifoliæ aquilegia folio, tûm libanotidis fertilis Theophrasti, seu ligustici vulgaris.

LIBANOTIS FERULÆ FOLIO,
& panax Asclepias.

Αἰθανοτίς Dioscoridi lib. 3. c. 87. duum est generum; unum fæcundum, cuius semen rotundum, angulosum, acre, linguam exurens, & ράχης vocatur, foliis fæniculi, cui alterum consimile, semine lato, minime exurente. Sterile illorum similitudinem refert, sed, neque caulem, neque florem, neque semen promit. De hujus posterioris assertionis veritate multum dubito.

Pag. 158. col. i. Pl. i. libanotis ferulae folio, sem. anguloſo, C. B. P. Hic intelligitur libanotis cachryophorus vera & genuina nostra, semine fungoso pericarpio lœvi inclusa, & ferulae folio. Ex descriptione omnium authorum in pinace à Casp. Bauhino citatorum, nullam obſervo fulcorum aut striarum factam mentionem in seminibus, niſi apud Andream Cæſalpinum Doctissimum Philosophum & acutissimum Botanices scriptorem, cuius verba hæc ſunt. Libanotis candida ſemen fert crassum, rotundum, ac striatum, oſeo cortice candido præditum, in quo nuclei inſtar farctum intus appetat ſemen, multo amplius, quam in crithmo. Eriamſi hucusque non reperiantur apud authores species libanotidis genuinæ, ſeu cachryos diſtinctæ, ſed confusè omnino traditæ, ſub initium tamen hujus traſtatus clare cernere licet notam genericam libanotidis genuinæ, ejusque species notis ſuis particularibus ex libro naturæ petitis, cognoscibiles.

Eadem pag. 158. Col. i. Pl. ii. Libanotis ferulae folio & ſeme, C. B. P. panax Asclepium, Dod. Cum hujus ſemen fit compreſſum, membranaceum, oblongum, ſtriis depprefſoribus ornatum, & folia pariter ferulacea, ad fuas umbellas congeneres, ferulam ſciliſet & anethum, eſſet releganda.

Ibidem Pl. iii. Libanotis fæniculi folio ſem. foliaceo, C. B. P. Hæc propter ante dictam rationem eodem debet amandari, cum Dodonæus & Cæſalpinus eidem tradant femina foliacea, depreſſa, oblonga, nigra, acria, odorata. Nafcitur in Creta teste Camerario, ubi ſefeli vulgo dicitur, & in Sicilia, ubi peucedanum appellatur: hæ appellationes magis proprie convenienti aliis plantis, ut alibi à nobis dictum.

Ibidem col. ii. Pl. iv. Libanotidi 2. ſimilis, ſeu panax Asclepium 1^{um} C. B. P. panax Asclepium Matth. Lug. Eſt ferulae effigie ſimile, ſed multo minus: ſemine non fæniculi, ſed ferulae lato; eidemque foliis & floribus haud diſſimile; ergo ex libro naturæ 2^{da} 3^{ia} & 4^{ta} libanotidum hic contentarum ſpecies, ad septimum genus ſubalternum, ſeu cap. 7. doctrinæ noſtri amandari debent; quocunque modò nominentur, modò reſte diſponantur, hoc me non ſollicitum habet. Sunt atfines ferulae à nobis, & poriore parte, ſemine; odore, & ſapore conſequenter: ſuccum reddunt, qui opopanax dici potest, quemadmodum ferula Galbanum ſuffundit.

Ibidem col. ii. Pl. v. panax asclepium umbella lutea, C. B. P.

Asclepium alterum, Hift. Lug. Hujus ſeminis in Hift. Lugd. non fit mentio à Dalpiō, ergo quo certò fit reducenda hæc umbella, incertum nobis adhuc eſt.

Ibidem col. ii. Pl. vi. panax Asclepium ſem. foliaceo, C. B. P. panax Asclepium Apulum, Col. Hujus ſemina (inquit Fab. Columna) foliacea ſunt duplia, alata, binis cartilaginibus donata, ut in Thapsia, &c. Hæc umbella ſemine ala foliacea lateraliter cincto donatur, ergo ad 4. Genus ſubalternum noſtrum, Thapsiam ſciliſet eſſet referenda, ſecundum ſymbolum, ſeu tefſeram ſub qua debent congeneres collocaſi, & ex libro naſture ſimilibus addi, tam in noſtra tabula 4^{ta} quam reliquias omnibus: proinde male à Casp. Bauh. diſjungit, ſed in ſuis cognatis, Thapsia ſciliſet, & hic inter diſſimiles locatur.

Ibidem col. ii. Pl. vii. Libanotis minor umbella candida, C. B. P. Libanotis ſeptentrionalium herbariorum Lob. Adv. Cum ex ipsius Lobellii deſcriptione, hujus ſemini fit exiguum, ſub hyemem maturans, minus carui rotundi, fere ammi officinarum par, debet referri ad umbellas ſemine ſtriatu, minore, foliis lobatis prædictis, in 2^{do} genere ſubalterno noſtro ejusdemque 2^{do} membro contentas.

Ibidem col. ii. Pl. viii. Libanotis tenuifolia, German. major & minor, C. B. P. rāḡnūd̄s major & minor Thal. Curtē & ſuccinē nimis hic loquitur Thalius in ſylva ſua Hyrcinia (præcipue cum nullam ſeminum harum faciat mentionem) ut nos quoſint referendæ in ambiguo hæſitare cogamur. Si quis harum & aliarum multarum umbellarum ſemina ad manus noſtras porrigeret, facilè ad classes ſuas proprias redigerentur. Prætent alii quod ego non potui: via jam eſt aperta. Ex dictis tres ſunt umbellæ ſem. compreſſo, membranaceo, oblongo, ſive ſub libanotidis, ſive panacis nomine, una ſemine ala foliacea cincto prædicta, & una ſemine ſtriatu minore, hæc libanotidis nomine, illa panacis afficitur. Prima eſt libanotis vera & genuina & proprie dicta; ſub initium noſtri traſtatus ſuprā de eadem ejusque diſiōne ſatis ſuperque diſtum. Si detegantur plures ſpecies genuinæ cachryos ſemine pericarpio fungoſo in-cluso prædictæ, notā aliqua particuli, aut ſpecifica ab hiſce differentes, addantur ab eaſdem detegenribus & obſervantibus, nos quas adhuc vidimus dedimus & expoſuimus, denon- dum viſis nil temere afferendum.

C A P V T I I:

U M B E L L A E S E M I N E S T R I A T O M A J O R E,
foliis ferulaceis donatae.

F O E N I C U L U M.

Μάρεθρον Dioscoridi lib. 3. c. 81. ἀπὸ τῆς μεριμνῆς, à marcescendo, quod ejus cum inaruerit, ad condienda plurima multus uſus ſit; Plin. lib. 19. c. 9. fæniculum anguibus gratissimum, ad condienda plurima, cum inaruit: & l. 20. cap. 23. fæniculum nobilitavere ſerpentes, g��atu ſenectam exuendo, oculorumque aciem ſucco ejus reficiendo. Latinis fæniculum; quod ſatum magno cum fænore ſemen reddat; vel potius Græcorum imitatione, quod quaſi fænum in hyemem arefactum ac marcidum reponatur.

Genera: Dioscoridi, eſt ſativum, ſylvestre, quod ἵππομάραθρον, & duplex eſt: alterum ſemine magno, ca- chri ſimile, aliud ſemine Coriandri. Idem Plin. lib. 20. c. 23. recentioribus eſt vulgare, ſeu ſativum, dulce, rotundum, & erraticum, ſeu hippomarathrum.

Ag. 147. col. i. & ii. fæniculum variat foliorum colore, ma- gniſtudine partium, odore, & ſapore. Videtur mihi in hoc cap. de fæniculo Casp. Bauhinus multiplicare (cum authoribus) entia fine neceſſitate; nam fæniculum vulgare Germanicum i. C. B. P. & fæniculum vulgare Italicum ii. atque fæniculum

sylvestre v. ſeu erraticum ſponte virens in agris Narbonen- ſium diſſerre tantum natalibus apparent. Nam ſemina omnium ſunt tribus ſtriis, ſeu carinis in dorſo, ſeu convexa ſingulo- rum ſeminum parte, & 4. fulcis prædicta, ſuntque ſecundum ſoli fertilitatem aut sterilitatem majora, & longiora, vel bre- viora

viora & rotundiora. In Septentrionalibus regionibus sunt gustu acri, acuto, in meridionalibus dulciora, & palato multò gratiiora.

Male Casp. Bauhinus vulgare Ger. non emac. idem constituit cum feniculo secundo Tab. Eriam si figuræ cùm Ger. non emac. tum Tabernemontani sint eadem, tamen per feniculum vulgare Ger. debet intelligi feniculum sem. striato, oblongo, petalis florum luteis reflexis; at per feniculum rotundum, Tab. intelligitur feniculum semine striato, rotundo, floribus albis, seu candidis, ut vult ipse Casp. Bauh. in Pin. quod in nullâ feniculi specie conspicu poterit (ex mea opinione;) aut si sit, à vulgato & sapore & odore differt, non minus quam semine minori carui forma, eritque alibi disponendum.

Insuper hippomarathrum, seu feniculum sylvestre Tab. Icon. & feniculum dulce Ger. eadē iconē exhibentur, utriusq; tamen icon repräsentat seseli pratense Monspeliensium; ex hisce facile est inferre Casp. Bauhinum seselios pratenis Monspeliensium figuræ male adaptasse nomina diversa diversorum feniculorum supra citatorum. Vide feniculi distinguis species sub initium 2^{di} cap. doctrinæ nostræ suprà exhibitez, quæ sunt odore acuto, acri, aut dulci, hoc est Italicum, vel Azoricum nobis, quod forte feniculum est dulce maj. sem. albo, J. B. cuius icon nostrum Azoricum satis bene refert.

Pag. 147. Pl. vi. hippomarathrum Creticum, C. B. P. & Prod. & Hon. Bell. ep. i. ad Clus. florem (inquit ibidem Clusus,) gerit luteum in umbella, folia ut anethum, semina magna cachri similia, vocatur πλατωνικόν πυρον quod latum cuminum sonat. Ex hac nuda & sterili satis descriptione nihil certi potest determinari, forte ramen à foliis est feniculum Azoricum, si sit semine striato maj. more feniculi: Si sit semine fungoso pericarpio inclusu, commode satis reduci poterit ad cachryos prædictæ & descriptæ ab initio speciem minimam sem. plano sulcato.

Pag. 147. col. ii. Pl. vii. Chaa herba ex Japonia. Ex quo auctore hauserit Casp. Bauhinus hanc plantam inter feniculi species collocandam, non possum assuevi: nec ipsum ex ullo auctore ante ipsum scribente excerpisse feniculi aliquam vel minimam notam huic plantæ congruentem percipio. Plantæ ipsius Chaa & Te dictæ folia ad nos cùm Parisis rūm Blæsis degentes delata, in aqua macerata, & postea eadem super orbem aheneum (quo utuntur mulieres ibidem viventes, in hinc suis exsiccandis,) extendi curavimus, quæ nobis apparet, foliis bellidis majoris latiora, & longiora, saltēm inter-

griora; quin & odor & sapore foliorum prædictorum, aut per se masticatorum, aut in aqua maceratorum, longe à feniculi odore & sapore recedebant, ac proinde à forma foliorum conclusimus in præludiis Botanicis non esse umbellam feniculaceis ferulaceisve foliis præditam, & per consequens male à Casp. Bauhino hic inter feniculi species collocatam. Multo minus admitti potest folia Chaa aut Te esse folia Myrti Brabantæ, aut gagel Germanorum, aut similem habere effectum, ut volunt quidam Botanici (non ita pridem) homines quidem minime mali, sed male versati in Botanicis, cum chamaeleagni, seu myrti Brabantæ folia fragrantissimum edant odorem, qui calida ipsa & sicca in tertio gradu indicat, nec approximant folia Chaa (quæ sunt temperatoriæ naturæ) foliis prædictis aut odore aut sapore, per consequens nec effectu. Nam semina chamaeleagni impense sunt calida & sicca, & usque ad tertium gradum accidunt. Fructus & folia molesta sunt cervisiae inter coquendum addita, admodum tentantem caput & ebrietatem adserentem eam reddunt, totus frutex cum fructu aridis vestimentis interpositus à tineis & vermiculis ea tuerit. Dod. Hæc dixisse quid non sit Chaa sufficiat. Videamus ex modernis qui ipsam arbustulam crescentem viderunt, quid sit. Petrus Martinus Author Atlantis Sinici sic describit Chaa, seu Te: huic est foliolum simile folio arbustula que Rhus coriaria, seu sumach dicitur, est enim virgultum quod in variis virgulis, seu rāmulos sese diffundit. Estate primum florem emitit, levi odore fragrante, hunc evanescens sequitur bacca viridior mox nigricans. Hac ratione Chaa non est chamaeleagnus, cum hujus flores exigui, spicati, luteoli exentur ē finu foliorum, atque hisce succedunt semina alpera cacumine pungentia, in racemi exigui & oblongi formam cohærentia, & oleoso succo per maturitatem redundantia: totus frutex cum gravedine quadam odoratus est, præsertim semen & ejus oleaginosa pinguedudo. Ex hisce (sine longa verborum serie) evidenter appetit quod Chaa non sit myrtus Brabantica. Ex verbis Petri Martinii quid sit satis evidenter appetit. Qui plura desiderat de Chaa, seu Ciā vel Te, consulat Perrum Martinum Atlantis Sinici authorem, Athanasium Kircherum, Nicolai Tulpī Obs. Medicas, pag. 400. & sequentibus usque ad finem, Jacobum Bonitum, Dialogo vii. Med. Ind. aliosque plures ab ipso Tulpio citatos, versus finem Obs. Med. prædict. De viribus ejusdem vide Athanasium Kircherum, pag. 180. aliosque citatos. Modus præparandi apud Sinenes illic describitur etiam, sed jam lippis & tonsoribus hic itidem notus,

CUMINUM.

Kύμυον Dioscoridi lib. 3. cap. 68. Theoph. 7. Hist. 4. at Plinio lib. 19. cap. 8. & lib. 20. cap. 14. & 15. cuminum. Genera: Dioscoridi sativum est, cui Ἀθηοπικόν, quod Hippocrates Regium vocavit, præfert. Secundum locum tenet Ἑγύπτιον, reliqua sequuntur; est & sylvestre; alterum capitulis in cacumine rotundis: alterum quod à singulis floribus, cornicula in sublimē erecta promitt. Sed hæc stirps omnino ab umbellis arcenda, cum sit sui generis, & heteroclyta. Theophrasto genera plura sunt: quare Plinio l. 20. cap. 15. sativum est & sylvestre, Ἀθηοπικόν & Africanum; at lib. 19. cap. 8 alterum sylvestre rusticum vocatum, aliis Thebaicum: Ἀθηοπico Africōque palma est: quidam huic Ἑγύπτιον præferunt.

Pag. 146. col. i. Pl. ii. cuminum sem. rotundiore & minore, dulce Melitensis, C. B. P. Est perfecta & omnibus numeris absolutis anisi species, ex feminis forma, ejusdemque odore & sapore; quin & folia habet anisi semula. Semine autem constat anisi vulgaris sem. crassiore & breviorum cum dulcedine quadam, etiam anisi, si masticetur; nec semina oblonga, acuminata, striata, graveolenta producit, ut cuminum officinarum Cæs. ergo male hic collocatur & se Jungitur ab aniso, à Casp. Bauhino.

Ibidem col. ii. Pl. iii. Cuminum sylvestre capitulis globosis, C. B. P. sylv. Dod. Hæc planta non est umbellæ species vera, & genuina, (multo minus cuminum) propter præcipuum deficiens conditionem requiritam ad umbellam proprie dictam

constituendam; nam singulatim semina summâ parte hirsuta, non binatim aliarum umbellarum more gerit, reti admirabili strukturâ contexto, ex quatuor pinnatis, seu plumosis carinis, & lobis plurimis angulosis, veluti laneis composito, singula semina circumvolventi. Quin & cumino, nec odore, nec sapore, nec partium strutura, aut compositione accedit, ideo male hic collocatur Dioscoridis exemplo, à Casp. Bauhino, aliisque authoribus inter cumini species. Nos cum dauco cretico (genuina dauci specie) collocavimus in doctrina superiori. Vide explicationem Tab. de Pastinaca tenuifolia, seu dauco suprà, in cap. 2. doctrinæ nostræ novæ.

MHON ἀδεμαρτινὸν καὶ μεῖον, Meum Athamanticum Diose. l. 1. c. 3. similiter à Plinio lib. 20. c. 23. non minatum, Meu (scribit) in Italia non nisi à medicis scritur, & iis admodum paucis. Duo genera ejus: Macedonicum scilicet & Hispanicum (non quidem ea duo diversa genera sunt: ceterum iis in locis, plurimum lignit: Hæc addit ex Dioscoride Dalechampius in notis.) Nobilius, Athamanticum vocant, illi tanquam ab Athamante inventum; hi quoniam laudatissimum in Athamante (monte Pthiotidis Thessalie) reperiatur.

UMBEL-

UMBELLÆ SEMINE STRIATO MINORE,
foliis fœniculaceis donata.

M E U M.

Pag. 148. col. ii. Meum dauci cretici facie, C. B. P. meum aliud, Hist. Lugd. Hæc parva umbella quantum ex descriptione à Daechampio in Hist. sua Lugd. exhibita, colligere licuit, videtur saxifragæ tenuifoliae species; & ex semine minutissimo amaro, & floribus minutis candidis eidem potius accedit, quam daucu cretico, cuius semen est oblongum, acuminatum, subalbidum, & hirsutum: nec ex conformatione partium, odore aut sapore Meo Athamantico, seu vulgari tenuifolio convenit.

Ibidem pl. iii. meum Alpinum umbella purpurascens, C. B. P. Daucus Creticus seu mutelina, Cam. Ep. in Mattheolum. Cum hæc umbella sit semine oblongo, acuminato, subalbido, & hirsuto,

& odorato, saporis aromatici cum manditur, ex verbis Cam. loco citato, atque ratiocinando ex *αὐτοποσίᾳ* seminis, cuius iconem videre est in Cam. cuivis Botanico in arte versato facilissimum erit nobiscum concludere, hanc umbellam esse myrrhidis speciem; ergo male hic collocatur.

Ibidem pl. iv. meum spurium. Hoc ut supra diximus in explicazione umbellarum, fol. fœniculaceis sem. minore striato præditum propius saxifragæ tenuifoliae accedit, & seminis parvitate, sapore etiam, & odore, quam Meo Athamantico, cum quo conjungitur à Casparo Bauhino aliquæ authoribus modernis.

BULBOCASTANUM.

Bulbocastanum, cuius Tralianus l. 7. c. 2. meminit, à radicis figura bulbosa, & sapore castaneas exprimente, nomen habet. Bætor Diſcor. l. 4. c. 124. aliqui censem, cui *γευδεβέριον* cap. sequenti subjungit.

Pag. 162: col. ii. pl. ii. Bulbocastanum minus, C. B. P. alterum Cam. Hort. Hoc minoribus bulbis in tractu Rhenano frequens nequitiam est species diversa; sed ex bulbillis, seu potius tuberculis novellis folia tenuiora producit tertio aut quarto anno; nam pro ratione loci & longa duratione grandescunt tuberosæ radices, & consequenter caules & folia cæteraque partes. Hoc valde familiare est multis annos, & vivacibus plantis, tam tuberosa, carnosæ, quam fibrosa radice

præditis; proinde inadvertenter Casp. Bauhinus cum reliquis authoribus hoc in loco ab ipso citatis, aliisque post ipsum scribentes, duas constituant species bulbocastani, cum sit una & eadem, & rata tantum discrepans, adeoq; magnitudine & parvitate; quod observare in multis aliis stirpibus quilibet poterit, tam in hortis cultis, quam in agris sponte provenientibus.

GINGIDIUM.

Gingidio Diſcorides l. 2. c. 167. herbam staphylino sylvestri similem dicit. Plin. l. 20 c. 5. Gingidium similem staphylino.

Pag. 151. col. i. pl. ii. Gingidium folio fœniculi, C. B. P. Syria-cum Cam. Ep. & Gingidium Diſcoridis Rauwolfii Hist. Lugd. App. Confusè admodum descripferunt authores hanc plantam, ut quis in arte Botanica versatus observabit, teste Johanne Bauhino. Figurae Marth. & Cam. multa videntur habere communia cum lappula majore, seu caucalide majore. Descriptio partim ex Diſcoride, partim ex lappula Canaria, partim ex visnaga desumpta est: adeo ut clare illuc colligere licet, si fitiam descriptionem authorum quorundam, & falsam, majoremque mutationem in icone Tabernemontani; quod huic compilatori satis est familiare. Accedamus ad veram descriptionem, ex ipsa planta semine prægnante à Johanne Bauhino exhibitam: & postea nullo cum negotio ipsam ad suas congeneres reducemos.

Hac plantula anetho aut Gingidio nostrati per quam similis, semine lato, laciniato; radice est parva albicante, foliolis fœniculaceis, tenuioribus, quam in pastinaca erratica, gustuque amarioribus: umbellæ in medio capitulum cœruleum babenti subsunt folia tenuia, ut melanthio; semina rotunda, consarcitum coacta in unum quasi capitulum; unicuique flori bina solent succedere semina, quæ parte coherent mutuè aspera, rugosa, oblonga, extrinsecus striata, in ambitu fimbriata, ut in umbellis quibusdam à nobis exhibitis sub tordylii granulati nomine. Totum semen paulò minus est parvi digiti ungue, aut denariolo, in monte Libano, & Syria locis præruptis prævenire scribit Rauwolfius, qui semen communicavit Joh. Bauhino. Ex hisce verbis partim ex Rauwolfio partim ex Joh. Bauhino apparet esse semine membranaceo, compresso, rotundo, binatum juncto, & fimbriato, seu granulato; ut sunt tordylii quædam species, de quibus nos supra diximus in doctrina cap. 7. hujus tractatus. Cum sit foliis anethi & sem. membranaceo, compresso, oblongo, granulato, seu fimbriato in margine, aptius ex mea opinione ad suas congeneres eodem cap. contentas, & à nobis sic congestas revocabitur; appellando anethum sem. membranaceo, compresso, oblongo, fimbriato cum Joh. Bauhino, quam gingidiū, cum quo nullatenus convenient in partibus essentialibus: quippe gingidiū semina sunt minora, striata. Cum vero ne vel seminum formæ aut figuræ meminerit Rauwolfius, nec alii ex ipso transcriptentes in descriptionibus suis, nec vera sed fictitia seminum rudimenta iconibus suis appinxere: concludendum est, melius à Joh. Bauhino descriptam & depictam esse hanc umbellam, qui sese plantam Montbelgardi in horto E. C. cultam habuisse, eandemque observasse ait.

Pag. eadēm Col. ii. pl. iii gingidium foliis cerefolii, C. B. P. gingidium Matth. Hist. Lugd. Nullus authorum à Casp. Bauhino citatorum hujus seminis facit mentionem, ac proinde nentiquam certum est determinatu, an ad gingidium semine striato, villis privato; an ad pastinacam tenuifoliam seu carotam semine villoso donata, sit reducenda. Umbella est (ut inquit Dalp. in Hist. Lugd.) in cacumine alba, eadēm undique comunitibus foliis eisque laciniatis; è floribus semen prodit (sed formæ & figuræ oblivia scitur, more sibi & aliis solito) quo maturescente umbella in sece contrabuntur, ut in dauco, seu pastinaca, dentata glutinosa sentiuntur. Sed cum semina nec describuntur nec appinguntur, quod satis frequenter occurrit apud authores, proinde nos hic, ut alibi, in ambiguo relinquimus dispositionem hujus umbellæ. Poterit esse daucus (propter superficiem concavam) non minus quam visnaga; hoc enim est commune quibusdam sub diversis generibus contentis, ut supra diximus in observationibus generalioribus.

Pag. eadēm col. ii. pl. iv. gingidium folio pastinacea latifolia. C. C. P. gingidium primum, Dod. Caucalis Syriaca, Job. Baub. Hæc umbella cum non sit semine striato, non est gingidii, aut visnaga habenda species, nec caucalis apte à quibusdam dicitur, cum non habeat semen echinatum, aut aculeatum caucalidum more; ergo (ut alibi diximus) concludendum est, cum dispositione & compositione seminum membranaceorum, rotundor, & compressorum in margine fimbriatorum (Tordylii minimi Apuli, Col. ritu) tum positione foliorum lobatum, seu per lobos, aur pinnas rachi, seu pediculo medio adhærentium, sub tordylii signo militare debere. Per hanc eandem rationem à seselios classe acetur, ut à nobis dictum Prælud. Botan. pag. 372. Vide Tab. 5. cognitionis & affinitatis, & Tab. icon. 9^{am} in qua conspicuntur sphondylium, pastinaca latifolia sativa; ubi etiam tordylium Syriacum cum caulinis, foliis, & umbellis, seminibus membranaceis compres. rotund. & granulatis onusis representatur. Vide Tab. Generalem icon. sem. 28^{am}, hoc tordylium maj. Syriacum, & Apulum minimum, & vulgare majus limbo quasi levæ, nobis dictum; nil aliud sunt quam nothæ aut spuræ pastinacea latifolia species, quarum omnium semina, clypeum, scutumve formâ rotundâ, aut oblongâ representant: ac proinde nos ipsis nomen Anglicano idiomate adaptavimus, *Bucklerwort* in elenco Tab. 5. cognitionis & affinitatis.

SELINUM PUMILUM MONTANUM, Clus.

Selinum pumilum montanum, Clus. Hæc omnium umbellarum semine striato minore donatarum minima, annua est planta, & folia habet tenuiter dissecta. Quin & eadem est, quæ à Lobelio dicitur peucedani facie pufilla planta, quæ etiam si pro peucedano à C. Bauhino (ut infra docebitur) ponatur, tamen sub di-

versis generibus, & diversis nominibus collocatur cum revera saxifragæ tenuifolia sit species. Hoc facile apparet ex lectione Clus. & Lobelii, & seminum descriptione, atque ad se invicem collatione.

SAXIFRAGA PANNONICA, Clus. Hist.

Axifraga pannonica, Clus. Hist. Hæc est cum congeneribus suis in capite de dauco contentis hic collocanda, quarum maxima pars

foliis constat ferulaceis, & semine striato minore. Vide infra examen, Dauci post pastinacam tenuifoliam cap. de Dauco.

UMBELLÆ SEMINE STRIATO MAJORE,
foliis lobatis donata.

SILER.

Siler montanum, Clus. Hist. Dod. *Ligusticum* quod seseli officinarum, C. B. P. Plin. l. 19. cap. 8. & l. 20. c. 15. *Siler* nunc appellant, à Sile nomine deducto, quia pro seseli semine utuntur; at veteres etiam ipsum seseli fili & seli vocabant. Λιγυστικόν (Galeno Λιγυστικόν) ut plurimum in Liguria nascitur, quare à Λιγυστικόν nomen traxit, in monte scilicet Apenino dicto: incolis ravans dicitur. Dioscorid. l. 3. c. 58. *ligusticum sylvestre*, est in Ligurie montibus: panacem aliqui vocant.

ANGELICA.

Angelica, quam aliqui ad *Smyrnium*, alii ad *Laserpitium*, seu *Sylphium Cyrenaicum* referunt: etiam sancti spiritus radix dicitur, vel a radicis suavissimo odore, vel a facultate singulari, qua contra venena valet.

Pag. 155. & 156. Angelica sativa, odore, sapore intentiore, foliisque dilutiis virentibus, & flore herbaceo, ab omnibus sylvestribus distinguitur; adde quod sativa semina producit crassiora, & albidiaria. Sylvestres omnes angelicæ species eodem odore, & sapore afficiuntur, sed in remissiore gradu. Folia habent saturatiis virentia, flores albos, & semi-

na striis depressoibus donata, non alba, sed lurido; aut fusco colore tincta. Qui angelicam sylvestrem majorem, C. B. P. & sylvestrem montanam, C. B. P. imo & aquaticam, C. B. P. ad idem membrum sylvestrium tanquam tot varietates, cælo & solo, & consequenter magnitudine, & parvitate discrepantes reduxerit, ipsi non refragabor:

IMPERATORIA.

Imperatoria, qua obraras & præstantes facultates, sic nominata fuit, inter *laserpitum* & *panacem* media videtur.

P. 156. col. i. pl. *Imperatoria*. Odore & sapore omnino sese declarat esse angelicæ veram & genuinam speciem, atq; ex foliorum sinus amplioribus, & ferraturis profundioribus, atq; rugosis

& inæqualibus duftibus venarum, quibus folia afficiuntur, juriata rependi facultate: semineque depressoibus striis praedito, inter cæteras sui generis notu est facilis,

ASTRANTIA, SEU IMPERATORIA NIGRA.

Pag. 186. col. i. pl. v. *Astrantia nigra*, seu *imperatoria nigra*. Cum prædicta planta omnes habeat conditions ad perfectam umbellam constituendam, flores videlicet pentapetalos in umbella producunt, quorum singulis evanescentibus succedunt binæ semina striata, aspera, & oblonga, quæ clare intuentibus, & ipsam plantam florentem, & semina producentem examinantibus apparent ideoq; clare constat eandem veram & genuinam esse umbellæ speciem. Intueantur (quotquor sunt) Botanici curiosi librum ex quo ego hæc haui, (id est librum naturæ, ut sæpe à nobis dictum) & clarius luce meridiana prospicient me non sine summo jure incuriam & supinam negligientiam Botanicorum ante me scribentium, non solum in hoc loco, sed & passim in hisce meis observationibus in Casparum Bauhinum, aliosque Botanicos editis redarguisse. Varia fortia est hæc planta nomina ab authoribus neotericis imposita. Primo propter foliola in summo caulinum fastigio subtilis incana, supra viridia, stellatum cingentia basin radiorum sustinentium umbellatum flosculos minimos, astrantia

illi fuit inditum nomen. Quoniam vero folia singula pediculis suis immitentia, in quinque lobos utplurimum obscure videntur, saniculæ vulgaris more gerit divisa, saniculæ illi adaptarunt nomen. Ab aliis multis dicitur helleborus niger, seu veratum nigrum, à nigredine radicum, quæ ei cum multis aliis stirpibus (quæ non sunt hellebori species) communis est. Verum an non aprius à nobis cum Theod. Tabernæmontano imperatoria nigra astrantia dicta denominetur, legentum hæc, & perpendentium librum naturæ, judicium penes esto. Ex dictis concludimus C. Bauhinum inadvertenter aut faltem non satis diligenter evolvisse librum naturæ, etiam si authorum libros satis accurate perflustraverit, atque omnium stirpium synonyma in pinacem collegerit, opus certe dignissimum tanto viro, tot tantisque laboribus exantlati. Consule Tab. Icon. 4. ubi umbellam seminibus rugosis, striatis, oblongis, binatim junctis oneratam, data opera obtulimus. Vide Tab. generalem Icon. seminum Rr & 85. & 86. ejusque explicationem.

SMYRNIA.

Pag. 154. col. i. pl. xiii. σμύρνιον *Dioscorid.* ἵπποσιλίνιον *Thoophr.* in *Sicilia proveniens*.

U M B E L L Æ L O B A T Æ M I N O R E S ,
semine striato minore donatæ.

S I S A R U M .

Σισάρων Dioscoridi lib. 2. cap. 139. vulgo cognitum, cuius radix elixa, ori grata est. *Siser* Plinio lib. 19. c. 5. quod olim in Germania cibi causa serebatur, quare eam quotannis à Germanis Tiberius Caesar (Plinio scribente) flagitavit.

Pag. 155. col. ii. pl. ii. *Sisarum Syriacum*, C. B. P. secacul Arabum, seu Maurorum, sive pastinaca marina Rauwolfi Hist. Lugd. app. Nec Rauwolffius (qui prius hanc plantam detectus & descripsit) nec ille qui eandem ex Rauwolfio transcriptus, inque Historiam Lugd. transluit verbatim, ullam hujus seminum fecere mentionem, ac proinde difficile est determinare, ad quod genus sit reducendum. Hoc nimis familiare authoribus est, umbellas breviter describere, earumque semi-

num oblivisci, aut saltem eadem negligenter appendi curare: si fit semine pericarpio cartilagineo spinoso testo, poterit adungi crithmo marino spinoso, & pastinacæ echinophoræ Col. ex quibus emergere potest decimum genus subalternum umbellarum à semine pericarpio cartilagineo sursum spinoso involuto, vide in explicatione tab. 2. in qua disponitur crithmum marinum spinosum.

P I M P I N E L L A S A X I F R A G A .

Pimpinella & *Bipenella* à recentioribus, ab ordinibus binis foliorum pinnatim seu plumatum digestis, sic nominatae, veteribus indicatae existimantur: quæ etiam *Bipennula* & *pampinella* vocantur. *Hæc duplex est*, *pimpinella saxifraga*, seu *saxifraga*, à facultatibus calculorum è renibus expellendorum: altera *pimpinella sanguisorba*, vel *sorbastrella*, quod sanguineos fluxus sistat: quæ πυρηνεῖ Myrepso, & quibusdam (ut Fab. Columnæ) sideritis 2. *Dioscoridis* censetur.

Pag. 160. col. i. pl. vi. *Pimpinella sanguisorba major*, & tres sequentes, col. ii. aliæque quoiquot sunt hujus farinæ à nobis additæ, aut ab aliis posthac detegendæ & addendæ, cum non sint umbellæ propriæ dictæ, non debent hic locari, sed ad calcem umbellarum inter improprie dictas, ut alibi à nobis ostensum. Propter foliorum in appositione similitudinem, cum *Pimpinella*

la *saxisraga* convenient, sed à spica longiori, floribus, & seminibus diversis discordant: Proinde, nisi me animus longe fallit, aptius à nobis ad congeneres umbellas improprie dictas relegantur, quam hic inter umbellas proprie dictas à C. Bauh. collocantur.

S I S O N .

Σισών Dioscoridi l. 3. cap. 64.

S I U M .

Σιον Dioscoridi l. 2. c. 154. ἀνὸς οὐσίαν, quod in aquis vacillando, ab iisdem præterlabentibus securtiatur: vel potius ab excutiendis calculis. Plin. l. & c. 22. *Sion forte*, ejusdem l. 26. c. 8. laver.

U M B E L L Æ F O L I I S P L U R I F A R I A M D I V I S I S ,
semine striato majore donatæ.

Σέσελι Dioscoridi l. 3. cap. 60. quatuor generum, μαγαραλεόνηγον, foliis fæniculi: αιθιομηγον, foliis hederæ: πελοποννησιανηγον foliis cicutæ latioribus; υρετηγον sive τρόδυλον; Plin. l. 8. c. 32. ex Aristotelis l. 9. Hist. cervas ante partum purgari herba quadam quæ seselis dicatur scribit: & l. 25. c. 8. Seseli cervæ enixa à partu monstravere: & l. 20. c. 22. *Tordylion* est semen ex seseli.

Pag. 161. col. i. pl. iii. *seseli Creticum majus*, C. B. P. *Tordylion*, seu *seseli majus*, Hist. Lugd. ibidem pl. iii. *Seseli Creticum minus*, C. B. P. *seseli Creticum* Lob. Adv. Lobelius duas exhibit icones seselios Cretici in observationibus suis, quibus superscribuntur *seseli Creticum majus*, & *seseli Creticum*. Nobis videtur Lobelius illuc exhibuisse, seu appinxisse semina caucalidis majoris Clus. quæ à nobis describitur & pingitur sub nomine *Tordylion* majoris, limbo quasi lxxvi. Cum fimbrias, seu granula omiserit in figurâ utraq; & fimbrias descripterit in adversariis his verbis, semina sunt alba, copiosa, circinata, quasi torematis elaborata, orbiculata, compressa, binatim juncta, clypeoli speciem referentia, aut Lobelius in observationibus, & iconibus, per duas suas icones intelligit unam eandemque plantam, videlicet *Tordylion nostrum* majus vulgare sine granulis, aut per descriptionem à se allatam in adversariis intelligit *Seseli Creti-*

cum, seu *Tordylion Syriacum* minus, aut Apulum minimum nostrum, cuius figuram non exhibuit. Insuper notandum quod *seseli Creticum majus*, & *minus*, & *Creticum fructu majore*, & *Creticum minimum* pl. iii. iv. v. & vi. ibidem, male à C. B. P. & aliis *seseli* dicuntur, cum ex libro naturæ non sint semine striato, sed semina producant membranacea, compres. rotunda; quare ad congeneres debent referri umbellas (quarum gerunt tesseram) videlicet *sphondylium*, *pastinacam latifoliam*, *panacem heracleum*, ceteraque tam dexteræ quam dexteræ sub *Tordylion* nomine, quod nomen à Plinio jure merito iisdem attribuitur, à forma seminis clypeum aut scutum referentis. De seminibus *Tordylion* consule Tab. General. icon. sem. 27 27. 28 28. 29 29. Atque de seminibus umbellarum congenitum, sem. membranaceo, compresso, rotundo, aut oblongo præditarum vide Tab. Gen. icon. sem. 20 20. 21 21. 22 22.

23 23. 24 24. 25 25. 26 26. 27 27. 28 28. 29 29. 30 30. 31 31. 32 32.
33 33. 33^a 33^b Ibidem observabis secundum intentionem naturae,
dispositionem omnium congruentium inter se à forma & figura,
imo & consistentia seminum.

Pag. 862. col. i. pl. xi. *Seseli palustre laetescens*, C. B. P. &
Prod. *Palustre*, Cam. in Hort. Hoc folia habet tenuiter dissecta,
ut seseli pratense, atque ab eodem solo succo lacteo ex quali-

bet hujus parte rupta manante, & semine compresso, mem-
branaceo, oblongo, seu subrotundo dignoscitur, ac proinde
habita ratione feminis non hic cum seselion speciebus colloca-
dum judicavimus in Tabulis nostris affinitatis & cognationis,
sed ad congeneres, similibus feminibus compressis, membra-
naceis, & subrotundis, & foliis plurifariam divisas præditas
amandavimus ad calcem 7^m capitii.

C I C U T A.

Kōneov Theoph. 1. Hist. 8. & 6. ejusdem 2. Dioscorid. l. 4. c. 79. Etymologicus ita nominatum
tradit, Κατά τον καταγόμενον τον πότον τούς πίνοντα. Quare Galenus lib. quod animi mores 3. quod cicuta epo-
ta fultitiam pariat, κωνέον δicit a, desumpto nomine ab eo affectu, quia corpus ipsum torquetur. Plinio l. 25.
c. 13. cicuta, cuius caulem viridem à plerisque edi scribit: verum qui sapiunt, ab hujus esu, Socrateo exemplo mo-
niti, abstineant.

Pag. 161. col. i. pl. iv. *cicutaria latifolia tertia*, C. B. P. *cicutaria maxima* Brantoni, Lob. Ob. Nec Lobelius hic (sicut in
multis aliis locis) satis sibi constat; an inquit hæc *cicutaria nostra*
maxima fœtida, aut *Thapsia* 3^{ia} *Salmanticensium*, Clus. vulgo can-
beia, quæ est Clusio *Thapsia* 3^{ia}, & caulem trium aut 4. digito-
rum crassitum æqualem habet, instar caulis ferulae, imo aliquan-
do humanam altitudinem superantem, flores etiam habet luteos &
semina matura, laeta, acerosa, alvæ foliacea cincta. A floribus &
semine quilibet potuerit ex libro naturæ eductus concludere
esse *Thapsia* speciem cum Clusio, quem & ipse Lobelius citat, sed
quia sub nomine *cicutæ* à Brancione ipsi communicata erat, ca-
cutiens præterit authoritatem Clusii. Quin & vitio vertendum
est Casp. Bauhino, qui non attentius perpenderat mancam & im-
perfectam Lobelii descriptionem, atque ejus dubitandi ratio-
nen puerilem in observationibus, ex quibus aperte & mani-
festè concludendum est, non esse *cicutam* Brancionis, sed
Thapsiam 3^{iam} Clusii sub nomine *cicutæ* missam.

Pag. 161. col. i. & ii. pl. v. & vi. *Cicutaria palustris latifolia*
alba & *rubra*, C. B. P. Hist. Lugd. Cum ex descriptione Dalpiⁱ
in Historia Lugd. sem. sunt longo, nigro; & ex Camerario

sunt oblongo semine cerefolii, male constituuntur *cicutæ* aut *cicutariae* species, quippe hæc semine striato majore donantur, at
prædictæ *cicutariae* palustres proprius ad cerefolium sylvestre se-
minibus lævibus, nigris accidunt, ergo male disponuntur à C.
Bauhino quia male nominantur à Dalpiⁱ in Hist. sua Lugd.

Pag. eadem col. ii. pl. ix. *Cicutaria bulbosa*, C. B. P. *cicutaria*
Pannonica, Clus. *Bulbocastanum coniophyllum*, Thal. Hæc umbel-
la, cum sit pariter sem. rostrato & striato, ad myrrhidum classem
pertinet, non ad *cicutæ* ordinem, semine striato majore brevi
prædictæ; ergo male à Casparo Bauhino inter *cicutarias* dispo-
nitur, properea quod major pars authorum ante se scribentium
denominationem indidere, & *cicutariam* appellavere; rectius
ex libro naturæ myrrhis dicitur *tuberosa*, nodosa, *coniophy-
lon*. Figura virtutis exhibetur à Tabernæmontano, melior à
J. Bauhino Tom. 3. Part. 2. De hisce supra dictis & de infra di-
cendis judicent docti in arte Botanica, & ad lydium lapidem,
librum scilicet nature mecum & hic, & alibi configuentes,
meæ accedere sententia procul dubio ipsos neceſſe erit; na-
tura monstrante viam, homini Philosopho deviare haud facile
erit, si rebus ipsis dicta hæc mea applicentur.

OE N A N T H E.

Oivavδn Dioscorid. l. 3. c. 135. quasi flos vinosus, quod odore & quadantenuis colore, non sit viti dissimilis:
vel potius, quod cum vite floreat: & λευκερον à florum candore, quos producit: cuius radix magna, in multa
rotunda capitula extuberans. Plinio l. 21. c. 24. œnanthe radice magna numerosa, &c.

Pag. 162. col. i. pl. i. *œnanthe apii folio*, C. B. P. *œnanthe* 3^{ia}
Matth. Hist. Lugd. Confuse traduntur hujus synonyma à Casp.
Bauhino. *Angustifolia* Lobelii radices habet carnosas, crassiflu-
cas, fusiformes, at 2. Matth. Hist. Lugd. radices sunt filipen-
dulæ instar, sicut & filipendulæ tenuifoliæ Tab. Quin & præde-
centi synonymum adjungit Casp. Bauhinus *Cymimum* *Bulbosum*
Plinii Col. quod est *Bulbocastani* species, ut ait ipse Doctissimus
Andreas Cæsalpinus, ac proinde arcendum ab *œnanthes* specie-
bus.

Ibidem col. ii. pl. iii. *œnanthe pastinacæ sylvestris folio*, semine
atriplicis, C. B. P. *œnanthes* species altera Dalpiⁱ Hist. Lugd.
Nec hanc videre hucusque cuivis Botanico per agros Mon-
spelienses expatianti præter Dalechampium videre contigit.
Semen ejus *atriplicis* saltem valde suspeatum habeo; forte ex
schedulis vetustis Dalpiⁱ Molinæ deceptus in hoc, sicut multis
aliis, mundo imposuit.

Pag. eadem col. ii. pl. iv. *œnanthe aquatica*, C. B. P. *Siser pa-
lustre* Hist. Lugd. Perperam Casp. Bauhinus hoc posterius syn-
onymum collocat cum junco odorato aquatili Dod. sunt enim
hæc duæ toto celo differentes *œnanthes* species, ut cuilibet in-
tenti, & easdem in pratis uidis, paludosis, & fluviorum ripis
consideranti appetat; *Siser palustre* enim Hist. Lugd. optime
œnanthen cicutæ (potius apii) folio odore viroso refert. Con-
sule Tab. nostram suprà de *œnanthe*, ejusque explicationem.
Insuper Lobelius *œnanthes* aquaticæ duas apponit figuræ, unam
cum nodulis, alteram sine tuberculis, radice repente. Taber-

næmontanus duas itidem assignat icones pro una & eadem plantæ
filipendulæ sūa aquatica, at neuter discriminis meminit, in descrip-
tionibus. Sunt tantum diversitates pro anni tempestate variantes.

Pag. 163. col. i. pl. v. *œnanthe bederae foliis*, C. B. P. *œnanthe*
Myconi, Hist. Lugd. Hæc, umbella non est, multo minus
œnanthes species; flores, & semina, etiam radices ranunculi ritu
producit, quin & causticam habet facultatem ranunculorum plu-
rimorum more, ergo male à Doctissimo Casp. Bauhino sequenti
Dalpiⁱ in Hist. Lugd. *œnanthe* nominatur; potiore jure cum
Johanne Parkinsono, *Ranunculus Thaliætri* folio, radice aspho-
deli nuncupatur.

Ibidem, col. ii. pl. vii & viii. *filipendula vulgaris major* & *minor*,
C. B. P. Haud apposite hic associantur hæc duæ cum *œnanthe*
umbellifera à C. Bauh. Non sunt umbellæ, ut supra satis demon-
stravimus, multo minus pro *œnanthes* speciebus habendæ sunt.
Idem dicendum de Barba capræ. Vide doctrinam nostram de
umbellis impropter dictis.

Pag. eadem col. ii. pl. ix. & x. *Pedicularis* seu alestorolophos
ejusque species male hic locantur à Casp. Bauhino & disjunguntur
à cæteris suis classis infra, alibi etiam collocandis. De hisce
prolixius, & clarus suo loco & sectione propria Galeatarum,
quam sectionem ordine & methodo à natura data in lucem
dare (si deus dederit) anno sequenti proposuimus; sint Mæ-
cenes non deerunt Matheoli, aut qui non solum ipsius, sed om-
nium Botanicorum humeris sublati, claris & perspicaciis
è longinquò observabit, quam omnes hucusque præstiterunt.

C R I T H M U M.

Kεῖθμον sive κεῖταυον Dioscoridi l. 2. c. 157 foliis pinguis, albicantibus, portulacam spissitudine, neutiquam
forma referentibus, sed crassoribus, longioribus, salsoque gustu, floribus candidis, &c. in muria servatur,
cruda & cocta editur. Plin. l. 21. c. 15. *Batin* appellasse videtur, *Batin marinam*, & *Batin hortensianam*, quam
aliqui asparagum *Gallicum* vocant, sine ullis notis preponens: *Batis* etiam l. 21. c. 27. meminit, que aluum mol-
iat, nec plura habet.

Pag. 288. col. i. pl. i. & ii. *Crithmum sive faniculum marinum majus odore apit*, C. B. P. *Crithmum, sive faniculum maritimum minus*, C. B. P. Cum haec duæ sint perfectæ & omnibus numeris absolutis verae, & genuinæ umbellæ, à floribus pentapetalis albis, & semine striato binatum juncto, perperam omnino, hic pag. 280. collocantur inter crassifolias plantas, portulacam scilicet, & kali, & propter conformitatem foliorum crassitiae, & spissitudine succulenta, à Casp. Bauhino, in sylvas tanquam spuria proles expositæ, à congenerebus umbellis scilicet feceruntur. Melius à nobis inter affines umbellas semine majore, striato, foliisque plurifariam divisis donatas disponuntur; aut (si quis mavult) inter umbellas feniculaceis foliis, & semine majore striato affectas collocari possunt. Versentur inter affines, nostra parum interest. Sed aptius & melius ex hac, & pastinaca echinophora, Col. constitueretur 10^{um} genus subalternum, ut alibi dicitum.

Pag. eadem col. ii. pl. iii. *crithmum maritimum flore asteris Attici* C. B. P. Propter crassitatem, & spissitudinem succulentam foliorum, male hinc jungitur cum Crithmis umbelliferis. Cum Crithmum maritimum asteris Attici flore, sit planta stellata pap-pescens (sicut olim nos observavimus in rupibus altis Arno-ricis non longe distans ab oppido Poligon paucis milliaribus ab

ostio Ligeris) debet amandari ad sibi consimiles, videlicet astrem, conyzam, helenium, Doronicum, & cæteras id genus alias. Folia spissa crithmi instar inseruent ad speciem generis, sub quo militat, determinandam.

Ibidem col. ii. pl. iv. *Crithmum maritimum spinosum*, C. B. P. seu *crithmum spinosum*, Dod. Notari debet (inter cæteras omnes umbellas) quasi quid peculiare huic conveniens, quod bina semina striata oblonga, in pericarpio cartilagineo, seu membranaceo oblongo & in summitate senas, nunc plures, nunc pauciores spinas producat. Idem cernitur in pastinaca echinophora Apula, Col. quæ est (ut infra dicemus in hallucinationibus) Casp. Bauhino pastinacæ tenuifoliæ species. Forte etiam secacul Arabum seu pastinaca marina circa Halep proveniens, de qua diximus in hallucinationibus C. Bauh. de sisaro supra. Quicunque ex hisce speciebus, genus subalternum decimum, umbellarum proprie dictarum constituerit, addendo idem immediate post nostrum crithmum spinosum sem. itidem striato, cartilagineo pericarpio inclusi, ipsi non refragabor: cum regumentum habeant cartilagineum, sicut cachryes omnes, seu libanotides cachryferæ pericarpio fungoso, molli semina habent involuta. Reliquum omnium umbellarum semina dupli tantum cortice investiuntur exteriori duriori, & interiori molliori sine pericarpio hujusmodi cartilagineo, aut molli fungoso.

A P I U M.

Σέλινον Dioscorides l. 3. capitibus sex scilicet 74. & sequentibus proposuit; *υπάταιον*, seu *hortense*: *ελαύσελινον*, in humidis: *ορεοσέλινον*, in montosis: *περγοσέλινον*, in Macedonia: *ιπποσέλινον*: tandem *ορύριον* in Cilica prove-niens. Theoph. 1. Hist. 4. de selino egit, cuius plura esse genera 6. caus. 22. scribit: hec 7. Hist. 4. inter secum foliis, tūm caulis differunt: aliud enim folio spiso, crasso, densoque: aliud rariore, latioreque, cauleque majore: horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut versicoloris. Plin. l. 20. c. 11. de Apio, Hippaselino, Eleoselino, & oreoselino, & cap. sequenti de petroselino & buselino egit.

Pag. 153 col. i. pl. iv. *apium montanum folio ampliori*, C. B. P. *Oreosolinum*, vel veelguta (id est multibona, Dod. pl. vii. *apium sylvestre laetivo succo turgens*, C. B. P. *Thysselinum Plinii*, Lob. pl. viii. *Apium montanum nigrum*, C. B. P. *Oreoselinum Parisiensem*, Hist. Lugd. pl. ix. *apium peregrinum cicutæ facie*, C. B. P. *Selinum peregrinum* 2. Clus. Hist. Apium verum & genuinum secundum doctrinam nostram novam in tractatu superiori propositam, & ex libro naturæ depromptam, est semine striato minore, subrotundo, sed haec quatuor apii species suprà citatae & sic nomine nominatae à Casp. Bauhino, cæterisque authoribus neotericis, neutquam sunt genuina apia; cum omnes haec umbellæ sint semine membranaceo, depresso, rotundo, aut subrotundo affectæ: aliò ergo sunt remittendæ; aptissime ad septimum genus subalternum seu caput 7^{um} doctrinæ suprà tradita nostræ, & si quæ alia hujus farinæ detegantur eodem debent amandari. Edidimus nostra, jam carpiimus supinam negligentiam, & inexcusabilem incuriam authorum passim transribentium. Sicut vulgo dicitur, canis festinans cæcos parit catulos, pariter autores multi inter Botanicos, pruritu quodam scribendi aut potius transribendi, sine debito examine rerum ipsarum, errant cum errantibus, & dictum dicunt; quod contigisse multoties observavimus apud Botanicæ artis scriptores, quia multi alijud agentes, medicinam factitantes, perfunditorie tantum & quasi per transennam Botanographos præstare cupiunt, quemadmodum multi posteriori hoc seculo in musæis suis transribendo & compilando aliorum ante se scribentium opera, ingentia & decumana volumina confarcinant, atque pro suis venditant, nihil aut, parum ex propriâ inspectione aut (ut ita loquar) cerebro proprio depromunt deteguntur: sed authorum aliorum verborum longam seriem captantes, eandemque chartis suis inserentes, res ipsas ex libro naturæ haurire, easve seria indagine venari, hucusque ipsiis animum nondum subiit; atque ex hujusmodi neglectu, parum reipublicæ literariae Botanicæ emolumenta ex ipsorum scriptis advenit, verum maxima confusio, & tædiosa prolixaque verborum lectio in multorum monumentis appetet. Quæ hic dicimus absque injuria cuiquam probo & ingeniosi scriptori sint, cum sunt vera, atque ratione & oculari inspectione, aliisque sensibus in opem advocatis inituntur; nam quæ nos in medium proferimus, ex diligentí examine & consideratione exacta florum, capsularum seminalium, & seminum ad genera intermedia reduximus, nulla habita ratione denominationum variorum authorum. Indistinctis enim generibus species multis modis confundi necesse est. Cognitis autem generibus species facile eliciuntur, à foliis, caulis, radice, colore, sapore, odore, quæ omnia postularunt primariò ἀντηλιαν, tamque diligentem, præter labores & lucubrationes per multos annos exantlatos. Nos sic hanc sectionem condidimus, cæterasque etiam composimus, quas publico expondere brevi decrevimus. Sed ne currente calamo longior fiat digressio, revertamur ad hallucinationes Caspari Bauhini, & cæterorum authorum, ex quibus collectionem nominum stirpium

in Pinace contentarum hausit Casp. Bauhinus, qui duas distinctas species prædictarum constituit, oreoselinum montanum scilicet, folio ampliori, & oreoselinum Parisiensem seu nigrum, que solimmodo una & eadem est species, diversa tantum natibus; nos in Monte Valeriano Sequano fluvio vicino, Suræneosq; pago imminenti, ipsam plantam à Dalp^{io} in Hist. Lugd. propositam copiosè provenientem offendimus, alibique in peregrinationibus nostris per Galliam, sub auspiciis Serenissimi Regii Ducis Aurelianensis vidimus, nominatim intra sepræ Regiæ Chambort, cujus semen utrobique collegimus in monte prædicto quinis abhinc luitris, ducente me èo præceptore Dignissimo Vespasiano Robino. Figuram seu iconem seminis illic collecti in Tab. Generali icon. sem. damus. Vide 31. 31. non est oblongum, nigrum, acre, odoratum, ut sunt myrrhidis semina, nec cumini semini accedit, multo minus apii semini est simile, ut vult Dalp^{ius} in Hist. Lugd. Ex omnibus authoribus citatis à Casp. Bauhino, non elicetur oreoselini in monte Suræneo pago imminenti vera delineatio seminis; hoc familiare est multis, aut omittere seminis descriptionem, aut falsò affingere quando nunquam observarint: ut hoc in loco Dalp^{ius}, dum cumino simile ejus semen afferit, verba quæ illic addit de semine, sunt ex Dioscoride transcripta; atque Dioscoridis verba alii umbellæ quam cerefolio convenire non possunt; neque oreoselino, aut apio montano Parisiensem adaptari debent. Natales ipsum Dalp^{ius} produnt; ipse nunquam oreoselinum Parisiensem contræstatavit semina, sed Dioscoridis verba citat, & reliqui omnes ex Hist. Lugd. transcripsere: ergo cum oreoselinum Parisiensem semen habeat membranaceum, compressum, oblongum adinstar peucedani aut thysselii, tribus striis ovatis depreiñoribus in gibba parte præditum, coloris pariter ruffi, inter congeneres haec sicut & omnes prædictæ apii species à nobis notatae, sunt collocandæ: cum propinquiores à propinquioribus seminibus essent digerendæ, & consequenter nominandæ. A similibus seminibus similes deteguntur vires & facultates, quod nos ut plurimum observavimus, non scilicet in umbellis, sed & in tota stirpium cohorte; in quibus itidem considerentur flores & capsulae seminales.

Ibidem pl. x. *apium peregrinum cicutæ folio*, C. B. P. *Selinum peregrinum* 2. Clus. *Oreoselinum aliud*, Hist. Lugd. Selini peregrini 2. Clus. semen ex Carolo Clus. est latum, minus tamen quam ferula. At oreoselinum aliud Dalpⁱⁱ Hist. Lugd. flore est in umbella candido, semine apii odorato, & amaro; folia ei sunt cicutæ; quin & hoc est oreoselinum aliud in montibus Valerianis teste Dalp^{io} ipso, in eadem Hist. Lugd. ergo frustra adhibuit hoc synonymum bis repetitum, C. Bauhinus sequendo Dalechampium, cum ex Clus. verbis selini peregrini 2^{di} semen sit latum, minus tamen quam ferula; at ex Dalp^{io} oreoselinum aliud in montibus Valerianis (ut dictum) est semine apii odorato, amaro; ergo disconveniunt quoad descriptiones seminum, atque bis repetitum imo ter à Dalp^{io} in Hist. Lugd. Vide apinm montanum, Oreoselinum Parisiensem, & oreoselinum aliud in Hist. Lugd.

AMMI

A M M I .

Αὐτοὶ Dioſc. lib. 3. cap. 70. quod κύμινον καὶ διομήνην οἱ Βασιλίην vocant. Plin. l. 20. c. 15. Ammi quod Graci vocant, cumino est simillimum: quidam cuminum Ἀθηναῖον existimant, Hippocrates regium appellat.

Baub. pag. 386. *Eryngium arvense* foliis ferræsimilibus, C. B. P. ammi quorundam Dalpii Hist. Lugd. Cum hæc sit umbella perfecta, & omnibus modis genuina, & vera ex definitione umbellæ à nobis ab initio hujus tractatus assignata, flore, femine odore, sapore ammeos speciebus accedit, proinde male inter carduos nothos (ex nostra doctrina) eryngia scilicet, à Caspary

Bauhino, aliisque quibusdam authoribus recensetur. Ex dictis debet illinc ex eryngiorum numero averruncari, & hic inter socias plantas disponi, quemadmodum cum Dalpio præstitimus. hujus assertioñis penes examen esto veritas, penes judicium rite mea dicta examinantium esto cognitio, non credenda sed revera examinata, examinanda tamen exhibeo.

C A R U I .

Καροῦ Dioſcoridi lib. 3. c. 64. κύπεον, Αἴτιον καροβάδιον, Simeonis Sethi lib. De Allimentis. Carenum Plin. l. 19. c. 8. in Caria regione, in qua laudatiss. nascitur.

Pag. 158. col. i. pl. ii. carui Alpinum, C. B. P. & Prod. Cum C. Bauhinus umbellæ hujus seminum formam in descriptione sua non exhibeat, incertum, an ad carui, an ad anethum sit reducenda.

Ibidem planta iii. *Caruifolia* C. B. P. fœniculum sylvestre, Hist. Lugd. Est fœniculo vulgari, seu sativo procerius, ad tantam

altitudinem in Mauritania accedit, ut ad 12. cubitos pertingat. Niſi semen ejus sit odore carui, vix credibile est ut hoc inter species carui reduci debeat. Forte est fœniculum giganteum Mauritanicum.

A N I S U M .

Aνίου Dioſcoridi l. 3. c. 65. anisum, quidam authore Plinio l. 20. c. 17. quasi αὐντὸν vocavere, quod appetentiam cibi præstaret, & forsan sic dictum, ὅτι αὐνοῖ τὰς ἐμπνευματῶσις, quod tentiores flatulentias internas & externas remittat, & laxet.

Pag. 159. col. ii. pl. ii. Anisum peregrinum, C. B. P. anisum Philippinarum insularum, Clus. Hist. Hæc planta non est umbella, ergo multò minus est anisum, est enim planta sui generis; odor non facit hīc ad genus constituendum, cum non versetur inter congeneres, à forma florui & seminum deberet denominatio generică defūti, & hic, & alibi ex doctrina nostra; odor inservit secundario tantum inter congeneres, ad species determinandas, ut sæpe alibi obſervavimus passim in Historia Generali à nobis costructa, apud authores omnes, v. g. alliaria significat plantam allium redolentem, nos tamen habita ratione tesseræ suis confitibus convenientis genericæ, cum sit planta tetrapetalæ filiæ, inter tetrapetalas filiolas collocavimus; atque aptius mea opinione denominabitur hesperis allium redolens, sic affigno odorem ad tales speciem peculiariter determinandam genericæ prædictæ scilicet tetrapetalarum filiolarum: sicut scoridum indigitat plantam Σκόριδον, allium pariter redolens, sed cum sit planta verticillata, Galeata, chamædri omnibus suis parti-

bus conveniens; ex libro naturæ edoſtus nominabo Chamædrin palustrem, allium redolentem, sic inter socias plantas generice convenientes collocando, relinquo odorem ad peculiariter & secundariò tales speciem determinandam, & ita de cæteris. Revertamur ad anisum Philippinarum insularum, non est umbella, ergo male primò à Carolo Clus. deinceps à Casp. Bauhino & aliis posteriori hoc seculo ex ipsis transcribentibus disponitur. Hoc passim obſervo Botanicos authores ut plurimum cum primo errante, & male adaptante nomen plantæ, cum ipso errare, nec res ipsas examinant, sed scripta & dictata aliorum transcribunt, an verba convenientia rebus perraro inquirunt; præponderent hæc quæ dico homines (ad quos scribo) docti in arte Botanica, illorum judicium & existimatio valebunt. Nec mihi animus est captare auram popularem, sed prodeſſe Botanicis; methodum proponendo in vegetabilibus addiscendis, qua instruti homines Botanicen discendi cupidi, possint, ex arte confusissima, ad scientiam perducere Botanicen.

P Y R E T H R U M .

Πύρεθρον Dioſcor. l. 3. cap. 86. ab igne nomen habet, ob radicis ejus fervorem igneum: salivaris Romanis, quod mansa salivam eliciat, apud Pl. l. 28. c. 9. Pyrethri nomen solum habetur.

Pag. 148. col. i. pl. i. *pyrethrum* flore bellidis, C. B. P. Propter fervidissimum gustum sequenti pyrethro umbelliferò, hoc pyrethrum corymbiferum conjungitur hoc in loco, sed male tamen à C. Bauhino, aliisque authoribus modernis ipsum sequentibus, inter umbellas disponitur, quare cum pyrethrum corymbiferum sit planta stellata, inter stellatas corymbeferas (si solida producat semina sine pappo, quod vere simile est) foret collocanda; si secus, si semina emitat in pappos abeuntia, ad stellatas pappescentes, seu pappolas esset amandanda, cùm nobis hucusque plantam ipsam videre, & contrectare nondum licuit, multò minus semina contemplari; & ideo in incerto relinquimus, ad quodnam horum generum sit reducenda. Hoc certò scimus non ad umbellas reduci debere, propter fervidum gustum, aut pares qualitates quas possidet. Quin & ex libro naturæ facile reducitur (ut dictum) ad alterutrum prædictorum generum, præcipue autem ad ejus, cuius ferre observatur tesseram. Hinc ex dictis facilis, aut nullo quasi negotio, quilibet plantam hanc stellatim florentem, ad suam classem distinctam redigere poterit, assignando intensissimum fetvorem pro nota specifica, ipsam ab aliis sui generis sequentem.

Ibidem pl. ii. *Pyrethrum umbelliferum*, C. B. P. *Pyrethrum verum* Matthii. Hist. Lugd. Umbella hæc variat (afferente Bauhino in pinace) vulgo est alba, at in horto patavino lutea & longioribus foliis collecta ab ipso, ibidem. Longe fallitur C. Bauhinus dum variationem tantum dicit; nam una & eadem species, neutquam conspicitur fl. albo & luteo varians in umbellis, intelligo colorem perfecte luteum, si ochroleucum intelligit, hoc admitto.

Cæſalpinus semina pyrethri sui umbelliferi, compressa, rotunda, nigra, ferventia, figuræ lentis exhibet, in descriptione sua, pag. 294. folia itidem assignat staphylini sylvestris tenuiora. At Gesnerus cum aliis neotericis suo pyrethro folia attribuit anethi foliis similia. Ab aliis dicitur esse semine striato, ut sunt anisi, sic adeò confuse ab omnibus, aliis ex aliis transcribentibus exhibetur hoc pyrethrum umbelliferum, verum; ut nec sibi satis constare videantur in descriptionibus suis cùm quad diversa folia, tum diversiformia semina. Hac tamen certa & infallibili notâ ab omnibus traditur semini esse fervidissimi gustus, sicut & radix pyrethri; quod nos hic collocavimus, est semine rotundo, striato anisi imitar, non au-

X tem



tem compresso lantis forma, hoc alibi à nobis disponendum venit inter congeneres, sem. membranaceo, compresso, subrotundo, foliisque plurifariam divisis, ad finem cap. 7. cum Thyselio, & apio montano quadruplici, seu oreoselino male disposito inter apii species, ut suprà à nobis notatum fuit.

Ibidem col. ii. pl. ii. Pyretrum folio anethi, C. B. P. pyretrum, Gesneri, Hist. Lugd. Matthiolus & Guilandinus plantam hic supra expressam, pyretri nomine donarunt, cui radices, & folia ut

cotulae fastidae, umbellae quasi in centro, multis petiolis innixa & inis veneris ritu, aut anethi, candidi flosculi, fervido & amaricante gustu. Non tam efficaces habet vires, quam pyretrum officinarum. Hęc Dalp^{ns}, sed more illi aliisque authoribus solito, & consueto neutiquam semen meminit. Sit semine compresso anethi ritu, sit carui, aut anisi more, facile reducetur ad suum peculiare genus, quin & omnes umbellae descripsæ pariter (ut sèpè dictum) secundum hanc nostram doctrinam umbellarum, ad suas congeneres facile reduci possunt.

UMBELLÆ FOLIIS QUID PECULIARE referentibus præditæ.

PERFOLIATA.

Perfoliata sic dicta, quod singula folia caulis penetret: quam alii cacaliam Dioscoridis l. 4. c. 123. suscipiantur: alii cotyledonem ejusdem l. 4. c. 92. pronunciarent, ni radix obstareret: alii seseli Aethiopicum ejusdem l. 4. c. 61. censem.

Pag. 277. col. ii. pl. ix. perfoliata gramineo folio seu Bupleurum angustifolium Alpinum, C. B. P. Sedum Petreum Bupleuri folio, vel Bupleurum Petreum Gramineo folio, Pona. Hęc planta male inter umbellas, & consequenter perfoliatae species collocatur, cum ex libro naturæ, sit perfecta. Sedi species, ut appetat ex descriptione Joh. Pona, & Doctissimi simul & laboriosissimi J. B. quod colligere quilibet poterit, juncto iconis intuitu, ex auctoritate & hujus, & aliarum stirpium. Plantam ipsam florentem, & semina ferentem vidimus, quæ ex capsulis suis seminalibus collecta, in promptuario nostro seminario (cum 2500. aliis diversis) recondita impræsentiarum servo. Cum omnibus suis partibus essentialibus sese demonstrat sedum, male hic à Casparo Bauhino solo disponitur, suinendo denominationem à foliis ante caulis latiore basi adhaerentibus: si autem melius observasset figuram gramineorum foliorum, magis apposite cum Joh. Pona denominasset Bupleurum Gramineo folio saltem inter

umbelliferas disposuerisset. Folia à figura, spissitudine, magnitudine, & parvitate, incisura, seu divisione, & colore, inseruant tantum ad species determinandas tam in hac sectione umbellarum, quam in aliis. Cognoscantur perfectæ genera planarum, & species facile discernuntur easdem distinguendo a radice, caule, foliis, odore, sapore, & colore, &c. Nota denique Casparum Bauhinum aliosque Authores Historias generales edentes, & absque methodo componentes, transcribendo verbatim à seinvicem; perfoliatam & Bupleurum ab umbellis separasse, quia umbellæ reseram non bene observarunt. C. Bauhinus in Pin. pag. 278, collocavit inter helenum & centaurium minus: reliqui post ipsum scribentes idem fecere (excepto oculatissimo nostro Botanicorum Coryphæo Joh. Bauhino, sed cum sunt umbellæ perfectæ semine striato donatae, ad suas congeneres rediuximus in Tab. quemadmodum alibi observavimus in Prælud. Botan. nostr. pag. 399.

BUPLEURUM.

Bo^{πλευρον} Hippocrati & Nicandro in Theriacis. Plin. l. & cap. 22. Bupleuri meminit, ubi aliqui ammi vulgatus intelligendum censem: licet Bupleurum Plin. rectius valerianæ campestris (quæ etiam lactuca agnina dicitur) tribui videatur. Quare aliis hoc nostrum Bupleurum βέραντι dicitur, cuius Theophr. 7. Hist. 8. inter olera mentionem facit. Et Buprestis Plin. l. & c. 22. sunt qui ad panaces Chironium Dioscoridis, alii ad elaphoboscum referunt.

CAPVT III:

UMBELLÆ SEMINE ALIS foliaceis cincto.

LASERPITIUM.

Laserpitium Σιλφιον Dioscoridi l. 3. c. 94. cuius caulis ferulaceus μάσπετον appellatur: folia sunt apio similia, semen vero latum ex cuius caulis, & radice incisis, ὄποι iā est succus colligitur: quibusdam caulis σιλφιον, radix μαγύδηρις, & folia μάσπετα dicuntur: sic Theophr. 6. Hist. 3. silphium cuius folium maspeton vocant: & Plin. l. 19. c. 3. laserpotium quod Graci silphion vocant, in Cyrenaica Provincia repertum, cuius succum laser vocant: Avicennæ planta laserifera alhit dicitur, interpretum aliqui Assam reddunt, forte voce ex laser corrupta.

Quam imperfecte caput hoc de laserpitio à Casp. Bauhino sit traditum, consulat lector Botanicus tabulas cognitionis & affinitatis, earumque explicationem à nobis factam, sub tertio genere intermedio à nobis exhibitam, & ex libro naturæ, non ex confusis authoribus erutam. Ubi nos nulla habita ratione nominum ab authoribus, sub libanotidis genere traditorum, in cap. ejusdem Bauhini de libanotide, & ut in cap. nostro primo hic de Hallucinationibus C. Bauh. observavimus, atque hic restituimus inter congeneres, debenque libanotidum species suprà illic à nobis notata, huc revocari, propter tesseram

communem ipsis convenientem, semina scilicet alis foliaceis cincta, more laserpitiorum rotæ molendinæ fluvialitis pinnarum instar: & si quæ aliae hujus farinæ species præter illic à nobis dictas, & notatas deregantur; huc revocentur. Hoc pafsim præstandum relinquimus in omnibus generibus subalternis 9^{em} aut 10^{em} umbellarum. Viam (mihi monstrante natura ex auctoritate & inspectione oculari) aliis prostravi, & calcavi: insistant meis vestigiis & plura detegent quæ à me observari hucusque non poterant; perpendite laserpitia à nobis tam in Tab. cognitionis laserpitiorum, quam in cap. primo de Hallucinatio-ribus

nibus C. Bauh. circa libanotidem exhibita, quæ perperam incuria, & negligentia (nec dicam) ignaviæ, authoribus nondum immotuere. Nomina quorundam permutavimus, quædam

de novo adjecimus, quorum nulla apud authores facta fuerit mentio, cætera conjungenda & addenda intelligo congeneribus.

CAPUT IV.

UMBELLÆ SEMINE ALA FOLIACEA CINCTO DONATÆ.

Quartum Genus subalternum.

THAPSI A.

Θάψια quod in Thapsø ejus nominis Insula primùm inventa, Diosc. l. 4. c. 157. que tota natura ferulæ similis : meminere Thapsia Theop. 9. Hist. 8. & Plin. l. 13. c. 22.

TURPETUM.

Turbith vox Arabica est, ab Avicenna & aliis usurpata, quamvis aliqui à turbando deducant, quod propter magnam violentiam, purgando corpus turbet. Duplex est, aliud Arabicum, aliud Indicum. Arabicum Mesueo 2. simpl. est radix herbae, folia ferula minor a fermentis & lacteo succo turgentis; qua sane causa, cur alii Pityusa, alii Alypi, nonnulli Tripolii Græcorum radicem esse voluerunt: cuius genera varia Mesuea, domesticum, sylvestre, magnum, parvum,

album, nigrum & flavum. Indicum, radice non est magna, nec longa, caule bedere modo per solum extenso, digitæ crassitudine, foliis & floribus althææ similibus, cuius tantum caulis pars inferior juxta radicem gummosa, utilis est. Acosta, Fragoso, Dodoneo ex Garzia monentibus. Quare hoc ab eo, quo in officinis vulgo utuntur, longe aliud est, monente etiam Clusio in Garziam: idcirco inter se differre volunt, Turbith Avicennæ, & Turbedb, aut Tarbadb.

CAPUT V.

UMBELLÆ SEMINE VILLOSO, SEU HISPIDO:

Quintum Genus subalternum,

PASTINACA TENUIFOLIA.

Σπαργαλλιν. Dioscorid. lib. 3. cap. 39. forte à colore uva nigricantis, cuius coloris, unius radix est: quæ sylvestris, in cuius umbellæ candidæ medio, exiguum quid coloris purpurei cernitur; & etiam sativi meminit. Δαῦνος Theophrasto (pastinacam Gaza vertit) 9. Hist. 15. cui daucus specie lauri, colore croci apud Archades nascitur: & in Patrensi agro præstantior cæteris: huic vis calefactoria est, radix nigra: & c. 22. Daicum agro Spartensi Achæa laudatissimum referunt: natura calefactorium, radice nigrum.

Pastinaca (quæ à pascendo dicta videtur, cum corpus alatum nomine, Latinis quatuor plantas significari Plin. l. 19. c. 5. ostendit; pastinaca (inquit) unum genus agreste, sponte provenit, Staphylinus Græcis dicitur: Alterum seritur radice, vel semine: est & quartum genus in eadem similitudine pastinaca, quam, nostri Gallicam vocant, Graci vero daucou, at l. 20. c. 5. staphylinus, pastinacam erraticam appellant.

Duplex est pastinaca, tenuifolia & latifolia: de tenuifolia tam sativa quam sylvestri nunc, de latifolia sub genere septimo subalterno supra diximus: cum nihil observatu dignum in hallucinationibus supersit dicendum, infra plura dicere, quam nomen antiquorum in medium adferre supersedebimus.

Pag. 151. col. i. pl. ii. *pastinaca sylvestris umbella majore C. B. P. pastinaca sylvestris daucoides Apula Colum. Hæc folia habet majora pastinaca syl. foliis paucioribus longioribus, atque aduncis lobis divisa; umbellas etiam gerit ex basi foliorum lacinias intersectas ut in vulgari, rotundas in circuitu, planas in superficie, magnas, floribus ex albo purpurascensibus, medium illud croceum habentibus, semine est oblongo angusto, non echinato sed hirsutie quâdam aspera, minutâ, albicante obsoito, clauditur ut quasi avis nidum repræsentet, ut ex latina translatione metrica Nicandri appetit his verbis, & simulans nidum daucus.*

Hæc descriptio ex Columna allata convenit cum myrrhida nostra semine villoso, striato, oblongo donata, nobis in tabulis cognitionis & affinitatis, sic dicta. Utur sit, non est daucus argumentando ex libro nature, cum sit semine rostrato myrrhidis; accedunt deinde sapor, & odor, quæ ipsam etiam manifestant, quæque simul juncta nos concludere faciunt eandem ad myrrhidis classem propius accedere, quam ad dauci seu pastinacæ tenuifoliae seriem.

Pag. eadem, col. i. pl. iv. *pastinaca sylvestris angustifolia fructu echinato, C. B. P. pastinaca ethinophora Apula Col. hujus flores sunt lutei, folia media inter marinam & terrestrem, parum acuta, leviter hirsuta, & propter hirsutiem leviter albicantia, in*

cacuminibus alarum, pericarpia remanent aculeata, dura, sex radiis divisa, in quorum summis sunt totidem apices densi, qui flores erant prius; semen duplex intus alut striatum, ovali figura rotundum, oblongum, cortice flavescente exterius præditum, qui medullam intus habet aromatico sapore. Ex hisce Fab. Columnæ verbis, atque ex iconis ab ipso exhibite inspectione, (etiamsi plantam ipsam nondum nobis licuit videre,) facile est demonstrare non esse pastinacam tenuifoliam, sequendo regulam à natura datam & à nobis observatam; cum non sit semine villoso seu hispido ut requirit nota essentialis, huic classi quintæ à nobis propositæ in tabulis nostris supra, earumque doctrina congruens: alio igitur est religanda, nec aptius quam ad Crithmum spinosum marinum, cuius (à semine & ejusdem capsula seminali) est omnino perfecta species, foliis acutis brevibus, leviter hirsutis prædicta: cumque seminibus pericarpio cartilagineo contextis, binatum junctis, ac spinis sex sursum tendentibus, ad amissum hæc cum crithmo spinoso convenit, & per consequens sub eodem genere disponi debet; foliis acutis, brevibus, leviter hirsutis, & plurifariam divisis, speciem constiuentibus distinctam à crithmo marino spinoso, cuius folia sunt longiora, Glabra, crassa spinarum instar in mucronem pungentem definitia. Consule suprà hallucinationes C. Bauh. in Pinace de crithmo, & Sifaro, ex quibus cum hac pastinaca eruat & conditum decimum genus, semine ejusque pericarpio cartilagineo, à cæteris prædictis novem generibus proprie distis omnino distinctum.

DAUCUS

DAUCUS.

Dacūngs Dioscorid. lib. 3. cap. 83. Daucus, Daicum, & Daicum latinis
Genera tria Dioscor. Primum Creticum foliis fœniculi: alterum apio sylvestri simile: tertium foliis Coriandri.
Diocles verol. 3. de Salub. quartum addidit nempe staphylinum. Plin. l. 25. cap. 9. ait. Dauci genera quatuor,
Petronius Diodotus fecit, cum sint differentiae duas; probatissimum in Creta fœniculi similitudine; alterum foliis Coriandri; si tertium genus facere libeat, est simile staphylino quod pastinacam erraticam appellant. Idem l. 19. c. 5. pastinacæ quartum genus, quam nostri Gallicam vocant, Græci vero dacon, cujus genera etiam quatuor fecere. De dauco Theophrasti, qui idem cum pastinaca tenuifolia, est suprà dictum; examinemus nunc Daicum Dioscoridis.

Pag. 150. col. i. pl. i. Daucus foliis fœniculi tenuissimis, C. B. P.
Creticus verus Dioscoridis Ad. Lob. Hic est foliis fœniculi, semine i., acri, longo, hirsuto, ergo ad myrrhidum classem ex nostra doctrina reduci debet.

Ibidem pl. ii. Daucus Alpinus multifido longoque folio, sive montanus umbellâ candidâ, C. B. P. Creticus Cam. Ep. Camerarius huic femina assignat hirsuta, longa cumini. At Daicum Cæsalpini, hujus Synonymum, semen habet Cretico simile, sed nequaquam lanuginosum, acre & valde odoratum, foliis constat non fœniculi, sed specie staphylini, longo pediculo in adnexu folioso; umbellæ clauduntur, ut staphylini: caulis est cubitalis striatus. Uterque hic daucus est myrrhidis species, prior foliis fœniculaceis, semine longo, hirsuto: alter eit etiam myrrhis, ex descriptione omnium authorum (& foliis est pastinacæ tenuifolia, & semine hirsuto) præter Andream Cæsalpinum, qui suo Dauco attribuit semina, cretico similia, sed non lanuginosa: utur sit, sunt (inquam) ex descriptione omnium authorum semine longo, rostrato, sive villis obdueto, sive iisdem privato, & per consequens ad myrrhidum classem reduci debet, ex nostra doctrina, non obstante autoritate Dioscoridis ejusque omnium sequacium.

Ibidem pl. iii. & iv. videlicet Daucus montanus multifido breviq; folio C. B. P. At nobis longiori folio, seu Saxifraga Pannonica, Clus. Hist. & Daucus montanus multifido folio, selini semine, C. B. P. seu selinum moutanum pumilum, Clus. Hist. Sunt enim haec umbellæ semine striato minore, & foliis tenuiter divisis. Ergo ad primum membrum capitum secundi, tractatus nostri præcedentis, apte reducuntur inter ferulaceas, semine minore, striato. Vide caput 2. supra de Saxifraga pannonica, & selino montano pumilo, Clus. Hist.

Ibidem pl. v. Daucus montanus apii folio major, C. B. P. Daucus 2. Trag. (cui & seseli 2.) hujus floculi (inquit Tragus) in semen subnigrum, latum, anetho, aut cimicibus simile definunt. Dauci 3^{um} genus Fuchsii foliis Coriandro assimilatur, estque capite, & semine anethi, in quo umbella pastinacea erraticæ similis appetet, &c. Libanotis altera, cervaria nigra quorundam J. B. hujus semen est latum (inquit Joh. Bauhinus) & ad pastinacæ latifoliæ semen accedens, ex descriptionibus omnibus horum authorum, haec umbella (cum sit semine membranaceo, compresso oblongo) ad septimum genus nostrum debet referri: ast cætera synonyma à C. Bauhino allara, non convenient generice cum prædicta umbella. Nam Saxifraga Venetorum, seu daucus selinoides, Ad. Lob. semen in umbellis gerit oblongum, angulosum, fœniculi modo, seseli montanum. Clus. Hist. hujus sumnum caulem atque extremos ramos exornant umbellæ pallescens floscularum, quibus succedunt semina sileris montani semini similia. Ergo ex synonymis Clusii & Lobelii atque descriptionibus seminum, Saxifraga Venetorum, seu Daucus selinoides, Lob. Ad. & seseli montanum 2. Clus. debet pro diversa umbella ad secundum caput doctrinæ nostræ novæ amandari. Male ergo pro una & eadem synonyma plantæ umbellifera ponuntur, & hic associantur à C. Bauhino; cum ex libro naturæ sub diversis signis militant.

Ibidem col. ii. pl. iv. Daucus montanus apii folio minor, C. B. P. Dauci secundi selinoidis varietas L. b. ex Lobelio, hic per aestatem flosculos fert candidos, quibus succedunt semina oblonga & in fuscum rubentia. Prioris, semine (scilicet) compresso, membranaceo, oblongo haec est tantum varietas minor.
Ibidem pl. vii. Daucus montanus apii folio albicans, C. B. P. seseli 2. montanum Pannonicum, Clus. Hist. Desc. Hoc idem synonymum osserrur suprà cum Saxifraga Venetorum, Lob. & hic & suprà bis repetitur, miror quomodo C. Bauhinus sui sit oblitus, utcumque, est semine striato, prouinde ad' 2^{dum} genus nostrum debet referri.

Ibidem pl. viii. Daucus montanus apii folio, flore luteo C. B. P. &

Prod. Ex Bauhino in Prodromo, hujus caulis sustinet umbellas parvas, flores elaphobosco similes, luteos, sed seminum non mentionat Casp. Bauhinus loco citato, ergo quo reduci debeat in incerto relinquimus.

Ibidem pl. ix. Daucus pratensis apii folio C. B. P. & Prod. Hujus ramis extremis umbelle candidæ floscularum exiguorum insident, quibus semen oblongisculum, nigricans, aromaticum succedit, ex his verbis Casp. Bauhinus propter sterilem & mancam hanc descriptionem, quo relegari debeat, anticipates adhuc hæremus.

Ibidem pl. x. Daucus campestris apii folio C. B. P. Dauci 2. genus Dalpⁱⁱ Hist. Lugd. Ex Historia Lugdunensi est illi umbella apii fiore candido, copioso semine minuto, oblongo, acri, odorato; propter mancam hujus seminis descriptionem, in ambiguio relinquimus etiam ejusdem dispositionem.

Ibidem pl. xi. Daucus petroselinii, vel coriandri folio, C. B. P. Bumium Dalpⁱⁱ Hist. Lugd. Flore est umbellaque anethi, semine odorato: minore, quam in hyoscyamo, quam imperfectè hæc, & superior umbella, in Historia Lugdunensi discribantur, judicent qui lectores docti Botanici.

Ibidem pl. xii. Daucus Creticus, nodosus umbella lutea C. B. P. Daucus Creticus 3. Hon. Belli Ep. 1. ad Car. Clusum. Flores fert luteos in umbellis, ut anethum, semenque cumini; ergo ad 2. genus Doctrinæ nostræ debet referri.

Ibidem pl. xiii. Daucus pratensis millefoli palustris folio C. B. P. Daucus pratensis Dalpⁱⁱ Hist. Lugd. Nos hanc umbellam ad oenanthes classem reduximus ut videre est in Cap. 2.

Daucus Alsaticus, C. Bauhini in Prod. Extremos hujus ramulos, umbellæ satis magnæ floscularum flavescentium exornant, quibus semina plana succedunt, hujus Dauci oblitus est Casp. Bauhinus in Pinace, nec sine causa me judice, quandoquidem semine polleat membranaceo, compresso, rotundo, atque tota lacteo succo abundet; est Thysselinum in humidis, uliginosis, & umbrosis alneris proveniens, non obstante altitudine quam ei assignat Casp. Bauhinus majorem Thysselino, eandem, sepe altitudinem humanam superantem, intra septa Regia Chambort in umbros illic humidis alnetis, secus fluvium Coufon, millari a Palatio Regio Chambort dissipitis offendimus.

Adeo ut 1^{us} & 2^{us} ad myrrhidum pertineant classem, proinde reducuntur ad genus octavum nostrum subalternum, quia sunt sem. rostrato. 3^{us} & 4^{us} ad secundum genus nostrum, quia sunt semine striato minore, & foliis fœniculaceis. 5^{us} ad septimum genus nostrum, quia est semine membranaceo, compresso, subrotundo, aut oblongo. At Saxifraga Venetorum, seu daucus selinoides, Lob. Ad. seu seseli montanum 2. Clus. (male synonymum a Casp. Bauh adaptatum prioribus) debet ad secundum genus nostrum pertinere, cum sit semine striato. 6^{us} est tantum varietas 5^{ti} semine membranaceo compresso, oblongo. 7^{us} est idem cum quinto, ut appetet ex dupli repetitione à Casp. Bauhina facta, synonymi Clus. scilicet seselios 2. montani pannonicici. 8^{us} semen habet elaphobosci, seu pastinacæ latifoliæ ergo ad 7^{us} nostrum genus amandari debet. 9^{us} forte eodem relegandus 10^{us}, 11^{us}, 12^{us}, & 13^{us}, omnes haec umbellæ quatuor novissime collocatae, referri debent ex doctrina nostra ad secundum nostrum caput, quia sunt semine striato minore; atque reliquæ omnes in hoc capite de Dauco contentæ, que sunt semine striato, & brevi; ad secundum nostrum caput relegari debent. Daucus Alsaticus ut supra dictum idem est cum Thysselio, ideo ad septimum caput nostrum, subalternum umbellarum pertinet, cum nullus horum daucorum, pertineat ad daicum Theophrasti, singuli secundum tesseram uniuscunque ad singula capita praeditæ nostræ doctrinæ, quam facilime reduci poterunt, quemadmodum suprà hic à nobis factum,

CAPUT VI.

UMBELLÆ SEMINE ACULEATO,
seu echinato donatæ.

Sextum Genus subalternum.

CAUCALIS.

Kauκαλις apud Dioscoridem l. 2. c. 169. scandicem sequitur, quam aliqui daucum sylvestrem nominant.
Plin. l. 21. c. 15. sequuntur Dioscoridem inter olera recensuit.

Pag. 152. col. i. pl. i. caucalis maxima sphondylii aculeato semine, C. B. P. Caucalis major, Clus. Hist. Male à Carolo Clusio primo & Caspero Bauhino, aliisque authoribus Clusium, & Casp. Bauhinum in Historiis suis Generalibus sequentibus, & posteriori hoc seculo scribentibus nominatur hæc planta. Clusium inquam primò hallucinantem, & male nominantem, cœcuentes omnes sequuti sunt, nullatenus perspexa nota essentiali huic generi convenienti, partim quod non noverant, partim quod supinā negligentiā sponiti ulterius librum naturæ indagare non dignati sunt, sed transcribendo ex antecessorum libris, cum ipsis errantibus errare voluerunt, nulla habita ratione nota genericæ unicuique generi à natura præscriptæ. Hæc umbella non est caucalis, cum ejus semen non sit (caucalidum ritu) aculeatum, aut undique carinis echinatum; quod est nota genericæ & essentialis omnibus caucalidum speciebus conveniens, ut in capite de caucalide docuimus supra: quodque quis percipere poterit ex Tabula nostra generali icon. sem. Videte 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. & 19. Habetis illic semina caucalidum summa cum arte nobis à peritissimo nostro Chalcographo exhibita, ex ἀντηλίᾳ delineata, & sculpta. Nos semina ipsa omnium ex promptuario nostro seminario suppeditavimus, atque eadem publice monstravimus unâ cum omnibus seminibus umbellarum in horo publico universitatis. Ex dictis ergo aliò est remittenda hæc umbella, nec aptius quam ad Tordylium (cum docto Jacobo Plateo, qui ejus semen ad Carolum Clusium misit) referri posse autumo; hoc evidenter apparebit cuilibet intuenti li-

brum naturæ, atque ipsa semina contemplanti. Videte Tab. 9. icon. ubi offeruntur umbellæ sem. membranaceo compresso, rotundo, aut subrotundo: videlicet peucedanum, sphondylium, pastinaca latifolia, & tordylium; sub cujus generi comprehenditur caucalis maj. Clus. perperam sic appellata. Consule etiam Tab. icon. seminum. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. Ex libro naturæ à seminibus militant omnes hæc umbellæ sub eodem signo:

Ibidem pl. ii. Caucalis arvensis echinata magno flore, C. B. P. echinophora πυκνόκερπος an Gingidium Disc. Colum. Male pro synonymâ huic additur à C. Bauhino echinophora πυκνόκερπος, cum huic synonyma sit echinophora πλαπέρπος, Col. & echinophora πυκνόκερπος synonyma sit caucalidi Monspeliacæ magno fructu. Fiat transmíratio nominum à Fabio Col. iconibus male assignatorum, & tolletur lapsus cum Col. tūm C. Bauhini. Observate tab. icon. seminum 15. 15. 16. 16. & coniungeret ipsa semina, & plantas ipsas examine, quando habueritis ad manum, & ex libro naturæ collato cum errore Col. & C. Bauhini in synonymis hisce assignandis, facile erit detegere hallucinationem prædictam.

Pag. 153. col. ii. pl. ix. Caucalis folio peucedani, C. B. P. Caucalis Anglicæ. Lob. cum hæc umbella sit semine striato minore (saxifragie tenuifolia more) donata, cum quad. folia, tūm quad. semina, hinc est averruncanda propter rationem antedictam, & ad congeneres amandanda, neutiquam vero ad caucalidem (cujus non fert symbolum, semen scilicet echinatum, seu aculeatum) redigenda.

CAPUT VII.

UMBELLÆ SEMINE MEMBRANACEO,
compresso, subrotundo, fol. fœniculaceis donatæ.

Septimum Genus subalternum.

FERULA.

Νάρθηξ Dioscorid. l. 3. c. 91. *νάρθηξ* καὶ *νάρθινος* Theoph. 6. Hist. 2. id est (Gaza interprete) ferula & ferulago. Plin. l. 13. c. 22. ferula.

Genera duo ferulae Plinio: Nartheca Græci vocant, in altitudinem assurgentem, nartheciam vero semper humiliem: & ferula sine dubio est Thapsia, sed sui generis &c. & l. 20. c. 23. ferula, quæ ab uno caule dividitur in cacumine, fæmina putatur.

Y PANAX

PANAX ASCLEPIAS,
& libanotis Ferulæ folio, & semine.

Αιβανωτίς Dioscoridi lib. 3. c. 87. duum est generum; unum fæcundum, cuius semen est rotundum, angulosum, acre, linguam exurens, & κάρπος vocatur, foliis fæniculi, cui alterum consimile, semine lato, minime exurente. Sterile illorum similitudinem refert, sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Non obstante authoritate Dioscoridis, hoc παραδόξον esse concludo.

De Libanotide vera & genuina, seu pilifera, diximus in 1^o tractatus superioris, atque in cap. 1. inter hallucinationes, *τοι* Bauhini. 2^{da} 3^{ia} & 4^{ta} libanotidis species contentæ in cap. Casp. Bauhini de libanotide ferulæ folio, debent hic collocari cum ferula, quia sunt semine membranaceo, com-

presso, oblongo donatæ, ut dictum est suprà inter hallucinationes delibonotide. Panax Asclepium semine foliaceo, C. B. P. Panax Asclepium Apulum, Colum. cum sit Thapsiae species, ad 4. cap. doctrinæ nostræ supra tradire referatur. Vide cætera suprà cap. i. de libanotide ferulæ folio.

ANEETHUM.

Ανθον Dioscoridi l. 3. c. 67. ταρά τὸν οὐρανόν quod cito crescat: Theophr. 1. Hist. 18. cui 7. Hist. 4. plura ejus genera, quæ non recenset. Plinio l. 2. c. 18. Anethum.

Pag. 147. col. ii. pl. ii. *Anethum sylvestre majus*, C. B. P. anethum sylvestre grandius sativo, foliis fæniculi, Cæsalp. Hæc umbella non est anethum, ex verbis Cæs. qui afferit semine esse exiguo ferme ut ammeos, subacri. Cum ammeos semen sit oblongum, striatum, anethi autem semen subrotundum, membranaceum, compressum, striis depressioribus tribus, in medio superficie exterioris, seu convexa præditum, ut sunt omnium prædictarum, & multarum aliarum, de quibus infrâ dicimus in hoc capite 7^{mo}, male collocatur hic pro anetho.

Ibidem col. ii. pl. ii. *anethum sylvestre minus*, C. B. P. & Prod.

Est umbella ex festucis 8. aut 9. uncialibus composita, flosculis luteis, semine parvo, oblongo; teste Bauhino in Prodromo: ergo non est semine membranaceo, compresso, rotundo, ut anethum. Propter brevitatem authorum in descriptionibus suis, non ritè semina observantum, impossibile est certò concludere, ad quod genus debeant quædam umbellæ reduci; sed ex hac methodo à nobis exhibitâ, facilium erit omnes umbellas ad aliquod prædictorum generum subalternorum à nobis assignatorum reducere, modo adsint semina, aut ritè & exactè describantur eadem apud authores.

PEUCEDANUM.

Πευκέδανον Dioscoridi l. 3. c. 92. Theophr. 9. Hist. 14. et si sint qui velint, nomen ab amaritudine sortitum esse, tamen à τούτη, quæ latinis pinus, dictum videtur, cum hujus folia cum pini foliis similitudinem quandam habeant: unde & pinastellum aliquibus nominatur, peucedanum Plin. l. 25. c. 9.

Pag. 149. col. ii. pl. iii. *Peucedanum minus*, C. B. P. peucedani facie pusilla planta, Lob. ad. & icon. Peucedanum est umbella, gramineis foliis, semine membranaceo, compresso, subrotundo prædita. Parum ergo rationi consonum est, hanc umbellulam, esse peucedanum, cum peucedani facie pusilla, planta sit (ut vult Lobelius) semine anisi breviori, exiliori, gustu grato, aliquantulum acri, radice comosa supernè, gustu oreoselini, &c. Hic ut in aliis complurimis locis, non satis sibi conitar Lobelius; ignoraverat tesseram peucedano familiarem, nec alii bene eandem observarunt, sed cum ipso errante (sicut ut plurimum fit) errarunt: neque peucedanum Pannonicum, Cluf. dici debet peucedanum, quia ex Clufii ipsius verbis est semine selini fere brevi, crassissimo, quæ nota non convenit peucedani spe-

cibus, cum peucedani semen sit compressum, membranaceum, subrotundum. Insuper saxifraga 3^{ia} Matthⁱⁱ Hist. Lugd. non est umbella, multo minus peucedanum: hoc evidenter appetet ex his verbis Dalpⁱⁱ, flosculos albos, caliculos pallidos, ocyoidis modo & crenatis oris in corone modum, admodum pusillos fert, in quibus semen rubrum papaveris minus. Cum hæc sit descriptio lychnidis, longe fallitur C. Bauhinus qui saxifragam 3^{iam} Matthⁱⁱ Hist. Lugd. synonymam posuit cum peucedano; quin & Joh. Bauhinus afferit esse selini semine, ergo non est peucedanum; nisi me animus longe fallat, aptius selini pumili montani species designabitur, aut selinum montanum, Cluf. hæc pusilla planta peucedani facie: quod ex descriptionibus Cluf. & Lob. ad seinvicem collatis erui poterit.

UMBELLÆ SEM. COMPRESSO, MEMBRANACEO,
subrotundo, foliis lobatis donatæ.

SPHONDYLIUM.

Σφονδύλιον folia habet platano similia ad panacis foliorum effigiem accendentia. Dioscoridi l. 3. c. 90. *Sphondylium* Plinio l. 12. c. 26. & l. 24. c. 6. sic dictum fortasse ob odoris gravitatem, à sphondyle insecti genere, odoris gravis, ut Pena tradidit.

PASTINACA LATIFOLIA.

Ελαφόβούτον Dioscoridi l. 3. c. 80. & Plinio l. & c. 22. id est pabulum cervi, hoc enim pabulo cervos serpentibus resistere fama est. Dioscor. & Plinio Authoribus. *Baucia*, pastinaca latifolia Arabum an Elaphoboscum Adv. Lob. Cum nihil hic, nec suprà in sphondylio occurrit observandum, de eo & pastinacâ plura addere supersedemus, quemadmodum passim in hallucinationibus præstamus.

TOR-

TORDYLIUM.

Τορδύλιον quasi *Τορδύλη*, quæ vox (nisi fallor) scutum significat, & eo nomine satis apte quadrat omnibus umbellis, sub membro hoc 3^o contentis, semine compresso, membranaceo, rotundo, & foliis lobatis donatis; quippe quod earum semina rotunda, compressa, clypei, aut scuti militaris adinstar sint.

Vide hallucinationes Caspary Bauhini, in cap. 2^o, ubi seselion species à nobis examinantur, atque ibidem quatuor seseli species ab eo genere absconduntur, & avertuntur; & caucalis Hispanica à caucalidum numero pariter separatur, propter rationes supra dictas in propriis capitibus de seseli & caucalide, ut huc ad congeneres, sphondylium, & pastinacam reducerentur, cum quibus cotuientum, quoad formam & figuram seminum, & foliorum appositionem. Quam apposite hoc revocantur, intuentibus & mecum examinantibus librum naturæ judicandum relinquo. Ex odore porro & sapore esse umbellas sese declarant, & male hucusque authoribus locatas, sunt enim tantum sylvestres pastinacæ latifoliae species sponte in regio-

nibus & locis ipsis convenientibus nascentes à radice fibrosa præditæ, non autem radice carnosæ edules. A forma simili seminum omnes alias umbellas ex libro naturæ ad proprias suas, & genuinas classes reduxi, naturâ mihi monstrante viam, & semina inter se similia producente: insuper similia semina similes pariter produnt vires, & virtutes, secundum saltem magis & minus. Vide cetera cap. 2^o hujus tractatus, & cap. 2^o de hallucinationibus C. Bauhini, aliorumque authorum de seselion dispositione, & denominatione, cap. itidem de libanotide, & Dauco, ubi umbellæ sem. membranaceo, compresso, oblongo, maleolatae, locis citatis notantur.

PANAX Ηράκλειον, SIVE HERCULANUM.

Πάναξ quasi πᾶσι ἄργε, omnibus remedium adferens, cuius Theoph. 9. Hist. 10. genera quatuor 1. Syriaeum: 2. Chironium: 3. Esculapium: 4. Herculatum. Chironium, folio rumici simili: Esculapium, folio Thapsia: Herculatum, folio magno, & ample, ut quoquo versum tres palmos perficiat. Diosc. l. 3. c. 55. 56. 57. tria genera sunt: πάναξ Ηράκλειον, ex quo opopanax colligitur, foliis fculneis, quinquepartitis: πάναξ Ασπλυτός, foliis faniculi: πάναξ Σειρόνιον, folio amaraci.

Licet hæ panacis Ηράκλειον species ut plurimum sint semine membranaceo, compresso, rotundo, aut subrotundo, lachrymamque thuriferam fundant incisis radicibus, atque panacis nomen obtineant; tamen propter folia lobis latioribus divisa, instar sphondylii, aut pastinacæ latifoliae, easdem post affines & consimiles hic locavimus. Tesseram communem à seminis formâ eandem, aut plane similem gerunt cum panace Asclepios; ast inquam, propter folia eidem dissimilia, disjungentur à panace ferulae folio in primo membro hujus 7^o cap. contento, & apertissime hic disponentur in hoc secundo membro; convenient enim notâ genericâ, seminis scilicet forma, proinde utrumque, & Panax Asclepium, & Heracleum, eorumque species, ad 7^o hoc caput reducuntur; at propter tenuitatem foliorum, panax Asclepium ejusque species in primo membro cum ferula, panax autem Heracleum ejusque pariter species in secundo collocabuntur membro, cum congeneribus, sphondylio, pastinaca latifolia, & Tordylio, propter folia lobata, ut supra dictum.

Pag. 157. col. i. pl. ii. Panax sphondylii folio, sive Heracleum, Casp. Bauh. in Pin. Heracleum Matthi¹¹ Hist. Lugd. Panax Heracleum pastinace folio, seu fronde, Ad. Lob. Flores hujus in umbella esse luteos Venetiis in Franciscanorum hortis, at albos in Belgii viretis, ait idem Lobelius. De colore florum unus mihi restat scrupulus; hic de unâ & eadem specie Panacis Heraclei loquitur Lobelius, sed nec hoc fieri potest, quia nulla umbella una & eadem specie conspicitur fl. luteo & albo donata; varietatem floris colorum non nego, sed specie diversas ipsas umbellas esse contendo; etiam si Lobelius distinctionem, seu diversitatem in aliis ejusdem partibus non observaverit: si panax He-

racleum in horro Franciscanorum Venetiis observatum à Lobelio flores produxit luteos, idem panax Heracleum specie in Belgii viretis non protulit flores albos, ergo male observavit Lobelius.

Pag. 157. col. ii. pl. iv. Panax Heracleo similis Hungarica, C. B. P. Tataria Hungarica, Clus. Hist. Hujus floribus succedunt semina valde crassa, nec assimilia semini illi magno striato libanotidis cachryferæ. Flores non sunt facundi, nam raro producunt sem. Biennioradices ejusdem alii, antequam caulem, aut flores, seminave producerint, deinde corruptæ sunt, & tam foetidum exhalarunt odorem, ut ex horto nostro Viennensi fuerint ejicienda. Ex his verbis Clusii concludo hanc umbellam, cum semen protulerit magnum, striatum, libanotidis cachryferæ ritu, fusile cachryos aliquam speciem; proinde nec ex nostra doctrina poterit suis sociis umbellis hic sub panacis nomine contentis conjungi, quia non est sem. membranaceo, compresso, rotundo, aut subrotundo. Cum vero Ungari ejus radice alterius panis vice utantur, & Tartari foliorum in aqua decoctum refrigeratum, instar vini bibant, teste Clusio. Non tam mihi tertiæ aut foetidi videntur odoris ejusdem radices, nisi hoc contingat per regulam vulgarem, corruptio optimi pessima. Omnes præterea cachryos species post sationem semina non producunt, nisi 4^o aut 5^o anno, nec caules, nisi 2^o aut tertio emittunt. Quæ facile concurrunt ad probandam hanc esse libanotidis cachryferæ speciem: ideoque male hic collocatur cum panace Heracleo, cuius non fert tesseram, semen scilicet membranaceum, compressum, rotundum, monstrante errorem C. Bauhini libro naturæ.

UMBELLÆ FOLIIS PLURIFARIAM DIVISIONE,
sem. membranaceo, compresso, subrotundo.

Nos hoc membrum 3^o umbellarum semine membranaceo, compresso, subrotundo, foliis plurifariam divisum donatarum, ex variis classibus, in hunc locum aggregavimus, habita ratione tesserae supra traditæ in doctrina cap. 7^o tractatus superioris. Ex capite Casp. Bauhini de apio, quatuor umbelliferas plantas huc tranferemus, videlicet oreoselinum, Clus. Thyrselinum, oreoselinum Parisiense, Hist. Lugd. & selinum peregrinum 2. Clus.

id est apium iv. vii. viii. & x. Casp. Bauhini. Item libanotis altera, cervaria nigra Joh. B. & si que alia hujus farinæ detegantur, sub quounque nomine versentur, huc pariter debent remitti. Idem dicendum de dauco Alsatico. Consule doctrinæ supra traditæ cap. 2^o de apio, seseli: & cap. 5^o hallucinationum Caspary Bauhini de dauco.

C A P V T VIII.

UMBELLÆ SEMINE ROSTRATO DONATÆ.

Octavum Genus subalternum.

MYRRHIS.

Mūrris sive Mūrra Dioscoridi l. 4. c. 116. myrrhis quæ aliis Smirrhiza, aliis myrrha dicitur. Plin. l. 24. c. 16.
Pag.

Pag. 160. col. ii. pl. iii. *Myrrhis sylvestris seminibus lœvibus*
C. B. P. Myrrhis, Fuch. Lugd. Hæc umbella rostrata cerefolium
sylvestre, perenne, majus, seminibus lœvibus, nigris, nobis
exhibit, quia ejus semina sunt lœvia, nigra cerefolii sativi ritu,
suntque rostrata, crassiora duplo quam sunt cerefolii semina;
quin & ipsa planta in omnibus, & per omnia major est cerefolio
sativo, ergo à seminibus lœvibus nigris, sese declarat cerefolium,
non autem myrrhidem, cuius semen semper producitur
striatum, sive sit villosum, asperum, aut planum; quemadmodum
in antrisco Plinii, & myrrhide tuberosa, nodosa, cicu-
tariae folio videre est. Harum duarum semina sunt striis obduita,
sicut petala florum croci, aut tuliparum variegata, seu striata,
sine eminentiis, aut depressionibus, seu carinis, & fulcis,
quales conspicuntur in reliquis myrrhidum proprie dictarum
speciebus; ergo male à Casp. Bauhino & aliis authoribus au-

thriscus Plinii synonymum habet cerefolium sylvestre, cum non
sit cerefolium, ut supra dictum in doctrina nostra de myrrhide,
& cerefolio, in qua ostendimus cerefolium primariò & princi-
paliter discerni à myrrhide, quod illud sit seminibus lœvibus,
myrrhis autem seminibus striatis. Consule doctrinam nostram
novam supra, cap. 8^o, ubi agitur de myrrhide, & cerefolio,
quippe rostratis, eorumque differentiis à seminibus desumptis.
Consule Tab. Generalem icon. sem. 37 37. 41 41. quibus repre-
sentantur semina myrrhidis sylvestris, seu antrisci Plinii Hist.
Lugd. & cerefolii sylvestris seminibus lœvibus, quæ à C. Bau-
hino, & reliquis authoribus exhibentur, permutatis nominibus,
& rebus ipsis confuse traditis. De seminibus rostratis, tam
myrrhidum, quam cerefoliorum, consule tab. icon. sem. 34 34.
35 35. 36 36. 37 37. 38 38. 39 39. 39^a 39^b 40 40. 41 41.

CHÆROPHYLLUM.

Chærophyllum Columella habet: an Plinii l. 19. c. 8. sit chærophyllum, quod pæderota Græci vocant, propter
brevitatem asserere non licet: & potius ejusdem antriscus, l. & c. 22. forte Theophr. 7. Hist. 7. Εὐθανὼν En-
thusicum Gaza vertit: Opeorūvov Dioscoridis quibusdam videtur.

Pag. 152. col. i. pl. ii. *chærophyllum sylvestre*, C. B. P. an-
triscus Plinii, Hist. Lugd. Chærophyllum & myrrida valde
cognatas, & affines esse umbellas ex libro naturæ haudimis, eo
nomine præcipue quod sint ambae rostratae: hoc tamen intercede-
nente discriminare (ut cuilibet utriusque seminum figuram & for-
matum observanti, eaque attentius intuenti appareat) quod cere-
folium sit seminibus rostratis, sed lœvibus, nigris prædictum, non
autem striatis, ut est myrrhis omnis. Hoc posito fundamento
à natura jacto, antriscus Plinii non est cum cerefolio collocan-
dus, cum ex Dalechampii descriptione in Hist. sua Lugd. quadret
omnino myrrhidum speciebus, ac proinde male cum cere-
folio sylvestri Casp. Bauhinus synonymum fecit antriscum
Plinii, atque vice versa cum myrride cerefolium sylvestre se-
minibus lœvibus jungit, appellando myrridem sylvestrem.
Fiat mutua permutatio harum duarum denominationum, à C.
Bauhino assignatarum, propter ante dictam rationem ex semi-
num compositione, & strudura, & tolletur lapsus C. Bauhini er-
rantis, aliorumque ante ipsum scribentium, aut post ipsum trans-
scribentium, atque in ingenta volumina colligentium, qui omnes
nedum generum horum duorum, umbellarum rostratarum no-
tam essentiam cognovere, fortasse quia nec in hac sectione,
nec in aliis librum naturæ inspexere, sed libros, seu volumina
authorum ante se scribentium, aut transcripsere aut translitere:
ex quorum lectione ego obseruo primum errantem, vel male
nominantem, & consequenter perperam digerentem, reliquos
sequentes in præcipitem traxisse; hoc contingit non aliter quam
in grege ovium, quarum quædam audacieores & fortiores obser-
vantes pratum nuper tonsum, gramineaque mollia suggesterens,

ex via communis quâ adigi solent hujusmodi animalia, transeundo
fossam, aggerem ve superant, quâ fossâ superatâ omnes eandem
transire saltando conantur, exemplo fortissimarum, sed perpauci
intentum acquirunt, ast in fossâ, locisque multis aggeribus
vicinis, pastum quærere coguntur: sic itidem perpauci autho-
res Botanici, eò pervenerunt quod intendebant, sed rumi-
nando quæ ab aliis fuerunt præmansa, eadem quasi
reassumunt digerenda, transcribunt, transferunt aliorum scri-
pta, atque in immensa volumina congesta edunt; libros autho-
rum evolverunt, sed librum naturæ neglegunt habuerunt, sic cum
errantibus errarunt, atque antecessorum scripta virtuosa publi-
co obruserunt, parum solliciti de ordine, & methodo, quæ est
(ut ait Philosophus) omnis doctrinæ ac disciplinæ anima; sed
de hisce alias prolixius agemus.

Pag. eadem col. ii. pl. iii. *Chærophylllo nonnihil similis*, C. B. P.
percepier (id est saxifraga) Anglorum Lob. Ad. Ex libro naturæ
Chærophyllum est umbella, foliis plurifariam divisis, & semine
rostrato longo, quasi lœvi donato, secundum doctrinam à nobis
suprà traditam, ergo Percepier Anglorum chærophylllo nihil
similis, potius quam nonnihil similis, ut vult Casp. Bauhinus.
Non est umbella, ergo longe à cerefolii classe arcenda est hæc
planta, sicut alibi in Prælud. Botanicis pag. 368. diximus. Cum
enim in omnibus & per omnia alchimillæ illi convenientia
essentiales, à flore, & semine petita, ad alchimillæ classem
(cum Doctissimo Fab. Columna, cui est alchimilla montana mi-
nima) esset referenda, & non inter umbellas collocanda, quemad-
modum hic præstitit Casp. Bauhinus, nec per antedictam ra-
tionem est scandix, ut vult Tabernæmontanus.

SCANDIX.

Σιγάρδιξ Dioscoridi l. 2. c. 168. *sylvestre olus est*, quod Gingidio subjungit: Theophr. 7. Hist. 8. Plinio
l. & c. 22.

Observatio in Doctrinam Casp. Bauhini & Dalpⁱⁱ de scandice.
Pag. 152. col. i. pl. i. *Scandix umbellæ ex apicibus coagmentata*,
C. B. P. *Scandix Hist. Lugd.* radice est pastinacæ tenuifoliae sylve-
stris simili, amara & subacri; eodem sere sapore est qui in radice
Smyrnii deprebenditur; foliis est pastinacæ tenuifoliae latioribus,
candidis, minime hirsutis: caulis apponuntur per membranam
corticis, sub exortum petiolorum. Spinati sunt folliculi: caule est
cubitali, flores in umbella candidi, (non aliarum umbellarum more)
petiolis seu radiolis rotatim construita, sed compluribus apicibus ex

candido herbaceis veluti in capitulum congesta, & coagmentata,
peculiariter quadam compositione, in nullis aliis umbellis apparente,
imo nec in ulla alia stirpe perspecta. Author ipse Dalpⁱⁱ in Hist.
Lugd. nullam formæ seminum facit mentionem. An sit scandix,
an umbella abortiva scandici accedens, sententiam ferre su-
persedemus, propter imperfectam hujus descriptionem, atque se-
minis omissionem, quod nimium familiare est & huic & aliis au-
thoribus in describendis suis plantis umbelliferis.

CAPUT IX.

UMBELLÆ SEMINE ROTUNDO, SEU TESTICULATO.

Nonum Genus subalternum.

CORIANDRUM.

Kœrorov n^o Kœiavrov Dioscoridi l. 3. c. 71. dictum putant, quod folia & caules cimices redoleant. Kœiavrov
Theophrasti 7. Hist. & 4. caus. 3. cuius genera plura esse 4. Hist. 7. dicit. Coriandrum Plinio l. & c. 20. quod
inter sylvestria non inveniatur.

Animadversio in caput Caspari Bauhini de coriandro. *Pag. 158.*
col. ii. pl. ii. & iii. Coriandrum minus testiculatum, C.B.P. Coriandrum alterum minus odorum Hist. Lugd. & sylvestre Myconi, Hist. Lugd. Cum duæ icones coriandri sylvestris à solo Dalpio in Hist. sua Lugd. diversimodè proptere exhibeantur primò, atque postea easdem ex ipso mutuari sint alii, quin & semina habeant rotunda binatum utrinq; sibi adhærentia, unius ejusdemq; plantæ in diverso solo naturæ figuram ibidem exhibitam esse non sine ratione conjeturam facio, cum non reperiam in descriptione Hist. Lugd. diversas no-

tas essentiales iisdem assignatas. Si quis plantas illas binas essentia-
liter, & specificè, notà aliquā distinctionē produixerit, ipsi con-
sentire nullatenus refragabor: sed cum hoc sit familiare Mo-
linæ compositori prædictæ Hist. Lugd. bis terve plantam repe-
tere, eademque diversis diversorum authorum iconibus re-
præsentare, atque aliquando pro unâ & eadem plantâ tres,
nonnunquam 4. icones apponere, subiit animum eum ejusdem
culpæ hoc in loco reum judicare. Vide animadversiones
Caspari Bauhini in eandem Historiam Lugdunensem.

CAPUT I.

UMBELLÆ IMPROPRIE DICTÆ.

Primum Genus subalternum.

VALERIANA.

*Valeriana Dioscoridi l. 1. c. 10. quod verpods ageia, eo quod radices ejus cum quadam odoris gravitate nar-
dum emulentur: imo & nardo viribus similes, Galeno & Aegineta authoribus. Plin. l. 12. c. 12. Nardum cre-
ticum, aliqui agriam vocant, alii Phu folio olusatris, &c. & l. 21. c. 20. Nardus quod phu appellavimus, affi-
cinis & herbariis valeriana, à multis quibus valet facultatibus: quare & Theriacaria dicitur. Genera duo una
descriptione Dioscorides proposuisse videtur; folia namque olusatris, majori valeriana: folia elaphobosci, media:
radices priori, floris color mediae convenient.*

*Pag. 164. col. i. pl. iii. Valeriana peregrina purpurea, albæ, C.B.P. Indica. Hæc non est valeriana proprie dicta, cum ejus semen non sit pappo in superiore parte prædictum: semen fert cartilagineum quadantenus molle, & fungosum, oblongum, compressum, angustumque, semper binis fungosis, & mollioribus oblongis pariter tegumentis involutum, ac si esset cuneus adactus in alveolum, inter bina tegumenta firmiter amplecten-
tia, versus basin idem prædictum semen; florem habet elegan-
ter rubrum, quasi ex exterius & superius galeatum, & inferius tubulo oblongo tenui conflatum, à reliquarum valerianellarum infra recitandarum floribus distinctum; atque hoc dupli-
cili nomine, feminis diversa forma, & floris stru^tura variæ,
aptius à nobis disjungetur à valerianis, & ad valerianellæ classem
sequentem amandabitur.*

*Pag. 264. col. ii. pl. vii. Valeriana Græca cerula & alba, C.B.P.
flore cœruleo & albo, hort. Eyst. Hæc nec à capula feminali,
floribus, multo minus seminibus est valeriana, sed propter anal-
ogiam, seu conformitatem in foliis lobatis, seu pinnatis, cum*

valeriana sylvestri hic locavitur, at in cæteris partibus nil cum valeriana habet commune aut affine, nos tamen propter antedi-
ctam similitudinem in foliis tantum, cum valeriana fœmina, immediatè post valerianam marinam, proprie valerianam di-
vidim, quippe pappo in seminibus donatam, hanc eandem hic colloc-
vimus in Tab. cognitionis & affinitatis. Vide inter impropte
dictas umbellas cap. 1. tract. superioris.

*Pag. col. i. pl. xvii. & xviii. Valeriana rubra angustifolia C.B.P.
Hæc valeriana etiam si partibus essentialibus floribus & semine
quam proxime valerianis accedit, exiguum tamen cum illis ha-
bet affinitatem quod ad folia: sed primo intuitu ocyastro,
aut papaveri spumeo, foliis valde convenit; flores inquam ha-
bet valerianæ proprie dictæ, & fœmina ei omnino conformia;
in floribus hoc observatur discrimen, quod singuli inferius
calcaris donentur, atque hæc facta observatione (a Casp. Bau-
hino aliisque authoribus hucusque omisla) valerianellas omnes
per se in cap. sequenti umbellarum minus proprie dictarum col-
locavimus.*

CAPUT II.

UMBELLÆ IMPROPRIE DICTÆ.

Secundum Genus subalternum.

VALERIANELLA.

*VALERIANELLÆ omnes cum valerianâ suprà dictâ in
hoc convenient, quod flores producant in quina segmenta mar-
gine divisos, seu pentapetalos, unâ Galeatâ (de qua suprà dictâ
cum capite præcedenti) exceptâ. At omnes in seminibus valde
disparès sunt, ut videre est in Tab. Generali icon. seminum
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Con-
sule etiam Tab. 7am cognitionis, & affinitatis, ejusque expi-
cationem suprà; diversas icones diversorum seminum 10. val-
erianellarum cernere licet in Tab. Generali icon. sem. loco
citato.*

*Pag. 165. col. i. pl. xix. Valeriana campestris inodora major,
C.B.P. Errasse Casp. Bauhinum observamus hic, dum valeria-
nam campestrem majorem inodoram, seu laetucam agninanam
Ger. Tab. dubitanter asserit eandem cum valerianella altera
nudo umbilicato, & brevi fœmine, Col. Miror Casp. Bauhini
negligentiam, quum valeriana campestris cuilibet pagano, vel
rustico, aut oppidano artem manuariam excercenti sit satis fa-*

perque nota; cumque ejus semen passim in hortis holeraceis
spargitur à natura ipsam de novo quotannis producente. Quin
& Fabius Columna propriâ manu alterius semen umbilicatum,
nudum, breve pinxit, nullus Casp. Bauhino proinde dubitan-
di restare debuerat locus; hinc concludendum, aut ipsum nun-
quam alterutrius semen vidisse, aut saltem (si viderit) non bene
idem observasse, nec rite, aut attente Fabium Columnam
perlegisse. Nos perfectam & distinctam varietatem feminum
omnium harum umbellarum exhibuimus, in explicatione cap.
2. umbellarum impropte dictarum supra in doctrinâ nostra no-
vâ, atque semina ex *auto* sculta obtulimus, in Tab. generali
loco suprà hic citato. Comparete ipsa semina prædicta diversa,
& quam facilime distinctionem hanc nostram, specierum om-
nium harum percipietis. Consulite Tab. 7am cognitionis & affi-
nitatis, & umbellas non scriptas, sub finem tractatus præ-
dantis.

CAPUT III.

UMBELLÆ IMPROPRIE DICTÆ.

Tertium Genus subalternum.

PIMPINELLA SANGUISORBA.

PIMPINELLÆ & *Bipinellæ* à recentioribus, à foliorum ordinis pinnatim, seu plumatim digestis nominate, à veteribus indicie existimantur; quæ etiam *Bipennula*, & *Pampinella* vocantur. Hec duplex est, *pimpinella saxifraga*, seu *saxifraga*, à facultate calculorum à renibus expellendorum. Pimpinellam hanc (cujus supra meminimus) inter umbellas semine striato minore foliis lobatis donatas collocavimus cap. 2. trattatus superioris. Consule Tab. 2. cognitionis & affinitatis ibidem, ejusque explicationem, & Tabulam 2. affinitatis ejusque elenchum. Altera *pimpinella sanguisorba*, vel *sorbastrella*, quod sanguineos fluxus absorbeat, vel fistat, que & *mumivæn Myrepſio*, &

quibusdam sideritis 2^{da} Dioscoridis censetur. Ut Fabio Columnæ. Nobis hæc dicitur *pimpinella spicata*, ut distinguitur à *pimpinella umbelliferæ*, dictæ *saxifragæ* ab effetu, de quæ prius egimus loco citato, ubi observavimus Casparum Bauhinum male junxisse *pimpinellam sanguisorbam* cum *pimpinella saxifraga*. Nos ipsas separavimus, & magis apposite hic ad calcem *umbellarum* inter *impropriæ dictæ umbellas* *pimpinellam sanguisorbam* revocavimus, propter conformitatem foliorum lobatorum pinnatim pediculis adnexorum, videlicet ritu & modo *pimpinella saxifragæ*, seu *umbelliferæ* nobis sic dictæ.

CAPUT IV.

UMBELLÆ IMPROPRIE DICTÆ.

Quartum Genus subalternum.

FILIPENDULA.

Pag. 163. col. ii. pl. viii. *filipendula vulgaris* C. B. P. & minor in Prod. Male hæc collocantur hæc duæ à Casp. Bauhino inter œnanthes species, quæ sunt veræ & genuinæ umbellæ, cum filipendula non sit umbella proprie dictæ à tuberositate radicis non magis quam œnanthe; *Myconi* cuius erroris redarguimus C. Bauhinum suprà cap. 2. de œnanthe. *Filipendula* à glandibus olivaribus, longioribus minusve, ventriosis, asphodeli more foris ex rubro

nigricantibus, intus albescientibus, per fibrarum filamenta pensis, & connexis nomen fortia est. Nos hic inter umbellas *impropriæ dictæ* eandem digestissimus propter aliqualem in foliorum dispositione conformitatem cum umbellis proprie dictis, at ab œnanthe *umbellifera* eam averruncavimus propter rationes allatas suprà, cap. 2. de œnanthe, & hic.

CAPUT V.

UMBELLÆ IMPROPRIE DICTÆ.

Quintum Genus subalternum.

BARBA CAPRÆ.

Pag. 163 & 164. *Barba capræ*, à florum figura, que *Barbam caprinam* aliquo modo refert, nomen obtinuit: & prima seu major *Melandryon* Plinii l. 26. c. 7. censetur, cuius descriptio talis: *Melandryon* nascens in segete, & pratis fl. albo, odorato: altera ejusdem l. 24. c. 19. *Rhodora*; herba inquit, quam Galli *Rhodoram* vocant, caulem habet virgæ ficolæ modo geniculatum; folia urticæ in medio exalbida, eadem procedente tempore tota rubentia: florem argenteum fert.

Barbæ capræ folia sunt oblonga, castaneæ acuminata, serrata, plura ad costam medianam alligata, nullis intercedentibus foliolis, ut in *ulmaria*, à quæ & flores hujus plurimum differunt (scilicet in ligulis) qui racematum sunt positi perpusilli, candidi; folia autem *ulmariae* lato virore nitent, quin & septena ad rachin, seu costam medianam connexa sunt (intercedentibus plurimis minoribus) serrata, & nonnihil sinuata, crispo contextu plicata, & ad ulni folia accendentia; floribus onerantur caules compactis,

suaveolentibus, passim in pratis humidis provenientibus (unde *Regina prati* propter suaveolentem odorem dicta:) formæ est *filipendulæ vulgaris*, subalbidi seu sulphurei coloris: qui apposite satis à Carolo Clusio dicitur ὄχελευκος. Debut in pinace postponi *valeriana*, quia minorem possidet cum umbellis propriæ dictis affinitatem, quam *valeriana*; ut clare satis docuimus in cap. de *valeriana* supra.

CAPUT

CAPUT VI.

UMBELLÆ IMPROPRIÆ DICTÆ.

Sextum Genus Subalternum.

THALICTRUM.

Pag. 336. Θαλικτρον folia coriandri habet, at pinguiora: caulinum ruta crassitudine ramatim prove-
nientem producit, in quo folia umbellarum modo plurifariam per lobos disponuntur. Dioscoridi l
98. Sic dictum forte à Διόσκουρῳ vireo, eo quod dum germina protrudit, eleganter vireat. Phellandryum Plinii
aliqui suspicantur.

Thalictrum huc ad calcem umbellarum propriè dictarum re-
vocavimus, propter folia (multarum umbellarum more) plurifariam divisa: sicut alias plantas prædictas hic supra dispositas,
pimpinellam sanguisorbam, filipendulam, Barbam capræ, melius
& magis apposite hic quam post rutam à Casp. Bauhino collo-
cavimus, cum ruta sit quadricapsularis planta, flore luteo te-
trapetalō donata, & multis staminulis, seu floccis in medio
ornata, atque consequenter capsules quaternas singulis præ-
dictis floribus succedentes habet, que continent semina minuta,
longe à Thalicstro diversa; Thalictri enim semina omnia sunt
singularia, singularibus petiolis, seu radiolis insistentia, stria-

ta (solo Canadensi Jacobi Cornuti excepto, triquetra, aut
triangulari capsula, aut siliquâ donato) angulosa, vel striis seu
carinis, & fulcis prædicta, seminum umbellarum instar; ast flores
sunt muscosi, pluribus floccis lanuginosis constantes, quibus
omnibus ab umbellis discrepant. Foliis (ut supra dictum)
umbellis quamplurimis accedunt omnes Thalictri species,
nam folia sunt trifariam disposita, & ter tripartita, pediculis
suis innitentia, & propter hanc analogiam cum umbellis, ad
umbilicum umbellarum proprie dictarum, inter impropre di-
ctas, Thalictrum disposuimus.

FINIS.

Errata.

Pagina ii. linea 25. lege gradu masticatum. P. 21. l. 16. l. ejusque explicationem. P. 21. l. 9. l. pro
de Gingidio, de Sisaro. P. 21. omnibus in Tab. addatur ♀ excepto ammi perenni. P. 22. l. 11. l. Salmanti-
cam. P. 25. l. 13. l. 1. 2. 3. 4. 5. 5. P. 37. l. i. & infra l. Harcynica. P. 38. l. 6. pro sin-
gula petala l. singuli flores P. 44. l. ult. dele ut in. P. 46. l. 18. l. Salevæ. P. 47. l. 7. l. infrā. P. 52. l. an-
tep. l. venenatarum & pesti resistit. P. 56. in Tabul. dele Tab. Col. P. 57. l. 2. l. Lusitania P. 9. l. 6. l.
à qua in P. 64. l. penul. l. alis. P. 78. de Seseli Col. 1. l. 1. pro pl. iii. l. iv. P. 80. de Apio versus finem
l. exantlatas. P. 81. de aniso l. avinntor idem Col. 2. l. 9. l. ipso. P. 80. Col. 1. l. 6. l. pag. 288. ibi-
dem de apio col. 1. l. 1. pro pl. iv. l. vi. & l. 5. pro pl. ix. l. x. P. 84. col. 1. pl. 5. l. 5. l. pastinacæ P. 88.
cap. de cerefolio col. 2. l. 18. l. donata. In explicatione Tab. Gen. Icon. sem. lege 13. indicat semen
singulare cumini capitulis Glob. C. B. P. reticulo exemptum 13. indicat ejusdem semen reticulo involu-
tum & tectum. Alia errata leviora & punctationes corrigit lector.



