

RECUPERACIÓN DE LAS RAMBLAS COMO ELEMENTO DE VALOR PAISAJÍSTICO EN ZONAS RURALES DEL SURESTE PENINSULAR: LA RAMBLA DE CHIRIVEL.

P. CARIÑANOS GONZÁLEZ

Departamento de Botánica.Universidad de Granada

Las ramblas se definen como cursos de agua que carecen de flujo hídrico durante largos periodos de tiempo, que sin embargo pueden evacuar grandes cantidades de agua de escorrentía tras fuertes precipitaciones. El paisaje de ramblas constituye un rasgo morfológico típico del sureste árido peninsular donde juegan un papel importante como vectores de transporte de elevados caudales procedentes de fenómenos hidrológico de baja predecibilidad. Esta alternancia de periodos de sequías y avenidas condicionan que las ramblas presenten unas características físicas y ecológicas de gran valor por las comunidades naturales que albergan.

La rambla de Chirivel, que toma su nombre de uno de los pueblos de paso, constituye un corredor natural entre las regiones de Andalucía y Murcia, comunicando las altiplanicies de Baza y Huéscar con las llanuras de Lorca, encajada en dirección E-W por la Sierra de María al Norte y la de las Estancias al Sur.

Además del gran valor paisajístico que la rambla ha aportado a la zona, es de destacar su papel como impulsora del desarrollo socioeconómico de la comarca. La utilización de diversos sistemas tradicionales para la captación de las aguas de filtración y escorrentía ha permitido el mantenimiento de una actividad agrícola sostenible a ambos lados de su cauce que ha sido hasta hace poco tiempo la base de la economía local.

Son también de importancia las comunidades vegetales asociadas a la rambla, algunas de las cuales tienen su origen en la particular fisionomía del terreno o en las estructuras desarrolladas para optimizar su funcionalidad. Son frecuentes por lo tanto las comunidades halófitas que soportan altas concentraciones salinas y tupidos entramados de tarayales (*Tamarix* spp.) y sabuqueras (*Sambucus nigra*) que actúen de barrera en los momentos de avenidas. Pero si hay una característica diferencial en esta rambla es la presencia de un estrato arbóreo más o menos continuo, hoy dominado por sauces, álamos y almececes y en el pasado por fresnos y olmos. Este bosque de galería se encuentra en la actualidad muy degradado por las plagas y por la acción antrópica, que han modificado de forma sustancial el paisaje vegetal de la ribera. Entre los principales factores amenazantes se encuentran la utilización de parte de la rambla como carril de paso de vehículo, el abandono de la actividad agraria en los terrenos colindantes y algunos intentos de restauración no demasiado afortunados.

Está previsto que en breve se inicien las acciones necesarias para la recuperación de la fisionomía tradicional de la rambla, con especial énfasis en la restauración de la vegetación riparia como vector de conectividad entre las diferentes comunidades del entorno y en la reforestación de las tierras agrícolas que han ido quedando abandonadas. Al término de las mismas, el pueblo de Chirivel en particular, y la Comarca de los Vélez en general, recuperarán uno de los elementos más característicos de su paisaje natural tradicional.