


D. VARENI  
C. F. DE K. A. P.  
C. F. DE K. A. P.

A  
2-439



LIBR  
MUSEI  
HISTORIC

1000



103 4/18/22m

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL GRANADA	
Serie:	<del>A</del>
Estante:	<del>4</del>
Numero:	<del>79</del>

NOV. 21  
823/4

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
GRANADA

Sala: \_\_\_\_\_

A

Estante: \_\_\_\_\_

2

Numero: \_\_\_\_\_

43934

KTH ca  
M. Jo. Georq̄i Wemeri  
Koenigl. Miss  
compositum Viteb  
Anno 1715.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
GRANADA

Sala: \_\_\_\_\_

A

Estante: \_\_\_\_\_

21

Numero: \_\_\_\_\_

439

König  
M. Jo. Georgii Werneri  
Königst. Medic.  
compositum Viteb  
Anno 1715.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
GRANADA

Sala:

A

Estante:

2

Numero:

439

4



KT H ma  
M. Jo. Georgii Wemeri  
Koenigst. Misen  
compositum Viteb  
Anno 1715.



613272287



GEOGRAPHIA  
GENERALIS,  
In qua affectiones generales  
Telluris explicantur  
Autore  
BERNH. VARENIO  
Med. D.

AMSTELODAMI,  
Ex Officina Elzeviriana. 1671.

LIBRARY  
OF THE  
HOSPITAL  
REAL DE GRANADA



ANASTASIO  
EX OFFICINA ELIZABETHANA

*Ad Nobilissimos, Amplissimos, Spectatissimos, & Prudentissimos VIROS,*

D. CORNELIUM BICKER  
à SWIETEN, Dominum in Swieten,

D. NICOLAUM KORVER,

D. ANTONIUM OETGENS  
à WAVEREN, Equitem, Dominum  
in Waveren, Boxthol, Ruygewilnis,  
&c. Fœderatarum Belgii Provincia-  
rum nomine antehac ad Daniæ Re-  
gem Legatum,

*Consules  
Reipubl.  
Amstelo-  
dam. Sa-  
pientissi-  
mos.*

D. FR. BENNINGIUM KOCK,  
Equitem, Dominum de Purmerland  
& Ilpendam, Militiæ Urbicæ Tri-  
bunum,

D. GERHARDUM SCHAEF,  
J. U. D. Fœderatarum Belgii Pro-  
vinciarum Senatui Delegatum, & ad  
Potentissimum Daniæ Regem Exle-  
gatum,

*Consula-  
res Reip.  
Amstelo-  
& Gymn.  
Curator.  
hunc et-  
iam Aca-  
demie  
Lugd.  
Batav.*

D. WILHELMUM BACKER  
de CORNELIIS, Equitem S. Marci,  
in Confessu Deputatorum D. D. Or-  
dinum Hollandiæ Delegatum,

D. PETRUM HASSELAER,

D. CORNELIUM GRAEF,  
Dominum in Polsbroeck, Curato-  
rem Gymnasii Amstelodamensis,

*Consula-  
res &  
Thesaur-  
arios Reip.  
Amstel.  
fidelissim.*

NOBILISSIMI, AMPLISSIMI,  
SPECTATISSIMI, ET PRUDEN-  
TISSIMI CONSULES,

**T**ota hæc rerum Universitas, quam Mundum appellare con-  
suevimus, à longo jam tem-  
pore communi quasi hominum  
consensu diuisa fuit in Tellu-  
rem & Cælum. Quæ partitio etsi minus re-  
gulis Logicis, & ipsi naturæ conueniens vi-  
deatur, partim quod essentialem Telluris à  
cælo differentiam supponit, partim quod  
exiguam Tellurem toti cælo, hoc est, cen-  
trum orbi comparat, tamen ab omnibus fe-  
re jam recepta, & tanquam legitima appro-  
bata fuit, idque varias ob causas. Plerique  
ideo Mundum ita dividendum censent, quod  
tellus sit diversæ admodum à cælestibus cor-  
poribus naturæ: illam enim variis mutatio-  
nibus & corruptionibus obnoxiam esse: hæc  
vero incorruptibilia sine omni iactura persi-  
stere autumant. Deinde aiunt, Tellurem ad-  
eo parvam esse si comparetur ad Cælum, ut  
sit instar puncti vel centri: centrum autem  
diversam valde naturam habere ab ipso orbe,  
ac proinde recte Tellurem & Cælum oppo-  
ni, tanquam diversa & contraria. Cæterum  
hæc rationes non sunt veritati consentaneæ.

Etenim



D E D I C A T O R I A .

Etenim neque excepta sunt à mutationibus & corruptionibus cœlestia corpora, ut demonstrarunt hujus & præcedentis seculi Mathematicorum observationes: neque Tellurem centrum cœli occupare firmis ostensum est hætenus argumentis. Quod si ob parvitatem opponenda esset Cœlo, multo rectius Luna & quædam aliæ stellæ, quæ minores sunt Tellure, eidem opponerentur. Cum itaque hæ rationes falsitatibus laborent, aliæ afferendæ sunt, propter quas totius hujus Universi unam partem Cœlum, alteram esse Tellurem dixerint Majores nostri. Illæ videntur esse hæ: Prima, quoniam Tellus est generis humani domicilium, ideoque à nobis non minoris æstimanda est quam totum Cœlum. Altera, quia non tantum Tellus est domicilium nostrum, sed etiam ab illa prima nostra origo est, illa nobis præbet & conservationis & propagationis adminicula. Tertia, quoniam è Tellure nostra cœlestium corporum motus contemplantur. Quarta, quia in Tellurem cœlestia corpora vires suas exerere videntur. Quinta, quoniam Telluris constitutio magis nobis cognita est, quam cœlestium corporum. Verum, utcunque se istæ rationes habeant, id certe ab omnibus prudentibus conceditur, quod cognitio Telluris sit non tantum homine dignissima, sed etiam tam in Republica litera-

## EPISTOLA

ria, quam ad vitæ usum pernecessaria. Non jam dicam de usu quem præstat Historiarum studio, cujus lampades non immerito statuuntur Chronologia & Geographia: non de usu, quem præstat Theologiæ, Physiçæ, Politicæ, & aliis disciplinis: illas modo utilitates & commoditates consideremus, quibus mercaturam & rem nauticam, quæ duo Vestræ Reipubl. ærarium, hoc est nervum rerum gerendarum constituunt, adjuvari à Geographia docet & testatur quotidiana in hac urbe experientia. Annon ad mercaturam feliciter & cum fructu, addo etiam jucunde, exercendam plurimum facit, scire regionum, ad quas merces mittendæ, vel è quibus ad hunc vel alia loca deferendæ sunt, situm, distantiam, interjecta maria, iter, vicina loca, infensos vel amicos incolas habentia, & alia, quæ quidem è Mappis Geographicis non sine honesta animi voluptate hauriuntur? Nautæ vero amplissimum imo divinum Geographiæ usum agnoscunt, quando remota maria & furentem Oceanum sulcare suscipiunt freti Mapparum Geographicarum & aliarum regularum, quas ad directionem navis Geographia illis largita est, certitudine. Quæ et si hodie in hac vestra civitate non tam à Mathematicis, quam ab artificibus lucri causa & nautarum informato-ribus, imo ab ipsis nautis fiant & doceantur, nemo

nemo tamen ideo existimare debet, ab illis, non à Mathematicis profecta hæc esse. Et enim inventio illarum rerum & demonstratio, unde certitudo dependet, multo difficilior fuit & majoris est operæ, quam usurpationis: hanc Mathematici ita facilem reddere, ut etiam illi, qui Mathematici non essent, capere possent: illam vero, demonstrationem dico, quoniam ex ipsis Mathesis penetralibus, nempe Theoretica Geometria, maxima ex parte petitur, soli Mathematici asservant, quandoquidem majorem postulat ingenii fatigationem, quam homines, qui lucro tantum intenti solam usurpationis & utilitatis cognitionem quærunt, sustinere velint vel possint. Neque hoc tantum in Geographia locum habet, sed etiam in plerisque aliis Scientiis Mathematicis idem perspicue licet videre, inprimis in Arithmetica. Quid ejus usu & exercitio hodie vulgarius, præsertim in hac vestra civitate? quid facilius? quis è mercatoribus, imo mercatorum pueris, non novit promptissime calculum juxta regulas Arithmeticæ instituere, imo etiam alios artem hanc docere? At vero, antequam regulæ, juxta quas praxis instituitur, à Mathematicis essent è penetralibus Arithmeticæ erutæ & demonstratæ, & methodus expedita exercitii monstrata, plane tunc nemo erat qui ista facere posset. Ne-



que si ab illis, qui promptissimi sunt in usu; quæras, cur hoc vel isto modo ad supputationem agendum sit, quicquam rationis vel fundamenti nancisceris, quoniam demonstrationes à Mathematicis tantum & fiunt & asservantur: neque si nova quædam regula pro novo usu invenienda sit, ad alios, quam Mathematicos recurritur. Et eodem modo cum Perspectiva, statica Mechanica, Musica, Arte muniendi, Geodesia & aliis scientiis comparatum esse perquam facile est ostendere: ut inde manifestum sit, quanta beneficia à Mathesi in vitæ humanæ usum, imprimis vestram civitatem, profecta sint. Sed ut ad Geographiam redeam, etsi hæc tantum de Tellure agat, quæ instar puncti est si cum Cælo conferatur, tamen non minus peculiarem partem Mathesis constituit, quam Astronomia, idque propter causas supra allatas. Duplex autem est Geographia: una Generalis, altera Specialis. Illa considerat Tellurem in genere, varias ejus partes & generales affectiones explicans: hæc autem, Specialis scilicet, observans regulas generales recenset singularum regionum situm, divisionem, terminos & alia cognitu digna. Caterum qui hæcenus Geographiam scripserunt, illi de sola fere speciali prolixè egerunt, pauca vero ad Generalem pertinentia explicarunt, plurimis iisque necessariis neglectis & omis-

fis,

sis, ita ut juvenes specialem addiscentes fun-  
 damenta hujus disciplinæ maxima ex parte  
 ignorarent & ipsa Geographia vix Scientiæ  
 titulum tueretur. Quod cum animadvertere-  
 rem, ut malo huic remedium facerem, cœpi  
 cogitationes meas ad supplendum hunc de-  
 fectum, hoc est, ad scribendam Generalem  
 Geographiam convertere, neque à suscepto  
 labore cessavi, donec opus absolutum esset,  
 ut nimirum pro mearum virium modulo  
 quem ex diligenti Mathematicarum disci-  
 plinarum per multos annos cultura Deus mi-  
 hi concessit, Reipubl. literariæ atque juven-  
 tutis studiis inservirem, vel saltem volunta-  
 tem inserviendi probarem. Hunc meum la-  
 borem cur vobis, VIRI MAGNIFICI,  
 inscripserim & consecraverim, plurimis in-  
 ductus sum rationibus. Prima, quoniam to-  
 to terrarum orbe nulla est civitas, quæ ma-  
 gis quam hæc Vestra Geographiæ cognitio-  
 ne & indigeat & utatur propter admirandas  
 in omnes terræ angulos navigationes. Se-  
 cunda, quia Vestræ Reipubl. navigationibus  
 non parum crevit Geographiæ studium, mul-  
 ta dubia & incertitudines sublatae sunt. Ter-  
 tia, quoniam Vos cognovi esse omnis crudi-  
 tionis Fautores & Promotores, ideo nullus  
 dubito, quin Geographicum quoque studium  
 maximi æstimetis. Quarta, eaque præcipua  
 causa est, quod hoc meum opus in Vestra Ur-

## EPISTOLA

be & confectum & in lucem editum fuit. Non itaque sub alterius Patroni favore, quam Vestro, in lucem prodire debuit. Etenim cum Patria mea variis prius belli injuriis afflicta tandem in favillas & cineres tota redacta esset, bono quodam fato vel potius Dei Opt. Max. providentia in Vestram civitatem me contuli, ubi commodam nactus sum scribendi occasionem de iis rebus, quas in alio loco agens vix potuissem absolvere, quandoquidem non pauca ab aliis Scriptoribus vel omissa vel perperam tradita de Terræ & Oceani partium conditione, situ, ventis, & populorum moribus exquirenda fuerunt à nautis vel aliis, qui in regionibus istis commorati fuerant. Multa in hoc libro loca id testantur: idem manifestum est ex commentariis, quos præcedenti anno de Japoniæ regno, religione, ut & diversa gentium religione edidi: & magis id perspicuum evadet, si favore Vestro & liberalitate studia mea juvabitis, ut perficere liceat, quæ inter alias meas meditationes de naturalibus observationibus in variis Telluris partibus, quæ de cibo & potu diversorum populorum, quæ de cibi & potus essentia & materia, item de diversa diversarum gentium medicina, & quæ de medicamentis paratu facilibus atque aliis rebus commentari incepi. Laus vestra est,

PROCERES, quod industrios & labore suo

Rei-

DEDICATORIA.

Reipublicæ inservire cupientes atque hoc ipso opere demonstrantes libenter foveatis, alatis & promoverestudeatis: date & mihi, cujus conatus adversa fortuna Marte & Vulcano impedire satagit, ut vestram liberalitatem laudare, Vobisque eorum, quæ publico bono edere studeo, promotionem ascribere possim, quo tota Respubl. literaria intelligat, quantum Vestræ Prudentiæ debeatur. Quod si feceritis, operam dabo ut intelligatis, non in hominem ignavum & Vestra liberalitate atque favore abutentem beneficium Vos contulisse. Deus Vos, vestramque Rempubl. diu incolumem servet. Valete. Ex meo museo Calendis Augusti, Anno MDCL.

V<sup>o</sup> Mag<sup>a</sup>, Ampli<sup>s</sup>. & Prud<sup>s</sup>,

Observantissimus

BERNHARDUS VARENIUS,  
Med. D.



C O N T E N T A  
SINGULORUM CAPITUM, ET  
PROPOSITIONUM INDEX.

C A P U T I.

De præcognitis Geographiæ. Pag. 1

PROPOS. I. *Definitio.*

2. *Divisio.*
3. *Objectum.*
4. *Affectiones.*
5. *Principia.*
6. *Ordo.*
7. *Methodus.*
8. *Origo & incrementum Geographiæ.*
9. *Præstantia Geographiæ.*

C A P U T II.

De Geometricis præcognitis. Pag. 3

1. *Tres sunt magnitudinum species.*
- 2, 3, 4, 5. *Definitiones lineæ rectæ, circuli, diametri, arcus.*
6. *Super datam rectam erigere perpendicularem.*
7. *Circulum & peripheriam in quatuor quadrantes secare.*
8. *Peripheriam in gradus 360 dividere.*
9. *Quadranguli rectanguli capacitatem invenire.*
10. *Datâ circuli semidiametro invenire peripheriam.*
11. *Datâ peripheriâ invenire diametrum.*
12. *Datâ globi alicujus diametro invenire ejus superficiem curvam, & soliditatem sive capacitatem globi.*
13. *Definitiones trianguli rectanguli, sinus, tangentiæ, & Canonis Mathematici.*
14. *Duo necessaria theoremata.*
15. *Quatuor necessaria problemata.*
16. *Variarum mensurarum explicatio.*

## CAPUT III.

## De Telluris figura.

P. 19

1. *Varia hominum opiniones de figura Telluris.*
2. *Figura est prima affectionum Telluris, ex qua omnes reliqua dependent.*
3. *Rationes, quibus sphaerica probatur, à priori.*
4. *Rationes à calo desunt a.*
5. *Rationes à terra ipsa desunt a.*
6. *Refutatio Objectionum.*

## CAPUT IV.

## De Telluris dimensione &amp; magnitud.

P. 30

1. *Telluris dimensio tria complectitur; lineas, superficiem & solidum.*
2. *De diversis autoribus, qui illam dimensionem tenuerunt.*
3. *Modus primus vulgaris.*
4. *Modus secundus Eratosthenis.*
5. *Modus tertius Pofidonii.*
6. *Modus quartus Snellii.*
7. *Modus quintus, primus terrestris.*
8. *Modus sextus, secundus terrestris.*
9. *Modus septimus, tertius terrestris.*
10. *Determinatio circuitus Telluris, diametri, superficiei, capacitatis Telluris in milliaribus & perticis linearibus, quadratis & Cubicis.*
11. *Defectus & vitia in enumeratis antea dimensionum modis.*
12. *De magnitudine minorum peripheriarum Telluris.*

## CAPUT V.

## De Motu Telluris.

P. 48

1. *Motus Telluris est causa calisium apparentiarum juxta Copernicanos.*
2. *Mo-*

INDEX CAPITUM

2. Motus duplex præter tertium, qui inclinatio potius est axis.
3. Rationes, quibus motus illi probantur.
4. Responsio ad objectiones.
5. Celeritas motus istius in diversis Telluris locis.

CAPUT VI.

De loco Telluris in Mundi Systemate. P. 54

1. Communis opinio Tellurem in centro collocat totius Mundi.
2. Situs Telluris & ordo Planetarum.
3. Locus Telluris Copernicanus.
4. Distantia Telluris à Planetis.
5. Distantia Telluris à stellis fixis.

CAPUT VII.

De Telluris substantia & constitut. P. 59

1. Ex quibus corporibus Tellus composita sit, exponere.
2. Tellus dividitur in partem consistentem, liquidam, & Atmospheram, sive in terram, liquorem seu aquas, & aërem.
3. Quomodo terra & aqua cohereant & unum globum faciant.
4. Terrarum superficies continua est, aquarum non continua.
5. Quomodo Telluris partes à superficie ad centrum se habeant, non est omnino certum.
6. Consistentia terra & coherentia est à sale.
7. Terrarum species variis modis commixta sunt in Tellure.
8. Partium Telluris situs & dispositio diversa est diversis temporibus.

CAPUT VIII.

De Divisione partium terræ in partes integrantes, facta à mari. P. 67

1. Terra quadam portio tegitur aquis, alia extat.
2. Terra

ET PROPOSITIONUM.

2. Terra extantes sejuncta sunt à se invicem per interfluentem aquam.
3. Magna continentes sunt quatuor; earum enumeratio.
4. Insularum magnarum decem enumeratio.
5. Insularum mediocrium decem enumeratio.
6. Insularum parvarum decem enumeratio.
7. Minimaram insularum enumeratio.
8. De penisulis & isthmis, atque terris procurrentibus.
9. Peninsularum quatuordecim enumeratio.
10. Isthmorum insigniorum enumeratio.

CAPUT IX.

De Montibus in genere, & dimensione altitudinis. P. 80

1. Partes terra diversa sunt altitudinis.
2. Montis alicujus altitudinem per geodasiam investigare.
3. Datâ altitudine montis investigare ejus à certo loco distantiam.
4. Datâ distantia, à qua primo conspicitur vertex montis, invenire ejus altitudinem.
5. Cognitâ altitudine montis invenire remotissimam distantiam, è qua videri potest.
6. Datâ Solis ad tempus aliquod altitudine supra horizontem, & longitudine umbra, quam mons à Sole illustratus tunc spargit, invenire montis altitudinem.
7. Montium altitudo ad semidiametrum Telluris non habet sensilem proportionem sive non tollit rotunditatem Telluris.
8. Quomodo montes extiterint, explicare.
9. Cur in montium fastigiis pluvia & aquea meteoza frequentia, cum in vallibus serenitas est.
10. An montis superficies sit capacior, quam subjectum planum, sive pes montis.



INDEX CAPITUM

5. Motuum maris quidam est generalis, quidam sunt proprii, reliqui contingentes.
6. Contingentium motuum maris causa est ventus.
7. Generalis Oceani motus duplex est, unus continuus, alter fluxus & refluxus.
8. Venti saepe immutant motum generalem Oceani.
9. Causa generalis motus incerta est.
10. Qualis sit motus, qui dicitur fluxus & refluxus.
11. De causa fluxus & refluxus.
12. Cur in pleniluniis & noviluniis motus maris generalis est magis vehemens, quam alio tempore, sicut etiam intumescencia major tunc sentitur.
13. Cur diebus aequinoctiorum motus generalis & maris intumescencia major.
14. In quibusdam littoribus magnus est affluxus & refluxus, in aliis vix sensilis.
15. Affluxus maris est violentus, refluxus naturalis.
16. In locis, ubi Luna est verticalis, affluxus est maximus.
17. Quantitas affluxus non est constans.
18. Tempus termini affluxus incipientis & desinentis variat in diversis locis.
19. Mare ad pleraque littora sex horis affluit, sex refluit, in quibusdam tamen paucioribus affluit quam refluit, & contra.
20. An Luna horizontem attingente incipiat affluxus.
21. Data hora, in qua altitudo summa est fluxus die novilunii in aliquo loco, invenire horam summae altitudinis pro sequentibus diebus.
22. Venti protrahunt & imminuunt terminum affluxus vel refluxus.
23. Specialium motuum maris magna est diversitas. Primus perpetuus.
24. Secundus specialis perpetuus.
25. Tertius specialis perpetuus.
26. Quartus specialis perpetuus.
27. Quintus specialis perpetuus.

28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
lu  
lin

De I

1.  
2.  
3.  
pi  
4.  
gen  
5.  
gen  
6.  
rat  
7.  
be  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.

De F

1. 2

ET PROPOSITIONUM.

28. *Sextus specialis perpetuus.*
29. *Septimus specialis perpetuus.*
30. *Specialium motuum periodicorum enumeratio.*
31. *Vortices maris duplices sunt.*
32. *Causa tremoris maris & exempla.*
33. *Cur mare Pacificum calo sereno magis tranquillum est & sine fluctibus, ventis autem levibus facillime movetur.*

CAPUT XV.

De Lacubus, Stagnis, & Paludibus. P. 206

1. *Definitiones lacus, stagni & paludis.*
2. *Lacus sunt quadruplices.*
3. *Eorum lacuum, qui neque emittunt neque recipiunt fluvios, generationem exponere & enumerare.*
4. *Eorum, qui emittunt sed nullos recipiunt fluvios, generationem exponere.*
5. *Eorum, qui recipiunt, sed nullos emittunt fluvios, generationem explicare.*
6. *Eorum, qui & recipiunt & emittunt fluvios, generationem explicare.*
7. *Lacus plurimi dulcem, pauci salsam aquam habent.*
8. *Utrum mare Caspium sit lacus an sinus Oceani.*
9. *Utrum Pontus Euxinus sit lacus an sinus Oceani.*
10. *Lacuum enumeratio, qui insulas habent in medio.*
11. *In dato loco lacum efficere, si fieri possit.*
12. *Lacum exsiccare.*
13. *Paludes duplices sunt.*
14. *Paludes habent terram sulphuream.*
15. *Paludes exsiccare.*

CAPUT XVI.

De Fluviis in genere.

P. 219

1. *Definitiones fluvii, rivi, confluentis, &c.*

2. Ter-

INDEX CAPITUM

2. Torrentes & rivi existunt interdum à copiosa pluvia & resoluta nive.
3. Plerique rivi oriuntur è fontibus, fluvii ex congressu rivorum.
4. Fluvii augentur à pluvia & resolutione nivis, diversis annitemporibus.
5. De causis fontium, sive unde aqua fontana oriatur.
6. Fluvii quidam sub terram se conduunt & rursus emergunt.
7. Fluvii exonerant se in mare vel lacum. Rivi pauci stagnant.
8. Utrum à natura an hominum industria sint facti fluviorum alvei, & itinera.
9. Alvei, quo fontibus sunt propiores, eo sunt altiores: quo ostiis propiores, eo sunt depressi magis. De Cataractis.
10. Cur fluvii in una sui parte sunt latiores quam in alia.
11. Fluviorum alvei magis vel minus depressi sunt modo in una, modo in alia parte.
12. Cur fluvii quidam tardi, quidam celeres: Et idem fluvius celerior in uno quam in alio loco decurrit.
13. Fluvii pauci directo, plerique flexuoso itinere feruntur ad ostia sua.
14. De lacubus per quos quidam fluvii transeunt.
15. Fluvii plerique quo ostiis fiunt propiores, eo latiores evadunt.
16. Aqua fluviorum multas particulas variorum metallorum, mineralium, sabuli, succorum oleosorum & aliorum continent, spiritus quoque subtiles vitrioli, salis, sulphuris, &c. Auriferorum rivorum enumeratio.
17. Plurimorum fluviorum aqua discrepant coloribus, gravitate, aliisque qualitatibus.
18. Quidam fluvii adeo augentur stato tempore, ut exundent in vicinas terras. Enumeratio eorum fluviorum,

19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
D  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

ET PROPOSITIONUM.

viorum, & causa.

19. Quomodo fontes prorumpant.
20. Dato loco in terra, inquirere an possit in illo fons seu puteus fieri.
21. Dato loco in terra, efficere in illo fontem, si fieri possit.
22. Dato loco, apparentem in illo fontem efficere, si fieri possit.
23. A dato fonte vel fluvio ad datum locum deducere fluvium. De libramento aquae.
24. Fluviorum longi tractus & magnorum enumeratio.
25. In quibusdam fluvii sunt veragines & vortices.
26. Aqua fluviorum est levior quam marina.

CAPUT XVII.

De Aquis mineralibus, thermis, acidulis & aliis, quas vulgus admiratur. P. 287

1. Nulla aqua pura est & elementaris. Definitio aquae mineralis.
2. Aqua minerales sunt triplici modo.
3. Quomodo aqua minerales generentur, explicare.
4. Aquarum mineralium infinita sunt species.
5. Differentias celebriores liquorum, quas vulgus miratur, enumerare.
6. De aquis acidulis.
7. De Thermis.
8. De oleosis & pinguibus aquis.
9. De aquis amaris.
10. De fontibus frigidis admodum.
11. De aquis, quae mutant corpora.
12. De aquis venenatis & mortiferis.
13. De aquis coloratis.
14. De aquis salis.
15. De fontibus ebullientibus & cum spiritu prorumpentibus.
16. De aquis aliis mirabiles proprietates habentibus.



## INDEX CAPITUM

17. Fontes statò tempore prorumpentes.

## CAPUT XVIII.

De Mutatione &amp; generatione locorum aridorum &amp; aquarum Telluris. P. 298

1. Superficiem Terra extantis & illam, qua aqua tegitur, explorare.
2. Superficies terra & aqua non est perpetuo eadem.
3. Quantum terra & quantum aqua Tellus contineat, supputare.
4. Aqua litus deserit, & locus ejus fit terra, varias ob causas: Primo de paludibus & stagnis.
5. Fluvii ripas & alveum deserunt & novam terram præbent.
6. Lacus exsiccantur & in terram mutantur.
7. Freta exsiccantur.
8. Sinus exsiccantur.
9. Oceani partes exsiccantur.
10. Pulvinorum generationem explicare.
11. An pulvini sint futuri pars continentis vicine, inquirere.
12. Insula fiunt variis modis.
13. Rariores modi generationis insularum.
14. De insulis natantibus.
15. Fluvii occupant terrarum tractus, quos antea non occupabant, varias ob causas.
16. Lacus, paludes & stagna occupant terrarum tractus, quos antea non occupabant.
17. Oceanus occupat terrarum tractus, quos antea non occupabat.
18. An fieri possit, ut tota superficies Telluris occupetur à sola aqua, vel à sola terra.
19. Cur in medio Oceano pauca insula, plurima & agmina insularum non procul à continentibus vel majoribus insulis.
20. Qua de causa agri fiant fertiles vel steriles, & ad litora maris mutantur terra agros tegentis species.

## De Atmosphæra &amp; Aëre.

P. 312

1. Ex Telluris partibus perpetuo ascendunt exhalationes.
2. Atmosphæra constitutio.
3. Exhalationes diverso tempore & diversis locis plures vel pauciores.
4. Exhalationes sunt varii generis.
5. Particula aëris repellunt radios Solis tanquam speculum.
6. Partes atmosphæra supra sunt subtiliores quam infera.
7. Exhalationes violento motu pelluntur sursum, naturaliter deorsum vergunt.
8. Atmosphæra incallescens majorem locum postulat, frigida contrahitur in minorem.
9. Thermometrum sive Thermoscopium conficere.
10. Quomodo vel quantum possit aër rarefieri.
11. Cur in Zona frigida aër plerunque crassus & nebulosus.
12. Cur in severissimo hyemis frigore aër est subtilis & serenus.
13. Cur aër Horizontalis apparet crassior.
14. An aëris seu atmosphæra altitudo in omnibus locis sit una & eadem.
15. Condensatio aëris & rarefactio non mutat ejus altitudinem.
16. Aëris altitudo eadem est in omnibus locis & omni tempore.
17. Aër hyeme & nocte densior quam astate & die.
18. De diversa densitate aëris in diversis locis.
19. In locis polo vicinis Telluri propior est media aëris regio.
20. In locis polo vicinis remotior est regio aëris calida, sive suprema initium.
21. Radii Solis, Luna & Stellarum refringuntur in aëre.

INDEX CAPITUM.

22. Propter illam refractionem Sol & Luna citius videntur in ortu, quam debebant.
23. Quo aer crassior, eo major refractione.
24. Quo aer crassior, eo citius videtur Sol & Luna.
25. Quo aer est humilior, qui refractionem facit, eo citius videtur Stella.
26. Eadem potest esse stella alicujus refractione ad eundem ejus situm, etsi diversa sit aeris altitudo.
27. Si loci alicujus aer sit & crassior & humilior, quam alterius, citius Luna & Sol videbuntur in illo quam in hoc.
28. Si unius loci aer sit crassior & altior quam in altero, potest & citius & tardius videri orienti stella.
29. Observatis duabus refractionibus ad duas altitudines, invenire inde & aeris altitudinem & crassitatem aeris respectu aetheris, sive regulam refractionis.
30. Invenire minimam aeris altitudinem, qua esse potest.
31. Invenire regulam refractionis.
32. Invenire refractiones ad quamvis inclinationem.
33. Invenire refractionem ad datam stellae altitudinem.
34. Radii stellarum, imprimis Solis & Luna, reflectuntur seu repercutiuntur a particulis aeris.
35. Reflexio illa est causa crepusculi praecipua.
36. Crepusculi initium quando fiat.
37. Ex crepusculi quantitate non potest inveniri altitudo aeris.
38. Quanta aeris altitudo fiat, si supponamus a duplici reflexione oriri crepusculum.
39. Data aeris altitudine, ejus quantitate supponere.
40. Aer in quibusdam locis quadam habet peculiaris.

De  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
zo  
12.  
13.  
lar  
qu  
14.  
15.  
les.  
16.  
for  
17.  
tur  
18.  
19.  
ran  
20.  
ext

## CAPUT XX.

De motu aëris &amp; Ventis in genere ; de plagis.

P. 368

1. *Venti definitio.*
2. *Venti plerique ab una plaga ad oppositam tendunt.*
3. *De plaga definitione.*
4. *Plagarum numerus, & ventorum.*
5. *Plaga & venti triginta duo.*
6. *Alia subtilior numeratio plagarum & ventorum.*
7. *Veterum numeratio ventorum.*
8. *Alia veterum numeratio.*
9. *Venti oppositi.*
10. *Causa ventorum varia.*
11. *Cur venti perpendiculariter spirent supra loci Horizontem.*
12. *Cur venti interrupto impetu spirant.*
13. *Cur ventus nullus vel rarus admodum perpendicularis in locum desuper ex aëre spirat, sed omnis obliquus quasi.*
14. *Cur venti Australes & Occidentales tepidi sunt.*
15. *Cur Occidentales minus frequentes quam Orientales.*
16. *Cur Septentrionales & Orientales majori nisu & fortiores, Austrini & Occidentales debiliores.*
17. *Cur nubecula crassior & subnigra prænunciat ventum ab ea plaga.*
18. *Cur in Vere & Autumno frequentiores sunt venti.*
19. *In quam aëris regione vel altitudine venti spirant.*
20. *Ad quantum spatium unus idemque ventus se extendit.*



## De Ventis in specie, &amp; de Tempestatibus.

P. 383

1. *Ventus alius constans, alius inconstans.*
2. *Alius generalis, alius particularis, & causa generalis venti.*
3. *Quidam venti periodici & statii, alii vagi & contingentes. Enumeratio periodicorum.*
4. *Etesiarum causa.*
5. *Cur in multis locis Etesia non deprehendantur.*
6. *Venti quidam proprii, alii communes.*
7. *Venti quidam sunt periodici horarii.*
8. *Venti Septentrionales plures in locis, qui in polo Septentrionali propiores.*
9. *Ventorum species quatuor.*
10. *Venti quidam impetuoosi subitanei. illorum species. Travados. Exempla singulorum. De Ecnephia.*
11. *De Exhydria.*
12. *De Typhone.*
13. *An venti quidam ex ipsa Terra vel Aqua erumpant.*
14. *An ventus quidam oriatur à fluxu maris & fluviorum.*
15. *Causa Castoris, Pollucis & Helena in tempestatibus.*
16. *Cur in Oceani Ethiopici parte sub Equatorem præcipue ad Guinea littora tam frequens malacia.*
17. *Quibusdam locis procella & tempestates sunt anniverfaria.*

Defini

1. D  
Polo  
Circu  
ridian
2. D  
stella
3. D

De lo

1. D
2. D
3. La
4. D  
zonl
5. La  
duo.
6. Ex  
datar  
haber
7. In  
trion
8. Gl
9. La
10. D
11. Si  
tudo  
punct

ET PROPOSITIONUM  
GENERALIS GEOGRAPHIÆ.

LIBER II.

De Affectionibus Telluris caelestibus.

CAPUT XXII.

Definitiones & præcognita necessaria. P. 416

1. Definitiones Globi, Mapparum Geographicarum, Polorum Telluris, Axis, Equatoris, Parallelorum, Circulorum latitudinis, Tropicorum, Polarium, Meridiani, Horizontis, &c.
2. De motu sive circumvolutione diurna apparenti stellarum.
3. De motu Solis proprio seu annuo.

CAPUT XXIII.

De locorum latitudine & elevatione poli.

P. 424

1. Definitio latitudinis loci, & circuli latitudinis.
2. Definitio elevationis poli.
3. Latitudinem loci in globo & mappis invenire.
4. Dato loco in globo, ita disponere globum, ut Horizon ligneus fiat loci illius Horizon.
5. Latitudo loci aequalis est elevationi poli. Corollaria duo.
6. Exhibere in globo & mappis omnia illa loca, qua datam ab Equatore distantiam sive latitudinem habent.
7. Invenire lineam meridianam, sive plagam Septentrionis & Austri in dato loco.
8. Globum constituere juxta cardines mundi.
9. Latitudinem loci de calo observare vel investigare.
10. Diversitas latitudinis locorum.
11. Si in loco ignoto versemur, inventa autem sit latitudo loci, exhibere in globo peripheriam, in cujus uno puncto nos esse certum sit.

De Zonis & apparentiis cœlestibus in diversis Zonis. P. 434

1. Divisio Telluris superficiei in Zonas oritur à motu Solis proprio. Definitiones Zonarum.
2. Signum, ex quo colligimus, in qua Zona quilibet locus jacet.
3. Per qua loca Aequator transeat, sive qua loca in Aequatore jaceant: quanam regiones in Zona Torrida, Temperata, Tropicis, Zonis frigidis sitæ sint.
4. Quibus locis Sol semel in anno fiat verticalis, quibus bis, quibus nunquam.
5. Quibus locis Sol aliquot circumvolutionibus sive integris diebus non oriatur, & totidem non occidat: quibus locis uno tantum anni die non occidat, &c.
6. Quibus locis Sol quotidie oriatur & occidat.
7. Dato loco in Zona Torrida, invenire duos illos anni dies, quibus Sol verticalis sit illi loco.
8. Dato loco in Zona Frigida, invenire diem anni, qui primus erit, quo Sol illi loco non occidet: item quot dies non occidet; Et contra, diem primum, quo Sol non oriatur.
9. Dato die anni, exhibere omnia illa loca Telluris, quibus Sol eo die verticalis fiet in meridie.
10. Dato die anni, exhibere omnia illa loca Telluris, quibus Sol non occidit illo die, ita ut hic dies primus sit.
11. Latitudinem & magnitudinem singularum Zonarum supputare.

De lon  
cis

Cl

1. D

equi

2. L

equi

totid

3. A

duos

4. D

rum

loci,

5. D

6. Q

longi

7. D

habe

simu

8. O

sita

eand

DE

9. D

incre

10. D

11. D

veni

12. D

Tell

totid

13. T

14. A

Tab

## CAPUT XXV.

De longitudine diversa dierum in diversis locis, & inde ortâ divisione superficiei in Climata. P. 447

1. Duobus anni diebus in omnibus Telluris locis fiunt æquinoctia, sive nox diei æqualis.
2. Locis in Æquatore sitis omnes dies noctibus sunt æquales. Poli loco unus est tantum dies & una nox totius anni, &c.
3. Aliis locis nulli alii dies æquales noctibus præter illos duos.
4. Dato loco in globo & dato die anni, invenire numerum horarum, quibus Sol supra Horizontem illius loci, & quibus infra cum illo die morabitur.
5. De die longissimo & brevissimo.
6. Quomodo dies accrescant in singulis locis usque ad longissimum, & decrescant ad brevissimum.
7. Duorum locorum, qui ab Æquatore est remotior, habet omnes unius anni semissis dies atque ideo longissimum diem longiores.
8. Omnia loca Telluris, qua in uno eodemque parallelo sita sunt, habent omnes anni dies, & ideo quoque eandem longissimi diei quantitatem.

DEFINITIONES Climatum, parallelorum.

9. De inæquali incremento longissimi diei ad æquale incrementum distantia locorum ab Æquatore.
10. De eadem inæqualitate.
11. Datâ quantitate diei longissimi in aliquo loco, invenire ejus latitudinem.
12. Dato aliquot dierum numero, exhibere illa loca Telluris, (sive, invenire Latitudinem locorum) ubi Sol tot diebus non oritur & totidem non occidit.
13. Tabulam Climatum construere.
14. Aliorum Geographorum methodus constructionis Tabula, &c.

INDEX CAPITUM

15. Usam Tabulae Climatum monstrare.

CAPUT XXVI.

De luce, calore, frigore, anni tempestatibus in  
diversis Telluris locis & Zonis. P. 468

1. Causarum enumeratio, qua efficere vel variare possunt lucem, calorem, &c.
2. Quomodo Ver, Aestas, Autumnus & Hyems generaliter definienda sint.
3. Determinatio temporis Verni, Aestatis, &c. in diversis Zonis & Zonarum locis.
4. Dato loco Zona Torrida invenire dies anni, quibus Aestas, Autumnus, Ver, Hyems incipit & desinit.
5. In quibus locis quatuor tempestatum aequale sit tempus, & in quibus inaequale.
6. De inaequali Solis infra Horizontem depressione in diversis locis.
7. Invenire longitudinem crepusculi in dato loco ad datum diem.
8. In Torrida Zona crepuscula sunt minima, in frigida longissima, &c.
9. Qua hora in Zona Torrida loco aliquo Sol eandem habeat elevationem, quam in loci alicujus extra Zonam Torridam meridie.
10. Quomodo causa lucis, caloris, &c. in Zona Torrida se habeant.
11. Quomodo iux, calor, tempestates, Ver, Aestas, &c. in Zona Torrida loci se habeant.
12. Quomodo in Zonarum Temperatarum locis.
13. Quomodo in Zonarum Frigidarum locis.

De U

orr

1. D
- Umb
2. In
3. In
4. In
5. In
6. D
- inco
7. D
- die e
8. D
- cola
9. C
- ince
10. Q
11. P
- styl
- loci
12. In
- man
13. S
14. D
- gam
- eter
15. S
- cref
16. I
- din
17. I
- gitu
18. S
19. I



## CAPUT XXVII.

De Umbris & denominatione locorum inde  
orta.

P. 530

1. Definitiones Perisciorum, &c.  
*Umbræ cadunt in plagam Soli oppositam.*
2. *Incola Tropicorum sunt Ascii Heteroscii.*
3. *Incola Zona Torrida sunt Ascii Amphiscii.*
4. *Incola Zonarum Temperatarum sunt Heteroscii.*
5. *Incola Zonarum Frigidarum sunt Periscii.*
6. *Dato loco Zona Torrida, invenire dies anni, quibus incolæ illius loci erunt Ascii.*
7. *Dato die anni, exhibere illa loca quorum incolæ eo die erunt Ascii.*
8. *Dato loco Zona Frigida, invenire dies, quibus incolæ loci istius erunt Periscii.*
9. *Centra dato die anni, exhibere omnia loca, quorum incolæ Periscii sient eo die primo.*
10. *Quomodo cadat umbra in locis Equatoris.*
11. *Planum constituere in quovis loco, ita ut umbra styli in illo plano ita spargatur, sicut in cujusvis alius loci plano Horizontali.*
12. *In Equatoris locis umbra diebus æquinoctiorum manet in una recta linea.*
13. *Quomodo in locis Torrida se habeant umbra.*
14. *Dato loco in Zona Torrida invenire horam & plagam, in qua umbra regredietur & Sol cursum inflectere videbitur.*
15. *Quomodo umbrarum longitudo accrescat & decrescat.*
16. *Datâ longitudine styli & umbra, invenire altitudinem Solis.*
17. *Investigare umbra, quam tota Tellus spargit, longitudinem.*
18. *Quanta pars Luna obscuranda sit in Eclipsi.*
19. *De diversitate longitudinis umbrarum.*

INDEX CAPITUM

20. De umbra styli, qui pars est axis mundi vel ei parallelus.
21. Horologium sciathericum æquinoctiale construere.
22. Horizontale sciathericum construere.
23. Verticale sciathericum construere.
24. Sciathericum construere, quod in nostro loco monstrat horas aliorum locorum.
25. Sciathericum, in quo umbra regrediatur, construere.

CAPUT XXVIII.

De comparatione affectionum cælestium in Diversis locis & inde orta denominatione Antæcorum, &c. P. 548

1. Quinam & meridiem & omnes dici horas easdem simul numerent.
2. Quinam ad idem tempus diversas anni tempestates sentiant.
3. De sinistro, dextro, &c. ortu atque occasu.
4. Antæcorum affectiones inter se comparata.
5. Quinam non habeant Antæcos, &c.
6. Dati loci exhibere Antæcos, Periæcos & Antipodes.
7. De comparatione affectionum incolarum ejusdem paralleli.
8. Periæcorum affectiones comparata.
9. Antipodum affectiones comparata.
10. Unius loci Periæci sunt aliorum Antipodes, &c.
11. Exhibere omnia loca, quæ cum dato loco simul numerent omnes horas, &c.
12. Dato loco, exhibere omnia illa loca, quorum dies sunt æquales noctibus prioris loci.
13. Quibus horis Antæci simul videant Solem, &c.
14. Quibus horis Periæci simul videant Solem, &c.

De com

1. Da
2. Da  
sit hor.
3. Da  
invent
4. Da
5. Lu
6. Da  
Babyl
7. Con
8. Inv  
dat a.
9. Con
10. Da  
lem fru
11. Cont
12. Und  
deunt  
nume

De dive  
rum

1. Glob  
à lucer  
in ipsa
2. Idem
3. Div  
& occi
4. De r  
zonten

## CAPUT XXIX.

De comparatione temporis in diversis locis.

P. 557

1. Datâ horâ unius loci invenire horam alterius loci.
2. Datâ horâ nostri loci, exhibere omnia illa loca, ubi sit hora, quamcumque volumus.
3. Datâ Solis altitudine, die anni, & latitudine loci, invenire horam, &c.
4. Datâ plagâ Solis, invenire horam loci.
5. Lucente Sole, beneficio globi cognoscere horam loci.
6. Datâ horâ nostrâ numerationis, invenire horam Babylonicam ab Ortū.
7. Contra.
8. Invenire horam Italicam sive ab Occasū, nostrâ datâ.
9. Contra.
10. Datâ horâ nostrâ, sive equali, invenire inaequalem sive Judaicam.
11. Contra.
12. Unde fiat, ut circumnavigantes Tellurem, ubi redeunt ad locum discessus, unum diem magis vel minus numerent.

## CAPUT XXX.

De diverso ortu atque occasu Solis &amp; stellarum in diversis locis.

P. 567

1. Globum terrestrem ita suspendere vel constituere, ut à lucente Sole partes ea globi illuminentur, quas Sol in ipsa Tellure ad singulas horas illuminat, &c.
2. Idem à Luna lucente ostenditur.
3. Diversitas plagarum Horizontis, quibus Sol oritur & occidit.
4. De rectâ & obliqua Solis ascensione supra Horizontem.

INDEX CAPITUM

5. *Diversitas temporis quo signa ascendunt.*
6. *Dato die, invenire loca, quibus Sol oritur in data plaga.*
7. *Datâ horâ, exhibere locum, cui Sol tunc verticalis est.*
8. *Datâ horâ, invenire loca, à quorum vertice Sol habeat datam distantiam.*
9. 10. *Datâ dati diei horâ, exhibere omnia loca, quibus Sol oritur, quibus occidit, &c.*
11. *Investigare, quantam Telluris portionem Sol illuminet.*
12. *Quanto citius in vertice montis videant orientem Solem, quam in pede montis.*
13. *Ex anticipatione illa temporis invenire montis altitudinem.*
14. *Exhibere loca, quibus ad datum diem Luna sit verticalis.*
15. *Invenire horam, quâ Luna orietur, quâ occidet, &c.*
16. *Exhibere omnia loca, quibus Luna oritur, occidit, &c.*
17. *Exhibere loca, quæ Eclipsin Luna videre possint, & quæ non videre, &c.*
18. *Quanta portio Telluris à Luna illuminetur in plenilunio.*
19. *Exhibere omnia loca, quibus stella aliqua fixa sit verticalis.*
20. *Exhibere omnia loca, quibus ad datam horam stella in meridiano est.*
21. *Exhibere omnia loca, supra quorum Horizonta stella aliqua est ad datam horam, & quibus oriatur, occidat, &c.*
22. *Exhibere omnia loca, quorum dies nostris noctibus sunt æquales.*
23. *Cur dies celerius augeantur & decrescant circa æquinoctia, quam circa solstitia, &c.*
24. *A locorum in Æquatore sitorum vertice Sol multo celerius recedit, quam à vertice locorum, quæ Tropici vicina sunt in Zona Torrida.*

De Lo

1. Q  
nu le
2. P  
ru.
3. D  
locu
4. O  
quin
5. D  
ris d  
nem
6. D  
exhi  
pis  
hun
7. In  
mod
8. ✓  
ita a
9. T  
briu

De sit  
Gl

1. E  
cum
2. T  
loca

LIBER TERTIUS.

*Pars Comparativa terrestris.*

CAPUT XXXI.

De Longitudine locorum.

P. 587

1. *Qualibet loca possunt assumi pro initio numerationis longitudinis locorum.*
2. *Primum meridianum determinare in globo Telluris.*
3. *Dat<sup>a</sup> loci latitudine & longitudine, exhibere illum locum in Globo & Mappis.*
4. *Omnes Stella removentur à meridiano quolibet quindecim gradibus in una hora.*
5. *Datu ad unum idemque temporis momentum horis duorum locorum, invenire unius loci longitudinem ab altero.*
6. *Datu eisdem & uno loco in Globo vel Mappis dato, exhibere alterius loci meridianum in Globo & Mappis, sive meridianum, in cuius uno puncto alterum hunc locum jacere certum est.*
7. *Invenire loci longitudinem, in quo versamur, modi sex.*
8. *Alii modi inveniendae longitudinis, minus proprietate dicti, quinque.*
9. *Tabulae longitudinis & latitudinis locorum celeberrimum.*

CAPUT XXXII.

De situ locorum mutuo, de compositione Globi terrestris & Mapparum.

P. 636

1. *Dato loco Telluris, reliquorum locorum situm ad eum expendere, & invenire.*
2. *Dato loco in Tellure, exhibere in Globo omnia illa loca, quae ad locum illum sita sunt in plaga data.*

3. *Dato*



INDEX CAPITUM

3. Dato loco in Tellure vel globo, exhibere omnia illa loca, ad qua singula datus locus situs est in una aliqua plaga data.
4. Data plaga unius loci ad alterum, ejus distantia, & hujus latitudine, invenire plagam hujus loci ab altero, & hujus alterius latitudinem.
5. Globum terrestrem componere. Modi tres.
6. Mappas Geographicas componere: Modi quinque pro universalibus, & quatuor pro particularibus.

CAPUT XXXIII.

De distantia locorum.

P. 690

1. Distantia duorum locorum in superficie Telluris brevissima est arcus peripheria maxima interceptus inter duo illa loca.
2. Datis duobus locis in globi superficie ducere per illa peripheriam maximam sive arcum, qui est brevissima locorum distantia.
3. Distantie locorum manent eadem perpetuo, exceptis paucis partibus.
4. Nulla loca superficiei Telluris distant majori intervallo, quam 2700 milliaribus Germanicis, quorum XV gradum facere ponuntur.
5. Dato loco in globo, exhibere omnia illa loca, qua à dato distent datis milliar. quotcunque.
6. Quanam faciant, ut itineraria distantia locorum sit major, quam vera sive brevissima.
7. Duorum locorum in globo distantiam invenire. De Mappis.
8. Datâ longitudine locorum & latitudine invenire distantiam.
9. Datâ duorum locorum latitudine, & plaga, in qua unus ab altero jacet, invenire distantiam.
10. Datâ duorum locorum longitudine, unius latitudine & plagâ, invenire distantiam.
11. Data distantia duorum locorum ejusdem longitudinis & plagis in quibus tertius aliquis ab utroque situs

ET PROPOSITIONUM.

*situs est, invenire distantiam tertii à duobus hisce.*

CAPUT XXXIV.

De Horizonte visibili.

P. 704

1. *Horizon visibilis diversa est magnitudinis pro diversa oculi altitudine.*
2. *Horizontis visibilis quantitatem invenire, supposita maxima hominis statura.*
3. *Data oculi altitudine, invenire distantiam ultimi puncti, quod videri potest.*
4. *Si ex aliqua altitudine conspiciamus fastigium alicujus rei, cujus altitudo nota sit, invenire distantiam ab illa.*
5. *Contra, si distantia nota sit, invenire illius altitudinem.*
6. *Refractio auget quantitatem Horizontis visibilis.*

CAPUT XXXV.

De Arte Nautica in genere, & in specie de navium structura.

P. 708

1. *Quanam requirantur ad navigationem recte instituendam.*
2. *Quanam in fabrica navium sint observandae.*

CAPUT XXXVI.

De onere navibus imponendo.

P. 711

1. *Onus exprimitur per vehes & dolia.*
2. *De corporum in aqua submersione & natatione.*
3. *De capacitate figura navis.*
4. *In oneris impositione duo consideranda.*
5. *De submersione navium in fluviiis.*
6. *De gravitate corporis immatantis aquae.*
7. *De gravitate in aquis diversi ponderis.*
8. *De oneris quantitate.*

INDEX CAPITUM

9. De navis commotione à procellis, &c.

CAPUT XXXVII.

De Limeneuretica sive Arte dirigendæ navis,  
& Prima ejus parte. P. 714

1. *Artis gubernanda navis definitio & divisio in partes quatuor.*
2. *Cognitio spatii intermedii in quibus consistat.*

CAPUT XXXVIII.

De secunda artis directoriæ parte. P. 716

1. *Cognoscere in singulis locis plagas.*
2. *Compassum magneticum seu nauticum construere.*
3. *De numero plagarum.*
4. *De acus magnetica declinatione & compassi fallacia.*
5. *Invenire declinationem illam.*
6. *De correctione compassi nautici & terminis nauticis.*
7. *Qua acum magneticam à naturali situ deducant.*

CAPUT XXXIX.

De Histiodromia sive linea cursus navis. P. 726

1. *Locus ab alio loco situs versus Septentrionem vel Austrum, ab omnibus intermediis locis situs est versus eandem plagam Septentrionis vel Austri.*
2. *Duorum in Equatore jacentium unus ab altero & ab omnibus intermediis locis situs est versus plagam Orientis vel Occidentis.*
3. *Duorum locorum non in uno meridiano neque in Equatore jacentium unus ab altero & ab omnibus intermediis punctis non est situs versus unam eandemque plagam, sed versus diversas à diversis punctis.*
4. *Navigatio institui non potest, nisi navis aliquo*

terru.

ET PROPOSITIONUM.

tempore dirigatur in unam plagam, & quam via inter dua loca sit commodissima ad navigationem.

5. In navigationibus, quibus navis dirigatur versus Septentrionem vel Austrum, via navis est portio Meridiani illorum locorum.
6. Si navigatio instituaturs à loco aliquo in Equatore sito, ita ut navis dirigatur versus Orientem vel Occidentem, erit via navis portio ipsius Equatoris.
7. Si navigatio ab aliquo extra Equatorem sito instituaturs, ita ut navis dirigatur versus Orientem vel Occidentem (plagas cardinales), erit via navis peripheria paralleli loci, à quo navigatur.
8. Si navigatio à quovis Telluris loco instituaturs, ita ut navis dirigatur in plagam non cardinalem, erit via navis non circularis sive peripheria circuli, sed linea curva solida, helici modo Tellurem infinitis gyris atque flexibus circa polos ambiens.
9. Non pervenitur ab uno loco in alterum (nisi in uno meridiano vel ambo in Equatore fuerint), si navis dirigatur in plagam, in qua alter locus à primo situs est.
10. Quando navis in eandem, quando in alias plagas dirigenda sit, quam situs loci unius ad alterum habet.
11. Loxodromiarum sive rhomborum numerus.
12. Loxodromia magnitudo.
13. Partes Loxodromie inter aquidistantes parallelos sunt aequales.
14. Datis duobus locis Telluris, invenire Loxodromiam sive rhombum, qua via navis erit, si ab uno ad alterum sit navigandum, & plagam, in quam navis dirigenda.

## CAPUT XL.

De Cognitione loci, ad quem navis pervenit  
ad quodlibet navigationis tempus, & ejus  
signatione in Mappis. P. 741

1. Non potest institui navigatio, nisi loci situs, unde proficiscendum, sit notus.
2. Locum, ad quem navis pervenit, invenire in Mappis & calculo.
3. In quam plagam & in qua Loxodromia seu Rhombo navis moveatur, conicere.
4. Confectum iter navis è conjecturis colligere.
5. Latitudinem loci in mari observare.
6. Longitudinem loci in mari observare.

GEO.

Geog  
xta, qua  
quantita  
magnitu  
que alia  
A qu  
gionum



I

G E O G R A P H I Æ  
G E N E R A L I S

P A R S A B S O L U T A.

S E C T I O P R I M A.

D E P R Æ C O G N I T I S  
G E O G R A P H I Æ.

C A P U T I.

*De Geographia Definitione, Divisione,  
Methodo & aliis Prolegomenis.*

**D**udum invaluit consuetudo, ut illi qui scientiam aliquam aut disciplinam integre pertractant, de hujus doctrinæ conditionibus atque methodo & constitutione aliisque proprietatibus quædam præmittant. Neque hoc sine ratione, modo absque obreptione Sophistica fiat, existimo fieri, cum per talem informationem Lectorum intellectus Ideam quandam totius disciplinæ vel scientiæ argueretur, ut illius concipiat, & quomodo versari debeat in hac disciplina, cognoscat. Nos itaque primo hoc capite de Geographiæ Constitutione, & natura, pauca præfabimur.

*Definitio.*

Geographia dicitur scientia Mathematica mixta, quæ Telluris, partiumque illius affectiones à quantitate dependentes, nempe figuram, locum, magnitudinem, motum, caelestes apparentias, atque alias proprietates affines docet.

A quibusdam nimis strictè sumitur pro sola regionum Telluris descriptione & distributione. Ab

A

aliis

aliis contra nimis late extenditur, qui descriptionem politicam singularum regionum adjungunt. Sed hi facile excusantur, cum illud faciant ad retinendos & excitandos lectorum animos, qui nuda regionum enumeratione & descriptione sine morum gentis explicatione somnolenti plerunque redduntur.

### Divisio.

Dividimus Geographiam in Generalem & Specialem, sive Universalem & Particularem (Golnitzius explicationem Geographiæ ait duplicem esse, Exteriorem & Interiorem, sed impropria & Catachristica est hæc appellatio, & sine ratione assumpta, cum termini, Generalis & Specialis, sint aptiores). Generalis sive universalis Geographia dicitur, quæ Tellurem in genere considerat, atque affectiones explicat, non habita particularium regionum ratione. Specialis sive Particularis dicitur, quæ singularum regionum Telluris constitutionem docet: estque duplex, Chorographia & Topographia. Chorographia regionis alicujus, magnitudinem sattem mediocrem habentis, descriptionem proponit. Topographia parvum aliquem Telluris tractum reuoluit describit.

Nos hęc libro Generalem Geographiam exhibebimus, quam in tres partes distribuendam esse existimavimus, quæ sint *Pars Absoluta*, *Pars Respectiva*, *Pars Comparativa*. In Parte absoluta contemplabimur corpus ipsum Telluris & partes ejus atque affectiones ejus proprias, ut figuram, magnitudinem, motum, terras, maria, fluuios, &c. In Parte Respectiva illas affectiones atque accidentia considerabimus, quæ Telluri à caelestibus causis accidunt. Pars denique Comparativa continebit illarum proprietatum explicationem, quæ ex diversorum locorum Telluris comparatione existunt.

Obje.

Ob  
quod,

Tri  
gulis r  
in Spe  
cari po  
nemp  
affecti  
stellar  
Primo  
à polo.  
supra.  
longisse  
Quint  
pluvia  
ad ter  
quonis  
motu r  
lestium  
tus, ap  
stella p  
vel cele  
thesin  
Astrol  
singuli  
Zodiac  
hi vana  
ejus do  
men S  
hanc dif  
Hæc  
voco, c  
quarum

## Objectum.

Objectum Geographiæ, sive subiectum circa quod, est Tellus, in primis superficies ejus & partes.

## Affectiões.

Triplicis generis esse videntur illa, quæ in singulis regionibus considerari merentur, ac proinde in Speciali Geographia ad singulas regiones explicari possunt cum fructu discipulorum & Lectorum, nempe *Terrestria*, *Cælestia*, & *Humana*. Cælestes affectiões voco illas, quæ ex apparenti solis & stellarum motu dependent, & octo esse videntur. Primo, *Elevatio poli*, *distantia loci ab Equatore & à polo*. Secundo, *Obliquitas motus diurni stellarum supra Horizontem illius loci*. Tertio, *Quantitas diei longissimi ac brevissimi*. Quarto, *Clima & Zona*. Quinto, *Calor, frigus atque anni tempestates: item pluvia, nix, venti & alia meteora*. Etsi enim hæc ad terrestres proprietates possint referri, tamen quoniam cum quatuor anni temporibus & Solis motu magnam habent connexionem, ideo ad cælestium classem retulimus ea. Sexto, *stellarum ortus, apparentia, & mora supra Horizontem*. Septimo, *stellæ per verticem loci transeuntes*. Octavo, *quantitas vel celeritas motus*, quos juxta Copernicanam hypothesein singulis horis locus quilibet rotatur. Juxta Astrologos nona affectio addi posset, quoniam illi singulis regionibus præficiunt unum ex duodecim Zodiaci signis atque hujus signi planetam. Sed mihi vana hæc doctrina semper visa fuit, neque ullum ejus doctrinæ fundamentum perspicio: in fine tamen Specialis Geographiæ recensēbimus eorum hanc distributionem.

Hæc de cælestium affectiōnum classe. *Terrestres* voco, quæ in ipsius regionis loco considerantur, quarum numero decem. Primo, *Limites & circumscri-*

cum descriptionem. Secundo, *Figuram*. Tertio, *Magnitudinem*. Quarto, *Montes*. Quinto, *Aquas*, nempe *fluvios*, *fontes*, *sinus maris*. Sexto, *Sylvas & deserta*. Septimo, *Fertilitatem & sterilitatem*, item *fructuum genera*. Octavo, *Mineralia*, sive *fossilia*. Nono, *Animalia*. Decimo, *Longitudinem loci* quæ primæ terrestri proprietati nempe *circumscriptioni* adjungi potest.

Tertium affectionum, quæ in singulis regionibus spectari merentur, genus facio *Humanas*, quæ ab hominibus sive incolis regionum dependent, quarum etiam decem circiter constitui possunt. Primo, *Incolarum statura*, *conformatio*, *color*, *vita diuturnitas*, *origo*, *cibus*, *potus*. Secundo, *Quæstus & Artes*, quibus occupantur incolæ, *mercatura & merces*, quæ mittit illa regio in alias. Tertio, *Virtutes*, *vitia*, *eruditio*, *ingenium*, *schola*, &c. Quarto, *Consuetudines circa puerperia*, *nuptias*, *funera*. Quinto, *Sermo seu lingua*, quæ utuntur incolæ. Sexto, *Regimen politicum*. Septimo, *Religio & status Ecclesiastica rei*. Octavo, *Urbes & loca celebriora*. Nono, *Historia memorabiles*. Decimo, *Viri illustres*, *artifices & inventa à singularum regionum incolis*.

Hæc sunt tria affectionum genera in Speciali Geographia explicanda, etsi illæ, quæ tertiam classem faciunt, minus recte ad Geographiam referantur: Sed dandum est aliquid consuetudini & utilitati discipulorum. Nos præter illa adjungemus Speciali Geographiæ multa capita de Usu Geographiæ.

In Generali vero Geographia, quam hoc libro explicabimus, considerantur primo affectiones absolutæ Telluris, & partium constitutio. Deinde caelestes proprietates in genere contemplantur, quæ deinde in Speciali Geographia ad singulas regiones applicanda sunt. Denique in Parte comparativa ea proponuntur, quæ in unius loci cum alio comparatione offeruntur.



*Principia.*

Triplicia sunt principia, quibus Geographia utitur ad confirmandam Propositionum veritatem. Primo, Geometrica, Arithmetica atque Trigonometrica propositiones. Secundo Astronomica præcepta & theoremata, etsi miraculo simile videatur, quod ad Telluris, in qua habitamus, naturam cognoscendam uti debeamus caelestibus corporibus, quæ tot myriadibus miliarium à nobis remota sunt. Tertio, Experientia. Etenim maxima Geographiæ pars, inprimis specialis, sola experientia & observatione hominum nititur, qui regiones singulas descripserunt.

*Ordo.*

De Ordine, quem in disciplina hac Geographica observare commodum esse existimo, dictum est in Divisione & Affectionum explicatione. Occurrit tamen quædam difficultas de ordine in affectionum harum explicatione observando, nimirum, utrum singulis regionibus suas affectiones, an vero affectionibus generaliter explicatis ipsæ regiones attribuendæ sint? Aristoteles, libr. 1 Histor. Animal. ut etiam libr. 1 de part. Anim. similem movet dubitationem, & multis disputat: utrum ad singulas animalium species enuncian- dæ sint proprietates eorum, an vero proprietates hæ generaliter explicandæ, & animalia, in quibus ea reperiantur, subjungenda. Similis difficultas in aliis Philosophiæ partibus occurrit. Nos in Generali Geographia, quasdam affectiones generaliter explicavimus, quas in speciali Geographia ad singularum regionum explicationem accommoda- bimus.



## Methodus.

De Methodo, hoc est, Modo probandi dogmatum Geographicorum veritatem, sciendum est, quod in Generali Geographia plurima proprie dictis Demonstrationibus confirmantur, inprimis cælestes affectiones: in Speciali autem Geographia omnia fere sine Demonstratione explicantur (exceptis cælestibus affectionibus, quæ demonstrari possunt) quo experientia & observatio, hoc est sensuum testimonium illa confirmat, neque possunt alio modo probari. Etenim scientia tripliciter sumitur. Primo, pro qualicumque cognitione, etiamsi ex probabilibus tantum sit. Secundo, pro cognitione certa, sive hæc certitudo à Demonstrationum robore, sive à sensuum testimonio dependeat. Tertio, pro sola cognitione per Demonstrationem: quæ usurpatio strictissima est, convenitque Geometriæ, Arithmeticæ, reliquisque Scientiis Mathematicis, excepta Chronologia, Astrologia & Geographia, quibus Scientiæ vocabulum in secunda significatione competit.

Probantur etiam vel ostenduntur potius plurimæ propositiones per Globum terrestrem artificialem, per mappas quoque Geographicas: atque harum propositionem, quæ ita ostenduntur, quædam possunt legitimis Demonstrationibus confirmari (quod tamen propter captum Lectorum omittitur) aliæ nequaquam ita probari possunt, sed ideo recipiuntur, quia supponimus, omnia loca in globo & mappis ita esse disposita, ut in ipsa Tellure jacent. In hisce tamen Descriptiones potius ab autoribus Geographicis confectas sequimur: globus & mappæ ad illustrationem & faciliorem comprehensionem inserviunt.

*Origo Geographia.*

Origo Geographiæ nova non est, neque uno partu in lucem edita est, neque ab uno homine profecta: sed dudum ante multa secula ejus primordia jacta sunt, etsi antiqui Geographi tantum in describendis regionibus, hoc est, Chorographia & Topographia occupati fuerunt. Romani solebant, devicta & subjugata aliqua provincia, hujus Chorographiam in Tabula expressam & claris signis illuminatam monstrare in triumpho spectantibus. Erant præterea Romæ in porticu Luculli multæ Geographiæ Tabulæ omnium contemplationi expositæ. Senatus Romanus anno ante natum Christum centesimo circiter, miserat Geodætas & Geographos in diversas mundi plagas, ut totam Tellurem dimetirentur, sed vix vigesimam partem perlustrarunt. Neco Ægyptiorum Rex, multis ante Christum natum seculis per Phœnices universum Africæ externam, latus integro triennio explorare jussit. Darius Indi ostia & mare Æthiopicum Orientale scrutari mandavit. Alexander Magnus in expeditione sua Asiatica duxit secum duos itinerum mensores & descriptores, Diognetum & Betonem, teste Plinio, ex quorum annotationibus & Itinerariis Geographi sequentium seculorum multa desumserunt. Etenim cum omnium fere aliarum artium studium à bellis afficiatur damno, sola fere Geographia ab illis crescit una cum Fortificatoria, quam vocant.

Cæterum valde manca, imperfecta, & falsitatibus plurimis scatens Geographia veterum erat, quoniam ignorabant has, quæ non infimæ sed præcipuæ sunt cognitionis, Telluris partes, (vel saltem non habebant certam de iis experientiam)

1. Totam Americam.
2. Terras Septentrionales.
3. Terram Australem & Magellanicam.
4. Ter-

ram circum navigari posse & Oceanum continuo tractu ambire Tellurem ( quosdam tamen ex antiquis in hac opinione fuisse non nego , at illud certo scivisse, id nego). 5. Zonam Torridam habitabilem esse & ab infinitis populis habitari. 6. Telluris dimensionem veram , etsi multa in hoc negotio scripserint. 7. Africam posse circumnavigari , & australem Africae partem. 8. Regionum remotarum veris Descriptionibus carebant tam Græci quam Romani , atque innumera falsa & fabulosa de populis in Asia termino atque Septentrionalibus locis scripta reliquerunt. 9. Motum maris sive fluxus diversitates & generalem illum fluxum ignorabant. 10. Imo Græci atque ipse Aristoteles Fluxum & Refluxum maris non habuerunt cognitum. 11. Ventorum diversitates paucas habebant perspectas , generalis omnino illis incognitus. 12. Magnetis insignis proprietas , qua Septentrionem & Austrum monstrat , ipsis occulta fuit , etsi alteram illam , qua ferrum trahit , cognoverint. Anaximander autem , qui vixit anno ante Christum , ecce circiter, primus scribitur tentasse Telluris dimensionem.

*Geographia Præstantia.*

Commendat studium Geographicum , 1. Dignitas, quia hominem Telluris incolam & ratione præ aliis animalibus præditum maxime decet. 2. Jucundum quoque est & quidem honesta recreatio contemplari Telluris regiones & proprietates. 3. Insignis utilitas & necessitas, cum neque Theologi , neque Medici , neque Jurisconsulti , neque Historici neque Literatores alii carere possint Geographiæ cognitione , si absque remora progredi voluerint in suis studiis. Hæc ab aliis satis ostensa sunt & multis exemplis illustrari possunt.

SPECIALIS  
GEOGRAPHIA  
considerat in sin-  
gulis regionibus  
triplicia.

Terrestria  
decem.

1. Limites & Circumscriptionem.
2. Longitudinem loci & situm.
3. Figuram.
4. Magnitudinem.
5. Montes, } eorum appellatio & situs, altitudo,  
                  } proprietates & contenta.
6. Fodinas.
7. Sylvas & deserta.
8. Aquas } Mare, lacus, paludes,  
           } Fluvii. Horum fontes, ostium, tractus, latitudo, aquæ copia, celeritas,  
                  } aquæ qualitas, cataraclæ, &c.
9. Fertilitatem, vel sterilitatem, & fructus.
10. Animalia.

Cælestia  
octo.

1. Distantiam loci ab Æquatore & Polo.
2. Obliquitatem motus supra Horizontem.
3. Quantitatem dierum.
4. Clima & Zonam.
5. Calorem, atque anni tempestates, ventos, pluvias & alia metæora.
6. Stellarum ortum & moram supra Horizontem.
7. Stellarum per verticem loci transeuntes.
8. Quantitatem vel celeritatem motus juxta Copernicanam hypothesin.

Humana  
decem.

1. Incolarum statura, vita, cibus, & potus, origo, &c.
2. Quæstus & artes, mercatura, merces.
3. Virtutes & vitia, ingenium, eruditio, &c.
4. Consuetudines circa puerperia, nuptias, funera.
5. Sermo & lingua.
6. Regimen Politicum.
7. Religio & status rei Ecclesiasticæ.
8. Urbes.
9. Historiæ memorabiles.
10. Viri illustres vel scæminæ, artifices, inventa.

continuo  
ex anti-  
tud cer-  
habita-  
6. Tel-  
hoc ne-  
naviga-  
um re-  
ni Gra-  
fabulo-  
triona-  
naris fi-  
fluxum  
storetes  
cogni-  
bebant  
gnitus.  
entrio-  
r, et si  
verint.  
Chri-  
de Tel-  
i. Di-  
tatione  
decet.  
esta re-  
proprie  
neque  
nsulti,  
re pos-  
remora  
allis  
ustrari  
Sub-







SECTIO PRIMA, de præcognitis capita duo. } Cap. I. De Prolegomenis.  
Cap. II. De quibusdam necessariis ex Geometria.

SECTIO SECUNDA, affectiones totius Telluris explicat capitibus V. } Cap. III. De Telluris Figura.  
Cap. IV. De ejus dimensione & magnitudine.  
Cap. V. De ejus motu.  
Cap. VI. De ejus loco in Systemate Mundi.  
Cap. VII. De ejus substantia & materia.

SECTIO TERTIA, in qua Terræ Constitutio & partes explicantur capitibus quatuor. } Cap. VIII. De divisione Terræ per Aquas.  
Cap. IX. De Montibus in genere.  
Cap. X. De Montium differentiis.  
Cap. XI. De Sylvis, desertis, & fodinis.

PARS ABSOLUTA dividitur in Sectiones sex.

SECTIO QUARTA, HYDROGRAPHIA, in qua Aquarum constitutio & proprietates explicantur capitibus VI. } Cap. XII. De Divisione Aquarum.  
Cap. XIII. De Oceano & Mari.  
Cap. XIV. De motibus maris, inprimis de Fluxu & Refluxu.  
Cap. XV. De Fluviis.  
Cap. XVI. De Lacubus, stagnis & paludibus.  
Cap. XVII. De aquis mineralibus.

SECTIO QUINTA } Cap. XVIII. De mutatione locorum aridorum in Aquosa; & contra.

SECTIO SEXTA, de Atmosphæra. } Cap. XIX. De Atmosphæra & Aëre.  
Cap. XX. De Ventis in genere.  
Cap. XXI. De Ventorum differentiis & in specie.

GENERALIS GEOGRAPHIA in tres Partes in hoc libro dividitur, quæ sunt

PARS RESPECTIVA explicans affectiones cælestes capitibus IX.

} Cap. XXII. De affectionibus cælestibus in genere.  
Cap. XXIII. De latitudine loci & elevatione poli.  
Cap. XXIV. De Divisione Telluris in Zonas.  
Cap. XXV. De longitudine dierum & divisione Telluris in Climata.  
Cap. XXVI. De luce, calore, & tempestatibus anni.  
Cap. XXVII. De Umbris, & divisione incolarum respectu umbrarum.  
Cap. XXVIII. De comparatione Affectionum cælestium in diversis locis, ubi de Antæcis, Periæcis & Antipodibus.  
Cap. XXIX. De Diversitate Temporis in diversis locis.  
Cap. XXX. De diverso ortu Solis, Lunæ, &c. atque aliis apparentiis.

PARS COMPARATIVA, affectiones illas considerans, quæ ex comparatione unius loci ad alium oriuntur.

} Cap. XXXI. De longitudine locorum.  
Cap. XXXII. De situ locorum ad invicem.  
Cap. XXXIII. De distantia locorum mutua.  
Cap. XXXIV. De Horizonte visibili.  
Cap. XXXV. De arte Nautica in genere & navium structura.  
Cap. XXXVI. De onere navibus imponendo.  
Cap. XXXVII. De Directoria artis Nauticæ Parte prima, Cognitione intervalli.  
Cap. XXXVIII. Secunda parte, Cognitione plagarum.  
Cap. XXXIX. Tertia pars de Histiodromia, sive via navis.  
Cap. XL. Quarta pars de loco navis in itinere.

Subj  
tenta h  
te ocul  
graphia  
obierva

Quada  
qu

S' Apic  
voca  
lum evo  
affectio  
nus neco  
ficio &  
velit. In  
ta ; qua  
phiz tu  
callent  
cessaria  
felicus  
neutiqu  
nem, q  
metria S  
plinas ar  
prohibus  
ignorant  
nent de  
ticis pra  
tuor Nu  
Subtract  
praterca  
que de h  
plerique  
cu, & si

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "Secundo", "Tercio", "Quarto" are faintly visible.]

Secundo  
Tercio

Generalia  
in  
lib



Subjungo hic Tabulas duas, quarum prior Contenta hujus libri nempe Geographiæ Generalis ante oculos ponit: altera ordinem in Speciali Geographiâ ad singularum regionum explicationem observandum.

## CAPUT II.

*Quædam ex Geometria & Trigonometria, quæ studiosos Geographiæ scribere oportet.*

Sapienter Plato Geometriam & Arithmeticam vocavit alas, quibus hominum mentes in cœlum evolarent, hoc est, solis stellarumque motus & affectiones scrutarentur. In Geographiâ non minus necessariæ sunt ex disciplina, si quis cum judicio & absque impedimento eam apprehendere velit. Interim paucioribus Geographiâ est contenta, quam Astronomia. Et quoniam multi Geographiâ studio capiuntur, qui disciplinas illas non vellent, nos pauca hic afferemus ex illis, quæ necessaria esse putamus Geographiâ studioso, ut eo felicius & promptius in hac disciplina versetur: etsi neutiquam probemus pravam illam consuetudinem, qua adolescentes nondum delibata Geometria & Arithmetica ad alias Philosophiæ disciplinas animum applicant: sed causa est in Præceptoribus & Professoribus, quorum plerique ipsi ignorant has scientias, & ideo juvenes non movent de hac erronea consuetudine. Ex Arithmeticis præsupponimus in Lectore cognitionem quatuor Numerationis specierum, nempe Additionis, Subtractionis, Multiplicationis, Divisionis, & præterea Regulæ aureæ sive Regulæ Detri. Neque de his loquemur in præsentia, quandoquidem plerique adolescentes ea cognitione sunt instructi, & si qui ignorent, viva Præceptoris voce po-

tius, quam ex libro addiscant. sed Geometrica affertur.

1. Geometria tres agnoscit magnitudinum species, quibus omnia dimetitur, nempe Lineas, Superficies & Corpora seu Solida: neque datur quantum in Natura.

2. Linea alia est Recta, alia Curva. Et curva alia uniformis seu circularis, alia difformis seu dissimilari, ut lineæ ovals, conchoides, helices, &c.

3. Circulus dicitur spatium seu superficies plana, & figura, curva linea inclusa, in quo spatio punctum aliquod est, à quo ductæ rectæ ad curvam illam terminantem omnes sunt æquales. Et curva illa terminans spatium dicitur linea circularis seu peripheria circuli. Punctum illud medium dicitur centrum circuli.

4. Diameter circuli dicitur linea recta per centrum ducta ad peripheriam ex utraque parte. Semidiameter, quæ ex centro ad peripheriam ducitur.

5. Arcus dicitur pars peripheriæ circuli. Quadrans dicitur quarta totius peripheriæ pars. Complementum arcus alicujus dicitur, arcus, quo quadrante differt vel deficit: Excessus, quo excedit.

#### PROBLEMATA.

6. *Data linea recta, & puncto in ea vel extra eam, ducere ex illo puncto lineam perpendicularem.* Sit data AB, punctum C. Sumatur quodvis circini intervallum, & posito pede uno circini in C, altero pede secetur linea in d, & f. Tunc centro d. describatur arcus supra partem d f: item centro f, alius arcus priorem secans in g, & h, & ducatur g h, hæc est perpendicularis.

7. *Circulum & peripheriam in quatuor partes scindere.* Ducatur una diameter, & ex centro exci-

tur su-

diame-

quatu-

8.

tur au-

riphe-

trece-

dum i-

num

prescri-

sec.: n

efficitu-

pheria

Ad

prius q

ni, fer

tur arc

gradu

du, q

& hinc

du, q

secandi

strume

vuntur

9.

sentum

Multip

indicab

neas m

furari m

dratæ;

suris, q

domus

seu pavi

pacitate

bus Cub

10.

tur supra illam perpendicularis : Erit hæc quoque diameter, & secta erit peripheria cum circulo in quatuor æquales partes seu quadrantes.

8. *Peripheriam circuli in gradus dividere.* Dicitur autem gradus pars trecentesima sexagesima peripheriæ. Etenim Mathematici peripheriam in trecentas & sexaginta (360) partes secant : & gradum in sexaginta minuta prima : minutum primum in sexaginta secunda. Signum gradus est superscriptum gr. minuti primi pr. minuti secundi sec. : nempe ita : 3 gr. 2 min. 5 sec. Hac ratione efficitur, ut quadrans habeat 90 gradus : semiperipheria, 180. sexta pars sit 60.

Ad absolvendum itaque Problema assumto prius quadrante circuli, sumatur intervallo circini, semidiameter circuli, & hoc intervallo auferatur arcus à peripheria. Hic arcus erit sexaginta graduum, & restabunt in quadrante triginta gradus, quibus bissectis, habebis quindecim gradus, & hisce mechanicè trissectis, habebis quinque gradus, qui iterum mechanicè in quinque partes sunt secandi, quæ erunt ipsi gradus. Cæterum ope instrumentorum hæc promptius & perfectius absolvuntur.

9. *Quadranguli rectanguli aream seu spatium contentum invenire, datis duobus lateribus quadranguli.* Multiplicetur unum latus in alterum : Productum indicabit areæ quantitatem. Sciendum autem lineas mensurari lineis, superficies seu spatia mensurari mensuris, quæ sint superficies & quidem quadratæ; corpora denique & solida mensurari mensuris, quæ sint corpora & solida Cubica. Ita latera domus mensuramur pedibus lineis, aream domus seu pavementum metimur pedibus quadratis : capacitatem domus seu soliditatem explicamus pedibus Cubicis.

10. *Data semidiametro circuli vel diametro,*



invenire in eadem mensura peripheriam circuli, & contra, Data peripheria invenire diametrum, & quidem quam proxime. Problematis solutio dependet ex proportione diametri ad peripheriam, quæ juxta Archimedis Demonstrationem, fere est ut 7 ad 22, vel accuratius, ut 10000000000 ad 31415926535. Detur itaque diameter 12 pedum. Fiat per regulam auream, ut 7 ad 22, ita 12 ad peripheriam circuli istius. Vel ut 10000000000 ad 31415926535, ita 12 ad eandem peripheriam.

Contra, si detur peripheria, quærat autem diameter, Fiat ut 22 ad 7 vel ut 31415926535 ad 10000000000, ita data peripheria ad quæsitam diametrum.

11. Data peripheria circuli in pedibus vel miliaribus & diametro: Vel etiam data sola peripheria & sola diametro, invenire aream circuli in pedibus & miliaribus quadratis. Juxta primum datum, multiplicetur data peripheria in quartam diametri partem, vel semiperipheria in semidiametrum: quot producitur, erit area quæsitæ. Juxta secundum datum præstat prius invenire semidiametrum vel semiperipheriam, ex præcedenti Problemate, et si sine hoc absolvi possit.

12. Data semidiametro vel diametro globi aliquid, invenire illius superficiem in quadrata mensura & soliditatem in cubica mensura. Globus dicitur corpus rotundum seu solidum, in cujus medio aliquod punctum est, ex quo omnes rectæ ductæ ad superficiem sunt æquales. Et punctum hoc dicitur globi centrum. Linea per centrum dicitur diameter: Et axis, si globus circa eam diametrum volvatur, seu rotetur. Porro si globus utcumque secetur, sectio est circulus. Et si per centrum secetur seu planum duci cogitemus, erit sectio Circulus, cujus eadem diameter est, quæ ipsius globi. Et tales circuli dicuntur circuli sphaeræ seu

globi M  
cuntur.

Ad p  
metro  
ris. De  
pheria  
mensur  
Porro  
diamet  
globi in

13.  
num la  
gulum  
hæc d  
nusa.

Ang  
centro  
quot g  
tercept  
Ita ang  
quia a  
ripheri

Sinu  
arcus t  
trum d

Tan  
in uno  
tro per  
ita du

Sinu  
metitu  
Secans

Porro  
ticorum  
semidi  
reperit  
annium

glob

globi Majores: reliqui circuli sphaerae Minores dicuntur.

Ad problematis itaque solutionem, ex data diametro inveniatur primo peripheria circuli majoris. Deinde multiplicetur diameter in hanc peripheriam, producetur superficies globi in quadrata mensura.

Porro haec superficies multiplicetur per sextam diametri partem. Quod producitur, erit soliditas globi in cubica mensura.

13. *Triangulum rectangulum dicitur, cujus unum latus alteri perpendiculariter insistit*, sive angulum rectum 90 graduum cum eo facit. Latera haec duo dicuntur catheti, tertium latus hypotenusa.

Angulorum mensura est arcus, qui describitur centro assumpto vertice illius anguli: Nimirum quot graduum est arcus ille inter crura anguli interceptus, tot graduum dicitur esse ille angulus. Ita angulus rectus dicitur esse nonaginta graduum, quia arcus ita descriptus semper est quadrans peripheriae circuli.

*Sinus* alicujus arcus dicitur recta, quae ex uno arcus termino ducitur perpendicularis in diametrum ductam per alterum arcus terminum.

*Tangens* illius arcus dicitur recta tangens arcum in uno termino, & terminata recta, quae ex centro per alterum arcus terminum ducitur. Haec vero ita ducta dicitur, *secans* illius arcus.

*Sinus* vero anguli dicitur sinus arcus illius, qui metitur illum angulum: Ita Tangens anguli, & Secans.

Porro sciendum est, opera & studio Mathematicorum Tabulas esse confectas, in quibus assumpta semidiametro 100000 (vel plurium cyphrarum) reperiuntur sinus & tangentes & secantes omnium arcuum peripheriae, ex. gr. 2 gr. 10 gr.

20 gr. 33 min. &c. Et hæc Tabulæ dicuntur *Canonicæ Mathematicæ*, habentque infinitas utilitates omnibus Mathematicis & Physicis Scientiis. Ideo Geographiæ studiosos pauca hæc de illis dicere volui. Usus autem ejus præcipuus est in Triangulorum mensura tam Sphæricorum, quam planorum. Sed quia Sphæricorum mensura aliqua difficultatem habet, quæ illis tantum videretur necessaria qui profundius immergere se huic disciplinæ cupiunt, ideo de planis Triangulis rectangulis solum dicemus, quorum dimensionem facile capere quilibet potest & debet.

DVO THEOREMATA,

*Quorum frequens usus in Geographia.*

14. Cujusvis Trianguli tres anguli simul sumti sunt aequales duobus rectis angulis sive 180 gr. & ideo duo acuti in Triangulo rectangulo faciunt 90 gr. Præterea, si linea recta tangat circulem, & ex puncto contactus ducatur recta ad centrum circuli: hæc facit angulum rectum cum linea Tangente.

15. Problemata vero, quorum usus frequens est, sunt hæc.

16. I. Data Trianguli rectanguli hypotenusa & una catheto, invenire angulum contentum vel alterum acutum. Ad cujus inventionem fiat juxta Regulam auream, ut hypotenusa data ad datam cathetum, ita sinus totus 100000 (qui numerus est semidiameter in Tabulis sinuum assumptus) ad sinum anguli alterius. Hic sinus in Canone quaesitus monstrabit arcum seu quantitatem anguli, qui adjacent hypotenuse. Angulus vero contentus est inventi anguli complementum ad 90 gr. Itaque si inventum angulum subtrahas à 90 gr. relinquitur angulus quaesitus.

II. Data catheto & angulo acuto adjacenti, invenire

venire b  
Sinus  
10000  
quaesita  
17.  
lum a  
rhetus  
Tanger  
catheto  
18.  
venire  
10000  
catheto

A Q  
men  
fis u  
nen  
& H  
tin  
con  
F  
dive  
mat  
anti  
nian  
fuit  
Rhi  
me  
app  
A  
citu  
Rhi  
lan  
qu  
supp

venire hypotenusam. Fiat juxta regulam auream, Ut Sinus complementi dati anguli ad 100000 (vel 1000000 in majori Canone) ita data cathetus ad quæsitam hypotenusam.

17. III. *Datis duabus cathetis, invenire angulum alterutri catheto adjacentem.* Fiat, ut una cathetus ad alteram, ita sinus totus 100000 ad Tangentem anguli, qui adjacet primo assumptæ catheto.

18. IV. *Data hypotenusæ & uno angulo acuto, invenire alterutram cathetum.* Fiat, ut sinus totus 100000 ad sinum anguli, qui opponitur quæsitæ catheto, ita data hypotenusæ ad cathetum illam.

### De variis mensuris.

A Quoniam in Geographia frequentissimus est mensurarum usus, & vero diversi populi diversis utuntur mensuris, ideo de illis quædam monenda sunt partim ad Veterum Geographorum & Historicorum scripta bene intelligenda, partim propter hodiernam diversarum mensurarum comparisonem cognoscendam.

Famosa mensura est *pedis longitudo*, sed apud diversos populos diversa. Usitatus jam Mathematicis est pes Rhinlandicus Snellii, quem hic antiquo Romano æqualem esse probat. Et quoniam Snellius diligentissimus & accuratissimus fuit in terræ dimensione, ideo merito pes ille Rhinlandicus assumitur pro regula omnium mensurarum. Ejus quarta pars est in margine apposita A B.

*Decempeda* continet tales pedes decem. Dicitur & *pertica*. Sed hodie Geodatae *perticam Rhinlandicam* faciunt duodecim pedum Rhinlandicorum vel etiam sedecim in Germania: quod valde incommodum est in calculo vel supputatione; *Milliare Hollandicum* idem Snellius



lius facit perticarum Rhinlandicarum ( 12 pedum singulari ) 1500 sive pedum Rhinlandicarum (cujus quadratum apposuimus hic in margine) 18000.

Atque hæc dux mensuræ, pertica & milliæ oriuntur ex pedum multiplicatione seu aggregatione. Mensuræ vero ex pedis divisione sunt digitus, palmus, granum. Digitus est duodecim pedis pars. Palmus continet digitos quatuor. Granum est quarta digiti: sed harum infrequens est usus. Præstat pedem in decem digitos, digitum in decem grana dividere.

Atque hæc mensuræ sufficiunt hodierno usui in Geographia: sed aliæ addendæ sunt, nempe primæ Veterum, Græcorum, Romanorum, Persarum, Ægyptiorum; & Recentiorum, Gallorum, Hispanorum, Italorum, Germanorum, Polonorum, Moscorum, Turcarum.

*Stadium Græcorum* censetur fuisse pedum Græcorum 600: qui faciunt pedes Romanos seu Rhinlandicos 625. Nam Græcus pes major paulo fuit Romano.

*Milliare Germanicum* (qualium Geographi quindecim attribuunt gradui uni) continet pedes Rhinlandicos  $14000 \frac{2}{3}$ . Censetur passuum 4000 stadiorum 32. Ad Rhinlandicum proportio est, quæ 15 ad 19.

*Milliare Italicum & Romanum* passuum est 1000 pedum Rhinlandicorum 4000. Octo stadia unum milliare Romani Scriptores etiam Lapidem vocant ubi de vicinis urbi locis loquuntur.

*Passus Geometricus & absolute* ita dictus continet pedes quinque.

*Orgyia* continuissæ censetur pedes sex, & Græcorum passus fuisse dicitur à nonnullis.

*Cubitus* pedum  $1 \frac{1}{2}$  fuisse existimatur.

Paras  
setur tri

Schaer

ginta sta

draginta

magnitu

niano d

Leuco

proporti

ad idem

diversis

vatur le

no certa

Angl

est, sicut

triplicia

$27 \frac{1}{2} \pi q$

cria, qu

Dani

quibus

Russi

Turca

lico mil

Arab

quinta

unum v

quoque

effecisse

Indor

dicantu

itiner

Cam

tur men

faciunt

Sine t

vocant



*Parasange*, Persicum milliare, continuisse censetur triginta stadia: passus autem Persicos 3000.

*Schaenus*, Ægyptiorum mensura continet sexaginta stadia juxta Herodotum: juxta Plinium quadraginta. Verum in diversis locis fortasse diversa magnitudo fuit: vel etiam stadium Herodoti à Pliniano differt: vel libri corrupti sunt.

*Leuca Gallica* ad milliare Rhinlandicum habet proportionem, quam 25 ad 19. Hispanica leuca ad idem milliare est, ut  $17\frac{1}{2}$  ad 19. Sed quia in diversis Gallix atque Hispanix locis diversa observatur leucae magnitudo, ideo hæc non sunt omnino certa.

Anglicum milliare ad milliare Rhinlandicum est, sicut 55 ad 19, vel etiam ut 60 ad 19. Verum triplicia habent Angli milliaria. Majora, quorum  $27\frac{1}{2}$  æquant gradum sive 19 Hollandica: Mediocria, quorum 50: Minima quorum 60 vel 55.

*Danicum* vero, & Suecicum, ut 10 ad 19. in quibusdam tamen locis utuntur Germanico.

*Russicum* ut 80 ad 19. Vocant autem Voreft.

*Turcarum milliare* sive leuca censetur æqualis Italico milliari, ita ut 60 faciant gradum.

*Arabum leuca* olim censetur fuisse vicesima quinta pars gradus, ita ut 25 æquarint gradum unum vel 19 milliaria Hollandica: verum aliam quoque mensuram usurparunt, cujus 56 gradum effecisse perhibentur.

*Indorum milliaria* centum gradui æqualia esse judicantur, etsi Indi vulgo per dierum & horarum itinera describant distantias.

Cambaienses & Guzaratensis regni incolæ utuntur mensura, quam Cosam vocant, cujus triginta faciunt gradum unum.

*Sina* tres itinerarias mensuras observant, quas vocant Li, Pu, Uchan. Li est intervallum, ex quo hominis

hominis alte clamantis vox audiri potest in planitie & aëre quieto, quod censetur trecentorum passuum Geometricorum. Pu continet decem ita ut viginti gradum conficiant. Decem Pu facit Uchan, quod unius diei iter stantur, nempe passuum quindecim millium.

*Milliare quadratum* Rhinlandicum est pedum quadratorum.

*Milliare Cubicum* Rhinlandicum est pedum Cubicorum.

Existit autem milliaris quadrati numerus multiplicatione milliaris in se, & Cubicum milliare, si quadratum milliare multiplicetur per milliare simplex. Idem de pedibus quadratis & Cubicis intelligendum est.

#### SECTIO SECUNDA

### GEOGRAPHIÆ ABSOLUTÆ,

*Continens affectiones generales & absolutas in Telluris, quinque capitibus.*

#### CAPUT III.

#### *De Figura Telluris.*

**P**rima omnium Telluris affectionum est *Figura* non tantum nobilitate, sed etiam utilitate necessitate excellens, cum absque illius cognitione nihil in Geographia demonstrari vel cognosci non possimus, atque omnia sequentia ex hac fere dependeant & fluant. Primo itaque loco de agendum esse manifestum est.

Varia autem de Telluris figura extiterunt opinioniones. Etenim vulgus (hoc est homines in Geographia cognitione imbuti) existimant, Terram latissima planitie, cujus terminus sit circulus linea, excurrere, nisi montes vel valles occurrerint.

que Pat  
sum ex  
moti q  
plicati  
& Aug  
antiqu  
buitur  
forman  
veo. Q  
non ig  
mordic  
gi pede  
der sta  
le non  
verit &  
ratione  
tropia  
bra sua  
diem.  
matam  
nescio  
audent  
lo c. x  
Cat  
Mathe  
est, T  
Argum  
jus ut  
propor  
fensore  
feri po  
& exar  
cogniti  
Levi  
Sophist  
tica fig

rerint. In eadem sententia fuit Lactantius, alii-  
que Patres, qui Tellurem infinitis radicibus deor-  
sum extendi atque fundari acriter defenderunt,  
moti quibusdam sacrae Scripturae locis male ex-  
plicatis vel intellectis. Vide Lactant. l. 3. c. 24.  
& Augustinum l. 16. de Civit. Dei c. 9. Sed &  
antiquo Philosopho Heraclito hæc sententia tri-  
buitur: etsi hunc alii scribant Telluri attribuisse  
formam *σφαειδῆ* sive profundo excavatam al-  
veo. Quid? quod è recentioribus prioris seculi  
non ignobilis Philosophus Franciscus Patricius  
mordicus tueri conatus est terram plano exporri-  
gi pede. Cylindraccam ejus formam Anaximander  
statuisse scribitur à Peucero: sed id verisimi-  
le non est, cum & dimensionem Telluris tenta-  
verit & Astronomiæ peritus satis pro illius seculi  
ratione fuerit, quippe qui Lacedæmone Helio-  
tropia constituit, in quibus gnomonis apex um-  
bra sua signabat æquinoctiorum & solstitiorum  
diem. Leucippus tympani in modum conforma-  
tam tellurem existimasse scribitur: & sunt qui  
nescio quas absurdas opiniones Veteribus ascribere  
audent: de quibus videatur Aristoteles l. 2. de cæ-  
lo c. XIII.

Cæterum vera & ab omnibus fere Philosophis,  
Mathematicis vero omnibus, defensa sententia  
est, Terram esse globosam seu Sphæricæ figuræ.  
Argumenta vero, quibus ad confirmationem hu-  
jus utuntur Scriptores, adeo obscure & confuse  
proponunt ut pertinacem contrariæ sententiæ de-  
fensorem cogere nequeant. Nos itaque quantum  
fieri potest, clarissime illas rationes proponemus  
& examinabimus, ut lectores distinctam illarum  
cognitionem consequantur.

Leviores primo rationes, quæ probabiles vel  
Sophisticæ potius sunt, rejicio, nempe has. 1. Sphæ-  
rica figura est capacissima. Ergo terra debuit ta-  
lem

lem figuram habuisse. 2. Omnes partes terræ  
dunt ad centrum idem. Ergo partes illæ  
constituent figuram globosam. 3. Cum in  
tione aqua adhuc terræ esset confusa, fuit  
dubio humida & mollis tellus. Humidorum  
tem & liquidorum figura est spherica. Ergo  
telluris talis figura post separationem humidi  
co mansit.

Hiscæ & similibus argumentis neglectis, vi-  
mus firmiora; quæ triplicia sunt. Unius & pe-  
generis tantum est unum, quod est à priori. R  
qua duo genera sunt à posteriori: nempe quæ  
à caelestibus apparentiis desumuntur, quadam  
eis, quæ in Tellure observamus sine calo. Qu  
ad primum attinet, à priori concludens, desu-  
tum id est à natura aquæ, solerque demonstra-  
hæc peti vel ex Aristotele vel ex Archimede.  
stoteles lib. 2. de cæl. c. 5. suam, quam tamen  
præcessoribus Philosophis accepit, his verbis  
posuit: Superficiem aquæ rotundam (spherica  
esse patebit, si suppositionem sumserimus, aqu  
suapte natura semper ad magis concavum (de-  
viorem) locum confluere, & eum locum ma-  
concavum esse, qui est propinquior centro. I  
cantur igitur ex  $\alpha$  centro, recta linea  $\alpha\beta$  &  
& ex  $\beta$  in  $\gamma$  linea ducatur  $\beta\gamma$ , ad quam  
perpendicularis ducatur  $\alpha\delta$ , & protrahatur  
Pater itaque lineam  $\alpha\delta$  esse minorem lineis  
 $\alpha\gamma$  (per rs. l. 1. Elem. Euclidis.) Ergo hic lo-  
 $\delta$ , magis concavus est. Quare affluet aqua (ex  
&  $\gamma$ ) quousque lineæ  $\alpha\beta$ ,  $\alpha\delta$ ,  $\alpha\gamma$  sint æquæ  
At  $\alpha\delta$  est æqualis  $\alpha\beta$ ,  $\alpha\gamma$ . Ergo aquam ipsam  
hiscæ esse, quæ sunt ex centro ductæ, necesse  
(Nota hæc pars, At  $\alpha\delta$  &c. nihil facit ad dem-  
strationem). At ea, quæ tangit eas, quæ sunt  
centro ductæ, circumferentia est. Rotunda est  
superficies aquæ, quæ quidem est  $\beta\gamma$ .

Hæc Ar-  
ter confusa  
rigi potest  
nit centra  
declivem  
illius cen-  
qui figura  
tamen de-  
corrigi po-  
ne circum-  
tati circa  
rensitella  
circa quo  
terra, jar  
rotatur pe-  
puncto c  
ficultas est  
norem: v  
re respect  
quæ supe  
ille negat  
tem spec  
pe respect  
quam tel  
datur: v  
ret. Atq  
nisi conc  
sumenda  
apparens  
perficitur  
alix decl  
moveri d  
mitti vix  
ricam ter  
Alii i  
stratione  
tur in a



Hæc Aristotelis Demonstratio est, in qua præter confusam & malam compositionem (quæ corrigi potest) hæc animadverto. Primo quod supponit centrum aliquod universi: secundo, quod declivem magis aut minus locum sumit respectu illius centri. Hæc enim duo in dubium revocaret, qui figuram sphericam Telluris negaverit. Primum tamen de centro Universi, sufficienter probari vel corrigi potest. Namque vel stellas motu quotidiano circumduci dicendum est, vel terram circumrotari circa suum centrum (hoc enim motus apparet stellarum cogit). Si stellæ, jam punctum id circa quod volvuntur, erit centrum Universi: si terra, jam punctum medium terræ sive circa quod rotatur poterit assumi in Demonstratione pro hoc puncto centrali Aristotelis. Verum præcipua difficultas est in secunda suppositione, nempe minorem vel majorem declivitatem spectari debere respectu illius centri. Etenim qui defenderet Aquæ superficiem planam esse vel alterius figuræ, ille negaret hoc suppositum, diceretque declivitatem spectandam esse juxta nostros sensus, nempe respectu planitiæ Horizontalis nostræ, juxta quam tellus infinitis spatiis in profundum extendatur: vel etiam alio modo declivitatem definirer. Atque ita demonstratio hæc nihil concludit, nisi concedatur, declivitatem locorum Telluris sumendam esse respectu illius centri, circa quod apparet motus quotidianus caelestium corporum perficitur: quod etsi verum sit, possintque omnes alix decliviratis definitiones, juxta quam aqua moveri dicitur, refutari, tamen pro principio admitti vix potest, cum fere supponere videatur sphericam terræ figuram.

Alii itaque Archimedeam præferunt Demonstrationem, quæ reperitur l. 1. de iis, quæ vehuntur in aqua. Hæc quidem artificiosior est quam

Aristo-



Aristotelis : attamen iisdem laborat difficultatibus, quandoquidem Telluris Sphæricam figuram & ejus centrum supponit, ratione cujus pressuram aquæ sumit. Absit vero ut divinissimum Archimedem alicujus paralogismi arguamus, quem neque unquam decepisse neque unquam deceptum esse scimus. Etenim Archimedi, illo libro non est propositum Telluris sphæricam figuram demonstrare (sic enim petitionem principii admisisset) : sed solius Aquæ seu omnium liquorum generalem naturam contemplatur, ad quam supponit tanquam notius & ex aliis phænomenis demonstratum, Tellurem esse sphæricæ figuræ, sive habere in se centrum suum, ad quod gravia moveantur : quod miror Clavium non animadvertisse, qui Commentariis in Joannem de Sacro Boscæ usurpat Archimedeam demonstrationem pro sphæricæ Telluris figura asserenda. Sed & Snellius idem facit in suo Eratosthene Batavo. Alia ratio est cum Aristotele. Huic enim eo loco propositum erat, & Terræ & Aquæ & Cœli sphæricam figuram demonstrare. Quare non sine paralogismo assumere poterat terræ vel universi centrum.

Ita vidimus, argumentum à priori ab Aqua desumptum, quod ab omnibus fere Geographiæ Scriptoribus usurpatur, aliqua laborare imbecillitate : quæ an tolli possit, de eo despiciant docti Mathematici. Ego quidem integrum huic cogitationi diem attribui & varia tentavi, sed non factum voti compos : esset quippe validum & elegantissimum argumentum sphæricæ Telluris figuræ. Seposui jam illo, asseremus argumenta à posteriori, & primo quidem à cælestibus apparentiis desumpta.

I. Concipiamus lineam meridianam nostri loci seu puncti cujuscumque B in tellure, sive sectionem telluris factam plano, quod per polos mundi M, N, transit A B C D : hæc linea solet dici latitudo ter-

ra; & quæ do, sive alia faciens in A B C D, esse. Est alicuius quodvis punctum, deinde punctum perpendicula- li, ista super-

Quoniam mus punctum, A res, ideæ superficiem corpus.

Quod nem latitudinem sit circulus multis. quovis, utrum M in æquali appropinquat linea ititur com-

2. Quor quam cum populis riciencia te perpendi Torrida, gr. P, & Q P (vel stantiam stantia sc

ra; & quæ huic perpendicularis ducitur, longitu-  
do, sive aliud planum *Æquator* celesti parallelum  
faciens in tellure lineam *E B F C*. Dico tam lineam  
*A B C D*, quam *E B F C* in tellure circularem  
esse. Est autem theorema Geometricum: si super-  
ficies aliqua juxta unam dimensionem secetur per  
quodvis punctum, fiatque sectio peripheria circu-  
li, deinde juxta alteram dimensionem per idem  
punctum secetur plano, quod priori plano sit per-  
pendicularare, fiatque sectio iterum peripheria circu-  
li, ista superficies est spherica.

Quoniam itaque in superficie telluris assumpsi-  
mus punctum *B* pro libitu, & ostendemus sectio-  
nem, *A B C D*, *E B F C* esse peripherias circula-  
res, ideo ex dicto theoremate concluditur, quod  
superficies telluris sit spherica, & Tellus sphericum  
corpus.

Quod autem sectio Telluris juxta dimensio-  
nem latitudinis ab uno polo ad alterum *A B C D*  
sit circularis, probatur ex apparentiis celestibus  
multis. 1. Si in hac linea *A B C D*, sumto loco *B*  
quovis, aliquis progrediatur versus polum alter-  
utrum *M*, vel stellam ei vicinam, animadvertit  
in æqualibus factis itineribus, polo se æqualiter  
appropinquare. Hoc autem fieri non posset, nisi  
linea itineris *B A D C* esset circularis, & ostendi-  
tur commode per globum terrestrem artificialem.

2. Quoniam *A B C D* est linea meridiana, in  
quam cum Sol venit, meridies nobis & omnibus  
populis in hac linea *A B C* habitantibus est, experi-  
entia testatur, Solem alicui loco in linea *A B C*  
perpendiculariter imminere (nempe in Zona  
Torrida, ut nauta satis superque testantur) ex-  
gr. *P*, & si æqualia sumamus spatia æqualia *B Q*,  
*Q P* (vel quævis alia) animadvertemus, solis di-  
stantiam à vertice *Q*, æqualem esse excessui di-  
stantiæ solis à vertice *B* supra distantiam à verti-

ce Q: quod fieri non posset, nisi linea B P Q. esset circularis. 3. Eadem ratio est omnium stellarum quæ cum in meridianum A B C veniunt, distantia earum à verticibus P, Q, B, habent eandem inter se rationem; quam distantia Q P, P B, Q B. Ita cum nautæ nostri navigant versus Austrum stellæ quæ antea plane non erant conspicuæ & infra Horizontem, paulatim magis magisque per navigationis proportionem altiores fiunt. 4. Ita sumantur multa stellæ in cælo, & loca terræ, per quorum verticem eæ transeant, in uno meridiano animadvertes, horum locorum distantiam habent eandem inter se proportionem, quam distantia punctorum Meridiani, in quibus stellæ illæ meridiem agunt. Jam quod ad longitudinem Telluris attinet, ex gr. E B F C, quod hæc quoque circularis sit, & quod tellus tumorem Sphæricum juxta hanc dimensionem habeat, ex eo probatur, quoniam Sol & omnes stellæ populis, qui à nobis versus Orientem agunt, citius multo oriuntur, quam nobis & citius occidunt: illis vero, qui ad Occidentem à nobis habitant, contra, tardius oriuntur & tardius occidunt, & quidem juxta eam proportionem temporis, quam habent distantia meridianorum istorum locorum à nostro meridiano. Ita si duo loca à nostro sumantur, unius meridiani distantia versus Orientem 225 mill. alterius 450, nempe dupla: tunc deprehendemus in hoc loco duabus horis citius Solem oriri quam in nostro: in altero vero loco tantum una hora citius oriatur. Clarius fit argumentum, si de appulsu Solis ad meridianos diversorum locorum proponatur. Etenim quæ est ratio distantia locorum à nostro, eadem observabitur ratio temporum quæ intercedunt inter appulsus ad Meridianos illos & nostrum, sive inter arcus Æquatoris, inter Meridianos illorum & nostrum interceptos: quod

ex Eclipsi  
Telluris  
per globu  
ineptæ fu

Ita ta  
ne Sphæ

Verum  
ti potest  
cultatis h  
enim quo  
secundum  
peripheri  
cali par  
num stel  
lide, qu  
Theorem  
metris de  
quod sive  
per unum  
que om  
li, istud c

Acced  
petita, n  
à Sole spa  
tur. Quo  
Lunæ ob  
ci demon  
minoso o  
bram, s  
recte asse

Rigide  
ta à Tellu  
te Sphæri

I. A c  
Europæi  
dentem &  
gellanicu

ex Eclipsibus conspicuum fit. Hæc autem fieri, si Telluri Sphæricam figuram tribuamus, ostenditur per globum artificialem: aliæ vero figuræ ad hoc ineptæ sunt efficiendum.

Ita tam de latitudine Telluris quam longitudine Sphærica figura ostensa fuit.

Verum ex sola etiam latitudine Telluris probati potest Sphærica ejus figura, (cum aliquid difficultatis habere videatur ratio longitudinis.) Et enim quoniam omnes sectiones Telluris, quæ sunt secundum latitudinem ejus in diversis locis, sunt peripheriæ circulorum, transeant vero per idem cæli punctum nempe polum conversionis vicinum stellæ polari, ex hisce duobus inferre licet solide, quod Telluris figura Sphærica sit. Est enim Theorema Geometricum, quod propterea à Geometris demonstrari debet, hoc: si solidum aliquod sive corpus secetur planis utcumque multis per unum aliquod punctum transeuntibus, fiantque omnes sectiones in superficie peripheriæ circuli, istud corpus Sphæricum est.

Accedit alia non parum fortior ratio à cælo petita, nimirum umbra, quam tellus aversa parte à Sole spargit ad Lunam, unde hæc Eclipsin patitur. Quoniam enim hæc umbra Conica est, ut ex Lunæ obscuratæ ratione declaratur, & vero, Optici demonstrant, si solidum aliquod utcumque luminoso oppositum Sphærico faciat Conicam umbram, solidum illud esse Sphæricæ figuræ, hinc recte asseritur Sphærica Telluri figura.

Rigide tamen si agamus, concludit Argumenta à Telluris contemplatione, pro illius rotunditate Sphærica desumpta sunt hæc.

I. A circumnavigatione. Quoniam octies jam Europæi ex Europa solventes & directo ad Occidentem & Austrum itinere usque ad Fretum Magellanicum, deinde ad Occidentem & Septentrio-



nem iterum redierunt ab Oriente in Europam, atque omnia illis phænomena evenere, quæ a globi proprietate emanant: quod certe haud factum fuisset, si Tellus non esset globosa. Certe super hanc figuræ Telluris hypothèsin omnes illæ navigationes fundatæ fuerunt, quæ propterea non ita feliciter successissent, si alia fuisset ejus figura.

2. Quando vel mari vel terra proficiscimur à altis turribus & montibus, tunc paulatim partem turris & montium inferiores occultantur nobis usque ad ipsa fastigia, quæ ultimo occultantur. Eodem modo quando è longa distantia accedimus ad turrim vel montem excelsum, primo apud nos se offert conspiciendum, deinde partes continuæ inferiores, donec in propinquo versantibus nobis ipsa radix montis seu pes videtur. Et fit hæc apparitionis & occultationis incrementum omnino juxta talem proportionem, qualem tunc Sphæricus Telluris causari potest: neque juxta aliam figuram explicari potest. Diagramma clarè propositum efficiet.

3. Quia dimensio altitudinis montium, quæ super hypothèsin globosæ Terræ figuræ fundatur, cum rei veritate convenire deprehenditur.

Cæterum ut omnium horum argumentorum à posteriori desumptorum numerum in unam summam contrahamus, (etsi Geometricè tractari possent, sed magni laboris & difficultatis ea res foret. Nam demonstrandum esset, posita hac vel illa proprietate, lineam esse circularem:) ideo Sphærica figura Telluri assignanda est, quia omnes apparentiæ tam cælestes, (ut poli elevatio diversâ, inversa Solis altitudo ejusdem diei in diversis regionibus, umbrarum ratio, dierum longissimorum differentia & incrementum versus polum, sicut plures vel pauciores apparentes circa polos, diversum ortus & occasus syderum tempus, &c.) quæ

Terrestre occultantur, plures apparentiæ excogitatione variè factitius lute revelaret, si Tellus factitius elegeris planam, sicut sol & stellarum orientalibus demus quam av

Neque omnibus est, hoc & sibi in æqualibus parti con autem in Telluris diversis locis eandem

Ratio ram attrahit per se non aère n terra, si u lus plana xia, & n 3. quia S rectis lin tur, deb

Terrestres, ut navigationum directio, apparitio & occultatio montium turriumque, distantiarum locorum, plagarum, venti, &c. commodissime & apte explicantur juxta illam figuram: neque alia figura excogitari potest, quæ id præstet, ut ex consideratione variarum figurarum patet. Et noster globus factitius terrestris omnia ita exhibet, sicut in Tellure revera deprehenduntur: quod certe non fieret, si Tellus aliam haberet figuram, quam nostri factitii globi. Et quæcumque aliam formam elegeris, innumera absurda sequuntur. Namque planam non esse, ex adductis apparentiis manifestum est. Nec cavam esse posse patet ex eo, quod sol & stellæ prius occidentalibus populis quam orientalibus apparere deberet, si talis esset, sicut videmus Solem Orientem prius illustrare valles quam aversam montium partem.

Neque parum ad hoc credendum facit, quod ex omnibus corporibus solum Sphæricum simile est, hoc est cujus omnes partes inter se similes sunt, & sibi mutuo applicari possunt; & sumtis duabus æqualibus partibus, omnes affectiones, quæ uni parti conveniunt, illæ etiam alteri competunt. Hoc autem in nullo alio corpore locum habet. Et vero in Telluris dimensione deprehendimus, cum in diversis locis eadem ratione instituitur, inveniri eandem magnitudinem.

Rationum vero, quibus quidam planam figuram attribuere Telluri sunt conati, levitatem quilibet perspicere potest: Sunt enim hæc. 1. quia sereno aëre mare planum apparet, eodem modo etiam terra, si undique circumspiciamus. 2. quia nisi tellus plana figura esset, nimis ruinæ videretur obnoxia, & mobilis; sed planæ figuræ sunt stabiliores. 3. quia Sol & Luna dum oriuntur & occidunt, rectis lineis paulatim oriri & occultari videntur, debebant autem curva linea secari ab Hori-

zonte nostro, si Tellus Sphærica vel saltem rotunda esset. Ita antiqui ratiocinati sunt, ut Aristoteles refert. 4. Quidam contra globositatem ratiocinantur ex tot montibus qui rotunditatem impediunt. 5. Quia aqua censetur altior esse quam terra. 6. Quia fieri non posse existimant, ut homines nobis oppositi consistant in Tellure, & non deorsum ad cœlum cadant. Hæc cogitatio multo doctis quoque, non vulgo tantum scrupulum facit, quod vix credidissem, nisi ex ipsorum orationibus aliquoties ista audivissem, qui mihi confessi sunt, etsi Sphæricam Telluris figuram non ausint neque possint propter urgentes rationes negare, tamen istum scrupulum non posse ex animo amovere. ut taceam Augustini atque aliorum Patrum sacrosanctos & irrefragabiles. Cæterum hæc rationes à quibus facile refutantur. Montium altitudinem, nullas habere proportionem ad Terræ magnitudinem infra demonstrabitur. Porro posita jam & asserita Sphærica Telluris figura, omnia illa, quæ Geometria de Sphæra & globo demonstrarunt, Telluri accommodari poterunt & debent, ideoque centri, diametri, seu axis semidiametri, poli, circuli maximi, &c. definitiones in memoriam vocandæ sunt.

Quisnam autem primus Telluris Sphæricam figuram asseruerit, id antiquitatis tenebris obliturum est. Sane vetustissimam esse doctrinam eo patet, quod Babylone ab Alexandro capta à ventis ibi sint Eclipses annotatæ & supputatæ, quæ annos ante Christum multos, quod sine hac Telluris figuræ cognitione fieri nequit. Thaleti Græci satis hoc perspectum fuisse, ex prædicatione Epicuri patet.

## CAPUT IV.

*De Telluris dimensione & magnitudine.*

**T**elluris dimensio tria complectitur primaria capita. 1. Diametri seu semidiametri, hoc est lineæ à superficie ad centrum ut etiam peripheriæ, terræ sive circuitus longitudinem. 2. Superficiæ totius Telluris magnitudinem. 3. Soliditatem seu corpoream Telluris dimensionem. Cæterum hæc ita comparata sunt, ut uno eorum cognito, reliqua duo innotescant per Geometrica Theoremata, quoniam tellus Sphæra quædam est: ut capite 2 monstratum est. Nobilissima hæc & cognitu dignissima affectio jam à multis seculis exercuit præstantissima ingenia: ita ut quidam integros libros de hac sola materia conscripserint. Et ideo non ingratum studiosis Geographiæ fore putavi, si historiam hujus dimensionis hoc loco enarrarem. Diogenes Laërtius laudat Anaximandrum Milesium Thaletis discipulum, quod præter alia Astronomica inventa, primus quoque terræ marisque circuitum seu perimetrum descripserit: Vixit autem Anaximander circa annum 550 ante Christum natum. Ejus dimensionem secuti videntur Mathematici sequentium temporum, usque ad Eratosthenem, quoniam nullius alterius mentionem faciunt scriptores: atque ideo ab Anaximandro assignatam magnitudinem eam existimo esse, quam Aristoteles annotavit in fine libri 2 de Cælo dicens: Mathematicorum etiam, qui magnitudinem orbis terræ metiri conantur, quadringentis terram cingi stadiorum millibus dicunt. Ex hac perimetro non est difficile assignare semidiametrum Telluris juxta Anaximandrum. Verum enimvero cum præter unicum illum Diogenis Laërtii locum nihil annotatum inveniamus



de Anaximandri Inventione & modo, obscurata est illius diligentia, & Eratosthenis, qui post Anaximandrum hoc negotium suscepit, celebrata ab omnibus industria: Vixit hic circa annum 200 ante Christum: & ut in reliqua Mathesi & dimensionibus fuit versatissimus, ita hanc Telluris Geodasiam accuratissime perfecisse existimatus est, & illi primo hæc gloria ascripta. Prodidit autem perimetrum seu ambitum Telluris esse ducentorum quinquaginta mill. stadiorum (250000, alii 252000) quæ Plinius ait efficere passuum Romanorum trecenties quindecies centena millia, hoc est 315000 milliaria Romana, quæ singula censentur mille passuum.

Scripserat Eratosthenes de Geographia tres libros, qui jam non exstant amplius injuria temporis: Strabo singulorum librorum argumenta recenset: & Cleomedes Modum annotavit, quod Eratosthenes usus est ad inventionem ambitus Telluris: in quo quid desideretur, postea dicemus. Etenim Eratosthenis dimensio à multis Mathematicis, inprimis Hipparcho (100 annis post Eratosthenem) judicata est à vero abudere: et si de Hipparchi dimensione nihil perscriptum sit nisi quod 25000 stadia addiderit Eratosthenis perimetro. Sed proximus post Eratosthenem aggressus est hanc doctrinam Posidonius, scientissimus non tantum Astronomus & Practicus, verum etiam in omni Philosophiæ parte, paulo ante Christi Nativitatem, nempe Ciceronis & Pompeii ætate. Hic per suam dimensionem invenit Terræ ambitum esse stadiorum 240000, ut Cleomedes annotavit; verum 180000, ut Strabo: unde magnus existit dubium de causâ hujus discrepantiæ inter Cleomedis & Strabonis assignationem: cum Strabonis hæc verior sit, etsi paucis verbis prolata: Cleomedis autem à vero aliena, etsi multis Geodasiam

dzfia  
mus i

Ca

huc u

post

rum

quis

tio t

graph

adju

ex ej

Ips

Geog

& qu

miru

dit,

nim

stadi

Pod

scien

tio a

Se

rum

trans

quer

Abe

Chri

cusâ

stian

Baby

mag

co i

Arab

quat

mat

serut

jar s

lani

daxiam Posidonii enarraverit, *De ipsius Modo dicemus infra.*

Cæterum Eratosthenis dimensio à plurimis adhuc usurpata est usque ad Ptolomæum (anno 144 post Christum) qui perimetrum 180000 stadiorum usurpavit & veritati convenientem præ reliquis esse asseruit, ita ut à Theone hæc ipsi inventio tribuatur. Marinum quoque celebrem Geographum & cujus scriptis Ptolomæus multum fuit adjutus, aliquid tentasse in hoc negotio colligitur ex ejusdem Ptolomæi Geographicis.

Ipsè Ptolomæus testatur de semetipso in libr. 1. Geog. cap. 3. quod dimensionem hanc tentaverit, & quidem alia via, quam præcessores, in locis nimirum diversorum Meridianorum: sed non addit, quantam invenerit perimetrum: usurpat enim à Marino & præcessoribus acceptam 180000 stadiorum.

Post illa tempora, cum in Græcia paulatim scientiarum cultus evanesceret, nihil in hoc negotio actum, neque Romani quicquam susceperunt.

Sed Arabes & Saraceni, rerum potiti, sicut aliarum disciplinarum splendorem à Græcis ad se transfulerunt, ita hanc Mathesis partem non liquerunt intactam. Etenim (ut Snellius refert ex Abelfedea Geographo Arabe, qui circa annum Christi 1300 floruit, & cujus scripta Romæ excusa sunt) circa octingentesimum Epochæ Christianæ annum Maimon Rex Arabum, seu Califa Babyloniorum, Matheseos studiosus, utpote qui magnam Ptolomæi Constructionem jussit ex Græco in Arabicum sermonem convertere, qui ab Arabibus dicitur Almagestus Ptolomæi, hic, inquam, Maimon convocatis quibusdam Mathematicis peritis mandavit, ut Terræ perimetrum scrutarentur. Ad quod peragendum campos Zinjar seu Mesopotamiæ elegerunt, atque sub eodem

Meridiano à Septentrione in Austrum progressi donec elevatio poli uno gradu decreverat, inventerunt ad amissim intervallum seu iter confectum esse 56 milliariam vel  $56\frac{1}{2}$ , unde conficitur perimetrum juxta eos esse 20060 vel 20340 milliariam.

Ex eo tempore ad nostrum usque seculum nemo problema hoc sollicitavit: sed Arabes plerique hanc suorum Mathematicorum dimensionem usurparunt: Latini vero cum Astronomiam tractare inciperent, adhibuerunt eam, quam Prolemæus usurpaverat 180000 stadiorum, quæ faciunt 324000 milliaria Italica, vel Germanica 5400 milliaria, quoniam uni gradui quindecim Germanica vel 60 Italica assignata sunt, cum deberent assignari 15 &  $\frac{1}{8}$ , quoniam 32 stadia tribuuntur circiter uni Germanico milliari: & si perimeter foret 5625 milliariar. Germanicar. Cæsarum ante triginta circiter annos Mathematici insignis Snellius Professor Leydenfis, animadvertens usitatam Mathematicis perimetrum terræ vel unius gradus definitam in milliariibus quindecim magnitudinem, non certa inniti demonstratione, sed dubiam esse, ideo magna profus industria dimensionem hanc aggressus est, & feliciter perfecit, demonstrans unius gradus in terræ magnitudinem esse 28500 perticarum (quarum singulæ continent duodecim pedes Rhinlandicos) sive novendecim milliariam Hollandicorum & totam perimetrum 8640 milliariam. Milliarum autem definit perticis 1500, sive 18000 pedibus Rhinlandicis. Hanc historiam dimensionis Terræ juris placuit præmittere, ut Lectores intelligant quanta cum industria hoc negotium tractatum sit & quanta cum difficultate conjunctum. Jam modo ipso dimetiendi loquemur.

In  
quam  
esse.  
transf  
lum  
secta  
cetur  
periph  
circui  
pheria  
tium.  
dividi  
& ver  
non p  
unius  
gnitue  
necess  
Periph  
Merid  
roris o  
Septer  
dis, qu

M

Hon  
terrest  
tricus  
ris. N  
celesti  
zontes  
eodem  
jacentes  
jam ob  
nempe  
F. A. E

Innititur autem hæc Inventio figuræ Telluris, quam in precedenti capite probavimus Sphæricam esse. Etenim concipimus Tellurem secari plano transeunte per centrum: hæc sectio efficiet circulum Telluris maximum (Spharâ enim utcumque sectâ, sectio fit circulus; si autem per centrum sectetur, circulus erit maximus), & ideo hujus circuli peripheria in superficie Telluris erit ambitus seu circuitus & perimeter telluris. Et ab hujus peripheriæ magnitudine incipit hoc dimetiendi negotium. Quoniam itaque hæc peripheria, sicut alia, dividitur animo in 360 gradus (ut cap. 2 dictum) & vero totius peripheriæ magnitudinem obire non possumus, ideo eo reducitur problema, ut unius gradus vel alterius partis, ex gr.  $\frac{1}{2}$  grad. magnitudinem in mensura cognita inveniamus, cujus necessitas etiam in aliis problematibus occurrit. Peripheriam autem Telluris accipimus plerunque Meridiani circuli, quia hic facillime & minori erroris occasione determinatur per nostrum locum & Septentrionem seu stellam polarem, vel aliis modis, quos cap. XXIII afferemus.

*Modus Primus, quo Arabes & alii  
usi sunt.*

Horizon  $H h R$  sit itaque Meridiani nostri terrestris (qui caelestis  $a b c d$  subjacet & concentricus est), peripheria  $A B C D$ .  $R$  centrum Telluris. Noster locus  $B$ . vertex  $b$  polus Telluris  $A$ , caelesti subjacens. Erit elevatio poli supra Horizontem  $A H a h$ . Assumamus jam alium locum in eodem meridiano,  $A B C D$  vel sub eodem  $a b c d$  jacentem  $G$ , vertex  $g$ , Horizon  $f F R t T$ . Sit jam observata accurate elevatio poli in loco  $B$ , nempe  $a h$  vel  $A H$ . Item loci  $G$ , nempe  $f a$  vel  $F A$ . Et auferatur  $F A$  ab  $H A$ , relinquitur  $H F$ ,

$B$  5

cui



cui arcus BG inter loca interceptus est æqualis. Deinde intervallum inter BG accurate metiendum est in certa mensura, ex gr. quot perticæ contineat, vel quot milliaria. Hæc enim respondebunt arcui BG. Et per regulam auream ut BG ad ABCd 360 gr. ita inventum intervallum vel perticæ vel milliaria ad perticæ vel milliaria totius perimetri ABCD: Vel ut BG arcus ad unum gradum ita inventæ perticæ vel milliaria ad perticæ vel milliaria, quæ debentur uni gradui.

NOTA. Si intervallum BG non placeat metiri sed vulgi determinationem sequi placet, tunc juxta illud iter determinanda est quantitas. Ex gr. Unus gradui respondere quindecim milliaria talia, quæ inter BG sint decem, &c.

Exemplum. B Amstelodamum, ubi Elevatio poli AH, ah est 52 gr. 23. min. G sit Schoonhoven jacens cum Amstelod. sub eodem meridiano cujus Elevatio poli Af, af est 51 gr. 54 min. Ita itaque fh vel BG, 29 minut. Distantia autem inter Amstelod. & Schoonhoven est  $9\frac{1}{4}$  milliaria Holland. vel perticarum Rhinland. (12 perticæ 13875. Itaque ut 29 minut. ad 60 min. vel 19 minut. ita  $9\frac{1}{4}$  ad 19 mill. Holl. Ergo 19 mill. Holland. faciunt gradum unum in peripheria Telluris. 360 gr. five tota peripheria est milliaria.

Vel: intervallum BG censetur  $7\frac{1}{4}$  milliaria Germanicorum (debet unum censei 1900 perticæ Rhinlandicis.) Itaque fiat: ut 29 pr. ad 60 pr. ita  $7\frac{1}{4}$  ad 15 milliaria talia Germanica. Itaque 1 pr. facit 15 milliaria Germanica. Ita Præcipua Elevatio, poli est 50 gr. 6 min. Lincii 48. gr. 16 min. Different. BG erit 1 gr. 50 min. Et censetur distantia 26 mill. Germanica. Itaque perimenter erat 511 milliaria. Et totus circuitus telluris 5400 milliaria.

*Modus secundus, Eratosthenis.*

Sint iterum duo loca telluris in eodem Meridiano. B. sit Alexandria Ægypti, ubi Eratosthenes Regiæ Bibliothecæ præfectus vixit. G sit Syene, urbs Ægypti sub Tropico Cancræ, quam Eratosthenes in sua dimensione elegit, & distantiam ejus ab Alexandria assumsit 5000 stadiorum. Observetur quadrante jam in ambobus locis uno eodemque die in meridie Solis quando in lineam meridianam a b c d venit, distantia à verticibus b, g. Sit Alexandria die solstitii, 21 Junii observata g f seu G F,  $\frac{1}{20}$  peripheriæ sive 7. gr. 12 min. In Syene autem sit nulla distantia, hoc est Sol vertici eorum g eminet perpendiculariter. Erit itaque B G arcus inter duo hæc loca interceptus 7 gr. 12 min. Et quia distantia ponitur 5000 stadior. (quorum 8 faciunt milliare Italicum vel 32 Germanicum.) Itaque juxta regulam auream erit ut 7 gr. 12 pr. ad 1 gr. (vel ut  $\frac{1}{20}$  ad  $\frac{1}{360}$  sive ut 5 ad 36) ita 5000 ad 694 $\frac{2}{9}$  stadia, quæ debentur uni gradui, Vel ut  $\frac{1}{20}$  ad 50 sive ut 1 ad 50, ita 5000 ad 250000 stadia totius peripheriæ A B C D, juxta hanc dimensionem. Cæterum cum diversi sint modi ad altitudinem Solis meridianam, & distantiam à vertice g b sumendam, Eratosthenes illud fecit per Sciathericum cavum Sphæricum, quod Scaphen & Scaphium appellarunt, ubi stylus B X indicat verticem O X Z radius solis umbram styli terminans designat arcum B Z, quantus est O b distantia solis à vertice, 7 gr. 12 pr. Alexandria: Sed in Syene stylus G X nullam umbram spargit eo die: quia Sol O illi perpendiculariter imminet, & ideo nulla tunc Solis à vertice est distantia. Quoniam itaque Angulus B X Z est æqualis angulo b x o, cujus mensura est b O sive

B 6

B G,

B G, ideo B G xqualis est B Z, 7. gr. 12. pr. v.  $\frac{1}{5}$  peripheriæ. Reliqua peraguntur, ut dictum est.

*Modus tertius Posidonii.*

Sint duo loca B G sub eodem Meridiano. Posidonius sumsit B, Rhodum, ubi ipsi vixit, & Alexandria Ægypti. Observetur in his duobus locis, stellæ alicujus S, altitudo, quando in Meridianum venit, supra Horizontem: idque eadem die vel diversis diebus. Nihil enim refert. Posidonius sumsit stellam S Canobum, fulgentem primæ magnitudinis in Argo navi. Hæc autem supra Horizontem h H S Rhodi non oriebatur, sed tantum stringebat Horizontem in S: Sed supra Alexandrinum Horizontem F R t, elevata est arcu t S,  $\frac{1}{48}$  totius peripheriæ, sive 7 gr. 30 min. Itaque arcus T s, hoc est B G, distantia erit erit 7 gr. 30 min. Est autem juxta ipsam intervallum Rhodi & Alexandriæ 5000 stadiorum. Itaque 7 gr. 30 min. ad 1 gr. sive ut  $\frac{1}{48}$  ad  $\frac{1}{360}$ , hoc est ut 48 ad 360 ita 5000 ad 666  $\frac{2}{3}$  stadia, quæ debentur uni gradui. Vel ut 1 ad 48 ita 5000 ad 24000 stadia totius perimetri telluris juxta hæc Posidonii hypotheses.

*Modus quartus Snellii.*

Quia in prioribus Modis assumpsimus duo loca B, G, sub eodem meridiano jacentia, & vero loca commoda ad hoc negotium sub diversis meridianis jacere possunt, ideo de hoc quoque exemplum proponendum esse duximus, & quod eodem Snellii.

Sit itaque A B C D Meridianus Almarix, Almaria. Elevatio poli h a 52 gr. 40  $\frac{1}{2}$  min. distantia à polo B A 37 gr. 19 min. 30 sec.

Alter locus sit P, Berga ad Zomum, Meridi

mus A P V V distantia à polo, hoc est, complementum Elevationis (51 gr. 29 min.) A P, est 38 gr. 31 min. Itaque ducta P G perpendiculari ad A B G, differentia distantiarum à polo est B G, 71 min. 30 sec. vel 1. gr. 11. min. 30 sec.

Porro distantiam Alemaria à Berga, B P, Snellius invenit geodæsia operosa 34710, perticarum Rhinlandicarum: Et angulum positionis P B G 1 r gr. 26 min. 2 sec. Itaque in Triangulo rectangulo P B G, datur hypotenusæ B P & angulus P B G. Itaque per probl. cap. 2 invenitur B G 34018, (pro quibus Snellius assumit 33930. Nam detrahit 88 perticas propter stationes elevationum poli). Est autem arcus B G  $71\frac{1}{2}$  scrupulorum, differentia Elevation. poli. Itaque ut  $71\frac{1}{2}$  min. ad 1 gr. vel 60 min. ita 33930 (vel 34018) ad 28473 perticas pro uno gradu, vel ad numerum rotundum, 28500, sive 19 milliar. Holland. Qui sphericam Trigonometriam callent, Ex datis, A B, A P, angulo A B P possunt invenire arcum B P 1 gr. 14 min. qui cum æquantur perticis 34710, erit 1 gr. æqualis perticis 28300 perticarum seu 18 milliar. &  $\frac{4}{5}$ . Sed quod hic numerus à Snelliano differt, causa est 1, quod Snellius non ipsa puncta turrium B, P, ex quibus angulum G B P est adeptus, sumisit pro electionibus poli cognoscendis, sed loca seu ædes paululum remotas ab iis. Vide eum p. 197. Eandem tamen inventum iri polorum altitudinem in turribus nemo potest dubitare. Altera causa est, quod lineas B G, B P, P G, assumit rectas, quæ tamen rectæ non sunt, nisi parvam & nullius momenti differentiam videatur hæc discrepantia creare. Sed assumatur Snelliana quantitas gradus 28500 perticarum (mea 28300 perticarum) hæc faciunt  $19\frac{347}{150}$  mill. (meæ 18 $\frac{4}{5}$  milliar. Erit perimeteꝛ seu ambitus juxta Snellium 10, 260, 000



pertic. vel 123, 120, 000 pedum, vel 8640 miliar. Holland.

*Quintus modus, primus Terrestris.*

Tres sequentes modi terrestres sunt, sine cœlo meridiana linea opus perficientes. Sit B P mons vel turris altitudo: hæc geodætica ratione inquirenda est. Dein termini remotissimi, à quo videri potest, vel qui ex eo videri potest, distantia P S. licet P S recta non sit, tamen quia totius telluris peripheriæ minima portio est, ideo pro recta sumitur: & Triangulum B P S rectangulum: in quo ex datis B P, P S, invenitur angulus B S P, cuius qualis est P R S, cujus mensura est arcus S P. Itaque ut hic arcus ad unum gradum, ita inventa distantia P S ad quantitatem unius gradus. Ex. gr. sit B P altitudo 480 passuum sive  $\frac{1}{2}$  circiter milliaria Germanici. Et distantia P S puncti S, quod visum terminat, sit 40000 passuum vel 10 milliaria Germanici. Itaque juxta probl. cap. 2 fiat: Ut  $\frac{480}{10700000}$  <sup>4000</sup> <sub>10700000</sub> Tangentem anguli B S P vel S R P vel arcus S P nempe 41 m. Itaque ut 41 m. ad 60 m. ita 4000 pass. ad 59000 passus, hoc est 15 milliaria circiter pro uno gradu.

Vel sine Tabula sinuum & sine perimetri inventionem potest inveniri semidiameter P R. Etenim ut B P ad P S ita P S ad P R, ut 480 ad 40000, ita 40000 ad 3333333 passus pro semidiametro R P.

*Modus sextus, secundus Terrestris, sine distantia cognitione.*

Verum eadem semidiameter R P etiam hæc modo concludetur & invenietur. Sit P B turris excelsa, nimirum ex foramine B demissa bolus deprehendatur altitudo 100 pass. (Vel si mons

P B al  
suum  
inven  
min.  
Ex  
Et hic  
Fia  
ite B  
passib

Hi  
accor  
tes,  
stanti  
rest.  
S T  
Germ  
angu  
te T  
920  
duob  
ream  
pro u  
Hi

Nam  
perin  
venit  
Q  
milli  
123,  
nitur  
tic.  
tellu  
Et  
4093

P B altitudo sit cognita ex alia geodasia 4000 passuum. Deinde adhibito in fastigio B instrumento inveniatur angulus ultimi visus, P B S, 88 gr. 37 min. Itaque B R S erit 1 gr. 23 min.

Ex Canone Sinuum sumatur sinus 88 gr. 37 m. Et hic subtrahatur à sinu toto 10000000.

Fiatque ut Residuum ad sinum 88 gr. 37 min. ita B P 1000 passuum ad semidiametrum S R in passibus.

*Modus septimus, tertius Terrestris.*

Hic modus prioribus accuratior & ad praxin accommodatior videbitur, adhibens duos montes, vel altitudines quorum non altitudo sed distantia cognita sit, quæ geodaxice inveniri potest. Sit B P una altitudo, mons, turris, arx, &c. S T altera, distantia T P sit quinque milliaria Germanicorum. Inveniatur per Instrumentum angulus B T R 89 gr. 45 min. & in altero monte T B R 89 gr. 55 min. Erit angulus P R S 920 min. (quia tres anguli T, B, R æquantur duobus rectis 180 gr.) Quare juxta regulam auream ut 20 gr. ad 60 gr. ita 5 milliaria ad 15 mill. pro uno gradu.

Hic sunt præcipui modi Telluris dimetiendæ. Namque ex inventa unius gradus mensura, tota perimenter, diameter, superficies & soliditas invenitur ita.

Quoniam perimenter juxta Snellium est 8640 mill. Holl. vel 10, 260, 000 pertic. Rhinlan. vel 123, 120, 000 pedum. Ideo per probl. c. 2 invenitur semidiameter Telluris 1088 $\frac{3}{4}$  mill. vel pertic. 1633190 vel pedum 19598300. Superficies telluris 18811353 $\frac{3}{5}$  milliaria Holl. quadrata.

Et tota soliditas est milliaria Cubicorum 40956831512.

Ve-

Verum quoniam usitator est supputatio Germanica milliaria, quorum quindecim unum gradum constituent, ideo hæc adhiberi possunt sed cum hac conditione, ut talia intelligantur milliaria, quorum xv faciant xix milliaria Rhinlandica, sive ut unum miliare contineat perticas Rhinlandicas 1900, vel pedes Rhinlandicos 22800.

Erit itaque peripheria seu circuitus telluris talium milliarium 5400: semidiameter 860: superficies 9278181 mill. quadrat. Soliditas 2656933 milliarium Cubicorum.

Commodissima vero sunt Italica milliaria, quorum sexaginta uni gradui solent attribui. Sic enim apte unum miliare respondet uni minuto gradus. Sed debet tale miliare Italicum intelligi, quod habeat perticas Rhinlandicas 475. Sic erit circuitus telluris talium milliarium 21600: semidiameter 3440. Hisce ita expositis, causæ afferendæ sunt cur autorum recitatae antea dimensiones ita discrepent, & quid in singulis desideretur.

In primo Modo hæc occurrunt. 1. Quod in iudiciis elevatione poli erretur. 2. Quod de locis sub eodem Meridiano dubitari possit. 3. Quod distantia non distincte explicetur. Et quia Arabes modo usi sunt, ideo quæ in eorum dimensione considerantur, sunt hæc. 1. Ignota nobis est exacta magnitudo milliaria eorum (4000 cubitorum est iuxta Alfraganum). 2. Non indicarunt loca, quorum elevationes sumserunt, & ideo de illorum diligentia non possumus inquirere. 3. Nec modum quo distantiam mensi sunt, indicarunt.

In Eratosthenis Dimensione hæc animadvertendum merentur.

1. Quod arcui invento BZ 7 gr. 12 min. non addidit 15 min. pro arcu inter radium Solis XZ et verum centalem radium, qui sumendus fuisset, intercepto.

2. Quæ

2. Quæ  
ridiano

3. Quæ  
sit nota

stadia h

4. Quæ  
diam a

Geogr ne  
bis cert

In P

1. C  
supra R

tollatu

stringat

2. C  
diam p

navit.

3. C  
natus s

4. C  
dus fut

In M

facile

2. Extr

test, tu

rum de

Hæc

tro, si

mus ex

pus sin

partes,

co non

zi potes

Ani

midian

lestium

planeta.

2. Quod Syenen & Alexandriam sub eodem Meridiano jacere non probavit.

3. Quod umbrarum terminus non accurate possit notari, & præterea loca circa Syenem ad 150 stadia hoc habeant, quod sine umbra sit stylus.

4. Quod distantiam inter Syenen & Alexandriam assumsit juxta vulgi opinionem, quæ *αξιόθετος* non curat: Neque stadiorum magnitudo nobis certo constat.

In Posidonii Modo hæc vitia inesse censentur.

1. Quod Canobum non attolli existimaverit supra Rhodi Horizontem, cum tamen 2 gr. attollatur: certe non potuit scire, quod accurate stringat.

2. Quod distantiam inter Rhodum & Alexandriam per conjecturas & vulgaria itinera determinavit.

3. Quod ipsius stadiasmus non satis determinatus sit.

4. Quod dubium sit, An Alexandria & Rhodus sub eodem Meridiano jaceant, &c.

In Modis terrestribus hic inest defectus, 1. quod facile peccetur in montium exacta dimensione.

2. Extremum visus punctum accurate sciri non potest, tum propter refractiones, tum propter oculorum debilitatem.

Hæc de Telluris circuitu maximo, semidiametro, superficie & soliditate dixisse sufficiat. Possimus ex soliditate de pondere ejus judicare, si corpus simile esset: sed quoniam diversi ponderis partes, quarum proportio nos latet, illi iniunt, ideo non nisi facta suppositione pondus determinari potest.

Animadversione dignum est, quod Telluris semidiameter sit modulus & mensura omnium cælestium dimensionum tam in assignandis distantibus planetarum à Tellure & à se invicem, quam in magnitu-



gnitudine eorum supputanda. Ita dicimus Soli abesse à Tellure Semidiametris 1200 circiter, nam 40, &c.

Cæterum cum in Geographia non tantum mares Telluris circulos, ut Æquatorem, &c. sed etiam parallelos Æquatoris consideremus, ideo etiam terminandum, quot milliaria vel perticæ respiciant uni gradui in singulis parallelis. Perticæ numerationem ex Snellio desumpsimus, millia ipse supputavi: nempe 1900 pert. pro milliar. German. 1500 pro Belgico, sed 475 pro Italico.

*Tabula quantitatis unius Gradus in singulis Parallelis.*

Gradus, quibus paralleli distant ab Æquatore, sive Elevatio poli parallelorum.

	Perticæ unius gr.	Milliaria Holland. mill. part.	Milliaria German. min.	Mill. Itali. min.
Æquat.	28500	19.	15. 0	60.
1	28496	18. 1496	14. 59	59.
2	28483	18. 1483	14. 59	59.
3	28461	18. 1461	14. 58	59.
4	28431	18. 1431	14. 57	59.
5	28392	18. 1392	14. 56	59.
6	28344	18. 1344	14. 55	59.
7	28288	18. 1288	14. 53	59.
8	28223	18. 1223	14. 51	59.
9	28149	18. 1149	14. 48	59.
10	28067	18. 1067	14. 46	59.
11	27976	18. 976	14. 43	58.
12	27877	18. 877	14. 40	58.
13	27769	18. 769	14. 37	58.
14	27653	18. 653	14. 33	58.
15	27529	18. 529	14. 29	58.

nus Sol  
circiter l

atum ma  
c. sed et  
o etiam  
ica refpe

Pertican  
, millia  
milliar. G  
lico.

fr-

Mill  
Itali  
min.

60.  
59.  
59.  
59.  
59.  
59.  
59.  
59.  
59.  
59.

58.  
58.  
58.  
58.  
58.

Latitudo.	Perticæ unius gr.	Milliaria Holland. mill. part.	Milliaria German. min.	Milliar. Italica. min.
16	27653	18. 453	14. 25	57. 40
17	27255	18. 255	14. 21	57. 20
18	27105	18. 105	14. 16	57. 4
19	26947	18. 0	14. 11	56. 44
20	26781	18.	14. 6	56. 24
21	26607	17. 1107	14. 0	56. 0
22	26425	17. 925	13. 54	55. 36
23	26234	17. 734	13. 48	55. 12
24	26036	17. 536	13. 42	54. 48
25	25830	17. 330	13. 36	54. 24
26	25616	17. 116	13. 29	54. 0
27	25394	16. 1394	13. 22	53. 28
28	25164	16. 1164	13. 15	53. 0
29	24927	16. 927	13. 7	52. 28
30	24681	16. 681	13. 59	51. 56
31	24429	16. 429	12. 51	51. 24
32	24169	16. 169	12. 43	50. 52
33	23902	15. 1402	12. 35	50. 20
34	23628	15. 1128	12. 26	49. 44
35	23346	15. 846	12. 17	49. 8
36	23057	15. 557	12. 8	48. 32
37	22761	15. 261	11. 59	47. 56
38	22458	15.	11. 49	47. 16
39	22149	14. 1149	11. 39	46. 36
40	21832	14. 832	11. 29	46.
41	21509	14. 509	11. 19	45. 16
42	21180	14. 180	11. 9	44. 36
43	20843	13. 1343	10. 58	43. 52
44	20501	13. 1001	10. 47	43. 8
45	20152	13. 652	10. 36	42. 24

Lati- tudo.	Perticæ unius gr.	Milliaria Holland. <i>mill. part.</i>	Milliaria German. <i>min.</i>	Milli- Italicæ	Lati- tudo.
45	19798	13. 298	10. 25	41.	76
47	19437	13. 0	10. 14	41.	77
48	19070	12. 1070	10. 2	40	78
49	18698	12. 698	9. 50	39.	79
50	18319	12. 319	9. 38	38.	80
51	17936	11. 1436	9. 26	37.	81
52	17546	11. 1046	9. 14	37.	82
53	17152	11. 652	9. 2	36.	83
54	16752	11. 252	8. 49	35.	84
55	16347	10. 1347	8. 36	34.	85
56	15937	10. 937	8. 23	33.	86
57	15522	10. 522	8. 10	32.	87
58	15103	10. 103	7. 57	31.	88
59	14679	9. 1179	7. 44	31.	89
60	14250	9. 750	7. 30	31.	90
61	13817	9. 317	7. 16	29.	
62	13380	8. 1380	7. 2	28.	
63	12939	8. 939	6. 48	27.	
64	12494	8. 494	6. 34	26.	
65	12045	8. 45	6. 20	25.	
66	11592	7. 1092	6. 6	24.	
67	11136	7. 636	5. 52	23.	
68	10676	7. 176	5. 38	22.	
69	10213	6. 1213	5. 23	21.	
70	9748	6. 748	5. 8	20.	
71	9279	6. 279	4. 53	19.	
72	8807	5. 1307	4. 38	18.	
73	8333	5. 933	4. 23	17.	
74	7846	5. 346	4. 8	16.	
75	7376	4. 1376	3. 53	15.	

Motio  
 tion  
 pleraru  
 pernican  
 petuam  
 nulla ef  
 venior fi  
 censuram  
 autem a  
 dari, ide  
 Solen  
 singulis  
 niente ac

Milliar. Italica.	Lati- tudo.	Perticæ unius gr.	Milliaria Holland. <i>mill. part.</i>	Milliaria German. <i>min.</i>	Milliar. Italica. <i>min.</i>
41.		6895	4. 895	3. 38	14. 32
41.	76	6411	4. 411	3. 23	13. 32
40.	77	5925	3. 1425	3. 8	12. 32
39.	78	5438	3. 938	2. 25	11. 28
38.	79	4949	3. 449	2. 36	10. 24
	80				
37.	81	4458	2. 1458	2. 20	9. 20
37.	82	3966	2. 966	2. 5	8. 20
36.	83	3473	2. 473	1. 50	7. 20
35.	84	2979	1. 1479	1. 34	6. 12
34.	85	2484	1. 984	1. 18	5. 12
	86	1988	1. 488	1. 3	4. 12
33.	87	1492	0. 1492	0. 47	3. 12
32.	88	995	0. 995	0. 31	2. 4
31.	89	497	0. 497	0. 16	1. 4
31.	90	0	0. 0	0. 0	0. 0

## C A P U T V.

### *De Motu Telluris.*

**M**otus Telluris Pythagoricus sive circumrotatio (non tremor vel concussio illa), causa est plerarumque apparentiarum cœlestium juxta Copernicanos, cum sine illo unusquisque locus perpetuam harum constantiam habiturus fuisset. Sed nulla est Telluris affectio, de qua major atque severior sit disputatio, cum etiam non ita dudum censuram Romanæ Ecclesiæ passa sit. Quoniam autem admodum verisimile multis videretur, cum dari, ideo paucis eum explicare conabor.

Solem, Lunam, omnesque cœli stellas apparere singulis diebus, hoc est, spatio 24 horarum ab Oriente ad Occidentem moveri, & ad eadem fere cœli



cœli loca redire, nemini vel ex vulgo ignotum. Oportet itaque vel ipsas moveri revera, vel moveri, atque nostrum motum imputari. Etenim si duæ res distantiam mutant, altera ad minimum mota fuit; quod axioma manifestum est.

Terram stare, stellas cum cœlo moveri, verum fuit & est opinio Astronomorum, qui Ptolemaïci vocantur: sed stellas suum constanter tenere locum, & terram circumgyrari circa suum centrum olim defenderunt Pythagorici, quorum verum fuit celeberrimus Aristarchus Samius, qui propter hujus placiti defensionem ab adversario & inimico suo accusatus est violatæ religionis coram Apollonibus, sed absolutus judicium sententia. Cæterum paucos reperit adstipulatores hoc dogma, in multis seculis oblivione quasi sepultum fuerat adeo nulla ejus in scholis vel mentio facta, donec Copernicus Astronomus insignis ante duo circiter secula magnum ei conciliavit nomen, atque edocuit, ut plurimi Astronomi & quidem excellentes dogma hoc amplecterentur atque multis rationibus confirmarent: inter quos non ita pridem fuerunt Dominus Keplerus Cæsaris Mathematicus, Galilæus de Galilæo Italus, & Magni Heriarum Ducis Mathematicus, & Lansbergius Belgicus. quoniam duplex nobis deprehenditur cœlestium corporum motus, primus, quo omnes stellæ fixæ quam planetæ pari tempore, nempe 24 horis circa tellurem ferri videntur, atque oriri, meridiem agere & occidere: Secundus, qui proprius dicitur, quo planetæ diverso motu ab Occidente ad Orientem, ut etiam stellæ fixæ ferri observantur. Ptolemaïci utrunque hunc motum ipsis Stellaribus seu Orbibus inesse affirmant: Copernicani autem primum illum motum solum Telluris non cum translatione de loco in locum, sed ejus in loco

manenti  
in Orientem  
) affe  
tur) affe  
fixas & S  
tes mot  
que axi  
planetis  
tam esse  
ponunt  
cum, n  
illam di  
pote qu  
Mercuri  
Ratic

1. Qu

horis 24  
cere, &  
tis in su  
rationi d  
lum: sic  
quantib  
apparent  
tum affe  
facere p  
est, in h

2. Q

superans  
enim cu  
vastissim  
minuto  
rium fer  
scribatur  
de mini  
suum ax

3. A

compare  
terrestri.

manentis rotationi circa suum axem ab Occidente in Orientem (qualis omnibus stellis indita videtur) ascribunt: Secundo autem illo motu stellas fixas & Solem etiam liberant, & horum apparentes motus Telluris circumlacioni circa Solem atque axis inclinationi attribuunt, reliquis tamen planetis eum relinquunt: nimirum Solem planetam esse negant, sed Tellurem in ejus locum reponunt: Solem vero in Ptolemaicum Telluris locum, nimirum Centrum totius mundi (subtilem illam differentiam Copernici non jam specto), utpote qui Telluri, Saturno, Jovi, Marti, Veneri & Mercurio sit causa circumeundi.

Rationes hujus dogmatis sunt hæc.

1. Quoniam tantus est numerus stellarum, quæ horis 24 circa Tellurem circuitum videntur perficere, & hæc apparentia per unius Telluris manentis in suo loco motum explicari potest, ideo magis rationi consentaneum est, hunc statuere, quam illud: sicut nobis in navi sedentibus, & appropinquantibus ad stationem multarum navium, quæ apparent nobis appropinquare, non ideo hæc motum ascribimus. Et omnino cum natura non solet facere per plura, quod per pauca potest, verisimile est, in hac quoque re illud observatum esse.

2. Quia incredibilis & omnem cogitationem superans celeritas, motus stellarum illius foret: Etenim cum infinito fere spatio à Tellure absint, & vastissimus orbis illis percurrendus sit, uno horæ minuto ad minimum per centena millia miliarium ferri deberent. Contra, si Telluri motus adscribatur hic primus, manet hæc in suo loco, neque de minima celeritate timendum est, quia circa suum axem rotatur.

3. Accedit argumento huic majus robur, si comparemus vastitatem corporum caelestium cum terrestri. Etenim cum Sol ad minimum ducentes major

major sit Tellure, stellæ vero fixæ vel millies majores, cui non verisimilius fiat, Tellurem circa suum axem motu naturali, quam tanta pora incredibili pernicitate de loco in locum veri?

4. Quoniam omnes Astronomi illustriores & Tychohe coacti apparentiis jam negant Orbiculos, quibus antiqui ad faciliorem stellarum motus hypothesein utebantur, ideo multo incredibilior videtur illarum circumlatio circa Tellurem. Negant autem orbiculos solidos, quia si hi essent, cedenda esset penetratio orbium mutua, cum eadem planetæ in alterius alicujus sphaera deprehendantur frequenter.

5. Nulla ratio reddi potest, cur stellæ circa Tellurem moveantur, cum contra, cur Terra & qui planetæ circa Solem cum reliquis planetis moveatur, aliqua possit dari ratio.

6. Quia nec polus, nec axis est realis circa stellæ ferri ponuntur: contra in Tellure & polus axis est.

7. Quia multo facilior est navigatio ab Occidente in Orientem, quam ab Oriente in Occidentem. Etenim ex Europa in Indiam navigatur mensibus circiter quatuor, ex India in Europam reditur mensium spatio circiter. Nimirum quia in illa navigatione in eandem plagam cum Tellure movetur: in hac vero in contrariam.

8. Quia omnes apparentiæ cœlestes, ortus, casus syderum, dierum incrementum, &c. possunt explicari, si Tellurem moveri ponamus. Inprimis autem hujus hypotheseis commoditas & necessitas conspicitur in admirandis illis Planetarum motionibus, ad quas explicandas Ptolomaici circulos Epicyclos & Eccentricos sine ulla excogitare coguntur: Copernicani autem Telluris motu secundo circa Solem facili

deducunt, & possunt retrogradum diutius

interdum narii esse possint numquam ginta ginta ginta quam o ejusdem Solem p

Plute præcipuum tum ma cum per tur, ut ad veretur

Hæc nicani Apodicticem reditum modum est.

Illæ vafferunt hæ: r. gravitate motu esse cont lapidem dem tur sus Orientis avis quæ hanc atti

deducunt ita, ut manifestam illarum causam reddant, & adeo facilem, ut vel indocti illam capere possint, nimirum 1. Cur planetae interdum retrogradi videantur, & quidem Saturnus saepius & diutius quam Jupiter, Jupiter quam Mars, &c. interdum celeriori motu ferri, interdum stationarii esse. 2. Cur Venus & Mercurius nunquam possint tota nocte conspicui esse. 3. Cur Venus nunquam majori à Sole intervallo, quam sexaginta graduum, Mercurius non majori, quam triginta graduum intervallo discedat, & ideo nunquam oppositi conspiciantur Soli. 4. Cur Venus ejusdem diei & vespere post Solem & mane ante Solem possit conspici.

Plures apparentias afferre supersedeo: sed illae praecipuae sunt, ex quibus ego existimo argumentum magni momenti peti hujus motus Telluris, cum per hunc adeo apposite & jucunde explicentur, ut admirandum potius esset, si Tellus non moveretur talibus apparentibus phaenomenis.

Haec sunt faciliora argumenta, quibus Copernicani Motum Telluris evincere volunt, quae etsi Apodictica non sint, tamen admodum probabilem reddunt hanc hypothesein praeter illa, quae caelum moveri ponit. Alterutrum enim admittendum est.

Illae vero rationes, quas quidam in contrarium afferunt, facili negotio dissolvuntur: sunt enim haec: 1. Terram esse ineptam ad motum propter gravitatem. 2. Partes telluris moveri naturaliter motu recto ad centrum, ideo circulaarem motum esse contra naturam ejus. 3. Si tellus moveretur, lapidem è turri demissum non posse cadere ad pedem turris. 4. Globum è tormento explosum versus Orientem ad metam aliquam (vel etiam si avis quaedam ad Orientem volaret), non posse hanc attingere, si meta cum tota Tellure versus



Orientem moveretur: vel saltem celeriore[m] s[er]vato  
 attactu[m], quam si ad Orientem emissus esset  
 globus. 5. Neque turres neque ædificia consistere  
 posse, sed propter illum Telluris motum collap-  
 sa esse, neque homines à vertigine immunes  
 esse. 6. Quia videmus, inquit, stellas mutare  
 locum, non autem Tellurem. 7. Quia tellus est  
 in centro mundi: centrum autem non movetur.  
 8. Quia Sacre literæ stabilitatem Telluris con-  
 firmant.

Etenim ad hæc Copernicani respondere solent  
 hunc in modum. Ad primum, negando totum  
 Tellurem gravem esse: namque gravitas est  
 in omni parte ad totum homogeneum tendentia: &  
 gravitas quoque in Lunæ partibus & Solis demum  
 est, neque tamen Luna vel Sol gravis dicitur.

Ad secundum dicunt, motum illum rectum  
 esse partium Telluris, non totius Telluris, atque  
 hujus circula[m] motum non impedire illam  
 rectilineam lationem, quod declaratur à partibus  
 Lunæ & Solis.

Ad tertium respondetur triplici modo. 1. In  
 primo enim gravia talia non ad centrum primi  
 feruntur ad ipsam Tellurem, & ideo brevissima  
 via ad superficiem ejus: brevissima autem  
 hæc, quæ turri respondet sicut ferrum non ad  
 centrum magnetis, sed ad magnetem tendit. 2. Tota  
 aër adhæret Telluri & cum hac movetur, ideo  
 etiam talia gravia demissa simul hunc circula[m]  
 motum acquirunt & moventur tanquam in  
 3. Cassendus crebra experientia demonstrat  
 quod si ex moto corpore aliquid projiciatur,  
 projectum etiam illo motu corporis movetur.  
 gr. lapidem dejectum è fastigio mali navis  
 rime motæ, tamen non relinqui à navi, sed ad  
 pedem mali decidere: Et è pede mali explosum  
 perpendiculariter è sclopeto globum, rursus per-

diculari-  
 valet.

Ad qu-  
 tertium

Ad qu-  
 bere,

pus imp-  
 & Tell-

vi. Ete-  
 mota,

sine flu-  
 & corp-

hil effu-  
 loci ste-

mutati-  
 situs m-

Tellure-  
 etiam &

In se-  
 est, vel

Ad  
 cram in-

tiam &  
 Sole dic-

lustranc-  
 gna sit,

lumen  
 terram.

mitate  
 talis ext-

buitur  
 lumnae

quidem  
 vulgus r-

ciunt ha-  
 losopha-

sunt. 2.

diculariter decidere. Itaque allata objectio nihil valet.

Ad quartum respondetur eodem modo, ut ad tertium.

Ad quintum dicimus tale quid locum non habere, quia motus est æquabilis, nec in aliud corpus impingit, & ædificia tanquam corpora gravia & Telluri homogenea moventur tanquam in navi. Etenim in navi celerrime etiam vel tardissime mota, si modo æquabilis sit navigatio, hoc est, sine fluctibus & aquâ planâ deprehendimus erecta corpora non everti, imo pocula vino plena nihil effundere. Ad sextum, dicimus mutationem loci stellarum non sentiri, sed situs respectu nostri mutationem deprehendimus: potest autem hæc situs mutatio animadverti & esse, sive nos cum Tellure sive nobis immotis stellæ moveantur, vel etiam & nos & stellæ.

In septima objectione & major & minor falsa est, vel saltem dubia.

Ad octavum respondetur, 1. Scripturam Sacram in rebus physicis loqui secundum apparentiam & vulgi captum, ex. gr. quando Luna cum Sole dicitur magnum luminare quod ad noctem illustrandam creatum sit, cum tamen nec Luna magna sit, respectu stellarum & telluris, nec proprium lumen habeat, neque omnibus noctibus illuminet terram. Ita Solem ab extremitate ire & ad extremitatem redire dicit Scriptura, cum tamen revera talis extremitas nulla sit. Ita in Jobi libro attribuitur Telluri figura plana & quadrata, cui columnæ sint suppositæ, quibus innitatur, quod quidem haudquaquam ita intelligendum esse, vel vulgus novit. Plura loca adduci possent: sed sufficiunt hæc. Namque sacræ literæ nobis non ad philosophandum sed ad pietatem colendam concessæ sunt. 2. Loca quædam Scripturæ adduci solent,

quæ non de immobilitate ejus, sed de constan-  
 & duratione loquuntur, ut locus ille quem e-  
 bō attulimus.

Ita paucis enarravimus, qualis sit motus, &  
 à Copernicanis Telluri ascribitur, cujus accu-  
 tior explicatio in Astronomia solet adhiberi. I-  
 autem supposito, applicanda erunt ad Tellure  
 omnia illa, quæ in circumrotato globo specta-  
 solent, nempe: Axis, circa quem rotatur, est  
 ex diametris: Poli, sunt extremitates axium  
 duo puncta, quæ non moventur: tertio circuli  
 maximus seu peripheria, juxta quam fit circum-  
 tatio, & ejus paralleli. Nunc de quantitate illius  
 motus seu celeritate videamus. Motus primus  
 quo circa suam axem Tellus convertitur, non  
 test in tota Tellure spectari, sed in diversis locis  
 diversus est, nempe quo locus Æquatori propius  
 est, eo majori celeritate & spatio movetur; quo  
 propius polo, eo tardius & minori spatio: motus  
 vero est in locis, quæ in Æquatore jacent.  
 Etenim quoniam viginti quatuor horis quilibet  
 telluris locus circumvolvitur per peripheriam  
 graduum spatium, nempe 360 gradus, ideo spatium  
 unius horæ invenitur, si 360 dividantur per 24  
 gradus enim est quindecim graduum: Hi gradus  
 quibus locus in Æquatore vel extra eum jacens  
 circumvolvitur in una hora: faciunt autem si in  
 Æquatore locus jacet, milliaria Germanica 22500  
 quatuor horæ minutis volvetur per unum gradum  
 hoc est, quindecim milliaria, & in uno hora mi-  
 to per  $3\frac{3}{4}$  milliaria,

Sed loca extra Æquatorem versus polum  
 utrumque jacentia, ejusdem horæ spatio per totum  
 quidem gradum sed multo minores rotantur, no-  
 rum eadem est ratio inter motus celeritates  
 inter duorum locorum, quæ est inter sinus arcuum  
 quibus illa loca à polo distant. Ex. gr. Amstel-

mi dist  
 gr. 23  
 37 mi  
 locum  
 90 gr  
 sub Æ  
 quinde  
 per rég  
 Ut  
 Vel  
 Itaq  
 ris fert  
 tis per  
 Sed  
 lam,  
 Quon  
 24 ho  
 bet lo  
 li, & i  
 nutis  
 poli v  
 bulam  
 data  
 positi  
 Stock  
 Tabul  
 gradui  
 quatu  
 milli  
 Tar  
 locis.  
 loco i  
 æqual  
 jus qu  
 der, &  
 lis die  
 dum, &

mi distantia ab Æquatore, seu Elevatio poli est 25 gr. 23 min. Itaque distantia à polo est 37 gr. 37 min. cujus sinus 61037. Sumamus alterum locum esse in Æquatore cujus distantia à polo est 90 graduum, hujus sinus 100000. Et vero locus sub Æquatore quatuor minutis horæ fertur per quindecim milliaria, & una hora per 225. Quare per regulam auream,

Ut 100000 ad 61037, ita 15 ad 9 milliaria.

Vel, ita 225 ad 135 milliaria,

Itaque Amstelodamum hoc motu singulis horis fertur per 135 milliaria, & quatuor horæ minutis per novem.

Sed multo facilius est hujus inventio per Tabulam, quam in precedentis capituli fine posuimus. Quoniam enim facta divisione 360 graduum per 24 horas, deprehendimus singulis horis quemlibet locum moveri per quindecim gradus sui circuli, & ideo per unum gradum moveri quatuor minutis horæ, ideo si cum loci propositi elevatione poli vel distantia ab Æquatore ingrediamur Tabulam illam, inveniemus ad gradus Elevationis datæ adscripta milliaria, quæ debentur motui propositi loci spatii quatuor horæ minorum. Ex. gr. Stockholmæ Elevatio poli est 60 gr. circiter. & in Tabula ad gradum 60, inveniò respondere uni gradui milliaria septem. Itaque dico Holmiam quatuor horæ minutis moveri vel gyrari per tot milliaria.

Tantus est motus primus spectatus in Telluris locis. Sed motus secundus est totius Telluris de loco in locum, & omnes partes seu loca moventur æquali celeritate & per æquales peripherias. Hujus quantitas ex Telluris à Sole distantia dependet, & perficitur integro anno, atque adeo singulis diebus Tellus perambulat unum circiter gradum, & in una hora duo minuta cum dimidio.



De Tertio Telluris motu, quoniam difficile  
 rem habet contemplationem, Astronomis age-  
 dum relinquo, quia in Astronomia ejus suppone-  
 di necessitas est. Origanus quidem de secundo Mo-  
 etiam controversiam movit, existimans primo  
 solum Telluri convenire, secundum autem soli  
 stellis fixis relinquendum esse: sed apparentie  
 motibus planetarum, quas antea attulimus, secun-  
 dum Telluris motum satis adstruunt.

### C A P U T VI.

#### *De situ seu loco Telluris respectu Pla- netarum & Stellarum.*

C Onsideratio situs Telluris in toto hoc Mu-  
 Systemate respectu reliquorum Planetarum  
 affinem habet contemplationem ei, quam de Mo-  
 tu Telluris in præced. cap. attulimus. Communis  
 enim sententia Philosophorum & Astronomorum  
 Ptolomaïcorum statuit, Tellurem occupare Cen-  
 trum hujus Universi, ita ut in medio sit omnia  
 stellarum & Planetarum. Copernicani vero et  
 antiquis Pythagoricis collocant Solem in centro  
 omnium stellarum, Tellurem vero tanquam pla-  
 netam inter Martem & Venerem constituunt, &  
 que annuo cursu circa Solem circumferri arbitran-  
 tur, quod ex diagrammate melius intelligitur.  
 In eo tamen duæ hæ discrepantes sententiae con-  
 veniunt, quod utraque fateretur, in Tellure esse  
 centrum motus illius primi, quo stellæ spatio  
 horarum circumferri nobis videntur. Hac enim  
 hypothese & Astronomia & Geographia indiget  
 ita ut siue Ptolomaïcam siue Pythagoricam sen-  
 tentiam sequaris, nihil ideo firmitati & certitudi-  
 ni vel Astronomiæ Generali, & Geographiæ detra-  
 dat. Differentia enim opinionum in hoc consistit

quod I  
 inesse,  
 cum ab  
 comm  
 Jux  
 stellas  
 Sol, M  
 Jux  
 matis  
 post eu  
 Jovis,  
 Si q  
 istente  
 unam  
 lis die  
 stanti  
 Maxi  
 netis j  
 A I  
 A M  
 A V  
 A S  
 A  
 A J  
 A S  
 Veru  
 vis, S  
 sectur  
 stanti  
 sed er  
 Ra  
 miru  
 dem  
 Motu  
 habet  
 dum  
 non S

quod Ptolomaïci motum hunc ipsis stellis volunt inesse, Pythagorici quiescentibus stellis Tellurium assignant; quorum neutrum vel Astronomiæ communi vel Geographiæ necesse est statuere.

Juxta Ptolomaïcos situs Telluris ad planetas & stellas fixas est hic, Tellus, Luna, Mercurius, Venus, Sol, Mars, Jupiter, Saturnus, Stellæ fixæ.

Juxta Copernicanos talis: Sol in medio Systematis mundi tanquam Cor & focus collocatus est, post eum Orbita Mercurii, Veneris, Telluris, Martis, Jovis, Saturni, Stellarum fixarum.

Si quæras, quantum Tellus & nos in Tellure existentes distemus à Planetis, sciendum est, non esse unam & eandem perpetuo distantiam, sed singulis diebus mutari, & propterea Astronomi tres distantiarum gradus recensent, Minimam, Mediam, Maximam. Media distantia Telluris à reliquis Planetis juxta plurimos Astronomos est hæc:

A Luna distat semidiametris suis 60.

A Mercurio 110.

A Venere 700.

A Sole 1150.

A Marte 5000 circiter.

A Jove 11000 circiter.

A Saturno 18000.

Verumenimvero omnino incerta est Martis, Jovis, Saturni & stellarum fixarum distantia, ob defectum parallaxis. In Copernicana Hypothesi distantia variatur non tantum à Planetarum motu, sed etiam à motu ipsius Telluris.

Rationes utriusque sententiæ, Ptolomaicæ nimirum & Copernicæ, de situ Telluris sunt eadem fere cum eis, quas in præcedenti capite de Motu Telluris attulimus: cum hoc enim magnam habet affinitatem hæc disputatio. Si enim secundum motum, qui proprius dicitur, Soli tribuas, non Sol sed Tellus erit in medio: si vero Telluri,

non Tellus sed Sol in medio erit. Pro Copernicorum nimirum sententia adduci possunt hæc :

1. Sol non tantum fons lucis est, quæ tanquam clarissima fax illuminat Tellurem, Lunam, Venerem & reliquos sine dubio planetas, sed etiam fons caloris & Vitalis Spiritus quo totum hoc universum fovetur & sustentari videtur. Ideo medium locum omnium obtinere, & hos circa eum moveri probabiliter.

2. Verisimilins est Tellurem circa Solem moveri ut cum reliquis Planetis ab eo lumen & calorem accipiat; quam Solem circa Tellurem ferri, cum ab hac nihil accipiat.

3. Sole collocato in medio, redditur alia causa, quare reliqui planetæ & tellus circa eum ferantur, nimirum quia Sol vastissimum corpus & magnis viribus præditum, ideo reliquos Planetas ad motum excitat. Et imprimis hæc ratio cum habet, si Kepleri hypotheses de motibus Planetarum amplectamur.

4. Solem circa axem suum rotari probant observationes Galilæi & Scheineri de Maculis Solaribus. Hac igitur ratione reliquis planetis circueundi causa existit, nec videtur ei alius motus tribuendus.

5. Si Telluri locum inter Martem & Venerem Soli vero centrum attribuamus, apte respondeat motus singulorum planetarum distantia à centro, quod in Ptolomaica hypothesi non fieri potest ex Motuum Solis, Veneris & Mercurii consideratione.

6. Apparentiæ illæ cœlestes, quibus in præcedente capite ad Motum Telluris secundum probandum usi sumus, valent quoque ad locum hunc, quem dixi, Telluri attribuendum, nimirum retrogradum planetarum cursum, statio, Veneris & Mercurii mirabiles apparentes motus, &c. Etenim motus

ille secundum  
rum primum  
habet.  
iudicio  
motu  
potest  
test, si  
statuit.

7. Si  
distantia  
Aristoteli  
goricorum  
Telluri  
sæpe rati  
mundi  
itaque  
discedere  
re hoc e  
bilissim  
Univer  
lus esse  
tunc si  
tempor  
aliis. 5  
foret, 1  
6. Neque  
psata or  
gradibus  
milliari

Ratio  
opera di  
quoniam  
verbi, si  
tibus Lu  
tio falsa  
que & c  
ignobili

ille secundus Telluris, hunc Telluris locum & situm præsupponit, vel proxime sibi conjunctum habet. Est vero hoc argumentum meo quidem iudicio præcipuum. Ex primo autem Telluris motu nihil pro situ Telluris colligendo desumi potest: namque Tellus in centro Mundi esse potest, si absque secundo esset, ut etiam Origanus statuit.

7. Sic quoque commode explicatur variatio distantiarum planetarum à Tellure. Verum enim vero Aristotelici cum Ptolomaicis sententiam Pythagoricorum pluribus impugnant argumentis, & Telluri centrum pro loco vindicare conantur hisce rationibus. 1. Gravia feruntur ad centrum mundi. Tellus autem gravissimum corpus est: itaque centrum illud occupat. 2. Gravia à Tellure discederent versus centrum universi, nisi in Tellure hoc centrum esset. 3. Centrum est locus ignobilissimus, & Tellus etiam parsignobilis hujus Universi: Itaque centrum occupabit. 4. Si Tellus esset extra mundi & stellarum motus centrum, tunc stellæ & constellationes quibusdam anni temporibus & diebus viderentur majores, quam alii. 5. Neque media cœli pars semper conspicua foret, ut oriente Tauro, occideret Scorpius, &c. 6. Neque æquinoctia forent, 7. Neque Luna eclipsata oriente Sol occideret, &c. 8. Neque singulis gradibus in cœlo in Tellure responderet æqualis milliarium numerus.

Rationes has Aristotelicas Copernicani facili opera diluunt. Prima enim & secunda refellitur, quoniam gravium motus non ad centrum universi, sed ad corpus homogeneum est, ut ex partibus Lunæ, Solis, Magnetis probatur. Tertia ratio falsam assumit Majorem & Minorem. Namque & centrum nobilis locus est, & Tellus non ignobilis. Reliquæ rationes refutantur facile per



Diagrammata, hoc saltem præsupposito, Telluris à Sole seu Centro distantiam, utut magna sit, tamen si ad stellarum fixarum distantiam à Sole comparetur, tam parvam esse, ut nullam ad eam proportionem habeat: hoc autem videtur nonnullis magnum postulatum in Astronomia Copernicana.

Cæterum ad hunc locum pertinet explicatio theorematis, distantiam stellarum fixarum & superiorum planetarum, Martis, Jovis & Saturni, ut tam esse à Tellure, ut semidiameter Telluris ad eam habeat ad eam proportionem: Lunæ vero, Mercurii & Jovis distantiam tantam non esse à Sole dubium est adhuc: certe si quæ est semidiameter Telluris ad distantiam Telluris à Sole proportio, ea admodum exilis erit.

Probatur autem theoremata ita. 1. Stellæ fixæ & planetæ superiores eodem momento orientibus apparent, quo per supputationem factam orientibus apparent, si in centro Telluris constituti essemus. Itaque distantia nostri loci à centro Telluris hoc est semidiameter ad distantiam fixarum stellarum habet proportionem. 2. Si stellæ fixæ vel superiorum planetarum altitudinem meridiana vel aliam Instrumento capiamus, deprehendimus eandem, ac si in centro Telluris eam observassemus; itaque semidiameter Telluris evanescit respectu istius distantiae. 3. Si aliqua esset proportio, tunc distantia duarum stellarum minor deprehenderetur circa Horizontem, quam circa Meridianum, quia in hoc situ propiores sunt Telluris à semidiametro Telluris.

Idem de Sole valet, namque illius diameter à Meridiano deprehenditur major in Meridiano, quam cum in Horizonte est.

Lunæ vero diameter in Meridiano observatur paulo major, quam cum in Horizonte est. Ita

in Mer  
nempe t

De

Con  
qua  
propriet  
tiz seu  
contem  
quomo  
etfi mag  
perfecta  
de eo ag  
co relin

Ex qu  
lus conste

Diver

niones.

& totiu

jam not

Multi e

statueba

particuli

gnitudin

sequunt

talem n

explicar

Chyn

& Merc

recte ad

sepositis

sis quinc

nampe

in Meridiano aliquantulum propior est nobis, nempe una fere semidiametro Telluris.

## CAPUT VII.

*De telluris substantia & constitutione.*

Consideravimus in precedentibus capitibus quatuor generales Telluris affectiones seu proprietates, nulla habita ratione ipsius substantiæ seu essentiæ. Hanc vero illis explicatis jam contemplari convenit, ut quale corpus sit Terra, quomodo partes ejus cohzreant, sciamus: quod etsi magis Physicum videatur, tamen quoniam ad perfectam Telluris cognitionem requiritur, paucis de eo agemus, accuratam hujusce theoriæ Physico relinquentes.

## PROPOSITIO I.

*Ex quibus corporibus simplicibus & similaribus Tellus constet sive composita sit, exponere.*

Diversæ sunt super hac re Philosophorum opiniones. Peripatetici quatuor numerant Telluris & totius sublunaris Orbis elementa, vulgo satis jam nota, Ignem, Aërem, Aquam & Terram. Multi ex veteribus, ut Democritus, Leucippus, statuebant, totum mundum constare ex minimis particulis solidis, quæ tantum variis figuris & magnitudine differant: eosdem multi è recentioribus sequuntur, & nuper Cartesius conatus est juxta talem hypothesein omnia naturalia phænomena explicare.

Chymici tria ponunt principia, Solem, Sulphur & Mercurium, quibus Caput Mortuum quidam recte addunt, cum tria illa sint foecunda. Mihi sepositis ambiguis vocabulis & rebus bene expensis quinque videntur esse prima simplicia corpora, nempe, Aqua, Oleum seu Sulphur, Sal, Terra &

Spiritus quidam, quem acidum nonnulli appellant, sive is sit Mercurius Chymicorum. Etenim omnia corpora & partes Telluris resolvuntur quinque illas elementares substantias. Nonnomen negaverim, illas ipsas non tam essentia interna, quam singulari figurarum & magnitudinis varietate differre.

Ex hisce proinde corporibus tota Tellus constat quæ multis modis commixta sunt, unde tantæ corporum varietas existit, quæ diversa à se invicem & similia apparent. Verum de hisce accurata explicatio ad Physicam pertinet, ubi plenius quando ista tractabimus.

### PROPOSITIO II.

*Tellus dividitur in partem siccam & liquidam, in Terram & Aquam, quibus alii atmospharam jungunt.*

Vulgaris hæc est Geographorum divisio, & dicitur tunc Aqua in lata significatione pro eo liquido seu fluido, sicut Terra pro tota sicca consistente Telluris parte, adeoque varia & diversa naturæ corpora complectitur, nempe ad Terram referuntur hæc: 1. Arena, sabulum, argilla & terræ minerales, Creta, Cinnabaris, Ochra, Terra Lemnia, Samia, Armenia & alia multa species. 2. Lapides, quorum magna est varietas. 3. Metalla, Aurum, Argentum, Æs, Stannum, Plumbum, Mercurius seu argentum vivum: 4. Terræ metallicæ, aureæ, argenteæ, &c. 5. Sulphur, Saliæ, Nitrum, Alumen, Bitumen, Vitriolum, & timonium, 6. Herbae & animalia.

Ad aquam referuntur 1. Maria & Oceanus. 2. Fluvii & aqua dulcis. 3. Lacus, paludes. 4. Aquæ minerales, ut thermæ, acidulæ, &c.

Atmosphæra est subtile illud corpus, quod Tellurem cingit versus cælum, & complectitur

rem, n  
Tellus

Quæ  
Situatio

1.

& æqu

bet cav

bus,

tur, e

pars su

& emi

bili ca

elevat

fas vo

habet

alia p

pressæ

lurem

partes

dam m

2.

veum

que in

recessu

vesta r

nempe

jungunt

amnes

& fun

oculis

to terr

prohib

aliquo

tos me

tes in i

rem, nubes, pluvias, &c. In has itaque tres partes Tellus commode dividitur.

## PROPOSITIO III.

*Quomodo terra & aqua cohaerant & Tellurem constituent, exponere.*

1. Terra, hoc est sicca Telluris pars, non una & æquabili superficie terminatur, sed multas habet cavitates, multas elevatas partes. In cavitatibus, quæ circa totam terram hinc inde reperiuntur, continetur mare seu Oceanus, atque ideo pars superficiei terrestris tegitur aquis, pars extat & eminent supra aquas. Ipsæ cavitates non æquabili cavitata factæ sunt, sed hinc inde scopulos & elevatas partes habent, alicubi admodum depressas voragines. Ita pars terræ extans supra aquas habet quosdam quasi umbilicos in medio sui, & aliæ partes alijs magis vel minus elevatæ seu depressæ sunt. Ita fit, ut aqua ambiens totam Tellurem impediatur, ne totam terram obtegat, sed partes altiores & extantes sint insulæ, quarum quædam magnæ, quædam parvæ.

2. Præter illam continuam cavitatem seu alveum in Terra in exteriori superficie, intus quoque in soliditate Terræ existunt innumeri hiatus, recessus, anfractus, cuniculi, voragines, tubuli, vasta receptacula, in quorum quibusdam mare est, nempe quæ alveo maris per aliquam viam conjunguntur, in quibusdam aqua dulcis, fluvii, amnes; in quibusdam spiritus vel etiam sulphurea & fumans substantia. Recte Seneca: Nimis ille oculis permittit, qui non credit esse in abscondito terræ sinus maris vasti. Nec enim video, quid prohibeat vel obster, quo minus illic habeatur aliquod etiam in abscondito littus, & per occultos meatus receptum mare. Multas itaque cavitates in ipsa solida terra existere, non est quod du-



- bitemus. Etenim id conjicimus ex hisce. 1. In fluviis, qui reperiuntur in multis locis, ubi ad signem profunditatem effoditur terra, quod in finibus dinis frequens est. 2. In nonnullis locis immensa est maris profunditas. 3. Specus aliquot finibus in terra. In Occidentali parte insulæ Hispaniæ mons est visendæ altitudinis, multis intus cavitatibus specubus, in quibus tanto sonitu, tantis aquarum fragoribus præcipitantur fluvii, ut ad quinque milliaria procul ea ruina exaudiatur. 4. Voragine quædam in mari reperiuntur, quas vocant *Maelstrom*. 5. Terræ motus etiam probant subterraneorum cavitatum existentiam. 6. Flavii quidam sub terram se condunt, ut Niger, Tigris, &c. 7. Fontes salsi qui sine dubio (maxima saltem parte) à mari fluunt, reperiuntur in multis locis. 8. In multis locis terræ ad ambulantium ingressum tremunt, ut circa fanum *S. Omer in Belgio*, & in agro *Brabantino (die Peel)*.

## COROLLARIUM.

Ex hisce itaque patet, falsam esse veterum quorundam Philosphorum sententiam, qui totam terram aquæ innatare defenderunt. Sic enim nulli essent maris alvei, sed ubique immensa est profunditas. Ex antiquis Philosphis quidam eam dicuntur fovisse opinionem (ut Democritus ascribitur) quod aqua olim Terræ fuerit commixta, ita ut tota Tellus mollis esset, medianaque inter siccum & liquidum haberet naturam sive consistentiam atque figuram perfecte rotundam, sive sphericam: deinde vero aqueas particulas paulatim coivisse in unum corpus propria naturalem conjunctionis proprietatem, quæ ab aqua deprehenditur: atque tunc terrestres particulas a se collapsas esse & condensatas factosque ab aqua alveos esse inter terras hinc inde

de. Ea  
lophi  
ipius  
à Mose  
aqua i  
res pri  
hoc fen  
fuisse s  
ca tota  
ita in r  
bis illi  
terras  
singula  
coercer  
que pr  
rum &  
sine su  
culum  
ostend  
omnes  
stentia  
rum va  
illas te  
que hi  
Neque  
tea ad  
terræ i  
potius  
tam te  
quear  
motui  
pter no  
rere: a  
pe qua  
plicand  
ad mir

de. Eandem opinionem plurimi Christiani Philosophi moderni defendunt, & ita Mosis vel potius ipsius Dei ter opt. max. in prima creatione verba à Mose allata intelligenda censent: *Congregentur aqua in locum unum, & appareat arida.* Sed Doctores primitivæ Ecclesiæ sive Patres plerique aliter de hoc sentiunt. Opinantur enim, Aquas jam tum fuisse separatas à partibus terrestribus, verum circa totam terram extitisse sive terram texisse, atque ita in naturali suo loco fuisse. Deinde autem verbis illis Jehovæ miraculose aquam recessisse & terras detectas fuisse, & in hunc usque diem per singularem Dei providentiam aquas impediri vel coerceri, quo minus terras iterum tegant, adeoque pro miraculo habendam censent hanc terrarum & Oceani constitutionem. Verum etiam vero sine sufficienti causa hac in materia eos ad miraculum confugere, probabimus capite XVIII, ubi ostendemus, quod aquæ sive Oceani inundatio in omnes terras prohibeatur ab altitudine & consistencia terrarum, quæ si à causis quibusdam, quarum variæ sunt, tollatur, non cessat Oceanus in illas terras invadere, atque eas obtegere. Est itaque hic causa manifesta, neque miraculo opus est. Neque antiquorum Philosophorum sententia antea adducta difficultate caret, nimirum si aqua terræ ita commixta fuit in unam massam, cur non potius terrestres partes subsiderint, & sic aqua totam terram texerit: illi hoc fortuitæ partium aquearum, ut etiam terrestrium, conjunctioni & motui ascripserunt. Hæc obiter dicta sunt propter nonnullos, qui de hisce ansie solent inquirere: ad Geographiam enim non pertinent, quippe quæ nec veterum opiniones curat, nec in explicandis Telluris proprietatibus confugere debet ad miracula.

## PROPOSITIO IV.

*Terrarum superficies continua est, aquarum item.*

Etenim superficies terræ extantis continua alveorum maris superficiei, & hæc aliis extantibus terræ partibus. Ita quoque Oceani & fluviorum una est continua superficies, non omnium aquarum, quia lacus quidam sunt qui cum Oceano non conjunguntur superficiei, ut Parime lacus, Caspium mare.

## PROPOSITIO V.

*Quomodo Telluris partes, quæ à superficie, hæc nostra habitations sunt remota versus centrum, constituta sint, incertum est.*

Quidam existimant, aquam esse circa Telluris centrum in imo. sed verisimile magis est, terram eum occupare locum. Gilbertus Anglus opinatur Telluris corpus intus nil aliud esse, nisi durum magnetem, illas vero partes, ad quas homines fodiendo perveniunt, & in quibus herbarum sunt, & nos vivimus, esse tanquam corticem crustam Telluris, in qua continuè generantur & corruptiones fiunt. Non multum diversè Cartesii sententia, qui existimat, tres regiones versæ substantiæ in Telluris corpore esse. Intima circa centrum ejus, secundam densam & opacam ex particulis minutissimis, tertiam, in qua homines occupantur, ex particulis minus coherensibus.

Verum enim vero de hac re vix quicquam asserte asseverare licet. In plurimis subterraneis locis ignem gliscere & fumos à sulphure elevari, manifestum est ex thermis. Thurnheuserus affirmat experientia se edoctum esse, quod in fodinis

minus a  
sive cent  
ticulari e  
aliquid a

Confiss  
Artifi  
quod in  
& eo pl  
eis oleo  
rerum c  
ex lapid  
rissimos  
amplius  
ritiem r

Terra  
in Tellu  
Ita in  
gentæ,  
sejunctæ  
li terra r  
non prin  
artifices  
tur. Eo  
limo, si  
puteum  
centoru  
tem, hæc  
terra pe  
apta, qu  
tes prop  
lis nove  
cem, ter  
mus An

minus aqua deprehendantur, quo profundiores sive centro Telluris propiores sunt. Verum ex particulari ejus observatione non existimo satis tuto aliquid asseverandum esse.

## PROPOSITIO VI.

*Consistentia Terra & coherentia est à sale.*

Artificiose resolutio partium terræ ostendit, quod in omnibus reperiat quædam salis species, & eo plus, quo est durius corpus, (exceptis paucis oleosis) ut in metallis, petris, &c. Et omnium rerum concretionem à sale esse, manifestum est ex lapidibus, quos arte efficere possumus è Sale durissimos. Quod si à terra separet Salem, non illa amplius coheret. Sed pulvis erit, neque ad duritiam reduci potest sine Salis admixtione.

## PROPOSITIO VII.

*Terrarum species variis modis inter se commixtae sunt in Tellure.*

Ita in fodinis reperiuntur particulæ aureæ, argenteæ, plumbeæ, &c. non coacervatæ & ab aliis sejunctæ, sed tum inter se invicem, tum cum inutili terra mixtæ, secundum minimas particulas, ut non primo aspectu sed aliis indiciis deprehendant artifices, quid in quavis metallica terra contineatur. Eodem modo in agris miscetur arena argillæ, limo, sali, &c. Cum Amstelodami aliquando ad pureum faciendum effoderetur terra usque ad ducentorum & triginta duorum pedum profunditatem, hæc species terrarum oblatae sunt. Hortensis terræ pedes septem, nigræ ad ignem nutriendum aptæ, quam vocant Torff (neque enim sunt caspites proprie loquendo) pedes novem, argillæ molliis novem, arenæ octo, terræ quatuor, argillæ decem, terræ quatuor, arenæ, super qua solent domus Amstelodamenses fistulari, pedes decem, argillæ



argillæ duo, sabulonis albi quatuor, siccae quinque, turbidæ unus, arenæ quatuordecim, gillæ arenariæ tres, arenæ cum argilla mixtæ quæ, arenæ marinis conchulis mixtæ quatuor, inde fundus argillæ ad centum & duorum pedum profunditatem, denique sabulo triginta pedum unius, ubi fossio desinit.

PROPOSITIO VIII.

*Cavitates terra, & tam externa quam interna dispositio & partium situs non sunt perpetuo eadem diversis temporibus diversa.*

Etenim non tantum aqua maris varias mutationes & ruinas in terræ partibus efficit, & quædam foramina obstruuntur, quædam liberæ redduntur, sed etiam spiritus & sulphureæ substantiæ in terra hinc inde latitantes cum gliscere incipiunt & in vapores resolvi, impetuosè partes commovent & protrudunt, ut ex terræ motibus manifestum est. Et verisimile est in interioribus Terræ partibus similes fieri motus quorum maxime partem nos non sentiamus.

De mutua vero aquæ & terræ mutatione in superficie Telluris dicemus capite XVIII.

1. IN MAGNAS CONTINENTES sive Maximas Insulas, quarum quatuor numerantur à nobis.

1. VETUS ORBIS, cujus partes.

Europa. Termini hujus  
Asia. Continentis  
Africa. sunt

A Septentr. Mare Boreale, glaciale & Tartar.  
Ab Oriente, Pacificum & Indicum.  
Ab Austro, Australe.  
Ab Occidente, Atlanticum.

2. NOVUS ORBIS, seu AMERICA, cujus partes

Septentrionalis & Meridionalis. Termini hujus sunt

A Septentr. Frerum Davis.  
Ab Oriente, mare Atlanticum.  
Ab Austro, Frerum Magellanicum.  
Ab Occidente, mare Pacificum.

3. TERRA POLARIS SEPTENTRIONALIS, sive Groenlandia. Cingitur undique mari & fretis.  
4. TERRA AUSTRALIS seu Magellanica incognita.

2. PENINSULAS seu CHERSONESOS, quarum sunt Continentium illarum partes.

Rotundas, quarum latitudo & longitudo sunt æquales circiter.

Africa ipsa.  
Peloponnesus seu Morea, Chersonesus Græcia.  
Chersonesus Taurica, seu Tartaria Pzrecopensis.  
Cambaia.

Oblongas, quarum multæ sunt:

1. Chersonesus aurea seu Malacca, adhærens Indiæ.  
2. Cimbrica, sive Jutlandia, adhærens Holsatiæ.  
3. Corea, adhærens Tartariæ.  
4. 5. Partes Americæ Septen. & Merid.  
6. California.  
7. Jucataa.  
8. Chersonesus Thraciæ.  
9. Nova Francia.  
10. Ionia, Cnidensis, Myndensis.

Affines peninsulis sunt

Italia, Græcia, Achaia in specie.  
Hispania, Asia minor, Arabia.  
Norwegia cum Suecia & Lappia.  
Beach regio Magellanica, & nova Guinea.  
Indostanis regna. Cochinchina.  
Nova Britannia in America.  
Monomotapa, &c. Cambaia.

TELLUS dividitur in TERRAM & AQUAM.

TERRÆ autem extantis Superficies per Maris interfluxum distinguitur in partes hæc quatuor

3. INSULAS, quarum facio tres classes.

Magnas novem:

Britannia.  
Japonia.  
Islandia.  
Canadensis.  
Sumatra.  
Madagascar.  
Borneo.  
Nova Zembla.  
California.

Mediocris tredecim:

Sicilia.  
Hibernia.  
Hispaniola.  
Cuba.  
Java major.  
Celebes.  
Creta.  
Luconia.  
Sardinia.  
Frislandia.  
Terra nova circa novam Fanciam.  
Midanao. Ceilanum.

Parvas novem:

Gilolo, Amboina, Timor, jacent inter Indicas Insulas.  
Corfica, Majorca, Cyprus, Negroponte, jacent in mari Mediterraneo.  
Seelandia Daniæ, Jamaica in sinu Mexicano.

Minimas, quarum consideramus,


1. Celebriores solitarias, Rhodus, Malta, Lemnos, S. Helena, D. Thomæ, Madera, &c.  
2. Congeries, sive quæ magno numero in mari jacent sibi valde vicinæ,  
Canaria.  
Flandriæ.  
Hesperides.  
Sinus Mexicani.  
Makdiva.  
Circa Madagascar.  
Moluccæ & Bandanæ.  
Philippinæ.  
Japoniæ.  
Insulæ Istruncolorum Maris Ægel.  
Circa Britanniam.  
Insulæ Salomonis.

4. ISTRMOS

Inter Ægyptum & Arabiam, sive Asiæ & Asiæ.  
Corinthiacus inter Peloponnesum & Achajam.  
Isthmus Panamensis seu Americanus longissimus omnium.  
Inter Jutlandiam & Holsatiam.  
Inter Malaccam & Indiam, &c.

hinc hæc





## SECTIO TERTIA.

## GEOGRAPHIÆ ABSOLUTÆ.

*In qua capitibus quatuor explicatur constitutio Terra, sive sicca partu Telluris.*

## CAPUT VIII.

*De divisione partium Terra naturali, facta ab Oceano circumfluente.*

Quæ hoc capite de Terræ Divisione & capite xv de Maris divisione trademus, ea magnopere juvabunt adolescentes ad comprehendendam & memoriæ infigendam superficiem Telluris partiumque distinctionem, & situm, atque ideo attente sunt perlegenda & cum globo Terrestri & Mappis conferenda. Diximus capite præcedenti, quod Tellus dividatur, quantum ad substantiam sive materiam, in partes duas, Aquam & Terram, sive Fluidum & Consistens, quibus Atmosphæram tanquam corticem vel tegumentum adjunximus. Primo itaque loco de parte consistente, nempe Terra, dicemus.

## PROPOSITIO I.

*Terra quadam portio tegitur aqua, quadam portio extat supra aqua superficiem, atque ab aqua cingitur.*

Veritas hujus Propositionis manifesta est per experientiam. Sunt tamen quædam partes terræ, quæ aliquo tempore aquis teguntur, aliquo ab eis liberæ sunt & conspicuæ, ut insulæ multæ ad Norwegiam, Scotiam atque alias regiones: adde hisce pulvinos & littora. Verum cum adeo parvæ sint hæ partes, non habemus earum rationem in præ-



praesentia. Neque illam quaestionem hic tractamus: Utrum majorem superficiei Telluris occupet Terra, an Aqua? De hac capite paucis agemus. Nunc partem extantem considerabimus, eamque absolute appellabimus Terras vel Insulas.

PROPOSITIO II.

*Terra extans supra aquas non est una & continua sed multa à se invicem per interfluentem aquam juncta.*

Faciemus earum differentias quinque, nempe Terras sive Insulas Maximas, Magnas, Medias, Parvas, Minimās.

De causa & origine harum terrarum extansium sive insularum agemus cap. xviii. quia ibi commodior locus est de hac materia agendi.

Ceterum omnes terrae extantes appellabuntur insulae, cum insula nihil aliud sit quam terra ab aquis cincta: usus tamen loquendi magis terris vocabulum hoc sive appellationem adeo propterea quod adeo magis sint & vasti tractus ut minus sensibilis sit aquae circuitus. Adeo illae solent vocari Terra firma, itemque Continentes magnae. Et sane propter ingentem magnitudinem ad quam reliquarum insularum magnitudo comparata exigua est, peculiare nomen meretur ideo nos quoque eas appellabimus Terras firmas & magnas Continentes. Alia tamen est significatio, in qua vulgo & frequenter usurpatur vocabulum Continentis Terrae. Sumitur enim 1. sive, pro parte Terrae quam ex nullo latere mare alluit. 2. latius, pro parte terrae, quae ab uno latere à mari alluitur, sed ab altera parte adhuc aliis terris lato tractu. 3. generaliter & latius pro terrae parte adhaerente alteri utcunque, nec lato vel angusto tractu. Haec significationes discuntur

sunt ab  
nentes

Terr

Contine

sive T

1.

sive

ARC

4. T

L AN

VE

mus

mus,

Isthm

Europ

in me

A

mare

Ab

mare

Ab

picus

Al

del N

Di

mus

sive

Arab

inter

tacin

ceret

auge

M

tem

do h

hic mo-  
eiluris pe-  
capite in  
ntem con-  
imus Te-  
sant ab ea, qua maxima insula dicuntur Conti-  
nentes.

## PROPOSITIO III.

*Terra maxima sive Insula maxima aut Magna  
Continentes (de appellatione cum nemine certabo)  
sive Terra firma sunt quatuor.*

1. VETUS ORBIS. 2. NOVUS ORBIS,  
sive AMERICA. 3. TERRA POLARIS  
ARCTICA sive ORBIS ARCTICUS.  
4. TERRA AUSTRALIS sive MAGEL-  
LANICA.

VETUS ORBIS ex quatuor illis celeberrimus & solus antiquis cognitus, quem nos incolimus, dividetur fere in Mari in duas partes parvo Isthmo junctas, quarum una est Africa, alteram Europa & Asia faciunt. Cingitur ab Oceano hunc in modum:

- A Septentrione est mare glaciale, Septentrionale, mare album, Oceanus Tartaricus.

- Ab Oriente Oceanus est Chinensis & Pacificum mare.

- Ab Austro Oceanus Indicus, Australis & Æthiopicus.

- Ab Occidente mare Atlanticum jacet, dictum del Nort.

Divisionem hujus Continentis, de qua diximus, faciunt Mare Mediterraneum & Arabicum sive rubrum mare; vel sinus Mediterraneus & Arabicus. Distantia enim sinuum, hoc est latitudo intercedentis tractus non est major quam triginta circiter milliarium, qui si abesset, Africa faceret peculiarem Terram firmam & numerum augetet.

Minimo intervallo Vetus Orbis versus Orientem distat ab America circa fretum Anian, si modo hoc existit. Europæ autem ab America minima distan-

distantia est inter Norwegiam & Terram  
Americæ Septentrionalis.

A terra polari Arctica Vetus Orbis minimo  
tervallo abest circa fretum Waigats. Ab Australi  
sive Magellanica circa Novam Guineam.

NOVUS ORBIS, sive AMERICA  
cingitur ab Oceano.

A Septentrione Mare est incognitum, imo  
certum, præter fretum Davis.

Ab Oriente est mare Atlanticum.

Ab Austro est fretum Magellanicum.

Ab Occidente est mare Pacificum.

Hic quoque Orbis parum abest, quin in duas  
fulas sit sectus, nimirum ad Panamam & Nombro  
Dios, ubi exiguo terræ tractu prohibetur confusio  
Oceani Pacifici & Atlantici.

Distat minimo intervallo à Vetere Orbe  
fretum Anian. A terra polari Arctica, circa  
fretum Davis. Ab Australi, circa Magellanicum  
fretum.

TERRA POLARIS ARCTICA & AUSTRALIS  
undique mari cinguntur, illa  
Septentrionali, cujus partes sunt fretum Davis, Waigats,  
Anian: hæc mari Australi, Pacifico, Indico  
fretum Magellanicum.

POLARIS Arctica à Veteri Orbe minimo  
habet intervallum ad fretum Waigats: ab Ameri  
ca ad fretum Davis. Ab Australi terra ingenti re  
vetur spatio.

POLARIS AUSTRALIS, sive potius Terra  
Australis maxime vicina est Veteri Orbi ad No  
vam Guineæ procurrentem tractum: America  
Novo Orbi ad fretum Magellanicum.

Cæterum de sola hac Australi certo exploratam  
habemus, quod mari undique cingatur & à reli  
quis separetur: de tribus reliquis, nempe Orbe  
Veteri, America & Orbe Arctico, nondum omni

no cer  
& à se  
verifin  
curren  
circu  
licuit.  
Waiga  
Occid  
adeo  
strand  
pta pa  
incert  
quatu  
explic

In  
cem,

1.  
glian  
insul  
quas  
cet in  
& G  
oblo

2.  
nore  
bat:  
esse  
in O  
Cing  
tum

3.  
Man  
Orie  
eam  
veru

certa res est, utrum undique mari cingantur & à se invicem separentur: admodum tamen est verisimile propter varios Oceani intra terram procurrentes sinus & fretorum initia. Sola Australis circumnavigata est hætenus, in reliquis nondum licuit. Vetus enim Orbis nondum ultra fretum Waigats circumnavigatus est, etsi totum littus Occidentale, Australe & Orientale sit lustratum, adeoque exigua Septentrionalis littoris pars lustranda restet. America circumnavigata est excepta parte littoris Septentrionalis, propter fretorum incertitudinem, vel difficultates. Sic itaque situm quatuor maximarum insularum sive continentium explicavimus.

## PROPOSITO IV.

*Insulas magnas in Telluris superficie numeramus decem, quæ sunt*

1. BRITANNIA, comprehendens Angliam & Scotiam, censetur maxima ex omnibus insulis, quæ vulgo ita appellantur, exclusis illis, quas præcedenti Propositione enumeravimus. Jacet inter Europam & Americam, vicina est Belgio & Gallia: cingitur à mari Atlantico. Forma est oblonga.

2. JAPONIA, quæ in Mappis & globis minorem habet magnitudinem, quam habere debebat: qui enim istic fuerunt, asserunt majorem esse vel saltem non minorem ipsa Britannia. Jacet in Orientali termino Asia, non procul à China. Cingitur ab Oceano Pacifico. Forma est aliquantum oblonga & curva.

3. LUCONIA, quæ etiam à Metropoli dicitur Manilha, est una ex Philippinis, quæ ultimæ sunt Orientalium insularum in Asia termino. Sunt qui eam majorem esse volunt, quam Britannia est; verum qui ibi fuerunt, minorem esse dicunt. Cingitur



gitur ab Oceano Pacifico, sive Orientali. Forma oblonga cum multis curvaturis.

4. MADAGASCAR, sive insula S. Laurentii, jacet ad Orientale litus Africae, non prope faucibus rubri maris & ab Arabia littoribus. Cingitur ab Oceano Indico, quoniam totum materter Africam & Indiam hodie appellatur Indica. Forma est oblonga.

5. SUMATRA, quam quidam Geographi immerito veterum TAPROBANAM esse censent, jacet in finibus Asiae inter insulas Indicas, non procul à Malaccensi Chersoneso, in longum exserta. Cingitur ab Oceano Indico.

6. BORNEO, non procul à Sumatra in Indico mari sita est forma rotunda: in ejus magnitudine assignanda ingens inter Scriptores dissimilitudo. Quidam enim circuitum ejus faciunt 2000 milliaria & maximam inter Indicas esse volunt alii tantum 300 circiter.

7. ISLANDIA, cujus una portio in Zona Temperata, altera in Zona Frigida jacet, non procul à Terra polari & Norwegia. Cingitur à mari Septentrionali. Forma est oblonga.

8. TERRA NOVA, insula adiacens Canadae in Septentrionali America. Cingitur à mari Septentrionali, regio major est, quam vulgè Tabulae exhibent. Per multas curvaturas mare accipit.

9. Inter fretum Davis & fretum Hudsonii in Septentrionali Oceano jacet magna insula ad Terram polarem. Tabula Universalis Vischeri ex anno 1594 exhibet eam: in aliis Tabulis non reperiri haecenus. Forma est rotunda.

10. NOVA ZEMBLA, sita inter Polarem Arcticam & Samoiedam atque Russicam. Cingitur à Mari glaciali, Tartarico. Separatur ab Europa non prope à Samoieda per fretum Waigats. Forma est rotunda.

Hic  
ca insu  
quada  
graphi  
etiam

Insu  
decem

1. J  
Austra  
lix &  
est obl

2.  
cul ab  
mari A  
est obl

3. F  
strum  
ptent

num i  
curren  
4. l  
procul  
mari S

5. C  
Europ  
oblong

6. S  
Cingit  
tunda.

7. C  
ultimo  
no Ind  
hanc e

8. M  
Pacifico

Hic

Hiscæ annumeranda est CALIFORNIA, si ea insula est & non pars America, Belgæ enim in quadam Hispanica navi repererunt Mappam Geographicam, quæ Californiam insulam & mari circumdatam exhibebat non adhaerentem America.

## PROPOSITIO V.

*Insulas mediocres in Telluris superficie numeramus decem, quæ sunt,*

1. JAVA, una ex Indicis insulis inter Asiam & Australem terram, omnium rerum abundantia felix & Paradisus. Cingitur ab Oceanó Indico. Forma est oblonga.

2. CUBA, una ex Americanis insulis, non procul ab Hispania Nova & FLORIDA. Cingitur à mari Atlantico in ingressu Sinus Mexicani. Forma est oblonga.

3. HISPANIOLA, jacens à Cuba versus Austrum, major est quam Cuba. Cingitur à mari Septentrionali sive Atlantico, ubi in sinum Mexicanum influit. Forma est subrotunda cum multis procurrentibus angulis.

4. HYBERNIA sive IRLANDIA, non procul à Britannia versus Americam. Cingitur à mari Septentrionali. Forma est subrotunda.

5. CRETA, non procul à Græcia, adjacet Europæ. Cingitur à mari Mediterraneo. Forma est oblonga.

6. SICILIA, non procul ab Italia jacet. Cingitur à mari Mediterraneo. Forma est subrotunda.

7. CEILANUM insula, non procul ab Indiæ ultimo promontorio Comorino. Cingitur ab Oceano Indico. Forma est rotunda. Barrius contendit hanc esse antiquorum Taprobanam.

8. MIDANAO una ex Philippinis in Oceano Pacifico; forma est subrotunda.

D

9. SAR-

9. SARDINIA, jacet in mari Mediterraneo forma est oblonga.

10. CELEBES insula non procul à Borneo. Cingitur ab Oceano Indico. Forma est oblonga.

Hicce annumerari potest Frislandia, insula procul ab Islandia.

PROPOSITIO VI.

*Insulas parvas in superficie Telluris numerantur, quæ sunt,*

1. GILOLO, una ex Indicis non procul Moluccis. Cingitur ab Indico Oceano. Forma instar Soleæ equinæ.

2. AMBOINA, non procul à Gilolo in eodem Oceano. Forma est oblonga.

3. TIMOR, insula non procul ab Australiâ, ad Indicas refertur. Forma rotunda est.

4. JAMAICA in Mexicano sinu non procul ab America. Forma est oblonga.

5. SELANDIA insula Daniæ inter Jutlandiam & Gothiam jacet. Cingitur ab Oceano septentrionali, ubi hic in sinum Balthicum insertur. Forma est rotunda.

6. CORSICA in mari Mediterraneo.

7. EUBOEÆ, hodie Negroponte, vicina Græciæ: cingitur à mari Mediterraneo; forma est oblonga.

8. MAJORCA prope Hispaniam.

9. CYPRUS, non procul ab Asia minori: cingitur à mari Mediterraneo: forma est oblonga.

10. ISABELLA, una ex insulis Salomonis in Oceano Pacifico.

Possent plures insulæ ad hanc classem referri, sed commodius ad ultimum ordinem eas referemus.

Mi  
in su  
peculia  
magna  
propter  
vel ap  
Vo  
comm  
in qu  
lebres  
dus, A  
phalo  
In  
celebe  
etiam  
ipso A  
Ma  
-meric  
Zo  
Go  
Inf  
existe  
opina  
tum n  
tem,  
incon  
incol  
natio  
Hispar  
institu  
potue  
illuſio  
diebus  
bula te  
detur.

PROPOSITIO VII.

*Minimarum insularum innumerabilu fere est copia in superficie Telluris : ex illu autem considerationem peculiaritatem merentur , 1. solitaria celebres. 2. ea , qua magno numero in aliquo Oceani tractu reperiuntur , & propter viciniam uno aliquo nomine comprehenduntur vel appellantur.*

Vocabimus in genere , Agmen Insularum , quia commodiori vocabulo destituimur. Tractus maris, in quo insulæ hæc jacent , dicitur Archipelagus. Celebres solitariae sunt , in mari Mediterraneo : Rhodus , Malta, insularum. Ivica , Minorca, Chios, Cephalonia, &c.

In Oceano Atlantico inter Africam & Brasiliam celeberrima apud nautas insula S. Helenæ , ubi etiam insula Ascensionis , insula Divi Thomæ , in ipso Æquatore sita.

Madera insula è regione Freti Gaditani versus Americam.

Zocotora, ante fauces Arabici sinus jacet.

Gotlandia in mari Balthico.

Insula Paradon sola hoc habet , quod de ejus existentia disputent Geographi. Nautæ Lusitanî opinantur , ut Linschotius refert , illam jacere centum milliariibus à Canariis insulis versus Occidentem , & sæpe illam conspicuam , plerunque tamen inconspicuam esse : campos ejus virides , fertiles ; incolas esse Christianos ; verum ignorant cujus nationis vel originis sint , & quo sermone utantur. Hispani aliquoties è Canariis ad illam visendam instituerunt navigationem , sed nunquam reperire potuerunt. Ideo quidam arbitrati sunt spectri esse illusiones ; alii existimant , certis tantum anni diebus videri posse ; plerunque nubibus vel nebula tectam esse. Mihi tota narratio vana esse videtur.



Inter celebres solitarias dignæ quoque sunt commemoratione illæ, quæ natant in aquis. de quibus vide caput XVIII.

PROPOSITIO VIII.

*Agmina insularum minimarum numerantur in superficie Telluris quindecim, nempe :*

1. CANARIÆ insulæ, olim Fortunatæ dicuntur. Jacent in mari Atlantico non procul ab Africa. Promontorio Occidentali è regione Atlantis montis. Numerantur decem circiter, exceptis minimis.

2. FLANDRICÆ, sive ASORES, in Europam & Americam in Oceano Septentrionali numerantur præcipuæ earum septem.

3. HESPERIDES, hodie Insulæ Viridive Promontorii Viridis. Jacent enim ad Occidentale Africae litus è regione Promontorii Viridis, numero XII. Cinguntur à mari Atlantico.

4. MALDIVÆ insulæ. Harum ingens dicitur esse numerus, nempe undecies mille; sed quia mille tantum ab incolis habitari volunt. Jacent in Oceano Indico non procul à Malabarico Indico, à Septentrione ad Austrum usque ad Aequinoctialem. Multitudinem efficiunt parvi Euripi influentes, adeo angusti, ut nauæ inter insulas navigantes possint apprehenso ramo alicujus arboris ex una in aliam saltu pervenire.

5. INSULÆ LUCARÆ inter Floridas Cubam prope Americam, hæc vel ideo memorandæ dignæ sunt, quod omnium totius Americae præcipuæ ab Europæis inventæ sunt, nimirum Columbus ad unam ex illis, distantem GUANAHAM, omnium primam, ipse primus ex Europæis appropinquavit. Lucarum harum numerantur 400, sed omnes parvæ præter ipsam Lucajam, à qua omnes denominatæ sunt.

6. I  
& A  
cano  
7  
span  
8.  
& A  
9.  
fertil  
plur  
cus i  
10  
Pacif  
1  
mo  
1  
1  
fico  
1  
Arch  
1  
vam  
1  
adja  
1  
fretu  
N  
nun  
tori  
Dav  
A  
fluv  
Can  
repe  
bus  
Am  
fita

6. *INSULÆ PRINCIPIS* inter Hispaniolam & Americam, ad quas refero omnes in sinu Mexicano sitas.

7. *INSULÆ CAMERCANÆ*, ante Hispaniolam versus Veterem Orbem.

8. *MASCARENIÆ* insulæ inter Madagaskar & Africam.

9. *MOLUCCÆ*, quarum quinque præcipue fertilitate caryophyllorum numerantur, sed multo plures sunt, ad illas refero Mauricas. Oceanus Indicus illas ambit.

10. *PHILIPPINÆ* in ultima Asia in mari Pacifico: magnus earum est numerus.

11. *INSULÆ MARIS ÆGÆI*, quod primo omnium appellatum est Archipelagus.

12. *INSULÆ JAPONIÆ*.

13. *INSULÆ SALOMONIS* in mari Pacifico ad terram Australem.

14. *INSULÆ* latrunculorum de las Velas in Archipelago S. Lazari.

15. *INSULÆ BANDANÆ* & aliz inter Javam & Bandam.

16. *INSULÆ ANGLIÆ & SCOTIÆ* adjacentes.

17. *INSULÆ* inter Magellanicum fretum & fretum Le Maire.

Non hic adnumero insulas illas, quæ magno numero adjacent quarundam continentium littoribus, ut Norwegix, Chinæ, Brasiliæ, freti Davis &c.

Ad hanc classẽ etiam referendæ sunt insulæ fluviorum, quales in Nilo, in fluvio S. Laurentii Canadæ, in Wolga, atque aliis quibusdam fluviiis reperiuntur, ut etiam illæ, quæ in lacubus quibusdam existunt, ut in Zembre lacu Africæ, in America Australi, ubi insula plumbi in lacu sita, &c.

## PROPOSITIO IX.

*Partes singularum Terrarum sive insularum sunt ejusdem figura, sed dissimiles: differentia celeberrime sunt Peninsula & Isthmus.*

Peninsula Græcis Chersonesus, dicitur per Terræ, quæ alteri parti jungitur tractu angustissimo atque in reliquo circuitu undique mari cincta est. Angustus iste tractus terræ dicitur Isthmus, nempe arcta via, per quam ex lata terra pervenitur in partem tam. Cæterum nec negligendæ videntur partes procurentes Terrarum, quæ longo tractu in mare exporriguntur, etsi ab uno latere tractu latissimo jungantur cum alia terra. Atque ita Península est species procurentis Terræ: quanquam omnis talis procurrens Terra possit appellari Península.

Procurentes terræ sunt, 1. Italia. 2. Hispania. 3. Pars Angliæ. 4. Tota Græcia & Macedonia. 5. Asia Minor. 6. Norwegia & Suecia cum Lapponia. 7. India. 8. Cambogia. 9. Nova Guineæ pars Australis. 10. Beach ejusdem terræ regio. 11. Nova Britannia, novum Belgium in America. 12. Lingua Africa, &c.

## PROPOSITIO X.

*Peninsulas numeramus quatuordecim.*

*Dividimus eas in oblongas & subrotundas.*

*Oblongæ sunt septem vel octo.*

1. *Chersonesus aurea veterum, hodie Malaccensis adhæret Indiæ.*

2. *Chersonesus Cimbrica, hodie Jutlandia, adhæret Holsatiæ.*

3. *California, ad Occidentale littus America Septentrionalis prope mare Vermejo. Sed recentiores observationes eam insulam perhibent.*

4. *Novæ Francia*, in Orientali latere Americæ Septentrionalis.

5. *Chersonesus Jucatan* in sinu Mexicano, adhæret Americæ.

6. *Chersonesus Thracia* ad Hellespontum.

*Chersonesus Cassandria* ad finem Theſſalonicenſem Græci maris. Sunt etiam Asiæ minoris quædam peninsulæ minus celebres, nempe 1. Ionia five Smyrnenſis. 2. Cnidensis, five Doris regio.

3. Myndensis.

De *Corea* dubium est, utrum Insula sit an Peninsula. Quædam Mappæ adjungunt Tartariæ, quædam mari cingunt. Recentissimæ tamen observationes faciunt eam peninsulam.

*Peninsula subrotunda sunt sex.*

1. *Ipsa Africa*, pars Veteris Orbis ingens. Cingitur mari Mediterraneo. Atlantico, Æthiopico, Indico, Rubro: adhæret Asiæ angusto tractu ad Ægyptum.

2. 3. *Partes America*, nempe Mexicana & Peruviana. Cohærent ad Panamam angusta via.

4. *Peloponnesus*, hodie Morea, pars Græciæ.

5. *Taurica Chersonesus* in Ponto Euxino & paludis Mæotis ostio: hodie Tartaria Przecopenſis.

6. *Cambaja* in India.

#### PROPOSITIO XI.

*Isthmos numeramus totidem, quot Peninsulas. Infigniores sunt quinque.*

1. Isthmus inter Ægyptum & Asiam, quo Africa adhæret Asiæ.

2. Isthmus Corinthiacus inter Peloponnesum & Græciam.

3. Panamensis inter Mexicanam, Americam & Peruviam.

4. Inter Auream Chersonesum & Indiam.

5. Tauricæ Chersonesi.



## CAPUT IX.

## De montibus in Genere.

**D**E montibus plurima occurrent cognitu digna & in Geographia explicanda, partim quia altitudinibus Telluris videntur officere, partim quia de illis varia apud Scriptores traduntur.

## PROPOSITIO I.

Dicitur autem *mons pars terra ad insignem altitudinem pertingens*, quæ si minor sit, dicitur *collis* & *clivus*.

*Promontorium* autem dicitur mons in mare procurrentis. *Scopuli* dicuntur partes extantes in mari vel etiam petris. Verum in genere sciendum, partes terræ quæ planæ apparent, non esse omnes ejusdem altitudinis, sed quasdam depressiores, imprimis ad littora maris, ita ut altitudo accrescat in maritimis locis ad mediterranea. Hoc autem probatur ex fluviorum fontibus & fluxu. Cum enim illa pars terræ, ad quam fluit aqua, sit humilior, à qua fluit, & raro in locis mediterraneis & à mari remotis fontes sint fluviorum, patet mediterranea esse elevatiora maritimis. Sic Bohemia est altior Holsatia, quod cognoscitur ex fluxu Albis quæ à Bohemia fluit ad Holsatiam. Ita ex Danubio, Visurgi, Rheno, Mosa, &c. sumimus indicia majoris altitudinis locorum mediterraneorum. Helveticorum & Rhetorum terræ à quibusdam censentur altissimæ totius Europæ, quod inde fluant Rhodanus, Danubius. Porro quanta est fluviorum declivitas, tanta est altitudo locorum mediterraneorum supra loca maritima.

Cæterum problemata de montibus cognoscenda, ex quibus judicium de controversiis, vel scri-

ptis,  
hac:

M  
Fit  
ne ex  
quo p  
Sic  
spicu  
neam  
fiat v  
deino  
A C  
gradu  
curat  
fiat u  
(vel  
distan  
collo  
fuma  
est re  
ideo  
Fia  
1000  
tia A  
rem  
Ex  
fliun  
tudir  
mem  
A F C  
A C  
13 m  
vener  
stadii  
13 m

ptis

ptis, & traditis apparentiis est desumendum, sunt hæc:

PROPOSITIO II.

*Montis altitudinem per geodasiam invenire.*

Fit hoc eodem modo, quo in Turrium altitudine exploranda utimur, si modo vertex montis aliquo peculiari signo sit notabilis.

Sit  $AB$  montis altitudo,  $A$  pes,  $B$  vertex conspicuus. Mediocri ab ea distantia sumemus lineam  $FC$ , ita ut neuter angulorum  $AFC$ ,  $ACF$  fiat valde acutus, sed fere æquales. Observentur deinde facta collimatione ad  $B$ , anguli  $AFC$ ,  $ACF$ , & hæc subtractis ad  $180$  gradibus, residui gradus designabunt angulum  $CAF$ . Deinde accurate metienda est distantia stationum  $FC$ . Et fiat ut sinus anguli  $FAC$  ad sinum anguli  $CFA$  (vel  $FCA$  si  $FA$  velis assumere) ita  $FC$  ad  $AC$ , distantiam montis à  $C$ . Dein suspenso vel erecte collocato instrumento in  $C$ , & collimando ad  $B$ , sumatur angulus  $BCA$ . Et quia Triangulum  $CAB$  est rectangulum, nempe  $BAC$  est rectus,  $90$  gr. ideo dabitur etiam angulus  $ABC$ .

Fiat itaque ex Triangulo  $BAC$ , ut sinus Totus  $10000000$  ad tangentem anguli  $BCA$  ita distantia  $AC$  ad altitudinem montis perpendicularem  $AB$ .

Exempli gratia. Ponamus Xenagoran Eumeli filium ulum esse hoc modo in Olympi montis altitudine cognoscenda (namque accurate eum dimensus est, ut epigrammate testatur) & angulum  $AFC$  invenisse  $88$  gr.  $29$  min. Sed angulum  $ACF$   $57$  gr.  $30$  min. Itaque  $CAF$  erit  $34$  gr.  $13$  min. & per mensuram vel alio certo modo invenerit  $FC$   $400$  pedum Græcorum sive  $\frac{2}{3}$  unius stadii. Itaque erit ut sinus anguli  $CAF$ ,  $34$  gr.  $13$  min. ad sinum anguli  $ACF$   $57$  gr.  $30$  min. ita

$D 5$   $CE$

C F 400 pedes ad F A distantiam: Nempe ut 5622 ad 84339 ita 400 ad 600. Est itaque F A 600 pedum. Porro angulus B F A fit inventus 84 gr. 1 min. Erit in Triangulo F A B, ut 100000 ad Tangenti anguli B F A 1016000 ita 600 ad 6096 pedes per A B altitudine montis Olympi: sed 600 pedes faciunt stadium. Itaque divisus 6096 per 600 inveniuntur 10 stadia & 96 pedes Græci pro altitudine montis Olympi, quantum Xenagoras invenit. Stadia autem illa faciunt  $\frac{1}{4}$  mill. German. cum  $\frac{2}{32}$   $\frac{1}{18}$  circiter.

Testatur autem Aristoteles cum multis alii Scriptoribus, tantam esse altitudinem montis, ut vertex nullos aëris motus nec pluvias sentiat, ad eoque supra aëris secundam regionem sit elevatus: idque collegerunt veteres ex immotis cineribus & non confusis literarum ductibus post aliquod intervallum.

Notandum, quod in diversis locis diversa nobis altitudo: ideo non valet consequentia. Hunc montem nubes æque tegunt: Ergo est æquus altus: Etenim in Septentrionalibus plagis nubes sunt multo humiliores.

Est quidem etiam alius modus in plano distantiendi montes per duas stationes in eadem cum monte linea recta, sed proclivis est ad errorem propter exiguam angulorum differentiam.

Ex alia tamen altitudine nota, ex. gr. ex turri cuius altitudo cognita est, & distantia à monte accuratius consequemur montis altitudinem. Nempe si ponamus F esse turrim altam 300 pedibus, & in ejus vertice vel commodo loco observatum esse angulum B F P 83 gr. 30 min. Inventur BP 5796 pedum, cui BA altitudo turris addenda.

D  
inter  
men  
dra  
metr

Si  
ex fe  
Græc  
cupi  
nion  
gr. 8  
lo B  
ad T  
B A

U  
unur  
F A,  
vel r  
quoc  
ne pa  
prop

N  
di, C  
semie  
jam  
F A t  
est di

D  
tur fa  
per G  
Su  
riffa u  
Terra

## PROPOSITIO III.

*Data vel cognita altitudine visi montis, quanto intervallo ab eo distemus geodätice invenire, si instrumentum Goniometricum habeamus, vel etiam quadratum Geodäticum, vel radium, aut scalam altimetram.*

Sit iterum montis altitudo AB, jam cognita ex scriptis aliorum decem stadiorum & 96 pedum Græcorum sive 6096 pedum. Locus noster F, & cupiamus scire intervallum FA. Observetur Goniometrico sive quadrante angulus BFA, sit ex. gr. 84 gr. 23 min. Itaque in Triangulo rectangulo BAF, cum tria sint nota, erit, ut sinus totus ad Tangentem anguli ABF 5 gr. 37 minut. ita BA nota ad AF quæsitam.

Ut 100000 ad 9234 ita 6096 ad 600 pedes sive unum stadium. Tanto itaque intervallo, quod est FA, distamus à monte. Si quadrato geodätico vel radio utamur, non opus est Canone Sinuum, quod ex Instrumentorum ostensione & explicatione patescit, sed minus accuratus sit ex eis calculus propter defectum veræ proportionis.

NOTA. In duobus hisce problematibus addidi, Geodätice, quoniam alius est modus, quando semidiametro & peripheria Telluris utimur, ut jam proponemus: nam in prioribus intervallum FA tanquam lineam rectam sumimus, quia exigua est differentia inter illam & curvam.

## PROPOSITIO IV.

*Dato intervallo, à cujus termino primum conficitur fastigium montis, inde invenire altitudinem montis per Geographiam.*

Sumamus montem altissimum in Insula Teneriffa una ex Canariis, qui dicitur *el Pico*. Et sit Terra peripheria, & quidem Meridianus montis



illius  $A B C D F$ : centrum  $R$ , mons ipse sit  $A B$ .  
 Ducatur ex  $B$ , recta tangens ad peripheriam  $B E$ .  
 Erit  $F$  ultimum seu primum punctum, ex quo  
 montis vertex  $B$  conspici poterit: Ducatur  $R F$ .  
 Testantur autem quidam nautæ, quod verticem  
 montis illius conspiciant primo, cum adhuc qua-  
 tuor gradibus ab eo absunt in Meridiano (namque  
 in hoc situ sub eodem Meridiano facile est illi  
 hanc in gradibus distantiam invenire). Itaque  
 arcus  $A F$  erit quatuor graduum: ponamus itaque  
 veram esse hanc relationem nautarum, & radius  
 primum visivum  $B F$  venire directe à vertice  $B$ .  
 & exquiramus, quanta sit futura montis altitudo,  
 si ita res sese haberet. Angulus  $B F R$  est rectus,  
 quia  $F A$  est 4 gr. ideo etiam angulus  $B R F$  est  
 4 gr. & nota est  $R F$  semidiameter Telluris, & in  
 Triangulo  $B R F$  tria data, eritque,

Ut Sinus Totus ad secantem anguli  $B R F$  4 gr.  
 ita  $R F$  ad  $R B$ . Ut 10000000 ad 10024419  
 3440 (milliar. Italic.  $R F$ , vel 860 mill. German.  
 ad 3448 mill. Ital. pro  $R B$ : aufer 3440 pro  $R B$   
 manent 8. mill. Ital. vel 64 stadia sive duo Ger-  
 pro altitudine montis  $A B$ , quæ incredibilis se-  
 est, & omnino contra Veteres. Itaque sciendum  
 duo assumpta esse in solutione problematis, quæ  
 falsa sunt, primum, quod radius ille qui primo  
 oculum ferit veniens à  $B$ , sit directus, cum tamen  
 propter aëris densitatem sit refractus. Nimirum  
 ex vertice  $B$  non potest duci ad  $F$  recta (si  $F A$  est  
 4 gr.) quin prius incurrat in Tellurem, & ideo  
 recte vertex  $B$  non potest in  $F$  loco videri, sed  
 medio fracto, nempe  $B T F$ , qui fractus est, & quidem  
 primus ex fractis, qui ad  $F$  potest pertingere.

Si itaque ponamus, quod hæc refractione efficiat  
 ut uno gradu (hoc est quindecim milliaribus Ger-  
 man.) citius hic mons videatur, quam videretur  
 si absque hac refractione esset, nimirum directus

radie  
 tura  
 que  
 dior  
 cum  
 accu  
 grad  
 put  
 38  
 posi  
 titu  
 S  
 refr  
 S  
 nic  
 S  
 hun  
 Si m  
 titu  
 Tur  
 ab i  
 S  
 ne,  
 & c  
 der  
 ex  
 est,  
 per  
 pra  
 cur  
 alt

radio BF videri à tribus gradibus AF, invenitur altitudo AB juxta expositam formulam quinque milliarium Italicorum vel quadraginta stadiorum. Sed quia verisimile etiam est (quod secundum est), nautas parum liberalius vel minus accurata dimensione loqui, si adhuc dimidium gradum subtrahamus (neque enim amplius licere puto) ut videri eum ponamus à  $2\frac{1}{2}$  gradibus, sive 38 milliariibus Germanicis pro FA; hoc, inquam, posito, & instituto calculo, ut prius invenietur altitudo montis AB unius circiter milliariis.

Si mons videatur à duobus gradibus (seposita refractione), erit altus  $2\frac{1}{2}$  milliari. Ital.

Si vero ab uno gradu seu 15 milliariibus Germanicis, erit altus  $\frac{1}{2}$  mill. Ital.

Sive quinque circiter stadiorum. Adjicimus in hunc finem Tabulam sequentem.

Si montium al-  
titudo sit. |  $\frac{1}{8}$  mil. |  $\frac{1}{7}$  mil. |  $\frac{1}{6}$  |  $\frac{1}{5}$  |  $\frac{1}{4}$  |  $\frac{1}{3}$  |  $\frac{1}{2}$  | I

Tunc videbitur  
ab interv. mill. | 14 | 18 | 20 | 25 | 26 |  $27\frac{1}{2}$  | 28 |  $29\frac{1}{4}$

Sed hæc omnia intelligenda sunt sine refractione, quæ plerunque montium & altitudinem visam & distantiam visus auget, ut per Diagrammata videre licet: namque refractus radius FT productus exhibet altitudinem NA.

PROPOSITIO V.

*Viso primum montis alicujus, cujus altitudo nota est, fastigio, invenire quanto intervallo ab illo distemus per Geographiam.*

Hoc est conversum prioris, & posset ex Tabella præmissa solutio peti: sed calculus monstrabit accuratiorem solutionem. Sit itaque montis AB altitudo cognita, & videatur in F, placeat scire

D 7

distan-

distantiam A F. B F tangit peripheriam. In Triangulo rectangulo B F R, angulus F est rectus, & cognita sunt duo latera R F, semidiameter Telluris & R B eadem semidiameter cum A B, quam posuimus esse  $\frac{1}{2}$  mill. German. Et quia R F vel R A 860, erit R B  $860\frac{1}{2}$ . Et fiat ut R B ad R F, ita finus totus ad finum anguli R B F.

In pedibus } Ut 860  $\frac{1}{2}$  ad 860 ita 10000000 ad  
 Rinland. } Ut 19609700 ad 19598300  
 10000000 ad 9994186, finus 88 p  
 2 min. 40 pro R B F.

Itaque B R F, hoc est, arcus A F erit 1 gr. 57 m. 20 sec. qui conversi in milliaria Germanica efficiunt  $29\frac{1}{4}$  mill. Itaque ab hoc spatio videbitur mons sine refractione, si altus sit  $\frac{1}{2}$  milliariae pro refractionis augmento addere licet octo milliaria, ut à 37 milliariis videri possit: sed refractionis quoque pro diversa Solis altitudine variat neque abest ante Solis ortum vel post occasum. Verum plura de hoc negotio dabimus capite de Aëre & parte tertia hujus libri, ubi de Horizonte visibili agemus.

#### PROPOSITIO VI.

*Data longitudine umbra, quam mons aliquis spargit, & data ad id tempus altitudine Solis, invenire montis altitudinem.*


Hoc problema proponemus magis propter antiquitatem & jucunditatem, quam quod per umbram accurate obtineri posse altitudinem putamus.

Scripterunt Plutarchus & Plinius (& res certa est propter vulgarem versiculum, *Αθως κρηστή πρὸς Ἀμφίνας βοῆς*. Athos teget latera bucule Lemnix), quod mons Athos in Macedoniae litore situs adeo elatus sit, ut umbram jaciat usque in insulam

fulam Lemnum, Sole in Cancro existente, & quidem in forum urbis Myrrinæ, ubi terminus umbræ olim designabatur bucula ærea, quam incolæ propter rei miraculum posuerant: Et scribit Plinius, intervallum inter montem Athos & insulam Lemnum censi octuaginta septem millibus passuum, sive 87 milliar. Italicis.

Sed non annotarunt Scriptores altitudinem Solis pro tempore ejus umbræ. Verisimile autem est, umbram hanc sparsam à Sole jamjam Occidente, sive ubi civitati Myrrhinæ occultari incipiebat à monte Athos (est enim Athos à Lemno versus Occidentem situs), vel ubi in eo Myrrhinæ verticali erat, qui per Athos montem ducitur. Etsi vero possimus ponere, Solem tunc fuisse in Horizonte

fere Myrrinæ FO, & sic radium OF transiisse per verticem montis B, & jecisse umbram AF, eritque tunc OF tangens peripheriæ, & quia datur FR, & angulus FRB (vel assumendo Triangulum BAF, & FA tan-



quam rectam) invenietur BA stadiorum octo sive unius Italicis milliaris, altitudo montis. Attamen quia in hoc Solis situ non potest notari terminus umbræ quippe infinitæ, & præterea ædificia urbis Myrrinæ impedirent & umbram & Solis vicinos umbræ radios, ideo statuendum est, Solem ad minimum duobus gradibus adhuc fuisse elevatum supra Horizontem myrrinæ, ex. gr. in S, ut angulus SFO sit 2 gr. & SF radius Solis transiens per verticem montis T, & umbram in F terminans. Erit itaque in Triangulo RFT obliquangulo



gulo datus angulus TFR 92 gr. & FRT datus 1 gr. 16 min. (quia AF assumimus 87 milliar. Ital. & ideo FTR est 86 gr. 54 min. & nota est semidiameter FR, 860 milliar. German. Ideo inveniatur TR juxta hanc proportionem.

Ut sinus anguli FTR 86 gr. 54 min. ad sinum anguli TFR 92 gr. ita FR ad RT 860.

Itaque RT erit 861 milliar. German. & AT montis Athos altitudo unius milliaris Germanicæ sive 32 stadiorum, quæ nimia est, cum Græci non ultra undecim stadia montes elevari statuerint.

Si unius gradus altitudinem Solis assumamus, inveniatur altitudo montis Athos viginti stadiorum.

Verumenimvero causam hujus nimie magnitudinis provenientis ex calculo, existimo esse nimiam distantiam Lemni à monte Athos assignatam à Plinio: namque & Tabula Græciæ Sophianæ, & Tabula modernæ Græciæ Blavii exhibent tantum 55 milliar. Ital. distantiam pro FA. Ideo angulus FRT erit vix 1 grad. nempe 55 min. Et sumpta Solis altitudine 1 gr. 30 min. erit angulus TFR 91 gr. 30 min. & ideo FTR. 87 gr. 35 min. Et sita in Triangulo FRT.

Ut sinus Ang. FTR 87 gr. 35 min. ad sinum Anguli TRR 91 gr. 30 min. ita FR 860 ad RT. Vel in Triangulo TFA rectangulo ad A, erit angulus TFA 1 gr. 30 min. & assumitur FA tanquam recta quinquaginta quinque milliarum, inveniatur altitudo AT juxta hanc proportionem: Ut sinus totus ad tangentem anguli TFA, 1. gr. 30 min. ita FA 55 milliarum ad AT altitudinem montis.

Hic etiam solvendum esset problema, quomodo montis alicujus altitudo inveniatur, si exploratum sit, quanto citius in illius vertice Sol conspicitur oriri, quam ad pedem montis. Et contra, si altitudo detur, quomodo hæc Temporis differentia

renti  
Plini  
eus se  
teriu  
eund  
ri,  
put

hab  
tund  
globi  
C  
Etur  
tudi  
uni  
eo a  
que  
rati  
mel  
liur  
cuj  
tior  
tant  
liar  
tun  
ritat  
rur  
rum  
Geo

G  
F  
run  
qua

rentia sit investiganda, qua de re Aristoteles & Plinius quaedam incredibilia prodidere, & quæ se-  
cus se habere calculus docet. Sed cum hoc sine al-  
terius problematis solutione, quod ad partem se-  
cundam hujus libri retulimus, non possit explica-  
ri, ideo differemus duo hæc problemata ad ca-  
put xxx.

## PROPOSITIO VII.

*Montium altitudo ad semidiametrum Telluris non  
habet sensilem proportionem, sive adeo exiguam, ut ro-  
tunditati Telluris non magis officiat, quam punctum in  
globi artificialis superficie notatum.*

Ostendimus enim montem insulæ Teneriffæ di-  
ctum, *el Pico de Tayde*, non majorem habere alti-  
tudinem, quam unius milliaris vel ad summum  
unius cum dimidio. Et verò vix ullum montem  
eo altiorem reperiri testatur experientia. Cum ita-  
que semidiameter Telluris sit milliarium 860, erit  
ratio altitudinis maximæ montium ad semidia-  
metrum Telluris, quæ est 1 ad 860, nempe qua-  
lium partium semidiameter Telluris vel globi ali-  
cujus est 860, talium unam habebit altitudo mon-  
tium maxima. Cumque paucissimi sint montes  
tantæ altitudinis, sed plerique vix ad quartam mil-  
liaris partem ascendant, manifestum est, quod ro-  
tunditatem Telluris non magis tollant, quam aspe-  
ritates quædam in globis manu factis artificum ho-  
rum globorum rotunditatem. Etenim in tota re-  
rum natura nullum corpus est, quod exactam &  
Geometricam rotunditatem habeat.

## PROPOSITIO VIII.

*Quomodo montes extiterint, explicare.*

Hanc quæstionem quidam Philosophi move-  
runt: plurimi inutilem esse censent, neque de eo  
quærendum existimant, propterea quod montes  
cum

cum ipsa tota Tellure generatos esse opinentur. A  
 qui non paucos subsedisse montes fornicibus san-  
 exesis vel aliam ob causam fatiscentibus, histon  
 testantur. Quorum autem naturalis corruptio et  
 illorum quoque generationem naturalem, non li  
 pernaturalem fuisse judicamus. Præterea quosdam  
 montes progressu temporis generatos esse, collig  
 tur ex conchularum testis, quæ in quibusdam  
 montibus inveniuntur, ut in Geldria montibus  
 Et generationis modus hic esse videtur, si veter  
 vehemens arenam & sabulum paulatim in locu  
 montis deferat & accumularet accedente pluvia. Qu  
 modus sicut minores montes producere potest, a  
 verisimile videtur, majores montes non esse gene  
 ratos, sed ejusdem cum tota Tellure ætatis & origi  
 nis. Qui magis Theologicè philosophantur, in  
 censent Tellurem primo à Deo creatam fuisse  
 mollem & omnino Sphæricam sine extantibus  
 partibus vel montibus, sine cavitatibus, deinde  
 cum Deus aquam à terra recedere jussisset, tum  
 alveos in terra factos fuisse atque terram ex alve  
 remoram montes constituisse. An vero tanta  
 montium multitudo & magnitudo ut omnes mo  
 ris alveos implere possint, ipsi viderint.

#### PROPOSITIO IX.

*Cur in montium fastigiis pluvia, nebula, nivæ  
 frequentes sunt, cum in vicinis vallibus aër serenus  
 sine talibus meteoris?*

Testantur illi, qui in montanis Afrix, Peruvia  
 atque aliarum regionum peregrinati sunt, quæ  
 frequenter accidat, ut in montium vertice versan  
 tes experiantur pluvias, nivem vel densam nebu  
 lam, descendentes vero ad subjectam vallem nihil  
 eorum, sed serenum aërem sentiant. Idem in no  
 stræ regionis montibus aliquando animadverti  
 mus.

Causam hujus phaenomeni quidam esse dicunt, quod montes attrahant aërem & nubes: Sed qua facultate id faciant, non explicant, ideoque nihil ad rem loquuntur. Mihi id videtur fieri hoc modo: Vapores & exhalationes ubi in media aëris regione (in qua sunt plerique montium vertices) condensantur in guttulas, deorsum vergere incipiunt. Et quoniam montium vertices sunt illis viciniore, quam subjectæ valles, ideo illæ guttulae, quæ supra vertices illos existunt, prius ad terram pervenientes, locum in aëris regione deserunt, quem vicinæ guttulae statim occupant, quia urgentur & trudentur ab aliis vel ratione fugæ vacui, vel quia aquæ hæc natura est, ut ad illum locum fluat, ubi incipit fieri fluxus vel ubi est locus magis depressus.

## PROPOSITIO X.

*Montibus accidunt, ruina, ruptura, transpositio.*

Rara quidem horum accidentium exempla sunt; quædam tamen in historiis leguntur. Rupturæ exempla in seq. cap. afferemus.

## PROPOSITIO XI.

*An montis superficies sit capacior, quam subjectum planum, cui insistit.*

Majorem esse probat Geometria: sed an ideo plures homines vel majorem frumenti copiam possit proferre, alia quæstio est. Ego affirmativam probabo. Etsi enim omnia in monte posita debeant esse perpendicularia ad subjectum planum, tamen major copia terræ & major superficies adest.



## CAPUT X.

De montium differentiis & tractu, &  
specie de montibus ardentibus.

## PROPOSITIO I.

**M**ontium quidam parvo circumscripti sunt in  
vallo, alii longo tractu se extendunt & pro-  
diuntur.

Atque hi posterioris speciei dicuntur juga. In-  
periuntur talia juga in omnibus fere terræ regi-  
onibus, ita ut continua censei possint, nisi pau-  
ca intervalla intercederent. Progrediuntur autem  
in varias plagas: quædam à Septentrione in Austrum  
quædam ab Oriente in Occidentem, & alia ad pla-  
gas cardinibus collaterales.

Celebriora juga sunt hæc.

1. Alpes, qui Italiam à vicinis regionibus se-  
rantes vasto terræ tractu se extendunt & qua  
brachia emittunt in alias provincias, nempe per  
Galliam ad Hispaniam, ubi Pyrenæa juga appel-  
lantur, ad Rhætiæ Rhætica, ad Pannoniam  
Panonia, & dubia, deinde supra Dalmatiam  
Dalmatica, & protenduntur usque in Thraciam  
& Pontum per Macedoniam. Sed quoniam inter  
Julia & Dalmatica juga mediocriter intercedit inte-  
vallum, ideo quidam in Juliis jugis finem Alpium  
constituunt. Mittit unum brachium perpetuis  
gis lunatoque cursu per totam Italiam transiens  
eamque bisecans usque ad fretum Siculum, nec  
simplex ubique progreditur, sed in multis partibus  
collaterales comites seu ramos emittit, quos  
etiam montes propter insignem altitudinem  
et aliam causam singularibus appellationibus do-  
ctos, ut est Massicus mons, Gaurus, *Monte di Capo*  
Vesuvius ardens, &c.

2. Juga Peruviana omnium longissima. Totam enim Americam Australem ab Æquatore usque ad Fretum Magellanicum pervadunt, separantque Peruvianum regnum ab aliis provinciis, ita ut tractus hujus jugi sit octingentorum circiter milliarium Germanicorum (quorum quindecim unum gradum facere ponuntur). Atque adeo celsa sunt fastigia horum montium, ut ipsos avium volatus fatigare dicantur, uno duntaxat, quod adhuc exploratum sit, eoque difficillimo transitu. Multa ex illis perpetuis teguntur nivibus tam æstate quam hyeme: multa nubibus involvuntur, quædam ultra mediam æris regionem elevantur. Sane Hispanis aliquando transeuntibus ex Nicaragua in Peruviam, accidit, ut in summis montium interjectorum jugis non pauci subito exspirarent cum ipsis equis, & quasi gelu obriguissent, statuarum instar manserint immobiles. Cujus sane causa fuisse videtur defectus æris, qualem respiratio nostra seu pulmones postulant. Reperiuntur in his jugis etiam sulphurei & fumantes montes.

3. Plurima alia juga sunt inter Peruviam & Brasiliam, quæ etiam per Chicam regionem se extendunt ad fretum Magellanicum, ubi vertices montium perpetuis nivibus occultantur, etsi sub latitudine 52 gr. jaceant.

4. Hilce jugis adde, etsi minus celebria, Canadensis, Nova Albionis, & plurima alia in America Septentrionali, perpetuis nivibus tecta.

5. Tauri montis jugum in Asia. Hoc apud veteres nobilissimum & totius Orbis maximum habebatur. Exoritur in Asia minori à Pamphylia mari juxta Chelidonias insulas, & per varias regiones atque vasta regna aliis aliisque nominibus progreditur ab occasu in ortum usque ad Indiam, dividitque Asiam universam in duas partes, quarum

rum altera, quæ Septentrionem spectat, Asia inter Taurum; altera, quæ Meridiem, Asia extra Taurum appellatur. Multis à latere comitibus stipens hinc inde, inter quos celebres sunt Antitaurus major & minor, qui Armeniam majorem & minorem bifecant, ubi ipse Taurus transit inter Armeniam & Mesopotamiam, multa brachia versus Septentrionem & Austrum emittit.

6. Imaüs mons, crucis forma duabus viis progreditur tam versus ortum & occasum, quam versus Septentrionem & Austrum. Septentrionalis pars nunc Alkai perhibetur. Protenditur versus Austrum usque ad Indiæ fines & Gangis fluminis fontes, longitudine milliarium Germanicorum quadringentorum circiter. Dividit Scythiam Asiaticam in duas partes, quarum illa, quæ occasum spectat, dicitur Scythia intra Imaüm montem, quæ ortum, dicitur Scythia extra Imaüm montem.

7. Caucaſi montis jugum à Septentrione à Austrum, versus pontum Euxinum à Caspio mari (cui vicinum est) extenditur, latitudine quinquaginta milliarium, atque navigantibus in Caspio mari certum instituendi cursus indicium; attingit montem Ararat Armeniæ, in quo arcam Noë refedisſe Scriptura Sacra testatur, & in hunc usque diem asservari Persæ atque Turcæ perhibent. Ararat vero montes Tauro vicini sunt: quippe omnes hi montes contigui. De altitudine Caucaſi dicimus capite xxx.

8. Jugum Chinense, quod complectitur montes Damasios veteribus dictos versus occasum, à Ottorocoram versus Septentrionem. Hoc jugum multis montibus haud sane continuis sed hinc inde transitum concedentibus constat. Et montes Carbois ejusdem jugi pars esse videntur.

9. Juga Arabiæ, quæ triplici ordine progreditur

gredi  
10  
taru  
est A  
cea  
Orie  
habe  
part  
jace  
1  
Mo  
mo  
mo  
& f  
jun  
part  
1  
cur  
diu  
voc  
pid  
ter  
est  
no  
pte  
flu  
ra  
le  
ple  
à S  
app  
vel  
cec  
sec  
du  
me  
rin

grediuntur, quorum pars est sanctus mons Sinai.  
 10. In Africa celeberrimum & innumeris Pœ-  
 tarum Græcolorum figmentis prædicatum jugum  
 est Atlas. Oritur à littore Africæ Occidentalis O-  
 ceani, & per totam Africam se extendit versus  
 Orientem usque ad confinia Ægypti loca. Fontes  
 habet omnium fere fluviorum Africæ, in plurimis  
 partibus nivofus frigidusque, etsi in Zona Torrida  
 jaceat.

11. Jugum Africæ prope Monomotapam, quod  
 Montes Lunæ vocatur. Cingit totam fere Mono-  
 motapam, & ejus brachia multa sunt, ut Zeth  
 mons & nivofus montes. Plurima alia juga in Africa  
 & fere innumera reperiuntur parvo intervallo se-  
 juncta, ita ut omnia fere contigua sint & unius jugi  
 partes esse videantur.

12. Montes Riphæi Europæ, qui & Obii di-  
 cuntur, à mari albo seu sinu Moscovitico progrediuntur ad ostium Obii fluminis, eosque Mosci  
 vocant Weliki Kamenypoyas, id est, magnum la-  
 pideum cingulum; quoniam eis montibus totum  
 terrarum orbem cingi existimant. Aliud hic jugum  
 est, quod Russi vocant Joegoria. Incipit à termi-  
 no australi Tartariæ & usque ad Oceanum Se-  
 ptentrionalem se extendit; atque ex hoc plurimi  
 fluvii oriuntur, nempe Witsagda, Neem, Wisse-  
 ra, & maximus Petfiora. Mappæ hæc omnia ma-  
 le exprimunt vel potius omittunt. Præterea tri-  
 plex jugum decurrit inter Siberiam & Russiam  
 à Septentrione versus Austrum. Unum ex iis Russi  
 appellant Coosvinscoy Camen, cujus latitudo  
 vel transitus est duorum dierum iter. Huic inter-  
 cedentibus quibusdam vallibus, proximum est  
 secundum dictum Cirgins Koy Camen, itidem  
 duorum dierum itinere; tertium Podvins Coy Ca-  
 men altissimum ex tribus hisce jugis, quod in plu-  
 rimis partibus per totum annum tegitur nivibus



& nubibus, ideoque moleſtum præbet tranſitum qui eſt quatuor dierum. Urbs Vergateria Siberiæ vicina eſt.

13. Juga Norwegiæ & Lappiæ, quæ à promontorio aſtrali Norwegiæ incipiunt, atque Sueciam ex parte ſeparant à Norwegia, dein multis ordinibus progrediuntur in ultimam uſque Lappiam, variisque vocabulis diſtinguuntur, à Filleſiel, Doſreſiel, &c.

14. In Germania celebre eſt jugum Hercynicum, cingens totam Bohemiam & variis flexibus ſe extendens in varias regiones, idque variis nominibus. In Ducatu Brunſwicenſi ſervat veterem appellationem, ubi dicitur *der Harz*: pars ejus eſt moſ Bruçterus.

## PROPOSITIO II.

*In plerisque inſulis & procurrentibus terra continentis partibus juga montium ita ſita ſunt, ut medias terras pervadant atque in duas partes dividant.*

Sic in Scotia Grampius mons eſt (Grampius vocant incolæ) qui hanc inſulam ab ortu in occiſum pervadit, & mediam ſecat in duas partes, quarum ut ſolum & incolæ non parum diſcrepant. In inſulis Sumatra, Luconia, Borneo, Celebes, Cuba, Hiſpaniola juga montium reperiuntur, quæ à littore maris verſus inſularum medium paulatim aſſurgunt in egregiam altitudinem.

Ita procurrentem Aſiæ partem, quæ India dicitur, juga Gatis mediam pervadunt. Orientem enim à Caucaſi extremitatibus & ad Cori uſque promontorium, quod *Cabo de Comorino* vulgo dicitur, progrediuntur à Septentrione in Auſtrum atque ita Indiam hanc procurrentem dividunt in duas partes, quarum illa quæ cis juga Gatis verſus Occidentem jacet, dicitur Malabarica regio, &c.

tera tra  
roman  
quæ nu  
Pegu,  
neſun

Ita  
citur:  
in pro  
rium E  
ninus,  
Quo  
Tellur  
ſint, in

Mon

I. I

Pico de  
luris,  
ab inte  
ced. c  
Non a  
menſi  
ctus eſt  
in adja  
tur. V  
cum h  
re ſupr  
men n  
tra me  
ſu ad v  
tem ve  
re ſere  
jacente  
licet,  
ab eo  
runtur

tera trans Gatis juga versus Orientem dicitur Comandelia. Eadem hæc juga reliquam Indiam, quæ nunc Bengala dicitur, pervadunt per regnum Pegu, Siam, atque totam Malaccensem Cherfonefum.

Ita juga procurrentis terræ, quæ Camboia dicitur: similia in Peninsula vel Insula Californiæ, in procurrente Africa à Zaire lacu ad promontorium Bonæ spei; peninsula Corea, in Italia Apenninus, &c.

Quomodo hæc juga extiterint, utrum cum ipsa Tellure orti, an postea à naturalibus causis generati sint, incertum est.

### PROPOSITIO III.

*Montes altitudine insigni celebres enumerare.*

I. El Pico in Teneriffa insula, incolæ vocant Pico de Terraira. Censetur altissimus totius Telluris, & clare satis conspicitur ejus vertex in mari ab intervallo sexaginta miliarium (de quo in præced. cap. diximus) antequam accedas ad illum. Non ascenditur in illum, nisi Julio & Augusto mensibus, quoniam reliquo anni tempore nive tectus est, etsi neque in ipsa insula Teneriffa neque in adjacentibus Canariis unquam nix conspiciatur. Vertex supra nubes attonli videtur manifeste, cum hæc medium montem cingant & vertex extare supra hanc nebulam conspiciatur. Quoniam tamen nives patitur, ideo certum est, quod non ultra mediam regionem aëris protendatur. In ascensu ad verticem usque requiruntur tres dies: est autem vertex non acuminatus, sed planus, atque aëre sereno & sine nebula existente reliquas circumjacentes Canarias insulas distincte ex illo cernere licet, quarum quedam quinquaginta miliaribus ab eo removentur. Duobus illis mensibus defertur ex monte multi sulphurei lapides atque in

Hispaniam magna copia avehuntur. Scaliger scribit, Teneriffæ hunc montem summo è fastigiis continua vomere incendia, sed ex quo autore habeat, ignoro: in illis, quos ego legi, nihil tale commemoratum inveni.

2. In una Azorum seu Flandricarum insularum prope insulam Fayal reperitur mons dictus Pico de Sanct Georg, unde & ipsa insula dicitur Pico. Æqualem cum Teneriffæ monte altitudinem habere scribitur, imo quidam aliquantum altiores esse volunt.

3. Jugum dictum Cordillera America Australis, separans Peruviam à reliquis Provinciis, magis adeo ubique altitudine esse dicitur, ut nulli monti Telluris altitudine cedat. Progreditur à toto Magellanico ad Panamam usque.

4. Ætna mons Sicilia, ex cujus vertice ejaculati ignes conspiciuntur in ipsa insula Melite, unde integri milliaria altitudinem habere putatur a minimum: sed in precedenti capite jam monimus de causa hujus apparentis altitudinis.

5. Hecla mons Islandiæ.

6. Pico de Adam in insula Ceilano.

7. Mons Bruæterus in Germania, & Abnoba.

8. Mons Figenojamma in Japonia, nubes superare altitudine putatur.

9. Caucasii altitudinem magnam prodiderunt veteres.

10. Pelion Macedoniæ mons. Plinius ait, Dicaearchum Mathematicum jussu & impensis Regum hujus montis altitudinem dimensum fuisse, atque deprehendisse eam passuum mille ducentorum & quinquaginta, hoc est, decem stadiorum sive  $\frac{1}{3}$  milliaria German. Geminus montem Cylenem à Dicaercho ait inventum tantæ altitudinis.

11. Athos mons, de quo Mela, lib. 2. cap. 1. Ait

Athos  
quam  
fidem  
ablu  
Toto  
tinen  
fossu  
pervi  
12  
præc  
13  
mille  
14  
milli  
15  
fuisse  
ni pe  
16  
in pr  
Poeta  
signe  
rient

M  
Pr  
plicat  
1.  
circu  
2.  
vis re  
3.  
diocr  
4.  
fi, al  
5.  
alii fi

Athos, inquit, adeo elatus est, ut credatur altius, quam unde imbres cadunt, surgere. Cepit opinio fidem, quia de aris, quas in vertice sustinet, non abluitur cinis, sed quo relinquitur aggere manet. Toto longo dorso procurrit in pelagus. Qua continenti adhæret, à Xerxe in Graios tendente perfossus & transnavigatus & factus freto navigabili pervius.

12. Olympus mons Asiæ minoris, de quo in præced. cap. diximus.

13. Casius mons in Asia, quem Plinius quatuor mille passuum altitudine elevatum esse scripsit.

14. Hæmus mons, quem Martianus Capella sex millibus passuum cacumen attollere refert.

15. Sismethræ petram Strabo narrat inventam fuisse altitudinis quindecim stadiorum, & Sogdiani petram altitudine dupla.

16. Atlas mons Africæ, de quo jam diximus in præced. Propos. Hunc adeo altum esse finxerunt Poætæ, ut cælum humeris sustineat: sed minus insignem ejus esse altitudinem hodie docuit experientia.

#### PROPOSITIO IV.

*Montium plure. differentias exponere.*

Prioribus propositionibus tres differentias explicavimus, nempe

1. Quidam longo tractu extenduntur, alii parvo circuitu terminantur.

2. Quidam medias regiones secant, alii per quovis regionum tractus transeunt.

3. Quidam sunt insigni altitudine, quidam mediocri, alii parva. Hisce differentiis addi possunt hæc:

4. Quidam montes sunt arenosi, quidam petrosi, alii argillacei, cretacei &c.

5. Quidam montes fluviorum fontes habent, alii sine fontibus.



6. Quidam montes sylvis ornantur, alii sine arboribus.

7. Quidam montes ardentes & fumantes sunt, alii sine ignibus.

8. Quidam montes metalla largiuntur, quorum quidam aurum, argentum, alii ferrum, &c. alii sine metallis.

9. Quidam montes nivibus continue teguntur, alii in ætate liberantur à nive.

#### PROPOSITIO V.

*Montes ardentes & ignivomos enumerare.*

Dicuntur autem hodie tales montes Vulcani, quam appellationem Lusitani nautæ primum invennerunt, & jam à nautis communiter usurpant. Sunt autem hi :

1. Celeberrimus est *Ætna*, Siciliæ mons, hodie *Gibel*, è cuius vertice ejectione flammæ & fumi longissima distantia in mari mediterraneo cernuntur, nempe in ipso Melitæ insulæ portu, qui tamen 4000 miliaribus Germanicis à littore Siciliæ abest. Et si continua sit flammarum & fumorum ejectione, tamen interdum majori impetu furit; Anno 1537 à primo die Maii usque ad XII tremoribus tota Sicilia: deinde ingens & horrendus mugitus & fragor auditus fuit, quasi magna tormenta bellica exploderentur: secuta est multorum ædificiorum per totam insulam ruina. Hac sævitia per XI dies cum continuasset, disrupta fuit vel hiatus aperuit hinc inde terra, unde magna vis flammæ & ignis prorupit, qua intra quatuor dies omnia absunta sunt & cremata, quæ non ultra quinque leucarum distantiam ab *Ætna* aberant. Paulo post crater, qui est in vertice montis, per tres integros dies ingentem copiam favillæ & cinerum eiecit, quæ non tantum per totam insulam dispersa fuit, sed etiam trans mare in Italianam delata.

delata: & naves in mari cum ducentis leucis à Sicilia abessent & ad Venetias tenderent, damnum passæ sunt. Farellus descripsit prolixè hujus montis incendia: & circuitum pedis ejus esse scribit 100 leucarum.

2. Hecla mons Islandiæ, non minus interdum sævit quam Ætna, & magnos lapides projicit: continui in illo ignes libero exitu carentes sæpe miros edunt sonos lamentationibus similes: inde multi creduli putarunt, ibi esse infernum & impias animas cruciari.

3. Vesuvius Campaniæ, hodie *monte di Somma*, non procul ab urbe Neapoli: constitus quidem est vitibus fertilissimis extra incendii tempus vini optimi Falerni, at frequentibus obnoxius incendiis. Dion Cassius refert, regnante Vespasiano adeo vehemens fuisse incendium ejus & flammaram impetum, ut cineres ex ejus foco seu penentralibus cum sulphureo fumo projecti non modo Romam vento deserrentur, sed etiam ultra Mediterraneum mare in Africam usque & Ægyptum; præterea aves in aëre suffocati deciderent in terram, pisces in fervente & infecta vicina aqua interirent. de hoc incendio & montis tristi immutatione elegans est apud Martialem carmen, qui eo tempore vixit, & vidit virentem & atrum deinde ex favillis montem. Sed deinde cessante incendio & pluviis irrigantibus sulphureas favillas & cineres in montis superficie magna hinc exitit ejus fertilitas vini. Cæterum ante aliquot lustra iterum arsit mons iste & crebros fumos emisit. Vicinus ager combustus est, & frequentibus inde foveis periculosus viatori.

4. Mons in Java insula, non procul ab urbe Panacura. Hinc anno 1586 cum antea non arsisset, primum disruptus est violenta flagrantis sulphuris eruptione, adeo ut ad decem millia hominum per-

iisse dicantur in subjectis agris, atque ingentia saxa in urbem Panacuram ejecerit. Tribus continuis diebus tantum fumum atrumque mixtis flammis & favillis evomit, ut Solem tegetet & fere tenebras diei inferret.

5. Mons Gonapi in una Bandanarum insularum. Is anno 1586, mense Aprili, cum jam septendecim annis arsisset, disruptus est ingenti cum fragore, atque tantam copiam magnorum saxorum & massæ sulphuræ ardentisque materię ejaculavit in mare & terras, ut omnibus horum rem incuteret cinerum & favillæ ingens vis, quæ etiam tormenta bellica, quæ Belgæ in arce seu castello habebant, inutilia redderent ad usum: tanta nimirum copia illis incumberebat. Saxa rudentia in mari reperta unius integræ orgyïæ; minorum vero tanta multitudo, ut vix naviculis inter in mari concederet. Aqua ad littus insulæ multum adhuc horis ebulliebat, ac si ignis ei subjectus esset: pisces plurimi enecati & fluitantes conspecti.

6. Mons Balaluanum in insula Sumatra, fumum & flammam evomit, ut Ætna.

7. Terra insularum Moluccarum diversis locis cum infano reboatu ignes eructat. Sed præcipua camino Ternatensi nobilitas. Mons in nubes assurgit excelsus & arduus, cujus inferiora densis nemoribus vestiuntur, superiora ex incendiis glabra & horrida sunt. In vertice crater, hiatus vasto, in plures circulos, circumductos majores minoribus ad speciem amphitheatri discedit. Inde, per æquinoctia maxime (in Vere & Autumno), certis flantibus ventis, imprimis borealibus, cum horribilo fremitu flammæ atro mistæ fumo & cum favillis erumpunt, atque omnia late loca cineribus complent. Visendi annuæ sunt vices: nec nisi per funes aut ferramenta quibusdam locis ascen-

fus e  
ligur  
8.

à Me

tur

nei

igne

ubi

tant

labo

opp

prin

riur

ene

fam

ren

ribi

eru

quo

fla

cre

cau

nul

gin

Ite

ma

m

por

pro

car

qu

qu

fla

dea

fus est: incola etiam sulphur optimum alicubi colligunt. Hæc Massæus.

8. Una ex Mauricis insulis (distant Lx leucis à Moluccis) sæpissime tota motibus terra concutitur, ignemque accineres evomit. Ignis subterranei tanta vis, ut rupes conflagrent totæ: sæpe saxa ignea erumpunt; maximarum instar arborum: ubi autem ventus existit vehementior, è cavernis tanta vis cinerum effunditur, ut viri ac mulieres laborantes in campis domum revertantur cinere oppleti: compures quoque apros illi cineres opprimunt, qui, ubi ventus remisit, passim reperiuntur mortui: pisces quoque plurimi in littore enecti, qui etiam vulgo intereunt, si cinere aspersam aquam hauriant. Ex vertice montis cum horrendo mugitu, crebrisque tonitribus, qualia majoribus tormentis eduntur, sordidum ac tetrum etumpit incendium, & magna cineris, pumicumque & ambustorum igne lapidum vis.

9. In Japonia mons est incertæ appellationis flammam assidue evomens, in cujus cacumine (si credere fas est) certis hominibus, postquam voti causa diu se maceraverunt, splendida circumfusum nube Cacodæmonem sese ostendere scribit Massæus.

10. Plures Vulcani in insulis Japoniæ septuaginta milliaribus à Firando distitis reperiuntur. Item in parva quadam insula, quæ inter Tanaxumam & insulas appellatas, septem sorores, jacet, mons conspicitur interdum ardens, reliquo tempore fumans.

11. In Tandaia insula una ex Philippinis, ubi est promontorium Spiritus Sancti, aliquot parvi Vulcani inveniuntur. Unus etiam in insula Marindique, quæ itidem Philippinarum pars est.

12. In Nicaragua Americæ provincia, triginta quinque leucis ab urbe Leon mons altus adeo ejicit flammam tanta copia, ut ad x millia passuum videantur.



13. In jugo Peruviano, dicto Cordillera, hinc inde rupes & montes quidam Vulcani, partim fumantes partim ardentis & ignivomi esse dicuntur, imprimis in Carrapa provincia Popaianæ mons est à cuius vertice quando cœlum serenum est pluvius fumus elevari cernitur.

14. Prope Arequipam urbem Peruvix, nonaginta leucis à Lima distantem, mons aliquis sulphureus continue ignes ejaculat, quem metuum ne aliquando rumpatur & urbem adjacentem obruat.

15. In Peruvia prope vallem, quæ Mulahalle appellatur, quinquaginta leucis circiter à Quito, Vulcanus seu sulphureus mons est, qui aliquando disruptus magnos lapides eiecit & ingenti fragore loca etiam remota terruit.

16. In una insularum, quas Papoys appellant, quam Le Maire detexit (nisi ea fortassis adhæret continenti Australi) ex Orientali littore novæ Guinæ Vulcanus est, qui eo tempore ardebat.

17. Montes quidam jacentes ad Orientalem ripam fluvii Jeniscea in Tingæorum regione ultra Obium versus ortum itinere aliquot hebdomadam, Vulcani sunt, Moscis referentibus.

18. Montes quidam ad fluvium Pefida ultra Tingæorum regionem.

19. Mons Fessanus dictus beni Gua zeval antrum habet ignivomum.

20. In Liburnia non procul à littore prope urbem Apolloniam petrosus mons, è cuius vertice sæpe erumpit fumus & flamma. In vicinia calidi sunt fontes.

Sunt etiam quidam montes, qui jam ardere desierunt. Sic insula Queimoda ad littus Brasiliæ non procul ab argentei fluvii ostio olim arsit, jam non amplius, unde vocant *het verbrande Eylandt*. Sic montes in Congo vel Angola, quos vocant, *de verbrande*

ver  
cis  
rim  
bus  
un  
S. f  
stis  
arfi  
bat  
kole  
fili  
peri  
cier  
apti  
Vul  
sulp  
mor

3  
hiat  
vel  
V  
quib  
de,  
2. Pe  
stan  
3. Pe  
quor  
exte  
hanc  
mati

Pr  
tu  
vatu

*verbrände bergen.* In insulis Azoribus seu Flandricis, imprimis Tercera & S. Michaël, olim in plurimis locis & rupibus terra ardebat, jam in quibusdam locis tantum fumus interdum expellitur: unde & crebri terræ motus inibi existunt. Insula S. Helenæ & Ascension terras habent similes adustis, favillis & cineribus, ut verisimile sit olim arfisse harum insularum montes, quod etiam probatur à sulphurea terra & carbonibus, quos *Smitkolen* vocant, quales tum in hisce tum Azoribus insulis reperiuntur. Et cum in plurimis locis illi reperiantur & effodiantur, sintque ad fumum faciendum ignemque concipiendum & fovendum aptissimi, nil mirum si novi interdum existant Vulcani. Causa nimirum ardentium montium est sulphurea & bituminosa substantia, quæ in talibus montibus continetur.

## PROPOSITIO VI.

*Fuga quadam nullum transitum seu aperturam vel hiatus præbent, quadam multos, alia unum tantum vel alterum.*

Vocantur autem portæ, item Thermopylæ. Ex quibus celebriores sunt, 1. Thermopylæ in Phocide, à quibus nomen hoc cæteris communicatum. 2. Portæ Caspiæ, per quas tanquam viam angustam transitus conceditur inter montes Caspios. 3. Porta Cordilleræ jugi in Feruvia. 4. Porta jugi, quod inter Abasiam & Arabiam Troglodyticam extenditur, per quam annona ex illa regione in hanc importatur. 5. In Caucaſo monte portæ Sarmaticæ & Albanæ.

## PROPOSITIO VII.

*Promontorium dicitur mons in mare aliquo tractu procurrens, vel in littore supra vicina loca elevatus.*

In mappis appellantur *Cabo*, Lusitanico vocabulo, Latinis Caput.

Celebriora sunt, 1. Caput Bonæ Spei in Africæ extremo, quod superandum est navigantibus in Indiam.

2. Caput Victoriæ, in exitu freti Magellanici.

3. Caput Viride, in angulo seu cuspide Africæ, ubi ab Occidente in Orientem littus flectitur.

4. Caput Vincentii in Hispania.

5. Promontorium Atlantis, quod olim dicebatur, Caput non, propterea quod illud ante aliquæ secula nautæ existimabant non posse superari, veli quis transnavigasset, non tamen illum salvum & incolumem regressurum: ideoque is terminus est navigationis eorum in Africæ littore. Alia promontoria in mappis videantur.

#### PROPOSITIO VIII.

*Montibus opponuntur barathra, specus & abyssi, quæ in paucis terra locis reperiuntur.*

Olim celebre erat mephiticum barathrum, hodie Islandiæ, quod S. Patricii vocant, & in Italia specus dictum *Grotta del Cane*. In monte Fessano Benigazeval antrum est ignivomum, de quo Leo Africanus, p. 439.

In insula Baruchus (adjacet Walliæ provinciæ Angliæ) ad mare rupes est, in qua hiatus, ad quem si aurem admoveris, malleolorum ictus, follium motus, ferri stricturas, quasi in officina ferraria exaudias.

Non procul ab urbe Bessa in Aquitania antrum est, vulgo, *du Souley*, in quo æstate murmura tonitruum instar exaudiuntur.

In multis locis medios inter montes reperiuntur valles profundæ adeo, ut aspicientibus horrorem & vertiginem inducant.

## CAPUT XI.

*De Fodinis, Sylvis & Desertis.*

**N**obilitant certos terræ tractus, fodinæ, sylvæ, & deserta, de quibus etsi pauca proponi possunt, tamen ad exactam superficiæ Terrestris cognitionem non inutile fuerit ea loca considerare, & tractus eorum limitesque designare; quod hoc capite paucis præstabimus.

## PROPOSITIO I.

*Fodina dicitur locus in terra, ex quo terra metallis vel minerales vel alia terra species effodiuntur.*

Quoniam itaque varia sunt, quæ ex terra effodiuntur, ideo varias quoque denominationes fodinæ recipiunt, ut auri fodinæ, argenti fodinæ, cupri fodinæ, ferri fodinæ, marmoreæ fodinæ, gemmæ fodinæ, salis fodinæ, &c.

*Auri fodina & argenti celebriores sunt. 1. Peruvianæ, & Castella aurea omnium totius Telluris ditissimæ. Etenim per omnes Peruvix provincias reperiuntur fodinæ auri atque argenti feraces (non exclusis tamen aliis metallis); ita ut ipsi Peruviani atque Hispani olim gloriati sint, fundum hujus regni aureum esse atque argenteum. Girava scriptor Hispanus testatur, circa urbem Quito fodinas fuisse, quæ plus auri, quam terræ largirentur. Ideo cum Hispani primum in aureum hoc regnum (quod ideo firmissimis muniunt castellis & præfidiis) venissent, in multis urbibus, inprimis regiâ, Cusco dictâ, plurimas ædes conspexerunt intus & extus obductas laminis aureis. Militum etiam Peruvianorum primarii non tantum loricas argenteas, sed etiam omnia armorum genera ex auro parata gestabant. Argenti fodina felicissima est in monte Porosi, in quo viginti millia hominum*



effodiendæ terræ operam dant descendentes per quadringentos gradus & plures. Inde ingens illa aurum & argenti vis, quam singulis annis Rex Hispaniæ in invidiam omnium reliquorum Imperatorum & Regum ex America accipit.

2. *Argenti fodina* præstantissimæ in Japoniæ insulis, unde Hispanis dictæ *Argentariæ insulæ*. Aliæ quoque fodinæ reperiuntur, sed hodie minoribus divitiis, ac olim.

3. Arabia olim auri fodinas uberiores habebat quam hodie.

4. In montanis Persiæ, item in China quædam argenti fodinæ sunt.

5. In Guinea multi montes auriferi, sed à littore remoti, quod nautæ Belgi vocant *de Goudkuste*: non tamen omne aurum effoditur, quod inde petitur, sed & aliis modis colligitur. Reges vero singuli singulas fodinas possidere dicuntur, & effossum aurum mercatoribus vendere, hi aliam donec ad littora pervenitur, ubi Europæi commutant.

6. In Monomotapa divites auri atque argenti fodinæ reperiuntur, ut etiam in Angola, quarum regionum fodinæ unius postes esse censentur, & continuæ.

7. Ex Europæ provinciis Germania superat reliquas copia fodinarum, quarum quædam aurum quantum largiuntur, multæ argentum egregiæ naturæ liberalitate, plurimæ cuprum, ferrum, plumbum, vitriolum, antimonium, &c. de hisce consulantur Germaniæ Descriptiones.

8. *Cupri fodinam* omnium hætenus cognitatarum feracissimam habet Suecia in vasto monte unito circiter milliaris, quem vocant *den Kopperberg*. Tanta cupri inde copia effoditur, ut tertiam partem regionum partem largiatur. Sunt quoque ferrifodinæ in Suecia, & argentifodinæ, sed hæc

vix  
5  
la,  
gen  
ful  
Por  
nor  
ner  
sing  
fod  
fiit  
ma  
fug  
fod  
qua  
und  
bi n  
plur  
I  
gen  
no  
se m  
I  
alii  
ferri  
etia  
tum  
I  
Poch  
lucio  
è te  
Hisp  
fim  
Wol  
diur

vix tantum præbent, ut operæ pretium refundant.

9. *Gemmea fodina* reperiuntur in Ceilano insula, in regno Congi (ubi etiam argenti fodina & ingens marmorea fodina, imo tota terra marmorea subtus esse creditur), in Peruvia, (Smaragdina: circa Portovejo) in Guiana. Huic adjacens parva insula nomine S. Maria magnam auri copiam præbet, nempe ad centum libras (si Belgis credendum) singulis fere annis. In regno Golundæ Gemmifera fodina (plurimos adamantes largiebatur) jam desit fodi.

10. In Chili regione, auri, argenti, atque gemmarum feraces fodina: sunt, sed incolæ bellicosi fugatis partim, partim trucidatis Hispanis inceptas fodinas demoliti sunt, pluris facientes ferrea arma, quam aurum atque argentum.

11. In insula Madagascar ferrum & stannum abundat, argenti mediocris copia, auri parum: plumbi nihil. Unde fit, ut incolæ plumbea cochlearia pluris æstiment, quam argentea.

12. In insula Sumatra largas fodinas auri, argenti, æris ferrique esse scribitur, ita ut Regem anno 1620 regnantem ferant in terra defossas habuisse mille libras auri.

13. In Insulis Philippinis, Java, Hispaniola, Cuba aliisque reperiri auri, argenti, ut etiam cupri & ferri fodinas testantur historia: In Siamensibus etiam montibus perhibent inveniri aurum, argentum atque stannum.

14. *Salis fodina* reperiuntur in Polonia, ad Pochniam, quatuor milliariibus à Cracovia, ubi pellucidi & candidi salis ingentia frusta excinduntur è terra, in Transsylvania, Tirolensi comitatu, in Hispania, in Asia minori, in Persiæ monte Kilisim, in locis prope mare Caspium, non procul à Wolga fluvio, ubi insula Kostowata. Hinc effodiunt sal Russi & ad puriorem substantiam coquant,

quunt, atque per totam Russiam devehunt. In Cuba mons salinus est. Insulæ Ormus in sinu Persici initio montes omnes sale crystallino constant, imo tota insula nil fere nisi sal est, ex quo etiam parietes ædium fiunt. In Africa non aliud sal, nisi quod ex specuum salinis velut marmor, candidi rubei, & cinericii coloris effoditur. In Peru octo decim milliaribus à Lima versus Septentrionem in valle quadam magna copia salis reperitur, unde cui vis licet petere, quantum placuerit, quoniam continue accrescit, neque unquam exhaurienda videtur fodina hæc. In regno Musilipatan Indiæ Comandeliæ ad urbem Baganaga maxima salis copia effoditur, unde omnes Indi petunt. Plures salis fodinas Lectores studiosi colligere poterunt. De fontibus salinis dicemus capite alio.

#### PROPOSITIO II.

*Sylva dicitur arborum multitudo longo & continuo tractu terra protensa, & sine cultura propagata.*

Pleraque Sylvæ unius tantum speciei arborum habent, & ab hisce denominantur; cumque arborum magna sit varietas, variarum quoque Sylvarum differentiæ existunt, ut Palmetum dicitur Sylva palmas habens; Quercetum, quæ quercus; iucilicetum, æsculetum, &c. etsi hæc vocabula frequentius pro nemoribus seu minoribus Sylvis usurvantur. Diversa autem sunt in diversis regionibus, præsertim remotioribus. in Africa ad præmontorium viride Sylvæ sunt malorum citreorum, aurantium (cujus fructus minimo pretio ibi carpere licet nautis appellentibus) quales etiam in aliis locis reperiuntur. In Gallia castaneæ arbores multas Sylvas faciunt. In Ceilano insula Sylvæ sunt arborum, quarum cortex cinamomum præbet. In Moluccis insulis Caryophyllorum arbores. In Bandanis Nuces muscatæ; In Brasiliæ

Sylva

Sylvæ arborum, quas Brasilienses vocant; & lignum durissimum, Brasiliense. In Africa dactyliferæ arbores faciunt Sylvas, imprimis in Numidia. In Insula Madagascar aliisque locis Tamarindiferæ arbores. In Libano monte cedri, quarum etiam integræ Sylvæ reperiuntur in Japonia, ita ut malos navium inde conficiant. In Hispania, Gallia, Italia, Olearum Sylvæ & myrti. In Germania Sylvæ constant abiete, quercu, alno, fago, pinu, junipero, acere, populo, fraxino, ulmo. Celebriores Sylvæ sunt, Hercinia, quæ olim totam fere Germaniam occupabat, pars ejus Sylva Bohemica, *der Böhmerwald* / & in Ducatu Brunswicensi *Bacenis* seu *Semana*, quæ sola hodie dicitur *der Harz* / *Gabreta*, *der Thüringerwald* / *Martiana*, *der Schwarzwald* / & alia. In Scotia celebris Sylva *Caledonia*, atque in aliis provinciis alia, imprimis Norwegia, arboribus ingentibus abundat præ omnibus aliis regionibus, unde malos navium tota fere Europa accipit: Lithuania nil fere nisi arbores habet, unde magnus Regi Poloniae reditus.

## PROPOSITIO III.

*Deserta dicuntur vasti terra tractus, qui ab hominibus non coluntur.*

Ea duplicia sunt; Proprie dicta & improprie: Illa, quorum solum seu terra sterilis est & infœcunda: hæc, quæ fertilem quidem agrum præbent, sed non coluntur ab hominibus, qualia in Moscovia, in locis circa Mare Caspium à latere Volgæ atque aliis locis reperiuntur, ubi non pauci fertiles & opimi agri jacent inculti, in Moscovia quidem ob copiam agrorum & incolarum segnitiam, circa Volgam vero prope mare Caspium ob bella Tamerlanis quibus olim illæ regiones vastata & incolæ fugati sunt.

Sed



Sed hæc minus proprie deserta dicuntur, proprie autem dictis celebriora sunt hæc, quæ quatuor species dividi possunt, nempe Deserta arenosa, ericosa, petrosa, paludosa: Ericosa plerumque habent in plurimis locis hinc inde sylvas & nemora, sunt quoque utiliora & facilius ad culturam perducuntur.

1. Africae deserta fere omnia sunt arenosa, & que ulla pars terræ pluribus desertis laborat; maxima in Libya reperiuntur: totam quoque Aegyptum cingunt.

2. Arabiae deserta, quæ partim arenosa, partim petrosa sunt. Sed celeberrimum est illud arenosum desertum in Arabia, quod vocant vulgo *Sand-see*.

3. Deserta Tartariæ circa Imaum montem. Item Desertum Belgian circa Mongul, ubi falso habebatur creditum fuit opimum Cathaie regnum consistere.

4. Deserta Camboiæ.

5. Deserta Novæ Zemblæ petrosa.

6. Norwegiæ, Lappiæ, Sueciæ, Finmarchiæ.

7. Germaniæ deserta omnia sunt ericosa, vocantur *Heide*, unde desertum in Lunæburgensi Ducatu longitudine decem circiter miliarium vocant, *Lunenburger Heide*.

8. Deserta Americæ, &c.

## SECTIO QUARTA

## GEOGRAPHIÆ ABSOLUTÆ,

*Continens Hydrographiam sex capitibus explicatam.*

## CAPUT XII.

*De Oceani divisione per Terras.*

QUoniam in præcedentibus de Terræ partibus & divisione egimus, ordo postulat, ut etiam Aquarum, quæ alteram Telluris partem faciunt, divisionem & situm contemplemur, atque earum proprietates, quæ ad Geographiam pertinent, explicemus. Capite septimo in Propositione secunda distribuimus Aquas in quatuor species, quæ sunt 1. Oceanus. 2. Fluvii & fontes aquæ dulcis. 3. Lacus & paludes. 4. Aquæ minerales. Hoc capite agemus de Oceani divisione.

## PROPOSITIO I.

*Oceanus continuo tractu universam Tellurem partesque terrestres ambit, neque ejus superficies per interpositas terras omnino alicubi interruptitur, sed tantum latior continuitas & liber congressus impeditur.*

Propositionis veritas non nisi per experientiam probari potest, inprimis à circumnavigatione Telluris, quæ toties jam tentata, & feliciter absoluta est, primo ab Hispanis, Duce Magellane primo inventore Freti: deinde ab Anglis, bis, nempe à Dracone & Candischio: postremo à Belgis quinques.

Veteres de hac continuitate nequaquam dubitabant, quia Veterem tantum orbem pro Terra extantam habebant, eamque undique ab Oceano cingi, quidam etiam innatare censebant. At cum America esset detecta, (quæ à Septentrione ad

AU-

Austrum longissimo tractu exporrigitur & Oceani  
 continuitatem impedit) & præterea Terra poli  
 Septentrionalis & Australis, tunc vero dubitatur  
 de eo fuit non immerito. Existimabant enim  
 Americæ, & illud non erat vero abfimile, Americam  
 & Terram Australem conjungi, sicut etiam Americanam  
 Septentrionalem cum Groenlandia  
 ex hodiernis Geographis continuam esse arbitran-  
 tur. Quæ duo si ambo vera essent, non arduus  
 Oceanus totam Tellurem. Verum enim vero  
 observationem & scrupulum sustulit Magellanus  
 quando anno 1520 invenit fretum inter Americanam  
 & Terram Australem, per quod conjunctum  
 Oceanum Pacificum cum Atlantico manifeste  
 tuit. Quod itaque veteres ex falsa persuasione  
 opinione se scire existimabant, illud nos ab infini-  
 bili experientia scimus. Simile accidit cum Africa  
 Namque etiam ultra hanc Veteres sine ulla  
 tatione ponebant Oceanum, atque Africanam  
 toto minori spatio ultra Æquatorem protendit  
 mabant, quam revera est. Sed cum Lusitanici  
 Africa navigassent atque vastas hic Terras  
 etiam ultra Æquatorem tractu invenissent, tunc  
 vero dubitabatur, an posset circumnavigari Africa  
 (ut ita in Indiam iter pateret) hoc est utrum  
 Africa extenderet se usque in Austrum, an vero  
 Oceano cingeretur. Hæc dubitatio sublata est à Vasco  
 Gamma navarcho, quo primo Duce anno 1497  
 circumnavigata est Africa, invento ejus ultimo  
 versus Austrum termino, Promontorio, quod  
 Caput Bonæ spei appellationem accepit à Rege Lusitanico  
 anno 1494, cum Diazius, qui primus de eo re-  
 (etsi ipse non superaverit deficiente committente  
 urgentibus tempestatibus) de promontorii  
 procelloso Oceano multa apud Regem commu-  
 nasset.

Di-  
 tres h  
 pote  
 ria.

O  
 toto  
 quar  
 integ  
 tractu  
 Ocea  
 thio  
 signi  
 inter  
 voce  
 nym  
 quon

Si  
 Aqu  
 nu de  
 tur e

Fr  
 inter  
 mari  
 mari  
 rum

Tr  
 riri p  
 bus.

Oc  
 partes  
 situs  
 riana  
 sunt,

## PROPOSITIO II.

*Differentia in partibus Oceani, qua à Terris oritur, tres habet species, sive Oceani aqua in tres quasi species potest dividi, qua sint, 1. Oceanus particularis sive Maria. 2. Sinus maris sive Oceani. 3. Freta.*

Oceani vox sumitur dupliciter. Interdum pro toto Oceano sive Aqua, quæ Tellurem ambit: aliquando & quidem frequenter pro quavis istius integri Oceani parte, quæ alteri parti adhæret lato tractu, & quidem ab utroque latere: ita dicimus Oceanus Atlanticus, Oceanus Germanicus, Æthiopicus, Indicus, Chinensis. In hac posteriori significatione propter usum loquendi nos quoque interdum ea voce utimur, etsi plerumque Mare vocemus Oceani integri partem, sed propter homonymiam Maris mox explicandam, Oceani vox frequenter in eo sensu adhibetur.

*Sinus maris* vel Oceani dicitur pars Oceani sive Aqua, quæ inter duas Terras ex Oceano vel alio sinu decurrit donec ad aliquam terram sistatur. Dicitur etiam communiter mare.

*Fretum* dicitur pars Oceani vel sinus Oceani pars, inter duas Terras angusto tractu decurrens & duos maria connectens, sive ab utraque extremitate cum mari conjunctum, per quod ex uno mari in alterum navigatur.

Tres hæc differentias in Oceani partibus reperiri probatur ab experientia & patebit ex sequentibus.

## PROPOSITIO III.

*Oceanus particulares, sive magnas totius Oceani partes, vel Maria, numeramus quatuor, respectu situs quatuor Terra Continentium sive Maximarum Insularum; Germanis, Die offne See! quæ sunt,*



1. *Oceanus Atlanticus*, est ea pars Oceani, quæ inter Veteris orbis littus Occidentale, & Novæ orbis littus Orientale sita est.

Dicitur quidem vulgo *Mar del Nort*, Septentrionale Mare, sed minus proprie, cum ultra æquatores quatuor versus Austrum se extendat. rectius in duas partes dividitur, una ab æquatore versus Septentrionem, altera versus Austrum exporturgetur. Habet itaque ab Oriente, orbis Veteris littus Occidentale, & ab Occidente, Americæ littus Orientale. Versus Septentrionem, coit cum Oceano Hyperboreo sive Septentrionali: Versus Austrum cum Australi.

2. *Oceanus Pacificus*, vulgo *Mare Pacificum*, quod inter Americæ littus Occidentale & Asiæ interjacet ingenti tractu usque ad insulas Indias & Philippinas atque Chinam usque.

3. *Oceanus Hyperboreus*, Septentrionalis, circum Terram polarem Arcticam.

4. *Oceanus Australis*, circa Terram Australem, cujus Oceani pars est Oceanus Indicus.

Alii Geographi quatuor partes Oceani continent alia divisione; Atlanticum unum faciunt, sed non extendunt ultra æquatores: hic enim incipiunt secundum, quem vocant Æthiopicum. Tertium numerant cum nobis Pacificum: Quartum, Indicum. Sed nos in divisione nostrâ proximè ad Quatuor Magnas Continentes Terrarum sive ad maximas Insulas. Possunt quoque tres partes constitui, nempe Oceanus Atlanticus, Pacificus & Indicus, sed tunc Atlanticum extendendum latius. Res est non magni momenti: Sequitur quilibet, quod ipsi optimum videtur. Magis est à nostra fictione, quam à Natura dependet hæc divisio.

Ta  
terrari  
Ita  
Indic  
tione

Sin  
quod  
ru. I  
sive p  
rii nu

I.  
ceano  
inter  
usque  
Dicit  
Stra  
der,  
luit,  
Vene

Plu  
nimi  
num  
De  
hujus  
Capu  
Di  
riis n  
alluit  
niam  
ciam  
fus A  
Tunc  
re ibe

## PROPOSITIO IV.

*Partes Oceani accipiunt denominationes à nominibus terrarum, quas alluunt.*

Ita dicimus Oceanus Cantabricus, Britannicus, Indicus, Chinenſis, & plurimæ sunt tales appellationes.

## PROPOSITIO V.

*Sinus Maris sunt duplices, Oblongi & Lati. Alii quoque modo duplices sunt, nempe primarii & secundarii. Illi ab Oceano, hi ab alio sinu oriuntur vel influunt, sive primarii sinus pars sunt vel ramus. Oblongi primarii numerantur,*

I. *Mare Mediterraneum, celeberrimum, ab Oceano inter Hispaniam & Barbariam irrupit, & inter Europam & Africam decurrit longo spatio usque ad Syriam, Asiam minorem & Thraciam. Dicitur etiam mare Internum, Germanis die *Strasse* Belgis *de Straet*, unde *een Straets-vaerder*, nauta, qui ad regiones, quas sinus hicce alluit, navigat, ut ad Syriam, Italiam, Siciliam, Venetias, &c.*

Plurimos secundarios sinus facit vel emittit, nimirum sinum Adriaticum (*Golfo di Venesia*) sinum Theſſalonicenſem, mare *Ægæum*, &c.

De Ponto Euxino non immerito dubites, utrum hujus primarii sinus pars sit dicendus, de quo vide *Caput xv.*

Distinguitur autem mare Mediterraneum variis nominibus desumptis à variis regionibus, quas alluit. Etenim versus Septentrionem habet Hispaniam, Galliam, Italiam, Siciliam, Illyricum, Græciam, Cretam, Thraciam, Asiam minorem. Versus Austrum habet Marocco, Fessanum regnum, Tunetanum, *Ægyptum*. Inde appellationes, mare Ibericum, Gallicum, Ligusticum, Siculum, Baleari-

learicum, Cretense, &c. Exporrigitur ab Occidente in Orientem. Fluvios recipit plurimos.

2. *Mare Balthicum, sinus Codanus*, Germanice *Dost-See* improprie. Irrumpit ex Oceano inter Terras inter Selandiam Daniæ insulam, & Gothiam Sueciæ continentem, ut etiam inter Selandiam & Jutlandiam. Primo oblonga via à Septentrione in Austrum fluit, mox reflectens in longissimo spatio ad Septentrionem excurrit, inter Germaniæ provincias Megapolim, Pomeraniam, Cassubiam, Borussia, Livoniam, &c. ab uno latere, nempe Orientali. Ab Occidentali latere habet Sueciam & Lappiam. Præbet tres secundarios sinus, quorum duo sunt oblongi, nempe Boticus & Finnicus. Tertius est latus, Livonicus mirum.

Fluvios recipit insignes magnitudine.

3. *Mare rubrum, sive Sinus Arabicus, mar di Meæa*, ex Oceano Indico fluit inter promontorium Arabiæ ad Aden urbem & inter Africæ promontorium, atque inter Africam versus Occidentem, & Arabiam versus Orientem decurrit: sistitur ad isthmum Africæ, ad urbem Suez, ubi est statio Clavis Turciæ. Fluvios paucissimos & parvæ magnitudinis recipit. Ex Africa nullum, ut quidam annotant. Exporrigitur ab Austro Euriplaga ad collateraliter Borealis plagæ versus Zephyrum.

4. *Sinus Persicus*, inter Arabiam & Persiam decurrit ex Oceano Indico circa insulam Ormuz. Persiam habet ab Oriente, Arabiam ab Occidente. Sistitur ad provinciam Chaldææ. Exporrigitur à parte Euro-australi ad Zephyro-borealem. Fluvios recipit paucos præter Euphratem & Tigrin jam ante conjunctos.

5. *Sinus California*, Mare Vermejo vel rubrum: Inter Californiam & Occidentale America Mexicana littus decurrit, ab Austro versus

ptent  
provin  
dorni  
quod  
potius

6. S  
tariæ  
ria lo  
so tan  
insula  
rigitu

Hi  
possi  
tuor  
secun  
niæ,  
Balthi

La

1.

no A  
lem S  
plaga  
gum  
Atlan  
cipit  
cum

2.

diam  
Ocea  
sistitu  
cipit i

3.

cul à  
trione  
alia.

ptentrionem. Terminatur ad incognitam Americæ provinciam Tarontæac. Fluvios accipit paucos. Moderni nautæ afferunt Californiam, esse insulam: quod si ita est, non erit hic aquæ tractus sinus, sed potius fretum.

6. *Sinus de Nanguin* inter Coream & Chinæ Tartariæque littora decurrit ad Septentrionalia Tartariæ loca, ubi Tenduc regnum Cathaiæ ponitur: falso tamen, ut hodie quidam censent, qui Coream insulam esse volunt. Fluvios accipit paucos. Exportigitur ab Austro versus Septentrionem.

Hi sunt oblongi sinus, quibus minores addi possunt, ut sinus ad Cambaiam, atque alii. Quatuor posteriores ex enumeratis non præbent sinus secundarios, nempe Arabicus, Persicus, Californiæ, Nanquinensis: sed solus Mediterraneus & Balthicus.

PROPOSITIO VI.

*Latos sinus sive hiantes numero septem, qui sunt,*

1. *Sinus Mexicanus*, mare Mexicanum, ex Oceano Atlantico inter partes Americæ Septentrionalis & Australis, quas separat, fluit: ab Orientali plaga ad Occidentalem. Sistitur ad Isthmum longum inter illas terras, qui impedit ne Pacificus & Atlanticus Oceanus coeant ab hac parte. Fluvios recipit non paucos. Multitudine insularum certat cum mari Ægæo.

2. *Sinus Gangeticus*, Golfo di Bengala, inter Indiam & Malaccensem Chersonesum infunditur ex Oceano Indico: ab Austro versus Septentrionem: sistitur ad regna Indiæ, Bengalæ & Pegu, &c. Recipit insignes fluvios præter Gangem.

3. *Sinus inter Malaccam & Cambaiam* non procul à Gangetico, itidem ab Austro versus Septentrionem infunditur: Sistitur ad regnum Siam & alia.

4. *Mare*



4. *Mare album*, Sinus Russicus. Ex Oceano Septentrionali inter Lappiam & extrema Russica littora influit versus Austrum: terminatur pariter ad Finlandiam, partim ad Moscoviæ regnum. (Præbet parvum quendam oblongum sinum, quæ ad Lappiam extenditur:) ubi celebre & frequentissimum ab Anglis & Belgis Emporium Archangelicum dicitur. Fluvios recipit insignes.

5. 6. *Mare Lantchidolinum*, sinus est inter terras Australis provincias Beach & novam Guineam ab Oceano Indico fluens: à Septentrione versus Austrum exporrigitur: terminatur ad incognitam Terram Australis. Huic alius sinus vicinus est versus Occidentem inter Beach & Terram aliam Australem procurrentem, ubi est Terra dicta Anthonii à Deden, quod est nomen Belgici Prætoris navalis, in quo detecta est hæc terra.

7. *Mare Hudsonii*, sinus est inter Novam Franciam & Canadam aliasque Americæ Septentrionalis ex Oceano Septentrionali infusus. Terminatur ad Estotilandiam.

### PROPOSITIO VII.

*Freta sunt triplicia. Vel enim conjungunt Oceanum cum Oceano: vel Oceanum cum sinu: vel sinum cum sinu.*

Enumerabimus quindecim, quorum tria sunt celeberrima & præcipua.

1. Primo loco merito numerandum est **MAGELLANICUM FRETUM**, quod & celeberrimum & longissimi est tractus: Conjungit Oceanum Atlanticum cum Pacifico, atque ex uno in alterum præbet Transitum. Longitudo est ab Oriente in Occidentem centum & decem miliarium: latitudo varia, modo duorum miliarium, modo unius, modo quadrantis. Magellanus primus invenit & navigavit anno 1500: et

Valde

Vascul

1513,

lem re

do five

min.

tis. A

Austra

Magel

2.

terram

riente

gellani

no At

gr. 30

3.

danao

citur e

ob cre

denter

dico ab

junctio

4.

tum in

ter Cei

laccam

5. F

li vel

est, se

Europa

Zembla

6. F

Spitzbe

polaren

7. F

merica

dum co

fretum

Vasculus Nunnus de Valboa prius, nempe anno 1513, illud animadvertisse dicitur, cum ad Australem regionem lustrandam istuc navigaret. Latitudo sive distantia ejus ab Æquatore est 52 gr. 30 min. Antiquitate notitiæ hominum cedit aliis fretis. Ad Septentrionem habet Chicam Americæ Australis provinciam: ad Austrum jacent insulæ Magellanicæ Terræ, & *Terra del Fuego*.

2. Huic vicinum est *Fretum le Maire*, inter terram Australem & Magellanicas insulas, ab Oriente in Occidentem, minus longum quam Magellanicum: per illud multo brevior via ex Oceano Atlantico in Pacificum. distat ab Æquatore 54 gr. 30 min.

3. *Fretum Manilhas*, inter Luconiam & Mindanao aliasque Philippinas insulas protensum, dicitur esse centum leucarum, navibus periculosum ob crebras Syrtes: extenditur ab Oriente in Occidentem: conjungit Pacificum Oceanum cum Indico ab illa parte, etsi liberiores in vicinia sint conjunctiones.

4. Plurima freta sunt inter insulas Indicas ipsas, tum inter Insulas & vicinas Continentes, ut 1. inter Ceilanum & Indiam. 2. Inter Sumatram & Malaccam. 3. Inter Sumatram & Bandam, &c.

5. *Fretum Waigati*, per quod ex Septentrionali vel Russico mari in Tartaricum Oceanum via est, sed à glacie clausa tenetur hætenus, saltem Europæis: Jacet inter Samoiedam & Novam Zemblam.

6. *Fretum Glaciale* inter Novam Zemblam & Spitzbergam vel alio nomine appellandam Terram polarem.

7. *Fretum Davis*, inter Groenlandiam & Americam Septentrionalem, sed ejus exitus nondum cognitus, & ideo dubium adhuc est, utrum fretum sit an sinus.

8. *Fretum Forbischers*, si non ad Oceanum Pacificum, saltem ad finem Hudsonii viam præbet Atlantico Oceano.

9. *Fretum Anian*, inter Americam Septentrionalem & Tartariam Asiæ, per quod ex Oceano Tartarico in Pacificum via esse dicitur: sed adhuc incertum. Aliquod tamen fretum esse inter Americam Septentrionalem & Tartariam, atque etiam aliud inter Americam & Groenlandiam, periti nautæ ex eo colligunt, quod in maris Pacifici ea parte, quæ inter Tartariam & littora Occidentalia Americæ Septentrionalis jacet, septingentis milliariibus à Japone ad Americam fluctus maris & motus sit à borea & Zephyroborea, etsi diversi vel ab alia plaga spirent venti (nautæ vocant *de holle Zee van 't Noorden*); sed centum milliariibus ante littus Novæ Hispaniæ omnino cessat ille motus & fluctus, nimirum feruntur ad patens aliquod fretum ultra Novam Hispaniam versus boream situm. Adde, quod in septingentis illis milliariibus reperiuntur multæ balænx, & pisces, quos Hispani vocant Albacores, Bonitos, & Arum: quæ piscium genera circa freta plerunque agitant: ut verisimile sit, eos ex freto vel mari Anian in hanc Oceani Pacifici partem pervenire, cum in reliqua hujus Oceani parte non reperiantur. Verumenimvero plurimi è recentibus omnino negant istud fretum, & vastum mare inter Tartariam sive Coream & Americam ponunt.

10. **FRETUM GADITANUM**, Herculeum, *di Gibraltar*, per quod Oceanus Atlanticus fluit vel efficit finem Mediterraneum. Latitudo minima est unius circiter milliariis: longitudo major: jacet inter Hispaniam & Africam. Olim non fuisse, sed ab Oceano in Terras irrupente extitisse scripserunt Veteres.

11. **FRETUM DANICUM**, *det Sund.*  
Jacet

Jacet inter Daniæ insulam Zeelandiam, & Scandiam. Per illud Oceanus Atlanticus fluit in sinum Balthicum. Latitudo est dimidii milliaria non integri, ubi minima. Huic freto adjungendum est alterum inter Zelandiam & Funen, & tertium inter Funen & Jutlandiam, dictum der Best.

12. *Fauces Arabici sinus.* Sunt ad Aden emporium per quas ex Oceano Indico in mare rubrum via est.

13. *Fretum Persici sinus*, sed minus proprie ita dicitur, quia non est angustior ingressus, quam ipse sinus.

14. *Hellespontus*, fretum satis celebre apud Græcos, per quod ex Ponto Euxino in Propontidem via conceditur. Huic vicinum est aliud fretum, dictum *Bosphorus Thracicus*, quo ex Propontide in mare Ægeum pervenitur.

15. *Fretum inter Siciliam & Italiam.*

Quidam existimarunt, fretum quoddam esse ad latus Septentrionale Virginæ, ad latitudinem 40 gr. per quod jungatur Oceanus Atlanticus Pacifico, & libera via ex Europa in Chinam & Philippinas concedatur: Sed frustra id per Hudsonium anno 1609 tentatum fuit. Sic itaque explicavimus differentias partium Oceani à Terrarum situ existentes, sicut capite octavo differentias Terrarum ab interfluente Oceano ortas ante oculos posuimus. Ad quorum omnium faciliorem memoriam non inconsultum erit, si adolescentes periplum oræ maritimæ Terrarum & Oceani tractus uno quasi intuitu perlegant. Ad faciliorem situs partium Telluris memoriam facit quoque non parum cognita habere littora Oræ maritimæ continentium, atque eorum conjunctionem: item partium maris connexionem & situm.

Periplus oræ maritimæ Veteris seu nostri qui



comprehendit Europam, Asiam atque Africam, Orbis, est hic. Terminus ejus versus Septentrionem est fretum Waigats: Hinc itaque placet incipere. Freto Waigats adjacet provincia Samoieda, & versus occasum progrediendo provinciæ regni Moscovitici, ubi etiam terra sinu factò recipit Mare album è Septentrionali: Dein est Lappia, & versus occasum Norwegiæ littus jacens à Septentrione ad Austrum. Hic factò flexu ad Orientem littus Scaniæ & Gothiæ, ubi iterum factò sinu, cujus alterum latus Jutlandia, recipit mare, quod dicitur Balthicum, affluens ad Sueciam, Finlandiam, Livoniam, Borussiam, Cassubiam, Pomeraniam, Megapolin, Holsatiam & Jutlandiam. Tunc sequitur alterum littus Jutlandiæ, & Holsatiæ, Frisiæ, Hollandiæ, Zelandiæ (ubi mare dicitur Germanicum) Galliæ, Hispaniæ. Hic iterum fit divaricatio, factoque sinu recipitur Mare Internum alluens Hispaniam, Galliam, Italiam, Illyricum, Græciam, Thraciam, Asiam minorem, Ægyptum & Barbariam, ubi ad Marocco iterum littus è regione respondet littori Hispanico, & sequitur postea littus Occidentale Africæ ad promontorium Viride, ubi littus flectitur ad Ortum, nempe hic sunt Guinea, Angola, Congi versus Austrum ad promontorium Bonæ Spei, ubi iterum versus Septentrionem littus flectitur Mozambique, Soffala, & sinus efficitur pro mari rubro seu Arabico: sequitur littus Arabiæ, hinc sinus Persici littora, & versus Orientem littora Persiæ, Cambaiæ, Indostanis, Indiæ Malaccensis, Bengalæ, Camboiæ, Chinæ, Tartariæ ad Coream, vel ad fretum Anian, unde per littora Tartariæ Septentrionalia & Samoiedæ reditur ad Fretum Waigats.

Circumscriptio seu periplus Americæ est hic:

Incipiemus à littore Freti Davis, ubi sinu factò recipitur Mare Hudsonii: hinc factò reflexu littora

tora Estotilandia, Novæ Angliæ, Franciæ, Virginiæ, Floridæ, Mexicanæ, Isthmi Americani, Castiliæ del Oro, Guianæ, Caribanæ, Brasilæ, Chicæ: hic littora freti Magellanici versus Austrum spectantia, sed ab Ortu versus occasum extensa: hinc ab Austro ad Septentrionem decurrit littus Chili, Peru, Isthmi Americani, Mexicani, ubi ad Californiam sinu facto recipitur Mare Vermejo: hinc littora Californiæ, novæ Albionis, Quirivæ, regni Anian, ubi littora freti Anian, quod hodie negant existere, & sequuntur littora ignota, quæ ad Fretum Davis extendantur.

Circumscriptio Terræ Septentrionalis polaris est hæc. A freto Davis littora Groenlandiæ incipiunt, quæ aliquantulum procurunt versus Austrum, deinde redeunt ad Septentrionem, & Spitsbergæ littora dicuntur.

Decurrit dein littus è regione Novæ Zemblæ, & obijcitur Oceano Tartarico: ubi reliqua littora ad fretum Davis ignota sunt.

Terræ Magellaniciæ periplus est talis. A freto Magellanico vel le Maire incipit littus & factis flexibus variis ad Beach regionem, ubi facto sinu recipitur Mare Lantchilonium: hinc littora Novæ Guinæ procurunt versus septentrionem, & redeunt dein ad Austrum, pergunt dein ad Fretum Magellanicum. Ita se habet Terrarum periplus.

*Videamus jam Oceani circumductum.* Inter fretum Davis & Novæ Zemblæ sumimus initium: atque hic mare Hyperboreum, glaciale, Caledonium, Groenlandiæ dicitur: deinde decurrit inter Europæ littora & Americæ, diciturque Oceanus Britannicus, Danicus (ubi finum facit) Germanicus, Gallicus, Hispanicus, (ubi mare Mediterraneum & Mexicanum præbet) Atlanticus in specie: Hic nempe ubi inter Brasilæ & Africæ littora decurrit, dicitur mox Æthiopicus, & fretum

Magellanicum ab una parte ingreditur, ab altera Orientali plaga est Mare Indicum & Australe, ubi inter Africam & Magellanicam porrigitur, dein inter Asiam & eandem Magellanicam, & pervenitur in mare Pacificum, quod extenditur ad Septentrionalia freta Waigatz & Anian, & ad Australe fretum Magellanicum (quo mediante iungitur Atlantico) directe autem appellit ad Americae littora Orientalia, Chili, Peru, Mexicana, Californiae, Albionis novae, &c.

Hiscæ præterea subjungo duas Tabulas, quarum una continet divisionem partium terræ: altera divisionem partium Oceani.

### CAPUT XIII.

*De Oceani atque ejus partium proprietatibus quibusdam.*

#### PROPOSITIO I.

**O**ceani atque omnium liquidorum superficies est rotunda, Sphærica, sive est pars superficiei Sphæricæ, cujus centrum idem est quod Telluris totius, sive Terra.

Hujus theorematis veritas apparet ex illis argumentis, quibus capite tertio probavimus, Telluris superficiem esse Sphæricam, quia tam de qua, quam Terra valent ea, quæ ibi attulimus. Sed quia illæ probationes tantum à posteriori concludunt, placet hoc loco proponere Demonstrationem à priori factam, per quam Archimedes de omnibus liquidis probavit superficiem Sphæricam, supposita hac, tanquam re certa, in Terra sive parte Telluris consistente. Etenim Archimedes in Demonstratione sua supponit tria. 1. Terram in medio sui habere aliquod centrum, adeoque Sphæ-



1. OCEANUM  
cujus sunt partes  
primariæ  
quatuor:

Atlanticum, Mare del Nort. cum Æthiopico inter Europam, & Africam ab uno latere, ab altero Americam interfluens, varia sortitur nomina secundum partes,  
Mare Pacificum, sive mare del Zur inter Asiæ extrema Indicasque Insulas & Americæ Occidentale litus.  
Mare Septentrionale circa terram Septentrionalem, Oceanus glacialis, Tartaricus, hyperboreus, &c.  
Mare Australe circa Magellanicam, cujus pars mare Indicum.

Britannicus.  
Gallicus.  
Æthiopicus, &c.

1. Mare Mediterraneum seu Internum, inter Africam & Europæ regiones decurrens ad Asiam Minorem. Ejus partes sunt  
Mare Ibericum, Ligusticum, Siculum, Creticum, &c.  
Sinus Adriaticus, Golfo di Venetia.  
Sinus secundarii multi, Sinus Euxinus.  
Sinus Corinthiacus, & plures alii.

Oblongi, quorum numero sex, suntque

2. Mare Balthicum sive sinus Codanus, unde finis secundarii  
Livonicus.  
Botnicus.  
Finnicus.  
3. Sinus Arabicus inter Africam & Arabiam.  
4. Sinus Persicus, inter Arabiam & Persiam.  
5. Sinus Californiæ, inter Californiam & Novam Granadam.

2. SINUS

Lati seu hiantes, quorum numero totidem, nempe sex, suntque:

6. Sinus Coreensis, inter Coream & ultimam Tartariæ Chinæque littoram.  
Sinus Mexicanus inter Americam Septentrionalem & Meridionalem.  
Sinus Gangeticus, sive Golfo di Bengala, inter Indostanis littora & Malaccam.  
Sinus inter Malaccam & Cambodiam.  
Mare album à Septentrionali Oceano inter Lappiam & extrema Moscoviam.  
Mare Lantchidol, inter Beach & novam Guineam terræ Magellanicæ.  
Mare Hudsonii inter novam Franciam & Canadam ex Septentrionali Oceano ortum.  
Hi carent fretis.

TELLUS dividitur in TERRAS & AQUAM. AQUA dividitur in fluvios, lacus, paludes & MARE continuum. MARE autem per terras distinguitur in hæc differentias tres.

3. FRETA

Magellanicum, quo ex Atlantico vel Æthiopico mari pervenitur in Pacificum. Est omnium fretorum longissimum.  
Fretum le Maire, vicinum Magellanico, & ejusdem usus.  
Fretum Waigats, quo ex Septentrionali Oceano in Tartaricum itur.  
Fretum Anjan, quo ex Tartarico in Pacificum mare: sed hodie negant illud.  
Fretum Davis, Forbischers, quibus ex Atlantico in Tartaricum vel Pacificum Oceanum pervenitur.  
Fretum Nova Zemblæ, quo ex Hyperboreo & glaciali Oceano in Tartaricum via concederetur, nisi glacies obstaret.  
Fretum GADITANUM, quo ex Oceano Atlantico in mare Mediterraneum via est.  
Fretum DANICUM, det Sund / quo ex Atlantico in mare Balthicum via est.  
Fauces Arabici maris, quibus in sinum Arabicum navigatur.  
Fauces Persici maris, quibus in Persicum.  
Hellepontus & Bosphorus, quibus ex mari Ægeio in Pontum.

De Mari Caspio an peculiare sit, vel an ad latos Sinus Oceani, cujus sit subterranea via, referendum, dubium est.



Spha  
hanc  
( aq  
conti  
expe  
quan  
eam  
terra  
aliqu  
fita  
fatio  
ftrat  
Si fin  
unu  
fatio  
illuc  
erit  
ofte  
fecta  
fatio  
pro  
fa  
D.  
Spha  
hoc  
à pu  
fias  
pro  
qua  
libe  
lan  
eni  
fur  
qu  
ria  
aq  
D

Sphæricæ figuræ esse. 2. Omnium liquidorum hanc esse naturam, ut partibus eorum æqualiter (æquali à centro terræ distantia) jacentibus & continuis inter sese, minus pressa à magis pressa expellatur, quod ab experientia ostendit. 3. Unamquamque liquidi partem premi à liquido super eam existente ad perpendiculum respectu centri terræ, si hoc liquidum sit descendens aut ab alio aliquo corpore prematur. Præter hæc tria supposita Archimedes utitur aliqua Geometrica propositione, quæ in elementis non invenitur demonstrata, & ideo ipse eam demonstrat, quæ est hæc: Si superficies aliqua secetur planis quotcunque per unum punctum transeuntibus, sitque omnis sectio peripheria circuli centrum habens punctum illud, ista superficies est Sphærica, cujus centrum erit punctum illud dictum. Hoc autem facile est ostendere. Sit enim corporis alicujus superficies secta per punctum D plano IFKEP, & sit sectionis linea IFKEP peripheria circuli habens pro centro ipsum, atque in omni sectione per D facta reperiatur peripheria circuli habens centrum D. Ostendendum est, quod superficies ista sit Sphærica, & D esse ejus centrum, D punctum, hoc est, omnia ejus lineæ puncta æqualiter distent à puncto D. Concipiamus enim à puncto D ductas esse quotvis rectas ad alia puncta superficiæ propositæ. Has itaque omnes inter se invicem æquales esse demonstrandum erit. Assumatur quælibet ex illis à D ductis ad superficiem, & per illam atque per rectam DF ducatur planum (Dux enim rectæ se mutuo secantes vel concurrentes sunt in uno plano, per 2 lib. XI Elem.) Hoc itaque planum superficiem secans faciet peripheriam circuli ex hypothesi. Quare ducta illa & æqualis erit rectæ DF, atque ita de omnibus ex D puncto ductis ostendemus, quod æquales sint

ipsi DF, & propterea, quod omnes inter se invicem sunt æquales. Ex quo infertur, superficiem istam esse Sphæricam, habentem pro centro punctum D. Superficies enim Sphærica est superficies curva, intra quam punctum aliquod est, ex quo ductæ omnes rectæ ad illam superficiem sunt æquales.

Hiscæ præmissis, demonstratur sphærica superficies de omni liquido, hunc in modum: sit liquor aliquis consistens EFGH, centrum terræ D, & concipiamus liquorem istum secari plano transeunte per D. Sit facta sectio in superficie liquoris linea EFGH. Ostendendum est primo, hanc lineam EFGH esse curvam, nempe peripheriam vel arcum peripheriæ circuli, cujus centrum sit D. Si enim fieri potest, ut non sit talis peripheria, inæquales erunt rectæ ex D ductæ ad illam: sint ductæ inæquales DE, DG, nempe DG major sit quam DE, & sit DG maxima ex omnibus, quæ ducuntur à D, atque DE sit minima. Ducatur alia recta DF, angulum GDE bifecans ad EFGH, ita ut hæc DF major sit quam DE, minor vero quam DG. Deinde centro D intervallo DF in eodem hoc plano describatur peripheria vel arcus circuli IFKH, cujus peripheria rectam DE ultra punctum E protractam secabit nempe in puncto I, sed rectam DG citra G nempe in K puncto.

Porro centro D intervallo DL, quæ minor sit quam DE, describatur peripheria vel arcus LMN intra liquorem in plano IFKH. Partes itaque humoris contenti intra DLN sive circa peripheriam LMN æquali distantia à centro D jacent & continuæ sunt: sed ex partes, quæ sunt circa MN magis premuntur, quam illæ quæ sunt circa LM, quia illæ premuntur à majori pondere, nempe à majori aquæ copia existente supra illas, quam hæc ad LM.

Ita-

tur  
laru  
At  
Eri  
qu  
line  
atq  
culi  
mor  
cien  
secti  
oste  
talis  
eun  
sequ  
sup  
punc  
itaq  
trum  
ex se  
stum

Oc  
tora,  
nis ab

Hu  
demo  
enim  
centr  
mare  
dium  
superf  
sphæ  
propo  
riori

Itaque partes juxta LM, cum minus preman-  
 tur, expellentur à partibus juxta MN, & hæ il-  
 larum locum occupabunt, neque consistet liquor.  
 Atqui ponebatur liquor consistens esse & quietus.  
 Erit itaque liquor consistens & non consistens,  
 quod est absurdum. Quare rectæ ex D ductæ ad  
 lineam EFGH non sunt inæquales, sed æquales,  
 atque adeo linea EFGH est arcus peripheriæ cir-  
 culi, cujus centrum est D. Eadem autem est de-  
 monstratio de omnibus planis secantibus superfi-  
 ciem liquorum & per D transcuntibus, nimirum  
 sectionem esse arcum peripheriæ circuli centri D  
 ostendetur. Quoniam itaque superficies liquorum  
 talis est, ut, si secetur planis utcumque per D trans-  
 euntibus, sectio semper sit peripheria circuli, ideo  
 sequitur ex demonstrata antea propositione, quod  
 superficies liquorum sit spherica centrum habens  
 punctum D, quod est Terræ centrum; Oceani  
 itaque superficies est spherica habens idem cen-  
 trum, quod est Terræ centrum: quod idem etiam  
 ex sequentis Propositionis confirmatione manife-  
 stum fiet.

## PROPOSITIO I.

*Oceanus non est majoris altitudinis, quam terra lit-  
 tora, atque ideo terra & aqua ejusdem fere sunt altitudi-  
 nis ubique, exceptis montibus excelsis.*

Hujus Propositionis veritas à priori quidem  
 demonstratur per præcedentem propositionem. Si  
 enim superficies Oceani est spherica & ejusdem  
 centri cum Terræ superficie, & vero circa littora  
 mare non est altius, quam terra, ideo neque me-  
 dium Oceani erit altius quam terra, sed faciet ejus  
 superficies cum hujus superficie unam eandemque  
 sphericam superficiem. Verum sine præcedenti  
 propositione ostendemus theorema hoc à poste-  
 riori hunc in modum, ut præcedens propositio



ex hac possit ostendi, si præcedenti Demonstrationi minus fidamus propter factas hypothesefes.

1. Experientia testatur, aquam liberam nec impeditam fluere ex locis altioribus ad loca minus alta. Si itaque circa littora esset locus minus altus, quam in medio Oceano, deflueret pars maris è medio Oceano ad littora, neque consisteret vel tranquillum esset, quod tamen in tranquillitate aëris non deprehenditur.

2. Si Oceanus à littoribus longe remotus esset multo altior, quam mare ad littus, conspiceretur ea altitudo è majori intervallo, quam sphaerica superficies admittit: imo ex eadem distantia videri debebat, ex qua videntur partes Oceani interceptæ inter illam altitudinem & littus. Atqui experientia testatur, quod non conspiciatur è majori distantia, sed quod paulatim pars remotior post viciniorem detegatur, quando è mediterraneis locis ad littus accedimus, & quo quævis pars littori est vicinior, eo prius sive majori ex intervallo à littore conspicitur. Non itaque pars Oceani à littore remota est altior, quam ea, quæ vicina est illi. Quare Oceanus est ejusdem ubique altitudinis tam in medio quam ad littora, neque altior quam terra.

3. Nautæ in medio Oceano altoque pelago versantes, etsi Mathematica instrumenta adhibeant, non tamen majorem ibi deprehendunt altitudinem, quam in partibus littori vicinis; quod certe haud fieret, si mare quandam altitudinem tanquam turrim vel montem elevatum haberet. Sicut enim instrumentis deprehendimus altitudinem turrium vel montium supra subjectas terræ partes, ita quoque si quæ esset altitudo medii Oceani supra vicinas partes, ista nequaquam lateret neque instrumentorum subtilitatem effugeret.

4. In Oceano etiam medio hinc inde reperiantur

tur  
dar  
ma  
tio  
ra  
5  
in  
æq  
nec  
vic  
6  
Oc  
vior  
mu  
aqu  
si h  
tite  
E  
ni a  
Que  
qua  
terr  
tud  
scat  
cluc  
qua  
do  
cresc  
litt  
plen  
ad  
aliqu  
niam  
part  
aute  
quar  
altit

tur insulæ, & quidem magno numero in quibusdam partibus, quæ vicinæ sunt Continentibus sive maximis insulis. Non itaque medius Oceanus altior est quam terra, quia non altior est quam littora illarum insularum.

5. Nullus Oceani fluctus diu suspensus permanet in cumulo: sed statim diffunditur ad omnimodam æqualitatem cum vicina parte ineundam. Itaque nec in medio Oceano talis tumor eminens supra vicinas partes erit.

6. Nulla causa dari potest, cur aqua in medio Oceano altior sit, & cur non influat in alveos fluviorum, si horum aquæ sunt depressiores. Videmus enim vel deprehendimus experientia, quod aqua ubicunque sita moveatur ad vicinas partes, si hæc sint minus alta, unde tot inundationes extiterunt.

Ex hisce, ut puto, sufficienter colligimus, Oceani aquas non esse altiores quam littora terrarum. Quoniam itaque paucorum littorum altitudo aliquantum major est quam vicinæ mediterraneæ terræ, in plerisque vero minor, cum terrarum altitudo à littoribus versus mediterranea loca accrescat & tanquam in umbilicos assurgat; inde concludimus, quod Oceani superficies non sit altior quam terrarum superficies. Quod autem altitudo terrarum à littoribus ad loca mediterranea accrescat, sive quod loca mediterranea altiora sint littoribus, id probatur è fluxu fluviorum, quorum plerique oriuntur in locis mediterraneis & fluunt ad Oceanum. Sunt itaque partes mediterraneæ aliquantulum saltem altiores quam littora, quoniam ab illis ad hæc fit fluxus. Fluit enim aqua à partibus altioribus ad loca minus alta. Quasdam autem regiones esse aliquantum depressiores, quam Oceani aquam, non negamus: sed illæ vel altitudine littorum defenduntur, vel aggeribus,

vel aliis interpositis terris. Aggeres tamen plerique facti sunt non propter majorem altitudinem Oceani in naturali suo statu hoc est tranquilli existentis, sed propter impetuofum ejus à ventis vel alia causa concitati motum.

Corollarium. Frustra itaque sunt, qui Oceani aquas altiores esse quam terram volunt, atque ad miraculosam providentiam confugiunt, qua impediatur Oceani in terras exundatio & totius Telluris diluvium. Ostendimus enim aquæ & terræ unam & eandem fere esse sphericam superficiem: plerasque vero terræ partes, ad minimum ipsa littora, habere majorem altitudinem, quam medium Oceanum, atque hanc esse causam, cur Oceanus nequeat inundare terras, quæ major altitudo si in quibusdam littoribus tollatur, ruptis aggeribus vel aucta & appulsa magna aquæ copia, tum vero existunt inundationes. Neque omnino impossibile est vel contra naturam ut tota terra obtegatur ab aqua, ut in fine capituli dicemus.

### PROPOSITIO III.

*Cur mare conspectum è littore videtur in majorem altitudinem & tumorem assurgere, quo à littore remotius est.*

Est fallacia visus, sive ut rectius dicamus, affirmativæ facultatis, quæ multos in eum adduxit errorem, ut Oceanum medium multis stadiis altiorem esse quam littora defendere conati sint. Sed permirum est, illis non venisse in mentem aliorum experimentorum quotidianorum in vita communi, in quibus fallacia ista manifesta satis est. Si enim pavementum aliquod seu aream longo expositam tractu vel seriem columnarum aspiciamus, cuivis videbuntur partes remotiores pavimenti esse altiores quam vicinæ partes, ita ut inde à nostro loco ad remotissimum area videatur paulatim

latim magis magisque elevari, cum tamen ubique ejusdem sit altitudinis. Eodem modo se res habet cum aquis Oceani. Si enim in littore adhibeatur instrumentum Geodæticum librandis locis commodum, deprehendimus nullam remotæ Oceani partis elevationem supra littus, sed potius exiguam aliquam depressionem, ita ut undæ subsideant infra Horizontem littorum.

Causam fallaciæ explicant Optici. Sit oculus A, & conspiciat pavementum sive aquæ superficiem in longum spatium exporrectam a e. Dividatur angulus a A e in partes æquales vel angulos quatuor, qui sint e A d, d A c, c A b, b A a ductis rectis A b, A c, A d. Hæ dividunt rectam a e in partes admodum inæquales a b, b c, c d, d e nimirum remotiores erunt multo majores, ut apparet ex ipso Diagrammate, nempe e d major est quam d e, & d e major quam b c, & b c quam a b. Et si autem hæ partes valde inæquales sint, tamen æquales videbuntur, quia sub æqualibus angulis a A b, b A c, c A d, d A e videntur, atque æstiativa facultas judicabit illas æquali distantia ab oculo A removeri (in quo multum fallitur) atque ideo lineas A b, A c, A d, A e judicat esse A f, A g, A h, A k, ut a b, f g, g h, h k æquales sint; Unde partes b c, c d, d e videntur elevatæ, quasi essent, f g, g h, h k.

*Vel brevius.* Quia oculus magis elevatur ad remota conspicienda, quam ad propinqua ubi deprimitur, ideo etiam remota judicantur esse elevata, & propinqua depressa. Vel, quoniam ad partes vicinas comparamus nostri oculi elevationem, ideo illas depressas judicamus; sed ad partes remotas non ita possumus comparare nostri oculi elevationem, ideo ipsa videntur magis elevata quam revera sunt.

Sic itaque vidimus, ex eo, quod Oceanus con-



templanti è littore videtur altior fieri, quo magis remouetur, ex eo, inquam, non probari quod reuera sit altior.

Aliam causam vel indicium ejus afferunt quidam, nimirum ideo medio Oceano majorem altitudinem quam terræ attribuendam esse censent, quod existiment aliter fieri non posse ut aqua ex Oceano perveniat ad fontes fluviorum, qui fontes sunt in mediterraneis locis, quippe cum aqua non fluat nisi è loco altiori ad depressiorem. Sed alio modo id fieri explicabimus capite ubi de origine fontium agemus.

Possent etiam aliquis ita ratiocinari: mons Teneriffæ non est tam altus (sicut & alii montes) ut possit è tam longo intervallo in Oceano videri, nempe ad sexaginta milliaria Germanica sive è quatuor graduum intervallo, nisi vel ipse montis pes, vel Oceanus sit altior quam mare ad littus Teneriffæ. Ad hoc quid respondendum sit, patet è capite IX, ubi de altitudine montium egimus.

#### PROPOSITIO IV.

*Causam & ortum sinuum atque fretorum Oceani explicare.*

Sinus hi proprie loquendo, Terræ sinus sunt, non Oceani, sed potius Oceani brachia, rami & procurrentes partes. Magis proprie possumus appellare sinus Oceani, ubi hic in se recipit peninsulas terræ, ut ubi Jutlandiam, Malaccensem Chersonesum, Californiam &c. recipit.

Verum usus loquendi obrinuit, ut contra rerum naturam in prima significatione usurpetur ita vox, atque sinus Oceani sit idem quod ramus Oceani vel pars procurrentis.

Causa sinuum horum est, quod partes terræ exstantes alicubi avulsæ à se invicem sunt & divaricantur, ita ut pars terræ inter divaricatas interjecta  
sit

fit magis depressa quam Oceani superficies. Aqua igitur ad depressiorem locum semper tendens infuit inter divaricatas partes atque eoulsque procurrit, donec occurrat terræ elevationi: hic enim ulterius progredi non potest adeoque finem suum seu terminum accipit.

Eadem est causa atque ortus fretorum Oceani siue maris.

Causa vero separationis siue divaricationis partium Terræ (quæ requiritur ad sinuum & fretorum existentiam), est impetuosus Oceani motus & insultus, quando à ventis vel alia causa urgetur: quod cum singulis fere diebus fiat, ut fluctibus terras verberet, inde fit, ut progressu temporis in quibusdam partibus littorum ita concutiat terra, ut ad irruentem Oceani aquam collabatur atque ei viam concedat; Quod si adiacens littori terra sit depressa, multo facilius & celerius oriuntur sinus, nimirum modo littoris terra perrupta sit, inundabit aqua vicinas terras atque ita sinum efficiet, si terra ita depressa sit vel tali materia constet, quæ ab aqua irruente possit educi.

Ita quidem sinus & freta generari posse & novos existere manifestum est: at inde non licet concludere, omnes sinus atque freta, quæ hodie existunt, ita generata esse: Fieri enim potest, ut quædam cum ipsa Tellure vel Oceano extiterint, adeoque ipsi Oceano sint cœva, quandoquidem ab hominum usque memoria nullus novus sinus maris vel fretum generatum est, etsi de Gaditano siue Herculeo freti Veteres Græci tale quid fabulati fuerint, nimirum Calpen montem Hispanici littoris & Abylen montem Africani littoris olim unum fuisse montem tradebant, separatos autem esse ab Hercule, unde montes hosce appellarunt columnas Herculis, & ipsum fretum Herculeum.

De freti inter Siciliam & Italiam, quod ab it-

tum-

rumpente mari factum esse constans fuit apud antiquos opinio, minus dubitandum videtur: nimirum talia parva freta generata esse & similia hodie quoque generari non est negandum. Possunt etiam ex fretis fieri sinus, & contra sinus possunt fieri freta. Ex. gr. Si alterutrum freti Magellanici os, vel freti Manilhas obstrueretur, forent illa freta sinus oblongi. Contra, si isthmus inter Africam & Asiam tollatur, tunc totum mare rubrum fieret, & dici posset fretum, per quod ex Indico Oceano in sinum Mediterraneum perveniretur.

PROPOSITIO V.

*An Oceanus ubique sit ejusdem altitudinis?*

Quod quidem in naturali sua constitutione & remotis omnibus impedimentis Oceani partes omnes sint ejusdem altitudinis, illud patet ex prima propositione, qua ostendimus Oceani superficiem esse sphericam, & centrum ejus esse centrum terræ: inde enim manifeste sequitur, quod debeat esse in omnibus suis partibus ejusdem altitudinis. Verum hic dubitatur, annon sint causæ quædam, quæ faciant ut quædam Oceani partes sint magis altæ quam aliæ; Est enim hoc consideratione dignissimum, & magni momenti, quando de perfodiendis isthmis & committendis maris partibus instituitur consultatio.

Plurimi Oceanum & terras volunt esse altiores circa septentrionem, minus vero altas circa Æquatorem. Ita Aristoteles sentit, libr. 2 de cœlo, c. 2. Rationem afferunt hanc, quod Oceanus à Septentrionalibus regionibus tanquam à fonte videatur profluere. Verum enim vero ex hoc nihil certi concludere possumus: namque an terræ septentrionales, inprimis alvei Septentrionales, sint altiores vel minus depressi quam alvei terrarum Æquatorum vicinarum, illud dubium adhuc est, neque ex mo-

tu illo sufficienter probatur, quia hic non est generalis, sive non deprehenditur in omnibus regionibus Septentrionalibus. Et licet concedatur hic Oceani motus à Septentrione, tamen ex eo non sequitur, Oceanum ibi esse altiorem, quippe ad fugiendum hunc altitudinis excessum Oceanus fuit ab illis locis versus Æquatorem. Addit Aristoteles loco citato fabulosam & à Poëtis desumptam rationem, quæ non meretur refutationem, Solem nimirum abdere & occultare se post regiones Septentrionales, quando occidit.

Origo autem opinionis de majori altitudine Terræ Septentrionalis, quam aliarum, inde videtur exitisse, quod facie ad Septentrionem conversa polum concipimus elevatum supra Horizontem & nostrum locum, atque ideo etiam terræ polum & vicinos tractus Telluris majoris esse altitudinis, quam alias regiones, existimarunt.

Nonnulli Oceanum Indicum inter Africam & Indiam altiorem esse quam Oceanum Atlanticum statuunt, quod ex sinibus nempe sinu Arabico & Mediterraneo probare volunt. Ubi illa simul consideranda est dubitatio: Utrum eadem sit altitudo sinuum, quæ ipsius Oceani, an minor? Inprimis in partibus sinuum extremis, atque maxime in illis sinibus qui per fretum angustius Oceani conjunguntur.

Oceanum Atlanticum atque Indicum esse altiores, quam sinum Mediterraneum, præsertim in extremis hujus partibus ad Asiam minorem & Ægyptum, non est vero absurdum. Etenim Oceanus Atlanticus per angustum fretum Gaditanum influit in sinum Mediterraneum, & verisimile est, Oceani altitudinem esse aliquantum majorem quam fretorum, quia in hisce impeditur liber influxus: Hic quidem parva erit differentia, sed deinde progrediens tam longo & lato tractu inter  
Euro-



Europam & Africam major videtur fieri depressio sinus hujus, quam ipsius Oceani, præsertim cum variis occurrat scopulis, insulis & procurrentibus terris, quæ repellunt aquam allabentem, adeoque imminuunt vel retundunt influxum. Imo si vera sunt, quæ de Rege Ægypti Sesostris, de Dario aliisque Ægypti regibus commemorantur à fide dignis scriptoribus, non est quod dubitemus de illa inæqualitate altitudinis. Etenim Reges illi attentarunt fossam seu alveum ducere è mari rubro in Nilum, ut hac via ex Indico mari & rubro per Ægyptum & hinc per ostia Nili in mare Mediterraneum navigatio institui posset, quæ ingentem commoditatem & utilitatem præberet Ægypto & plurimis regionibus littoris Mediterranei sinus. Verum enimvero susceptum negotium omittere coacti sunt, cum à peritis deprehensum esset, mare rubrum multo esse altius, quam terram Ægypti interioris. Si itaque mare rubrum est altius quam terra Ægypti, erit quoque altius quam aqua fluvii Nili, & per consequens altius quam ostia Nili & quam ipsum Mediterraneum mare. Aquam enim Nili non esse minoris altitudinis, quam sit mare Mediterraneum, ex eo manifestum est, quod in illud fluit. Quare mare Rubrum & ideo quoque Indicum mare est altius quam mare Mediterraneum, saltem ad hujus extremas partes circa Ægyptum, Syriam, Thraciam, & in mari Ægeo.

Præterea alii Ægypti Reges olim, & præteritis seculis Sultani Ægypti, atque Turcici Imperatores, aliquoties de perfodiendo Isthmo, qui Africam & Asiam conjungens disjungit mare Mediterraneum & Rubrum, consilia agitarunt: sed omissi negotii causa fuisse perhibetur, quod Indici atque Rubri maris deprehensa esset major altitudo, quam Mediterranei & littorum huic adjacentium: atque ideo metuendum esset, ne qua è Rubro mari in

Medi-

Med  
rum  
li sitH  
nos  
lius  
utru  
Arla  
to, c  
inte  
risin  
titu  
Rub  
prop  
qua  
qua  
ro a  
cus,  
Oce  
mihS  
terra  
Oce  
dite  
mif  
ri M  
ifter  
Indi  
nus  
dita  
retu  
rane  
E  
mer  
mir  
ad o  
mus

Mediterraneum influens obrueret illorum littorum regiones, imprimis Ægyptum, de cujus humili situ omnes consentiunt Scriptores.

Hoc vero, quod de mari Rubro diximus, alicui non sine causa dubium videri possit, cur nempe illius aqua altior sit quam Mediterranei maris, cum utrunque sit sinus Oceani, Mediterraneum scilicet Atlantici Oceani, Rubrum Indici. Causam esse puto, quod et si utrunque mare sit sinus & per fretum inter terras immittatur ex Oceano, atque ideo verisimile sit, utrunque esse minoris aliquantum altitudinis, quam est Oceanus, hoc tamen in mari Rubro minus sensibile esse quam in Mediterraneo, propterea quod illius tractus multo minor sit quam hujus, & idcirco multo vicinior sit Oceano quam extremæ maris Mediterranei partes. Alii vero aliam addunt causam, quod ipse Oceanus Indicus, ex quo mare Rubrum profluit, sit altior quam Oceanus Atlanticus, ex quo Mediterraneum (quod mihi admodum dubium videtur).

Si itaque Isthmus inter mare Rubrum & Mediterraneum perfoderetur, tunc equidem patentē viā Oceanus Indicus multum aquæ immitteret in Mediterraneum sinum. An vero tantam copiam immisuris sit, ut ex ea regionibus adjacentibus littori Mediterranei maris periculum inundationis existeret, de eo dubito. Fortasse enim ita fieret, ut si Indicus Oceanus plusculum immitteret, tunc minus immitteret Atlanticus Oceanus per fretum Gaditanum, quippe cujus altitudini aliquid detraheretur, si ex Indico Oceano motus fieret in Mediterraneum mare.

Et si vero hæc ita esse non negem, existimo tamen Sultanos Ægyptios & Turcas aliis potius, nimirum politicis rationibus & causis inductos esse ad omittenda consilia de isthmo perfodiendo. Primus scrupulus procul dubio fuit magnitudo operis.

ris. Neque enim foret negotium parvi vel brevis laboris, nec paucorum suntuum, quia isthmus est ad minimum quadraginta milliarium Germanicorum, ubi minima est ejus latitudo, terra petrosa: ducendi essent aggeres non sine peritorum artificum industria, quibus carebant Sultani & Turca.

Secundam causam fuisse existimo, quod ex ea navigatione & freto plus commodi & lucri in Christiani orbis incolas, nempe in Italos, Veneros, Gallos, Hispanos redundare possit, quam in Sultanorum vel Turcarum provincias. Etenim nauta Veneti, Galli, &c. per illud fretum navigarent ad Persiam atque Indiam, & inde remeantes pretiosas illas merces Persiæ atque Indiæ adveherent: quas merces Sultani & Turca malunt terrestri itinere camelis per suas ditiones vehi, ut ita multis locis vegetalia ex illis colligant, qua in re non minima rarior Turcico accedit opulentia. Legi potest hac de re Massens, libro tertio Historiarum Indicarum, ubi describit, quam agere Campson Sultanus Ægyptius rulerit Lusitanorum in Indiam navigationes & commercia.

Tertia causa omitti consilii fortassis fuit, quod Sultani & Turca sciant, Christianos in re navali prevalere, atque ideo metuerint ne fretum illud & adjacentes regiones, ipsamque Medinam Mahometis sepulchrum valida classe & firmo exercitu invaderent, cum per hanc navigationem milites robustos neque itinere defatigatos cum omni necessario commeatu in terram exponere possint.

Aliud fuit consilium Prætoris Indici Lusitani Alphonsi Albuquerquei, qui in animo dicitur habuisse, Nilum ab Ægypto avertere, ducto alveo ex Abassia (quæ Ægypto contermina est intercedentibus tantum quibusdam desertis, & per quam fluit Nilus antequam in Ægyptum veniat) in mare Rubrum, ut ita Ægyptum Turcis redderet  
fici.

sterile  
est, an

Ha  
bro m  
para  
de qu  
altitu

Ve  
fum,  
mani  
Holla  
parvu  
& ips  
rium  
inde  
leme  
titud  
mitti  
fas di  
que  
tes ag  
ubi t  
facti  
agri  
esse a  
densi  
be su  
rum  
liariu  
sent  
nicu  
enim  
ciller  
mun  
Gern  
ter L  
ubi f

sterilem & infructuosam. Verum morte præventus est, antequam quicquam in hoc negotio susciperet.

Hæc de Mediterranei maris altitudine cum Rubro mari & Oceano Atlantico atque Indico comparata explicanda fuerunt, quoniam indicium inde quidam petunt, quod diversa sit partium Oceani altitudo.

Verum illa alio etiam exemplo confirmare possum, si magnis parva licet conferre. Oceanus Germanicus, qui est Atlantici pars, inter Frisiam & Hollandiam se effundens efficit sinum, qui etsi parvus sit respectu celebrium sinuum maris, tamen & ipse dicitur mare, alluitque Hollandiæ emporium celeberrimum, Amstelodamum. Non procul inde abest lacus Harlemensis, qui etiam mare Harlemense dicitur. Hujus altitudo non est minor altitudine sinus illius Belgici, quem diximus, & mittit ramum ad urbem Leidam, ubi in varias fossas divaricatur. Quoniam itaque nec lacus hic neque sinus ille Hollandici maris inundant adjacentes agros (de naturali constitutione loquor, non ubi tempestatibus urgentur, propter quas aggeres facti sunt) patet inde, quod non sint altiorem, quam agri Hollandiæ. At vero Oceanum Germanicum esse altiorem quam terras hæc, experti sunt Leidenses, cum suscepissent fossam seu alveum ex urbe sua ad Oceani Germanici littora prope Catto- rum vicum perducere (distantia est duorum miliarium), ut recepto per alveum hunc mari possent navigationem instituire in Oceanum Germanicum & hinc in varias terræ regiones. Verum enimvero cum magnam jam alvei partem perfecissent, desistere coacti sunt, quoniam tum demum per observationem cognitum est, Oceani Germanici aquam esse altiorem quam agrum inter Leidam & littus Oceani istius: unde locus ille, ubi fodere desierunt, dicitur *het Malle Gat*. Ocea-



nus itaque Germanicus est aliquantum altior quam sinus ille Hollandicus.

Alia est ratio sinuum illorum, qui non oblongo, sed amplo & lato tractu infunduntur inter terras, ut Mexicani, Bengalenſis ſinus, & aliorum; hosce ejuſdem eſſe cum Oceano, à quo nullis anguſtiis ſejuſguntur, altitudinis, non eſt dubitandum: eſſi non ignorem, Hiſpanos olim de hoc dubitaſſe (an mare Pacificum altius eſſet ſinu Mexicano) cum de Iſthmo Americano ſive Panamendi perfodiendo conſultarent, ut ex ſinu Mexicano libera eſſet & commodiſſima ad Peruviam & Chinam, Indicaſque inſulas navigatio. Verum hujus quoque conſilii omiſſi cauſam politicam fuiſſe accepimus; nimirum metuebat Hiſpanus, ne Angli, Belgæ & aliæ nationes uterentur hoc freto & fauces obſiderent, ipſamque Peruviam invaderent. Sane Belgæ non neceſſe habuiſſent navigationem per fretum Magellanicum & fretum le Maire periculoſo & longo itinere inſtituere, cum ad expugnandam Peruviam, vel ſaltem infringendas Hiſpanorum in ea regione vires inſtructiſſimas claſſes mitterent.

Quare, ut hæc concludamus, ita ſtatuum videtur, Oceani partes & ſinus latos eſſe omnes ejuſdem altitudinis (ut Propoſitio prima probat), ſed ſinus oblongos præſertim per anguſtum fretum immiſſos eſſe aliquantum humilioreſ, inprimis in partibus extremis, de quo tamen diligentiores magiſque accuratas obſervationes optarem inſtitui ab illis, qui commoditates experiendi nanciſcuntur: hæc nimirum dubia ſunt. 1. Utrum Oceanus Indicus, Atlanticus, Pacificus ſint ejuſdem altitudinis, an Indicus vel Pacificus altior ſit quam Atlanticus. 2. An Oceanus Septentrionalis proprie dictus, nempe polo vicinus ſive in Zona frigida ſit altior quam Atlanticus. 3. An mare Ru-

brum

brum sit altius Mediterraneo. 4. An Pacificum mare sit altius sinu Mexicano. 5. An sinus Balticus sit æque altus ac Atlanticus. Idem in sinu Hudsonii, in freto Magellanico & aliis observari debebat. De Ponto Euxino dicemus cap. xv.

Fluxus & refluxus continuus maris atque alii fluxus omnino faciunt, ut partium Oceani diversa sit altitudo, & ejusdem partis in diverso tempore sive dici horis. Sed hæ sunt causæ externæ, nos vero naturalem aquæ constitutionem tantum hoc loco consideramus: præterea non ita variant altitudinem in ipso Oceano, sicut in littoribus videtur.

Corollarium. Non itaque assentiri possumus Papyrio Fabiano & Cleomedi, qui summam Oceani altitudinem statuerunt quindecim stadiorum esse (dimidii miliaris Germanici) nisi forte de profunditate intelligenda est illorum sententia, & male pro profunditate posita est altitudo: sicut in Aristotelis versione factum videmus lib. 1 Meteor. cap. xi, in fine, ubi  $\beta\alpha\theta\epsilon\alpha\ \tau\acute{\epsilon}\ \pi\acute{o}\nu\tau\omicron\varsigma$  explicatur per altitudinem maris.

PROPOSITIO VI.

*Profunditas maris sive Oceani in plerisque partibus explorari potest bolide: pauca loca sunt, quorum fundus hætenus nondum attingi potuit.*

Profunditas Oceani varia est, nimirum pro alveorum majori vel minori depressione,  $\frac{1}{10}$  miliar.  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{20}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , &c. in paucis locis integri circiter miliaris Germanici deprehensa est, ubi non sufficiunt funes ad explorandam profunditatem, etsi hic quoque verisimile sit profunditatem terminatam esse non ad ingentem distantiam. Cum hoc tamen non negamus, in profundis alveis quasdam quasi voragines vel alios subterraneos meatus esse.

In sinibus maris profunditas multo minor est quam

quam Oceani, qui alveus est minus profundus sive minus excavatus propter viciniam terræ, sicut eandem ob causam Oceanus ad littora minus est profundus quam in remotis à terra locis, quod accidit ob solam alvei ejus figuram cavam.

Nautæ profunditatem explorant bolide, cujus materia est plumbea, figura pyramidalis, pondus duodecim circiter librarum, si funis sit trium vel plurium librarum, qualis sufficit ad ducentas perticas, etsi alii requirant bolidem plurium librarum. possunt tamen in hac observatione decipi, si funis ab aquæ vorticibus & undis abreptus non perpendiculariter sed oblique descendat.

Ubi autem tanta est Oceani profunditas, ut rudentes vel catenæ non sufficiant, incerta ea manet, etsi quidam ad hujus investigationem aliquid excogitaverint. Observandum esse censent, quantum temporis elabatur interea dum plumbum aliquod noti ponderis descendit ad notam profunditatem, deinde eidem plumbo applicandum esse suber vel medullam sambuceam, aut vesicam inflatam, ita ut hæc statim separetur à plumbo, ubi hoc in fundum maris impegerit: atque ita applicatione facta, plumbum rursus demittendum esse in fundum, atque observandum esse tempus, donec suber redeat ad superficiem maris. Ex hac observatione si conferatur cum observationibus alio loco factis, existimant posse inveniri Oceani profunditatem certis adhibitis Canonibus. Sed & ipsa regularum incertitudo & observationum fallacia & temporis brevitatis tanta est, ut nunquam ista methodo existimem obtineri posse cognitionem profunditatis. Illud satis constat, *profunditatem Oceani in nulla parte esse infinitam, sed ubique fundum habere.* Etenim cum ipsa Tellus infinita non sit, sed rotunda, atque in seipsam recurrente figura, patet quod Oceani profunditas non sit infinita.

finita. Neque ab una superficiei parte se extendit per centrum ad oppositam superficiem, ut ita partes terræ separet à se invicem, quia terra gravior est aquâ, & ideo partes terræ si essent per intercedentem terram separatæ, tamen statim iterum conjungerentur.

Cæterum ex observata hæctenus in plerisque locis profunditate manifestum est, eam fere æqualem esse altitudini sive elevationi montium & locorum Mediterianeorum supra littora, nimirum quantum hæc elevantur & extant supra littorum Horizontem, tantum alvei maris infra eum deprimuntur, sive quantum assurgit terra à littoribus versus Meditæanea loca, tantundem paulatim magis magisque deprimatur usque ad mediū Oceanī loca, ubi plerumque maxima est profunditas. Mutatur profunditas modo in hac, modo in alia parte, varias ob causas. 1. Propter fluxum & refluxum. 2. Cum incremento & decremento Lunæ. 3. A ventis. 4. A ruina vel subsidencia alveorum vel littorum, item si alvei fundus fiat altior progressu temporis à subsidente arena, limo, &c.

#### PROPOSITIO VII.

*Oceanus nullos habet fontes, sed intra cavitates sive alveos terra continetur, non tamen idem numero semper manet.*

Fluviorum aquam è fontibus profilire experientia testatur, & quoniam hoc tot annorum seculis fit, inde necessario sequitur, aquam illam quæ è fontibus continuo tempore fluit ad mare, per subterraneos meatus vel alio modo ad eosdem fontes redire. Eodem modo fuerunt olim quidam Philosophi, qui maria dicebant è certis fontibus scaturire. Neque illos abducebat ab hac opinione magnitudo Oceani & perpetuitas. Aiebant enim per subterraneos ductus vel alio modo ad eosdem



fontes redire, ut ita perpetui fluxus causam redderent. Aristoteles libr. 2 Meteor. cap. 2. conatur demonstrare contrarium, & opinionem veterum refellere: vetum debilis valde est illius argumentatio. Mihi illa opinio refutari posse videtur hoc modo: Si sunt Oceani fontes, erunt vel in extante Terræ parte, vel in ea quæ ab Oceano tegitur, hoc est, in alveo Oceani. Non sunt in extante, cum nullibi ab hominibus sint inventi. Neque dicas, illas forte existere in terris incognitis Septentrionali vel Australi. Hoc enim gratis & sine ulla ratione postulare sibi concedi, impudentis est, imprimis cum ad Septentrionales terras non paucas mare glacie concretum reperitur, & in plurimis illis regionibus, quæ hætenus detectæ sunt, nulli fontes inventi sint. Non itaque sunt fontes Oceani in parte terræ extante. Restat ut probemus, illos neque in parte aquis tectæ, hoc est, in alveo Oceani esse. In hoc si essent, non magis distarent à centro terræ, quam aqua ipsius Oceani, & ideo non fieret ex illis fluxus, sed aqua quiesceret in illis, quippe cuius natura sit & proprietas ut non moveatur à locis depressis ad altiora. Fontes enim omnes altiores sunt fluviorum aqua quam effundunt. Sed objiciat aliquis, violentum hunc esse motum, propterea quod alveus Oceani & terra intus multis sit perforatus ductibus, meatibus, bazarthis sive canalibus, utcunque appellare placet, qui sub terris tractu longo progrediantur, donec in alium alvei Oceani locum immittantur, ut ita horum canalium subterraneorum (qui magnam fatis latitudinem & extensionem intra terram habere possunt) duo sint orificia in alveos Oceani exeuntia. Fieri itaque posse, ut aqua ex Oceano influat in orificium unum ex istis duobus, & per alterum tanquam ex fonte egrediatur, quod facili Diagrammate illustrari potest. Et quia tales sub-

terra-

terra-  
que a  
tes q  
veo  
nim  
Veru  
prop  
utru  
neor  
terun  
(nisi  
enim  
aqua  
ex alt  
ficio  
mit,  
per e  
aliqu  
æqua  
medi  
perfo  
sis A  
Aqua  
in hu  
funde  
quia h  
depre  
culari  
beret  
Si d  
lis in  
quam  
quod  
titudo  
deo,  
cumb  
quæ a

terraneos meatus plurimos esse nihil prohibet, neque absurdum quicquam inde sequitur, ideo fontes quoque maris plurimos esse in ipso Oceani alveo verisimile alicui videri posset (de fontibus enim apparentibus hæc tantum sunt intelligenda). Verum hæc imaginatio vana est, neque cum aquæ proprietatibus concordat. Aqua enim in alterutrum orificium istorum canalium sive subterraneorum meatuum illapsa non egrederetur per alterum orificium, sed in illo impleto quiesceret, (nisi accedente causa violenta sive externa). Etsi enim aqua in illo ductu prematur & urgeatur ab aqua incumbente ipsi orificio, tamen non potest ex altero orificio se exonerare, quoniam huic orificio etiam incumbit aqua, quæ non minus premit, quam aqua incumbens priori orificio, quod per experientiam ita probari potest: Sit in vase aliquo aqua *ABCD*, *AB* est superficies aquæ æqualiter & Sphæricè jacens. Sed per medium vas mediamque aquam sit immissa trabs *RPEF*, quæ perforetur ductu *gh* obliquo, ita ut *g* ex parte vasis *A* sit altior quam foramen *h* ex parte vasis *B*. Aqua igitur tam ex parte *A* quam parte *B* fluere in hunc ductum *gh* & implet eum, neque effunderetur per alterutrum orificium, non per *g*, quia hoc altius est, neque per *h*, quia etsi hoc sit depressius quam *g*, tamen aqua ex parte *B* perpendiculariter ad fundum vasis tendens sive nitens prohiberet effluxum.

Si dicas, aquam alteri orificio subterranei canalium incumbentem minus premere & repellere aquam per alterum orificium immisam, propterea quod ad illud orificium minor ejus sit copia & altitudo, quam ad hoc orificium; ad hoc respondeo, 1. illud quidem fieri, si aqua uni orificio incumbens sit separata & non continua cum aqua, quæ alteri orificio incumbit: at si continua super-

ficie cohæreant istæ aquæ, tunc potius aqua altior per hanc continuam viam movebitur ad minus altam, quam ut per subterraneum ductum feratur ad illam. 2. Etiam si id concedatur fieri aliquando, tamen motus ille mox cessabit, quando nimirum ex loco aquæ altioris tanta aquæ copiæ per subterraneum meatum delata est ad alterum orificium & ei vicinum alveum, ut non amplius sit altior vel major ibi copia, quam ad hoc orificium; neque ulla reddi potest causa quæ efficiat, ut aqua ab hoc alveo iterum alia via regrediatur ad orificium prius, sive ubi aqua altior ponebatur, ita ut hic perpetuo sit altior.

Ex hisce itaque perspicuum est, Oceani nullos esse fontes, sed intra alveum suum perpetuo contineri.

Verum contra hæc quædam objici possunt, quæ digna sunt consideratione.

*Primo.* Probationem nostram supponere perpetuam Oceani quietem sive naturalem constitutionem, & excludere causas externas atque violentas. Atqui nullum tempus est, quo non in aliqua saltem Oceani parte sit causa movens externa vel violenta, ut venti, fluxus & refluxus, terrarum mutationes, &c. Hisce itaque causis efficitur, ut modo in hac parte Oceani, modo in alia sit major altitudo & copia aquæ, quam in alia parte; atque ideo aquam illam altiorem in subterraneis meatibus illapsam vel irruentem iterum effundi in alia alvei Oceani parte, ubi minor est aquæ altitudo propter causam illam externam, & ubi incumbens aqua tunc minus resistit eruptioni vel effluxui, quoniam à causa externa alio movetur vel impellitur. Etsi enim, hæc ita fieri, non possit certa probari ratione vel experientia, tamen neque contrarium, hoc est, ista non ita fieri, potest demonstrari. Itaque ad minimum incerta est ve-

ritas,

ritas, & dubitandum est de hoc problemate. Quod autem tales subterranei meatus & barathra sint sub alveo Oceani, non potest negari, & videntur eorum indicium præbere loca illa Oceani, ubi immensa est ejus profunditas, cum in vicinis partibus tanta non sit. Ad hoc respondeo, etsi admitamus meatus illos subterraneos; tamen non ideo concedendum quoque est, quod ad aliam alvei Oceani partem progrediantur sive in eam excant; & licet hoc ipsum quoque concedatur, tamen cum non in omnibus locis sint tales meatus, & causæ hæ externæ modo in hac, modo in alia parte Oceani dominantur, non sequitur ex allata objectione, quod fontes Oceani sint in aliquo loco, sed quod modo ex hisce partibus alvei, modo ex aliis aqua profluat, ita ut fluxus non diutius duret, quam causa illa externa.

*Secundo*, ita aliquis argumentari posset: Fluxum Oceani perpetuum sentiri à Septentrionali terra vel plaga versus Austrum inter Europam & Americam Septentrionalem, item inter Asiam & Americam Septentrionalem: neque tamen ullum Oceani vel vicinum locum esse deprehensum, quo perveniat ad illas Septentrionales regiones. Cum itaque perpetuus sit hic fluxus, neque per manifestam viam ad illas regiones, unde fit fluxus, perveniat aqua, ideo necessario concludendum videtur, aquas ex aliis Oceani partibus per subterraneos ductus pervenire ad Septentrionales illas regiones, atque ita effundi ibi ex alvei foraminibus tanquam ex fonte, & hinc deinde versus Austrum moveri aquas. Accedit alia causa à priori desumpta. Est enim aqua Oceani in Zona Torrida gravior, quam in locis Septentrionalibus propter majorem salis copiam, ut proposit. VI II & XII probabimus. Itaque in Zona Torrida Oceanus magis premet per subterraneorum meatuum orificia,



quam in locis Septentrionalibus, & ideo in hisce locis minus resistens aqua sinet effluere aquam ex orificiis canalium. Ad hoc respondeo, 1. Fluxum illum Oceani à Septentrione non tantum esse, ut objectio ponit, & sicut quidam in primis veteres de eo sentiebant ( qui quatuor alveis vel ductibus ab ipso polo fluere aquam volebant, sicut etiam quaedam Mappæ Geographicae exhibent ), neque perpetuus est, sed propter frequentiam ventorum Septentrionalium frequenter animadvertitur: præterea ingens & perpetua in illis locis copia nivis & pluviarum auget aquam, & facit ut fluat versus Austrum. Adde quod in aliis partibus alius Oceani motus deprehenditur, de quo vide caput sequens.

*Tertio*, non videtur absurdum, sed potius verissimum, fontes omnium fluviorum in Oceanum se exonerantium simul sumtos, esse fontes ipsius Oceani. Cum enim perpetuo temporis progressu tanta copia aquæ in Oceanum ex illis profluat, procul dubio ad ipsos fontes & alveos fluviorum ex Oceano aqua pervenit, partim per subterraneos meatus, partim per pluvias. De hoc cum nemine certavero: neque de hisce fontibus Propositio nostra intelligenda est: quæsitum enim est, An Oceani aqua in certo aliquo Telluris tractu profluat è terræ cavernis, ita ut ex illis in ipsum Oceani alveum fluat sine intermedia via?

*Quarto*, videtur probari posse fontes Oceani in ipso alveo esse, ex eo, quod in fundo Oceani in quibusdam partibus reperta sit aqua dulcis, quæ quidem non aliter nisi per fontes in fundo illo scaturientes istuc potest pervenire vel existere. Linschotius narrat, in Ormus prope parvam insulam Bareyn dictam, in Oceano hauriri aquam dulcem ab urinatoribus ad profunditatem quatuor vel quinque orgyiarum; & similes fontes in aliis fun-  
dis

dis Oceani & sinuum reperti sunt. Ad hoc respondeo, paucos tales fontes hactenus repertos esse, qui non sufficiant vasto Oceano : præterea neque de hisce fontibus institutam esse quaestionem monuimus antea.

Ex hisce patet, aliquomodo verum esse & recte dici posse, Oceanum habere fontes, sed non in eo sensu, quo de fluviorum fontibus hæc profertur solemus, & in quo Propositionem nostram intelligendam esse diximus. Manifestum quoque hinc est, quid sentiendum sit de illa quaestione : Utrum unum & idem numero mare sit & perpetuo maneat, an aliud atque aliud, cujus partes perpetuo absumantur, & vicissim generentur.

## PROPOSITIO VIII.

*Salsedo siue salsus sapor aquarum Oceani provenit vel existit à particulis salis qua eis admixta sunt. Illa vero unde exstiterint & hodie adhuc augeantur vel conserventur, dubium est.*

Primum Propositionis hujus membrum probat experientia, qua vel vulgo cognitum est, Sal ex aqua marina fieri aquæ decoctione vel Solis vel ignis nostri calore & fervore : in Germania & plurimis aliis locis separatur aqua ignis beneficio : in Gallia Sol magis fervidus idem præstat immisso Oceano in factas foveas, in quibus aliquot mensium spatio exhalante vel educta vi solis aqua concretum sal invenitur. In littoribus multarum regionum, ut Angliæ & aliarum, colligitur salis nigri magna copia : aqua marina inundans sæpissime ea littora, relinquit quotidie aliquas particulas siue humorem, ex quo mox aqua siue subtilior pars exhalat, & relinquitur concretum sal, cujus nigredo deinde per coctionem tollitur, etsi à plurimis littoribus rursus abripitur & dissolvitur ab intruente iterum Oceano ; quæ causa est, cur non in-

veniatur in omnibus littoribus. Cum itaque vulgaris hæc sit experientia, non necesse habuerat Aristoteles falsum experimentum adducere de vasculo cereo in mare demisso.

Ex hisce patet, proximam falsedinis aquæ marinæ causam sive verum subiectum istius falsedinis esse particulas salinas, quæ in ea aqua continentur. Itaque improprie & obscure sine causa loquuntur Aristotelici cum suo Præceptore, quando ab adustione maris facta per Solem, vel ab adustis particulis falsedinem maris provenire dicunt & defendunt. sed de hoc mox pluribus dicendum est.

Nimirum de altero Propositionis membro præcipua est difficultas & controversia: Unde particula illæ falsæ Oceani existant?

Aristoteles siccas exhalationes sive fumos (quos omnes fere adustos & salinæ naturæ esse ait) existimat à Tellure elevatos misceri cum humidis vaporibus, & cum hi in pluvias coierint, decidere cum hisce in mare, atque inde falsedinem falsasque in mari particulas existere. Manifesta ejus verba sunt, cap. 7. lib. 2 Meteor. atque ideo hanc sententiam potissimum defendere videtur, quod ex ea rationem possit reddere, cur mare semper falsum sit.

Alii Peripatetici volunt, atque Aristotelem quoque in suas partes trahere conantur, quod ideo falsedo insit mari, quoniam fervore solis perpetuo aduratur: Indicium esse quod aqua eo minus falsa deprehendatur, quo profundior sive à superficie remotior, in hac vero maxime falsam deprehendi.

Ambæ hæc sententiæ gravibus laborant difficultatibus & absurdis, ut mirum videatur, eis doctorum illorum & quidem Philosophorum animos potuisse acquiescere. *Aristotelis enim opinio hisce*

*urget.*

urgetur; 1. Quod pluvia in Oceano deberet falsa sentiri, quod non deprehenditur, quia expers est falsi saporis. Scaligeri effugium ineptum est, qui id fieri dicit ex eo, quod fumus iste sive exusta evaporationis materia non sit nacta satis temporis, cum & rator sit, & in aëris regione frigidiorē haxerit. Etenim jam à nautis asservata est talis pluvia per aliquot dies, quod tempus certe satis foret aquæ ad ostendendum saporem falsum, si quis ei inesset. 2. Mare minus falsum deberet esse, quando diu non pluit; cuius tamen contrarium deprehenditur.

*Altera opinio urgetur hisce;* 1. Falsum est aquas Oceani eo minus falsas deprehendi, quo funde sunt propiores: pauca localunt, ubi id deprehenditur, nimirum in illis fundis, ubi fontes aquæ dulcis scaturiunt. 2. Experientia testatur, aquam dulcem utcunque diu exponatur fervori Solis, vel ignis, tamen non falsam fieri. Hanc quoque objectionem Scaliger effugere conatur nimis levi subtilitate. Dicit enim illud in hisce observationibus fieri propter aquæ exiguitatem, quæ non crassescat sed resolvatur. At utcunque magnam aquæ copiam sumas, & si vel levi igne urgeas ut resolutio in vaporem, (hanc enim resolutionem intelligit) impediatur, tamen nullum falsum saporem acquirat aqua, nisi quod salis antea contineat. 3. Lacus & paludes etsi sole urgeantur, tamen non falsescunt. Hanc quoque objectionem Scaliger eludere conatur, id accidere dicens propter dulcis aquæ successionem. Atqui idem deprehenditur in stagnis vel lacubus illis & paludibus, quæ tantum à pluvia & nivibus resolutis existunt, ubi non locum habet effugium illud de successionem: Illi enim lacus potius exsiccantur, ubi longo tempore non pluit, quam ut in salem abeant vel falsiores fiant.

Reiectis itaque falsis illis opinionibus de causa



& ortu salis in Oceano, apprehendamus unam è duabus, quæ magis verisimiles sunt, sententiis, neque ullis urgentur difficultatibus, nimirum

1. Particulas hæcæ coæternas vel coævās esse ipsi Oceano, atque ideo de earum ortu non magis querendum esse, quam de ipsius Oceani atque totius Telluris, imo totius mundi ortu & generatione.

2. Si ea causa minus placet, alteram eligemus, nimirum salas istas particulas à terra hinc inde avulsas esse & in aqua dissolutas. Multos enim montes vel scopulos salinos in maris alveo esse certum est. Tota insula Ormus nil aliud est nisi candidum & durum sal, ex quo etiam parietes ædium fiunt, & ideo nullus dulcis aquæ puteus in ea insula invenitur. Multas fodinas salinas in terra esse nemini ignotum est, & capite XI quædam enumeravimus. Sed non opus est particularibus hæcæ exemplis: quin ipsam totam terram consideremus. Hujus enim magna pars nihil fere aliud nisi sal est: à sale enim consistentiam suam habet, quandoquidem Physici Chymix periti recte probant, omnium rerum consistentiam & compactiōnem à sale esse: & experientia respondet; si enim terræ partem duram sumas & in cinerem comburas, nancisceris multum salis.

Nil contra hanc sententiam opponi potest, quod alicujus valoris sit & non facili negotio retundatur. Dicunt enim quidam, impossibile videri, quod partes illæ salis Terræ perpetuo sufficiant, neque aliquando absumentur ab aqua Oceani quæ continue ab eis aliquam partem auferit. Ad hoc enim respondeo, salem ex aqua Oceani non absumi tanta copia ut magna restauratione egeat, & si quid absumatur, id tamen in alio loco reponi, quandoquidem extra Tellurem non auferitur.

## PROPOSITIO IX.

*An aqua dulcior sit in Oceano, quo fundo propior?  
Et cur in quibusdam Oceani partibus aqua dulcis in  
fundo hauriatur?*

Ad prius respondeo, experientiam non testari de ea dulcedine, nisi in quibusdam locis, de quibus altera quaestio loquitur: In hisce locis esse in alveo maris fontes aquae dulcis, diximus aliquoties, in praecedentibus. Naturaliter enim fieri nequit, ut aqua magis salsa existat supra minus salisam, cum illa sit gravior.

Loca illa maris, ubi in fundo aqua dulcis scaturiens reperitur, studiosi rei Geographicæ ipsi colligant à Scriptoribus.

## PROPOSITIO X.

*Aqua Oceani eo minus salsa est, quo propior est Polus:  
Contra, eo magis salsa, quo Aequatori vel Zona Torrida magis vicina existit.*

Hac tamen de plurimis tantum Oceani partibus intelligenda sunt: quaedam enim exceptiones admittit Propositio.

Causa hujus inæqualitatis in salitudine est sextuplex.

1. Quod Solis fervor in Zona Torrida plures vapores ex Oceano attollat in nubes quam in locis Septentrionalibus, qui vapores sunt aquae dulcis, quoniam salis particulae propter gravitatem non ita facile attolluntur. Cum itaque ab aqua Oceani Zone Torridae, vel quo locus propior est Zone Torridae, eo major vaporum copia fervore Solis separetur, inde fit ut relicta aqua magis salsa deprehendatur, quam in Septentrionalibus locis, ubi non tanta aquae dulcis copia separatur propter debilem Solis calorem.

2. Secunda causa est ipse calor aquae vel frigus.

Etenim eadem numero aqua vel cibus salus, ut caro muriatica, intinctum, &c. magis falsedinem gustu sensibilem præbet, quando calidis eis vescimur, quam cum frigefacta sunt, quod cuius ex vulgari observatione ciborum notum esse puto: Calor enim sive ignis particulæ movent & acutiores reddunt particulas salis in cibo tali contentas, atque ab aliis admixtis separant, unde linguam magis & acutius feriunt vel pungunt. Quoniam itaque aqua Oceani eo magis calida est, quo Æquatori propior, vel quo propior est parallelo Solis ad singulos dies, contra eo magis frigida, quo polo propior, sequitur inde, quod aquæ, etsi eandem salis copiam continerent, tamen eo magis salis debeant videri vel gustui apparere, quo Zonæ Torridæ propiores: & quo polo propiores, eo minus falsedo erit sensilis.

3. *Tertia causa* est copia major vel minor salis in diversis alvei Oceani partibus. Etenim sicut in Terræ extantibus partibus deprehendimus, quod non in omnibus sint fodinæ salis, neque ubi sunt, ibi eadem salis copia: idem quoque de parte Terræ, quam Oceanus tegit vel alluit, hoc est, de alveis & littoribus asserendum esse, nemo ibit inficias. Ubi itaque major salis copia vel minera in alveo vel littore Oceani est, ibi aquam magis salis esse, quoniam majori copia salis imprægnata est, facile est concipere. Sic insula Ormuz tota sale constat: itaque vicinus Oceanus admodum salis habet aquas. An vero in alveis & littoribus Oceani existentis in Zona Torrida sit major copia salis vel minerarum salinarum, quam in Septentrionalibus locis, id dubium & incertum adhuc est propter defectum observationum: Verisimile tamen quibusdam videtur propter fervorem Solis majorem in illis locis quam in hisce, quo partes aquæ separantur à terrestribus & salis. Sed fallax hocce indicium est.

4. *Quarta causa* inæqualis falsedinis est pluviarum frequentia vel infrequentia, quibus nives addi possunt. Septentrionalibus locis pluvix atque nives frequentes sunt: in locis Zonæ Torridæ minus frequentes quibusdam anni partibus, quibusdam fere continuæ. Itaque in hisce locis, mensibus pluvialibus, aqua Oceani ad littora minus salsa est, & minus salis continet, quam mensibus siccis: Imo in Malabarici Indiæ littoris plurimis regionibus Oceanus dulcis est mensibus pluvialibus propter magnam aquæ copiam, quæ è jugis Gatis defluens in mare se exonerat. Hæc itaque causa facit, ut diverso anni tempore idem Oceanus sit diversæ falsedinis: quia tamen in locis Septentrionalibus continuæ fere per totum annum sunt pluvia & nives, ideo hîc mare est minus salsum, quam in Zona Torrida.

5. *Quinta causa* est dissimilis solutio sive inæqualis aquæ facultas ad resolvendum saleem & sibi unniendum. Aqua enim calida multo promptius sibi unit saleem, quam aqua frigida. Et si itaque in locis Septentrionalibus, alvei Oceani atque littora eandem vel majorem copiam salis continerent, quam in Zonæ Torridæ locis, tamen quoniam aqua ibi frigida est, non poterit ita prompte & subtiliter dissolvere saleem atque sibi unire, sicut aqua in Zona Torrida, quæ calidiuscula est.

6. *Sexta causa*, est magnorum & multorum fluviorum exoneratio in mare: Sed hæc causa tantum in partibus Oceani, quæ vicinæ sunt littoribus, locum habet; in remotis nihil sensibile efficiet. Ita nautæ affirmant, Oceanum ad littus Brasiliæ, ubi argenteus fluvius se exonerat, falsedinem amittere & dulces latices præbere quindecim miliarium à littore distantia. Idem de Oceano Africano ad littora Congi, ubi Zaire fluvius se exonerat, atque aliis plurimis, annotatum est, & jam



antè in quartæ causæ explicatione de Oceano ad littus Malabaricum Indiæ diximus. Hisce adde fontes in quarundam partium Oceani alveo scaturientes.

Hæ sunt causæ quæ ad varietatem & diversitatem salædinis in diversis Oceani partibus concurrere videntur, ex quibus singulorum marium salædo explicari potest.

Ex quibus etiam facile est perspiciere rationem, cur aqua Oceani Germanici & Septentrionalis sit minus apta ad salem ex illa per coctionem separandum, quam aqua Oceani Hispanici, insularum Canariarum, & viridis promontorii Africae (unde Belgæ magna copia sal petunt & in varias regiones Septentrionales, nempe in Borussia, Polonia, &c. vehunt) nimirum hic Oceanus est propior Zonæ Torridæ, & accipit aquas ex Oceano Zonæ Torridæ, iste remotior est à Zona frigida sive à Septentrione: non tamen negaverim ipsorum alveorum magis vel minus salinam constitutionem adesse. Aqua marina ad Guineam in Oceano Æthiopico præbet una coctione sal candicans instar sacchari, quæ nec mare Hispanicum nec ullum Europæorum largitur una coctione.

#### PROPOSITIO XI.

*Cur pluvialis aqua in medio Oceano dulcis deprehenditur, aqua vero, quam decoctione vel destillatione separamus à marina sive à salsa, nihilominus salsa deprehenditur, cum tamen pluvialis illa aqua etiam extiterit à vaporibus è mari sublatis?*

Frustra hætenus laborarunt veri naturæ scrutatores Physici, hoc est, docti Chymici (non illos ineptos Thrasones intelligo) ut in magnum rei Nauticæ commodum & usum invenirent modum & artem, qua aquam dulcem possent è marina destillare vel abstrahere, sed hætenus, quantum mihi

mihi quidem constat, frustra id tentarunt. Etsi enim tam in decoctione quam destillatione (quæ duo idem sunt) sal relinquatur in fundo vasis, tamen aqua per decoctionem vel destillationem separata adhuc salsa deprehenditur, ut potui hominum non sit apta, quod mirum videtur causam rei ignorantibus. Hanc autem Chymia, hoc est vera Physica, docuit, cujus beneficio cognitum est, duplex esse sal in corporibus; sive duo salium genera, quæ etsi sapore convenient, tamen aliis qualitatibus magnopere discrepant: unum vocarunt artifices sal fixum, alterum volatile. Fixum sal propter gravitatem suam in decoctione & destillatione non elevatur, sed in fundo vasis remanet. At volatile sal est spirituosum, & nihil aliud nisi subtilissimus Spiritus, qui levissimo igne elevatur, atque ideo in destillatione cum ipsa dulci aqua ascendit & arte unitus est propter atomorum subtilitatem. Nec tantum in aqua marina, sed in omnibus fere corporibus hoc sal volatile cum fixo sale reperiri Chymia probat per experientiam, verum in quibusdam majori, in aliis minori copia: majori quidem in herbis acris, minori in inspidis & oleosis. Difficultas itaque consistit in separatione spiritus hujus salis sive salis volatilis ab aqua.

At cur aqua pluvialis in medio Oceano dulcis est non minus ac in terra, cum tamen ea generata sit per abstractionem halituum ex Oceano factam fervore vel calore Solis, aut etiam ab igne subterraneo, quæ evaporatio nihil differt à destillatione?

Quadruplex causa esse videtur. 1. Lenta illa & lenis evaporatio, qua tantum subtilior elevatur pars ex Oceano, quæ etsi spiritum salinum volatilem continet, tamen minori copia eum habet, ac si fortiori calore facta esset exhalatio. 2. Longa via, per quam hic vapor transit, antequam in  
cam

eam aëris regionem perveniat, ubi in pluvias condensatur: in qua via verisimile est, spiritum salinum paulatim separari ab aqueis particulis. 3. Aliarum aquearum particularum in aëre existentium admixtio. 4. Refrigeratio vaporis & coitus sive condensatio. Etenim halitus illi ex Oceano sublati paulatim magis magisque refrigerantur & aliis admixtis vel obviis conjuncti coeunt in crassiorem vaporem sive nubes: in hac refrigeratione & condensatione sive coitu spiritus salini cum ipsis igniculis avolant in locum aëris altiorem.

Cur vero idem non fiat in destillatione, (ubi etiam halitus sublati iterum refrigerantur & condensantur) causa est, 1. quod propter parvam viam adhuc nimis arte conjungitur spiritus salinus particulis aqueis. 2. quod vapor coercetur vase, neque liberum evolanti spiritui exitum concedit.

#### PROPOSITIO XII.

*Aqua marina gravior est, quam aqua dulcis, & una marina altera gravior est.*

Causa è precedentibus est manifesta, quia mirum aqua marina continet sal fixum, quod gravius multo est corpus, quam aqua dulcis. Et ostendimus, quod in diversis maris partibus diversa sit salis copia. Non tamen sequitur, aquam esse graviolem, quo magis salsa est: quia potest illa falsedo à majori copia salis volatilis esse, qui non auget gravitatem, sed minuit, & tamen salissimas reddit aquas.

#### PROPOSITIO XIII.

*Aqua marina non ita facile congelascit quam aqua dulcis: sive, majus requiritur frigus ad aqua marina, quam ad dulcis congelationem.*

Experientia hoc satis ostendit contra Aristotelicos,

cos,  
esse  
na,  
dulc  
est.  
tus  
tus  
gelat  
spirit  
que

Ca  
piat  
C  
seq.  
qua  
vant  
dit i

O  
E  
mar  
fusco  
Guir  
albo  
bica  
Baya  
tur,  
bra t  
colo  
Mar  
esse v  
splen  
ciunt  
simil

cos, qui aquam eo minus congelationi obnoxiam esse defendunt, quo purior est, & proinde marina, quippe magis ab elementari recedens quam dulcis, debebat facilius congelascere, quod falsum est. Causa autem, quod in ipso sale quidam spiritus inest qui congelationi resistit, & à sale separatus nullam omnino patitur à savissimo frigore congelationem, ut notum est Chymix peritis. Est enim spiritus salis medicamentum satis notum & frequentis usus.

## PROPOSITIO XIV.

*Cur Oceanus non sit major, cum tot fluvios recipiat?*

Causa est, 1. quia per subterraneos meatus, ut seq. cap. explicabitur, ad fontes fluviorum redit aqua è mari. 2. quia plurimi vapores ex Oceano elevantur, quorum in pluviam resolutorum pars decidit in ipsum Oceanum, pars in terras.

## PROPOSITIO XV.

*Oceani partes quadam discrepant coloribus.*

Experientia testatur, in locis Septentrionalibus mare videri magis atro colore, in Zona Torrida fusco colore: in aliis locis caeruleo. Circa Novæ Guineæ littora quædam deprehenditur Oceanus albo, alibi flavo colore. In Fretis aqua magis albicare videtur. Ad littora Congi non procul à Baya d'Alvaro Gonzales rivus in mare exoneratur, qui subrubro colore est, accepto à minera rubra terræ, per quam fluit. Sed celebris est propter coloris proprietatem sinus Arabicus, ideo dictus Mare rubrum. Sunt qui nudam appellationem esse volunt, & desuntam ab Erythræo Rege: alii à splendore, quem Solis radii ab eo repercussi efficiunt, rubrum apparere volunt. Sed magis verisimilis & experientiâ confirmata sententia est, ruborem



borem illum oriri ab arena rubri coloris, quæ in alveo hujus maris & littoribus reperitur & ipsi aquæ admiscetur frequenter. Hujus autem admixtionis, quæ contra arenæ gravitatem esse videtur, causa est vehementia fluxus & refluxus aquæ, sive celeritas & agitatio in hoc mari, qua fit, ut arena vel sabulum evehatur & agitetur atque ita impediatur à rapida & continua agitatione maris, ut non possit subsidere. Testantur hoc nautæ, qui aquam maris hujus interdum adeo rubram apparere asserunt, ut sanguis esse videatur: sed si vase excepta relinquatur quieta, mox subsidere rubrum sabulum ad fundum atque in eo conspici. Sæpe accidit, ut procellæ è maris rubri plaga in Arabiam vel Africam irruentes tantam rubræ arenæ copiam secum vehant & in terras projiciant, ut integros hominum & brutorum cætus sive comitatus obtegat, unde deinde Mumia vera existit. Aliæ opiniones plurimæ de hac rubedine reperiuntur apud Scriptores, sed omnes falsas esse experientia, quam adduximus, probat.

An eadem vel alia causa sit, Cur mare inter Californiam & Americam dicatur rubrum (*Vermelho*), nondum legi annotatum à Scriptoribus.

#### PROPOSITIO XVI.

*In quibusdam Oceani partibus quadam peculiaria inveniuntur.*

Celebre est mare *di Sargasso* dictum à Lusitanis, quod non procul à Promontorio viridi Africæ circa insulas salis incipit & se extendit à vicesimo gradu latitudinis borealis ad tricesimum quartum Australis. Color hujus maris viridis videtur, qui tamen ipsius non est, sed herbæ cujusdam exiguorum foliorum, similis nasturtio aquatico, Belgæ vocant *kleyen peterfelie*, Lusitani *Sargasso*. Hujus herbæ folia implicata sibi invicem adeo dense &

con-

cantiuo tractu incumbunt Oceano hujus loci, ut ipsa aqua ægre conspiciatur, & nautæ eminus Oceanum hunc cernentes putent insulam & terras virides esse, neque penetrare possunt per herbas hujus tricas, nisi mediocri saltem vento adjuventur. Baccas herba fert parvas non absimiles nostris ribesiiis, sed insipidas & inanes intus. Unde oriatur nondum constat, quandoquidem nec terræ ita vicinum est mare hoc, ut illi originem suam debeat, neque è fundo sive alveo Oceani excrescere verisimile est, quoniam egregia hic est maris profunditas, & in plurimis locis funium superat longitudinem.

In Oceano non procul à promontorio Bonæ Spei usque ad insulas Tristan de cunha fluitantes conspiciuntur multi arundinacei frutices insigni crassitie, quibus marinus fucus implicatus est vel herba *Sargasso*. Nautæ vocant *Trombas*, vocabulo Lusitanico; & pro certo signo habent, si ibi versantes conspiciant, quod vel vicini sint promontorio Bonæ Spei, vel illud jam superaverint, ubi in Indiam iter instituitur.

Ad littora Insulæ Madagascar ejicit Oceanus corallia rubra & alba, quæ tanquam frutices sub mari crescunt, & licet mollia sint in quibusdam locis, tamen inter Madagascar & Africam scopuli durissimi corallini esse dicuntur.

In sinu Balthico ad littora Borussiae mare ejicit succinum præstantissimum, quod incolæ flantibus certis ventis versus littus reibus ferreis excipere sunt edocti.

Ambra ejicit Oceanus tantum (quod mihi cognitum sit ex scriptoribus) in Zona Torrida, nimirum ad littora Brasiliæ (ubi aliquando frustum quingentarum librarum à milite Belga inventum & Comiti Nassovio Mauritio oblatum), ad insulam Madagascar, ad promontorium viride Afri-

ca,

ca, ad insulam Mauriti (Lusitanis *de Cerne*) ad insulam Sumatram & alias Indicas. Garcias refert, aliquando inventum frustum 2000 librarum, imo quasdam insulas totas constare ex ambra, sed non nominat illas insulas.

In Oceano Æthiopico ad Guineam, Congo & Angola hoc observatur peculiare, quod lateribus & carinæ navium, dum ibi commorantur vel navigant, accrescunt conchæ virides instar graminis, unde navium cursus retardatur & ligna navium exeduntur. In ora Armoricæ Galliæ carinis navium incresecunt volucres informes primo, deinde sensim formantur, rostro in lignum defixo, ubi moveri incipiunt, sensim revelluntur, & mare petunt anatibus similes.

Excrementum Oceani, dictum spuma maris, reperitur multis in locis fluitare, sed in quibusdam majori copia, quam aliis. Belgæ vocant *Sasbeen*.

In Oceano ad Indiæ littora Malabarica & ad Cambaiam serpentes in superficie aquæ feruntur: hoc nautis signum, si forte ex aliis non possint colligere an regionibus illis propinqui sint.

Multis in Oceani locis lens palustris invenitur, ut inter Angliam & Galliam, ad Terram australem, & alibi.

Quatuor milliariibus à Nova Hispania fluitant multæ radices, arundines & folia ficulneis similia, quæ comeduntur, suntque sapore brassicæ.

In primæ Belgarum navigationis ad Fretum Magellanicum descriptione legimus, quod die XII Januarii, anno 1599, aqua Oceani non procul ab ostio fluvii argentei in Brasilia (Rio de Plata) apparuerit rubri sanguineique coloris, sed cum situlâ haustam aquam accuratius inspexissent, deprehenderant, quod innumerabilis vermiculorum multitudo, qui rubro colore erant, in aqua illa contineretur, & manu excepti instar pulicum

hinc

hinc inde saltabant. Nautæ appellant palices marinos, & putant illos à balanis certo anni tempore evomi sive rejici: alii autumant eos provenire ab innumerabili copia parvorum cancerorum, qui ad terram australem deprehenduntur, quæ copia ita mare implet, ut etiam in luce debili, nempe in crepusculo vespertino vel matutino Oceanum nautis præbeat conspiciendum sanguineo colore.

De animalibus, quorum in Oceani diversis locis diversæ species agunt, non est agendi hic locus.

### PROPOSITIO XVII.

*Cur mare noctis splendere & lucere videtur, præsertim si fluctus sint vehementiores à tempestatibus?*

Quæstio hæc sive phænomenon requirit difficilis istius de causis colorum disputationis cognitionem. Variæ de illis Physicorum sententiæ. Ad propositi phænomeni explicationem commodissima ea videtur esse doctrina, quæ colores à certo varioque motu existere sive potius apparere docet. Accuratam expositionem Physicis relinquimus.

### PROPOSITIO VIII.

*Oceanus, vel potius omnis aqua, ejicit corpora terrestria ad littora, imprimis tempore plenilunii.*

Hujus proprietatis, quam experientia satis superque ostendit, causam reddere, non est difficile. Etenim aqua nunquam est sine aliquo motu, qui si rapidus sit & versus unam plagam, deferret terrestria corpora, donec occurratur littoribus, ubi propter cessantem motus aquæ vigorem deponuntur corpora illa terrestria. Verum in Oceano fluctus modo huc modo istuc feruntur. Hisce eodem modo feruntur corpora terrestria, & quoniam fluctus omnes versus aliqua terræ littora tendunt,



dunt, ideo omnia terrestria versus littora deferuntur.

In pleniluniis maxima est Oceani agitatio.

Vana itaque eorum est opinio, qui Oceanum animatum dixerunt, & sensum possidere, quo se purget ab omnibus facibus & terrestribus corporibus. Causa satis hic manifesta est.

#### CAPUT XIV.

*De Motibus Maris in genere; & in specie, de Fluxu & refluxu.*

##### PROPOSITIO I.

**A**qua nullum habet motum naturalem præter unum, quo ex altiori loco ad depressiora loca movetur. Et si vicinus locus aut vicinum corpus sit vel aequalis vel majoris altitudinis, ac superficies aqua, tunc aqua naturaliter quiescit, hoc est, non movetur nisi violenta à causa pellatur & protrudatur.

Manifesta est Propositionis veritas per experientiam vulgarem, si vas aquam continens moveatur. Tandiu enim aqua fluctuat, donec nulla pars alia parte altior sit, hoc est donec sphaericam figuram vel superficiem componant, ut dictum est capite XIII. Etsi autem hic motus etiam habeat causam violentam nempe aëris pressuram vel motum aëris circumcirca Tellurem, tamen quia de hac causa magna adhuc est dubitatio, & adeo manifestus est in aqua, ut non ab externa causa ei advenire videatur, ideo saltem ad distinguendum hunc motum aquæ à reliquis motibus vocetur naturalis. Fit autem hic motus in eam plagam, in qua situs est locus depressior.

## PROPOSITIO II.

*Cum pars Oceani moveatur, totus Oceanus movetur, sive omnes reliquæ partes etiam moventur, sed eo magis, quo parti mota vicinior unaquaque fuerit.*

Quoniam enim si pars Oceani moveatur, necessario locum mutat, & ideo hic locus depressior fit loco vicinæ aquæ, hæc vicina aqua movebitur in hunc locum, & illius vicina in illius locum, & sic porro in reliquis partibus. Minor autem inde exiit motus in partibus remotioribus, quia in locum, à quo pars aquæ mota est, irruunt aquæ vicinæ non ex una plaga, sed ex omnibus circumcirca: deinde in harum particularum locum, quæ jam est peripheria, succedunt partes ex majori peripheria, & in harum locum iterum ex majori: atque sic porro. Quo autem ex majori peripheria aqua in locum eundem fluit, eo minor ejus particula influit, & multo minor si in locum majorem distribuenda sit. Ita videmus, cum lapis injicitur in aquam, truditur aqua in peripheriam, hæc in majorem peripheriam, hujus in majorem peripheriam, & eo minor minusque sensibilis fit motus, quo longius à loco jacti lapidis abest, & licet dein nullus motus videatur, est tamen aliquis admodum exiguus, nisi impediatur ab alio aquæ motu.

## PROPOSITIO III.

*Observare plagam, in quam mare, quod movetur, tendit.*

Eligatur tempus, si ita licet, quo ventus vehemens nullus spirat, & injiciatur in aquam corpus ejusdem fere cum aqua gravitatis, notetur locus ubi injectum est: nempe navicula ibi maneat immota: deinde ubi hoc corpus mediocri intervallo à loco injectionis cum mari fuerit delatum, tunc

tunc ad illius locum alia navicula constituatur, & observetur plaga, in quam situs hujus secundæ naviculæ à priori vergit. Hæc erit etiam plaga, in quam mare eo tempore dicemus moveri.

PROPOSITIO IV.

*Motus maris vel est directus, vel vortex & gurges vel concussio.*

Directum voco, qui versus plagam aliquam tendit: Vorticem, cum aqua in gyrum agitur, & alibi absorbetur & rejicitur: Concussionem, cum tremit. Sed sepositis duobus posterioribus ad finem capitis, de directo primo agemus, atque ideo hunc generis voce appellabimus Motum maris.

PROPOSITIO V.

*Motuum, quos in mari deprehendimus, quidam est generalis, quidam sunt proprii, & singulares, quidam contingentes.*

Generalem voco, qui in omnibus fere Oceani partibus deprehenditur & quidem omni tempore.

Proprios sive speciales motus voco, quibus tantum quædam Oceani partes moventur, suntque duplices, perpetui vel anniversarii: illi, qui sine mutatione vel cessatione persistunt, hi qui certis anni mensibus vel diebus in aliquo mari deprehenduntur.

Contingentes motus maris appello, qui sine certo ordine modo cessant, modo incipiunt, quales infiniti sunt.

PROPOSITIO VI.

*Contingentium motuum maris causa est ventus, impellens mare versus plagam vento oppositam. Neque unquam mare liberum est à talibus motibus.*

Etenim cum aër tangat mare, & ventus nil aliud sit quam valida aëris commotio & pressura  
versus

versu  
mare  
mare  
& un  
locu  
let,  
Co  
mod  
regio  
semp  
qui i  
sensit  
cipit

Ge  
nusus  
ex dn  
Refle  
tora,  
prius  
Mo  
tem  
ris eju  
Quor  
ditur  
De  
gantil  
in Oc  
nam d  
& Bra  
Sic  
riente  
de Ma  
xit,  
Atlan  
per fre

versus Tellurem, ideo aër impulsus & protrusus mare expellere de suo loco conatur, & quoniam mare fluidum est, neque resistere potest impetenti & urgenti aëri, ideo movebitur ex suo loco versus locum oppositæ plagæ, atque aliam aquam expellet, & hæc aliam, atque sic porro.

Cum autem semper aliquis ventus sit in aëre, modo hic modo illic, plerunque etiam in diversis regionibus diversi eodem tempore, inde sequitur, semper esse in mari quosdam contingentes motus, qui in partibus vento propioribus magis existunt sensiles, & quidem ideo, quod mare facillime recipit impressionem, quoniam fluidum est.

#### PROPOSITIO VII.

*Generalis motus maris duplex est: Unus continuus ab Oriente in Occidentem; Alter compositus ex duobus contrariis motibus, qui dicitur Fluxus & Refluxus maris, quo mare certis horis fluit ad littora, & certis horis refluit à littoribus. De primo prius agemus.*

Moveri Oceanum ab Oriente versus Occidentem continue, probatur potissimum ex motu maris ejus, quod in Zona Torrida intra Tropicos jacet. Quoniam enim hic fortior motus est, minus impeditur ab aliis motibus.

Deprehenditur is motus maris manifeste navigantibus ab India ad Madagascar & Africam, item in Oceano Pacifico Inter Novam Hispaniam & Chinam & Moluccas, item in Oceano inter Africam & Brasiliam.

Sic per fretum Magellanis fertur mare ab Oriente in Occidentem motu incitatissimo, ut inde Magellanes (vel qui ante Magellanem id detexit, ut volunt) conjecerit fretum, per quod ex Atlantico in Pacificum Oceanum pervenitur. Sic per fretum Maniliense, per canales inter Maldivas



insulas, motus maris ab Oriente naves ducit. In sinum Mexicanum impetuose inter Cubam & Jucatan illabitur mare, effluitque inter Cubam & Floridam. Ad Sinum Parix vehementissimus influxus, ut ideo fretum dicatur Os Draconis. Insignis etiam ad Terram Canadensem. Ex Oceano Tartarico per fretum Novæ Zemblæ & fretum Waigats movetur mare, quod tum ex ipso motu probatur, tum ex copiosa glacie, quam Oceanus Tartaricus in fretum Zemblæ ejcit. Et ad littora Septentrionalia Americæ in Pacifico mari motus fit versus fretum Anian: item à Japone movetur mare versus Chinam: sic in freto Maniliensi motus est ab Oriente in Occidentem; sic in freto ad Javam. Et cum Oceanus Atlanticus moveatur versus littora Americæ, deprehenditur contrarium in Pacifico Oceano. Hic enim à littoribus movetur, quod omnium maxime conspicuum est ad *Cabo des Correntes* inter Panamam & Limam.

#### PROPOSITIO VIII.

*Venti saepe immutant motum generalem maris, imprimis statim illi, quos motiones appellari dicemus in XXI cap.*

Quoniam enim hi spirant plerique ab Austro & Borea vel ab horum collateralibus, inde fit, ut mare quod propter generalem motum tendit versus Occidentem, moveatur versus plagas collaterales Occidentis, nempe versus Zephyro boream, vel Zephyro austrum: imo generalis ventus, cum raro ab ipso Oriente, plerunque à collateralibus plagis Orientis spiret, immutat hunc generalem maris motum. Multo magis id faciunt venti Septentrionales in mari Septentrionali, ubi generalis motus in paucis Oceani partibus est sensilis.

## PROPOSITIO IX.


*Causa generalis hujus motus maris ab Oriente in Occidentem incerta est.*

Aristotelici putant ( etsi ipsi Aristoteli & ejus asseclis atque omnibus Philosophis Europæis ignotus fuerit ante Lusitanorum navigationes per Oceanum Zonæ Tortidæ ) id fieri à motu calis primo, qui non tantum omnibus stellis sed etiam aëri ex parte & Oceano sit communis, quo ab Oriente in Occidentem omnia transferuntur. Copernicani quidam, ut Keplerus, etsi Lunam quoque agnoscant hujus motus causam, tamen motum Terræ non parum ad motum illum facere statuunt, nimirum aquam cum non continua sit, sed tantum contigua Terræ, existimant non posse sequi circumrotationem Terræ, atque illam restituere versus Occidentem, dum Terra se subducit ad Orientem, atque ita non mare moveri ab uno loco Telluris in alium, sed Terram partes aquæ relinquere, unam post aliam.

Alii, quibus nec Aristotelica nec Copernicana satisfacit explicatio, ad Lunam confugiunt: hanc Dominam omnium humorum esse, & Oceanum secum circumducere vel trahere ab Oriente in Occidentem volunt. Si quæras, quomodo? occulta est qualitas, inquit, influenza, sympathia, vicina est Terræ, & similia. Sane Lunam esse effectricem hujus motus, admodum est probabile, propterea quod in Noviluniis & Pleniluniis motus iste est multo vehementior quam in quadraturis, ubi motus plerunque exiguus.

Acutissimus Cartesius mechanicum explicavit modum, quo Luna motum hunc Aquæ tum Aëris efficiat. Supponit enim juxta generalem suam hypothefin, quod circa Tellurem circumgyrentur infiniti atomi, quibus spatium usque ad

Lunam expletum sit sine ullo vacuo, quod spatium vocat vorticem Terræ. Sit nempe Tellus FEHG, Aqua 2143, Aër 6587. Vortex Terræ BADC, Luna B. Si itaque in vortice BADC nulla Luna esset, inquit, particulæ ejus vorticis sine impedimento circumrotarentur circa centrum T: quia autem Luna in eo est, ideo spatium, per quod materia cælestis fluit inter B & T, redditur angustius, atque inde sequitur, materiam istam cælestem ibi celerius fluere (inter B & T) atque id eo magis premere tum superficiem aëris in 6, tum superficiem aquæ in 2, quam si Luna non esset in vorticis diametro BD: cumque corpora aëris & aquæ sint fluida, & facile pressioni isti obsequantur, ipsa minus alta esse debere supra Terræ partem F, quam si Luna esset extra hanc diametrum BD, ac è contra, esse altiora versus E. Dum autem Terra fertur ab E per F, versus G, sive ab Occidente in Orientem, aquæ tumor 412, itemque aëris 856, qui nunc parti Terræ E incumbunt, paulatim ad alias ejus partes magis Occidentales migrare, ita ut post sex horas incumbant parti Terræ H, & post horas duodecim parti Terræ G. Unde fit, ut aqua & aër ab Orientalibus Terræ partibus in ejusdem partes Occidentales fluxu continuo ferantur. Ita Cartesius. Nervus demonstrationis in eo est, quoniam Terra EFGH cum aqua 1234 circumrotatur & una cælestis materia vorticis inter BADC & 6587, Luna vero in B existens facit spatium B 6 angustius, ideo materia cælestis cum pressura quadam angustius B 6 transiens aërem & aquam, dum transit infra B, exprimetur versus IHG, & dum I transit infra B, exprimetur versus HGF, & sic porro. Neque enim materię cælestis pars ad Lunam allapsa in BD, sursum resiliet, quia repellitur, ideo quod omnia plena sunt corporum. Et licet premat aërem & aquam à



spatium  
 E H G,  
 A D C,  
 la Luna  
 impedi-  
 : quia  
 nod ma-  
 r angu-  
 ram ca-  
 que id-  
 6, tum  
 esset in  
 aëris &  
 sequan-  
 rra par-  
 metrum  
 a autem  
 b Occi-  
 que aë-  
 t, pau-  
 les mi-  
 i Terræ  
 nde fit,  
 ribus in  
 nuo se-  
 ionis in  
 ua 1234  
 icis in-  
 stens fa-  
 cælestis  
 iens aë-  
 rimeter  
 rimeter  
 materiz  
 sursum  
 ia plena  
 quam à  
 62 F





62 F  
 etiam  
 62 F  
 recedu  
 fita in  
 pue re

Sed  
 mus h

1. S  
 na ad  
 qua q  
 rum T  
 ticalis  
 experi  
 vero n  
 vitari

2. N  
 plane  
 ria cal  
 verius  
 Terra  
 materi  
 tius qu  
 sola pa  
 ficiente

3. L  
 deretur  
 cident  
 non fit

4. J  
 motum  
 tum ge  
 ortum  
 depreh  
 vertice  
 Cartesi  
 hypoth

62 F non tantum versus Occidentem E 15, sed etiam versus Orientem 73 G, tamen quia partes à 62 F versus 73 G Orientem sitæ magis magisque recedunt ab istis angustis, partes vero versus E 15 sitæ magis magisque accedunt, ideo ab hisce præcipue recipitur ille impetus.

Sed in hac viri ingeniosi explicatione desideramus hæc :

1. Sequitur ex ea, quod mare detumesceret Luna ad illud accedente, & intumesceret in partibus, quæ quadrante sive sex horis absunt à Luna: nimirum Tumor est in E 15, at in F 26, ubi Luna verticalis est, altitudo minima. Hoc autem repugnat experientiæ, namque in F 26 tumet mare, in E 15 vero minimus tumor. Quomodo hæc absurditas evitari possit, dicemus Proposit. seq.

2. Non sufficienter ostenditur (ipse Cartesius hoc plane omisit) cur, dum in angusto spatio B 6 materia cælestis premit aërem 6 & aquam 2, non æque versus G 37 moveatur, quandoquidem cum ipsa Terra ferantur versus G 37, tam aër & aqua, quam materia cælestis, atque adeo versus Orientem potius quam Occidentem aqua & aër feratur. An hoc sola partium subductione à 6 DB versus G 37 sufficienter caveatur, dubito.

3. Luna accedente ad mare aliquod, deprehenderetur in ea parte ventus vehementior versus Occidentem ab Oriente, quam alio tempore. Id vero non fit.

4. Manifestius est, Solem efficere illum aëris motum ab Oriente versus Occidentem sive ventum generalem, quandoquidem illum mane ante ortum Solis & cum ortu Solis in plerisque locis deprehendimus: Tunc enim quadrante abest à vertice loci. Hæc considerationem merentur in Cartesiana explicatione, ut nihil dicam de ipsa hypothesi.

An vero hic Oceani motus possit referri ad generalem ventum Orientalem, dubito. Etenim cum ventus ille sub Zona Torrida perpetuus sit, videtur etiam motum illum Oceani perpetuum posse efficere. Sane cum augescente vento augeri motum hunc Oceani, apertum est: sed illud non est sufficiens indicium, motum ipsum à vento dependere. Obstat connexio illa, quam motus hic cum Luna habet, nempe quod Luna ad mare appropinquante, turgescere facit illud, quod in plenilunio & novilunio vehementior sit motus ille maris ab Oriente in Occidentem, in quadraturis minus vehemens. Quod equidem Cartesii demonstratio egregie explicat, nimirum quoniam in novilunio & plenilunio Luna propior est Telluri, & sic angustior redditur porta B 6 pro transitu materiae caelestis, & ideo major pressura. Et quamvis cum Luna plena est, possit illa intumescencia referri ad majus lumen Lunæ, tamen cum Luna nova est, cessat illa ratio; atque ideo evincitur, Lumen non esse causam hujus motus, sed potius pressuram illam Cartesianam, ut in sequentibus dicemus.

#### PROPOSITIO X.

*Secundus maris motus generalis est Fluxus & Refluxus Maris, quo mare intervallo duodecim horarum cum dimidia circiter ad littora pleraque fluere & ab iis refluere animadvertitur: affluere quidem, cum Luna accedit ad Meridianum supremum vel inum: refluere, quando Luna recedit à Meridiano versus Occasum, & versus Ortum.*

Ubi primo querendum, an Oceanus hoc motu versus unam plagam certam moveatur, nimirum ab Oriente in Occidentem, & ab Occidente in Orientem?

Etenim littora sinus, alveique fluviorum, in  
qui-

quibus affluxus hic & refluxus manifestius deprehenditur quam in alto pelago, juxta diversas plagas extenduntur, quaedam versus Orientem ab Occidente, ut sinus Mediterraneus, quaedam ab Austro versus Septentrionem, ut sinus Arabicus &c. Et in singulis hisce sinibus & littoribus affluit aqua versus plagam extensionis, adeoque in diversis sinibus & diversis littoribus motus iste Oceani in diversas plagas tendit. Itaque primo inquirendum, an motus iste Oceani nullam plagam certam observet, sed alibi alias ad plagas moveatur, an vero duas plagas observet, nempe Occidentalem in affluxu, & Orientalem in refluxu? an vero unam & eandem plagam tam in affluxu, quam in refluxu, nimirum Orientalem? Ad quod respondeo, posterius verum esse, nempe quod totus Oceanus in affluxu moveatur ab Oriente versus Occidentem; in refluxu autem moveatur quidem motu generali itidem ab Oriente ad Occidentem, sed tamen in affluxu in certam partem majorem copiam affluere, in refluxu vero (proprie loquendo, defluxu) non in contrariam plagam moveri sed in eandem Occidentalem, affluere autem minorem copiam.

Nimirum ita statuendum est, quod Fluxus & defluxus maris non sit distinctus motus à generali illo motu, quem priori propositione explicavimus, quo Oceanus continue movetur ab Oriente in Occidentem, sed quod sit hujus generalis motus quidam modus seu affectio. Et ideo si hic motus spectetur & consideretur in toto vel medio liberoque Oceano, minus recte dicitur fluxus & refluxus maris, sed fluxus & defluxus, imo ne hæc quidem apta sunt vocabula, sed rectius dicitur intumescencia & detumescencia, ita ut peculiaribus appellationibus qualitas motus seu fluxus ab ipso motu & fluxu distinguatur.



Etenim mare semper fluit ab Oriente in Occidentem, refluxere autem tantum apparet propterea quod cum in uno tempore majori copia & vehementia ad certum locum affluit, deinde in alio tempore hic impetus cesset. Cæterum refluxus id eo appellatus est propterea quod in sinibus & littoribus mare accedere & recedere videtur juxta extensionem sinuum & littorum, quod tamen non propter ipsius motus qualitatem, sed propter situm littorum & sinuum accidit, nempe ut in contrariam plagam remeet aqua, sed quod decedit mare, hoc non à situ littorum, sed ab ipsius motus conditione provenit.

Neque debet vel potest motus maris spectari ex appulsu ad littora, quia qualiscunque sit motus maris sive in quamcunque plagam fiat, fluctus semper fiunt versus littora, quod fit propter fluidam aquæ naturam.

Quod autem tam in fluxu quam refluxu sive intumescencia & detumescencia mare moveatur versus eandem plagam, nempe ab Oriente in Occidentem, & nequaquam refluat, id colligitur ex eo, 1. In Oceano remoto à littoribus, sub Zona Torrida, nullus alius motus deprehenditur quam is, quo ab Oriente in Occidentem fertur. 2. In fretis quæ directe extenduntur ab Oriente in Occidentem, & quibus Oceani partes junguntur, ut fretum Magellanicum, Maniliense, Javæ, atque alia inter Indicas Insulas, in hisce, inquam, fretis mare quidem intumescit & detumescit duodecim horis, sed mare in detumescencia non refluit ex freto ab Occidente in Orientem, sed defluit per alterum freti orificium in Occidentem, quod manifestum est indicium, hanc intumescenciam & detumescenciam non esse peculiarem motum, sed generalis illius motus modificationem, neque mare refluxere in Orientem. Ideo Scaliget & alii

& alii omnes falluntur, qui duplicem hic motum, in se ipsum replicatum, introducunt.

Id tamen sciendum est, cum dicimus motum hunc fieri ab Oriente in Occidentem, non tantum ipsos Cardines intelligi, sed etiam plagas collaterales; nimirum movetur etiam mare hoc fluxu à plagis collateralibus Orientis ad collaterales Occidentis, imo ad ipsum Boream & Austrum, sed minus valido & urgente motu.

## PROPOSITIO XI.

*Causam intumescencia & detumescencia maris, sive fluxus & refluxus ut vulgo appellatur, exponere.*

Nullum fere naturæ phænomenon est, quod doctorum & physicorum ingenia tantopere exercuerit, quodque plures conatus eluserit. Quidam Mare & Tellurem animal fecere, quod inspirando & expirando efficeret refluxum & fluxum. Alii ingentem vorticem prope Norwegiam, qui sex horis aquam rapiat & sorbeat, & totidem exspuat, causam dixere. Scaliger atque alii littora, inprimis America, putarunt esse causam, quod illa mare generali motu appulsum repellant. Sed plurimi, cum viderent connexionem hujus intumescencia & detumescencia cum motu Lunæ, ab hac sola illam dependere statuerunt: Sed quomodo? Hoc opus, hic labor erat: ubi nihil illi aliud respondebant, quam Lunam trahere humores secum per occultam qualitatem & sympathiam. Verum hæc verba tantum sunt, quibus nihil aliud dicitur, quam effectum illum fieri à Luna modo aliquo, qui nos lateat. At iste modus quaerebatur.

Cartesius illum ex generali sua hypothesei deducit hac ratione. Resumat Diagramma propositionis IX. in quo ABCD sit vortex ille, qui Terram pro centro habet, quique cum illa & cum

Luna in majori vortice circa Solem fertur. M centrum ejus vorticis, EFGH terra, 1234 superficies maris, à quo majoris perspicuitatis causa Terram ubique tegi supponimus: & 5678 superficies aëris mare ambientis. Si itaque nulla in isto vortice Luna esset, punctum T, quod est centrum Terræ, foret in puncto M, quod est vorticis centrum, sed Luna ¶ existente versus B, hoc centrum Telluris T esse debet inter M & D, quia cum materia cælestis hujus vorticis aliquando celerius moveatur quam Luna vel Terra, quas secum defert, nisi punctum T aliquanto magis distaret à B quam à D, Lunæ præsentia impediret, ne illa tam libere fluere posset inter B & T, quam inter T & D; cumque locus Terræ in isto vortice non determinetur, nisi ab æqualitate virium materiæ cælestis eam circumfluentis, evidens est ipsam idcirco nonnihil accedere debere versus D. Atque eodem modo, cum Luna erit in C, Terræ centrum esse debebit inter M & A, sicque semper Terra nonnihil à Luna recedit. Præterea quoniam hoc pacto, ex eo quod Luna sit versus B, non modo spatium, per quod materia cælestis fluit inter B & T, sed etiam illud, per quod fluit inter T & D, redditur angustius, inde sequitur, istam materiam cælestem ibi celerius fluere, atque ideo magis premere, tum superficiem aëris in 6 & 8, tum superficiem aquæ in 2 & 4, quam si Luna non esset in vorticis diametro BD; cumque corpora aëris & aquæ sint fluida, & facile pressioni istæ obsequantur, ipsa minus alta esse debere supra Terræ partes F & H, quam si Luna esset extra hanc diametrum BD, ac e contra, esse altiora versus G & E, adeo ut superficies aquæ 1, 3, & aëris 5, 7, ibi protuberent. Jam vero, quia pars terræ, quæ nunc est in F, è regione puncti B, ubi mare est quam minime altum, post sex horas erit in G, è regione pun-

Et C, ubi est altissimum, & post alias sex horas in H, è regione puncti D, atque ita consequenter. Vel potius, quia Luna etiam interim nonnihil progreditur à B versus C, utpote quæ mensis spatio circum ABCD percurrit, pars Terra quæ nunc est in F, è regione corporis Lunæ, post sex horas cum 12 minutis præterpropter, erit ultra punctum G in ea diametro vorticis ABCD, quæ illam ejusdem vorticis diametrum, in quo tunc Luna erit, ad angulos rectos interfecat, tuncque aqua erit ibi altissima, & post sex horas cum duodecim minutis erit ultra punctum H, in loco ubi aqua erit quam minime alta, &c. Unde clare intelligitur aquam maris singulis duodecim horis cum 24 minutis in uno & eodem loco fluere ac refluxere debere.

Hæc Cartesii est demonstratio, in qua illud imprimis ingeniosum est, quod apte & concinne ostendit, quomodo non tantum ad locum affluxus fiat vel intumescencia, cum Luna ad verticem illius vel Meridianum movetur, sed etiam cum Luna infra Horizontem ad Meridianum mediæ noctis movetur.

Diximus autem in fine propositionis 1x, quænam in Demonstratione hac desiderare aliquis possit: imprimis illud mirum videtur, Cartesio non venisse in mentem, quod juxta Demonstrationem minima aquæ altitudo & omnimoda detumescencia esse debebat, Luna in Meridianum perveniente, ut Luna in B existente, est in 2 & 4 minima aquæ altitudo, & contra, aqua accrescit cum secedente Luna vel Terra, ita ut cum F erit in G h. e. sex horas à Luna, habebit altitudinem seu intumescencia maximam: quod sane est manifeste contra experientiam: cum Lunæ enim accessu ad Meridianum accrescit aqua, & cum decessu decrescit. Cartesii vero tam verba quam Diagram-



ma contrarium asserunt. Caterum existimo, absurditatem hanc removeri posse à Demonstratione, idque hac ratione (modo idem Cartesio videatur). Ponamus enim vorticem Telluris ABCD esse sine Luna, & aquam 1 2 3 4 æqualiter à centro T abesse sine ullo tumore, sed cum Tellure & materia cælesti inter A B C D & 5 6 7 8 circumagi. Accedat jam Lunæ corpus in vorticem hunc, ex. gr. in B, atque ideo spatium T B fit angustius & materia cælestis dum per illud conatur transire, premet aquam in 2 versus E.

Dum itaque aqua expellitur ex 2 versus E, quaeritur ubi maximus aquæ tumor vel cumulus sit futurus, an in loco E, qui quadrante absit à loco F (cui Luna verticalis est) an in loco vicino vel proximo ipsi F versus E. Si primum asseras, nempe in E debere esse tumorem, repugnat experientia: At secundum vere ita se habere, confirmat experientia, & ipsa ratio suadet, nimirum dum Luna consistit super locum E, expelletur aqua ex 2 versus I, sed maximus tumor erit in loco proximo ipsi 2, non in I, sed in hoc I erit minima accretio. Hoc enim experientiâ manifestum est, quia Occidentalia loca serius sentiunt intumescentiam. Ratio vero & motus aquæ leges idem omnino postulant. Si enim aqua effundatur in 2, ut fluat versus E, maxima copia erit in loco E, paulo minor in vicino loco, adhuc minor in hujus vicino, minima in E. Sic itaque cum ex 2 pellitur aqua versus E, maxima ejus copia & tantquam cumulus erit in loco vicino ipsi 2, & eo minor tumor quo ab 2 locus remotior. Quia vero Terra circumroratur ut E veniat in F, tum demum erit in E maximus tumor, & pelletur aqua versus H.

Diagramma itaque Cartesii cum ipsa Demonstratione immutandum est, ut Tumor sit in loco vicino

vici  
quæ  
Phy

I  
Ori  
etia  
Sed  
etia

E

com

gere

dri

frat

hyp

na e

ulla

stro

ri e

est r

pre

qua

I

mer

dam

bere

expl

ma

qua

nio

stius

zara

chas

nilu

nofo

est co

vicino ipsi 2, hoc est ei, cui Luna est verticalis. Alia quæ hic dici possent, tractabimus in consideratione Physicæ Cartesianæ.

## PROPOSITIO XII.

*In plenilunio & novilunio motus maris generalis ab Oriente in Occidentem est vehementior, intumescencia etiam maris major deprehenditur in plerisque partibus. Sed in quadris minimus est motus generalis, minima etiam intumescencia.*

Experientia propositionem hanc satis superque comprobatur: Testantur quippe nautæ, Oceanum turgere & aestuare in pleniluniis & noviluniis, in quadris vero malaciam esse, *calma* dicitur. Demonstratur autem juxta præcedentium propositionum hypothèses facili opera. Est enim Luna, cum plena est vel nova, Telluri propinqua magis quam in ulla alia ejus ætate, in quadris remotissima, ut Astronomi demonstrant. Cum autem Luna Telluri est magis propinqua, hoc est, cum spatium BT est minus, materia cælestis impedita vehementius premet aquam ab 2 ad 1 (quia propinquior). In quadris contra.

In pleniluniis tamen observatur motus vehementior quam in noviluniis, saltem in quibusdam locis, quod sane nisi lumini Lunæ velis ascribere, aliam causam non video. Neque aliter potest explicari, cur in plenilunio, & arbores & animalia majori humorum Oceani copia imprægnata sint, quam in novilunio, cum tamen mare in novilunio æque augeatur. Id tamen mirabile, quod *Twissius* Belga in Descriptione sua Indiæ de regno Guzarath (in quo ipse annos multos egit) refert. Conchas, Cancros atque alios pisces testaceos cum plenilunio omnium minime ibi esse succosos & carnosos, in noviluniis vero omnium maxime, quod est contra omnium aliarum regionum naturam.

Neque minus mirabile videri debet, quod ad littora vicina ostiis fluvii Indi ( ejusdem regni Guzarath ) mare augeatur & turgear in noviluniis, non procul vero inde, nempe in Calecutano mari, augmentum deprehenditur in pleniluniis. Verum accurate prius de hisce inquirendum esse institutis iterato observationibus existimo, deinde causarum inquisitionem tentent, quibus Naturæ contemplatio voluptas est.

### PROPOSITIO XIII.

*Tempore æquinoctii verni & autumnalis, sive in vere & autumno intumescencia maris major & vehementior est, quam aliis anni temporibus; in solstitiis minima.*

Hujus quidem proprietatis demonstrationem Cartesius ex sua hypothese simulat se afferre, at ego eam ex verbis illius non possum concipere, nec video, quomodo ex ipsius hypothese sequatur. Verisimile est, Solem quoque & ventos generales multum facere ad intumescenciam aquæ, cumque in æquinoctiis Sol medio incumbat mari Zonæ Torridæ, ideo vel ipse vel venti efficient, ut mare magis intumescat, quam alio tempore. De solstitiis contrario modo dicendum est. Vel dicemus, eandem esse causam majoris intumescencie maris, tempore æquinoctiorum sive veris & autumnis, quæ est causa frequentiorum pluviarum, ventorum, inundationum in illis temporibus.

### PROPOSITIO XIV.

*In quibusdam Oceani partibus, sinibus, & littoribus magnum est accrementum & decrementum aqua in fluxu & refluxu: in quibusdam exiguum, in quibusdam sensile nullum, adeoque nullus fluxus & refluxus, sive nulla intumescencia & detumescencia.*

Magnum accrementum & decrementum recipiunt

piunt ea loca, 1. quæ sunt in Zona Torrida, intra Tropicos, quippe cum Luna premens plerumque in hac circumrotetur. 2. In locis, quæ directe ab Oriente in Occidentem extenduntur, vel juxta plagas collaterales. 3. In illis sinibus, qui oblongi sunt & minus lati, magis sensibile est accrementum. 4. In illis locis, quibus pauca insulae vel procurrentes terræ adjacent.

Horum prout pauca vel plura in locis desiderantur, eo minor erit fluxus & refluxus maris in eo loco.

Maximus fluxus & refluxus ex hætenus cognitis est is, qui in sinu Cambaiensi in uno ostio fluvii Indi observatur, & multos in admirationem trahit. Etenim ad ingentem distantiam aqua recedit, & quidem celeriter. Unde non sine ratione Indus fluvius vel ille sinus Cambaiensis putatur ille esse, ad quem cum Alexander Magnus pervenisset & trajicere exercitum tentasset, ubi relatum illi est, recessisse celeriter aquam & naves in sicco desertas esse, noluit ultra tendere, sed judicavit, Deos hic metam expeditionis suæ posuisse, & prohibere ulterius progredi: id quod etiam incolæ Cambaiæ referunt. Causa est alvei parva depressio & altitudo. Quo enim alveus magis elevatus, eo majorem partem nudat aqua recedens; sed aliam accedere causam verisimile est.

Ad urbem Damman Indiæ, non procul à Suratte altitudo aquæ per fluxum & refluxum variatur ad  $2\frac{1}{2}$  orgyias, & mare recedit à littore ad dimidium milliare.

In sinu Cambaiensi affluxus auget altitudinem orgyis quinque (alii septem) quæ insolens accretio inexpertis nautis non raro naves perdidit, quippe recedente aqua ad scopulos allisæ sunt.

In freti Magellanici sinibus & littoribus non observatur constans tempus fluxus & refluxus, sed

mode



modo tribus, modo xii horis aqua fluit & refluxit, quæ inconstantia ascribenda est violentæ Oceani irruptioni in illud fretum, & crebris agitationibus à vento.

Circa Malaccam, item ad fretum di Sunda, insignis quoque affluxus & defluxus observatur.

In sinu Arabico sive mari Rubro tantum esse refluxum quidam veteres scripserunt (referente Scalligero), ut Moses cum Israëlitis sine miraculo illud transierit. At falsum est, quia non est tantus ibi refluxus, ut alveum siccum præbeat.

In maris Hudsonii sinu Nelson Thomas Burton Anglus hybernans ad 57 gr. latit. Septentrionalis, observavit singulis duodenis horis aquas accrescere ad quindecim pedes & ultra. Similem affluxum in sequenti ætate deprehendit in loco 60 gr. latitudinis: sed in sinu Hudsons & sinu Sirames non accrescebat aqua ultra duos pedes.

Ad littora Chinæ admodum sensibilis affluxus & refluxus, ut etiam ad insulas Japoniæ.

Ad urbem Panamam in littore Americæ ad mare Pacificum jacentem mare admodum altum evadit & mox deprimitur; in pleniluniis ita augetur affluxus, ut aqua ædes urbis ingrediatur. Imo in omnibus fere littoribus maris Australis mirifice augetur & minuitur altitudo aquæ, ita ut in refluxu ad duo milliaria decrementum sit sensibile, & aqua fugiat visum in littore stantis.

In sinu Bengalensi ad Siamense littus affluxus auget altitudinem aquæ decem pedibus.

In mari autem Mediterraneo, quod per fretum Gibraltar influit ab Occidente versus Orientem, non sentitur affluxus, quia situs est contra plagam, in quam mare movetur, & ideo parum augetur illius aqua per affluxum, ita ut hoc sensibile non sit, nisi in sinu Veneto qui ob longam extensionem & parvam latitudinem ostendit fluxum & refluxum,

xum, cum in reliquo Mediterraneo mari propter latitudinem insignem non sentiat illud parvum incrementum vel decrementum. Unde Græcis fuit ignotus hic fluxus & refluxus maris, uti etiam Romanis tempore Scipionis Africani. Et tam Græci quam Romani ubi aliquando in aliis locis eum sentiebant, habebant pro miraculo, ut constat ex Alexandri Magni expeditione & Scipionis oppugnatione Carthaginis; sed seculo Ciceronis satis cognitus erat Romanis. Quidam tamen ad Massiliam exiguum quid observarunt. Ad littora quoque Barbariæ quædam satis insignis esse dicitur.

In mari vel sinu Balthico, ut etiam toto mari Septentrionali ultra Angliam ad Norwegiam, Groenlandiam, nondum deprehensus est fluxus & refluxus, sicut neque in Pacifici maris boreali littore. Causa nondum satis cognita, nisi dicas illam esse, quod à Lunæ via longe remota sint illa maria, & simul, quod ab Occidente in Orientem & Septentrionem extendantur; præterea multæ insulæ & procurrentes terræ impediunt. Hæc tria conjungenda sunt ad impediendum effluxum maris in hisce locis. Sic enim objectio de mari Hudsonii non habet locum, quippe hoc ab Oriente in Occidentem extenditur, in quam plagam cum mare moveatur, nil mirum est, si in eo affluxus magis sentitur, quam in mari Norwegiæ, Balthico, aliisque Septentrionalibus.

PROPOSITIO XV.

*Affluxus maris est violentus, nempe impulsus, sed refluxus est naturalis aquæ motus.*

Etenim affluxus seu intumescencia fit à premente Luna vel materia inter Lunam & Terram, vel etiam, quia mare non manet in eo situ, quem accipit in affluxu, hoc signum est, violentum fuisse

fuisse motum. At in refluxu sive detumescencia mare movetur à loco altiori ad depressiorem, qui est naturalis aquæ motus.

## L E M M A.

*Dato ex Ephemeridibus vel per supputationem aut Astronomicam Observationem, loco Luna in Ecliptica, & latitudine, atque hora diei, invenire in globo Terrestri illum locum, cui Luna ad datam horam sit verticalis, item exhibere omnia illa Telluris loca, quibus Luna verticalis fiet eo die, nempe uni post alterum.*

Hujus problematis magnus, imo necessarius est usus in doctrina de Fluxu & Refluxu maris. Modum autem illud præstandi reperies c. xxx. Propositione XIII. Ibi enim commodius explicatur: potest tamen anticipari illius Propositionis explicatio, & hoc capite studiosis monstrari.

## P R O P O S I T I O X V I.

*In illis locis maris, cui Luna verticalis est, fluxus & defluxus est maximus, nisi alia impediunt, qua Propositione XIV enumeravimus. Et quo partes maris ab illo loco remotiores sunt, eo minor est affluxus & defluxus, cæteris paribus.*

Quoniam enim in eo loco est pressura major & tumor aquæ major, qui prementi Lunæ & materiæ cælesti est vicinior, inde sequitur id, quod Propositio dicit. Objectiones de locis quibusdam, in quorum comparatione contrarium deprehenditur, per aliarum causarum admixtionem sunt excusandæ.

## P R O P O S I T I O X V I I.

*Quantitas fluxus & refluxus inconstans est in quolibet loco, & diversa ad diversos dies, atque eo ma-*

*Ter vel minor, quæ Luna remotior vel propinquior ei loco sit.*

Etenim Luna singulis diebus mutat locum suum in Ecliptica, atque ideo aliis diebus aliis locis fit verticalis, & per consequens à quovis loco remotior vel eidem vicinior. Quo posito, concluditur ex præcedenti Propositione, quod diversa sit ad diversos dies in eodem loco quantitas fluxus & affluxus, sive sensilis sit diversitas, sive insensilis.

## PROPOSITIO XVIII.

*Maxima aquæ intumescencia in loco quovis & affluxus terminus esse debebat cum Luna Meridianum ejus loci occupat (supremum vel imum) sed in multis locis apprehenditur id fieri alio Luna situ.*

Etenim cuius loco Telluris Luna tum maxime est propinqua, cum in Meridiano ejus loci versatur, propterea quod hypotenusæ Trianguli rectanguli est longior quam cathetus. Unde infertur per Propositionem XVI, quod Luna constituta in meridiano, debeat maxima esse intumescencia, & maxima aquæ altitudo, & statim fieri decrementum. Cum autem Luna in imo Meridiani consistit, tunc opposita illi angustia vorticis Terræ consistit in Meridiano superiori, atque ideo idem efficit, ac si ipsum Lunæ corpus præsens esset.

Verum hic magna existit difficultas. Plurima enim loca & littora Telluris sunt, in quibus deprehendimus, quod terminus affluxus sive intumescencia maxima non sit cum Luna ad Meridianum pervenit (ut Philosophi ante hoc seculum differebant), sed citius vel tardius, nempe cum Luna ad certum Verticalem sive ad certam plagam non Cardinalem pervenit. Et ne hæc quidem plaga constanter observatur, sed in noviluniis & pleniluniis plerumque maxima intumescencia est

&



& detumescentiæ initium, antequam Luna ad hanc plagam vel verticalem circulum pervenit. Sic Londini aqua altissima est, cum Luna pervenit ad plagam, quæ inter Austrum & Occidentem, vel inter Septentrionem & Orientem media est, hoc est, ad Austro-zephyri vel Euro-boreæ plagam. Ad littus Chinæ in portu urbis Maccan, Lusitanus quidam Nauclerus observavit & consignavit tempus intumescentiæ maximæ, hac ratione. Elevatio poli vel latitudo loci est 22 gr. 20 min. Anno 1584 die 19 Septembris fuit plenilunium: tunc summa aquæ intumescentiæ, altitudo vel plemmyra observabatur hora matutina sesquioctava, sive  $\frac{3}{4}$  post octavam. Fuit itaque Luna tunc remota à Meridiano tribus horis cum quadrante. Unde plaga seu verticalis, in quo Luna ad id temporis momentum hæsit, invenitur juxta problema capituli xxx.

Anno 1585 die 111 Februarii, qui fuit tertius à novilunio, observata est altitudo aquæ maxima, paulo post duodecimam; unde colligitur ipso die novilunii, qui fuit primus Februarii, altitudinem maximam fuisse post horam decimam minuto quadragesimo circiter.

Ex hisce iterum plaga, in qua Luna eo temporis momento fuit, investiganda est.

Anno 1585 die xvi Februarii in ipso plenilunio, observata est altitudo aquæ maxima hora sesquiundecima, hoc est, fere tempore meridiei.

Anno 1585 die secundo Junii, qui erat quartus à novilunio, altitudo maxima observata fuit fere ad ipsam horam duodecimam: itaque colligitur in ipso novilunii die fuisse altitudinem maximam hora nona antemeridiana.

Addit idem Nauclerus, tempora & horas maximæ altitudinis & decrementi aquæ non convenire cum illis horis, quæ ex Lunæ motu supputantur,

tantur, nisi quinque diebus ante & post novilunium: sed ambiguitas quadam est in his verbis, ut & iis quæ subjunguntur; ideo omisi hæc. Sed causa istius diversitatis est, quod affluxus novem horas in portu Maccau occupet, defluxus tantum tres, ut Propof. XIX dicemus.

Nauclerus quidam Belga ad dies novilunii & plenilunii annotavit horas diversorum locorum pro affluxus termino sive intumescencia, è quibus excerpsi has:

*Hora XII (diebus novilunii & plenilunii).* Ad littora Flandriæ, Enchusæ in Hollandia, Hornæ, Embdæ in Frisia Orientali, ad ostia Albis, Eideræ, ad insulas Jutlandiæ, Doverii in Anglia, &c.

*Minutis 45 post XII.* Flissingæ in Zelandia.

*Hora sesquiprima, sive 1½ post XII.* In Occidentali latere insulæ Anglicæ Wicht, Caleti, ad ostia fluvii Tamesis Anglicæ, ad littora Zelandiæ, in ostiis Scaldis, in Mosa, Goredæ.

*Quadrante post secundam, sive 2¼ post XII.* Ante ostia Scaldis, ante Mosæ ostia.

*Hora tertia* Amstelodami, Roterodami, Dordraci, Noviocastrî in Anglia, ante pulvinos Flandriæ, Armenterix in Flandria, in ostio fluvii Burdegalæ (Bordeaux) in australi littore Britannicæ Gallicæ, Gasconicæ, Biscaicæ, Gallacicæ, Portugallicæ & Hispanicæ: in Occidentali littore Irlandiæ ad Hitlandiam usque.

*Quadrante ante quartam pomeridianam.* Rhotomagi in Gallia: inter Mosam & ad Rupellam Gallicæ (Rochelle): in fluvio Burdegalæ, in sinibus littoris Hispanici, Portugallici, Gallacicæ, australi littore Britannicæ Gallicæ, Gasconicæ, & ad Occidentale littus Irlandiæ.

*Semisse post quartam.* A Texel ad Australia littora Irlandiæ.

*Quadrante post quintam.* In omnibus portibus australis littoris Irlandiæ, Plimuthi Angliæ & aliis australibus ejus locis usque ad Walliæ littora.

*Hora sexta vespertina & matutina.* Ante Hamburgum in Albi, ante Bremam, ante Texeliam, Antwerpianam, in canali inter Angliam & Brabantiam extra Sorlis.

*Quadrante ante septimam vespertinam.* Inter Fawwyck & Vaelmuyam in Canali usque ad Briston, ante S. Nicolai & Poddessemke usque ad Weymuyam & Hartepol.

*Semisse post septimam.* In statione navium (op de Reede) ad Texeliam, Kilduynæ, medio in Canali, juxta Plimuthum in mari usque ad promontorium Lezart Angliæ procurrentis.

*Quadrante post octavam vespertinam.* Juxta insulam Wicht in Canali usque ad Bevesier, extra Fleuvum in Hollandico littore.

*Hora nona.* Ante ostia Amisii fluminis Frisiæ (Eems) ante Flevum, ad omnia Frisiæ littora, ad Orientale littus insulæ Wicht.

*Post horam decimam semisse.* Ante ostia Tamefis fluvii Angliæ, ad littora Normandiæ, Picardiæ.

*Quadrante post undecimam.* In fluvio Tamefi, atque aliis Angliæ locis.

Hujus tam insignis differentiæ & quidem in omnibus locis causam explicare, difficillimum est: etsi omnino id Physico incumbat, vel Geographo. Varios littorum anfractus, situm littorum respectu maris, insularum obstacula, aquarum mutuos occurfus, locorum à via Lunari distantiam, varios ventos, imprimis constantes & generales, declivitatem littorum, atque alia, multum facere ad hanc proprietatem fluxus, verisimile est. Exempli gratia: Ad portum Londini in littore Angliæ aqua accrescit donec Luna perveniat ad plagam Austro-zephyri, nimirum cum declinat ab Ecliptica

ptica versus Austrum. Tunc enim aqua reflueret incipit, non autem cum Luna ad Meridianum pervenit. Dicemus itaque, dum Luna movetur à meridiano Londini versus Brasiliam (sive Brasiliam versus Londinum) ideo non recedere mare à Londino, sed adhuc augeri, propterea quod America littora ad quæ Oceanus movetur à Luna, repellunt illam aquam versus Angliam, hocque ideo, quia non præbet transitum aquæ. At cur Luna declinante ab Ecliptica versus Boream, altitudo maxima aquæ & decrementi initium observatur antequam Luna ad Meridianum perveniat, nempe in plaga Euro-boreæ?

Respondeo, id ideo fieri, quia tunc Luna est multo propior Angliæ, quam cum versus Austrum declinat ab Ecliptica, & ideo celerius implet; causa autem quod affluxus tunc non diutius protrahitur usque dum Luna ad meridianum perveniat, esse potest, quod Luna tunc Oceanum pellit magis versus mare Mexicanum & mare Hudsoni, ubi magna deprehenditur intumescencia & detumescencia.

Ad littora Chinæ ideo dicemus intumescenciam anticipare Lunæ ad meridianum appulsum, propterea quod ventus Orientalis continuus mare pellat versus Occidentem.

Verumenimvero non hæc talia sunt, ut vel mihi ipsi satisfaciant. Ideo cuivis Naturæ scrutatori hæc ulterius & diligentius expendenda sunt. Ad veram autem causam inveniendam omnino necessarium est, ut accuratas habeamus observationes, quomodo in diversis locis fluxus & refluxus fiat, in quonam nempe verticali Luna sit in illo affluxu, quomodo varietur plaga in diverso loco Lunæ, in plenilunio, in novilunio, in primis in illis locis ubi Luna verticalis sit, item illis quæ directe respiciunt Orientem, Occidentem & Septentrionem,



trionem, Austrum. Illud quoque diligenter observandum, quomodo fluxus hic fiat illis horis diei, dum Luna in boreali circuli sui parte existens non habet verticaliter suppositum mare, sed terras longo tractu, nempe à Camboia & China usque ad Africæ littus occidentale. Quia enim tunc non premit aquam directe, quippe mediterraneis locis imminens, existimo quod inde aliqua varietas huic motui accidere debeat. Item quid tunc fiat, dum Luna in Australi hemisphærio regens pervadit Brasiliæ mediterranea sive Australem Americam. Sine hisce observationibus vix pervenimus ad veram causam. Neque nos negligemus hoc argumentum, si in hac urbe, ubi hæc scribimus, vitam transigere Deus dabit.

#### PROPOSITIO XIX.

*Mare ad pleraque littora sex horis cum duodecim minutis affluit, & totidem horis refluit.*

In paucis locis affluit pluribus horis & refluit paucioribus: Et contra, in paucis affluit horis paucioribus & defluit pluribus: ita tamen ut tempus affluxus & defluxus (nempe inter duas maximas intumescencias) simul faciant duodecim horas cum  $24\frac{3}{8}$  minutis, & duo talia tempora faciant viginti quatuor horas cum quinquaginta circiter minutis, ( $48\frac{3}{4}$ ) hoc est, fere viginti quinque horas. Atque ideo singulis diebus intumescencia summa integra fere hora serius accidit, quoniam Luna integra fere hora (50 minuta) tardius ad eundem Meridianum vel verticalem redit singulis diebus.

Satis superque primum Propositionis membrum explicavimus in demonstratione Propositionis XI, etsi in ista Demonstratione summam maris altitudinem sumpserimus Luna meridianum occupante: in hac vero Propositione, quoniam

niam  
eam  
num  
temp  
eo t  
in qu  
esse,  
cis P  
aste  
tis ve  
minu  
à ver  
horis  
panti  
Et  
duod  
( cur  
hoc  
reflu  
fluat  
afflu  
nus.  
nus i  
portu  
nove  
rient  
C  
fluit  
C  
Quid  
xum  
ferun  
sentin  
retare  
quini  
afflux  
borea

niam in precedenti ostendimus plurimis locis eam altitudinem accidere Luna extra Meridianum constituta, non numeramus illis horas à tempore quo Luna Meridianum occupat, sed ab eo tempore, quo Luna verticalem illum occupat, in quo Luna existente summam intumescentiam esse, per experientiam constat. In hisce tamen locis periodus incrementi & decrementi non exacte observat illas duodecim horas cum 24 minutis vel viginti quatuor horas cum quinquaginta minutis, quia Luna propter variam & mutabilem à vertice distantiam vel pluribus vel paucioribus horis ad eum verticalem redit, quæ tamen discrepantia magna non est.

Et si itaque in omnibus locis affluxus & refluxus duodecim horis fere cum 24 minutis absolvatur (cum nullæ tempestates sunt), in plerisque etiam hoc tempus æqualiter sit divisum inter fluxum & refluxum, ita ut sex horis affluat, totidemque defluat, tamen in nonnullis locis inæquale est tempus affluxus, tempori defluxus, nempe majus vel minus. Garumnæ (fluvius Gallix est) alveum Oceanus ingreditur horis septenis, defluit quinis. Sic ad portum Maccou in littore Chinæ affluit aqua horis novem, defluit tribus, imo paucioribus, si venti Orientales spirent.

Contra ad Zenegæ (fluvii Æthiopiæ) littora affluit mare horis quaternis, defluit octonis.

Causæ harum differentiarum difficiles sunt. Quidam in validum & celerem fluviorum effluxum vel etiam in simplicem effluxum causam referunt. Ideo enim Garumnæ littus septem horis sentire affluxum, quia validus Garumnæ motus retardet influxum, adjuvet autem defluxum, ideo quinis mare defluere. Alii horam illam addi ad affluxum, propterea quod mare refluxens à magis boreali loco impediatur, ne libere egrediatur mare è

Garumna, sed potius plus in eum impellatur. Ego vero existimo ideo fieri, quia Garumna valido motu se effundit ex ostio in Oceanum ad aliquam distantiam, hunc effluxum prohiberi ex parte ab afflu maris, & sic aquam Garumnæ resistare aliquantum etiam antequam mare propter Lunam ipsum alveum ingrediatur.

De Zenegæ incremento, quod quatuor tantum horas habet, utrum causâ sit ascribenda extensioni alvei ab Occidente in Orientem, an celeri Zenegæ defluxui, quæ prohibeat influxum duabus horis, an alteri causæ, dubito, & accuratorem observationem requiro, nimirum utrum vere decrescat octonis horis, an tantum sex horis, duabus autem reliquis nec accrescat nec decrescat, &c. quia validus fluvii effluxus impediatur fluxum.

Illud etiam considerandum, quod loca depressa plumbus horis sentire possint affluxum, paucioribus defluxum.

#### PROPOSITIO XX.

*An Luna Horizontem attingente incipiat affluxus vel incrementum in loco, cujus est Horizon?*

Ita dicunt communiter: contrarium tamen dicendum est in illis locis obtinere in quibus summa aquæ altitudo est Luna meridianum obtinente. Etenim cum Luna declinat ab Æquatore versus Austrum, tunc paucioribus quam sex horis pervenit ad Meridianum, & ideo debuit affluxus incepisse cum adhuc Luna infra Horizontem est depressa. Contra cum Luna declinat ab Æquatore versus Septentrionem, plures quam sex horas requirit, ut ab Horizonte ad meridianum perveniat, atque ideo cum jam supra Horizontem elevata est Luna in circulum horarium sextæ horæ, tum demum incipiet affluxus. Atque

que ita in plurimis locis observatur, sed Londini contrarium, ut diximus Propof. præced. Et ratio videtur postulare, ut etsi Luna declinet ab Æquatore versus Septentrionem, tamen incipiat affluxus in loco, ubi Luna ad Horizontem pervenerit: Absit enim tunc locus per quadrantem ab illo loco, cui Luna verticalis est, atque ideo pressura maris huc pettinget. Observationes accuratiores hic consideramus.

PROPOSITIO XXI.

*Data hora, in qua altitudo summa vel minima aqua est die novilunii vel plenilunii in loco, ubi ordinarius est fluxus & refluxus (sex nempe horarum cum 12. gr.) determinare horas sequentium dierum, post novilunium, quibus altitudo maxima & minima erit.*

Diximus in præcedentibus, quod tempus summi incrementi & decrementi (si medius Lunæ motus à Sole spectetur) in uno die postponat minutis horariis  $48\frac{3}{4}$ , ( $48\frac{1}{8}$  accuratius) in dimidio die, minutis  $24\frac{3}{8}$ .

Si itaque in aliquo loco sit summum incrementum vel maxima intumescencia die novilunii vel plenilunii, hora diei XII, erunt sequentibus diebus hora incrementi hæ:



Ætas Lunæ.	Diei	
	Horæ.	Scrup.
1	xii.	48
2	1	37
3	2	27
4	3	17
5	4	5
6	4	55
7	5	59
8	6	49
9	7	23
10	8	12
11	8	56
12	9	51
13	10	40
14	11	29
14 $\frac{1}{2}$	12 med.no.	
15	12 Diei.	

Nimirum in fine primi diei ætatis Lunæ serius accidit intumescencia summa, horatiis minutis  $48\frac{1}{6}$ . Sed in praxi sufficit ad horam novilunii pro primi diei fine addere minuta 48 five  $\frac{1}{4}$  horæ:

pro secundi fine.	horas $1\frac{1}{2}$
pro tertii.	$2\frac{1}{4}$
pro quarti.	$3\frac{1}{4}$
pro quinti.	4
pro sexti.	5
pro septimi.	$5\frac{1}{4}$
pro octavi.	$6\frac{1}{4}$
pro noni.	$7\frac{1}{4}$
pro decimi.	$8\frac{1}{4}$
pro undecimi.	9

pro

pro duodecimi.	$9\frac{3}{4}$
pro decimitertii.	$10\frac{2}{3}$
pro decimi quarti.	$11\frac{1}{2}$
pro decimi quinti.	$12\frac{1}{4}$

Hic calculus vel supputatio temporis medium Lunæ à Sole motum sive æqualem supponit, qui tamen inæqualis est, ita ut in perigæo suo Luna, multo celerius à Sole recedat, quam cum in apogæo est, atque adeo tunc longius protrahitur incrementum summum, quam horis 6 & 12 min. in apogæo autem cum Luna est, citius incrementum habetur. Nam & veri menses Lunares quidam superant 30 dies, alii minores sunt diebus 29, cum medius assumatur dierum 29, hor. 12, 44 minut.

Sed in locis, ubi cum appulsu Lunæ ad certum verticalem sit maxima altitudo vel minima, et si eodem modo fiat, tamen minus accurate tempus invenitur.

Neque enim ipsum tempus, quo Luna Soli conjungitur, cadit in eadem diei horas vel ejusdem horæ scrupula eadem in diversis noviluniis.

Quomodo per globum Terrestrem id fiat, docerimus capite xxx.

Et capite xxxvii, in usu nautico plura dicemus de accuratiori methodo.

Possumus etiam hac methodo uti pro illis locis, ubi tempus affluxus est majus vel minus, quam tempus defluxus, modo constet de differentia. Consideratio ipsius rei & praxis facilius hæc docebunt, quam sermo noster.

Lunæ ferius  
s minus  
viluntii pro  
oræ:

horas  $1\frac{1}{2}$

$2\frac{1}{2}$

$3\frac{1}{4}$

4

5

$5\frac{1}{4}$

$6\frac{1}{4}$

$7\frac{1}{2}$

$8\frac{1}{4}$

9

pro

## PROPOSITIO XXII.

*Venti saepe protrahunt, saepe imminuunt, in aliquo loco tempus affluxus vel refluxus: nec tantum venti illius loci, sed etiam in alio loco spirantes, idem possunt efficere.*

Veritas Propositionis adeo clara est, ut nulla indigeat demonstratione.

## PROPOSITIO XXIII.

*SPECIALIUM seu propriorum motuum maris, quo nempe una aliqua Oceani pars vel perpetuo & continue, vel certis mensibus movetur, magna est varietas.*

1. *Ex specialibus perpetuis, praecipuus est is motus, quo maris Atlantici seu Africani pars circa Guineam à promontorio viridi movetur versus curvaturam seu sinum Africae, quam vocant Fernando Poo, hoc est, ab Occidente in Orientem, qui contrarius est generali motui ab Oriente in Occidentem. Est autem vehemens motus, ita ut naves littoribus appropinquantes violentè deferat ad illum sinum præter nautarum opinionem & supputationem itineris. Inde fit ut naves, quæ duobus diebus à littore Mouræ delatæ sunt ad Rio de Benin (100 milliaria sunt) vix sex vel septem hebdomadibus interdum à Rio de Benin ad Mourre possint reverti, nisi in altum pelagus se conferant, quod tamen non facile est, cum mare valido motu moveatur ad plagam Euro-boreæ ab S. Thomæ-insula ad sinum illum Fernando Poo, trahens secum naves secundo quamvis vento Euro-boreæ utentes. Atque vix à littore illo abire possunt, nisi repentinis illis & crebris ecnephus (Travados) expellantur, qui interdum per aliquot menses minus frequentes vel nulli sunt. Multas naves perdidit hic maris istius motus, antequam*

tequam nautis satis cognitus esset : quippe vel naufragio perierunt delatæ in latentes littoris scopulos præter opinionem suam, vel nautæ siti & inedia confecti sunt, cum in sinu isto decinerentur.

Verum non inest hic motus toti Oceano Æthiopico, sed tantum parti illi, quæ adjacet littori Guinezæ usque ad sinum illum, nempe non ultra quatuordecim milliarium distantiam à littore in mari deprehenditur, ad unius gradus ab Æquatore distantiam. Itaque nautæ littora illa præternavigantes diligenter cavent, ne propius accedant ad illa, ut ita reliquam navigationem pro suo arbitrio & constituti loci situ possint dirigere.

Causam hujus littoralis motus invenire haud facile est, præsertim cum vicinus Oceanus moveatur contraria via ab Oriente in Occidentem. Duo dici possunt :

1. Oceanum ab America littore repulsum remeare aliquantum versus Orientem, & quoniam Oceanus Æthiopicus ad sinum Fernandi Poo lato tractu extenditur, ideo in hunc remeare, sed tantum ad littora deprehendi, non in alto pelago, propterea quod in hoc motus contrarius eum deleat & insensilem reddat : versus littora autem mare moveatur violente. Et ideo præcipue in sinu illo Fernandi Poo animadvertitur, quia à littoribus reliquæ Africæ (ut Congo), repellitur mare propter effluentes magno impetu fluvios.

2. In sinu isto Fernandi Poo subterraneum quemdam alveum esse, in quem mare illabatur & reliquam Oceanum trahit. Sed hoc minus fortassis verisimile videbitur. Inveniat meliora, qui potest, & cui otium Deus concessit.



## PROPOSITIO XXIV.

*Secundus specialis perpetuus motus.*

Circa Sumatram mare fluit ab Austro versus Septentrionem in sinum Bengalensem, & quidem valido motu, ut verisimile sit vi maris hunc sinum factum esse atque Malaccensem Chersonesum ab India separatum. Utrum causa sit, quod à tam multis insulis & promontorio Terræ Magellanicæ Oceanus, qui ad Occidentem tendit, repellatur ut ita versus Septentrionem violente fluctuanque deferatur, an vero subterraneus alveus sit in illo sinu, dubito.

Puto tamen non directe ad ipsum Septentrionem, sed ad plagam collateralē, quæ versus Occidentem declinet, fieri. Imo idem hic motus deprehenditur inter Javam & Terram Magellanicam, itaque Belgæ in Indiam navigantes dirigunt cursum ad procurrentem illam partem Terræ Magellanicæ vel Australis, & dein navigant ab Austro versus Septentrionem nempe ad Javam.

## PROPOSITIO XXV.

3. *Tertium specialem perpetuum motum facio eum, qui inter insulam Madagascar & Promontorium Bonæ spei observatur, imprimis in littore Africæ inter Terram de Natal & hoc promontorium Bonæ spei. Hic motus deprehenditur ab Euro-boreæ plaga ad Zephyro-astrum (& à Borea ad Austrum, pro littorum extensione) tam incitatus & vehemens, ut naves vix valido vento illum superare & contrariam viam ad Madagascar tenere possint. Contra, qui à Canali inter Madagascar & Africam versus promontorium Bonæ spei navigant, sine ventorum ope, solo maris motu deferuntur ad illud: causam esse puto, quod Oceanus generali motu delatus ad Africæ littora & à dire-*

cto

Et ita itinere prohibitus tendat versus promontorium Bonæ Spei, ubi transitum invenit. Etenim in medio Oceano vel à littoribus remoto inter Indiam & Africam non deprehenditur hic motus à collateralis plaga, sed Oceanus ab Oriente in Occidentem movetur.

## PROPOSITIO XXVI.

4. *Quartus specialis perpetuus est*, in mari Pacifico ad littora Peruviana & reliquæ Americæ, ubi mare movetur ab Austro ad Boream. Causa est sine dubio ventus perpetuus Australis, qui ad illa littora dominari deprehenditur, ut capite de Ventis diximus. In mari à littoribus remoto non deprehenditur hic motus, sicut nec ventus iste.

## PROPOSITIO XXVII.

5. *Quintus specialis perpetuus motus*, observatur in mari ad littora Americæ, promontorio S. Augustini Brasiliæ, ad insulas Antillas Mexicani sinus versus Floridam, hoc est, ab Austro ad Septentrionem. Causa fortassis est, quod Oceanus delatus generali motu ad Brasiliam, repellitur, & quia versus Septentrionem latior & liberior via datur, istuc fertur. Similis motus versus Boream observatur in ostio freti Manillensis ad Philippinas. Ita in Japone à portu Xibuxia versus Arimam motus incitatissimus.

## PROPOSITIO XXVIII.

6. *Sextus specialis perpetuus motus*, in freto le Maire, ubi nautæ classis Nassovix deprehenderunt mare ferri ab Occidente in Orientem. Sed una observatio non sufficit, præsertim cum le Maire contrarium scribat.

Plures speciales motus reperiuntur in Oceani partibus ad littora, sed nondum satis accurate observati & descripti sunt.

## PROPOSITIO XXIX.

*Ad speciales perpetuos motus partium Oceani pertinent illi etiam, quos efficiunt fluvii ingentes, ubi in mare se exonerant.*

Sic ad littora Africae, Lowango, Congi decem & duodecim milliariibus à littore validus est motus maris à littoribus versus Occidentem, quia plurimi fluvii, inter quos maximus est Zaire, cum impetu in mare se projiciunt & ita mare repellunt, qui motus à generali motu juvatur. Ideo aliquot dies requiruntur ut naves illa littora possint attingere, etsi tantum uno vel altero milliari ab eo distent.

Sic ad insulam Lamon littori Chinae adjacentem mare movetur à littore versus Eurum, contra generalem motum, qui est ab Euro versus Chinam. Hunc contrarium motum efficit impetuofus effluxus fluvii magni Chinensis Thoucoan: sed in mari remotiori à China omnino deletur hic motus à generali motu: neque enim ultra insulam Branco sentitur.

Hactenus de motibus specialibus perpetuis: pauca de specialibus statis & anniversariis subjungenda sunt.

## PROPOSITIO XXX.

*Specialium motuum maris cessantium seu periodicorum maxima est varietas; & motus illi periodici sive stati & anniversarii omnes fere ab anniversariis & statis ventis oriuntur. Et stati ventis unius loci possunt motum maris statum efficere in alio loco.*

Ita ad Javam in freto Calappa cum motio est Zephyrina, nempe mense Maio, fluit mare versus Orientem contra generalem motum.

Sic inter insulam Celebes & Maduram, cum  
motio

motio est Zephyrina, nempe in Decembri, Februario, Januario (ventus Zephyro boreas vel collateralis Zephyri vicinior plerunque tunc spirat ibi) mare fluit ad Euro austrum, vel Euri collateralem viciniorem.

Ad insulam Ceilanum à medio Martio ad Octobrem fluit mare versus Austrum, reliquis mensibus versus Boream, nempe quia illis mensibus frequentes sunt venti boreales, in hisce autem australes.

Inter Cocinum & Malaccam, cum motione Zephyrina ab Aprili ad Augustum, fluit mare ad Malaccam contra motum generalem versus Orientem: deinde reliquo tempore versus Occidentem adjacentibus ventis generalem motum. Mare hic movetur tanto strepitu, ut inexperti putent scopulos adesse, ad quos aqua allidat.

Sic aliquot mensibus post xv Februarii mare movetur à Maldivis insulis versus Orientem & Indiam contra generalem motum.

Ad littora Chinae & Camboiae mensibus Octobri, Novembri & Decembri movetur mare versus Zephyro-boream, sed cum Januario versus Zephyro-austrum incitato admodum fluxu versus pulvinos de champa, ut lapidis jacti celeritatem superare videatur.

Ad Pulo Cato usque ad Varella (in littore Camboiae jacent) cum non flant motiones, celer maris motus fit versus Austrum, sed motiones in aliam plagam movent.

In littore sinus Bengalensis, à Patana, ad Malaccæ promontorium, mense Novembri & Decembri incitatus cursus maris observatur versus Austrum.

In motione à China ad Malaccam, mense Junio, Julio, Augusto, vehemens maris motus à Pulo Cato ad Pulo Cambir in litore Camboiae.



Plura exempla, sed minus accurate consignata, leguntur in diariis nautarum.

Ad littus Aguada de san bras non procul à promontorio Bonæ Spei observatur hoc peculiare, quod mare semper ab Oriente in Occidentem versus terram movetur eo vehementius, quo ventus Occidentalis, ei nempe oppositus, fuerit vehementior. Causa proculdubio aliud vicinum littus altius illo.

### PROPOSITIO XXXI.

*Motus maris circulares, quos vortices appellamus, & gurgites, triplikes sunt. Quidam enim tantum aquam in gyrum circumagunt; quidam absorbent, & certis horis refundunt & exspuunt, quidam absorbent, sed non exspuunt. Etsi vero quarta etiam species sine dubio in alveo maris detur, quæ nempe exspuat, non vero absorbeat aquas, tamen eam in mari deprehensam esse non memini me legisse apud ullum autorem: sed in Terris plurimæ reperiuntur. Nautæ vocant hosce vortices & gurgites *Maelfroom*. Latini etiam Euripum.*

Neque est magnus illorum numerus: saltem eorum, qui annotati sunt, pauci.

Chalcidicus Euripus seu vortex celebris est prope Græciam, imprimis propter fabellam de Aristotelis morte & obitu. Recipit aquam certis horis & aliis exspuit. Scaliger ita conatur explicare: Subjectarum cautium recessibus receptas aquas refundi, non pessime dicemus. Nam perpetuo defluxu scrupæos impleri sinus, quorum claviculata conceptacula, sicut fit in fluviorum gurgitibus, humorem collectum evomant: quorum capacitas tanta sit, ut tot horis sufficere possit motum eum, qui partim defluxionem tardet ac retrudat, partim juvet, posteaquam saturata fuerint illa cava.

Ætio-

Ætiologiam hanc Scaligeri non esse sufficientem nemo non videt.

Vortex & Euripus ad Norwegiam omnium celeberrimus & maximus. Etenim tredecim miliaria habere scribitur in circuitu; mediani petra occupat, quam adjacentis terræ populi vocant Mouske. Vorago hæc sex horis absorbet omnia, quæ illi appropinquant vel vicina sunt, aquam, balneas, naves onerarias & alias res, totidemque horis omnia illa eructat & evomit, magna cum violentia, strepitu & circumgyratione aquæ. Causa later.

Inter Normanniam Galliæ & Angliam vorago est, ad quam feruntur naves mirabili celeritate, sed jam vicinæ gurgiti repelluntur.

#### PROPOSITIO XXXII.

*Motus maris, quem Concussionem vel tremorem vocavimus, provenit à spiritu qui vel terram vel ipsam aquam agitat vel ebullire facit.*

Sic ad littus Bascum, quod haud procul Baiona Britannicum mare summover, locus est quem incolæ vocant *Cap breton*. Ibi aliquando mare sine ullis ventis adeo turgescit, ut jamjam littus ipsum obrutum iri videatur: deinde mox subsidet. Similis intumescencia in lacu Scotiæ dicto *Loumond*prehenditur à spiritu subterraneo.

Tremorem aquæ anno 1523 circiter in mari Cambaiensi experti sunt Lusitani: In summa enim malacia (ut ait Maffæus) silentibus ventis, repente ab imo fluctus intumuit: inde naves inter se nutare, crepitare compages, tabulata concuti cœpta. Nautæ subito pavore istî, cum in Syrtis illatam haud dubie classem crederent, in summa perturbatione rerum omnium, alii bolidem demittere, alii sentinam exhaurire, sapientiores de fuga circumspectare & doliola arripere, quibus

enatarent: sed mox compertum, eum esse Terræ motum, quem navigantes quoque sentire non est dubium.

PROPOSITIO XXXIII.

*Cur Mare Pacificum magis tranquillum & sine profundis fluctibus existat, & cur vento facile turbatur.*  
(Belgæ dicunt, *Zee is haest ontstelt.*)

Causa sine dubio est, quia motus ejus versus Occidentem non impeditur ab objectis littoribus, sicut Atlanticum.

CAPUT XVI.

*De Lacubus, Stagnis & Paludibus.*

PROPOSITIO I.

*De definitiones.*

**L**acus dicitur copia aquæ in aliqua Mediterrænei loci cavitate insignis amplitudinis & tractus existens, undique terris cincta & mediocrem ad minimum profunditatem obtinens. In specie vero, Lacus dicitur is tantum, qui fluvios recipit & emittit.

*Stagnum* dicitur lacus parvus, qui nec recipit nec emittit fluvios. Geographi & Literatores non omnino eodem modo hæc definiunt: sed res non magni est momenti, quia de vocabulis hæc est: nos eo, quo proposuimus, modo commode & apte definiri existimamus.

*Palus* dicitur aqua in Mediterræneo loco existens, hinc inde extantes & eminentes terras habens vel etiam terræ immixta.

PROPOSITIO II.

*Lacus sunt quadruplices.* 1. Quidam neque amittunt neque recipiunt fluvios, quales lacus si  
parvi

parvi sint, appellantur stagna, ut diximus, si magni & vasti, retinent plerunque lacus appellationem. 2. Quidam emittunt fluvios, non vero recipiunt. 3. Alii recipiunt fluvios, non emittunt. 4. Reliqui & recipiunt & emittunt fluvios: Et quidam ex hisce majores emittunt, quam accipiunt, quidam æquales, quidam minores. Item, quidam emittunt fluvium in eadem fere linea cum eo, quem acceperunt, alii in alia linea sive ad aliam plagam. Item, quidam plures recipiunt, quam emittunt, quidam pauciores, quidam æquales.

## PROPOSITIO III.

*Eorum lacuum, qui neque emittunt neque recipiunt fluvios, generationem & conservationem exponere.*

Sunt illi lacus vel Magni vel Mediocres vel Parvi. Mediocrium & parvorum quidam perpetuo permanent, quidam æstate & ubi diu non pluit, exsiccantur, dicunturque utraque stagna. Horum itaque, qui exsiccantur, generatio facilis est explicatu, nempe copia pluviarum & cavitas seu depressio loci, in quo talia stagna sunt. Etenim si locus aliquis situs sit in medio elevatorum locorum, defluit in eum omnis aqua pluvia, atque ita stagnum efficit.

Ita in India visuntur plurima stagna industria incolarum facta, quorum quædam milliare unum, interdum & duo, ambitu capiuntur, lapideo muro cincta, quæ pluviis mensibus implentur, ut æstivis mensibus sufficiant eis, qui longius ab amnibus aut fontibus degunt.

Simili modo parvi lacus & stagna fiunt ab exundationibus maris & fluviorum.

Sic Nilus & Niger fluvius, ille in Ægypto, hic in Lybia & Nigritarum regione exundans, ubi  
 jam



jam recesserunt, multa stagna post se relinquunt, quæ ipsi incolæ etiam vel muniunt vel faciunt, ut inde aquam petant reliquis anni mensibus. Eadem ratione in Moscovia, Finlandia, Liffandia tempore veris, æstatis & autumnii multi sunt lacus; partim propter imbres, partim propter nivium & glaciæ resolutionem.

Cæterum etsi lacus quidam exsiccentur æstate & post diuturnam pluviarum cessationem, inde tamen non licet firmiter concludere, quod omnem suam aquam à pluviis habuerint. Etenim exsiccati possunt, etsi suas scaturigines habeant in fundo, nimirum cum hæc scaturigines adeo parum largiuntur, ut ab æstu solis in halitum vertatur & dissipetur.

Quod verò ad illos lacus sine fluviis attinet, qui non exsiccantur, potest quidem eorum generatio etiam ad pluvias referri, nempe si profundum alveum habeant, in quo tanta aquæ copia à pluviis collecta asservetur, ut calore Solis non queat tota absumi, antequam alia pluvia cadat: sed magis verisimile est, hosce lacus in fundo habere peculiare scaturigines, à quibus tantum aquæ illis accedat, quantum per exhalationem absumitur: atque hæc causa sola locum habet in illis stagnis, quæ in montium fastigiis reperiuntur, ut in Bructero, in Cenifio (quod stagnum truttas fert) & aliis. Quosdam etiam ex hisce per exundationem aquarum magnam olim generatos esse, & deinde à pluviis conservari, probabile est: imo de illis lacubus, qui mari vicini sunt & simul falsi, non est dubitandum quin vel per exundationem vel immisionem maris per aliquam viam extiterint, ut lacus Harlemensis, & plures in Hollandia. in Peru quoque falsi lacus sunt.

Neque est magnus horum lacuum sine fluviis numerus. Parvi aliquot reperiuntur in Moscovia & Fin-

& E  
Apo  
dici  
(Hi  
vinc  
long  
cul i  
Chi  
M  
tum  
mag  
Pari  
tore  
Occ  
dine  
mer  
mod  
utru  
sub  
trun  
bus  
turip  
lori  
quæ  
aquæ  
beat  
vero  
tant  
Ita  
tiis  
riun  
tci o

E  
recip  
nere.

& Finlandia, Lychnitis stagnum in Macedonia, Apollonia lacus in Mysia, in Carniola unus, qui dicitur *Zrinzee*, unus rotundus in China, alius (Hilam) in Cauchinchina; in Zanhaga Africae provincia unus: Ad urbem Mexico in America unus, longitudine duodecim leucarum, & alius non procul inde. Hi omnes parvi sunt, excepto illo qui in China, namque hic mediocris.

Magnus autem lacus ex hoc genere unus tantum est in tota Tellure, qui cum omnibus lacubus magnitudine certat, imo omnes superat, nempe Parima lacus in America, jacens sub ipso Æquatore. Habet enim in longitudine ab Oriente in Occidentem trecenta circiter milliaria, in latitudine centum circiter, ubi ea maxima: neque tamen ullum fluvium recipit vel emittit. Is quomodo primum extiterit, non immerito dubitatur, utrum per inundationem Oceani olim factam, an subterraneis fontibus & scaturiginibus? Item, utrum à pluviis conservetur, an ab eisdem fontibus? Mihi verisimile videtur, haberi in fundo scaturigines, quæ tantum suppeditent, quantum calor solis auferat. Eadem enim causa est lacuum, quæ fluviorum, sed differentia est in loco fontis & aquæ copia scaturientis. Si enim fontis locus habeat insignem cavitatem & tractum terræ, copia vero scaturiens parva sit, non effluit aqua, sed tantum per halitus dissipatur quantum scaturit. Itaque fons, lacus & fluvius differunt circumstantiis tantum, non reipsa. Sicut multi fontes reperiuntur, qui non effundunt aquam, hi rectius putei dicuntur.

PROPOSITIO IV.

*Eorum lacuum, qui emittunt fluvios, neque ullos recipiunt, generationem & conservationem expone.*

Inf.

Infinitus horum lacuum est numerus, cum plurimi fluvii ex lacubus tanquam cisternis, profluant, inprimis illi, qui in Moscovia, Finlandia, Lapponia oriuntur, nimirum ubi cavitas in loco fontis aliqua quidem est, sed non tanta ut copiam scaturientis aquæ continere possit, fit quidem lacus, sed dein accedit fluvius elabente nimirum aqua ad vicina loca. Neque enim dubitare possumus, quin hi lacus suam generationem & conservationem habeant à fontibus in fundo existentibus, sive verus sit fons, sive apparens, nempe aqua ab alio loco per subterraneum ductum istuc fluente, quod posterius de quibusdam lacubus, qui magnos fluvios protinus emittunt, verisimile magis apparet. Minorum talium lacuum ingens est, ut dixi, numerus, ut Volga, ex quo prima Volgæ fluvii origo; Odoium, ex quo Tanais; Adac, ex quo unus ramus Tigris fluvii; Osera in Moscovia, ex quo Sosnam fluvius, qui in Volga exoneratur, & plurimi alii parvi; nos hic majores & magis insignes tantum enumerabimus.

1. Insignis est lacus Chiamey sub latitudine 31 gr. non procul ab India jacens à Gange versus ortum. Ex eo lacu quatuor effunduntur fluvii eximii magnitudine, fertilitate & inundatione in regna Siam, Pegu &c. nempe fluvii Menam, Axa, Cosmum, Martavam. Sed quædam mappæ habent fluvium, qui in lacum hunc labitur, exiguum.

2. Lacus Cincuyhay in finibus Chinæ oblongus, mittit magnum fluvium versus Septentrionem, qui cum alio junctus intrat Chinam.

3. Lacus Titicaca in Chareas provincia Americæ Australis, habet octoginta leucas in ambitu, emittit magnum fluvium, qui in parvum lacum terminatur, neque ultra videtur. Multi circa eum lacum pagi & urbes conspiciuntur.

4. In Nicaragua provincia Americæ lacus est ejusdem nominis, Nicaragua, qui tantum quatuor milliariibus abest à mari Australi seu Pacifico, & centum milliariibus ab Atlantico, in quod effunditur magno alveo.

5. Iroquois Lacus in Canada, ex quo fluvius S. Laurentii.

6. Annibi lacus in Asia sub latitudine 61 gr.

PROPOSITIO V.

*Lacuum eorum, qui recipiunt fluvios, sed non emittunt, generationem & conservationem explicare.*

Hosce lacus ab eis fluviis generatos esse & conservari, quos recipiunt, sive qui in eos influunt, manifestum est. Etenim cum fluvii à fonte suo progressi perveniunt in itinere ad insignem aliquam & amplam cavitatem, colligitur in hac & efficit lacum.

Quod si forte hic fundi terra sit porosa, imbibit aquam & ad vicinam terram transmittit, vel, quod frequentius esse existimo, si subterraneus forte sit ductus, vel ab aqua ipsa talis fiat, per hunc avehetur aquæ affluentis portio, ita ut lacus non exundet.

Horum lacuum exiguus est numerus in Tellure.

1. In præcedenti propositione diximus, quod lacus Nicaragua emittat fluvium, qui in lacum parvum desinat. Hic itaque lacus erit unus hujus classis, nempe eorum qui recipiunt, & non emittunt.

2. Lacus Asphaltites, qui etiam mare mortuum dicitur in Palæstina, recipit Jordanem fluvium, sed nullum emittit. Longitudo ejus à Septentrione in Austrum septuaginta milliarium, latitudo quinque, ut quidam ponunt.

3. Unus



3. Unus in Asia minori est parvus.
4. In Macedonia parvus, qui dicitur Janna, exiguos rivos accipit.
5. Lacus Genevensis.
6. In Persia prope Calgistan.
7. Soran lacus in Moscovia, accipit duos parvos rivos.
8. Fluvium Ghir Africæ ortum in Atlante definere in lacum, tradit Leo Africanus, & ita quædam mappæ repræsentant eum: sed aliæ in Nubiam fluvium deducunt.

## PROPOSITIO VI.

*Eorum lacuum, qui recipiunt & emittunt fluvios, generationem explicare.*

Triplex illorum est differentia, ut Propos. Secunda dictum est. Vel enim majorem copiam aquæ emittunt, quam recipiunt, vel æqualem, vel minorem. Si itaque majorem emittant, manifestum est, quod in fundo occultas scaturigines ille lacus habeat. Si minorem, occultos in fundo aquæ ductus vel terram spongiosam esse indicio erit. Si æqualem, colligimus quod neque occultæ aquæ ductus neque occultæ scaturigines in fundo sint. Generationis itaque causa est partim eadem quam Propos. IV diximus, nimirum cavitas & depressio loci atque aquæ affluentis copia, quibus occultæ scaturigines accedunt, & juvant imbres copiosi.

Qui ex solo unius fluvii in cavitatem aliquam influxu generati sunt, illi in medio tractu fluviorum siti sunt & directe fluvios reddunt, estque illorum magnus numerus. Sic Niger quatuor lacus in itinere facit, vel tres, si unum à latere positum excludas. Nilus plurimos lacus in itinere facit, quos mappæ non exhibent. Duina fluvius ad minimum sex vel septem transit. Atque alios fluvios

vios in Moscovia, Finlandiaque videbis in Mappis magnis sedecim lacus efficere, antequam ad ostium perveniant. Sed illos præstat considerare, qui alios producent fluvios, quam acceperunt.

Celebriores autem & magnitudine insignes sunt hi.

1. Zaire lacus Africae procurrentis, jacens inter decimum tertium & inter sextum gradum latitudinis Australis, adeoque in longitudine habet centum & quinque milliaria. In medio ejus jacet insula ( præter alias parvas) ejus magnitudinis, ut triginta hominum millia in bellum cogant incolæ. Hæc insula quasi bisecat lacum, ita ut una pars habeatur pro peculiari lacu, & appelletur Zembre. Ex hoc lacu fluunt tres ingentes fluvii, Nilus, Cuama & Zaire. Influunt autem in eum quidam parvi rivi, qui soli non videntur ejus magnitudini sufficere, ita ut verisimile sit, eum Scaturigines in fundo habere, etsi ipsa inundatio fluviorum sit ascribenda imbribus in mensibus pluviis.

2. Zaflan lacus non procul à Zaire inter decimum & sextum latitudinis australis gradum, adeoque sexaginta circiter milliaria in longitudine habens, mittit ramum in Nilum, accipit parvos fluvios.

3. Lacus Sachaf non procul à Zaire versus promontorium Bonæ spei. Emittit rivum, qui aliis auctus aquis facit deinde Fluvium Spiritus Sancti. Accipit exiguos fluvios.

4. Aquilunda lacus, accipit ramum ex Zaire lacu, & effundit multos fluvios in regnum Congo.

5. Onega lacus in Finlandia inter sexagesimum & sexagesimum tertium latitudinis gradum situs longitudine habet quadraginta quinque milliaria, latus triginta, ubi maxima est latitudo. Accipit multos parvos & mediocres fluvios ex aliis lacibus

bus parvis prodeuntes, & emittit mediocrem fluvium Sueri in lacum Lodoga.

6. Lacus Lodoga, longus triginta, latus quindecim milliaria, accipit fluvium Sueri ex Onega lacu & ab aliis locis plures minores, mediocrem ex lacu Ilmen Moscoviæ insigni. Emittit fluvium in sinum Finnicum.

7. Lacus Ofera accipit Koufam fluvium & alios, emittit Sosnam, qui in Volgam exit.

8. Enarack lacus vel palus in Lapponia, longus, quadraginta milliariibus, latus quindecim. Accipit fluvium Avilam & alios minores: emittit fluvium Paes in Lappicum mare.

9. Ula lacus in Moscovia, longus triginta, latus quindecim milliariibus. Habet in medio insulam ut Zaire lacus. Accipit fluvium, qui per decem lacus transit, & emittit insignem fluvium. Sunt alii non pauci in Moscovia & Finlandia & Norwegia.

10. In China quatuor insignes sunt lacus, qui fluvios accipiunt & varias in partes rursus distribuunt.

11. In Brasilia eodem modo ut China, sunt lacus Eupana & lacus Puerto de los Reyes, in quo coeunt & permeant fluvii, argenteus & Omaranna.

#### PROPOSITIO VII.

*Lacus plurimi dulcem aquam continent, pauci salisam seu marinam.*

Etenim qui vel à pluviis vel à fluviis extiterunt, ut etiam qui scaturigines suas proprias habent à mari remotiores, illi plerique dulcem præbent causam: sed qui vel ex inundatione maris vel immissione maris per certum ductum originem habent, illi falsi sunt, ut etiam quidam qui fontes falsæ aquæ in fundo habent. Ita lacus Harlemensis & alii

& alii in Hollandia falsi sunt, vel marinam aquam gerunt: reperitur etiam falsus in insula Madagascar, in Peru, in Cuba, qui duas leucas in circuitu habet, non procul à mari situs, & licet aliquot dulcis aquæ fluvios recipiat, & pisces atque testudines alat, tamen falsus est. Ita lacus Asphaltites etsi Jordanis dulcem aquam hauerat, tamen dulcis non est, sed emittit adeo foetidum & virulentum vaporem, ut ager circumjacens ad dimidium milliare sit sterilis.

## PROPOSITIO VIII.

*Utrum mare Caspium sit lacus an sinus Oceani?*

Sunt qui mare illud esse velint proprie dictum. Mare autem proprie dictum nullum est, nisi Oceani pars sit, hoc est, Oceano manifesto tractu adhaereat. Sed illi per subterraneum ductum conjungi cum Oceano volunt. Veteres sane aperto tractu illud cum Indico Oceano, alii cum Septentrionali conjungi scripserunt, sed utrosque deceptos fuisse, experientia satis superque testatur. De subterraneo ductu incerta res est. Videtur autem ex eo probari, quod tot fluvios & quidem multitudine aquarum insignes recipiat, quam aquæ copiam non posset alveus continere, nisi subterraneis cavernis & meatibus in Oceanum eam exoneraret. Sed alii aliter illam copiam aquæ absumi existimant, nimirum non in Oceanum eam penetrare, sed in vicinos montes, quorum magnus est numerus, & omnes fere fontes emittunt. Scaliger quidem asseverat cum aliis, Caspium hoc mare subterraneo meatu in pontum Euxinum deferri, sed nullum indicium ejus affert. Id tamen indicio esse potest, quod Pontus Euxinus perpetuo emittit aquas per Bosphorum magna copia, quantam copiam à fluviis non accipere quidam putant, sed per subterraneum ductum à mari Caspio. Mihi non



non videtur, quod cum mari conjunctionem habeat, & ideo lacum esse, & ita potius appellandum, quam mare, existimo. Unde autem primo generatus sit, major est difficultas. Sunt qui multos fontes falsos in ejus fundo reperiri testantur, & inde falsedinem ejus esse: aquam vero à multitudine fluviorum, qui in lacum hunc seu mare se exonerant, esse autumant. Sed etsi hæ aquæ ad conservationem ejus faciant, magis tamen verisimile esse existimo, hoc mare abhinc aliquot annorum myriadibus olim fuisse cum ipso Oceano conjunctum, & varias ob causas fretum fuisse obstructum vel terras intercedentes progressu temporis generatas fuisse, ut in seqq. docebimus. Neque dubium est, quin pontus Euxinus aliquando propter hanc causam futurus sit lacus, obstructo Bosphoro.

#### PROPOSITIO IX.

*In dato loco lacum efficere, si fieri possit.*

Fieri id poterit, si in vicinia sit fluvius, vel in ipso loco fons reperiat, & locus sit aliquantum depressior, quam vicina loca, etsi in fastigiis quoque montium lacus parvi fieri possint. Excavandus itaque erit locus & terra effodienda, ad tantam profunditatem & amplitudinem, quantum cupimus, atque latera seu littus aggeribus, si opus videatur, muniendum. Tunc factò ductu ex alveo fluvii aqua immittenda, vel si fons in loco illo existens sufficientem aquæ copiam præbeat, non opus est illo ductu.

#### PROPOSITIO X.

*Lacum exsiccare sive tollere.*

Duplici id fieri poterit modo. Primo, si fundus illius lacus sit altior, vel æqualis etiam fere depressionis quam vicina loca, factò alveo vel aquæ ductu, effluet aqua ex lacu, & tandem siccum fun-

fund  
tis t

2.  
cina  
circu  
apert  
expel  
ra reg  
quæ  
fica.  
hauri  
cere.  
Harle  
aliqu  
bito,  
lacus  
multo

Pa  
quasi  
gia ho  
vel aq  
sicca e

Pri  
cipiur  
Moerl  
bantia  
riuntu  
admix  
reperi  
de qu  
ut Tar  
des et  
Savola  
rack:  
daicæ

fundum præbebit, adjuvante calore solis, & injec-  
tis terræ cumulis.

2. Si fundus illius lacus sit humilior, quam vi-  
cina loca, muniendus erit primo aggere in toto  
circuitu, relictis tantum quibusdam canalibus seu  
aperturis. Tunc adhibitis moletrinis aquariis aqua  
expellenda & educenda erit, & deinde fundus ter-  
ra regendus & fimo, atque talia semina injicienda,  
quæ celeriter radices agant, ut semen sinapi, bras-  
sicæ. Hoc modo Belgæ optime callent lacus ex-  
haurire & fecundos fundos agrosque ex illis effi-  
cere. Et hoc quo scribimus, tempore, de Lacu  
Harlemensi exsicccando consultatio instituta fuit  
aliquoties: quod aliquando susceptum iri non du-  
bito, quandoquidem & multas terras abradit ille  
lacus, & magnum ex illo exsicccato redundaret in  
multos lucrum.

#### PROPOSITIO XI.

*Paludes duplices sunt. Quædam uliginosa & mixta  
quasi substantia ex aqua & terra constant, ita ut vesti-  
gia hominum non ferat vel sustineat: alia parva stagna  
vel aquarum collectiones habent, hinc inde parvis terra  
sicca extantibus portionibus.*

Prioris generis quæ sunt, illæ nullos fluvios re-  
cipiunt vel emittunt, Germani inferiores vocant  
*Moerland*, quales paludes in Hollandia, in Bra-  
bantia (ubi de *Peel*), in Westphalia plurimæ repe-  
riuntur, quibus tamen quædam secunda classis  
admixta sunt. Sed hujus secunda classis plurimæ  
reperiuntur ad origines seu fontes fluviorum, un-  
de quidam fontes hosce solent appellare paludes,  
ut Tanais paludes in Moscovia, Nili. Tales palu-  
des etiam videntur esse in provincia Finlandiæ  
Savolax magno terræ tractu, item Paludes Ena-  
rack: Chelonides paludes Africa, paludes Chal-  
daicæ, per quas transit Euphrates. Reperiuntur

quoque hæ paludes frequenter in sylvis & desertis ericoidis, quoniam pluvia illas terras irrigans & in cavitatibus hinc inde collecta non attolliur à Sole, quoniam folia arborum & erica arcent ejus radios. tales paludes fructuosæ hinc inde in Germania & Moscovia conspiciuntur.

Porro paludes hæ secundæ classis eodem modo, quo lacus, sunt quadruplices; quædam & recipiunt & emittunt fluvium, quædam tantum recipiunt, quædam tantum emittunt, reliquæ neque recipiunt neque emittunt. Prioris generis partim ex fontibus ibi occultis & effusa aqua antequam per certum alveum deduceretur, quando major aquæ copia, quam ut per alveum possit educi, generatæ sunt & conservantur, quales multæ in Moscovia & Finlandia: ultimæ speciei paludes à pluviiis vel exigua scaturigine nasci & conservari verisimile est.

Paludem Mæotin Aristoteles vocat lacum, & quidem rectius.

#### PROPOSITIO XII.

*Paludes habent terram sulphurcam, bituminosam & pinguem.*

Id tum ex nigro colore, tum ex cespitibus qui ex ea generantur & ignem facile concipiunt, ut in Hollandia aliisque locis, probatur. Causa est, quoniam tales substantiæ & in pluvia & in terra, ubi paludes illæ existunt, continentur. Non tamen omnes paludes tales sunt: sed ubi terra est petrosa & non mollis, ibi paludes non existunt. Ubi autem mollis terra, ibi sulphurcam & pinguem substantiam contineri certum est.

#### PROPOSITIO XIII.

*Paludes exsiccare.*

Etsi quædam paludes ingentem habeant profun-

fun  
ad a  
re p  
ciar  
lon  
mag  
acco  
cear

C  
I  
verfi  
Al  
aqu  
quæ

2.  
latitu  
parv  
gia i  
etian  
gene  
hæc  
Torre  
fluen

3.  
fluen  
Germ

4.  
ex ali  
mitur  
vii pa  
brachi

funditatem, tamen non plus requiritur, quam ut ad aliquam profunditatem exsicceetur. Quod efficere possumus, 1. Si per aliquem ductum defluere faciamus aquam. 2. Si ubi aliquot hebdomadibus calore Solis aliquantum exsiccatæ sunt, inspergamus magnam terræ sicca copiam. 3. Si ignem super illas accendamus. 4. Si allabentem ad illam aquam arceamus, ut pluvias, &c.

## CAPUT XVI.

## De Fluviis in genere.

## PROPOSITIO I.

Completemur hac Propositione definitiones ad hanc doctrinam necessarias.

1. *Fluvius* dicitur aqua à certo Terræ loco fluens versus alium locum oblonga via & intra alveum. *Alveus* aquæ in Tellure dicitur cavitas illa in qua aqua continetur, quæ magis depressa est quam aquæ illius littus.

2. *Rivus* dicitur fluvius, qui non habet eam latitudinem, eamque profunditatem, ut navigia parva onerata admittere possit. *Amnis*, qui navigia illa admittit. Si vero mediocria navigia vel etiam magna onerata in eo vehi possint, dicitur generis vocabulo, Fluvius & Flumen. Est autem hæc differentia tantum secundum magis & minus. *Torrentis* dicitur aqua ex montanis locis cum impetu fluens.

3. *Confluens* dicitur locus, ubi duo fluvii confluent; Ipse quoque confluxus ita appellatur. inde Germanicum *Coblentz*.

4. *Brachium* fluvii dicitur fluvius vel rivus, qui ex alio fluvio & alveo fluit. Plerunque tamen sumitur pro tali brachio, quod minus sit altera fluvii parte, quæ relinquitur: sed frequenter tamen brachia etiam dicuntur, quæ à fluvio in duos alveos



veos divaricato existunt. Vocetur autem locus *divaricatio*, vel *bivium*; magis aptum esset vocabulum, *Sesfluens*, sed non est usitatum.

5. *Fons* dicitur aqua ex certo terræ loco scaturiens & profluens. *Puteus* vero dicitur, si scaturiat quidem, sed non profluat, verum colligatur.

### PROPOSITIO II.

*Torrentes & rivi interdum existere possunt à copiosa pluvia & resoluta nive.*

Etenim in partibus Terræ montanis vel paulo elevatioribus reperiuntur multæ cavitates, parvi lacus, stagna. Si in hæc affluat à pluvia vel à nive tanta aquæ copia, ut eam continere non possint, effluit & in depressiora loca defluit; & quia singulis annis sæpe hoc fit, alveum sibi facit: sed interdum torrentes sine certo alveo defluunt. Ex hac causa, pluviiis nempe & nivium resolutione in montanis locis, existunt plurimi rivi, torrentes, imo etiam mediocres amnes in illis locis, quæ juga montium longo tractu habent, ut procurrens Africa, India, Peruviana regio, Sumatra, &c. Et hi rivi nec æstate nec nocte, sed tantum die fluunt.

### PROPOSITIO III.

*Plerique rivi oriuntur è fontibus. Fluvii autem insigni & mediocri magnitudine existunt, vel ex multorum rivorum & amnium congressu & compositione sive confluentia, vel profluunt ex lacubus & paludibus. Nullus autem fluvius alicujus magnitudinis (ut Albis, Rhenus, &c.) profluit ex uno fonte, sed ex cœuntibus multis parvis existunt, vel ex lacubus: sed & hi ex lacubus orti augentur aliorum accessione. Wolga seu Rha fluvius ducentos & plures partim rivos partim amnes accipit, antequam in mare Caspium se exoneret. Nec pauciores Danubius antequam in Pontum.*

Et licet Plinius & Cardanus scribant, in Nilum nullos influere amnes, tamen experientia contrarium ostendit illis, qui in Abassia peregrinati sunt.

Propositio per exemplorum enumerationem facile probatur.

Fontes rivorum seu fluviorum quorundam sunt in montibus & montanis locis; quorundam in planitie existunt. De fontibus illorum fluviorum, qui è lacubus profluunt, diximus in præcedenti Capite, quod tales fontes in fundo seu alveo lacuum existant: Et lacus tales esse tanquam cisternas, & effusiones circa fontem, antequam certo alveo aqua fluxa vel majori copia. Nimirum fontes alii tecti sunt terra vel aqua, alii aperti.

Fontes in planitie sunt rivorum illorum, ex quibus Tanais, item ex quibus Albis existit in primo tractu, quibus deinde alii accedunt. Plura exempla facile colliguntur.

Cardanus negat hosce fontes in planis istis locis generari, sed ex montibus vicinis dirivari subterraneo ductu. Ego vero existimo tales fontes primo efficere lacum vel paludes. Nam neque Tanais ex fonte videtur profluere, sed ex palude seu lacu minus profundo.

Fontes montani sunt plurimorum rivorum, ut Rheni, Rhodani, Danubii, Borysthenis, &c.

E lacubus profluunt, Nilus, Wolga, & fluvius ingens Canadensis S. Laurentii.

Unus tamen modus esse potest, quo ex uno fonte magnus existat fluvius, nimirum si fons sit in elevatis locis (ut plerique sunt); alveus autem fluvii parum altior sit, quam ostii altitudo. Sic enim profluens aqua primo celeriori cursu, dein magis lento, colligitur in alveo & progressu temporis magnus potest esse fluvius, quia ex ostio non tantum effluit vel effluxit in prima generatione.

## PROPOSITIO IV.

*Fluvii admodum augentur à pluviis frequentibus & resoluta nive, & quidem diversis anni mensibus & temporibus.*

Ita in Peruviana regione & Chili quidam fluvii ita parvi sunt, ut nocturno tempore non fluant, sed tantum de die, quia aqua tunc affluit ex resoluta in Andibus montibus nive per solis calorem. Ita fluvii tam in Orientali quam Occidentali latere procurrentis Africae, ut in Congo, Angola &c. die majores sunt, quam nocte. Ita in India tam Malabarico quam Coromandelio littore, Imo in hisce regionibus tempore aestatis fluvii fere exsiccantur, hyeme seu pluviali tempore turgent. Sic Wolga mense Maio & Junio abundat aquis, ut & pulvini & insulae tunc tegantur ab aqua, reliquis mensibus pulvini vix transitum permittunt navibus onustis. Causa est, quia eo tempore resolvitur nix in montibus, unde profuunt rivi, qui in Wolgam se exonerant plures quam centum. Sic Nilus, Ganges, Indus, &c. augentur ita à pluviis vel nive, ut terras inundent. Diverso autem tempore fiunt haec augmenta, quia oriuntur à diversis causis & diversis locis. Etenim pluviae quia hyeme frequentiores, ideo hyeme fluvii altiores, nisi alia accederet causa à nivium resolutione, quae in quibusdam montibus & locis in vere, aliis in aestate, aliis intermedio tempore fit. Inde accidit, ut alii fluvii in vere turgeant, quia tunc in montibus, qui rivis illorum fluviorum adjacent, resolvitur nix; alii in aestate; & sic de aliis. Praeterea fluvii quidam, praesertim majores, ex remotis locis veniunt, ubi aestas, cum in loco, per quem fluunt, hyems; atque haec varietates efficiunt, ut diversis temporibus turgeant. Plerique tamen fluvii in vere id faciunt, quia tunc in plurimis

rimis locis nives resolvuntur. Caustrarum varietas explicanda est in particulari singulorum fluviorum descriptione.

De fonte peculiari Japonix, qui singulis diebus per duas tantum horas fluit, dicemus capit. seq.

PROPOSITIO V.

*Unde oriatur aqua, qua ex fontibus profluit?*

Ita proponimus quaestionem hanc difficillimam, qua tamen difficilior apparet, sicut alii eam proponunt: Unde fluvii generentur? Etenim versantur nobis tunc ob oculos magni fluvii, Rhenus, Albis, &c. quorum generatio propter aquarum copiam videtur admirabilior quam rivorum. Sed nos in praecedenti & tertia propositione docuimus, quod fluviorum aqua partim e pluviiis & nivium resolutione, partim e lacubus, partim ex rivorum & amniam congressu oriatur. Itaque non tam de fluviorum ortu, quam fontium origine & perpetuitate quaestio est.

Sunt de ea *varia Physicorum sententia* & Geographorum.

1. *Quidam* existimant, omnem fluviorum & fontium aquam esse a pluviiis vel resoluta nive. Indicium ejus esse volunt, quod pluvia & resoluta nives admodum augeant fluvios, ut saepe extra alveum se proferant & inundent regiones: item, quod fluvii admodum decrescant & quidam minores omnino siccentur, ubi longo tempore in aestate pluvia non decidunt, propterea quod alveus hisce sit minus profundus atque ideo parum aquae collegerint: illos vero, quibus profundus est alveus, non desinere neque exsiccari in aestate, propterea quod tantum aquae ex praecedentibus pluviiis & resolutis nivibus collegerint, ut non possit omnis in vaporem tolli nisi diuturno & constanti aestu. 2. quia paucissima flumina in illis locis



ubi rarus est imber : ut in Africa interiori pauci sunt fontes.

Sed hæc non solvunt quæstionem , quia non de fluviorum ortu , sed de fontium tantum aquæ origine debemus quærere. Ideo qui ita dicunt , non considerarunt bene sensum quæstionis , ut jam monuimus : quanquam etiam experientia , quam adducunt , non sit generalis , quia reperiuntur fluvii in locis , ubi rara pluviz , nullæ nives , etsi in Peruviana regione & Ægypto verum sit , quod asserunt. Præterea pluvia non ultra decem pedum profunditatem humectat Terram : fontes vero è majiori profunditate scaturiunt.

2. *Alii existimant* , non esse quærendum unde illa fontium aqua oriatur , quoniam aqua sit elementum , non minus ac terra & aër & ignis , de quorum ortu non quæritur ; sic Seneca disserit. Verum enim vero illi autores nodum Gordium Alexandri gladio dissecant. Non enim quæritur , quomodo existat aqua , sed quomodo ad loca fontium & non ad alia perveniat. Præterea terra non ita profluit , sicut fluvii. De aëre vero falsum est quod statuunt non esse quærendum.

3. *Aristotelici sequuntur opinionem* Præceptoris sui Aristotelis , qui libro 1 de Meteoris toto capite XI multis probare conatur , quod aqua fontium generetur ex aëre in terræ visceribus contento. Rationes adducit has : 1. Ex aëre supra terram existente aquæ generantur , pluviz nimirum : itaque cum in terræ visceribus & aër sit & eadem condensationis causa , nempe frigus , ideo absurdum esse dicit , si quis non putet ibi quoque ex aëre aquam fieri. 2. Experientia testatur , quod in terra grandiores guttæ ex parvis factæ stillent , & ideo fluviorum principia esse quasdam veluti scaturigines aquarum , quæ in unam aliquam terræ partem concurrant. Ideo enim , qui aquæ ductus struunt ,

scro.

serobibus atque cuniculis aquam deducere, tanquam ab excelsis sudante terra solent. 3. Quia plurimi fontes, & quidem maximorum fluviorum in locis montanis reperiuntur, pauci in locis planis: quod indicio est, aquam fontium ex condensato aëre esse vel vapore, qui aër & vapor versus altiora loca tendunt, & montana loca sunt tanquam spongia locis incumbentia humilibus. Hæc sunt Aristotelis rationes: quibus ego adjungo aliam non minus validam, nempe aëre nebuloso vel minus tantum sereno, sive aliquantum condensato, aciduli fontes statim deprehenduntur minus acidi, quod indicium est augeri illos ab aëre.

4. *Cardanus* cum aliis censet, aquam fontium fieri à rivulis, qui ex aqueis vaporibus tam intra quam extra terram existentibus & condensatis generati sint, sed fontes solos vix efficere fluvios, nisi pluvix vel resolutæ nives accedant. Rationes ejus sunt. 1. Si montes mane invisas, humidos invenies. 2. Fluvii matutino tempore excrescunt & quidem eo magis, quo fonti propior pars ejus sit.

Verum perpetuus & constans profiliens ex fontibus aquæ impetus non videretur à tam imbecilli causa & inconstante ortum habere. Neque differt hæc *Cardani* sententia multum ab Aristotelica, nisi quod Aristoteles aërem cum generatione, *Cardanus* vapores sine generatione ponit causam fontium, & vero exigua est inter aërem & vapores differentia.

5. Veteres nonnulli opinati sunt, pluvias intra terram in cavitatibus coacervari, & deinde tanquam ex alvo prægrandi erumpere, & aut fluvios omnes ex una, aut alium ex alia scaturire, nec ullam gigni aquam, sed quæ hybernis mensibus in hujusmodi conceptacula collecta fuerit, hanc in

annium evadere multitudinem arbitrabantur, & ob id majores semper hyeme, quam æstate profluere, & quosdam perennes esse, quosdam minime. Causam eandem addebant, quam in prima opinione proposuimus. Eam sententiam rejicit Aristoteles, quia plus aquæ in uno anno ex ostio fluvii effluit, quam sit moles telluris totius.

6. Ex modernis Philosophis, ut etiam antiquis, plurimi statuunt, Terram, quicquid aquarum ex ostiis fluviorum in mare emisit, rursus accipere. Occulto enim itinere maris aquam subire terras, & in transitu per multiplices anfractus terrarum verberatum & per arenas atque argillam colatum deponere falsedinem & amaritudinem, & sic in sinceram aquam transire. Hanc sententiam ego quoque tueor & veram esse existimo, ita tamen ut nec tertio loco, nec primo loco positam causam excludam. Rationes sunt hæc: 1. quia plures quam mille fluvii in mare se exonerant, & majores ex illis tanta copia, ut aqua illa, quam per totum annum emittunt in mare, superet totam Tellurem, sicut Wolga in mare Caspium, & alii. Itaque fieri aliter nequit, quin ex mari aqua in plurima Telluris loca & usque ad fluviorum fontes emittatur. Nisi enim hoc fieret, ne cogitari quidem potest, quomodo mare non augeatur in immensum, vel cur fontes non desinant emittere aquam. Neque dicas, vapores tam multos è mari elevari, quantum aquæ mare acceperit à fluviiis. Primo enim vapores illos sola reddit pluvia: deinde falsissimum est, quod tanta copia vaporum è mari tollatur, quanta generari possit ex aqua, quæ ex fluviiis in mare influit.

Secundo, probatur hæc sententia ex eo, quod fontes prope mare sunt falsi vel falsiusculi, & quo propiores mari eo magis plerunque falsi; ut in lit-

tore Africa, India imprimis Coromandelio litto-  
re, ubi neque vites crescunt & omnes falsi putei.  
In urbe Suez, ubi mare rubrum terminatur, o-  
mnes putei falsi & amari, & quæ à duobus milliari-  
bus petitur aqua, falsiuscula est. Sic in multis maris  
insulis putei nulli dulces sed falsi ( minus tamen,  
quam ipsum mare ) reperiuntur, ut in insula sancti  
Vincentii, aliisque. In Peru humili seu littorali  
regione lacus falsi sunt propter maris viciniam. Imo  
in locis maritimis Orientalibus nuces quas *Cocos*  
vocant, falsiusculæ reperiuntur. Quid, quod in locis  
Mediterraneis falsi fontes reperiuntur, ut in Lotha-  
ringia, Lunæburgi, Hallæ, &c. ?

3. Quia mare per subterraneos ductus aquam  
suam emittere manifestum est ex salinis Lunæ-  
burgensibus, Hallensibus, &c. ubi infra terram  
reperiuntur illi ductus seu fontes pleni aqua salia  
seu marina.

4. Quia ad insignem profunditatem fodientes,  
ut etiam in fodinis, copiosam invenimus aquam,  
cujus nec pluviam nec aërem possumus efficientem  
causam ponere.

Quomodo autem ex mari ad loca fontium per-  
veniat aqua ita ut dulcis fiat jam explicavimus,  
nimirum fundus maris non est ubique petrosus &  
faxeus, sed in plurimis locis arenosus, limosus,  
argillaceus, spongiosus, quæ terræ aquam maris  
imbibunt, ( sicut videmus id non tantum in terris  
nostris, sed etiam à siligine, tritico, hordeo, pisce,  
caryophyllis fieri ) & per continuationem terræ ad  
longam à mari distantiam paulatim deducunt,  
ubi tandem guttulæ coeunt præsertim in angusto  
loco, ut sunt montes, & data civitate fontem effi-  
ciunt: Quod si cavitas illa recta sit & clausa à ter-  
ra, tunc collecta ita aqua vel aliam viam ubicun-  
que factam sequitur, & sic in alio loco fons vide-  
tur prorumpere, qui tamen in eo loco non est, sed



à priori loco derivatus fluvius subterraneo meatu : vel si nullam viam circumcirca sese aqua illa cavitatis reperit , neque violentia terram obtegentem possit perrumpere , tunc non augetur illa aqua, sed quæ ad illam tendebat augmentum futura , illa in alium locum avertitur. Ea vero est humidorum & liquidorum omnium natura atque proprietas, ut omnes eorum partes & particulæ moveantur versus eum locum , ubi defluxus fit. Ita si vasculum impleveris aqua vel liquore ut tumor emineat supra vasis labrum , habent quidem tunc omnes aquæ extantis partes æqualem inclinationem & defluendi potestatem in vicina labri parte , sed propter mutuam particularum cohærentiam (cujus causa in physicis explicatur ) si in una labri parte defluxus fiat , omnes reliquæ partes deserunt vicinum labrum & versus illam labri partem trahuntur, vel ipsæ sequuntur , ubi defluxus fit. Sic si oblongum panis frustum immergas una extremitate in aquam vel vinum , videbis aquam sursum ferri & non immerfam panis partem etiam humectare. Præterea mare per cavernas subit terram, ex quibus cavernis eodem modo prorepere potest aqua, nisi evaporationi malis ascribere , quæ sursum feratur, & in angusto loco coiens guttas.

Verum quia multa sunt , quæ hanc sententiam videntur minus verisimilem reddere , ista etiam considerari debent, ut appareat, non labefactare hæc propositam sententiam.

1. Loca fontium sunt magis elevata, quam maris est superficies , quia pleraque sunt in montanis locis, ideo non potest à mari ad loca illa fluere aqua , quoniam natura aquæ est, ut ad loca magis depressa vel minus elevata moveatur , non ad altiora , ut patet ex fluviis & Aquilegorum artificis.

2. Etsi fundus maris sit argillofus, limosus,

arenosus, ut ita aqua sese inserat per ejus particulas, tamen ratio sufficiens non apparet, cur non magis humectet subjectam terram & minus altam, quam ut sursum ad loca fontium prorepat, praesertim cum hic petrosa & saxea saepe sit terra, ut in montibus insulae S. Helena.

3. Nulla apparet ratio, cur aqua ita à mari prorepens non media via inter mare & fontem prorumpat.

4. In profundissimis fodinis non invenitur aqua vel saltem pauca, teste Thurnheusero.

5. Deberet aqua ista fontium salsa esse, quia à mari proficiscitur. Hæc sunt præcipua argumenta, quæ propositam sententiam falsitatis arguere videntur. Nam leviora ab aliis allata prætereo, nimirum quod existimant, mare non posse sufficere tot fluviis; deinde quod fluvii nunquam deberent imminui, si vera esset fluviorum causa, quam proposuimus. Etenim ad hæc duo facilis est responsio, quoniam mare rursus accipit aquam è fluviis, quam emisit in fontes; deinde ad alterum, jam monuimus, non hic esse quæstionem, neque nos istud statuere, quod fluviorum aqua omnis ex mari sit, sed tantum de fontium aqua, quæ sola non facit fluviis, ut diximus: & simul asserimus, quod fontium aqua augeatur à pluviis & madido rore, quoniam hæc terram humectantes repunt vel trahuntur versus loca fontium, ubi effluxus aquæ fit, quod explicavimus aliis exemplis. Ad quatuor itaque allata argumenta, quæ aliquid momenti habere videntur, nos convertamus.

Primum validissimum censetur, à multiplici experientia desumptum: ideo diversæ à doctis sunt allatæ & excogitatæ solutiones. Primo illi se omnium facillime expediunt, qui defendunt, Oceanum esse altiore[m] quam Terras, sic enim ne-

gant assumptionem, & aiunt, hanc ipsam Oceani altitudinem esse causam fontium, quia fontes sunt minus alti, quam aqua in medio Oceano. Præterea Olearius in Descriptione itineris sui Persici refert, quod montem, qui mari Caspio adjacet, conscenderit, atque astrolabio (vel potius geodætico instrumento) exploraverit montis elevationem supra maris, istius superficiem, deprehendisse autem nullam, sed maris extremam superficiem in Horizontali linea visam esse, imo aliquantum elevatam supra illam, ut ita maris istius tumor aliquantum altior deprehensus sit, quam montis vertex, in quo observationem instituit. Verum enimvero hæc solutio non potest admitti, quia capite XIII ostendimus, quod Oceani aqua non sit altior quam Terræ montes & littora, atque id frequentes observationes Mathematicorum in littoribus vel turribus factæ testantur. Ad Olearii observationem quod attinet, ea non parum difficultatis hic facere videtur. Namque mare Caspium non esse altius, quam Terras vicinas, multo minus quam montes, id ex eo colligitur, quod plurimi fluvii se in illud exonerant. Dicendum itaque videtur, refractionem turbasse Olearii observationem & fecisse, ut aqua Oceani altior appareret, quam revera esset: & fortasse fluctus maris auxerunt hanc causam, & mons, quem conscendit, minus altus fuit.

Hujus itaque solutionis debilitate perspecta, alii adducunt hanc, quod aquæ naturalis locus sit circa Terram, & ideo debere illam totam terram tegere, quoniam est levior quam terra. Quoniam autem à naturali hoc loco impeditur propter extantes terræ montes, monticulos, & altitudinem terræ assurgentem versus loca Mediterranea, ideo illam Oceani partem, quæ ibi esse debebat ubi montes & elevatae Terræ partes sunt, cum non sit  
in suo

in suo loco naturali, premere aquam subjectam, quæ quidem in naturali suo loco est, sed ab imminente aqua, quæ non est in naturali loco, pellicitur vel premitur ad fundum, ubi cum non inveniatur viam neque cedere possit, abit versus latera & montium radices subit, ubi collecta tanquam in aliqua cisterna exprimitur à premente Oceani aqua versus montis verticem, non aliter ac si in cantharum, cui à latere tubulus est vel emissorium (ad fundum canthari pertingens), ex quo aqua, vinum vel cerevisia in vitra infundimus, si, inquam, in cantharum talem plenum liquore vel semiplenum immittamus lapidem, liquor exsilit è tubuli orificio. Hæc Scaligeri est subtilitas: Sed nimis profecto crassa. Etenim non ita è radicibus montanorum locorum expellitur aqua versus verticem, quia & experientia in fossis contrarium testatur; & si ita fieret, salsa esse deberet fontium omnium aqua: præterea falsum est, quod assumit, aquæ partem non esse in naturali suo loco, & ideo premere subjectam partem. Etenim illud gratis sumitur & contra experientiam, quoniam aqua non premit subjectam partem, nisi cum altior est, quam vicina aqua, & ideo ubi superficies Oceani sphærica est, quiescit: quod si motus aliquis fieret à pressura, is ad littora maris aquam detrunderet, ubi laxior locus est, non per terræ parvas cavernas. Per magnas quidem cavernas è fundo maris influere aquam certum est, sed ex non efficiunt fontem dulcem, quia falsedinem aquæ non tollunt.

Ego veram argumenti solutionem non difficilem esse existimo, si consideremus, quomodo aqua ad fontem perveniat, nimirum non per aliquem alveum vel tubulum ex alveo maris vel pede montis (sic enim falsedinem retineret) sed per continuam aquearum particularum progressio-



nem vel reptionem ( ut ita dicam ) in materia terrestri ad loca vicina fonti, ubi demum in guttas colligitur propter cavitatem & continuam successionem aquæ, atque sic fontem efficit. Hoc enim in effossa ad insignem profunditatem terraprehendimus, quod hinc inde guttulæ aquæ consistant, & à vicinis premantur, ut exiguus rivulus fiat, quos vocant venas aquæ (*aderen*) quales rivuli si plures in unam cavitatem congregiantur, fontem efficiunt, id quod optime norunt qui aquæ ductus vel fontem efficere aut puteum callent. In puteis enim colligitur aqua ex multis guttulis, quæ in fundo putei ex vicina terra coeunt: & qui aquæ ductus struunt, serobibus atque cuniculis aquas deducunt in unum locum, ut ita ab excelsis locis guttulæ decidant in cavitatem.

Si objicias, fontes multos inter media saxa scaturire, per quod non sit verisimile aqueas particulas ita prorepfisse; ad id respondeo, hoc ipsum confirmare sententiam nostram. Etenim illa saxa non à vertice montis usque ad pedem montis pertingunt (saltem in illis montibus, ubi fontes reperiuntur), sed tantum superficiem montis & aliquam exiguam profunditatem occupant, intus vero terra montis mollior est, vel minus saxea, vel talis saltem, ut aquam recipiat & attrahat; ideoque ubi penetrando ad saxeam partem pervenitur, quia penetrare amplius non potest, ibi sistitur & in guttas colligitur, efficitque fontem inter saxeam partem prorumpentem, nimirum si via concedatur. Et montes petrasque insulæ S. Helenæ & fere omnium insularum non esse intus ita petrosas & duras colligitur ex eo, quod omnes fere illi montes aliquando arserint vel saltem fumaverint, quod ex cinerea terra, item ex sulphure, quod in illis locis reperitur, colligitur. Adde, quod jam in superioribus monuimus, aquæ fontem non  
semper

semper ibi esse, ubi esse videtur, sed ex altiori loco per subterraneum ductum ad fontem meare, & ita efficere ut aqua profiliat cum aliquo impetu, quod in plurimis fontibus fieri existimo. Et magis persuademur, si consideremus, ignem quoque deorsum moveri propter materiae continuationem, cum revera, si liber sit, sursum tendat. Ita si oblongi ferri extremitatem admoveas igni, penetrabit hic per totum ferrum usque ad alteram extremitatem, etsi hæc extremitas altera non sursum, sed deorsum vergat.

Sic itaque primum argumentum, quod fontanæ aquæ originem à mari impugnabat, sufficienter dissolvimus. Ad secundum respondeo, causam dari posse, cur aqua maris non tam penetret & repat in terram versus centrum, quam versus montes, nimirum, quod ibi terra sit magis dura & metallica, id quod experientia testatur: ubi vero non est ita dura, ibi fit penetratio aquæ, & ideo etiam infra fundum maris intra terram versus centrum, ubi cavitas aliqua est, fluvios reperiri vel saltem dulces aut salfos lacus non negamus. Sed quia paucae tales cavitates sunt, & ubique fere terra metallica & dura infra fundum maris, ideo non potest imbibere continue aquam, sed ubi saturata est, cessat amplius imbibere, neque plus recipit. Tunc itaque repit aqua versus altiora loca. Ad quod promovendum verisimile est, quod multum faciat mutatio altitudinis maris, modo in hac modo in illa parte propter fluctus & tempestates. Etenim aqua altior facta magis premit aquam & promovet ejus ingressum per terras ad fontes. Cumque singulis diebus non tantum à tempestatibus, sed etiam à fluxu & refluxu augeatur altitudo maris & minuatur in partibus Oceani, ideo talis pressura singulis diebus fit: sed dubito an hæc causa multum efficere possit.

Ad tertium argumentum dico, rationem esse dispositionem locorum & ipsius terræ, atque ut dixi, quod humor movetur & repit versus eam partem, ubi effluxus fit: neque opus esse puto proximiori explicatione.

Quartum vero argumentum à falsedine desumptum difficiliorem habet solutionem, quia per solam transcolationem non videtur posse tolli falsedo. Etenim falsedo aquæ consistit in duplici sale (quod Aristotelici non animadverterunt) quorum unum Chymici apte vocant fixum, alterum volatile. Et fixum quidem sal separari potest à marina aqua tam per transcolationem continuam, quam per coctionem sive destillationem aquæ: sed volatile sal quia spirituosum est statim attollitur cum ipsa aqua, neque per destillationem utut frequentem & sæpius repetitam hætenus quidem separari potuit per artem aqua dulcis. Itaque difficile est, dare modum, quo volatilis hicce falsus spiritus in via inter mare & fontem separaretur ab aqua marina. Sed interim pro solutione omnino sufficiunt hæc. 1. Etsi nobis nondum innotuerit artificium & modus, quo falsedo ista volatilis separaretur ab aqua marina, non ideo negandum est, separari posse, quandoquidem deprehendimus à Natura illum separari; nimirum pluviam in medio Oceano dulces decidunt, quæ tamen generata fuit è vaporibus à mari sublatis. 2. Particulæ illæ marinæ aquæ terram penetrantes, antequam ad fontem confluant, miscentur hinc inde cum aliis humoribus dulcibus ex pluvia vel vapore ibi ortis, atque sic parva illa falsedo, quam adhuc habebant, omnino insensilis redditur. 3. Non verum est, quod in omnibus fontibus falsedo omnino insensilis sit, quia quidam fontes falsi sunt, ut antea diximus & exemplis probavimus, quidam falsiusculi, ut quobus milliaribus ab urbe Suez, & locis minus

min  
ne &  
dam  
per  
sam  
est, q  
que  
certu  
Fo  
aquis  
ritur  
tim ex

Fl  
dunt  
vi stu  
Su  
ca,  
stu ve  
do &  
ejus  
rens  
tera n  
2.  
rethu  
tur, &  
quam  
neos  
mani  
Tabu  
3. C  
rivos  
Quod  
cus &  
Sic  
Ex

minus à mari remotis. Longa itaque transcolatione & evaporatione lentissima opus est ad separandam aquam à sale volatili, atque hoc modo etiam per artificia efficitur aquam marinam minus salisam, atque talis quoque pluvialis aquæ generatio est, quæ ideo salsa non est, vel saltem minus. Namque in mari interdum falsiusculas cadere pluvias certum est.

*Fontium itaque aqua partim à mari vel subterraneis aquis, partim à pluviiis & rore terram humectantibus oritur. Fluviorum autem aqua partim ex fontibus, partim ex pluviiis & nive oritur.*

#### PROPOSITIO VI.

*Fluvii quidam in medio itinere sub terram se condunt, atque alio loco rursus egrediuntur tanquam novi fluvii.*

Sunt autem celebrati hi. 1. Niger fluvius Africae, quem quidam Cosmographi subterraneo ductu volunt ex Nilo derivari, quoniam eodem modo & tempore exundat atque Nilus, neque alia ejus exundationis causa apparet. Ipse Niger occurrens montibus Nubiæ conditur sub illis, & ex altera montium plaga Occidentali egreditur.

2. Tigris in Mesopotamia transvectus lacum Aarethusam occurrens monti Tauro in specu mergitur, & à latere altero ejus profluit. Deinde postquam transit lacum Thospitem, rursus in subterraneos cuniculos mergitur, & post sex circiter Germanica milliaria demum prorumpit. Olearii tamen Tabula non exhibet hasce latebras.

3. Circa Arcadium in Peloponneso plurimos tales rivos fuisse scribit Aristoteles, lib. 1 Meteor. cap. xi. Quod etiam Poëtæ versus testantur, in quibus Lycus & Erasinus nominantur:

*Sic ubi terreno Lycus est epotus hiatu,*

*Existit procul hinc, alioque renascitur ore.*

Sic



*Sic modo combibitur, tacito modo gurgite lapsus  
Redditur Argolicæ ingens Erasinus in undis.*

4. Alpheus Achaia fluvius à terra absorbetur. Eum Græci scribunt sub mare & infra terram agere cursum usque in Siciliam, ubi in Syracusano litore emergere eum volunt atque illum esse, qui in Sicilia Arethusa dicitur. Hoc autem ex illo imprimis collegerunt, quod Arethusa in Sicilia, quinta quaque æstate stercore pecudum ejiciebat eo tempore, cum in Achaia Olympia celebrarentur & matatarum victimarum stercore in Alpheum conjiceretur. Secundo itaque flumine delatum in Sicilia ejiciebatur.

5. Guadiana fluvius inter Lusitaniam & Beticam, olim Anas dictus, totus ad oppidum Medelinam cuniculo se condit & post octavum circiter milliare Germanicum renascitur.

6. Dan fluvius ( qui cum fluvio Jor confluit facit Jordanum ) prorumpit aliquot milliariis à fonte suo Phiala. In hunc enim conjectæ paleæ reduntur vel prorumpunt in apparenti fonte vel prurptione ipsius Dan fluvii.

Plinius atque alii scripsere, Nilum quoque aliquoties in via terras subire, sed experientia ostendit, illum in toto itinere conspicuum manere. Sic Aristoteles atque alii Padum vel Eridanum celebrem Italiae fluvium occultari sub terram aliquo intervallo scripserunt, sed experientia contrarium docet.

Causa autem, cur fluvii isti se condant sub terram, & rursus emergant, est 1. obstaculum loci magis elevati, quam alveus fluvii. 2. Cavitas sub illa terra forte existens, vel inconstans materia, quæ facile cedat fluvio allabenti.

Sunt etiam alii qui sese condunt sub terram, sed non iterum emergunt, ut in sequentibus dicemus.

## PROPOSITIO VII.

Fluvii magni, & mediocres plerique, ut etiam minorum magna pars, exonerant se in mare, vel lacum. Et locus, ubi hæc exoneratio fit, dicitur Ostium fluvii. Quidam fluvii unum, quidam tria, quidam plurima ostia habent. Quidam ex mediocribus & minoribus exonerant se in majores fluvios. Reliqui vel stagnant vel à terra absorbentur.

De majoribus fluviiis res manifesta est exemplo Rheni, Albis, Danubii, Wolgæ, &c. Etenim Danubius 7 ostiis in Pontum Euxinum evolvitur; Wolgæ ad minimum septuaginta numerantur ostia, Nilus septem, & ubi exundat plura.

Causa, cur majores fluvii in mare se exonerent, est aquæ copia & vehemens latio. Cur autem plura ostia, quam unum, habeant, causa duplex est. 1. Copia aquæ. 2. Pulvinorum in ostiis generatio, qui progressu temporis ita augmentur, ut pars terræ vel insulæ fiant. atque ita efficiunt, ut fluvius allapsus in duos ramos dividatur, & cum tales pulvini plurimi generentur, plurimos in ramos dividitur fluvius, sive unum ostium in plura. Sed plerunque tunc ostia proferuntur & mare à terra recedit.

Sane Nilum uno tantum ostio olim in mare se immisisse testantur Veteres, quod ostium Canobicum appellarunt. Hisce duabus causis tertia adjungi potest, nempe humana industria. Etenim homines ex fluvio aliquo sæpe ductus aquarum derivant, atque illis in mare viam seu alveum parant, partim ad irrigandos agros, partim ad navigationis commoditatem, qui aquæ ductus progressu temporis ab aquarum impetu majores fiunt. Ideo veteres scribunt, neque id sine verisimili ratione, quod omnia Nili ostia, excepto uno Canobico, sint facta ab hominibus. De hoc plenius in sequenti

sequenti Propositione agetur, ubi etiam explicabitur, Quomodo factum sit, ut unus fluvius in alterius alveum fluat.

Wolchda in Moscovia (non Wolga) oritur ex lacu, & in alium lacum se exonerat.

Fluvii, seu rivi, qui neque in mare neque in alios fluvios se exonerant sunt vel brachia seu rami aliorum fluviorum, vel peculiare fluvii. Rami qui sunt aliorum fluviorum, eos verisimile est stagnare neque subire terras. Causa autem cur non ad mare tendant, duplex est. 1. Quia alveus minus altus est, & ideo non multum aquæ habent. 2. Durior terra impedit progressum. 3. Multi ex illis manu facti sunt ad irrigandos agros & faciliorem aquæ usum. 4. Ostium obstructum est, nempe mari recedente & terra aucta aut in mare promota, vel pulvini in alveo generati ita aucti sunt, ut aquam non admittant, sed repellant versus fontem vel locum, unde affluxit. Ita ramus Rheni, qui olim se exonerabat in mare Belgicum prope Cattorum vicum vel arcem Britannicam, hodie stagnat mediâ inter Leydam & Cattorum vicum viâ.

Peculiare vero fluvii, qui neque in mare neque in alios fluvios se exonerant, sed in terra ori à terra absorberi videntur, pauci sunt & admodum parvi, ut qui ex montanis Peruvianis & Indiæ & Africa profiunt, in arenosum solum absorbentur vel conduntur infra arenas. Sic ad Meten (est vicus ante sinum Arabicum) reperitur amnis alveo glareoso. Sub eam glaream in ætate latices tacito cursu ita se condunt, ut nihil humoris in summo prorsus appareat. Quod si non concedatur illis rivis via sub terra, efficiunt paludes & lacus parvos. Sunt tamen aliqui adeo lenta scaturigine, ut per exhalationem tantum separetur fere, quantum à scaturigine accipiunt, atque ita in terra sistuntur, neque

neq  
Mol  
que  
tam

2  
hom  
V  
ipfa  
haic  
novi  
face  
agru  
pus  
veur  
Etos  
quo  
Alie  
supe  
firm  
rum  
lacu  
& a  
conf  
facta  
nes  
veur  
Idee  
inte  
H  
alio  
illar  
veo  
ob d  
fluvi  
in T

neque lacus efficiunt, neque absorbentur: ut in Moscovia rivus Conitra, Salle, Mareffa, Jeleesa, atque alii. Vide Mappam magnam Arctoi Orbis editam ab Hondio.

## PROPOSITIO VIII.

*Utrum via vel alveus, quo fluvii decurrunt, sit ab hominum industria an a natura factus?*

Verisimile est, eorum fluviorum, qui non cum ipsa Terra generati sunt, alveos, manu factos esse, hæc ob causas. 1. Quia experientia testatur, cum novi fontes scaturiant, aquam profluentem non facere sibi certum alveum, sed per adjacentem agrum se expandere, adeoque si fluere debeat, opus esse hominum adjumento ad excavandum alveum. 2. Quia multos alveos ab hominibus factos esse constat. Sic Chineses alveum fecerunt, quo ex flavo fluvio aqua currit in alium fluvium. *Alia exempla minus celebria omitto, quia satis superque nota.* 3. Quia lacus & paludes id confirmant, quales reperiuntur circa fontes plurimorum fluviorum in planitie existentes, ut sunt illi lacus seu paludes ex quibus Nilus, Tanais, Wolga & alii profluunt. Quos lacus generatos esse & conservari ab effusione aquæ ex fonte circumcirca facta, non est quod dubitemus: atque ideo homines, ut agros à tali aqua defenderent, certum alveum fecisse, in quo deflueret & agros desereret. Idem de fluviiis, quorum fontes in montibus sunt, intelligendum est.

Huic quaestioni vicina est illa: An fluvii, qui in alios se exonerant, vel congregiuntur, suo motu illam viam fecerint, an ab hominibus in illos alveo facto deducti? Posterius magis verisimile est ob causas modo dictas. Idem quoque de ramis fluviorum & circumductibus, quibus insulae fiunt in Tanaï, Wolga, intelligendum est. Sic Euphratis



tis unum brachium per Chaldaicas paludes transiens olim evolvebatur in mare, postea ab incolis ad agros rigandos multis alveis & ductibus ex eo factis iter deseruit, neque mare petit, ostio pracluso, sed aqua partim in ductibus aquae factis absumitur, partim in alterum brachium avertitur, quod in Tigrim se exonerat. Atque ita quoque cum aliis fluviis res videtur se habere, quos hodie non ad mare exire, sed stagnare videmus. Verisimile est, eos olim in mare se exonerasse.

PROPOSITIO IX.

*Cur nulli fluvii salsi reperiantur, cum fontes salsi multis in locis sint?*

Causa est, quia homines non opus habent aqua salsa, & ideo non faciunt alveum, quo fontis salsi aqua fluat, quoniam minori compendio sal sibi comparare queunt. Si autem ab illis salsis fontibus alveus aptus pararetur, haberemus salso fluvios vel rivulos, quales in salinis Lunaburgensibus & Hallensibus sub terram habentur. Neque dubitandum est, quin sub terram multi salsi amnes labantur à suis fontibus.

PROPOSITIO X.

*Alvei fluviorum quo fontibus sunt propiores, eo sunt altiores; & quo ostium fluviorum seu mari propiores, eo magis depressi, ut plurimum.*

In quibusdam vero alveis partes quaedam remotiores à fonte sunt altiores parte magis vicina fonti, nempe vel ob colles & valles ut ita dicam existentes in alveis, vel ob voragines. Nulla tamen alvei pars fonte altior est.

Causa seu ratio Propositionis manifesta est, quia aqua non fluit nisi à loco altiori ad humiliorem, & ideo quavis alvei pars (inprimis ostium fluvii) est humilior fonte: alias enim versus fontem refluat

fluer  
usqu  
tibu  
in al  
pul  
à for  
font  
aqua  
ca,  
aut p  
ostiu

Et  
habe  
Wol  
A  
alvei  
dicit  
& ce  
habe  
Et  
tanto  
esse  
fluvi  
Lado

Ita  
tore  
nus  
re. C  
in d  
navig  
omn  
majo  
duce  
excip  
alvei  
depre  
Libra

flueret aqua. Quod autem decreſcat elevatio alvei uſque ad oſtium, id de plurimis ſaltem alvei partibus verum eſt. Quia enim hinc inde reperiuntur in alveis voragineſ, depreſſa magis loca, & contra, pulvini, monticuli; inde fit ut una alvei pars, etſi à fonte remotior, ſit altior quam pars alvei quæ fonti propior, & nihilominus ab hac ad iſtam fluit aqua, quoniam ea copia aquæ inſluit in depreſſa loca, ut ſuperficies ejus altior fiat quam monticuli aut pulvini vicini, ſive vicinæ partes, quæ verſus oſtium jacent magis elevata.

Et vix ullus fluvius reperitur, cujus alveus non habeat hæcæ inæqualitates, imprimis in Nilo & Wolga abundant pulvini.

Atque ubi ex altiori loco ad magis depreſſam alvei partem aqua decidit, ſi magna ſit depreſſio, dicitur iſ locus Cataracta fluvii, ubi cum impetu & celeritate fluvius deorſum ruit. Tales Cataractas habent majores fluvii, imprimis Nilus.

Etenim Nilus duobus alvei locis inter montes tanto impetu & fragore decidit, ut accola ſurdaſtri eſſe dicantur. Wolgda quoque parvus Moſcoviæ fluvius (non Wolga) duas habet Cataractas prope Ladogam.

Ita Zaire fluvius in Congo ſex milliaribus à litore Cataractam habet ubi de monte decidit. Rhenus ad Bilefeldam, & ad Scaffuſiam ingenti fragore. Cæterum Hydragogi obſervarunt, ſi alvei fundus in ducentis paſſibus deprimatur uno paſſu, eum vix navigabilem eſſe propter celeritatem. Cum itaque omnes fluvii ſint navigabiles, colligimus, quod non major ſit alveorum depreſſio, quam uno paſſu in ducentis. Sed particulares Cataractæ & voragineſ excipiuntur. Vocatur autem depreſſio hæc unius alvei partis infra aliam partem, libramentum. Et depreſſio oſtiorum fluvii infra fontis locum, dicitur Libramentum fluvii.

## PROPOSITIO XI.

*Cur fluvii in una sui parte majorem habent vel acquirunt latitudinem, quam in alia parte?*

Causæ quatuor sunt. 1. Si ripa seu littus in ista parte sit humilius, quam in hac. 2. Si terra littoris minus dura sit & coherens, ut non satis resistat violento fluvii accessui, qui interdum vel à ventis vel ab aquæ copia oritur. 3. Si alveus in illa parte minus profundus vel excavatus sit, vel pulvinos habeat. 4. Si à cataracta aliqua defluat in illam partem.

## PROPOSITIO XII.

*Fluviorum alvei fiant magis vel minus depressi, modo in hac, modo in ista parte.*

Minus depressi vel altiores & minus cavi evadunt, 1. Si pulvini generentur. 2. Si fluvius ab ea parte fiat latior. 3. Si fluxus minus celer fiat.

Augetur depressio seu cavitas alvei, si celer sit & vehemens fluxus fluvii, præcipue à Cataracta aliqua, vel inter angustias littoris, imprimis si fundus constet terra minus coherente.

## PROPOSITIO XIII.

*Cur fluvii quidam celeri cursu, quidam tardiusculo progrediuntur? Et, cur unus idemque fluvius in uno loco celeri, in altero tardo cursu fertur, quod in Rheno multis locis observatur?*

Causæ sunt, 1. Fontis altitudo. 2. Incrementum declivitatis seu depressionis in partibus alvei vel fundi (imprimis in ostio). Etenim si fundus inducentis passibus deprimatur uno passu, observant Hydragogi, in eo alveo aquam ita celeriter & rapide moveri, ut non sine periculo navigetur. Ubi itaque Cataractæ sunt, ibi celerrime ruunt fluvii. Et ideo torrentes ita rapide feruntur, quia  
à mon-

à montibus defluunt. 3. Angustia alvei & profunditas cum aquæ copia, ut cum inter duos montes vel procurrentes terras fluvius transit.

Celeritate cursus celebres sunt fluvii, Tigris, Indus, Danubius, Yrtis in Siberia, Malmistra in Cilicia, qui cum tanto fragore fluit, ut è longa distantia audiatur.

PROPOSITIO XIV.

Ostia fluviorum eo facilius obstruuntur, quo latiora sunt, & quo altiora vel minus depressa, & quo aquæ fluvii copia minor, minusque celer & vehemens fluxus. Etenim hæ causæ faciunt, ut minori impetu feratur fluvius, neque protrudat materiam terrestrem quæ in ostiis colligitur, sed potius subsidere eam patiatur.

PROPOSITIO XV.

*Fluvii pauci directo cursu à fonte ad ostium feruntur, plerique plagas diversas in fluxu petunt, quidam plurimis curvaturis fluunt.*

Causa esse videtur partim hominum industria, partim aquæ motus, partim objecti in directo cursu pulvini.

Flexuosi fluvii sunt, 1. Rio de Orellana in Brasilia, innumeras curvaturas faciens, ita ut mille & quingentarum leucarum censeatur ejus iter seu alveus, cum directa linea à fonte ad ostium æstimentur tantum septingentis.

2. Fluvius des Madres in Natolia, cujus curvaturæ numerantur sexcentæ.

3. Fluvius Toera in Siberia oriens tam crebris & flexuosis curvaturis fluit, ut Russi & Siberienses cum in eo navigant, frequenter naviculam & onera per terram ab una curvatura ad aliam portent ad vitanda magna dispendia.



## PROPOSITIO XVI.

*Utrum lacus, per quos quidam fluvii videntur transire (sive ingredi in eos & egredi) sint effecti à fluvio, an vero suas scaturigines peculiare habeant, & fluviorum aquam augeant? item, an fluvius prodiens è lacu sit idem cum eo, qui influit? Non omnes fluvii habent lacus tales, sed quidam tantum. Nubia Africae fluvius numerat quinque, Niger fluvius quatuor, Rhodanus Lemanium lacum, &c.*

De lacubus hisce jam in præcedenti capite diximus, nimirum conferendum esse fluvium ingredientem cum eo, qui egreditur. Si is, qui egreditur, major est illo qui ingreditur, erunt in fundo istius lacus peculiare scaturigines, quæ lacum efficiant: si minor vel saltem non major egreditur, factus est is lacus & conservatur à fluvio ingrediente, & causa sive origo illius generationis fuit alvei latitudo & cavitas seu depressio. Et potest ex quovis fluvio lacus effici, ut in præced. capite diximus.

Et si egrediens fluvius sit in directa circiter linea situs cum ingrediente, unus idemque fluvius sive unius fluvii partes erunt censendi duo illi fluvii, nempe cum egrediens major est ingresso, nam si minor sit vel non major, non puto quarendum esse vel dubitandum, an egrediens idem sit cum ingrediente.

Accedunt in quibusdam alia indicia. Ut Rhodanus Lemanium lacum ingreditur atque rursus egreditur, neque tamen efficit illum lacum, quod colligitur præter alia ex colore, quem fluvius hic diversum gerit à colore lacus. Neque Rhenus ullum lacum efficit, sed à pullulantibus subter terram aquis producitur & conservatur. Non tamen hæc tanquam indubitata propono.

## PROPOSITIO XVII.

*Fluvii plerique eo latiores fiunt, quo ostio propiores, vel à fonte remotiores, atque in ostiis maxima est latitudo.*

Causa est, 1. Quia alii fluvii ingrediuntur eum, qui in mare se exonerat, atque ita copia aquæ augetur. 2. Quia alveus minus deprimatur in partibus ostio propioribus. 3. Quia vento è mari spirante fluvii aqua repellitur ab ostio versus fontem, qui impetus tantum in partibus ostio propinquis, non in remotis & fonti vicinis sentitur. 4. Ipsum mare vento tali spirante, ostium ingreditur, & vehementi agitatione amplius & latius illud reddit.

Atque eo majora & latiora sunt ostia in magnis fluviiis, quo pauciora. Maxima ostia sunt fluviorum, Maragnon in Brasilia, Laurentii in Canada, Zaire in Africa, fluvii argentei in Brasilia. Etenim hic in mare fertur ostio quadraginta leucarum, ut quidam annotarunt, sed alii viginti tamen leucas ponunt, & puto illos, qui quadraginta scribunt, reliqua ostia istius fluvii simul comprehendisse, Zaire vero ostium viginti octo milliarium esse scribunt, qui in Congo fuerunt. Et fluvii hi tam patulis ostiis copiosam aquam effundentes vincunt sive delent & saporem salsum maris & motum versus littora, idque usque ad decem vel duodecim milliaria in mari.

## PROPOSITIO XVIII.

*Aqua fluviorum multas particulas variorum metallorum, mineralium, arenarum, olcosorum seu pinguium corporum secum defert.*

Ita quidam fluvii sunt auriferi, qui deferunt arenulas, quibus grana auri sunt admixta, quales sunt, 1. In Japonia. 2. In insulis Lequeo non

procul à Japonia. 3. Rivus, Arroë dictus in Africa, qui scaturit in Monomotapa è radicibus montium Lunæ, in quibus auriferæ fodinæ, & fluit in Magnicen Soffalæ fluvium. 4. In Guinea, ubi Nigritæ grana hæc separant ab arena & Europæis nautis (qui ob solius auri mercaturam istuc navigant) vendunt seu commutant cum Europæis mercibus. Interdum afferunt cum ipsis arenulis. Vocant *gràngold*: estque optimum neque indiget depuratione. 5. In rivis circa urbem Mexico etiam grana auri colliguntur, præsertim post pluvias, seu imbres, quod de omnibus hisce rivis intelligendum est. Namque extra imbrium tempus vix vel parum admodum reperitur. 6. In Peru. 7. In Sumatra. 8. In Cuba. 9. In Hispaniola & quibusdam adjacentibus insulis. 10. In Guiana Americæ provincia. 11. In Caribana rivis magna grana reperiuntur post imbres: incolæ prætendunt reticula hinc inde fluenti aquæ, & dein ab arena facili negotio separant. 12. Plurimi rivi & fontes sunt in regionibus circa Alpes Germaniæ imprimis in provincia Tirol, ex quorum aqua aurum & argentum elicitur, etsi nulla grana in eis sint conspicua: quia particulas vehunt admodum exiguas, sive atomos. Rhenus quoque auriferum lutum vehit in plurimis locis, ut etiam Albis. Olim Tagus Hispaniæ fluvius admodum celebris erat propter granula auri in eo reperta, sed hodie nihil amplius largitur, neque memini de ullo Europeo rivo tales divitias prædicari. In Hassia quoque hoc seculo dicitur repertus fluvius parvus, in cuius arena fuerint auri grana. Sed fide dignum autorem de eo nondum legi.

Argentiferi quidem fluvii seu rivi non sunt annotati à Scriptoribus; non tamen dubito, quin æque multi vel plures etiam rivi sint, qui granula argenti deferant, sed quia non ita facile discernuntur

nuntur ab arena, neque inde magnum lucrum & vix operæ pretium expectari potest, ideo à nemine hætenus observatum fuit. Eadem causa fecit, ut neque eorum rivorum, qui ferrea, cuprea, stannea granula deferunt, facta sit hætenus mentio, exceptis paucissimis, quorum tamen magnus sine dubio est numerus, quorum mirabiles effectus cum vident homines, stupent, & Philosophi vulgares ad occultam qualitatem confurgunt. Illum modo spectemus fluvium in Germania superiori, qui ferrum mutat in æs, ut vulgo putant, ita ut si ferream soleam suspendas in eo, cupream sis extracturus. Nimirum non ferrum mutatur in cuprum, ut prædicant vulgo, sed cupræ & vitrioli particulae seu granula, quæ in isto fluvio sunt, corrodunt ferrum adjuvante motu aquæ, & particulis ferri semotis cupræ particulae in eorum locum succedunt. Hoc autem Physici moderni, qui chymix periti sunt, per aliud experimentum didicerunt.

Multo minus fossilium, variarum scilicet Terræ specierum atque salium particulis imprægnati rivu observati sunt. Explicabimus autem sequenti capite fontes minerales & metallicos.

Ex hac variarum particularum admittione oritur magna diversitas aquarum in fluviis atque puteis. Quorundam aqua si ad coquendos cibos adhibeatur, subnigros eos reddit (ferro imprægnata esse indicio est), neque pisa ita facile ad molliem perducuntur, ac si in alia aqua decoquantur, quæ pinguis aliquantulum sit. Ex diversis aquis non potest eadem cerevisia vel similis confici. Inde est, quod quorundam fluviorum & puteorum aquam Germani vocant, *Ein hart wasser* / nempe quæ ferreis particulis, nullis vero oleosis & pinguibus imprægnata est. Albis autem ex pinguium numero est, ut ita loquar. Causa hujus va-



rietatis petenda est ex varietate terrarum, per quas fluvius fertur, quæ vel saxeæ sunt, vel argillaceæ, vel metallicæ.

Atque experientia testatur, quod fluvii quorum aqua mollis seu pinguis est, fluant per argillaceas terras. Sic omnia loca, quæ adjacent Albi, sunt admodum fœcunda.

#### PROPOSITIO XIX.

*Plurimorum fluviorum aqua discrepant coloribus, gravitate, aliisque qualitatibus.*

Etenim quædam aquæ sunt nigræ, quædam subnigræ, quædam ad rubrum vergunt, quædam ad albedinem.

Et diversitas hæc omnium maxime animadvertitur, cum duo fluvii coeunt. Possumus enim ad plures passus, ubi jam in eadem alvei parte existunt, aquas illas adhuc discernere. Ex quo etiam patet, quod gravitate differant, dum una magis fundum alvei petit, quam altera. Quanquam hoc manifestum magis sit per examen libræ.

Gangis aqua levissima & saluberrima censetur: eamque Imperator Guzaratensis, sive Magnus Mogol, quocunque loco agat, in phialis sibi adferri curat, & hanc solum potat. Alii Nili aquam saluberrimam & fœcundissimam esse volunt. Graves aquæ pleræque ferro vel Mercurio imprægnatæ sunt.

In magnis fluviiis respiciendum est ad rivos, è quibus componuntur: nam Rhenus plurimos accipit minerales rivos, ita quoque Danubius auriferos, ferri-feros, vitriolatos, &c. Hinc eorum qualitas, etsi plurimi fontes parum habeant de illis.

#### PROPOSITIO XX.

*Quidam fluvii singulis annis statò tempore adeo augen-*

*augentur ut extra alveos se proferant & vicinas terras inundent.*

Celeberrimus inter hosce est Nilus, qui adeo crescit, ut totam Ægypti terram exceptis collibus tegat. Incipit inundatio circa decimum septimum Junii, & crescit per quadraginta dies, totidemque diebus recedit, ita ut hoc tempore omnes urbes, quæ in collibus pleræque extructæ sunt, videantur insulæ. Admodum antiquitas hanc Nili exundationem prædicavit, propterea quod in cognita eis terræ portione ante detectas Orientis & Occidentis regiones nullus alius fluvius reperiebatur, qui id faceret, excepto Nigro, quem ideo subterraneo ductu à Nilo oriri argumentati sunt. Sed quoniam Seneca omnium pulcherrime descripsit Nili exundationem, facere non potui, quin illius verba hic subjicerem: Nilus ante exortum Caniculæ augetur mediis æstibus, ultra æquinoctium. Hunc nobilissimum amnem natura extulit ante humani generis oculos, & ita disposuit, ut eo tempore inundaret Ægyptum, quo maxime uita fervoribus terra undam alius traheret, tantum haustura, quantum siccitati annuæ sufficere possit. Nam in ea parte, quæ in Æthiopiam vergit, aut nulli imbres sunt, aut rari, & qui insuetam aquis caelestibus terram non adjuvent. Unam, ut scis, Ægyptus in hoc spem suam habet. Proinde aut sterilis annus aut fertilis est, prout ille magnus influxit, aut parcior. Nemo aratorum aspicit caelum. Quare non cum poëta meo jocos, & illi Ovidium suum impingo? qui ait:

*Nec pluvio supplicat herba Jovi.*

Unde crescere incipiat si comprehendi posset, causæ quoque incrementi invenirentur. Nunc vero magnas solitudines pervagatus, & in paludes diffusus, gentibus sparsus, circa Philas primum ex vago & errante colligitur. Philæ insula est

aspera & undique prærupta: duobus in unum co-  
 ituris annibus cingitur, qui Nilo mutantur, &  
 ejus nomen ferunt. Urbem totam complectitur.  
 Hanc Nilus magnus magis quam violentus egres-  
 sus, Æthiopiam arenasque, per quas iter ad com-  
 mercia Indici maris est, prælabitur. Excipiunt  
 eum Cataractæ, nobilis insigni spectaculo locus.  
 Ibi per arduas excisasque pluribus locis rupes Ni-  
 lus insurgit, & vires suas concitat. Frangitur  
 enim occurrentibus faxis, & per angusta elucta-  
 tus: ubicunque vincit, aut vincitur, fluctuat: &  
 illic excitatis primum aquis, quas sine tumultu  
 leni alveo duxerat, violentus, & torrens, per ma-  
 lignos transitus profilit, dissimilis sibi. Quippe ad  
 id lutosus & turbidus fluit. At ubi scopulos ver-  
 beravit, spumat: & illi non ex natura sua, sed ex  
 injuria loci, color est. Tandemque eluctatus ob-  
 stantia, in vastam altitudinem subito destitutus  
 cadit, cum ingenti circumjacentium regionum  
 strepitu. Quem perferre gens ibi à Persis colloca-  
 ta non potuit, obtusis assiduo fragore auribus, &  
 ob hoc sedibus ad quietiora translatis. Inter mira-  
 cula fluminis incredibilem incolarum audaciam  
 accepi. Bini parvula navigia conscendunt: quo-  
 rum alter navem regit, alter exhaurit. Deinde  
 multum inter rapidam insaniam Nili, & recipro-  
 cos fluctus volutati, tandem tenuissimos canales  
 tenent, per quos angusta rapium effugiunt: &  
 cum toto flumine effusi, navigium ruens manu  
 temperant, magnoque spectantium metu in caput  
 nixi, cum jam adploraveris, mersosque atque ob-  
 rutos tanta mole credideris, longe ab eo, in quem  
 ceciderant loco navigant, tormenti modo missi.  
 Nec mergit cadens unda, sed planis aquis tradit.  
 Primum incrementum Nili circa insulam, quam  
 modo retuli, Philas noscitur. Exiguo ab hac spatio  
 petra dividitur; *ἄλκων* Græci vocant: nec illam  
 ulli,

ulli, nisi antistites calcant: illa primum saxa adum  
 fluminis sentiunt. Post magnum deinde spatium  
 duo eminent scopuli, Nili venas vocant incolæ:  
 ex quibus magna vis funditur, non tamen quanta  
 operire posset Ægyptum. In hac ora stipem sacer-  
 dotes, & aurea dona præfecti, cum solemne ve-  
 nit sacrum, jaciunt. Hinc jam manifestus nova-  
 rum virium Nilus, alto ac profundo alveo fertur,  
 ne in latitudinem excedat objecta montium pres-  
 sus. Circa Memphim demum liber, & per cam-  
 pestria vagus, in plura scinditur flumina, manu-  
 que canalibus factis, ut sit modus in deriva-  
 tium potestate, per totam discurret Ægyptum. In-  
 itio diducitur, deinde continuatis aquis in faciem  
 lati ac turbidi maris stagnat: cursum illi violenti-  
 amque eripit latitudo regionum, in quas exten-  
 ditur, dextra lavaque totam amplexus Ægyptum.  
 Quantum crevit Nilus, tantum spei in annum  
 est. Nec computatio fallit agricolam: adeo ad  
 mensuram fluminis respondet, quam fertilem facit  
 Nilus. Is arenoso & sitiensi solo & aquam inducit  
 & terram. Nam cum turbulentus fluat, omnem in  
 siccis atque hiantibus locis facem relinquit: &  
 quicquid pingue secum tulit, arenis locis allinit:  
 juvatque agros duabus ex causis, & quod inun-  
 dat, & quod oblimat. Ita quicquid non adit, sterile  
 ac squalidum jacet. Si crevit super debitum, nocuit.  
 Mira æque natura fluminis, quod cum certi amnes  
 abluant terras & eviscerent, Nilus tanto ceteris  
 major, adeo nihil exedit, nec abradit, ut contra  
 adjiciat vires, minimumque in eo sit quod solum  
 temperet. Illato enim limo arenas saturat ac jungit.  
 Debetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem  
 terrarum sed ipsas. Illa facies pulcherrima est,  
 cum jam se in agros Nilus ingessit. Latent campi,  
 aperta que sunt valles: oppida insularum modo  
 extant. Nilum in Mediterra-



neis, nisi per navigia commercium est. Majorque est latitia gentibus, quo minus terrarum suarum vident. Sic quoque cum se ripis continet Nilus, per septena ostia in mare emittitur: quodcunque elegeris ex his, mare est. Multos nihilominus ignobiles ramos in aliud atque aliud littus porrigit. Ceterum beluas, marinis vel magnitudine vel noxa pares, educat. Et ex eo quantus sit, aestimari potest, quod ingentia animalia & pabulo sufficienti, & ad vagandum loco, continet. Babilus virorum optimus, in omni litterarum genere rarissimus, auctor est, cum ipse praefectus obtineret Aegyptum, Heracleotico ostio Nili, quod est maximum, spectaculo sibi fuisse delphinarum à mari occurrentium, & crocodilorum à flumine adversum agmen agentium, velut pro partibus praelium. Crocodilos ab animalibus placidis morsuque innoxiiis victos. His superior pars corporis dura & impenetrabilis est, etiam majorum animalium dentibus: at inferior mollis ac tenera: hanc delphini spinis, quas dorso eminentes gerunt, submersi vulnerabant, & in adversum enixi dividebant. Recisis hoc modo pluribus, ceteri velut acie versa refugerunt. Fugax animal audaci, audacissimum timido. Nec illos Tentyritæ generis aut sanguinis proprietate superant, sed contemptu & temeritate, ultro enim insequuntur, fugientesque injecto trahunt laqueo: plerique pereunt, quibus minus praesens animus ad persequendum fuit. Nilum aliquando marinam aquam detulisse, Theophrastus est auctor. Biennio continuo, regnante Cleopatra, non ascendisse, decimo regni anno & undecimo constat. Significatam aiunt duobus rerum potentibus defectiorem. Antonii enim Cleopatraeque defecit imperium per novem annos non ascendisse Nilum superioribus seculis, Callimachus est auctor. Sed

nunc

nu  
Ni  
pia  
niv  
ni  
cle  
me  
tiff  
Tro  
xa v  
inc  
ni  
gno  
sup  
que  
mu  
bru  
sum  
qua  
pos  
care  
cta f  
recip  
cipia  
juga  
min  
hibe  
imb  
lor  
Ister  
nium  
bus  
Bory  
cont  
causa  
fluor  
ves,

nunc ad inspiciendas causas, propter quas aestate Nilus crescat, accedam, & ab antiquissimis incipiam. Anaxagoras ait, ex Æthiopiæ jugis solutas nives ad Nilum usque decurrere. in eadem opinione omnis vetustas fuit. Hoc Æschylus, Sophocles, Euripides tradunt. Sed falsum esse, argumentis plurimis patet. Primo Æthiopiæ ferventissimam esse, indicat hominum adustus color; & Troglodytæ, quibus subterraneæ domus sunt. Saxa velut igni fervescunt, non tantum medio, sed inclinato quoque die: ardens pulvis, nec humani vestigii patiens: argentum replumbatur: signorum coagmenta solvuntur: nullum materiæ superadornatæ manet operimentum. Auster quoque, qui ex illo tractu venit, ventorum calidissimus est. Nullum ex his animalibus quæ latent bruma, unquam reconditur. Etiam per hiemem in summo & aperto serpens est. Alexandria quoque, quæ longe ab hujusmodi immodicis caloribus est posita, nives non cadunt: superiora etiam pluvia carent. Quemadmodum ergo regio tantis subjecta fervoribus duraturas per totam æstatem nives recipit? Quas sane aliqui montes illic quoque excipiant: nunquam tamen magis quam Thraciæ juga aut Caucasus. Atqui horum montium flumina vere & prima aestate intumescunt, deinde hibernis minora sunt. Quippe vernis temporibus imbres nivem diluunt: reliquias ejus primus calor dissipat. Nec Rhenus, nec Rhodanus, nec Ister, nec Caystrus subjacent malo: aestate prove-niunt. Altissimæ sunt & in illis Septentrionalibus jugis nives. Phasis quoque per id tempus & Borysthenes cresceret, si nives flumina possent contra aestatem magna producere. Præterea si hæc causa attolleret Nilum, aestate prima plenissimus fuisset. Tunc enim maximæ & integræ adhuc nives, ex mollissimoque tabes est. Nilus autem per

menses quatuor liquitur, & illi aequalis accessio est. Si Thaleti credis; Etesia discendenti Nilo resistunt, & cursus ejus acto contra ostia mari sustinent: ita reverberatus in se recurrit: nec crescit, sed exitu prohibitus resistit, & quacunque mor potuit, inconcessus erumpit. Euthymenes Massiliensis testimonium dicit: Navigavi, inquit, Atlanticum mare. Inde Nilus fluit major, quamdiu Etesia tempus observant: tunc enim ejicitur mare instantibus ventis. Cum resederint, & pelagus conquiescit: minorque discendenti inde vis Nilo est. Ceterum dulcis maris sapor est, & similes Niloticis beluæ. Quare ergo, si Nilum Etesia provocant, & ante illos incipit incrementum ejus, & post eos durat? Præterea non fit major, quo illi flavere vehementius? Nec remittitur incitaturque, prout illis impetus fuit: quod fieret, si illorum viribus cresceret. Quid, quod Etesia litus Ægyptium verberant, & contra illos Nilus descendit, inde venturus, unde illi, si origo ab illis esset? Præterea ex mari purus & caruleus efflueret, non ut nunc turbidus venit. Adde, quod testimonium ejus testium turbâ coarguitur. Tunc erat mendacio locus, cum ignota essent externa. Licetbat illis fabulas mittere. Nunc vero tota exteri maris ora mercatorum navibus stringitur: quorum nemo narrat nunc caruleum Nilum, aut mare saporis alterius. quod & natura credi vetat: quia dulcissimum quodque & levissimum sol trahit. Præterea quare hieme non crescit? & tunc potest ventis concitari mare, aliquanto quidem majoribus. Nam Etesia temperati sunt. Quod si è mari ferretur Atlantico, semel oppleret Ægyptum. At nunc per gradus crescit. OEnopides Chius ait, hieme calorem sub terris contineri: ideo & specus calidos esse, & tepidiorum puteis aquam. itaque venas interno calore sicari. Sed

in a  
 qui  
 scer  
 terr  
 esse  
 asta  
 sub  
 repe  
 piur  
 dun  
 lo re  
 nit.  
 se ra  
 tum  
 una  
 rata  
 sum  
 exar  
 pren  
 exar  
 oleu  
 bit,  
 de ex  
 hibe  
 hoc  
 non  
 in un  
 nisi f  
 red  
 aut f  
 gare  
 cunè  
 state  
 perco  
 teris  
 stio.  
 cum

in aliis terris augentur imbribus flumina. Nilum quia nullo imbri adjuvetur, tenuari, deinde crescere per astatem: quo tempore frigent interiora terrarum, & redit rigor fontibus. quod si verum esset, astate flumina crescerent, omnesque putei astate abundarent. Deinde non calorem hieme sub terris esse majorem. Aqua & specus & putei tepent: quia aëra rigentem extrinsecus non recipiunt. Ita non calorem habent, sed frigus excludunt. Ex eadem causa astate refrigescunt: quia illo remotus, seductusque aër calefactus non pervenit. Diogenes Apolloniates ait: Sol humorem ad se rapit: hunc exsiccata tellus, tum ex mari ducit, tum ex ceteris aquis. Fieri autem non potest, ut una sicca sit tellus, alia humeat. Sunt enim perforata omnia, & invicem pervia. Sicca ab humidis sumunt aliquando. Nisi aliquid terra acciperet, exaruisset. Ergo undas sol trahit: sed ex his quæ premunt, maxime hæc meridiana sunt. Terra cum exaruit, plus ad se humoris adducit, ut in lucernis oleum illo fluit, ubi exurit: sic aqua illo incumbit, quo vis caloris & terræ astantis arcessit. Unde ergo trahitur? ex illis scilicet partibus semper hibernis, Septentrionalibus, unde exundat. Ob hoc Pontus in inferum mare assidue fluit rapidus, non ut cetera maria, alternatis ultro citro astantibus in unam partem semper pronus & torrens. Quod nisi faceret, hisce itineribus, quod cuique deest redderetur, quod cuique superest emitteretur, jam aut sicca essent omnia, aut inundata. Interrogare Diogenem libet, quare, cum Pontus & amnes cuncti invicem commeent, non omnibus locis astate majora sunt flumina? Ægyptum sol magis percoquit. Itaque Nilus magis crescit. Sed in ceteris quoque terris aliqua fluminibus fiat adjectio. Deinde quare ulla pars terræ sine humore est, cum omnis ad se ex aliis regionibus trahit: eoque  
magis,



magis, quo calidior est? Deinde quare Nilus dulcis est, si illi è mari unda est? Nec enim ulli flumini dulcior gustus.

Ex hisce Senecæ verbis cognoscimus, quam antiquorum, imprimis Græcorum Physicorum fuerint sententiæ de exundationis Nili causa. Ex quibus tamen nulla vera est, quoniam eis temporibus nemo ad Nili fontes & vicinas gentes ex Europa pervenerat, quoniam ab Ægypto remotissimi sunt. Sed hodie satis ea explorata sunt, & vera causa inventa est, quandoquidem tam Lusitani, quam Belgæ & Angli cum gentibus, quæ vicinæ sunt fontibus Nili, commercia exercent in regnis Congo, Angola, Monomotapa, Sossala, Mosambique. Ex hisce cognitum est, fontes Nili esse ingentem lacum Zaire (sive in lacu Zaire) situm in procurrente Africa medio loco inter Orientale & Occidentale littus sub gradu x ab Æquatore versus Austrum, ut priori capite dictum est. Huic lacui vicina sunt multa juga montium, quos Lunæ montes & unum jugum Seth vocant, ita ut Lacus tanquam in valle inter montes jaceat. Quoniam autem loca hæc ab Æquatore versus Austrum jacent, ideo hiemem illis esse, cum nobis æstas est, motus solaris ratio postulat. Sed propter parvam ab Æquatore distantiam frigus nullum sentiunt, verum pluvias (nivis loco) quotidianas duabus horis ante & post meridiem in regno Congi: nubes Solis conspectum nunquam fere permittunt: eisdem nubibus montium juga quasi tecta conspiciuntur, atque in hisce montanis locis pluvia & imbres fere continui, qui tanquam torrentes deorsum ruunt, & omnes in Zaire lacum confluunt, ex hoc in alveum fluvii Nili, Zaire, Cuama & alios qui ex eodem lacu oriuntur, sed ideo non tanta copia exundant, (Zaire tamen singulis annis inundat) sicut Nilus, quia al-

veus

veus profundior & post brevem tractum in mare se exonerant. Omnes tamen eo tempore crescunt & immensam aquarum vim in mare exspuunt. Hinc itaque manifesta est causa exundationis Nili; nempe copia aquarum; proxima causa sunt pluviae continuae: harum autem causa adhuc latet: sed verisimile est eandem esse, quae nobis hyeme nives generat & pluvias, quae non tantum in Nilo, sed in nostris quoque fluviis exundationes efficiunt, ubi nimiae cadunt, quod cuius ex historiis notum est.

Consentit cum hac causa tempus, quo Nili exundatio incipit, & quo desinit. Etenim hyems in regno Congi & montanis illis locis, sive pluviae incipiunt cum nostro vere, medio circiter Martio vel Aprili, (quod tempus illis tanquam Autumnus est, nempe à Martio XXI & ad Junii XXI) sed minus tunc vehementes ac in Maio, Junio & Julio. In Augusto quoque & Septembri lenes, & medio Septembri desinunt. Exundatio Nili incipit, ut dictum, decimo septimo circiter Junii, hoc nempe seculo. (Nam Herodotus de suo seculo testatur, centum diebus Nilum tunc exundasse, & totidem diebus decrevisse.) Aliquot itaque hebdomadibus prius incipere incrementum Nili necesse est, nempe primo circiter Junii vel in Maio: & antequam increfcere possit, debuit jam aliquo tempore pluuisse in montibus lacui vicinis, hoc est à Martio ad Junium vel Maium. Ideo autem tardius hodie exundatio incipit, quam olim (nempe tempore Herodoti cum Aprili videtur coepisse) quia ipse Nilus per advectam limosam & terrestrem materiam altiores fecit terras, quas inundabat, & ideo alveus factus est profundior & capacior (ad quod ipsa fluxus celeritas etiam aliquid fecit), ita ut multo plus aquae continere possit quam olim, & ideo tardius extra alveum effundatur,

tur. Neque dubitandum est, quin post multa tantem secula nulla sit futura Nili exundatio; perpetua enim alluvione ita accrescent vicinæ littoris seu ripæ regiones vel tractus, ut margines riparum æquent & tandem altiores fiant fluminis altitudine in aqua copia maxima.

Sed nimis multa de Nilo præter opinionem nostram diximus.

Secundus fluvius ex iis, qui stato anni tempore exundant in terras vicinas, est Niger, fluvius Africae non minori tractu, quam Nilus, sed minus celebris. Eodem tempore exundat, quo Nilus. Leo Africanus decimo quinto Junii die incipere inundationem ait, & per quadraginta dies accrescere, totidemque diebus decrescere. Et incrementum sumente Nigro, cymba per totam Nigritarum regionem vehere licet, non tamen sine magno id sit periculo.

Tertius exundantium est Zaire, Congi fluvius, ut dictum. Huic adde minores fluvios Congi.

Quartus exundantium fluviorum est, fluvius argenteus Brasiliæ, qui eodem quoque cum Nilo tempore exundat in adjacentes agros, ut Maffeus annotavit.

Quintus, Ganges.

Sextus, Indus fluvius. Hi duo pluvii mensibus illarum regionum, nempe Junio, Julio, Augusto, extra alveos suos in terras se effundunt, ubi tunc incolæ factis stagnis aquam colligunt, ut reliquis anni mensibus, cum nullæ fere pluviae, inde aquam petant. Magnam agris fecunditatem hæc inundatio affert.

Septimus plurimos complectitur, nempe quatuor vel quinque, qui ex lacu Chiamay profluunt mediocri alveo & in sinum Bengalensem se exonerant, transeuntes per regna Pegu, Siam & alia. Qui regiam Siamensem præterfluit, dicitur Menan.

nan.  
Nove  
urbib  
domo  
tilita

Od  
sibus

No  
modo  
dem e

Dec  
exund  
à jugo

Un  
potan

Du  
undat

Ali

re exu  
plerisq

Flavus

Qui

vii, P  
magni

rumpa

Vifurg

vel rip

annive

rique

qui an  
versari  
alvei p  
littora  
lent ag  
Cau  
pia, q  
resolut

nan. Exundatio fit mensibus Septembri, Octobri, Novembri, quo tempore agri tecti sunt aquis, & in urbibus plateæ, ita ut cymbis innumeris ab una domo ad aliam tunc navigetur. Ingentem terræ fertilitatem creat.

Octavus, Macou fluvius Camboiæ, æstivis mensibus inundat. Mappæ illum male exprimunt.

Nonus, Fluvius Parana, sive Paranaguasu, eodem modo ut Nilus & argenteus fluvius. Quidam eundem esse volunt cum argenteo.

Decimo; In Coromandeliam Indiæ parte fluvii exundant mensibus pluvius propter copiam aquæ à jugo Gatis defluentem.

Undecimus, Euphrates, statis anni diebus Mesopotamiam inundat.

Duodecimus, Fluvius Numidiæ, Sus dictus, inundat hyeme.

Alios fluvios, præter hosce, anniversario tempore exundare non memini me legisse: etsi quidam plerisque annis id faciant, nempe Obius fluvius, Flavus fluvius Chinæ, &c.

Qui sine ordine vel stato tempore exundent fluvii, plurimi sunt, imo vix ullus fluvius insignis magnitudinis est, qui non aliquando in terras prorumpat ex alveo suo, ut exemplo Albis, Rheni, Visurgis, manifestum est. Et nisi alvei capacitas vel riparum altitudo obstaret, omnes magni fluvii anniversario tempore inundarent, quia in vere plerique augentur valde. Et fieri potest, ut fluvius, qui antea non solebat exundare; incipiat id anniversario tempore facere, nimirum, si pars aliqua alvei propter pulvinos, vel alio modo fiat altior, littora vero non fiant altiora. Sed tunc homines solent aggeres excitare.

Causa exundationum harum unica est aquæ copia, quæ in quibusdam exemplis allaris à nivium resolutione fortassis oritur, sed in plerisque ab imbrum



brium & pluviarum frequentia. Id tamen mirum, cur Indus & Ganges aliis mensibus inundent, quam vicini fluvii ex lacu Chiamay. Ceterum diversitatis, quæ in tempore hic observatur, causa petenda est partim ex anniversariis pluviis in vicinis locis, partim ex montibus & pluviis circa loca fontium, ut de Nilo diximus. Nos ad vitandam prolixitatem singula exempla excutere superfedemus. Fluvius Bibara in Francia prope Lutetiam aliquando sine ullis pluviis, aut certe non inusitatis, sic intumescit, ut adjacenti suburbio S. Marcelli inferat magnam vastitatem.

Cur autem omnes fere exundationes fecundos faciant agros, causa est, quoniam aqua illa, quæ exundat, est vel pluvialis vel nivosa, quæ aquatum propter levitatem spirituosam, tum propter sulphuream subitantiã, quam in aëre admixtam habent, præ aliis mineralibus valent ad fecunditatem, & salubres sunt. Quod autem in aqua pluvia tales spiritus & sulphur sit, probatur ex vermibus qui in ea generantur. 2. Ex facili putredine. 3. Ex ipsa destillatione Chymica. Quædam tamen flumina inundatione sua non reddunt fecundos agros, sed potius steriles, ut Ligeris in Gallia; cum Sequana fecundos faciat, ob pinguem aquam.

### PROPOSITIO XXI.

*Quomodo fontes prorumpunt, explicare.*

Propositione quarta explicavimus, unde oriatur aqua, quæ ex fontibus profluit: hic autem querimus, à qua vi aqua illa in terra collecta protrudatur, cum hoc sine violenta terræ remotione non videatur posse fieri. Causæ autem variæ sunt, quæ in loco aliquo fonti viam faciunt. 1. Si in loco sit cavitas quædam, aqua ipsa sine alterius causæ adjumento exsudat vel stillat in eam, quan-

do

do rependo ad illam pervenit, & deinde progressu temporis majores sibi vias facit, donec impleta illa cavitate effluat & flumen efficiat. Idem etiam fit sine illa cavitate, & sifons in declivitate montis sit vel etiam fastigio. Hanc etiam ob causam frequentes reperiuntur scaturigines in sylvis & locis umbrosis. Etenim aqua pluvia terram humectat, & quia calore solis liberoque aëre non statim extrahitur, allicit paulatim ad se latentem fontis futuri aquam. 2. Fontibus via paratur & terra removetur à spiritibus, qui aquis in terra adhuc existentibus admixti sunt, item aquæ rarefactio in terra, propter quam ampliozem locum poscit. Etenim aquæ dum adhuc intra terram abundantur, plures spiritus gerunt. Ignes quoque subterranei non parum ad hoc faciunt. 3. Ab imbribus sæpe fontes proferuntur in lucem, nimirum imbres poros terræ ampliores reddunt, cum aqua fontis latentis se conjungunt, atque ita hæc illam sequitur propter mutuam conjunctionem & coherentiam. 4. A terræ motu interdum fontes aperiuntur. Ita Ladon flumen, qui inter Helim & Megalenspolim olim medius erat, terrarum motus effudit. 5. Hominum industria interdum proferuntur, qui terras effodiunt. 6. Multi fontes ab animalibus detecti sunt, qui rostris suis terram solent eruere. Sic primum salsum fontem ex illis, qui Lunaburgenfes salinas efficiunt, porcus detexit. Etenim cum eruisset terram, factaque foveâ aqua profiliisset, quæ foveam implebat, porcus juxta consuetudinem suam in ea decubuit. Dein cum surrexisset atque calore solis exsiccatum esset dorsum, conspexerunt quidam candidum in eo colorem, quem cum accuratius contemplantur, sal esse deprehenderunt candidum. Inde ad fontem decursum est, atque dein plures quaesiti & inventi. Unde urbs omnes fere suas divitias omnem-

omnemque splendorem obtinet. Porcus quadripertitus & infumatus in hunc usque diem asservatur in curia Lunaburgensi, ubi particulae dependent à trabe, ita tenues factae diuturnitate temporis, ut nihil præter corium esse videantur.

PROPOSITIO XXII.

*Dato loco in terra, inquirere, an possit in illo fons seu puteus fieri.*

Signa hujusce inquisitionis Vitruvius docte explicat libr. VIII Architecturae, cap. I. ex quo Plinius & Palladius desumere. Bessonius quaedam addidit in libro edito, anno 1569. Nos ipsa Vitruvii verba apponemus: Si fontes (inquit) non profluent, quærenda sub terra sunt capita, & colligenda: quæ sic erunt experiunda, uti procurabatur in dentes, antequam sol exortus fuerit, in locis quibus erit quærendum, & in terra mento collocato & fulsto, prospiciantur eæ regiones. Sic enim non errabit excelsius quam oporteat visus, cum erit immotum mentum: sed ad libratam altitudinem in regionibus certa finitione designabit. Tunc in quibus locis videbuntur humores se conciscentes, & in aëra surgentes, ibi fodiatur: non enim in sicco loco hoc signum potest fieri. Item animadvertendum est quærentibus aquam, quo genere sint loca. Certa enim sunt, in quibus nascitur: In creta, tenuis & exilis & non alta est copia, ea erit non optimo sapore. Item sabulone soluto, tenuis: sed si inferioribus locis invenietur, ea erit limosa & insuavis. In terra autem nigra sudores & stillæ exiles inveniuntur, quæ ex hybernis tempestatibus collectæ in spissis & solidis locis subsidunt, eæ habent optimum saporem. Glarea vero mediocres & non certæ venæ reperiuntur, eæ quoque egregia sunt suavitate. Item sabulone masculo, arenaque & carbunculo, certiores & stabiliores

biliores sunt copiae, eaque sunt bono sapore. Rubro saxo & copiosa, & bona, si non per intervalla dilabantur & liquecant. Sub radicibus autem montium, & in saxis silicibus, uberioribus & affluenter, eaque frigidiores sunt & salubrioribus. Campestribus autem fontibus salia, graves, tepida, non suaves: nisi quae ex montibus sub terra submanantes erumpunt in medios campos, & ubi sunt arborum umbris contextae, praestant montanorum fontium suavitatem. Signa autem quibus terrarum generibus suberunt aquae, praeter quod supra scriptum est, haec erunt: si inveniuntur nascentia tenuis juncus, salix erratica, alnus, vitex, arundo, hedera, aliaque quae ejusmodi sunt, quae non possunt nasci, nec ali per se, sine humore. Solent autem eadem in lacunis nata esse, quae sidentes praeter reliquum agrum excipiunt aquam ex imbribus, & agris per hyemem, diutiusque propter capacitatem conservant humorem, quibus non est credendum. Sed quibus regionibus & terris, non lacunis, ea signa nascuntur, non sata, sed naturaliter per se creata, ibi est quaerenda. In quibus locis ea non significabuntur inventiones, sic erunt experiunda. Fodiatur quoque versus locus latus pedes tres, altus ne minus pedes quinque, in eoque collocetur circiter solis occasum scaphium aereum, aut plumbeum, aut pelvis, ex his quod erit paratum: idque intrinsecus oleo ungetur, ponaturque inversum & summa fossura operiatur arundinibus, aut fronde; supra terra obruatur: tum postero die aperiatur, & si in vase stillae sudoresque erunt, is locus habebit aquam. Item si vas ex creta factum non coctum, in ea fossione eadem ratione opertum, positum fuerit, si is locus aquam habuerit, cum apertum fuerit, vas humidum erit, & etiam dissolvetur ab humore. Vellusque lanae si collocatum erit in ea fossura, in sequenti autem die



die de eo aqua expressa erit, significabit eum locum habere copiam. Non minus si lucerna concinnata, oleique plena & accensa, in eo loco operata fuerit collocata, & postero die non erit exsucta, sed habuerit reliquias olei & ellychnii, ipsaque humida inuenietur, indicabit eum locum habere aquam: ideo quod omnis tepor ad se ducit humores. Item in eo loco ignis si factus fuerit, & percalefacta terra, & adusta, vaporem nebulosum ex se suscitaverit, is locus habebit aquam. Cum hæc ita erunt pertentata, & quæ supra scripta sunt signa inventa, tum deprimendus est puteus in eo loco: & si caput erit aquæ inventum, plures sunt circa fodiendi, & per specus in unum locum omnes conducendi. Hæc autem maxime in montibus & regionibus septentrionalibus sunt quaerenda, eo quod in his & suaviora, & salubriora, & copiosiora inveniuntur: aversi enim sunt solis cursui, & in his locis primum crebræ sunt arbores & sylvosæ, ipsique montes suas habent umbras obstantes, ut radii solis non directi perveniant ad terram, nec possint humores exfugere. Intervals quoque montium maxime recipiunt imbres, & propter sylvarum crebritatem, nives ibi ab umbris arborum & montium diutius conservantur: deinde liquatæ per terræ venas percolantur, & ita perveniunt ad infimas montium radices, ex quibus profluentes fontium erumpunt fluctus. Campestribus autem locis è contrario non possunt haberi copiam, quæ & si sint, non possunt habere salubritatem, quod solis vehemens impetus, propter nullam obstantiam umbrarum eripit exhauriendo fervens ex planitie camporum humorem: & si quæ ibi sunt aquæ apparentes, ex his quod est levissimum tenuissimumque & subtili salubritate, aer avocans dissipat in impetum cæli: quæque gravissimæ duræque & insuaves sunt

sunt partes, ex in fontibus campestribus relinquuntur.

Sed hodie neglectis signis per effossionem terræ ad ingentem sæpe profunditatem res tentatur, & plerunque inveniuntur fibræ & capita fontium seu puteorum, vel ipsi putei & fluvii.

Alii superstitiose per ramum coryli certo planetarum aspectu abscissum id cognoscere volunt.

PROPOSITIO XXIII.

*Dato loco, efficere in eo fontem seu puteum, si fieri possit.*

Afferemus iterum verba Vitruvii, quippe Viri in hisce operibus versati, cum nos nunquam huic operi manum admoverimus. Capite VII ita loquitur: In puteorum autem fossionibus non est contemnenda ratio, sed acuminibus solertiaque magna naturales rerum rationes considerandæ, quod habet multa variaque terra in se genera. Est enim, uti reliquæ res, ex quatuor principiis composita; & primum est ipsa terrena, habetque ex humore aquæ fontes. Item calores, unde etiam sulphur, alumen, bitumen nascitur, aërisque spiritus immanes, qui cum graves, per intervenia fistulosa terræ, perveniunt ad fossionem puteorum, & ibi homines offendunt fodientes, naturali vapore obturant in eorum naribus spiritus animales: ita qui non celerius inde effugiant, ibi interimuntur. Hoc autem quibus rationibus caveatur, sic erit faciendum. Lucerna accensa demittatur, quæ si permanserit ardens, sine periculo descenderet. Sin autem eripietur lumen vi vaporis, tunc secundum puteum dextra ac sinistra defodientur æstuaria, ita (quemadmodum per nares) spiritus ex æstuariis dissipabuntur. Cum hæc sic explicata fuerint, & ad aquam erit perventum, tunc puteus ita sepiatur structura, ne obturentur venæ. Sin au-

tem loca dura erunt, aut in imum venæ penitus non fuerint, tunc signinis operibus ex testis, aut à superioribus locis excipiendæ sunt copiæ. In signinis autem operibus hæc sunt faciendæ, uti arena primum purissima asperissimaque parietur, cæmentum de silice frangatur ne gravius quam libarium, calx quam vehementissima mortario misceatur, ita ut quinque partes arenæ ad duas calcis respondeant: mortario cæmentum addatur, ex eo parietes in fossa ad libramentum altitudinis futuræ depressa, calcantur vestibus ligneis ferratis. Parietibus calcatis, in medio quod erit terrenum, exinanitur ad libramentum imum parietum, & exaquo solo ex eodem mortario calcetur pavimentum ad crassitudinem, quæ constituta fuerit. Ea autem loca si duplicia aut triplicia facta fuerint, ulti percolationibus aquæ transmutari possint, multo salubriorem ejus usum efficient. Limus enim cum habuerit quo subsidat, limpidior aqua fiet, & sine odoribus conservabit saporem: si non, salem addi necesse erit, & extenuari.

#### PROPOSITIO XXIV.

*An aqua fontis sit salubris, probare.*

De hoc ita Vitruvius: Experimentiones autem & probationes eorum sic sunt providendæ. Si erunt profuentes & aperti, antequam duci incipiantur, adspiciantur, animoque advertantur, qua membratura sint, qui circa eos fontes habitant homines. Et si erunt corporibus velentibus, coloribus nitidis, cruribus non vitiosis, non lippis oculis, erunt probatissimi. Item si fons novus fuerit fossus, & in vas Corinthium, sive alterius generis, quod erit ex arte bono, ea aqua sparsa, maculam non fecerit, optima erit. Itemque in aheno si ea aqua deservefacta, & postea requieta & defusa fuerit, neque in ejus aheni fundo arena, aut limus invenitur,

niatur, ea aqua erit item probata. Item si legumina in vas cum ea aqua coniecta ad ignem posita, celeriter percocta fuerint, indicabunt eam aquam esse bonam & salubrem. Non etiam minus ipsa aqua, quæ erit in fonte, si fuerit limpida & perlucida, & quocumque pervenerit aut perfluxerit, si muscus non nascetur, neque juncus, neque inquinatus ab aliquo inquinamento is locus fuerit, sed puram habuerit speciem, innuetur his signis, esse tenuis, & in summa salubritate.

## PROPOSITIO XXV.

*Dato loco, apparentem fontem illo efficere, si fieri possit.*

Apparens fons dicitur, ut propof. v docuimus, ubi aqua profilit missa ex alio loco altiore per subterraneum ductum. Fieri autem poterit talis fons, si sit in vicinia aliquis lacus, vel fluvius, vel fons. Nimirum cuniculus agendus erit subtus terram à dato loco ad lacum vel fluvium vicinum, per quem aqua fluat ad datum locum, ut sequenti Propositione docebimus.

## PROPOSITIO XXVI.

*A dato fonte vel fluvio ad datum locum, fluvium deducere.*

Si fons vel datus fluvius sit altior quam datus locus, facilis erit opera. Id autem exquiritur per instrumenta geodætica; & ipsa operatio dicitur librare loca pro ducendis aquis, & differentia inter altitudinem fontis & loci dati dicitur libramentum ducendi fluvii. Effodiendus itaque est alveus à fonte vel fluvio ad datum locum, cujus libramentum magnum vel parvum sit prout celerem vel tardum volumus esse fluvium. namque Problema est Indeterminatum. Plerumque in



aquæ ductibus, ut mediocris sit celeritas fluxus, ita observatur, ut in longitudine alvei ducentorum pedum depressio non sit minor semipede (alias enim non fluat aqua vel nimis tarde. Vitruvius in centum pedibus requirit non minorem semipede depressionem), neque major integro pede vel ad summum sesquipede (alias enim nimis cito & incitato cursu fluat). Quod si fons non sit altior dato loco, instrumentis opus est, de quibus Mechanici consulendi sunt, ut etiam de multis aliis, quæ in hoc negotio sunt consideranda. Galli quidam scribunt, quod Sequana spatium quo fertur ab armamentario Parisiensi ad hortum Regium Tuilleries, in quingentis hexapedis vix uno pede deprimatur. Cæterum sciendum est in quibusdam alvei partibus non opus esse tanta depressione si in præcedenti parte alvei aqua impetum adepta sit. Per hoc problema etiam fit conjunctio fluviorum duorum, quando ex uno fluviò in alium alveus ducitur, ut navigatio possit institui ex uno in alterum, ut ex Duina in vicinum; ex Tanai in Volgam; ex Flavio fluviò Chinæ in Nanchinensem.

#### PROPOSITIO XXVII.

Quidam fluvii insignes sunt & celebres propter longos tractus, quidam propter latitudinem, quidam propter celeritatem cursus, quidam propter aqua, quam vehunt, peculiaves proprietates: quidam propter duas pluresve causas ex hisce. Propositionis veritas nulla indiget probatione. Illos tantum hic fluvios enumerabimus, qui maximè sunt ex omnibus, nempe longissimi tractus, qui etiam latitudine insignes sunt: tales numerantur in tota Tellure hætenus cogniti sedecim: nempe Nilus, Obius, Jenisceæ, fluviùs Orellana, Argenteus, Parana, Maragnon, Omaranna, Ganges, Danubius, Ca-

nadenfis five Laurentii fluvius, Niger fluvius Africa, Nubia, Wolga, Janfu China, Fluvius fluvius China.

Post hosce, insignes sunt alvei amplitudine sed minus longi tractus, ac priores, numero viginti circiter, nempe Indus, Zaire, Cuama, fluvii è lacu Chiamay, Euphrates, Tanais, Petzora, Fefida, Tabab Siberia, Yrtiis Siberia, flumen S. Spiritus in Africa, Amana in Castilia Americana, fluvius Magdalenæ, fluvius Juliana in Chica, fluvius S. Jacobi in Peru, Rhenus, Albis, Mofa, Borysthenes, Totontec in nova Albione.

Maximorum fluviorum decem tractus hic tantum contemplantur, accuratiorem explicationem cum reliquis fluviiis Speciali Geographia relinquentes.

1. NILUS, Niger, Ganges, directa fere via incedunt, reliqui plurimis & ingentibus curvaturis. Nili fons in lacu Zaire statuitur, in latitudine Australi x grad. ostium Canobicum in latitudine Septentrionali xxxi graduum. fluit ab Austro versus Septentrionem, alicubi se effundit per latum spatium, alibi admodum angustus: Cataractas duas habet. Tractus seu longitudo est milliarium circiter 630 Germanicorum, five Italicorum 2520, pro quibus ponere licet 3000 propter curvaturas. Inundat singulis annis.

2. NIGER fluvius Africa, five Senega: Fons ejus in latitudine xi graduum Septentrionali, è lacu: quidam subterraneo meatu à Nilo cum derivati scribunt: indicium esse, quod singulis annis exundet eodem tempore, quo Nilus. Ostium unum est in latitudine xi eadem, qua fons. Sed remotissimum ab Aequatore est xv latitudinis. Fluit ab Oriente in Occidentem. Abscondit se alicubi sub terram & iterum emergit. Tractus ejus est 600 circiter milliar. German. Sed minor erit, si

infignes ejus curvaturas omnino negligas; major, si omnes adnumereres.

3. **GANGES**, in Asia. Fons ejus remotissimus ponitur in latitudine Septentrionali 43 graduum in Tartaria (sed quidam retrahunt ad 33 grad.) Ostium in latitudine eadem 22 gr. Fluit à Septentrione in Austrum. Tractus est 300 circiter milliarium Germanicorum. Exundat singulis annis.

4. **OBIUS**, fluvius Asiae, ingens & ubique latus. Fons in 43 gradu latitudinis Septentrionalis ponitur in Tartariae montibus prope turrim lapideam. Ostium in 69 gr. latitudinis. Tractus est 400 circiter milliarium Germanicorum, neglectis curvaturis. Divaricat se in duo brachia in Siberia, vel potius ramum de se emittit, qui curvo peracto itinere redit in illum, atque sic insulam efficit, in qua à Moscis & Siberis extracta est urbs, dicta Jorgoet.

5. **JENISCEA**, fluvius Asiae, haecenus ignotus Geographis, sed à Moscis observatus. Multo major deprehensus est, quam Obius, à quo versus ortum abest itinere x hebdomadam versus Tartariam: ad ejus ripam Orientalem juga montium longo tractu exporriguntur: in Occidentali ripa habitat populus quem Tingasos appellant. Singulis annis exundat in vere ad 70 milliaria in terras Occidentales, quo tempore Tingasi cum pecore suo & supellectile se conferunt in montes ripae Orientalis. Fons & ostia ignorantur: tractus non minor esse putatur, quam Obii fluvii.

6. **PESIDA** fluvius, aliquot dierum itinere versus ortum à Jeniseca remotus: ejus Orientalis ripa existimatur attingere Chinam & regnum Cathaë, si modo hoc existit. Fons & ostia ignorantur: non quidem est è maximorum fluviorum numero: Sed hic pauca de eo monui, quoniam à Geographo nullo haecenus ejus mentio facta

fuit,

fuit,

7.

de O

maxi

vinctu

hoc e

latitu

leuca

xuiri

leuca

esse v

vel s

vuis i

de m

quæ

ni m

8.

Rio e

Ostiu

dicir

ma c

alio

cant

ut qu

9.

è mo

magn

Oma

coëu

gunt

10

tii, i

meri

Iroq

tr. m

milli

fuit, sicut etiam de Jenifcea & Yrtiis fluvio.

7. Fluvius ORELLANA, in America, Rio de Orellana (à Francisco Orelli) censetur inter maximos totius Telluris. Fons in regno Peru, provincia Quito, in latitudine 12 gr. australi (non hoc omnino certum est: ) ostium xv leucarum in latitudine 2 gr. australi. Tractus dicitur esse 1500 leucarum Hispanicarum, propter magnum flexuum numerum, cum revera non superet 700 leucas. Alii confundunt cum eo, vel ejus ramum esse volunt fluvium Maragnon. Latus alicubi est 4 vel 5 leucarum, sed non tam ex fonte, quam pluvii in montanis Peru cadentibus aquas accipit, unde mensibus siccis illorum montium non vehit aqua multum, de quo vide Cap. Et quidam moderni multum detrahunt de ejus magnitudine.

8. Fluvius argenteus, ARGYROPOTAMUS, Rio de la Plata, Brasiliae. Fons in montanis Peru. Ostium in latitudine 37 gr. australibus, idque esse dicitur 20 leucarum: Sed quando exundat plurima ostia habet, quae quidam pro uno numerant: alio tempore non vehit multum aqua. Incolae vocant Paranaguasu, hoc est, Aquam tanquam mare, ut quidam annotant.

9. OMARANNAN, itidem Brasiliae fluvius, è montanis Peru profluens longo tractu. Tres hi magni fluvii Brasiliae, nempe Orellana, Argenteus, Omarannan, in mediterraneis locis Brasiliae alicubi coeunt in quibusdam lacubus, & ex iis rursus emergunt sejuncti.

10. CANADENSIS, sive fluvius S. Laurentii, inter Canadam & novum Belgium fluit in America Septentrionali. Fons in lacu qui dicitur *des Troquois*: ostium amplum in 50 gr. latitud. Septentr. magna ejus est latitudo: tractus non minor 600 milliaribus Germanicis.



## PROPOSITIO XXVIII.

*In quorundam fluviorum alveis reperiuntur voraginee & gurgites.*

Sic in fluvio Sommona Picardiae inter Ambianum & Abbavillam caecus gurgis est, in quem aquae tanto impetu praecipitant, ut sonitus ad aliquot miliaria audiatur. Plura exempla colligant studiosi harum rerum.

## PROPOSITIO XXIX.

*Aqua fluviorum est levior, quam marina.*

Causa facilis est cognita, nimirum marina multum salis gerit.

Inde fit, ut quaedam in fluviiis mergantur ad fundum sive subsideant, quae mari natabant vel fluitabant, quod frequenter accidit in navibus valde oneratis, quae à mari sustinentur; in fluviiis, ubi fere in portu navigant, merguntur. Varia autem est proportio inter hasce aquas, quia neque marina ubique ejusdem gravitatis, neque diversorum fluviorum aquae. Est tamen proportio circiter, quae 46. ad 45, ut 46 unciae aquae fluvii aequae ponderent 45 marinis.

De A

Q

ru

pr

gr

m

nu

da

gr

cl

tr

N

v

bus co

terra

autem

divers

vel ha

mus,

propr

Pro

sta est

ipsa d

confe

ment

Caus

In aq

camu

rituo

aer a

stant.

## CAPUT XVII.

De Aquis mineralibus, Thermis & Acidulis.

Quoniam multa liquidorum sive aquarum sunt species, quarum peculiare proprietates admirantur homines, ideo Geographi de illis quoque solent agere, sed omnes hactenus præter nudam appellationum recitationem, & recensitionem quorundam mirabilium fontium nihil solida cognitionis adjunxerunt. Nos vero magis clare & cum causarum explanatione hæc tractabimus.

## PROPOSITIO I.

**N**ulla aqua pura est & elementaris, sed continet siue admixtas habet particulas, quales in terrestribus corporibus reperiuntur, non tamen particula hæc terra sunt, sed varia, spiritus, olea, &c. Mineralis autem aqua vocatur illa, qua tot talisque particulas diversa ab aqua natura continet, ut ex ea nascatur vel habeat insignes qualitates, quas sensu deprehendimus, siue sensu notabiliter admodum vel sensum ferientes proprietates.

Propositionis veritas per experientiam manifesta est, & tam ex saporum differentiis quam ex ipsa destillatione probatur: atque omnes Physici consentiunt, aquam simplicem, sicut & alia elementa ab aliis secreta, in natura non existere. Causa est varia & perpetua particularum agitatio. In aquis autem, ut in specie de nostra materia dicamus, causa admixtionis heterogeneorum spirituosas particulas accipiunt. Pluvia vero & ipse ær aquam tangens multis diversis particulis constant.

Aquæ itaque univèrsæ admixtas habent alterius naturæ particulas: sed non in omnibus eadem harum copia. In Rhenum quidem, Danubium, Albim, atque in omnes majores fluvios influunt alii rivi imprægnati mineralibus particulis, & quidem tali copia ut sensum feriant: sed quia præter hosce multi alii rivi in eos influunt non imprægnati tali ad sensum notabili copia particularum heterogenearum, & præterea maxima pars aquæ, quam vehunt, ex pluvia est & aëre, ideo quoque in istis majoribus fluviiis non manifeste sentiuntur particulae illæ heterogeneæ, quas diximus illos accipere; sed arte debent ab illis separari, si quis illas ad sensum cognoscere velit. Cæterum illas demum *minerales appellabimus, quæ aliquam insignem proprietatem præter vulgarem aquam habent*, hoc est, quæ heterogenearum particularum talem continent admixtionem, ut insignem & sensibilem inde possideant qualitatem.

#### PROPOSITIO II.

*Aqua minerales triplices sunt.*

Quædam corporeæ (deest aptius vocabulum), alia spirituosæ, reliquæ simul corporeæ & spirituosæ. Aquas corporeas minerales voco, quæ continent particulas solidas & fixas mineralium sive fossilium, ita ut hæ ab aqua separari & visu cognosci possint. Corporeæ hæ duplices sunt: quædam particulas illas fossilium sive mineralium vehunt insignis magnitudinis, ut sine aliqua opera, vel levi certe, in aqua conspiciantur, neque sunt proprie loquendo aquæ commixtæ. Tales sunt, de quibus in præcedenti capite, diximus, quod in eorum aqua granula auri, argenti, &c. contineantur, qui fluvii propterea dicuntur auriferi, argentiferi, &c. Verum hæ aquæ non sunt, proprie loquendo, appellandæ minerales, quo-

quoniam  
mixta  
proprie  
les quæ  
illorum  
rum  
ideo  
preher  
fontes

Co  
dictæ  
lium  
nitus  
scant  
fident  
sive c  
plure  
dissol

Ac  
Spiri  
vero  
ex ill

Ac  
nobis  
spiri  
cieru

care.

1.  
neos  
rales  
ab hi  
granu  
ratio  
hent

quoniam non habent illas particulas sibi commixtas, sed liberas, neque ab illis ullam accipiunt proprietatem vel qualitatem: quoniam tamen tales quoque fluuios homines admirantur, & habet illorum explicatio magnam affinitatem cum aquarum mineralium proprie dictarum enodatione, ideo sub generali mineralium appellatione comprehendere volui. Possunt ad hanc classem reduci fontes bituminosi, &c.

Coporeæ vero minerales aquæ, magis proprie dictæ, sunt, quæ solidas quidem particulas fossilium continent, sed adeo exiguas, & parvas, penitusque commixtas, ut visu non statim dignoscantur, sed vel arte vel longo temporis tractu subsidentes & concrecentes in sensilem collectionem sive copiam redigantur, ut sunt fontes falsi, sulphurei, &c. & aquæ Chymicæ, in quibus metalla dissoluta.

Aquæ spirituosæ sunt, quæ volatilem tantum Spiritum, qualis in mineralibus reperitur, non vero fixas particulas continent, & propterea nullæ ex illis possunt elici visa notabiles.

Aquæ corporeæ simul & spirituosæ dicuntur à nobis illæ, quæ & fixas sive solidas & volatiles seu spirituosas mineralium particulas in se habent. Specierum harum exempla afferemus in seq.

PROPOSITIO III.

*Quomodo aqua minerales generentur, explicare.*

I. Si aqua feratur rapido cursu per subterraneos meatus, in quibus terræ metallicæ & minerales minus densæ sunt, manifestum est, quod ab ab hisce aqua illa abripere potest & secum auferre granula istorum mineralium. Hæc itaque est generatio aquarum mineralium corporearum grana ventium.



2. Si sint mineralia imperfecta, vel minus densa, ut vitriolum, sulphur, &c. vel etiam salia, quæ sua natura facile uniuntur aquis, per talium mineralium terras sive fodinas si feratur aqua aut rivus, vel si rependo per hæc terras (sine alveo vel ducta, ut in generatione fontium explicavimus capite præced. proposuit.) aqua perveniat ad fontem, habebit hæc admixtas atomos istorum mineralium, & erit aqua mineralis corporea subtilis commixtionis secundum atomos. An vero aqua possit atomos metallorum per istum modum sibi unire, dubitatur, quoniam ea dura sint & solida, neque facile uniuntur aquæ. Ego fieri id posse existimo, sed non ab aqua simplici, sed à vitriolata & salsa spirituosa, quæ similis sit aquæ forti Chymicorum. Sicut enim hæc aquæ fortes solvunt metalla in atomos & sibi intime uniunt, ita ut non ad fundum cadant, nisi arte separentur: ita quoque si tales aquæ ferantur per terras metalles, poterunt metallicas particulas in atomos solvere & sibi unire. Hoc itaque modo explicata est generatio aquarum mineralium corporearum secundæ classis.

3. In terræ visceribus antequam generentur metalla, vapores & fumi condensantur ad extantes petrarum angulos, quibus adhærent; & primo mollem in substantiam coeunt, deinde condensantur. Si itaque aquæ ferantur vel repant per terras, ubi tales vapores sunt & excitantur, imprægnantur illis, & ita fiunt aquæ minérales spirituosæ metallicæ. Mineralia vero imperfecta alio modo efficiunt aquas minerales suæ naturæ, nimirum quia ipsa à calore subterraneo vel proprio calefacta emittunt spiritus, vapores, ut sulphur, vitriolum, sal, carbones, &c. Et tales fumi & exhalationes continue fiunt in locis talium mineralium, per quæ si aqua repat, imprægnabitur illo spiritu.

Sunt

Sunt  
nera  
ras,  
earu  
quæ  
qual  
meis  
cemi  
pere  
ve à  
impr  
li,  
traha  
tion  
aqua  
erit.

4  
rales  
rent

rieta  
versu

I  
plic  
part  
qua  
Quo  
inde  
dun  
re.  
sing  
bus  
plic  
bus  
beb

Sunt qui existimant, spirituosas hasce aquas generari posse à sola delatione per metallicas terras, vel à diuturna mora super eas sive in fodinis earum: sed certum est ex experientia, quod aquæ nullam accipiant à metallis & mineralibus qualitatem, si vel centum annis hæc in illa immersa jaceant. Opinione itaque hac rejecta, dicemus generari illas aquas, sive spiritum accipere, 1. A femine metallorum, ut ita dicam, sive à primordiis. 2. Vel dicemus illas aquas jam imprægnatas esse aliis subtilibus spiritibus vitrioli, salis, quorum beneficio è duris metallis extrahatur spiritus: sed huic causæ vel modo generationis minus tribuo, quia iterum de generatione aquæ spirituosæ mineralis vitrioli & salis quæstio erit.

4. Ex hisce simul patet, quomodo aquæ minerales, quæ simul corporeæ sunt & spirituosæ, generentur.

#### PROPOSITIO IV.

*Aquarum mineralium innumera sunt species pro varietate & diversitate particularum, quas continent ex diversis mineralibus.*

In præcedenti Propositione ostendimus & explicavimus, quomodo aquæ minerales accipiant particulas illas (ex quibus admirandæ earum qualitates oriuntur), à mineralibus sive fossilibus. Quoniam itaque variæ sunt mineralium species, inde fit ut etiam variæ sint & qualitatibus admodum differentes aquæ minerales, imo infinitæ fere. Neque enim ab una tantum mineralis specie singulæ aquæ sunt imprægnatæ, sed simul à pluribus plurimæ. Quare aquæ minerales erunt simplices vel mixtæ. Et mixtæ vel è duobus vel è tribus è quatuor vel è pluribus fossilibus aliquid habebunt.

Inde 1. aqua metallicæ, nempe aureæ, argenteæ, æreæ, stannæ, plumbeæ, ferreæ.

2. Aqua salium, nempe salis communis, nitrosæ, aluminosæ, vitriolatæ, &c.

3. Aqua bituminosæ, sulphuræ, antimoniales, carbonum, ambra, &c.

4. Aqua terrarum & lapidum, nempe calcaria (quæ è lapide calcario acceperunt particulas) cretaceæ, ochræ, cinnabaris, marmoreæ, alabastrina.

5. Aqua Mercuriales, &c.

Denominationes hæc sive species aquarum intelligendæ sunt juxta triplicem modum, quo in Propositione secunda diximus aquas minerales esse, siue ex fossilibus particulas accepisse, nempe 1. aliæ corporeæ, & quidem vel ad sensum manifestum, vel corporeæ per subtilem & accuratam commixtionem. 2. aliæ spirituosæ. 3. aliæ corporeæ simul & spirituosæ. Hæc differentia ad singulas mineralium aquarum species applicandæ sunt. Nimirum (ut uno vel altero exemplo id ostendamus) aureæ aquæ sunt 1. corporeæ quæ grana auri vehunt ejus magnitudinis, ut in sensum incurrant levi opera, neque ea sibi admixta accurata coherentia habent. 2. corporeæ quæ admodum exiguas auri particulas, & quidem arte satis ipsi aqua commixtas possident, quales existere puto, etsi in natura auri vel minima granula in aqua petunt fundum, posse tamen tales esse, manifestum est ex aqua regia Chymicorum, in qua aurum in atomos dissolutum est. Sed hæc aqua regia non est simplex: ideo neque aqua illa, quæ in natura reperiuntur admixtas habere atomos auri, aliis mineralium particulis carent. 3. aureæ spirituosæ, quæ spiritum & vaporem in terra concepit, ex quo aurum generari solet. 4. aureæ corporeæ simul & spirituosæ, quæ & atomos  
auri

auri

Eo

appli

min

(und

vel c

cum

aqua

man

ritu

plur

reas

quat

&amp; m

triol

ra q

talli

istan

met

sulph

quo

peri

abra

rem

plo

tion

te l

auri

in

&amp; d

atq

cis v

loru

acci

con

hæc

feld

auri & vaporem generandi auri possident.

Eodem modo quadruplicem hanc differentiam applicare debent lectores ad singulas aquarum mineralium species tam simplices, quam mixtas, (unde innumera species existunt, quandoquidem vel corpora fossilium, vel spiritus, vel unius corpus cum alterius spiritu sunt conjuncta in aqua.) Sic aquæ plumbeæ quadruplices, nempe 1. corporeæ manifesto. 2. corporeæ subtili mixtione. 3. spiritu plumbi infectæ. 4. spiritu simul & atomis plumbi imprægnatæ. Sic ad vitriolatas, sulphureas, Mercuriales aquas, &c. applicandæ sunt quatuor illæ diversæ participationes mineralium, & magis quidem ad hæc, nempe ad falsas, vitriolatas, sulphureas, quoniam in hisce ipsa natura quadruplicem istam varietatem exhibet; in metallis dubito, an corporeæ subtilis mixtionis existant per naturam: raræ quoque sunt spirituosa metallica: sed frequentissima sunt aquæ salium, sulphuris, &c. tam corporeæ quam spirituosa, quoniam & in pluribus terræ locis hæc fossilia reperiuntur, & in majori copia, & facile patiuntur abradi particulas suas, fumum quoque & vaporem frequenter emittunt. Explicabimus exemplo uno quadruplicem hanc varietatem participationis, & quidem in auro 1. In capite precedente Propos. xvi enumeravimus rivos, qui grana auri vehant, & gaza hac accolat exhiberent, quales in Tirolensi Comitatu & vicinis locis multi sunt, & diximus, ipsum Rhenum, Albim, Danubium atque majores fluvios plerisque in quibusdam locis vehere grana auri (sicut etiam aliorum metallorum & mineralium); quoniam rivos auriferos accipiunt. Rhenus auri granula luto & arenæ commixta vehit plurimis locis, sed præcipue ad hæc: 1. Prope Curiam in Rætia. 2. Ad Meinfeldiam. 3. Ad Eglinsau. 4. Ad Seckingam. 5. Ad oppi-



oppidum Augst, non procul à Basilea. 6. Ad Novoburgum. 7. Ad Seltz. 8. Ad WORMATIAM. 9. Ad Moguntiam. 10. Ad Bacherach. 11. Ad Bononiam, &c. Rivos auriferos, quos Rhenus accipit, videre poterunt lectores in Thurnheusero, sicut etiam illos, quos Danubius & Albis. In hujus, Albis nempe, aqua, reperiuntur granula auri, 1. Ad Leutmeritz in Bohemia. 2. Ad Purn. 3. Ad Dresdam in Misnia. 4. Ad Torgam. 5. Ad Magdeburgum. 6. Ad arcem Lauenburg, quinque miliaribus ab Hamburgo. Plurimos auriferos rivos vide in citato Thurnheuseri libro, ubi etiam aliorum metallorum & mineralium vestrices videre poteris.

Hæ itaque aquæ sunt aureæ corporeæ primi modi, nempe granosæ, quæ minus proprie minerales vel aureæ dici possunt, quoniam aurea granula non sunt aquæ permixta, sed tantum à rapido vel celeri cursu aquæ devehuntur: & ipsæ aquæ simplices sunt. 2. Aquæ aureæ corporeæ, subtilis commixtionis, nempe cujus aquæ atomi permixtæ sunt & unitæ atomis auri, sicut diximus esse aquas Chymicorum Regis, quæ aurum dissolvunt & sibi per atomos uniunt. Quoniam itaque in natura esse possunt aquæ similes aquis chymicorum, si illæ per aureas terras, vel fodinas ferantur, abradent & dissolvent quasdam ab eis atomos aureas cum terreis. Tales aquæ aureæ esse videntur plurimi rivi, quos Thurnheuserus auri participes esse scribit & enumerat in Descriptione Danubii, Rheni, &c.

3. Aquæ aureæ spirituosæ paucae sunt & nonnullæ fortasse ex iis, quas enumerat nominatus Thurnheuserus. Minus autem sensiles vel notæ sunt tales aquæ, quoniam raræ & in parva copia sunt aureæ terræ & fodinæ, præterea, ubi sunt minima, aliorum mineralium copia simul adest, unde aqua

aqua  
spirit  
tis Be  
voca  
rien  
spirit  
ri co  
runt

4.  
spirit  
heuse

Ad

1.

erassi  
sunt,  
bus f  
si cra

2.

mo  
falsif  
tiles  
na te  
sit di  
urina

3.

spirit  
dolia  
les  
plice

4.

lis pa

O

quar  
requ  
pe R  
aliis  
tur,

aqua multo plures spiritus accipit. Participes tamen spirituum aureorum statuuntur rivi quidam in altis Bohemiæ Alpibus, in Silesia & monte, quem vocant *Fichtelberg*: piperinæ quoque thermæ in Curienti Episcopatu imprægnatæ esse creduntur tali spiritu, sed propter aliorum admixtionem in majori copia minus sensilem qualitatem aquæ acceperunt ab illo.

4. Aquæ aureæ, quæ simul & atomos auri & spiritum vehant, sunt quædam ex rivis à Thuttheusero annotatis.

Addamus exemplum aquarum salifarum.

1. Salsæ corporeæ, quæ nempe particulas salis crassiores neque accurate mixtas vehunt, plurimæ sunt, & satis cuivis notæ, ut fontes quidam ex quibus sal conficitur: ipsa marina aqua huc pertinet, si crassior facta sit ignis calore.

2. Salsæ corporeæ subtiles, quæ in minimas atomos redactum sal continent, sunt illæ, quæ cum falsissimæ sunt, tamen admodum pellucidæ & subtiles existunt, sicut fontes multi falsi & aqua marina tenuis: etsi in hac subtili commixtione magna sit differentia: pertinet huc omnium animalium urina.

3. Salsæ spirituosæ, quæ non salis particulas, sed spiritum salis continent, tales sunt, ut si vel multa dolia earum coquas, nihil tamen salis accipies, quales non paucæ in Germania, & alibi, sed raro simplices inveniuntur.

4. Salsæ corporeæ simul & spirituosæ, quæ & salis particulas & spiritum habent.

Omnes fere corporeæ habent quoque aliquam spirituum salinorum portionem, sed pleærque exiguam. Ita ad urbem Saltzingam prope Rhenum fontes falsi sunt, quorum aqua etsi aliis aquis sit falsior, tamen minus salis largitur, quoniam acris ejus & falsus sapor acuitur  
à spiri-

à spiritibus sive sale volatili, qui in coctione a-  
volat.

Ex hisce patet, quomodo quadruplex ista diffe-  
rentia participationis sit applicanda ad singulas a-  
quarum mineralium species, nempe ad aquas vi-  
triolatas, aluminosas, plumbeas, &c.

#### PROPOSITIO V.

*Differentias celebriores aquarum mineralium enume-  
rare.*

In præcedentibus Propositionibus explicavimus  
veras mineralium aquarum species & differentias,  
desumptas ab ipsa earum essentia, nempe à parti-  
culis mineralium, quas vehunt, sive quibus im-  
prægnatæ sunt. Verum enim vero illæ differentiz  
quoniam non ita incurrunt in sensus, & præterea  
propter variam mineralium mixturam varias a-  
quis proprietates communicant, ideo minus vul-  
go sunt notæ, quandoquidem à manifestis sive  
in sensum incurrentibus qualitatibus omnium  
corporum denominatio & aquarum celebritas  
oritur apud homines, quarum apertarum qua-  
litarum & proprietatum explicatio & causæ pe-  
tenda sunt ex intima rerum compositione. Ce-  
lebres itaque & ab hominibus vulgaribus quo-  
que cognitæ aquarum vel potius liquorum è  
terra promanantium differentiz seu species sunt  
hæ decem. 1. *Acida.* 2. *Amara.* 3. *Calida.*  
4. *Frigida admodum.* 5. *Oleosa & pingues.* 6. *Ve-  
nenosa, sive lethifera.* 7. *Colorata.* 8. *Ebulientes.*  
9. *Convertentes res minus duras in duriores, vel alio  
modo corpora injecta aut tincta mutant.* 10. *Sal-  
se.* 11. Hisce addi possunt illæ, quæ aliis qui-  
busdam mirabilibus proprietatibus præditæ sunt.  
Ad hæc classes studiosi harum rerum redigete  
poterunt omnes aquas, quæ ab autoribus de-  
scriptæ reperiuntur. Nos breviter earum genera-  
tionem,

tionem, differentias & quadam exempla afferemus.

## PROPOSITIO VI.

*Aquarum acidarum causam sive generationem, differentias & species explicare.*

Magna est aquarum vel fontium acidorum celebritas vocant vulgo Acidulas, Germani Saurbrunnen.

1. *Oriuntur* ex admitione spiritus vitrioli, salis, & aluminis, quæ mineralia partim simplicia partim aliis mineralibus magis aut minus admixta in terræ cavitatibus reperiuntur, imprimis in ferro. Causam hanc acidularum veram esse, probamus 1. quia ubique fere, ubi tales acidulae prompant, reperiuntur fodinae vitrioli, salis, aluminis. 2. quia spiritus vitrioli & salis sunt acidi, sicut etiam sulphuris quidam spiritus, ut notum est ex Chymia. 3. quia ex aquis hisce acidulis nullum corpus acidum, sed spiritus separantur, qui omnino similes sunt spiritibus vitrioli, salis, &c.

2. *Magna est acidularum copia* in variis regionibus, præcipue ubi fodinae abundant. In sola Germania numerus earum ad millenarium fere accedit. Causa est, quia spiritus acidus omnibus fere corporibus inest, quoniam elementarem eum esse diximus capite VII, Propositione 1. Reperitur in omnibus herbis & fructibus.

3. *Differentia acidularum insignis* deprehenditur. Quædam adeo acidæ, ut aceti loco illis utantur homines, qualis fons in Sicilia provincia Nicana invenitur: in Germania fons ad Ellebogam insignis aciditatis. Alii acidi fontes appellantur vinosi, quod aciditate sua referant vini gratissimum saporem, inter quos insignis est ille, qui in Comitatu Germaniæ Catzenelebocensi ad oppidum



dum Schwalbach invenitur. In agro Lugdunensi Gallia ad oppidum S. Baldomari fons, dictus fortis. (*Fontaine forte*) vini penuriam supplet, & si ejus una quarta pars vino misceatur, nil vini saporis deperit: si affundatur farina, fermentat statim: non possunt in ea coqui cibi: avolat enim propter subtilitatem: salubris est, adeo ut oppidani raro utantur Medico.

In Aquitania non procul ab urbe Bessa similis fons acidulus vinosus, cujus aqua si tantum sextam vini partem misceas, merum te bibisse credideris nulla aqua dilutum. In Romano agro acidulus fons aluminosus, vino mistus gratissimum praebet potum. Ingens est in Germania superiorum acidulorum numerus, quorum quidam in Danubium, alii in Rhenum influunt. Plurimi in dicto comitatu Catzenelleboci, in Trevirensi provincia, Tirolensi, Rhaetia, Vindelicia; celebris est. prope Anderna, dictus Heilbrun. In agro Toletano Hispania juxta pagum Valentiam fontes sunt, qui in imo deprehenduntur acidi & vinosi saporis, in superiori parte dulces, quod Baecius fieri propterea existimat, quoniam acidulae & nitrosae partes subsideant. Ego autem, modo vera sit traditio, fieri existimo propter spiritus subtilitatem, qui ad superficiem delatus statim exspiret.

Alii aciduli fontes sunt astringentes & palatum contrahentes, quod indicium est ferrearum particularum & chalcanti sive vitrioli admixtionis, ut etiam aluminis, &c.

Acidulorum fontium aqua caelo nebuloso & pluvioso minus acida deprehenditur, quod indicium est aeris condensati admixti.

Item si calori exponatur aqua illa, vel si in vaso aperto stet aliquot horis, vel longo itinere non bene tecta frigidis vasibus portetur, amittit statim

aci-

acidu  
pend

Ha

mini

si, &amp;

tur ac

horu

Ex

lectio

vi ad

tilita

Cu

tes si

loris

ficut

vel t

niatu

Fon

tioner

G

fons

quip

fume

nia f

ronit

aqua

etiam

cales

de d

impe

vi ap

num

Po

ma

App

aciditatem; quod indicium est à subtili Spiritu dependere illarum aciditatem.

Habent tamen etiam atomos ipsius vitrioli, aluminis, ferri, salis, atramenti; &c. & argillæ, sabuli, &c. Hoc probatur ex ea materia, quæ conspicitur adhærescere Canalibus, per quos fluunt fontium horum aqua.

Exempla studiosi sibi met colligant ex autorum lectione. In Rhenum influunt acidi fontes sive rivus ad minimum ducenti: sed propter spirituum subtilitatem nihil in Rheno sentitur aciditatis.

Cur in locis Septentrionalibus nulli aciduli fontes sint, quæres? Causam esse puto defectum caloris subterranei & nimiam densitatem terrarum: sicut ob illam causam quoque fit, ut nullum vel exiguum in illis regionibus aurum invenitur.

#### PROPOSITIO VIII.

*Fontium calidorum, quos thermas appellant, generationem explicare, & celeberrima loca.*

Germani vocant, Warmbad. Celebres sunt, fons Islandiæ omnium fervidissimus iudicatus, quippe cujus aqua, nil differat ab ea, quæ igne ad summum caloris gradum perducta. Sed in Japonia fontem adeo fervidum prorumpere scribit Caronius, ut ignis vehementissimi licet fervore nulla aqua ad eum gradum fervoris perducatur; triplo etiam diutius retinere aquam, quam nostra aqua calefacta consueverit. Fluit non continue, sed bis de die per unam horam cum ingenti spirituum impetu, & stagnum efficit, quod ex alio cognovi appellari ab incolis singacko, hoc est, infernum.

Post illum insignes calore fontes sunt sive thermæ Badenses in Helvetia, huic succedunt thermæ Apponenses in Italia. Vulgarium magnus in Germania

mania superiori est numerus, sicut etiam aliis in locis. In Scotia lacus est & fluuius Nessâ, qui calidus quidem non est, nunquam tamen frigore congelatur.

Causa & generatio thermarum est, 1. Admixtio sulphurearum particularum dum aqua per subterraneos meatus fertur, vel potius dum repit per fœdinas sulphureas ad collectionem circa fontes. 2. Fumi vapores & exhalationes inter terram, ubi sulphur est, purum vel impurum, ut carbones fossiles, succinum, &c. Etenim hæc materiæ continue fumum calidum emittunt, quæ aquas istuc delatas vel per ista loca prorepentes calefaciunt. Plurimis tamen & plerisque thermis admixtæ sunt particule aluminis, ferri, nitri, unde etiam acidiusculum & adstringentem saporem habent. Thermae omnes fere, quas novimus, sine cessatione fluunt, exceptis piperinis Germaniæ, quæ in Rhetia non procul à Curia celebres sunt, & præter sulphur continent etiam auri aliquid & nitri non parum. Erumpit harum thermarum aqua quotannis circa tertium Maii: definit fluere die XI: y Septembris circiter. Celebres thermæ in Germaniâ sunt Plumbariæ in Lotharingia, Emsbadæ supra Constantiam, in Alsatia prope Gebersweilum, in Marchionatu Bada. In Wirtebergensi Ducatu, Wildbad. Cellenses; Blasianæ prope Tubingam, &c. In Japonia quoque & insulis Indicis multæ sunt. In Insulis Azoribus ita fervidæ, ut ovum in eis coqui possit.

#### PROPOSITIO IX.

*Oleosorum & pinguium liquorum è terra manantium generationem explicare, & loca Telluris, in quibus temperiuntur, enumerare.*

Quidam fontes bituminosum liquorem effundunt, alii aquam pinguem, sive aquam cui guttæ oleosæ

oleos  
Eden  
tant  
moll  
veter  
paris  
unge  
Æthi  
bat,  
qui s  
diner  
super  
tiam  
rachi  
tes e  
aqua  
gnit  
bat s  
ne &  
cum  
rium  
oleu  
que  
mole  
Schw  
quie  
jor e  
proc  
mult  
ticul  
gni  
Petr  
Fo  
fed n  
effur  
chiu  
kauf

oleosa innatant. In Scotia duobus milliaribus ab Edenburgo fons scaturit, cui olei nigri guttæ innatant tota superficie: Incolæ eo utuntur ad cutem molliendam & tollendam scabritiem. Sic apud veteres celebre erat flumen Ciliciæ, dictum Liparis, in quo natantes vel lavantes ab ipsa aqua ungebantur. An hodie existat, dubito. Similiter Æthiopiæ lacus erat, qui unctos homines efficiebat, qui in eo nataverant: erat etiam Indiæ fons, qui sereno cœlo emittebat olei magnam multitudinem. Carthagini fons erat, in quo natabat insuper oleum odore, uti scobe, citreo; quo oleo etiam pecora solebant ungi. Zacyntho & circa Dyzrachium atque Apolloniam (teste Vitruvio) fontes erant, qui picis magnam multitudinem cum aqua vomebant. Babylone lacus amplissima magnitudine, qui Limne asphaltis appellatur, habebat supernatans liquidum bitumen, quo bitumine & latere testaceo structo muro Semiramis circumdedit Babylonem. Hodie quoque ad Monasterium Bavariæ Degemscæ fons est, cujus superficiei oleum innatat & quotidie aufertur. Magni quoque in Syria & Africa lacus sunt, qui maximas moles bituminis emittunt. Acidulis quoque Schwalbacensibus vase exceptis si per aliquot horas quietæ fuerint, guttulæ exiguæ olei innatant. Major ejus copia in fonte quem vocant Oelbrunn non procul ab Hagenaw ad pagum Lampereschloch. In multis etiam thermis reperiuntur bituminosæ particulæ si quietæ steterint per aliquot dies: In regni Neapolitani thermis quæ dicuntur balneum Petrolei.

Fontes autem, qui non oleum aquæ innatans, sed merum pinguem seu bituminosum liquorem effundunt, sunt etiam plurimi. Prope Gersbachium in valle dicta Lebersthal ex antiquata & exkausta fodina crassum oleum seu bitumen profuit,



fluit, quo rustici illinunt axes curruum, neque incolæ ejus excellentiam norunt: Thurnheuserus docet ex eo parare nobile balsamum. In Sumatra insula fons est, ex quo naphtha instar olei manat; alii balsami speciem esse dicunt: Ambra quoque fontes ibidem esse dicuntur. In Peruvia prope mare fons bituminosus rivum in mare emittens; incolæ utuntur picis loco, neque alia utuntur materia. In Persia non procul à Schimachia ad excelsum montem Barmach in valle fontes bituminosi seu naphthæ triginta circiter, sed in profundis puteis scaturientes cum impetu: profunditas est duarum circiter majorum ulnarum (Klaffter); additi ad descensionis commoditatem gradus lignei: emit tit sulphureum validumque spiritum: duplicis est coloris, in quibusdam rubri, in aliis albi coloris, hujus odor gratior.

Causa horum bituminosorum fontium est sulphurea & bituminosa materia in terræ visceribus à calore & spiritu liquefacta atque protrusa. Differentiarum causa ex ipsorum pinguium mineralium differentiis, ut succinum, ambra, oleum petrolei, pix, naphtha, bitumen, &c. petenda est.

#### PROPOSITIO X.

*Aquarum amari saporis generationem explicare, & loca Telluris, in quibus reperiuntur, enumerare.*

In Coromandelii littoris Indiæ regionibus fontes & putei multi aquam habent amaram, etsi ex petris fluant vel in petris scaturiant. In Ponto sive Asiæ minoris provincia parvulus rivus ad Callipadum oppidum, dictus Exampeus, amarus admodum, reddit Hypanem fluvium, cui influit, amarum. Plura exempla lectores ipsimet colligant.

Oriuntur ab impuro sulphure, bitumine, nitro,  
atra-

atram  
relicta  
lina in  
verifim  
aqua  
amara

Lac  
tuum  
purum  
Propo  
odore  
in fun  
petere  
fluent  
contin

Fon  
loca Te

In l  
est tan  
neque  
tur ex  
glody  
etsi m  
millia  
scaturi  
hausta

Prin  
tit aqu  
fima, u

Cat  
tio nitr  
fundita  
solariu

Sunt  
calidi &

atramento, cupro: sicut aqua in vase cupreo diu relicta acquirit amarum saporem. Quod vero Molina in descriptione Galaciæ tradit, non fit mihi verisimile, nempe in Hibernia lacum esse, cujus aqua per semissem dici fit dulcis, altera semisse fit amara.

Lacus Asphaltites Palæstinae, quem mare Mortuum vocant, amarum aquam habet propter impurum bitumen, unde ad pingues aquas prioris Propositionis referti debuisset. Terrum emittit odorem & vaporem: Omnia vitæ carentia trahit in fundum; Animalia autem non finit fundum petere: neque dulcescit, etsi Jordanum continuo fluentem absorbeat: venenatus est, quia arsenicum continet.

#### PROPOSITIO XI.

*Fontium admodum frigidorum causam explicare & loca Telluris, in quibus reperiuntur, enumerare.*

In Delphinatu Gallia, non procul à Vienna fons est tantæ frigiditatis, ut bibentibus ora intumescant, neque manus in eo contineri queant: non minuitur exhausta aqua, nec augetur ab infusa. In Troglodytica Arabia vel Æthiopia fontes frigidissimi, etsi magnus Solis ibi fit æstus. In Stiria, quatuor milliaribus à Gretz fontes tam frigidi in profundo scaturientes, ut nemo possit ex eis fluentem vel hausitam aquam potare.

Primo lapide à Culma fons magno spiritu emittit aquam quasi ferventem, cum tamen sit frigidissima, unde vocant insanam.

Causa horum fontium frigiditatis est, 1. Admixtio nitri & aluminis, item Mercurii, ferri, &c. 2. Profunditas scaturiginis, propter defectum radiorum solarium & sulphurei subterranei caloris.

Sunt etiam fontes quidam, qui alternatim sunt calidi & frigidi. In Catalonia lacus & fons Sal-

fula hyeme tepidus, æstate frigidissimus. Hoc illi cum multis commune est. Causam esse puto, quod æstate pori Telluris sunt aperti, per quos calidi spiritus erumpunt: hyeme clausi, unde intus coercentur calidi furni, qui aquam calefaciunt. Ita quidam fontes nocte sunt calidiores, quam die.

PROPOSITIO XII.

*Earum aquarum, quæ corpora in aliam speciem mutare videntur, generationem explicare, & loca Telluris, ubi reperiuntur, enumerare.*

Quædam aquæ sunt, quæ lignum mutant in durissimum lapidem. In Hibernia supra Armacanum urbem in stagno haud amplo hasta lignea defixa si aliquot mensibus hæreat, pars luto infixæ ferrea erit, pars quæ tingitur aquis, versa erit in coctem: reliqua manet lignum. Ita narrant Gyrardus & Maginus: sed Brietius meram esse fabulam dicit nescio quo autore. In boreali Ultonia (Hiberniæ provincia est) parte fons est, qui ligna per septennium immersa obdurat in lapidem. Loquæ aquæ (à *Loches*) in Belsia Galliæ provincia indurant omnia immissa in lapidem. Ad urbem Senonensem Burgundiæ prope lacum fons fluit, cujus aquæ durefcunt in lapidem. Vitruvius in Cappadocia inter Mazacam & Tuanam esse dicit lacum amplum, qui immissam arundinem vel lignum mutat in lapidem uno die. In Bohemia prope thermas Caroli fons est, in quo lignum diu jacens mutatur in lapidem. Similes aquæ in plurimis locis reperiri diversi autores referunt. Aliæ aquæ ferrum in cuprum mutare putantur, quod tamen revera non faciunt, sed quia ipsæ aquæ vitrioli & cupri particulas & spiritum vehunt, ideo ferri particulas dissolvunt & paulatim auferunt, quod dum faciunt, cupræ aquæ particula in ablatarum

latarum ferrearum locum reponuntur five ibi hærent, dum allabuntur cum fluente aqua.

Illarum vero, quæ ligna in lapidem mutant, aquarum ratio hæc est. 1. Quædam non mutant ipsa ligna in lapidem, sed terræ & lapidæ atque salinæ particule in aquis contentæ applicant se ad ligna, atque ita lapideo quasi tegmine obducunt ligna, non vero ea reuera immutant. 2. Quædam non in lapidem ligna vertunt, sed lapideam duritiem lignis inducunt, quod quidem facere possunt aquæ quædam minerales. 3. Si vero aquæ quædam ligna vere mutaverint in lapidem, concipio istud hoc modo fieri. Inter lignum & lapidem ea præcipua differentia visu deprehenditur, quod in lignis sunt quasi longæ fibræ, quibus particule cohærent, & cæminus densæ: in lapidibus autem particule granorum instar vel atomorum sunt sine certa in longas fibras extensione. Si itaque aqua aliqua particulas in ligno cohærentes secundum oblongam lineam dissolvat & quasi comminuat, ut jam non amplius isto modo cohæreant, sed tamen magis condensentur, non erit amplius magna inter lignum & lapidem differentia ut oculis notari possit: verisimile tamen est; aquas hæc minerales aliquam substantiam ipsis lignis communicare.

Aliæ aquæ sunt, quibus narratur inesse facultas mutandorum colorum in pilis & crinibus hominum & brutorum. In Momonia Hiberniæ provincia fontem esse tradit Gyraldus, cujus aquis si quis abluatur, statim canus efficitur, atque se vidisse, cujus pars barbæ lora cana erat, altera priorem retinebat colorem.

PROPOSITIO XIII.

*Aquarum venenatarum & lethiferarum causam*  
 N 2 *expli-*



explicare, atque loca Telluris, ubi reperiuntur, enumerare.

Talis est lacus Asphaltites propter arsenicale bitumen. Olim celebris erat Terracinæ fons, qui Neptunius vocabatur, in Volscorum regione, ex quo qui bibebant, vita privabantur; ideo ab accolis lapidibus injectis obstructus fuit. Apud Cychros in Thracia lacus fuit, ex quo non solum qui biberint, moriuntur, sed etiam qui laverint. In Thesalia fons profluit, ex quo nec pecus ullum gustat, nec bestiarum genus ullum propius accedit. In Macedonia non procul ab Euripidis sepulchro similem fuisse mortiferam aquam tradit Vitruvius. Celeberrima vel infamis est aqua, quam in Arcadia regione dicta Nonacris è rupibus faxeis stillasse scribunt veteres frigidissimam, & stygiam vel infernalem appellatam, quam neque argenteum, neque æneum, neque ferreum vas potuerit sustinere, sed dissilire & dissipari: conservare autem eam & continere nihil aliud potuisse, nisi mulinam unguam, atque ista aqua interfectum ab Iolla filio Antipatri fuisse Alexandrum Magnum non sine Aristotelis infamia scribunt Historici. In Alpibus quoque in Cotri regno aquam fuisse Vitruvius scribit, quam qui gustabant, statim conciderint. Hodie non pauci mortiferi reperiuntur in locis sive regionibus ad Alpes, sed plerique lapidibus obstruuntur, quæ causa est, cur adeo pauci lethiferi fontes noti sint.

Cæterum generatio talium aquarum fit, si aquæ repant vel fluant per arsenicales, mercuriales & antimoniales terras, atque earum fumis imprægnentur. Sicut enim fumus arsenici necat viventia, ita aquæ tali fumo imprægnatæ idem præstant.

## PROPOSITIO XIV.

*Aquarum Coloratarum generationem explicare & differentias, atque loca Telluris, in quibus reperiuntur, enumerare.*

Ad urbem Chinon Belsiæ (Galliæ provinciæ) aqua è specu profluit subflava, & concrefcit in lapidem. In Regno Congi Africæ rivus rubri coloris in mare labitur. In valle S. Georgii prope Sultzmat in Elfatia fons aquæ rubicundæ, dictus Notwasser. Rubicon est in Italia, profluit è summis Alpium fastigijs; hodie *Pisatello* dicitur. Alicubi nigri, viridiusculi, &c. coloris profluunt fontes, sed pauci.

Causa coloris harum aquarum est à terris per quas fluunt vel repunt, antequam ad fontem perveniunt.

## PROPOSITIO XV.

*Salsarum aquarum generationem explicare, & loca Telluris, in quibus reperiuntur, enumerare.*

Earum generatio duplex est. 1. Ex Oceano per subterraneos meatus ad superficiem terræ perveniunt & scaturiunt. 2. Generantur ex sale intra terram contento, qualis in plurimis locis invenitur, per quæ dum aqua repit, salinas particulas & spiritum concipit, antequam ad fontem perveniat. Magna est & cuius nota salorum fontium copia. In Germania sunt Hallæ Sueviæ, Hallæ Saxonix, Hallæ prope cento-Pontem, Hallopoli in Stiria; item in Saltzburgensi Archiepiscopatu; Salzæ in Magdeburgensi, in Lotharingia ad Saltzburgum, plurimæque aliæ in aliis locis ad centum usque fere. Diximus quoque de illis in præcedenti capite, & facilem habet hæc res cognitionem propter copiam salis ubique fere in terra latentis, cum ipsum sal elementum sit.

## PROPOSITIO XVI.

*Causam fontium ebullientium & cum spiritu multo prorumpentium explicare, atque loca Telluris, in quibus tales reperiuntur, enumerare.*

Causa est spiritus partim sulphureus, partim nitrosus, in terra aquæ commixtus: si sulphureus, aquæ sunt calidæ; si nitrosus, frigidæ: neque enim omnes aquæ, quæ ebulliunt fervidarum instar, sunt fervidæ, sed non pauca frigidæ, ut patet ex illa prope Culmam, insana dicta, de qua in Propos. XII diximus. Fluvius Tamayus in Galæcia oritur ex lacu: in exortu suo per aliquot anni menses edit mugitus ingentes. In Japonia fons ille fervidus mirabilis, de quo Propos. VIII diximus singulis diebus non nisi bis prorumpit per unam plerunque horam. Quando autem aqua profluere incipit, tanto spirituum impetu & vehementia fertur, ut incumbentia puteo ingentia saxa commoveat & ad trium vel quatuor ulnarum altitudinem exsiliat tanto fragore, ut explosionem magni tormenti bellici referat. In Westphalia fons prorumpit dictus Bolderborn, à strepitu.

Acidulæ quoque & thermæ pleræque cum spirituum copia exsiliunt & quasi ferventes bulliunt: in thermis id facit spiritus sulphureus, in acidis spiritus vitrioli, nitri, &c.

## PROPOSITIO XVII.

*Aquarum, quæ alias quasdam mirabiles proprietates habent, species enumerare & singularum causas scrutari.*

Ad hanc classẽ omnes reduci debent, quæ ad priores species non possunt commode referri. Sic fons in Lusitania est ad locum Cadima omnia injecta absorbens: olim quoque ibi in vicinia fuit alius, omnia injecta respuens: sed is obstructus est.

est. I  
lacun  
dicet  
net  
pe ad  
pago  
jcceri  
diu ci  
quam  
gent  
nadæ  
testat  
Pro  
lante  
ce dil  
amyg  
Fo  
edit,  
In  
aqua  
In  
cieba  
quob  
mira  
collig  
nulla  
causa  
rum  
Fo  
tinuo  
intum  
Ha  
ad pr  
mirac  
hic e

est. In Andalusia non procul ab urbe Guadaiana lacum esse refert Eusebius Nirenbergius, qui indicet tempestatem futuram. Ubi enim hæc imminet, horrendis mugitibus eum perstrepere, qui sæpe ad xviiri milliaria audiuntur. In Normanniæ pago Calerensi puteus est, in quem si lapidem projeceris, audies strepitum, quali tonitruï frementis, diu cieri in putei penetralibus. Ad Alpes putei aquam præbent, ex qua accolæ bibentes strumas ingentes collo dependentes acquirunt. In regno Granadæ ad oppidum Antiquarium fons est tantæ potestatis, ut saxa dissolvat.

Prope Tours Galliaæ urbem visuntur specus stilantes, vulgo *les Caves gouttieres*, ex quorum fornice dilapsa aqua efformatur in varias figuras, nuces, amygdala, &c.

Fons ille fervidus Japoniæ omnia adurit & exedit, ferrum, carnem, pannum, &c.

In Arcadia fons fuit olim ad urbem Clitori, cujus aqua pota reddebat abstemios.

In insula Chio fons, cujus aqua insipientes faciebat potantes. Susis in Persia fuit fonticulus, ex quo bibentes amittebant dentes. Similia exempla mirabilium fontium studiosi ex autorum lectione colligere & ad classem hanc redigere poterunt, si ad nullam priorum referri commode posse videantur; causa petendæ sunt ex peculiari singulorum locorum situ & proprietate.

### PROPOSITIO XVIII.

*Fontes illos enumerare, qui statò tempore, non continuo, prorumpunt; explicare & causam & illos, qui intumescunt, & detumescunt.*

Hæc Propositio non quidem ad hoc caput sed ad præcedens pertinet, quia tamen ad aquarum miracula pertinet, & in præcedenti neglecta fuit, hic explicabitur.



*In Wallia* Angliæ non procul à Castello Dineu-  
cer in regione Canterbocan fons est, qui intume-  
scit & detumescit singulis diebus cum maris fluxu  
& refluxu.

*Similis* intumescencia & detumescencia depre-  
henditur in fonte sito in vertice excelsi montis in  
Connacia Hiberniæ provincia: aqua tamen dulcis  
est. *Idem observatur* in fonte Lou-Zara, qui est in  
montanis Galaciæ dictis Cabreti, viginti leucis à  
mari: *item* in Aquitaniæ vico Marsaco fons est, qui  
æstus maris imitatur, & simul intumescit cum Ga-  
rumnæ incrementis in Burdigala. *Alibi fontes esse*  
dicuntur, qui contra maris æstum accrescunt & de-  
crescunt, qualem in Gadibus insula fuisse scripsere  
Strabo & Mela.

*In Wallia* prope Sabrinæ fluvii ostia stagnum  
est, vocant Linligunam, quod absorbet marinos  
æstus, dum hi assurgunt, iis tamen nullo modo  
repletur. At detumescente æstu, tum magno cum  
impetu exsurgit & aquas revomit, quibus ripas  
cooperit.

*In Cantabria* (Biscaya) fontes Tamarici quatuor  
sunt, quorum tres diebus singulis ita siccantur  
duodecies, quasi hic nulla aqua extiterit. Plinius  
refert. dubito an hodie reperiantur.

*In Andegavensi* agro Belsix supra Salmurium pa-  
gus est *Varus* dictus, ex quo rivulus bis in die fluit,  
bis immotus stagnat.

*In Sabaudia* fons eximie magnitudinis, dictus  
Mirabilis, qui qualibet hora bis deficit, bis fluit,  
& antequam fluat, ingenti murmure prorumpit.  
Influit in lacum Burgitem.

*In montibus de Foix* (in *Languedoc* provincia Gal-  
liæ), prope pagum Bellestadium oritur fluvius Li-  
ria (*Lers*) qui mensibus Junio, Julio, Augusto,  
quater & vices quotidie deficit & renascitur. Ber-  
tius ex Papyrio refert.

*In Westphalia regione*, quæ dicitur Paderborn, fons est, qui singulis diebus bis deficit & bis renascitur, etsi tantum aquæ effundat, ut non procul à fonte aqua circumagat trium moletrinarum rotas: erumpit cum ingenti strepitu: Est ille, quem diximus vocari Bulderborn.

*In oppido Villanova Lusitania* visitur fons, qui fluit tantum à Kalendis Maii ad Kalendas Novembris: tunc cessat, referente Eusebio Nierembergio.

*In Germania* provincia Wallis, non procul à thermis, quas vocant Leuckerbad, fons est dictus S. Mariæ (unser Frauen brunne). Ille fluere cessat in autumno ad diem Mariæ sacrum: redit Maio.

*In Vindelicis* non procul à Labach stagnum invenitur, quod æstate adeo siccum est, ut in eo ferant & metant: autumno redit aqua & quidem cum piscibus; in Maio recedit. Non procul inde fons visitur prope Sitich, qui eandem proprietatem habet.

*Sic stagnum seu lacus Maron in Palæstina* inter mare Galilææ & urbem Belena invenitur, quod æstate adeo exsiccatur & altas herbas fruticesque profert, ut leones, lupi & aliæ feræ in eo stabulentur.

*In Aquitania* prope fanum S. Jean d'Angely fons visitur nullo pene fluente in hyeme, ætate abundanti.

*Similis fons in Hispania* duobus miliaribus à Vagliadolit, qui cum Maio oritur, cum initio Novembris occidit.

*Therma omnes sine vicissitudine vel cessatione* fluunt, exceptis iis quæ in Rhætia sunt, & piperinæ dicuntur: namque fluunt tantum ætate à die tertio circiter Maii ad xiv Septembris: Tunc cessant.

## CAPUT XVIII.

*De Mutatione locorum Aquæ & Terræ, sive  
de mutatione aquæ superficiæ in  
Terream, & contra.*

## PROPOSITIO I.

**S**uperficiem Telluris, quam aqua occupat, cognoscere  
quanta sit; & illam, quam Terra occupat.

Accurate hoc scire non possumus, propterea  
quod ignoramus, an superficiem Telluris polaris  
Septentrionalis & Australis mare occupet an Ter-  
ra. Præterea quia superficies aquæ, ut etiam Ter-  
ræ, in Globo terminatur irregulari linearum flexu,  
ideo difficilis admodum labor foret supputare illam  
superficiem (aquæ & Terræ) quantitatem. Sed  
quantum ex inspectione terrestri Globi licet colligere  
crassa Minerva, pares fere & æquales esse vi-  
dentur aquæ & terræ superficies, ut ita superficies  
aquæ sit dimidia totius Telluris superficiæ, atque  
ita etiam superficies terræ.

## PROPOSITIO II.

*Superficiæ aquæ, ut etiam Terræ, non est omni tem-  
pore ejusdem magnitudinis, sed modo major, modo mi-  
nor; & cum augetur superficiæ aquæ, immittitur su-  
perficiæ Terræ.*

Etenim mare modo hic modo illic in terras ex-  
undat, vel illas abradit & secum avehit: sic itaque  
augetur ejus superficies, magis aut minus, prout  
magnum vel parvum terræ tractum inundaverit,  
sicut olim Thessaliam, &c. Hæc tamen varietas,  
quanta quidem hætenus cognita est, exiguam ra-  
tionem habet ad totam aquæ superficiem: potest  
autem magna fieri, ut dicemus Proposit. xviii.

## PROPOSITIO III.

*Quantum aqua Tellus contineat, & quantum Terra, supputare.*

Ad accuratam & veram quantitatem aquæ & terræ inveniendam, debent prius cognita esse tam tota aquæ superficies quam profunditas in variis maris partibus: præterea subterraneæ aquarum moles debebant esse exploratæ. Quæ omnia cum nulla methodo possimus investigare, ideo neque accuratam aquæ quantitatem neque Terræ possumus invenire: sed tantum ex certis hypothesebus; nimirum ponamus aquæ superficiem esse dimidiam superficiem totius Telluris; profunditatem quadrantis vel dimidii milliariis, neque habeamus rationem aquarum in subterraneis alveis.

Invenietur quantitas aquæ ita: Auferatur à semidiametro Telluris quadrans vel dimidium milliariis, & inveniatur soliditas spheræ, cujus semidiameter æqualis est residuo. Hæc soliditas auferatur à soliditate Telluris; residui dimidium est aquæ quantitas. Idem dimidium à totius Telluris soliditate subtractum, relinquit quantitatem Terræ, cui pro montium quantitate addenda est quarta vel quinta molis aquæ seu dimidii prioris pars. Verum hæc ex incertis suppositis incerta sunt, vel saltem veritati propinqua.

## PROPOSITIO IV.

*Aqua licet & locum Telluris, quem occupat, deserere potest multas ob causas, ita ut terra arida conspiciatur, ubi aqua vel mare antea fuit, adeoque nova terra videatur generata.*

Aquarum tractus septuplices sunt, 1. Oceanus. 2. Sinus Oceani. 3. Freta. 4. Fluvii. 5. Lacus. 6. Stagnum. 7. Paludes.

1. Paludes exsiccare posse vel per aquæ subdu-



ctionem vel per exsiccationem sive evaporationem progressu temporis factam, vel per terræ admixtionem, nemini dubium esse potest. Multis enim in regionibus agri fertiles sunt, in locis, ubi paludes ante aliquot sæcula fuere, ut in Westphalia, Geldria, Brabantia, Hollandia, Moscovia. Sic Argivorum regio in Peloponneso Trojanis temporibus pauculos alere poterat, propterea quod palustris esset: at Aristotelis tempore exsiccata erat & admodum fertilis.

2. Eadem est stagnorum ratio, cum non multum differant à paludibus.

#### PROPOSITIO V.

*Fluvii alveum vel litas (hoc est, partem alvei) deserunt & novam terram præbent:*

1. Si multum terrestris materiæ, arenæ & sabuli secum devehant, quæ in fundum subsidentia progressu temporis ita augent alvei altitudinem, ut non sit magis depressus, quam iste locus, unde aqua è vicinia fluit. Quod si in unum locum subsideat illa materia in parte alvei, separabit partem unam, quæ dein exsiccabitur.

2. Si alium alveum fluvius accipiat, sive id fiat per artem, sive per naturam, & violenta causâ, ut vento, inundatione.

3. Si ipsi fontes fluviorum obstruantur vel aquam effundere cessent, collapsa nimirum aut condensata terra vel magna arenæ copia vi ventorum in fontes & vicina loca compulsâ.

Exempla fluviorum, quorum alvei hodie exsiccati sunt ex toto vel ex parte, passim occurrunt apud Scriptores, non tamen magnorum fluviorum, sed parvorum, vel partium magni alicujus fluvii. Sic alveus brachii istius Rheni, quod Leydam præterfluens olim in Oceanum Germanicum effluebat, jam ante aliquot sæcula ab aqua deser-

tus hodie terra est, stagnante Rheno inter Leydam & Cattorum vicum.

Littora ab aquis fluviorum detegi & alveo angustiori decurrere fluvios quosdam, quam olim fecerint, ex plurimis exemplis constat. Ex eo, quod quidam hodie navigabiles non sunt, qui olim fuerunt, colligimus, aquæ altitudinem imminutam, & aliquando omnino nullam in illis alveis futuram, ut in Scaldi fluvio. Ideo rectores Rerum-publicarum faeces illas seu sedimenta curant extrahi ex alveis fluviorum, ut navigabiles mancant, ut multis in locis videre licet.

Magni autem fluvii non nisi multis annorum seculis vel myriadibus potius, exsiccantur vel in terram mutantur, propterea quod & multi minores fluvii ex diversis partibus fluentes illos constituunt, (quorum etsi quidam exsiccentur vel cursum mutant, omnes tamen non nisi longo tempore idem patientur) & alveus profundior est. Sed unus obiectus pulvinus efficere quidem potest, ut fluvius alium alveum decurrat, & prior exsiccet, ipsum tamen fluvium non tollet, nisi vel fontes, vel brachia illius obstruantur. Verum itaque est, nec Nilum, nec Tanain, nec Albim, nec Rhenum, nec alios fluvios semper fluxisse vel perpetuo futuros, sed terram & fuisse quondam & futuram olim, ubi ipsi jam fluunt.

#### PROPOSITIO VI.

*Lacus exsiccantur, & in terram mutantur.*

1. Si lacus à fluviis influentibus constituatur, fiet illa mutatio per abductionem fluviorum vel cessationem, & simul per evaporationem. 2. Si lacus per subterraneum ductum ab Oceano vel mari aquas accipiat, fiet lacus illius mutatio postquam subterranei ductus fuerint obstructi. Et sic lacus primo mutantur in stagna & paludes, dein-

de in terram aridam. Perspicuum est, inquit Aristoteles, quod quia limum aut quippiam ejusmodi aquarum vis intulit (loquitur de lacubus quos fluvii faciunt), ideo stagna facta sunt & tellus arida, quodque inibi relicta stagnansque aqua, successu temporis assiccata jam prorsus evanuit. Ita quæ ad Mæoticum lacum pertingunt terræ, annuum convectu in tantum excrevere, ut naves multo minores nunc, quam anno abhinc sexagesimo, quæstus gratia ingrediantur. Parvorum lacuum, qui in terram aridam mutati sunt, plurima exempla reperiuntur; inprimis in Hollandia.

### PROPOSITIO VII.

*Freta exsiccantur atque in isthmos mutantur, vel regiones continentales.*

Accidit illud, postquam propter continuam terrestres materiæ subsidentiam longo tempore factam alveus freti ita altus evasit, ut mari transitum neget.

Sic isthmum inter Africam & Asiam olim fuisse fretum, quo mare rubrum & mediterraneum conjuncta fuerint admodum est verisimile, & sequenti Propositione dicemus. In multis fretis hodie minor maris altitudo & major alvei altitudoprehenditur ac olim; quod certissimo indicio est, freta illa aliquando sine aquis futura esse & in isthmum aridum mutatum iri. Sic fretum, per quod Oceanus Atlanticus efficit sinum, quem Hollandi vocant *Suyder-zee*, & fretum *Texel*, hodie non capit majoris formæ naves onustas, & altitudo maris singulis annis minor evadit, terra altior. Itaque ubi aqua est ad *Texeliam*, ibi post aliquot secula erit arida terra. De altero freti quod *Vlie* vocant, idem aliquando futurum est.

## PROPOSITIO VIII.

*Sinus, quos Oceanus medias inter terras præbet, exsiccantur progressu temporis & fiunt arida vel sicca loca.*

Fit illud duplici de causa. 1. Si fretum, quo sinus Oceano conjungitur, isthmus fiat, sive obstruatur ab arena & sabulo; quod progressu temporis fieri, dictum est in præcedenti Propositione. Hac enim ratione sinus Oceani & ipsius pars seu membrum resicabitur à corpore, & fiet lacus, deinde stagnum & palus, atque per exsiccationem fiet terra, & aqua nulla ibi conspicietur. 2. Si ipse alveus sinus propter defluentes in eum fluvios & arenam secum deferentes altior fiat, ut mare deinde non recipiat: sic paulatim Mare recedet à littoribus illius sinus.

Mare itaque mediterraneum, Balthicum, rubrum, Persicum atque alia, quæ sinus Oceani sunt, desinent aliquando maria esse, & in terras mutabuntur, quod sequenti Propositione pluribus probabitur.

## PROPOSITIO IX.

*Oceanus littora quadam deserit, ita ut terra sit, ubi antehac Oceanus erat.*

Fit illud propter hasce causas. 1. Si aquæ allabentis ad littora impetus frangatur ab extantibus hinc inde in littore vel sub mari clivis, pulvinis aut scopulis. Impetu enim illo imminuto, subsident partes terrestres aquæ, & augent illorum pulvinorum altitudinem & magnitudinem, unde fit ut magis magisque frangatur Oceani impetus, atque ideo plus materiæ terrestri subsideat, ut tandem aucti pulvini excludant Oceanum vel alveum minus profundum efficiant. 2. Multum ad hoc augmentum littorum facit, si littora sint arenosa



noſa & petroſa, ut allabens Oceanus parum poſſit ſeparare vel ſecum auferre. Si enim cum nihil auferre poſſit, ſemper autem quaſdam particulas deponat, progreſſu temporis altiora ſient littora, & Oceanum à conſueto loco arcebunt. 3. Si aliud vicinum littus habeat terram minus ſolidam, leuem & cavernoſam. Etenim Oceanus terras ab aliquo littore abraſas & abreptas deſert ad vicina littora, præterea littus tegeus vel inundans deſerit vicini littoris partem, atque ita terram hic præbet. 4. Si fluvii magni exonerent ſe per littus in mare illud, Etenim fluvii hi deſerentes ſecum multam arenæ & ſabuli copiam, ubi ad oſtium & littus, quo in mare ſe exonerare nituntur, pervenitur, deponunt illam, partim quia alveus laxior & latior ibi ſit, partim quia mare reſiſtit illorum fluxui: & inprimis hoc obſervatur in regionibus, quas fluvii inundant ſingulis annis. 5. Si venti frequentes è mari ad littus ſpirent, & littus ſit petroſum vel tenacis terræ, non arenolum. 6. Si affluxus maris celer & vehemens ſit ad littus, refluxus autem tardus & lenis. Etenim materiam, quam celer fluxus advexit, lenis refluxus non auferit ſecum, ſed ſubſidere ſinit. 7. Si littus oblique deſcendat in mare ad longum ſpatium, non directe & perpendiculariter deorſum vergat. Sic enim impetus allabentis maris decreſcit, & deponit ſaburram.

Multa terræ loca ſunt, quæ conſtat olim fuiſſe Oceani ſedes. Ægyptus ubi eſt, mare olim fuit antiquorum teſtimonio, & comprobatione hodiernæ experienciæ. Nilus enim à remotis Æthiopiæ regionibus fluens & ſingulis annis alveum egrediens, ubi turget, expandit ſe per totam Ægyptum, ubi cum fluminis impetus ceſſat, ſubſidet limus, cœnum & terreſtris materia, quam celer fluvii curſus advexerat: atque ita Ægyptus ſit altior. Et antequam à Nilo tantum erat adveſtum.

mate-

mate  
mare  
teles  
Locu  
tant  
tur.  
Iudib  
tudo  
præte  
amne  
Ægy  
id qu  
to (  
ruit.  
necd  
Clar  
tota  
aber  
curſu  
ti ad  
tum  
pone  
men  
foli  
ſolid  
ſtru  
G  
datio  
Bran  
mod  
jicer  
flav  
ſapi  
re) t  
ipſu  
H  
mor

materiæ, tunc mare terram Ægypti tegebat: jam mare non admittitur propter altitudinem. Aristoteles testis præter alios: ejus enim verba hæc sunt: Locus iste totaque regio (Ægypti), quæ fluminis tantum investu nata est, semper aridior effici videtur. At propterea quod paulatim arescentibus paludibus vicina loca incoli cœpere, temporis longitudo initium obliteravit. Omnia igitur Nili ostia, præter unum Canobicum, manu instituta, non ab amne facta videntur. Quin etiam antiquitus tota Ægyptus urbe, quam Thebas vocant, constabat: id quod & Homerus declarat, qui non adeo multo (ut ita dixerim) post ejusmodi mutationes floruit. Nam loci illius mentionem facit, tanquam necdum existente Memphi aut certe non tanta. Clarius Seneca ita hic explicat: Ægyptus ex limo tota concrevit. Tantum enim (si Homero fides est) aberat à continenti Pharos, quantum navis diurno cursu metiri plenis lata velis potest: Sed continenti admota est. Turbidus enim defluens Nilus, multumque secum limum trahens, & cum subinde apponens prioribus terris, Ægyptum annuo incremento semper ultra talia. Inde pinguis & limosi soli est, nec ulla intervalla in se habet, sed crevit in solidum arescente limo quo pressa erat & cedens structura.

Ganges & Indus in India celebres fluvii, inundationibus suis idem effecerunt, quod Nilus; in Brasilia quoque fluvius argenteus. Et Chinam hoc modo generatam vel saltem auctam esse, licet conjicere, propterea quod impetuofus fluvius, quem flavum appellant, ex Tartaria in Chinam fluens & fæpissime inundans (etsi non anniversario tempore) tantum arenæ & sabuli habeat, ut tertiam aquæ ipsius partem faciant.

Hæc exempla quarto loco positam causam demonstrant, ubi nempe fluvii faciunt, ut mare deserat

ferat littora: sed ipsum quoque mare secessus sui causa sæpe in plurimis existit regionibus, nempe dum ipsum advēhit & deponit materiam, qua alveus & litus majorem altitudinem acquirunt & accedens mare non admittunt. Ita Hollandia, Zelandia & Geldria generatae sunt; namque olim Oceanum hæcæ Telluris partes occupasse norum est tam ex vetustis historiarum monumentis, quam ex ipsa terræ qualitate. In clivis Geldriae non procul à Noviomago reperta concha satis superque id restantur, ut etiam frutices & uliginosa materia in profundo Hollandicæ terræ reperta: adde, quod ipsum mare altius est quam terra harum regionum, atque illam inundaret, & obtegeret, nisi vel arenosis jugis vel aggeribus arceretur. Sunt tamen, qui à Rheno & Mosâ advectam esse Hollandiam & Zelandiam existimant, neque est vero ab-simile.

Ita Borussia, Cassubia, crevere, cum mare hodie littora illa deseruerit, quæ olim observabat.

#### PROPOSITIO X.

*Pulvinorum generationem explicare.*

Pulvinos appellamus arenosos tumulos seu clivos in aqua, extantes supra alveum fluvii ad eam altitudinem, ut navium transitum impediant. Nautæ Belgæ vocant, *een droogte, een banck, een riff*; Lusitani, Abrolhos, Baixos. Neque differunt à scopulis, nisi quod eorum partes cohæreant & densatae sint ac duræ: pulvini vero ex arenæ granis consistunt non admodum cohærentibus: sed sæpe confunduntur hæc vocabula.

Pulvini vel in alveis fluviorum jacent (ut in Albi, in Wolga plurimi) vel ad ostia (quod frequentissimum, ut in Wolga, Albi) vel ad littora maris, vel in medio mari. Modus generationis idem est, quo in præcedentibus propositionibus dixi-

dixim  
deserer  
antequ  
prius  
bus,  
pars C  
viorum  
ferant  
augent  
rapide  
quibu  
angust  
que fu  
pido f  
rem al  
copia  
tus ve  
& gen  
tur in  
fere.

Ne  
& dit  
gnitat  
major  
dudur  
fantur  
in Fri  
dracu  
Briem

Hic  
omnia  
quam

Ne  
quod  
bi qu  
runt  
rant.

diximus alveos fluviorum sicari & mare littora deserere. Etenim plerunque ita fit, ut Oceanus, autequam partem Telluris omnino relinquat, prius pulvinos hosce generet non procul à littoribus, atque ita paulatim recedat & pulvini hi fiant pars Continentis. Eodem modo fit in alveis fluviorum autequam omnino arefcant & ab aqua deserantur. Frequentissima causa est, quando fluvii aagentur ab imbris vel resoluta nive, atque ideo rapide fluunt. Etenim tunc à littoribus vel ripis quibusdam, ubi motus vehementior, & alveus angustior, abradunt limum, arenam, ipsa quoque fundi materia attollitur & simul defertur à rapido fluvii impetu, donec ad ampliorem vel latiorum alveum pervenitur, atque à fonte vel causa copix aquarum remotum. Hic enim remittit motus vehementia, & tunc subsident partes terrestres, & generantur pulvini: quorum plurimi reperiuntur in locis, ubi fluvii lati sunt, in angustiis nulli fere.

Neque est ullum malum, quod vel florentissimis & ditissimis emporiis omnem splendorem & dignitatem citius auferat sine ulla recuperandi spe, vel majorem navibus cladem inferat. Ut antiquas & dudum oblivione oblitteratas urbes taceamus, versantur adhuc ob oculos Sturiorum urbs (Stavoren) in Frisia, Arnemuda Zelandix (Armuyen), Dordracum Hollandix, Antverpia Brabantix, Stada Bremensis Episcopatus.

Hisce civitatibus negotiandi potestatem, unde omnis eis splendor & divitiarum, nihil aliud ademit, quam pulvini in fluvii vel mari vicino orti.

Neque ullum emporium fere maritimum est, quod ab hoc metu pulvinorum liberum sit. In Albi qui existunt, multas Hambugensibus perdiderrunt naves quæ grandia Oceani tormenta evaserant. Idem in aliis consideranti manifestum fiet, præ-



praesertim in portu Texel & Vlic Amstelodamensis emporii.

Conspiciuntur autem magno numero ad littora maris, ut ad Flandriæ littora, & Frisiæ, & recedente æstu maris plurimi ex istis pulvinis sunt pars continentis, quippe alveus intercedens parum aquæ tunc habet, ut navigationem non admittat: Belgæ vocant eos *het Wad*, quasi Vadum. Cejebres apud nautas vel potius infames propter naufragia pulvini sunt, qui magno numero reperiuntur in uno maris loco, hi nempe, 1. Pulvini Brasiliæ, Abrolhos de Brasilia, *het riss van Brasilien*, item *de droogte van Brasil*. A littore Brasiliæ in mari jacent tractu septuaginta miliarium, quos nautæ Indiam petentes magna diligentia vitare debent, dum ad vitandam Guineæ malaciam versus Brasiliam navigationem instituunt. Accedunt tamen ad illos pulvinos, quam proxime licet, ut ventis majorum virium utantur: sed ne inter Brasiliam & pulvinos deferantur, cautione opus est. 2. Pulvini S. Anni, non procul à Guinea Africana, ad elevat. poli Arctici 6 gr. In hosce delatæ naves non sine magno periculo & opere deducuntur, plurimisque diebus detinentur, ubi nautæ existimant se jam evasisse illos. Etenim pulvini hi continui non sunt, sed latis & profundis voraginibus atque euripis sejuncti, ita ut in parva distantia hic sit profunditas aquæ decem ulnarum, mox trium. 3. Pulvini inter Insulam Madagascar & Arabiam atque Africam, dicti Baixos de Judæa, sunt scopuli seu cautes acuti coralliorum varii coloris. 4. Pulvini Chineses. 5. Pulvini Flandrici, &c. Alios plurimos videre licet in Mappis Geographicis nauticis.

Unum generationis modum, quo pulvini hi existant, per subsidentiam arenosæ materiæ, quam mare secum defert, explicavimus supra. Huic secundus

eundus  
existere  
obtegar  
enim c  
ad litt  
renosi  
longo

Si it  
illas te  
judicari

Ad  
pulvin  
impetu  
ideo m  
cum a  
fluent  
omni

Et  
duos h

Ar  
cent, s

Di  
bus n  
fiden  
nem  
dante  
magi  
cium  
hoc e  
nam  
do m  
tunc  
terra  
hanc  
tantu

cundus modus adjungendus est, quo tales pulvini existere possunt, nempe si mare inundet terras & obteget, in quibus clivi & colles arenosi sunt. Et enim colles hi tunc erunt & dicentur pulvini. Ita ad littora Geldriæ & Hollandiæ multi continui arenosi colles, quos *Dunen* vocant, conspiciuntur longo tractu, ipsa vero terra sive ager humilior est.

Si itaque per irruptionem mare inundet & tegat illas terras, tunc colles illi erunt pulvini. Ita de aliis judicandum.

Ad ostium fluviorum ideo frequentissimi sunt pulvini, quoniam ibi alveus latior est, & propterea impetus effluxus fluviorum ibi imminuitur, atque ideo materia hic subsidet, quam rapidus fluxus secum advexit. Oceani quoque fluxus repellunt effluentem ex ostiis fluviorum aquam, unde impetus omnino cessat.

Et operæ pretium est; distinguere & considerare duos hosce generatorum pulvinorum modos.

#### PROPOSITIO XI.

*An pulvini, qui in mari non procul à continenti jacent, sint futuri pars continentis istius, conjicere.*

Diximus in precedenti propositione, quod duobus modis pulvini generentur, uno vere per subsidentiam arenæ in mari, altero per denominationem, nempe collem aqua circumfluente & inundante terras. Si priori modo generati sint & adhuc magis magisque accrescere deprehendantur, indicium est, illos continenti terræ conjunctum iri, hoc est, alveum maris inter pulvinos istos & vicinam terram exsiccatum iri. Si vero pulvini secundo modo generati sint, neque amplius augeantur, tunc conjicere licet, pulvinos non facile proximæ terræ conjunctum iri, sed mare potius terram hanc latius ingressurum. Hæc tamen conjectura tantum est.

## PROPOSITIO XII.

*Insula in mari & fluvio eodem modo producantur, quo pulvini, imo ex pulvinis possunt fieri insula: alia tamen etiam modo fiunt.*

Etenim si in aliqua maris parte tanta arena, fabuli, limi, argillæ copia progressu temporis aggregetur, ut altior evadat, quam mare, erit insula, qui est primus modus. Deinde secundo modo, si mare irrumpens in terras, tantum partes humiliores tegat, non vero altiores & colles, erunt hæc insulæ. Et hoc posteriori modo verisimile est generatas esse vel extitisse insulas illas, quæ in magnam altitudinem assurgunt, ut S. Helena, Ascensio, &c. præsertim quæ saxæ & petrosæ sunt.

Huc etiam pertinent insulæ, quas mare abscidit à procurrentibus terris. Sic Siciliam ab Italia maris violentia separatam, testantur antiquitatis Scriptores, & noti sunt Poëtæ de hac re versus.

Priori modo, nempe per subsidentiam & congregationem multarum terrestrium particularum extiterunt insulæ Zelandiæ, Danicæ, Japoniæ. Eadem Moluccarum insularum videtur origo fuisse: quippe fodientibus in planitie ad exiguam profunditatem occurrit arena & concharum copia.

Ceilanum insulam ab India procurrente separatam narrant Ceilani incolæ, & valde est verisimile. Sic Sumatra insula Malacæ olim adhæsisse creditur, neque est vero absimile propter frequentes pulvinos & syrtes. Certe olim Chersonesum auream fuisse multi putant, pro Chersoneso habitam fuisse verisimile est, quoniam è remoto loco spectata videtur adhærere Malacæ.

De Maldivis insulis referunt Indi Malabarici littoris, quod ex olim adhæserint Indiæ, & continuam continentem fuisse, cum hodie & longe absint ab India & in undecies mille insulas divisa.

Ne-

Neque  
harum  
ut qui  
quin  
coale  
in una  
insula  
gellan  
Ocear  
Pacific  
move  
Amer  
tus pe  
auget  
vero a  
Torri  
hæfiss  
inde  
fisse &  
dico  
hodie  
vallo  
nam,  
De  
nici fi  
Ins  
mari  
diter  
rint,  
mate  
xerit  
risim  
vium  
boear  
adha  
quipp  
junga

Neque dubitandum est, cum inter binas quasque harum Maldivarum angusti transeant euripi, adeo ut quinque vel quatuor ulnas alicubi non superet, quin progressu temporis multæ ex illis in unam coalescent, Euripo imminuto, & demum omnes in unam magnam oblongam insulam. Imo, omnes insulæ Orientales inter continentem Asiæ & Magellanicam sitæ magno numero videntur extitisse Oceani violentia separatis terris. Etenim Oceanus Pacificus in Zona Torrida perpetuo motu & impetu movetur ab Occidente in Orientem, hoc est, ab America ad insulas illas Orientales: præterea ventus perpetuus versus eandem plagam Orientalem, auget magnopere Oceani impetum. Non itaque vero absimile est, cum omnes istæ insulæ in Zona Torrida existant, olim continuo terræ tractu adhæsisse Asiæ Magellanicæ seu australi Terræ: deinde Oceani violentiam modo hic modo illic abrafisse & divulsisse terram, donec ubique facta via Indico Oceano junctus est, & tot insulas effecit, quot hodie in illa plaga admiramur parvo distantes intervallo, Javas, Celebes, Borneo, Maduram, Amboinam, &c.

De insulis in Mexicano sinu, ut etiam Magellanicæ freti, idem omnino conjicimus.

Insulæ Ægæi maris utrum per divulsionem à mari factam (mari ex Ponto Euxino fluente & mediterraneo mari contrarios fluctus ciente) extiterint, an priori modo per subsidentiam terrestris materiæ, quam Propontis ex Ponto Euxino advenit, dubito. Divulsionem factam esse, magis verisimile: & fortassis famosum Deucalionis diluvium hic etiam vires suas exercuit. Certe Euboeam insulam, hodie Negroponte dictam, Græciæ adhæsisse olim, Scriptores non ignobiles tradunt, quippe Euripus tam modicus interfuit, ut ponte jungatur.

Ex



Ex pulvinis insulas fieri multis exemplis docemur. Sic insulæ in fluvio Nilo, in fluvio Laurentii Americæ Septentrionalis olim pulvini fuerunt. Alio modo fluvii insulas faciunt, quando ramum emittunt, quem alio loco in se recipiunt, ut in Tanai, Wolga, aliisque videre est. Hoc autem non à natura sed hominum industria esse factum, non est dubitandum. Obius idem facit.

Insulam Loanda sitam in littore Africæ procurrentis convexerunt duo fluvii Rengo & Coauza, qui in illo loco se in mare exonerant. Quoniam enim magnam limi & sabuli copiam deferunt secum ex altis & montanis locis cum impetu delata, hanc deposuerunt & adhuc deponunt in ostiis suis, atque ita insulam Loanda progressu temporis effecerunt, prius pulvinum factam, jam vero & fertilissimam & incolis abundantem. Atque ita plurimas insulas ad littora fitas olim pulvinos fuisse existimamus, etsi quasdam etiam exitisse per divulsionem à continenti factam vi maris scimus, ut ad Norwegiam: Et in petrosis & rupeis insulis hic posterior modus generationis magis verisimilis est.

Sed in mari Indico tam per divulsionem quam per subsidentiam materiæ possunt existere insulæ, quoniam dum divellit, simul abradit intermediam terram, quam deinde in alio loco deponit. Ad hoc multum faciunt furibundi venti & ecephias frequens tempore mensium pluvialium à Maio ad Septembrem. Istitis enim mirum in modum Oceanus perturbatur, ita ut ex fundo quoque argilla & arena separentur & ab aliis regionibus, quæ materia ad Indiæ littora expellitur. Sic fauces Goani portus impetu ventorum hyemalium (à Maio ad Septembrem) aggestis arenæ cumulis ita obstruuntur, ut vix minoribus navigiis transitum præbeat. Sic Cocini portum cumuli isti arenæ

nz clau  
ita ut n  
sint tra

Eten  
frequ  
nubibu  
conspic  
petu ef  
ra rapia  
tamen  
portus

Sun  
affluxu  
insulæ  
atque  
acquir  
aquæ a  
sine re

Sed  
facit, u  
deantu  
& Jun  
insulis  
mensis  
dant re

Alii  
insula e  
traditu  
subito se

Alii  
judicar  
ctum.  
neca q  
lam Th  
& quid

nz claudunt instar aggeris seu valli iis mensibus, ita ut neque majoris vel minoris formæ naves possint transire.

Etenim continua in montibus Gatis pluvia, & frequens ecnephas cum exhydria prorumpens è nubibus, quæ in jugo Gatis tanquam suspensæ conspiciuntur, tantam copiam aquæ & tanto impetu effundunt, ut multum arenæ secum ad littora rapiat, ubi reluctantem Oceano coacervatur: quæ tamen arena cessante hyeme ab Oceano aufertur & portus aperiuntur.

Sunt terræ quædam littoribus adeo vicinæ, ut affluxus maris eas insulas faciat, in refluxu non insulæ, sed pars Continentis vicinæ dici possint, atque si interpositus alveus altitudinem majorem acquirat progressu temporis, excluditur deinde aquæ affluxus, atque insulæ illæ pars Continentis, sine reciproca mutatione existunt.

Sed & Nilus inundans Ægyptum singulis annis facit, ut urbes, & colles Ægypti tunc insulæ videantur. Sic Wolga fluvius ita crescit in Maio & Junio, ut pulvinos & insulas tegat. Et multæ ex insulis Indiæ adjacentibus proxime fiunt pulvini mensibus pluvialibus, ubi Nilus & Ganges inundant regiones.

### PROPOSITIO XIII.

*Alius adhuc præter duos commemoratos modos, quo insula existant vel orientur, à quibusdam Scriptoribus traditur, nimirum Terram coherentem è fundo maris subito ferri ad superficiem.*

Alii fabulosum hunc modum non immerito judicant à fabulosis Græcis atque Poëtis profectum. Delon enim ita extitisse volunt. Sed Seneca quoque gravis auctor commemorat, insulam Therasiam sua ætatè enatam in Ægeo mari, & quidem nautis spectantibus. Et si itaque paucissima

ciffima exempla talis productionis infularum reperiuntur, impossibilis tamen non debet censerī. Fieri enim potest, ut in fundo maris vel in alveo ejus, terra porosa, spongiosa, pumicosa, sulphurea existat, ( ut est varia terrarum levium differentia & mixtura ) quæ jam ad insignem altitudinem excreverit, ita tamen ut adhuc infra aquæ superficiem lateat. Si itaque fundo maris minus firmiter adhæreat terra vel pulvinus, poterit maris vi separari, & quia parum levior est, quam aqua, vel ejusdem fere levitatis, ideo ascendet ad superficiem aquæ & subito videbitur enata insula: Vel sine aquæ violentia poterit spiritus sub terra conclusus, & erumpere molens, insulam illam sursum extrusisse. Magna enim spirituum inclusorum & majus spatium exigentium potentia est, ut probatur ex terræ motibus, quibus aliquando monticulos è terra protrusos esse, aliquando absorptos constat: idem ex bellicis cuniculis manifestum est, ubi spiritus magnas moles turrium & murorum dirumpunt & versus æthera pellunt.

Si itaque talis insula ita subito in mari enata adhæreat adhuc fundo maris, necessario dicendum est, vi spiritus subterranei illam sursum pulsam esse; sicut aliquando montes è terra protrusos esse quidam scribunt: si vero non adhæreat fundo amplius, poterit tam spiritus quam aquæ violentia illam separasse à fundo, ut deinde ipsa sua levitate sursum ad superficiem delata sit.

#### PROPOSITIO XIV.

Unde alia oritur dubitatio, *An insulae quaedam dentur, quæ mari innatent, sicut Thales dicitur existimasse totam Terram, quam nos habitamus Oceano innatare?* Thaletis quidem opinio satis superque refutata est, cum alveus maris nostræ Terræ continuus deprehendatur. Sed natantes insulas

insula  
sit pu  
perier  
nata  
herba  
atque  
sed &  
item  
fiatu  
moni  
Delon  
mari  
Cur il  
Ad ho  
tatio i  
illa fe  
inde a  
elevat  
vinos  
alia te  
que in  
meric  
ti coll  
hinc in  
In  
esse qu  
pascen  
rum S  
Ha  
partis  
quom  
& nov

Flu  
non occ  
I. C

insulas existere posse ratio suadet, nempe si terra sit pumicosa, levis & sulphurea. Seneca addit experientiam. Scribit enim se vidisse ad Cutylias natantem insulam, quæ & arbores habuerit & herbas nutrierit, aqua illam sustineri & in hanc atque illam partem non tantum vento impelli, sed & aura, neque unquam illi per diem & noctem in uno loco stationem esse, quod lenissimo flatu moveatur. Aliam præterea insulam in Vadi-  
monis lacu vehi, aliam in lacu Stationensi. Sic Delon insulam & omnes Cyclades olim innatasse mari narrant veteres. Neque est quod objicias, Cur illæ insulæ hodie quoque non innatent mari? Ad hoc quippe facilis est responsio. Etenim innatio illa non potest diu durare. Cum enim insulæ illæ fere ad fundum maris pertingant, dum hinc inde agitantur, & ad pulvinos vel alveum magis elevatum deferuntur, præsertim si inter duos pulvinos mediæ veniant, sistitur ille motus & aggesta alia terra uniuntur cum isto pulvino vel alveo, atque ita ex natantibus fiunt firmæ. In provincia Americae Fonduræ hodiernum lacus est, in quo multi colles herbis & fruticibus consiti conspiciuntur hinc inde vento agitari.

In lacu maximo Scotiæ, dicto *Loumond*, insulam esse quæ natet & vento circumferatur, etsi pecori pascendo apta sit, tradit Boxthius Scoticarum rerum Scriptor.

Hactenus de generatione Terrarum sive aridæ partis Telluris in superficie extantis egimus: jam quomodo Oceanus atque aquæ loca sua nutent, & nova occupent, considerabimus.

#### PROPOSITIO XVI

*Fluvii certos terrarum tractus occupant quos antea non occupabant, varias ob causas.*

1. Cum primo oriuntur e fontibus suis & vel à



natura vel ab arte alveum accipiunt, de quo diximus capite xv.

2. Si fluvius alium alveum sibi faciat vel ramum de se emittat, quod plerunque ab hominibus fit, nimirum ut fluvii partem ad urbes ducant vel in alium fluvium, cujus exempla attulimus capite citato.

3. Si fluvii ripam magis magisque occupent progressu temporis; quod accidit, 1. Si alveus fiat altior à subsidente terra & arena. 2. Si celeri fluxu abradat latera ripæ. Si alio fluvio augeatur, vel copiosis pluviis aut exhydria.

4. Si inundent terras. Quod si non recedant, sed magis magisque augeant, fiunt lacus, vel si alveum priorem repetant, effusa in campos aqua, si magna sit copia, palus fiet.

*Corollarium.* Fuisse itaque tempus verisimile est, quo tractus illi Telluris, quos jam Rhenus, Albis, Nilus omnesque alii fluvii tenent, aridi fuerint & à terra occupabantur.

#### PROPOSITIO XVI.

*Lacus, paludes, stagna occupant telluris partes, quas antea non occupabant.*

1. Quando primum enascuntur & progressu temporis augentur. de quo diximus capite xv.

2. Si copiosa pluvia decidat.

3. Si in lacus fluvii magnam aquæ copiam deferant cum impetu.

4. Si alveus altior evadat.

5. Si crebris & vehementioribus fluctibus agitati lacus paulatim magis magisque abradant ripam & terras aqua tegant. Sic lacus Harlemensis intra triginta vel quadraginta annos vicesimam circiter milliaris partem ultra priorem ripam progressus est.

*Corol.* Verisimile itaque est, quod tempus fuerit

rit olim, quo tractus illi Telluris, quos jam vel Zaire lacus, vel Lemanus, vel Parima, vel Harle-  
mentis, vel Mæoticus, vel paludes Westphaliae atque  
alix omnes occupant, aridi fuerint.

## PROPOSITIO XVII.

*Oceanus occupat Telluris partes, quas olim non occu-  
pabat.*

Pluribus id modis fit. 1. Cum medias perrum-  
pens terras fracta facit & sinus, ut sinum Mediter-  
raneum, Arabicum, Bengalensem, Camboiensem,  
&c. Ita fretum inter Siciliam & Italiam, inter  
Ceilanum & Indiam, inter Græciam & Eu-  
roæam, Maniliense, Magellanicum, Danicum, &c.  
Neque vero est absimile, Oceanum Atlanticum  
hoc modo generatum esse, & ita Americam à Ve-  
teri Orbe, seu sola Europa avulsam esse, quod eo  
libentius quidam arripiunt, ut inde originem  
gentium Americanarum deducant ab Adamo. Sane  
Ægyptii sacerdotes Soloni Atheniensi sexcentis  
circiter annis ante natum Christum narrarunt (ut  
videre licet in Dialogo Platonis, qui Timeus in-  
scribitur) insulam fuisse quondam contra fretum  
Herculeum Hispaniæ Gibraltar, Africa simul &  
Asia majorem, nomine Atlantidem, postmodum  
vero immani terræ motu, ingentique unius diei  
ac noctis illuvione, sub vasto gurgitemersam fuis-  
se (partem scilicet ejus). Ex qua narratione collige-  
re licet, fuisse olim apud Ægyptios, quippe li-  
terarum monumentis & annotationibus deditos,  
quandam adhuc famam de separatione Americæ à  
nostro Orbe facta ante multa secula. Longe est ve-  
rissimilius, Septentrionalis Americæ partem, ubi  
Nova Francia, Anglia, Canada, &c. olim adhaesisse  
Hiberniæ. Fretum Gibraltar ab Hercule perfosum  
esse scripsere veteres.

2. Cum vento vehementiori versus terram

compulsus Oceanus eam inundat perruptis aggeribus à natura vel arte factis. Multa inundationum Oceani exempla sunt, ut olim in Thessalia, non ita dudum in Fritia, Holfatia, &c.

3. Cum propter easdem causas multis locis firmam Terram penetrat, atque insulas facit. Hoc modo diximus in præcedentibus quod verisimile sit mare illud extitisse, quod innumerabiles illas Indicas seu Orientales insulas interfuit, & illud quod inter Maldivas & Indiam fluit, atque etiam sinum Bengalensem & Camboiensem.

4. Cum littora paulatim abradit atque ita progressu temporis quasdam littoris & adjacentis terræ partes tegit. Sic mare Balthicum Pomeraniæ littora invalit, perdiditque celeberrimum emporium Vinetam. Sic à Norwegiæ littore insulas parvas auferens, seipsum inter hæc insulas & Continentem immisit. Sic Oceanus Germanicus Hollandiæ littus prope Cattorum vicum magno tractu occupavit, ita ut rudera arcis Britannicæ (quam vocant *het huyste Britten*), Romanorum olim castellum seu munitio, jam procul à littore in mari jaceant inconspicua & aquis tecta. A Ceilanî insulæ parte Septentrionali Oceanus ad viginti milliaria abstulit, ita ut hodie sit multo minor, quam olim. Et sunt plura ejus rei exempla.

*Collarium.* Ex hisce colligitur, illa loca Telluris, ubi jam Oceanus est, olim terras fuisse, & quondam terras futuras, nimirum si supponamus, Tellurem multa annorum millia jam extitisse, & adhuc duraturam. De hoc argumento legi potest Aristoteles cap. XI I, lib. I, Meteororum; & Stevinus in Geograph. Si quæras, quomodo Oceanus montium loca occupet, respondeo, montes non tegi à mari, sed fieri tunc vel scopulos vel insulas, affluente nimirum vel appulsa alia terra. Confirmatur id exemplo multarum insularum,  
imo

imo omnium fere, quia experientia testatur, quod insulæ omnes fere habeant montes in medio, ut Ceilanum, Sumatra, Java, &c. Imo quædam sunt nihil nisi montes, ut Helena, Ascensio, Hesperides, &c. Cum itaque loca illa Oceani, in quo insulæ hæ jacent, olim terra erunt vel olim essent, tunc sane montes insularum harum fuerunt montes Continentis.

## PROPOSITIO XVIII.

*An fieri possit, ut tota Telluris superficies sit sicca sive Terra? vel ut tota liquida, sive ut terra omnis aqua tegatur? vel ut partes plures superficiei sint terrea uno tempore, quam alio, vel plures aqua tecta?*

*Primo*, ut modo majorem superficiei Telluris partem occupet Terra, quam alio tempore. item, quod consequens est prioris, ut aqua uno tempore majorem superficiei Telluris occupet, quam alio tempore, id satis ostensum est Propositione secunda hujus capituli.

*Secundo*, An aqua sive Oceanus possit omnem terram obtegere, ut nulla sit extans vel insula, atque ita universale diluvium efficere? ad hoc respondeo, posse quidem explicari & concipi modum, quo id fieri queat naturaliter, sed tamen propter terrarum compactionem & montium altitudinem tale quid vix unquam futurum esse. Modus, quo id fieri queat, est idem cum eo, qui Propositione secunda est explicatus. Si enim Oceanus continue abradat terras à littoribus, easque in alvei sui loca profundissima deponat, atque hoc perpetuo temporis decursu faciat, tandem omnes terras superficiei sive extantes auferet, & ipse omnem terram teget. Montes vero vel scopuli fient, vel vehementi aquarum impetu ablatis radicibus corruent vel subsidebunt paulatim. Multo



facilius hoc fiet, si illorum opinionem velimus sequi, qui, qui Oceano majorem tribuunt altitudinem, quam terræ: verum nos in præcedentibus satis ostendimus, falsam esse hanc opinionem.

*Tertio*, An terra possit totam Telluris superficiem occupare, ut ita omnia aqua totusque Oceanus in cavernis terræ vel subterraneo alveo contineatur & à terra tegatur? ad hoc respondeo eadem ratione, non esse impossibile & modum concipi, quo illud fiat, posse; sed tamen vix unquam futurum. Modus autem unicus tantum concipi potest, nimirum si totæ cavitates intra terræ profundum vel jam existant vel fiant, in quas Oceanus possit contineri. Neque enim à quoquam hætenus demonstratum est, quod tales cavitates in profundo terræ non existant. Et si non existant, fieri poterunt, 1. ab aquæ ipsius impetu. 2. à spiritibus subterraneis.

#### PROPOSITIO XIX.

*Cur in medio Oceano pauca insula & nulla insularum agmina reperiuntur, sed plura ad magnas Continentes sive ad magnas Insulas?*

De veritate Propositionis non est quod dubitemus: eam quippe experientia manifeste probat. In vasti Pacifici Oceani medio vix una vel altera parva insula conspicitur: Sic in Oceano vasto inter Africam & Brasiliam præter insulam S. Helenæ, & Ascensionis, pauca reperta sunt. At circa littora Continentium vel in Oceano non procul à littoribus Maximarum Continentium omnes existant insulae (paucis illis exceptis, quas dixi) imprimis hoc animadvertere licet in numerosis illis, quas Agmina insularum appellamus, quæ omnia Continentibus sunt vicina. Insularum Agmi maris agmen adjacet Europæ & Asiæ: Hesperides Africæ: Maldivæ Indiæ, ut etiam omnes Indiæ insulae

insulæ jacent inter Aliam & terram australem. Solæ Flandricæ sive Azores videntur in medio Oceano inter Veterem Orbem & Americam sitæ esse; etsi illi quam huic sint propiores.

Causa hujusce phænomeni sive situs insularum proculdubio est, quod ipsæ extiterint per Oceani irruptionem in Continentes, quo impetu terræ Continentes separatæ sunt, sed quia non tanta Oceani altitudo, ut potuerit terras omnes interceptas tegere, ideo hinc inde inter Continentes vel ad Continentes, insularum agmina extiterunt. Quosdam etiam alio modo generatas esse, verisimile est, nimirum quia Oceanus terras à littoribus abrasas & avulsas non potest longo à littoribus spatio secum avehere, sed illas paulatim subsidere patitur non magna à littoribus distantia, quæ subfidentia multis annorum seculis continuata tandem insulas efficit. In medio itaque Oceano paucæ insulæ sunt. 1. quia à littoribus remotior est locus ille, quam ut abrasæ partes ad illum devehantur. 2. major ibi est aquæ commotio & impetus, qui alvei terram commovet & potius profunditatem promovet, quam ut insulas generari patiatur. 3. quoniam ibi nullæ Continentes, ideo neque agmina insularum existere possunt juxta primum modum, quo talia agmina generari diximus. Olim tamen, cum nondum hic esset medium vasti Oceani, ubi nunc est, talia agmina quoque hic extitisse & paulatim ab Oceano esse absorptas non est vero abissimile.

SECTIO QUINTA  
GEOGRAPHIÆ ABSOLUTÆ,

Continens explicationem Atmospharæ & Ventorum capitibus tribus.

CAPUT XIX.  
De Atmospharæ & Aëre.

PROPOSITIO I.

**E**X Telluris partibus tam siccis quam humidis, sive terrâ & aquâ, exhalant continuis vapores & fumi in spatium, quod circa Tellurem est.

Causa duplex est. Prima, Calor cælestis stellarum, imprimis Solis & Lunæ. Altera, calor terrestris sive Ignis subterraneus vel potius terrestris, sive qui Telluris partibus admixtus est. Etenim videmus, omnia fere corpora, admoto vel levissimo igne, halitus emittere. Cum itaque tam cælestis calor quam terrestris nihil aliud sit quam ignis aliquis, ideo necessarium quoque est, ut ex partibus Telluris vapores & fumi per illum extollantur. Ita à priori ostenditur veritas Propositionis. Eandem confirmat experientia. Nocturno enim tempore iter facientes præsertim Luna lucente & prope aquas, conspicimus vapores multos circa telluris superficiem oberrare & attolli. Die quoque Solem multos vapores attollere vel vulgo notum est, cum Germani dicunt, die Sonne ziehet das wasser/ item cum nebula sursum ascendit, quod futurarum pluviarum indicium certum est.

## PROPOSITIO II.

*Atmosphæra dicitur spatium circa totam Tellurem, in quo exhalationes ex Tellure elevata versantur, In hoc aut aliud quoddam præter exhalationes ipsam corpus continetur, incertum est.*

Sumitur etiam pro ipsis exhalationibus circa totam Tellurem. Est autem non levis controversia inter modernos Philosophos de corpore, quod circa Tellurem consistit. Mathematici enim complures, iique insignes, statuunt, nihil hic esse præter exhalationes elevatas ex Tellure, ideoque atmosphæram & aërem sumunt pro eodem, & post atmosphæram ponunt immediate ætheream substantiam. Alii vero Philosophi existimant, quod præter illas exhalationes in spatio circa Tellurem sit corpus aliquod peculiare & simplex, quod aërem appellant, etsi ultro concedant, exhalationes in aërem posse mutari, & contra aërem in nubes & densiores vapores. Idem post aërem hunc usque ad Lunarem orbem ponunt aliud subtile corpus diversum ab æthere, quod Ignem appellant quidem, sed minus proprie id fieri, neque cum nostro igne convenire ipsi fatentur. Esse enim substantiam calidam (non comburentem), siccam & admodum subtilem, ut refractiones radiorum Solis & stellarum non efficiat: quam tamen in aëre suo fieri volunt. Hisce bene consideratis, videntur hæc duæ sententiæ seu opiniones Philosophorum in verbis potius discrepare, quam in re ipsa. Etenim quod aërem attinet, quoniam ita crassum concedunt, ut radiorum in eo fiat refractionis, & præterea ex exhalationibus generari possit levi mutatione, nihil aliud videtur esse aër, quam subtilior exhalatio, etiamsi ex Tellure non exhalaverit. Quod ad ignem sublunarem attinet, cum cum improprie ita vocari fateantur, esse vero ita subtilem dicant, ut



nullam radiorum refractionem efficiat, nihil is videtur differre ab æthere, vel exigua discrepantia: Dicamus itaque, Atmosphæram & Aërem esse corpus circa Tellurem, in quod incidentes radii refringuntur (seposita controversia, Unde istud corpus ortum sit). Quæ quidem definitio cum priori convenit. Neque enim verisimile est, posse ex Tellure elevari exhalationes adeo subtiles, ut nullam refractionem vel impedimentum radiis luminosis ex æthere venientibus faciant: Si tamen tales dentur, earum altitudinem non possumus scire, & an excludantur ab atmosphæra. Quod tamen si quis acriter urgere velit, existimans, igniculos à Sole in Tellurem projectos, iterum remeare ad solem, ille posteriorem definitionem commodam esse non inficiabitur. Itaque atmosphæra & aër nihil aliud est, quam textura multorum corpusculorum, quæ Telluri adhæret, sicut lanugo pomum cotoneum circumvescit.

### PROPOSITIO III.

*Exhalationes interdum plures, interdum pauciores extolluntur e Tellure, præsertim in diversis locis.*

Causa est 1. Diversa Solis supra Horizontem elevatio vel infra eum depressio. 2. Lunæ diversa atas atque ejusdem supra Horizontem elevatio. 3. Reliquarum stellarum ortus, occasus & supra Horizontem constitutio. 4. Diversitas in ipsis Telluris partibus. Aqua enim & humida loca facilius vapores emittunt quam terrea & sicca.

### PROPOSITIO IV.

*Exhalationes, quæ atmosphæram constituent, sunt diversi generis ( præsertim in diversis regionibus ), nimirum aquea, salina, sulphurea, terrea, spirituosæ: compositæ exhalationes sive partes atmosphæra*

*Plura sensiles admodum diversa sunt, mixta scilicet ex simplicibus particulis.*

Causa est, quoniam in Telluris partibus talia corpora diversi generis existunt, & calore extoluntur, quædam facile, quædam difficiliter. De terreis particulis dubitare aliquis possit, quoniam hæc vix sursum elevari aptæ sunt: sed sciendum est, id fieri posse, 1. Ob maximam pulvisculorum parvitatem, quæ levia sunt, cum gravitas compactorum sit affectio. 2. Ob sulphurearum particularum admixtionem, quæ illas terreas secum avehant violente.

Porro sulphureas partes esse in aëre, probant meteora ignea, fulgura, ignis fatuus, tonitru, &c. imodor sulphureus post tonitru & fulgura manifeste id arguit.

De aqueis nullum dubium esse potest: spirituosæ & salinæ propter tenuitatem & promptam à Tellure exhalationem concedendæ sunt: arguunt quoque eas animalcula in aëre magno numero & incredibili copia generata.

Aristotelici exhalationes dividunt in duas species, Vapores & fumos. Vapores ex aqua generantur, & in eam facile redeunt. Fumi ex rebus siccis. Sic armoniacum sal totum in fenum abit supposito igne. Hæc quoque causa est, quod in diversis regionibus diversus admodum aër percipitur. Item quod in uno loco pluit, in altero non.

#### PROPOSITIO V.

*Minima particula aëris & insensiles omnes radios repellunt vel reflectunt tanquam speculum: sed particularum aëris sensilium & compositarum quædam plures radios transmittunt, pauciores reflectunt; alia contra, pauciores radios transmittunt, plures reflectunt.*

Ideo partes atmosphæræ dividuntur in opacas

& pellucidas : hæ sunt quæ plures radios transmittunt ; illæ, quæ pauciores.

Quoniam enim minimæ particule ( tam aqua quam terra ) utpote atomi , sunt solida corpuscula sine ullis poris , ideo radios non transmittent , sed repellent , quoniam admodum verisimile est , perspicuitatem sive radiorum transitum requirere ordinatos in corpore poros & vacua spatiosa.

Partes vero aëris seu atmosphæræ ex minimis particulis compositæ , si quidem ordinatos & multos poros habebunt , erunt perspicuæ & radios multos transmittent : sed si confuse admodum illæ particule fuerint compositæ vel aggregatæ , sine multis poris paucos radios transmittent.

Inde fit , ut Sol crassum nebulosum aërem opacum discutiens , faciat perspicuum , nimirum facit eum magis porosum.

Quod autem minimæ particule reflectant radios , ex eo constat. Aëre serenissimo in cubiculum obscurum per foramen angustum immittatur radius solaris. Videbis manifeste à particulis in aëre volitantibus ingenti numero reflecti radios ad oculum tanquam ex speculo. cumque illæ particule adhuc sensiles sint , idem de minimis & quæ sensum fugiunt , particulis concludendum est.

Qui autem exhalationes humidæ attenuatas volunt esse perspicuas , non autem siccas & fumos , illi refutantur ab experientia & ratione. Ratione quidem : quod fumi & siccæ exhalationes æque subtiles & porosæ fieri possint ac aquæ : sed illi existimant perspicuitatem non in pororum ratione , sed peculiari qualitate consistere. Experientia autem , quoniam aër serenus plures siccas quam humidæ particulas habet. Hoc ex eo scitur. In novo illo pneumatico sclopetorum genere , quod non pulvere pyrio vel igne , sed spiritus & aëris adminiculo

culo  
tur,  
pet :  
sclop  
aër

E  
surfa  
est, )  
N  
cen  
ro fa  
spat  
1. C  
2. C  
S  
nos  
ced  
par  
mi  
car

sera  
&  
re  
inc  
Po  
in  
fia  
ev  
m  
ha

culo exploditur, aër ita comprimitur & condensatur, ut vix sexagesimam prioris spatii partem occupet: neque tamen ullam humoris speciem creant in sclopeto; quod omnino fieri deberet, si particulæ aëris sereni essent aquæ.

**PROPOSITIO VI.**

*Exhalationes non per se & ex sua natura ascendunt sursum, sed violento motu impulsæ; sive, aër non levis est, sed gravis, absolute loquendo.*

Nimirum id omne grave dicendum, quod ad centrum Telluris movetur, nisi impediatur. Id vero facit aër. Effossa enim terra, descendit in factum spatium aër. Quod autem sursum fertur, fit ideo,

1. Quia calor rarefacit ut majus spatium quarat.
2. Quia ab alio vapore urgetur.

Sic in frigidis locis, ut Nova Zembla, & apud nos tempore nocturno nebula non ascendit, sed accedens Solis calor illam rarefacit, & facit, ut una pars alteram urgeat & trumat. Si autem particulæ minimæ aëris liberæ essent, nec sibi mutuo implicarentur, sic demum levis esset.

**PROPOSITIO VII.**

*Partes atmosphaera suprema sunt subtiliores quam inferiores. Fieri tamen potest, ut partes mediae sint densiores & crassiores quam infima circa Tellurem.*

Quoniam enim leviores partes petunt superiorem locum, sunt autem subtiliores etiam leviores; inde patet prioris Propositionis membri veritas. Posterioris autem membri causa est, quod partes in medio aère facile coëant rursus, & ita crassiores fiant, quandoquidem calidæ particulæ cum illis evectæ deseruerunt eas, & radii à terra refracti in media illa regione propter distantiam nihil roboris habent.

Inde



Inde fit, ut post pluvias aër medius sit magis serenus, quoniam partes crassiores separatae sunt.

PROPOSITIO VIII.

*Atmosphæra sive aër incallescens, majorem locum occupat quam antea: Calore autem quo magis defluitus est, eo magis se contrahit, & minus spatium occupat.*

Hoc luculente ostenditur illo instrumento, quod thermometrum vocamus, propterea quod calorem vel temperiem aëris in calore & frigore illo metiamur, in quo videmus aërem densiorem fieri, & minus spatii in vitro occupare, quo aër frigidior est, & contra eo majus spatium, quo aër plus caloris acquirit, uti sequenti Propositione dicemus. Causa autem, sive ratio Propositionis à priori est, quoniam calidæ particulæ sive Solis radiorum sive alterius ignis sunt subtilissimæ omnium particularum totius mundi, & in continuo motu. Illæ itaque atmosphærae dum sunt admixtæ, separant & divellunt illas particulas magno impetu, atque ita plures poros efficiunt: & his igniculis discedentibus, particulæ aëris sibi relictæ rursus coeunt, vel sibi mutuo implicantur.

*Corollarium.* Itaque altitudo aëris vel atmosphærae non est constans, sed decrescit & accrescit. Nimirum in meridie maxima esse debet, in media nocte minima, circa tempus ortus & occasus solis, mediocris. Vide Propos. XIV.

PROPOSITIO IX.

*Thermometrum sive Thermoscopium conficere, quo aëris mutationes in calore & frigore explorare possimus.*

Sumamus vitrum oblongi & cylindracei collicum sphaerico capitulo L.H. Hoc alligetur tabulæ M.N.P.Q, capite sursum erecto. Orificio supponatur

natur  
imple  
conda  
consti  
rum  
illo re  
aère f  
nimi  
imple  
Cont  
desce  
postu  
Gr  
loris  
divis  
Ve  
ad ex  
mine  
& sic  
gradu

A  
fieri,  
Contr  
sexag  
tanta  
densa  
Pr  
igne  
cim.  
lem  
quid  
lidus  
tio,  
differ  
drach

natur vas aqua (quam præstat esse coloratam) ita impletum, ut pars tubuli seu colli LF in ea abscondatur. Eligatur autem tempus mediocris aëris constitutionis, sive ad cuius temperiem, reliquorum dierum aëris temperiem comparare vis, atque illo tempore aqua infundatur in vas. Ita fiet, ut aëre factò frigidiorè, aqua ultra F sursum ascendat, nimirum quia aër frigore condensatus, qui antea implebat spatium FA, jam minus spatii occupat. Contra aëre factò calidiorè, aqua ab F versus L descendet, quia aër FH rarefactus jam plus spatii postulat.

Gradus autem accretionis vel imminutionis caloris & frigoris cognosces, si lineam FA in tabella divideris in certas numerorum partes.

Vel sine vase supposito, habeat vitrum LH etiam ad extremitatem L, sphaerulam cum exiguo foramine à latere, & hæc sphaerula impleatur aëre. Nam & sic ostendentur aquæ ascensione vel descensione gradus caloris.

## PROPOSITIO X.

*Aër serenus vehementissimo ab igne ita potest rarefieri, ut spatium septuagies majus occupet, quam antea. Contra ita condensari, in sclopeto pneumatico, ut tantum sexagesimam partem prioris spatii occupet. Sed neque tantam rarefactionem calor solaris neque tantam condensationem frigus aëri inducit.*

Probatür ex eo, quod si æolopila sumatur, & igne candescat, ea tunc capit aquæ uncias tredecim. Sed eadem æolopila frigida, sive ad naturalem statum rediens, capit uncias tredecim & sesquidrachmam. Itaque spatium, quod aër dum calidus erat, occupabat in æolopila, majus est eo spatium, quod occupat idem aër refrigeratus, estque differentia spatiorum ea pars æolopilæ, quæ sesquidrachmam aquæ capit, si tota capit tredecim uncias.

cias cum sesquidrachma. Atqui hæc pars æolopila est fere septuagesima totius spatii in æolopila. Itaque aër fervidus existens occupavit spatium septuages majus, quam deinde cum ad naturalem temperiem redit.

PROPOSITIO XI.

*Cur in locis Zona frigida, eo tempore, quo Sol illius minime non oritur, quibusdam diebus aër est serenus, plerunque autem crassus & nebulosus?*

1. Nebulæ istius crassæ & fere semper durantis causa est exilis calor ipsius Terræ subterraneæ, vel etiam à Sole, ut etiam Luna (quæ tempore delitescentis Solis dies multos & noctes continue supra Horizontem manet) reliquisque stellis derivatus; qui calor quoniam debilis est, ideo nebulam discutere nequit. Quod autem aliqui dies noctesve serenitatem aëris præbent, id fit non ideo quod vapores crassi attenuati sint, sed quod vel ad Tellurem subsederint, vel ventis in alia loca repulsi.

PROPOSITIO XII.

*Cur sæpe in maximo hyemis frigore aër tamen subtilis est & serenus, cum tamen frigus aërem denset & contrahat?*

Frigus duplex est, mediocre & sævum. Mediocre frigus non reddit aërem serenum sed nebulosum, quia ab exili calore, qui illi frigori adjunctus est, vapores elevantur, sed non discutuntur. Sed sævum & vehemens frigus aërem serenum præbet duplici de causa: 1. Quia crassiores aëris vapores magis crassos facit, & sic efficit ut decidant, aëremque magis subtilem præbeant. 2. Quia pori Telluris clauduntur & constringuntur, & vapores ipsi ita exhalare aëremque turbidum reddere nequeunt. Mare ipsum quidem gelu non constringitur, nihilominus particulæ ita gelu densantur, ut

ad ex  
mas e  
ac Te

Cur  
aër H  
quam

Ca  
tem r  
visus  
Horiz  
admo  
diné  
lumn  
ita qu  
tias r  
partic  
oculu  
appre

Ea  
ab illo  
vel in  
tur.

A  
in om  
gura

Qu  
titud  
Sol u  
lis, a  
debil  
cinior  
dioru  
verfas

ad exhalationes non ita promptum fit, etsi pluri-  
mas emittat, quandoquidem alia est ejus conditio  
ac Telluris.

PROPOSITIO XIII.

*Cur aër inspectus juxta lineam Horizontalem sive  
aër Horizontalis apparet crassior & magis nebulosus,  
quam is in quo versamur.*

Causa duplex est. Prima, quia aër circa Horizon-  
tem revera est magis nebulosus. Altera est fallacia  
visus vel judicii ex visu. Etenim particularum aëris  
Horizontalis distantias oculus apprehendit angulis  
admodum parvis, sicut distantias columnarum ordi-  
næ & longa serie positarum, & ideo sicut co-  
lumnas remotas conjunctas esse judicium autumat,  
ita quoque particularum aëris Horizontalis distan-  
tias non apprehendit, sed conjunctas existimat &  
particularum autem aëris elevati distantias aspicit  
oculus sub angulis majoribus, & ideo melius eam  
apprehendit.

Eadem causa est, cur aër, qui nebulosus nobis  
ab illo remotis apparet, ubi ad illum accedimus  
vel in eo versamur, minus nebulosus esse vide-  
tur.

PROPOSITIO XIV.

*An atmosphaera sive aëris altitudo supra tellurem sit  
in omnibus locis eadem ad idem tempus. Et, an ejus fi-  
gura sit sphaerica?*

Quod non eadem sit, sed admodum diversa al-  
titudo in diversis locis, ex eo videtur sequi, quod  
Sol uni tantum loco ad unum tempus est vertica-  
lis, ad reliqua loca radios mittit obliquos & eo  
debiliores, quo locus à Sole remotior & polis vi-  
cinior. Itaque diversa admodum est potentia ra-  
diorum solis ad elevandos vapores, & ideo ad di-  
versas altitudines extollentur, nimirum in loco  
cui



cui sol verticalis est, maxima erit altitudo, in opposito loco minima, in locis circa polum media, ut ita ovalem figuram aër accipiat.

Contrarium vero magis verisimile est, nimirum quod eadem sit altitudo atmosphaeræ in omnibus locis. Etsi enim in quibusdam locis vapores & aër magis elevetur quam in aliis, tamen quia aër fluxilis est & sua gravitate ad Telluris centrum tendit, ideo pars aëris elevatior premet aërem sub se positum & hic alium depressiorem à latere trudet, donec omnes partes eandem altitudinem acquirant.

Atque ita eodem modo demonstrabitur aëris figura sphaerica, sicut capite XIII, de Aqua cum Archimede eandem probavimus, quia valent hic eadem hypothesès, quas ibi assumsimus: nimirum pars aëris minus pressa expellitur à magis pressa; premitur autem unaquæque pars aëre supra eam existente. Quare aëris figura est sphaerica, non ovalis, ut quidam volunt. Sed nisi hypothesi dicta concedatur, ruit demonstratio.

Cartesius quoque ovalem facit aëris figuram peculiari ratione. Vide cap. XIV.

#### PROPOSITIO XV.

*Condensatio vel rarefactio aëris non mutat ejus altitudinem.*

Nimirum, quia non tota atmosphaera condensatur vel rarefit, sed quaedam partes, atqui in omni tempore quaedam partes condensantur vel rarefiunt, modo hæ, modo illæ: Quare condensatio vel rarefactio unius temporis non magis mutat altitudinem, quam condensatio vel rarefactio prioris temporis. Differentia tantum esse videtur, quod in uno tempore major possit esse condensatio vel rarefactio quam in alio: sed hæc differentia parum alterare potest altitudinem.

## PROPOSITIO XVI.

*Atmosphæra sive aëris altitudo non tantum eadem est in diversis locis, sed etiam omni tempore tam æstate quam hyeme eadem & constans manet.*

Etenim etsi calor in æstate nostri loci, nostrum quoque aërem magis attenuet & elevet, quam in hyeme, tamen quia eodem tempore in alio loco Telluris hyems est, in illo minus attolletur aër. Quare pars aëris nostri movebitur versus aërem locorum illorum, ubi aër minus altus est, nempe ad locum depressiorem, ut Propos. XI V est dictum. Et contra, dum aër nostri loci propter frigus hyemis deprimitur, pars aëris istius loci ubi æstas est vel major calor, movebitur versus nostrum locum, nimirum donec totus aër æqualiter absit à centro Telluris.

Eadem ratio de die ac nocte. Dum enim nobis nocte aër contrahitur & deprimitur, in alio loco rarefit magis, & sic versus aërem nostri loci movetur, donec iterum sphericam figuram faciat. Et quia ubique omnia paria sunt, manebit eadem ubique altitudo in omni tempore. Quod vero uno tempore & loco magis condensetur vel rarefiat aër, quam in alio loco vel tempore, ea differentia cum admodum parva sit, parum potest altitudinem variare, ut præced. Propos. monuimus.

Eadem est ratio nebulæ, vel pluviarum, vel vaporum, quæ fiunt in nostro loco vel alio. Hisce enim videtur altitudo aëris vel major vel minor debere. Sed respondeo, vix ullum tempus esse, quo non in aliquo loco Telluris pluat, nebula cadat, &c. Et propterea dum in uno loco pluit, non ideo minor fit aër, quam antea erat, quoniam antea in alio loco pluebat: Et sic par est ratio, & aëris quantitas nec augetur nec minuitur.

## PROPOSITIO XVII.

*Quo aër frigidior est, eo densior est; & propterea plerumque hyeme densior, quam aestate est (nimirum in aliquo Telluris loco); item nocte, quam die: atque illam densitatem augent aquosi crassi halitus in hyeme & nocte, praesertim matutinis & vespertinis horis.*

Veritas Propositionis manifesta est ex praemissis propositionibus. Neque obstat, quod pars calidioris aëris versus frigidiorum tanquam depressiorum locum moveatur, quoniam non ipse sed alius vicinus accedit propter continuam protrusionem, & si vel ipse accedat, tamen in loco frigido & ipse frigidus evadet.

## PROPOSITIO XVIII.

*Aëris tres regiones vulgo constituuntur, quarum media ea ponitur, in qua nix, pluvia, grando generatur: prima ea, in qua nos versamur, extendens se usque ad mediam. Tertia, qua à media termino supremo incipit & usque ad extimam aëris superficiem se extendit ad Ignem sublimarem usque, ut Aristotelici loquuntur.*

Media frigidior est quam prima & tertia, quae calidiores censentur: Tertia quidem, propterea quod subtiliores, igneas, & sulphureas exhalationum partes continet, quae ad illam supra aquearum particularum locum evolant, vel protunduntur, utpote leviores (Aristotelici calidam esse dicunt, propterea quod igneae sphaerae vicina sit); prima autem, quoniam radii Solis incidentes vicini ibi sunt reflexis, & sic calorem duplicant: accedit quod particulae ignis subterranei exhalantes quaedam in hac regione versantur. Media vero frigidior est, propterea quod neque reflexi radii incidentibus in Tellurem ibi vicini sunt, neque

que p  
nent, f  
aquea

Qu  
magis  
minori

via, m

Ca

in lo

rem,

denti

minu

Zona

res aq

teora

Cor

mam

soïdic

Q

stanti

tiam

santu

Et

la in

est,

elicia

Quo

gion

pauc

mus

Tellu

tium

à cer

tida

que particulas igneas & sulphureas multas continent, sed aqueas: quippe sulphureæ, & igneæ, quæ aqueas evexerunt, altius evolant.

## PROPOSITIO XIX.

*Quo locus Telluris à loco illo, cui Sol verticalis est, magis recedit ad polos, sive quo locus vicinior est poli, eo minori distantia à Tellure abest locus aëris, in quo pluvia, nix, grando generari incipiunt.*

Causa est, quod radii solis obliquius incidunt in loca circa polos, quam in loca circa Æquatorem, & ideo refracti multum abducuntur ab incidentibus, & sic minorem calorem efficiunt & ad minus spatium quam radii sub loco solis sive sub Zona Torrida, atque ideo in loco propiori vapores aquei poterunt coïre ad generanda aquea metœora.

*Corollarium.* Superficies terminans regionem primam aëris est ovalis, vel potius Elliptica sive sphæroïdica, protuberans in Zona Torrida.

## PROPOSITIO XX.

*Quo locus Telluris polo vicinior est, eo majori distantia abest à Tellure illa aëris regio qua incipit tertiam, sive in qua subtiliores & sulphurea particula versantur.*

Etenim pauciores sulphureæ & subtiles particule in parte atmosphæræ versantur, quo polo vicinior est, propterea quod calor Solis pauciores ex terra eliciat. Quoniam itaque pauciores ex terra eliciat. Quoniam itaque pauciores sunt particule tertiæ regionis sub Zona frigida, quam temperata, & in hac pauciores quam in torrida, & tamen terminus extremus regionis illius tertiæ æqualiter abest à centro Telluris juxta Propos. XVI, inde sequitur, quod initium illius regionis sub Zona Frigida longius abest à centro Telluris, quam initium illius in Zona Torrida & Temperata.

*Corol.*



*Corollarium.* Superficies terminans secundam aëris regionem, sive eam à tertia distinguens, est sphaeroidica, protuberans in Zona Frigida.


Hæc omnia adolescentibus per Diagrammata ostendenda sunt.

PROPOSITIO XXI.

*Radius Solis, Luna & reliquarum stellarum ex aëre per aërem ad oculos nostros non directe perveniunt, sed ubi ingrediuntur aërem, à directo itinere abducuntur vel deflectunt aliquantum, quod Optici vocant, refringi radios, atque ita radii refracti ad oculos nostros perveniunt, & stellam conspiciendam præbent.*


Subtilissima est doctrinæ opticæ pars, quæ de Luminis refractione agit. Experientia siquidem testatur, radios à quovis visibili vel corpore progressos, si ex uno medio incidant in aliud medium, quod vel densius vel subtilius sit priore, illos ubi hoc aliud medium ingressi sunt refringi, sive à directo itinere deflectere ad latera. Facilis est explicatio ex vulgari experimento. Sumatur vas aliquod, & fundo affigatur globus aureus vel cupreus, sive moneta aurea: Dein recede à vase, donec propter laterum vasis obstaculum non amplius videre possis monetam in fundo. Tunc infundatur in vas aqua; quo facto, iterum conspices in priori distantia monetam. Ex hoc itaque sequitur, cum à moneta nullus radius directe potuisset pervenire ad oculum propter interpositionem laterum vasis, & nihilominus post insulam aquam radii ad oculum perveniant, sequitur, inquam, ex hoc, quod radii à moneta progredientes ubi ex aqua in aërem ingrediuntur, deflectere vel refringi à directa via, & sic refractos ad oculum pervenire. Dicitur refractione, quia ob illam causam contus patte in aquam immersa apparet fractus.

Ita  
cie:  
Nullu  
nre p



Ita  
-oela  
sup  
radii  
nulla  
quam  
Atqui  
sunt in  
ad oculu  
te, qui

Ita sit centrum Telluris T, L oculus in superfi-  
cie : drsp superficies atmosphære vel aëris.  
Nullus itaque radius directe ad oculum L perve-  
nire potest, qui sit infra Lfg : alii enim inferiores



radii inciderent in tumorem terræ L o. Quare  
nulla stella directo radio apparere potest, ante-  
quam in lineam Horizontalem Lfg perveniat.  
Atqui stellæ prius apparent, nimirum dum adhuc  
sunt infra Lg, exempli gratia in S, & tamen ab S  
ad oculum L, nullus radius directe potest perve-  
nire, quia incideret prius in terram L o. Itaque necesse

P

esse

celle est, ut radius qui à stella  $S$  ad  $L$  oculum per-  
venit, non sit directus, sed aliquis refractus, nem-  
pe  $Lf$ , qui refractus ab incidente radio  $Sf$  propaga-  
tus, nimirum  $Sf$  ex æthere in crassius medium,  
nempe atmospheram in  $f$  incidens, refringitur & fit  
 $fL$ , cum directus esset in  $n$ . Et sic stella apparet,  
antequam revera apparere radio directo potest, hoc  
est, antequam in lineam Horizontalem  $Lfg$  per-  
veniat.

Sic stella in  $f$  existens non videtur per directum  
radium  $fL$ , sed per refractum  $rL$ , cujus incidens est  
 $fr$ , directus  $rm$ . Et ideo stella  $f$  apparet altior pro-  
pter refractionem, quam revera est, & in alio loco  
nimirum altus apparet arcu  $xg$ , sive angulo  $rLg$ ,  
quasi esset in  $x$ , cum sit revera in  $f$ .

Est enim hæc refractionum natura, ut radii ex ri-  
riori medio in densius incidentes ut ex æthere in  
aërem, refringantur vel declinent versus perpendi-  
cularem ductam per punctum incidentiæ ad superfi-  
ciem incidentiæ sive medii. Ex. gr.  $Sf$  radius incidit  
ex æthere in aërem:  $f$  est punctum incidentiæ,  $Tf$   
perpendicularis per  $f$  ducta ad superficiem  $d rfp$ .  
Itaque radius  $Sf$  refringetur versus  $fT$ , ut ex  $f$  a  
fiat  $fL$ .

Ita ex  $rm$  fit  $rL$ . Contrarium fit cum radii ex  
aqua in aërem egrediuntur. Tunc enim magis rece-  
dunt à perpendiculari dicta.

Deinde hæc quoque refractionum est natura, ut  
radii perpendiculariter incidentes superficiæ alte-  
rius medii non refringantur, sed tantum illi, qui  
oblique sive non perpendiculariter incident, &  
quidem eo magis refringuntur, quo minus perpen-  
diculariter incident, sive quo magis à perpendicu-  
lari abscedunt. Ita radii  $ST$ ,  $fT$ ,  $H dT$  non refrin-  
guntur, quia sunt perpendiculares in superficiem  
 $d rfp$ , sed radii  $Sf$ ,  $fr$ , refringuntur quia oblique  
incident, & quidem  $Sf$  magis quam  $fr$ .

Et

Ex  
testatu  
magis  
minus  
insens  
adepta  
admo

Atq  
thema  
ctionis  
nimir  
ratio i  
guli re  
lus inc  
gulus  
Itaque  
anguli  
ad sinu  
servati  
tionen  
tem re  
elevati

Ar  
qua pr  
stem u  
quam  
sunt,  
quam

Cau  
cata est  
sive ph  
Zembla  
diebus  
ret, ho  
sus esse

Ex quo sequitur id, quod experientia quoque testatur, quo stellæ Horizonti sunt viciniore, eo magis ipsarum radios refringi; quo altiores, eo minus. Et observarunt Astronomi, refractionem insensibilem esse, ubi stella altitudinem 20 graduum adepta est, non quod nulla sit refraction, sed quod admodum exigua.

Atque ex observationibus multis Optici & Mathematici recentiores derivarunt regulam refractionis, omnium radiorum oblique incidentium, nimirum quod in omni medio una & constans sit ratio inter sinum anguli incidentiæ & sinum anguli refracti: nempe angulus  $n f T$  dicitur angulus incidentiæ,  $L f T$  angulus refractus,  $n f L$  angulus refractionis: & sic in refractione radii  $f r m$ . Itaque quæ est ratio sinus anguli  $T f n$  ad sinum anguli  $T f L$ , eadem est ratio sinus anguli  $T r m$  ad sinum anguli  $T r L$ . Unde sequitur, si ex observatione constet quantitas refractionis ad elevationem unius radii, posse inde cognosci quantitatem refractionis pro omnibus aliis, aliis utcumque elevatis.

## PROPOSITIO XXII.

*Atmosfera sive aër facit, ut Sol & stella reliqua prius videantur, quam in Horizonte oriuntur, item ut videantur adhuc aliquantulo temporis, postquam occiderunt, item ut videantur altiores, quam sunt, & in alio cali loco, quamdiu non sunt altiores, quam 20 gradibus.*

Causa in præcedenti propositione satis explicata est: Experientias tantum quasdam addemus, sive phænomena naturalia. Cum Belgæ in Nova Zembla hybernarent, Sol illis apparuit sedecim diebus citius, quam revera in Horizonte existeret, hoc est, cum adhuc infra Horizontem depressus esset quatuor circiter gradibus, & quidem aère



sereno. Atque celebres Astronomi cum Tychone experti sunt, quod in nostris locis aëre matutino serenissimo existente, Solem conspiciamus elevatum supra Horizontem minutis 34, cum totus adhuc infra Horizontem est, ita tamen ut limbus Horizontem stringat. Et videtur Sol oriri, cum totidem circiter minutis 34 adhuc depressus est infra Horizontem, nimirum aëre serenissimo existente nostri loci.

Ita Spica Virginis, splendida stella, videtur nobis oriri, cum adhuc 32 minutis deprimitur infra Horizontem, quod inde colligitur, quia videtur oriri, cum cauda Leonis alta est 34 gr. 30 min. & in eadem plaga, in qua hæc stella Leonis tunc est. Atqui cauda Leonis & spica Virginis distant 35 gr. & 2. min.

#### PROPOSITIO XXIII.

*Quo aër seu atmosphaera pars, in quam radius stelle incidit, crassior est, eo majorem efficit refractionem, postea ceteris paribus, nempe eadem elevatione stella & eadem altitudine aëris.*

Ita angulus  $n f L$  (qui est & dicitur refraçtio) eo major est, si ve refractus  $f L$  eo magis accedit ad  $f T$ , quo atmosphaera crassior est. Ita Optici in omnibus mediõrum generibus verum esse deprehenderunt.

#### PROPOSITIO XXIV.

*Quo aër crassior est, eo magis stella infra Horizontem depressa est, cum primum apparere incipit.*

$L f$  est radius refractus qui primum apparere facit stellam:  $L f T$  angulus refractus. Et sit incidens radius  $S f n$ , & angulus incidentiæ  $n f T$ , erit refraçtio  $n f L$ .

Jam ponamus aërem  $f n L o$  esse crassiorem, quam est ubi refractionem  $n f L$  radii facit. Si itaque

que cr  
tem, n  
que it  
refraç  
vero  
mun

Qu  
fra Ho  
ris pat  
sitie)  
spicitu

Ete  
T f L  
erit a  
ad L  
cum  
posit.  
sinu  
titud  
angul  
tæ,  
qui si  
joren  
ut fa  
diagr

T 4  
T 4  
nor o  
majo  
hoc e  
jor q  
Quan  
n f L  
incie  
la eri

que

que crassior est, faciet angulum refractionis majorem, nempe  $c f L$ , & radius incidens erit  $K f c$ . Itaque stella existente in  $K$ , radius  $K f$  refringetur, ut refractus  $f L$  stellam conspiciendam præbeat. Aëre vero minus crasso existente, stella in  $S$  existente primum conspiciebatur.

## PROPOSITIO XXV.

*Quo aër est humilior, eo stella magis, depressa est infra Horizontem, cum primum apparere incipit (cæteris paribus, posita eadem aëris serenitate vel crassitie), sive eo diutius vel citius ante ortum suum conspiciatur.*

Etenim posito aëre humiliore, angulus refractus  $T f L$  erit major, ex. gr. si aëris altitudo sit  $T 4$ , erit angulus refractus (pro radio refracto primum ad  $L$  perveniente)  $T 4 L$ . Ducatur  $4 9$  parallela cum  $f n$ . Quoniam itaque est, ex hypothese Propositionis. XXI, ut sinus unius anguli refracti  $T f L$  ad sinum alterius refracti  $T 4 L$  (namque tantum altitudine non densitate differre ponuntur); ita sinus anguli incidentiæ  $n f T$  ad sinum anguli incidentiæ,  $3 4 T$  pro refracto  $4 L$  & incidente  $3 4 6$ . Atqui sinus anguli  $T 4 L$  ad sinum  $T 4 9$  habet majorem rationem, quam sinus  $T f L$  ad sinum  $T f n$ , ut facile demonstratur descripto ad hoc lemma diagrammate. Quare sinus anguli  $T 4 L$  ad sinum  $T 4 9$  habet majorem rationem, quam sinus idem  $T 4 L$  ad sinum  $T 4 3$ . Et ideo sinus  $T 4 9$  est minor quam sinus  $T 4 3$ . Et ideo angulus  $T 4 3$  est major angulo  $T 4 9$ , &  $3 4 L$  major quam  $9 4 L$ , hoc est quam  $n f T$  refractione: sinus  $T 4 L$  est major quam excessus sinus  $T f n$  supra sinum  $T f L$ . Quare angulus  $3 4 L$  est major quam angulus  $n f L$ , & ideo  $4 3$  protracta, nempe  $3 4 6$  radius incidens pro refracto  $4 L$ , cadet infra  $S f$ , & stella erit in  $6$ , ut faciat refractum radium  $4 L$ , atque

ideo depressa magis, quam cum in S, ubi altitudo aeris erat Lf.

PROPOSITIO XXVI.

*Eadem potest esse stella alicujus refractione ad eundem ejus situm, et si diversa sit aeris altitudo, si modo in densitate aeris sit differentia.*

Forma problematis rectius proponitur ita: *Data altitudine aeris & refractione, quam stella facit ad datam altitudinem, & data praeterea alia altitudine aeris, invenire hujus aeris densitatem sive proportionem refractionis talem ut ad datam stellae altitudinem eadem sit refractione, qua in prima altitudine aeris erat.* Ex. gr. in altitudine aeris T f, radius stellae S f facit angulum refractionis n f L. Si jam sit alia altitudo aeris T 4, & tamen stellae S in eodem situ radii incidentis 4 5 (qui propter ingentem distantiam quasi parallelus est cum S f) refractione 3 4 L sit aequalis refractioni n f L.

Quaeritur an hoc fieri possit, & si possit, utrum densior vel rarior esse debeat hic alter aer, & in qua proportione densitatis vel raritatis?

Respondeo, id fieri posse, & quidem si altera data altitudo aeris sit major quam prior T f, debet alterius hujus sive secundi aeris major esse densitas vel crassities: si vero altera data altitudo sit minor, ex. gr. T 4, debet hujus alterius crassities esse minor, sive raritas major. Quanta autem ea debeat esse raritas vel densitas, cognoscitur ita.

Invenitur prius angulus T 4 L (ex data T 4 & T L) item T f L. Dein sinus anguli T 4 L, item sinus anguli T 4 3 (qui est angulus incidentiae radii 3 4 6). Habetur igitur proportio densitatis hujus aeris vel raritatis ad rationem aetheris, ex quo radius incidens venit. Eodem modo sinus anguli T f n & T f L sumantur, sic sinus hi indicabunt prioris aeris raritatis proportionem ad raritatem

ritate  
num  
rudin  
quan  
Pro  
aio,  
cider  
diou

Si  
teriu  
infra  
cipien  
H  
man  
ea,  
mili  
dx,  
diuc  
rior  
fra F  
long  
rum  
ante  
na T  
in Z  
ortu  
pos

S  
rius  
vide  
infra  
iam  
pres

ritatem ætheris. Ex comparatione harum rationum innotescet, quanto posterior aër minoris altitudinis debeat esse rarior vel minoris crassitiei quam prioris.

Proprie tamen loquendo non est eadem refractionis, quia eadem refractionis intelligitur, si radii incidentes æqualiter elevati sint super superficies mediorum.

### PROPOSITIO XXVII.

*Si unius loci aër sit & crassior & humilior, quam alterius loci aër, Sol & reliqua stella magis depressa erunt infra Horizontem prioris loci, cum primum apparere incipient, quam in secundo loco.*

Hujus Propositionis ex præced. xxv & xxvi manifesta est demonstratio. Sequitur quoque ex ea, si in locis Zona frigidæ aër sit & crassior & humilior, quam in locis Temperata Zona & Torrida, Solem in illis locis longe citius ante ortum & diutius post occasum videri posse, quam in posterioribus locis. Etenim cum magis depressus sit infra Horizontem, & præterea multo obliquius & longiori tempore ascendat ad Horizontem illorum locorum, inde sequitur, quod longe citius ante ortum videatur in Zona frigida quam in Zona Torrida. Sed dubium est, an aër sit humilior in Zona frigida, & licet Sol citius videatur ante ortum, annon sola crassities aëris sufficiat, de qua postea.

### PROPOSITIO XXVIII.

Si unius loci aër sit crassior & altior, quam alterius loci, potest is esse excessus crassitiei, ut non videant stellas ante ortum tanta in depressione infra Horizontem, quam in altero aëre: potest etiam talis esse excessus crassitiei, ut in eadem depressione stellas incipiant conspiciere: denique tan-



tus potest esse excessus crassitiei, ut stellas in multo majori depressione infra Horizontem conspiciant, quam in altero aëre.

Imo crassities longe majorem potest hic inducere depressionem, quam aëris humilitas. Et pro refractionibus in Nova Zembla altitudo insignis aëris, cum crassitie requiritur.

### PROPOSITIO XXIX.

*Fieri nequit, ut stella alicujus in duabus altitudinibus refractiones in uno aëre sint aequales ejusdem stellæ in eisdem altitudinibus existentis refractionibus in alio aëre qui altior sit, vel humilior, sive crassior vel subtilior.*

In præcedenti propositione monstravimus, si in altitudine aëris  $Tf$ , radius incidens  $Sfn$  faciat refractionem  $nfl$ , posse in alia altitudine aëris nempe  $T_4$  radium  $S_4$  (qui parallelus est cum  $Sf$  propter ingentem distantiam, & sunt radii ab uno puncto) facere eandem refractionem  $3_4L$ , quæ æqualis sit refractioni  $ncL$ , nimirum si aër  $4oLw$  sit minus crassus, quam  $foLd$ . Jam itaque quaeritur, an hoc quoque in duabus stellæ altitudinibus fieri possit, exempli causa, posito, quod in situ stellæ  $S$ , aër  $foLd$ , & aër  $foLw$ , ita se habuerint, ut fecerint æqualem refractionem: an in alia altitudine stellæ, ex. gr. in  $f$ , in eisdem atmosphaeris  $frdLo$ ,  $4wLo$  possit iterum æqualis esse refraçtio sive eadem  $mcL$ . Et dico quod id fieri non possit.

Sit enim centro  $T$  intervallo alterius altitudinis aëris  $T_4$  descripta peripheria sive superficies hujus aëris, secans  $Lr$  in  $3$ . Erit  $3L$  radius refractus in altero hoc aëre, per quem stella  $f$  videtur. Debet enim radius  $3L$  idem esse cum  $rL$  propterea quod eadem ponitur stellæ  $f$  apparens altitudo  $xg$ , vel angulus  $rLf$ . Porro pro hoc refracto incidens

cidens  
paralle  
qualis  
erit an  
lus r

Est  
nus v

Et  
ad fin

Et  
est xq  
m r.

Ha  
cilior  
loco p  
specte  
fiet m

Ob  
duabus  
ru &  
fracti

Re  
servat  
lo cog  
nes si

Si  
prob

De  
Sf ej

De  
Ita

datu

L f,  
stella

n f L

cidens radius per  $3$  ducatur  $73w$ , quæ quidem parallela erit cum  $sr m$ , si refractione  $L3w$  esset æqualis refractioni  $L1m$ . etenim ducatur etiam  $T3$ , erit angulus  $T3w$  angulus incidentiæ,  $T1L$  angulus refractus,  $w3L$  refractione.

Est itaque ut sinus  $34T$  ad sinum  $L4T$ , ita sinus  $w3T$  ad sinum  $L3T$ .

Et ut sinus  $n f T$  ad sinum  $L f T$ , ita sinus  $m r T$  ad sinum  $L r T$ .

Et vero  $34L$  est æqualis  $n f L$ . Quare  $w3L$  non est æqualis  $m r L$ : sive  $w3$  non est parallela cum  $m r$ .

Hæc autem consequentia operosior & difficiliorem requirit Demonstrationem, quam ut hoc loco proponi possit, cum ad Geometriam potius spectet: Ex sequentis tamen propositionis analyfi fiet manifesta.

### PROPOSITIO XXX.

*Observatis duabus refractionibus stellæ alicujus in duabus altitudinibus, invenire inde & altitudinem æris & crassitiam æris respectu ætheris, sive regulam refractionis in isto aère.*

Refractione stellæ est æqualis differentiæ inter observatam ejus altitudinem & veram quæ ex calculo cognoscitur, & ideo facile est observare refractiones stellarum. Jam ad ipsum propositum.

Si Geometricè hoc solvendum sit, reducitur ad problema hoc:

Dentur nimirum stellæ in  $S$  existentis & radium  $Sf$  ejaculantis refractione  $n f L$ .

Deinde in altitudine  $sg$  ejusdem refractione  $m r L$ .

Itaque in circulo  $d r f p d$ , cujus centrum  $T$ , datur  $TL$  (semidiameter terræ) & ductis  $T r$ ,  $T f$ ,  $L f$ ,  $L r$ , dentur anguli  $TL f$ ,  $TL r$  (ex altitudine stellæ &  $90$  min. compositus), & dantur anguli  $n f L$ ,  $m r L$ , & scimus præterea, quod eadem sit

ratio sinus anguli  $n f T$  ad sinum  $L f T$ , quæ est ratio sinus  $m r T$  ad sinum  $L r T$ . Ex hisce inveniendâ est semidiameter circuli  $T f$  vel  $T r$ , & præterea ratio sinus  $n f T$  ad sinum  $L f T$ , sive inveniendus est angulus  $T f L$ . sic enim illa ratio sinuum simul nota erit.

Id quidem inveniri posse, docet analysis, sed difficillima solutione, ita ut Synthesis non possit fieri sine multis propositionibus præmissis instar Lemmatum, quod hoc loco omnino alienum est. Afferamus tamen analysis, tum ut problema hoc determinatum esse ostendamus, tum ut præcedentis Propositionis veritas simul confirmetur.

$TL$  sit  $f$

Sinus anguli recti $TLf$ f. b	Quæramus angulum $L f T$ , quia
Sinus $TLr$ f. c	hunc postquam nati sumus, etiam
Sinus $n f L$ f. d	$T f$ & reliqua innoscant.
Sinus Complem. f. g	
Sinus $m r L$ f. h	
Sinus Complem.	
Sinus $L f T$ f. a	

Est itaque in Triang.  $f L T$ .

Ut sinus  $L f T$  ad sinum  $T L f$  ita  $TL$  ad  $T f$ .

Ut  $a$  ad  $b$  ita  $f$  ad  $\frac{b f}{a}$ .

Et quia datur utriusque anguli  $T f L$ ,  $L f n$  sinus, dabitur etiam sinus totius anguli  $n f T$ , nimirum si multiplicetur alternatim sinus unius anguli in sinum complementi alterius, & productorum aggregatum dividatur per radium  $b$ . Est itaque sinus anguli  $n f T$ ,  $\frac{ha rdb - dr (bb-aa)}{f}$

Dein in Triangulo  $T L r$ , nota jam sunt  $T r$ ,  $TL$ , sinus  $T L r$ .

Itaque ut  $T r$  ad  $TL$  ita sinus  $T L r$  ad sinum  $T r L$ .

Ut

Ut  $\frac{b}{a}$  ad  $f$  ita ad  $\frac{c}{b}$  pro sinu TrL.

Atqui datur etiam sinus m r L : itaque invenietur juxta priorem regulam sinus totius m r T, nempe, si,  $gf + \frac{kca}{bf} - \left( \frac{ggffbb - ggccaa}{bbff} \right)$  sive si  $\frac{ka}{b}$  xqualis sit m, &  $\frac{ggcc}{bb}$  sit n n. erit sinus illo  $g + \frac{ma}{f} - \sqrt{\left( \frac{ggff - nnaa}{ff} \right)}$ .

Habemus itaque sinus quatuor angulorum LfT, n f T, L r T, m r T : hocce autem proportionales esse novimus. Itaque erit

Ut sinus TfL ad sinum Tfn, ita sinus TrL ad sinum Trm.

Ut a ad  $\frac{ha + db - d\sqrt{(bb-aa)}}{f}$  ita  $\frac{c}{b}$  ad  $g + \frac{ma}{f} - \sqrt{\left( \frac{ggff - nnaa}{ff} \right)}$ .

Et ideo ut b ad c ita  $ha + db - d\sqrt{(bb-aa)}$  ad  $gf + ma - \sqrt{(ggff - nnaa)}$

Et  $-bgf + cdb - bma + cha + b\sqrt{(ggff - nnaa)}$  æqu.  $+ d\sqrt{(bb - aa)}$ .

Pro  $-bgf + cdb$  sume p, & pro  $-bma + cha$  pone qqa.

$$\begin{aligned} & \text{Et } -p - qaa - 2pqqa \\ & + bbgff - bbnaa \\ & + ccddb - ccdaa \end{aligned}$$

$$\text{æqu. 2. } \left\{ \begin{array}{l} bbgffccddb - bbgffccdaa \\ - ccddbnaa \end{array} \right. + bbnaa \left. \right\}$$

Et facta divisione per 2p, & substitutis aliis signis, erit.

$$\begin{aligned} & r - taa + qqa \text{ æqu. } \sqrt{(x - yaa + 22a)} \\ & \text{Et } r + taa + qaa \quad + 2. rqa \text{ æqu. } x - yaa + 22a \\ & - 2. rqa - 2rtaa \end{aligned}$$



Et facta iterum divisione per  $tt - \mathcal{D}\mathcal{D}$ , & substituti

aliis signis erit  $a - \beta a - \theta\theta a a + \omega\omega a$  æqu.  $\gamma$ .

Ex hac æquatione patet, problema determinatum esse, & ipsam  $a$ , hoc est sinum anguli  $TfL$ , posse invenire tam per Geometriam quam Arithmeticam analyticam Vietæ: vel etiam facilius, si divisione possit æquatio ad minorem potestatem redigi: Ex hoc itaque colligitur, duas refractiones sufficere ad inveniendam aëris  $Tf$  altitudinem & ipsam proportionis regulam: quod ideo moneo, quia Keplerum video in Epitome Astronomiæ, pag. 65, tres requirere refractiones, etsi ipse hanc viam non tentaverit.

*Etsi autem ita est ostensum, solutionem problematis haberi posse tam per Geometriam quam Arithmeticam, tamen quia utraque admodum operosa & difficilis est, præsertim Geographiæ studiosis, quorum plerique ista non capiunt, ideo in illorum gratiam monstrabimus aliam methodum, qua problema facilius quidem absolvatur, etsi minus Mathematica sit, nimirum per regulam positionis. Assumatur itaque  $Tf$  in certa mensura ad  $TL$ .*

Itaque in Triangulo  $fLT$  ex  $fT$ ,  $TL$ ,  $TLf$ , inveniatur angulus  $TfL$ . Ita in Triangulo  $TLr$  ex  $Tr$ ,  $TL$ ,  $TLr$ , inveniatur angulus  $TrL$ .

Sumantur deinde sinus angulorum  $TfL$ ,  $Tfn$ ,  $TrL$ ,  $Trm$ . Item ad sinus  $TfL$ ,  $Tfn$ ,  $TrL$  sumatur quarta proportionalis. Si itaque sinus  $Trm$  sit æqualis quartæ huic proportionali: tunc assumpta magnitudo seu altitudo aëris  $Tf$  erit vera & legitima: si vero sinus  $Trm$  sit major quam quarta illa proportionalis, erit  $Tf$  minor assumenda; si minor, tunc major assumenda: atque hoc eousque faciendum erit, donec sinus  $Trm$  inventus æqualis sit inventæ quartæ proportionali.

E X E M P L U M.

Spica Virginis & qualibet alia stella, five Sol, ponatur in Horizonte Lf conspici, cum adhuc 40 32 minutis depressa est, nempe in S. Itaque refractio n f L est 32.

Deinde cum eadem stella vel Sol habet altitudinem gx apparentem 1 gr. 22 min. five veram gf. 1 gr. tunc refractio L r m deprehenditur 22 min.

Semidiameter TL est 860. mill. Germ. ponatur esse 10000, & altitudinem of ponamus esse talium partium S, nempe  $\frac{1}{20000}$  five  $\frac{1}{20000}$  rotius semidiametri TL, hoc est,  $\frac{1}{8}$  circiter unius milliaris.)

Itaque in Triangulo TLf, assumto sinu toto 10000000.

Ut fT ad TL, ita sinus illi TLf ad sinum TfL. 2001 - 2000 - 10000000 - 9995992. sinus 88 gr. 22 min. 40 sec.

Itaque Tfn est 88 gr. 54. min. 40. sec. cujus sinus 9998200.

Rursus in Triangulo TrL.

Ut Tr ad TL ita sinus anguli Tlr ad sinum TrL. 2001 2000 9997155 9992159. sinus 87 gr. 43 min. 40 sec.

Ergo Trm est 88 gr. 5 gr. 40 min. cujus sinus 9994500.

Inveniatur jam ad sinus TfL, Tfn, TrL quarta proportionalis, nempe

TfL                  Tfn                  TrL.

Ut 9995992 ad 9998200, ita 9992159 ad 9994366.

Cum hoc quarto numero comparatur sinus anguli Trm, qui est 9994500.

Deprehendimus itaque quod hic sinus sit quarta illi fere æqualis, & ideo altitudinem æris assumtam ( $\frac{1}{8}$  unius milliaris) non multum à vera

discrepare. Si tamen accuratius eam habere cupis, assumere potes aliam altitudinem atque eodem modo operari, donec sinus  $Tm$  magis æqualis sit quartæ isti proportionali: vel etiam regulam Falsi adhibere, sive ex duarum positionum defectu colligere veram altitudinem, quantum id licet. Nam omnino accuratam non licet invenire, propterea quod sinus in minimis numeris admodum variant, etsi vel dimidii minuti saltem vitium fuerit. Præterea Canon sinuum debet esse accuratissimus.

Concludimus itaque quod altitudo æris sit bis millesima pars circiter semidiametri Telluris: est autem semidiameter hæc perticarum 1633190, itaque altitudo æris est 816 perticarum, qualium una continet 12 pedes Rhinlandicos: sed rectius assumitur dimidium milliare Germanicum, quia refraçtio  $Lfn$  à Tychone observata est major, quam nos sumimus, & sumi potest 36, imo 48 quo posito, altitudo æris non minor erit quam unum milliare.

*Cognita jam altitudine æris, simul quoque habetur ratio densitatis vel crassitiei æris ad crassitiem vel subtilitatem ætheris, sive regula refractionis in isto aère, qui nempe tales refractiones & fecit ad tales stellæ situs: nimirum ratio sinus  $TfL$  ad sinum  $Tfn$  antea inventa, est quaesita ratio.*

Ut, 9995992 ad 9998200. Atque quod refractiones hæc tam parvæ sunt, causa est, quoniam ærem serenissimum sumimus, qui non adeo multum ab æthere differt in raritate, ut quidam sibi imaginantur.

Porro an inventa altitudo æris eadem sit ubique & in omni tempore, id cognoscetur, si ex duabus refractionibus ad duas stellæ altitudines in alio aère & alio tempore observatis calculetur altitudo æris eodem modo, ut jam fecimus.

Atque

Atque ut horum Naturæ secretum studiosi habeant, in quo calculum exercere & periculum ejus rei (an eadem sit ubique & omni tempore altitudo) facere possint, dabo ipsis hic exempla ex observationibus Tychonis, qui Solis & Lunæ refractiones observavit ad singulos altitudinis eorum gradus. & quia Lansbergii observationes (quia in diverso aëre observavit, si modo observavit) à Tychonianis discrepant, illas quoque addam.

TABULA REFRACTIONUM.

Gradus altitudinis.	Refra-ctio Solis juxta Ty-chonem.	Refra-ctio Lu-næ juxta Tychonē.	Refra-ctio So-lis & Lunæ juxta Lans-berg.
<i>gradus</i>	<i>minuta I.</i>	<i>minuta I.</i>	<i>minuta I. II.</i>
0	34	33	34.
1	25	25	26.
2	20	20	21.
3	17	17	18.
4	15	15	15. 45.
5	14	14	14. 0.
6	13	14	12. 30.
7	12	13	11. 15.
8	11	12	10. 5.
9	10	11	9. 5.
10	10	11	8. 15.
11	9	10	7. 35.
12	9	10	7. 5.
13	8	9	6. 40.
14	8	8	6. 19.
15	7	8	6. 0.
16	7	7	5. 42.

Gradus



Gradus altitudi- nis.	Refra- ctio Solis juxta Ty- chonem.	Refra- ctio Lu- nae juxta Tychonē.	Refractio So- lis & Lunae juxta Laus- berg.
gradus	minuta I.	minuta I.	minuta I. II.
17	6	7	5. 24.
18	6	6	5. 7.
19	5	6	4. 50.
20	4	5	4. 33.
21	4	4	4. 16.
22	3	3	4. 0.
23	3	3	3. 44.
24	3	3	3. 28.
25	2	2	3. 12.
26	2	2	2. 56.
27	2	2	2. 40.
28	2	2	2. 24.
29	2	2	2. 9.
30	1	1	1. 54.
31	1	1	1. 39.
32	1	1	1. 24.
33	1	1	1. 9.
34	1	1	0. 55.
35	1	1	0. 41.
36	1	1	0. 27.
37	0	1	0. 13.
38	0	1	0. 0.

Lansbergius easdem ponit tam Solis quam Lunae refractiones: Tycho autem aliquantulum diversas, nimirum circa Horizontem facit Solis refractiones majores quam Lunae, dein ad gra-  
dum

dum a  
Lunae  
ribus.  
debili-  
Tycho  
glicer  
in cal  
dum  
fractio  
nimir  
refrac  
jus ca  
Belga  
Solera  
quatu  
mum  
30 m  
De  
tem  
Hori  
Itaq  
Hori  
11 m  
niet  
aëris  
pore  
to m  
rum  
maj  
doco  
pos  
4 gr  
nor  
itaq  
nau  
plu  
tum

dum altitudinis quintum facit æquales ab hoc, dein Lunæ refractiones facit aliquantulum majores solaribus. Hujus sane causam fateor me ignorare, nisi debilitati Lunaris luminis ascribenda sit. Præterea Tycho omisit secunda minuta, quæ tamen non negligenda sunt, si ad 60 prope accedant, quoniam in calculo altitudinis æris eorum usus est. Sciendum autem est, omnium stellarum easdem esse refractiones, vel insensibilem saltem esse differentiam, nimirum in uno aëre, sed si aër sit crassior, erunt refractiones majores. Cujus exemplum sit hoc (cujus causa à nemine hætenus sufficienter data est). Belgæ in Nova Zembla hybernantes conspexerunt Solem post aliquot mensium noctem, cum adhuc quatuor gradibus infra Horizontem esset ad minimum Solis limbus. Itaque refraçtio n f L est 4 gr. 30 min.

Dein cum depressus esset adhuc infra Horizontem 3 gr. 45 min. viderunt eum elevatum supra Horizontem 30 gr. (nimirum superior limbus). Itaque refraçtio m r L (concipiamus m r f infra Horizontem cadere, & r L g esse 30 min.) erit 4 gr. 11 min. & L L T 90 gr. 30 min. Ex hisce invenitur altitudo æris L f, & ratio densitatis illius æris Novæ Zemblæ, qui tamen serenus fuit tempore observationis. Invenitur autem altitudo multo major, quam alia refractiones patiuntur, nimirum duorum fere milliarium, neque positione majoris crassitiei æris corrigitur, (ut seq. propos. docebitur) propterea quod angulus T f L non possit esse major quam 85 gr. 30 min. (si n f L est 4 gr. 30 min.): fit autem major si d f ponitur minor quam duorum milliarium. Non immerito itaque dubitare possemus de fide annotationis nautarum, quandoquidem nullum simile exemplum observatum sit: imo contrarium observatum est in eodem loco. Vide xxvi caput Propof.

in

in fine: præterea nulla causa dari potest, ut in illis locis post tam longam solis absentiam aër sit altior, quam eo tempore, quo post tam longam moram Sol discedebat; cum potius contrarium sequitur, nimirum aërem factum & crassiores, & humiliorum (propter contractionem) si quis velit urgere, aëris altitudinem esse inconstantem. Hæc tamen cum accuratius pensito, tria mihi incidunt, quibus salvari possit apparentia illa & ingens refraction (namque cum nauclerus fuerit peritus rei Astronomicæ & præterea sequentibus diebus quoque Solem viderint elevatum supra Horizontem, quo adhuc depressus erat, ideo non licet ipsam observationem negare. Neque de errore in dierum numeratione propter longam illam noctem suspicari debemus, quandoquidem ad populares suos redentes numerabant eundem diem anni quam populares, quod sane non contigisset, si prius dierum falsum numerum adhibuissent). Etenim si tantam altitudinem aëris velimus admittere, qualem refractiones in Zona Temperata & Torrida non patiuntur, dicendum erit, quod aër quidem sit ubique ejusdem altitudinis tam in Torrida & Temperata, quam Frigida, sed in Torrida & Temperata superiorem aeris regionem ita subtilem esse ut non faciat refractionem, sed tantum media regio: unde nil mirum, si refractiones in Zona Torrida & Temperata sint minores; namque etsi humilior sit aër, qui eas facit (ob quam causam debebat major esse refraction), tamen multo magis rariorem esse altero aëre. Sed contra hoc objici posset, Nautarum observationem factam esse aëre sereno, ut ipsi testantur. Ad hoc respondeo, non tamen verisimile videri, ita subtilem fuisse aërem, sicut in Zona Torrida & Temperata cælo serenissimo existente. Secundo dici potest, aërem illum Zone frigidæ, cum Sol post

post e  
in su  
paulc  
fracti  
trum  
mit f  
sic su  
Nequ  
quan  
initia  
tiam  
ram  
porib  
confi  
place  
etiam  
Zon  
si, i  
catic  
in lo  
tiore  
simu  
nuit  
mul  
altit  
bus  
nem  
pro  
ren  
ribu  
mar  
spex  
caus  
quo  
159  
noë  
unc

post diuturnam absentiam redit ad illum, primo in superiori regione attenuari, mediam adhuc paulo crassiorem esse, & ideo Solem per duas refractiones visum esse, sicut stellas per aërem & vitrum: duplex autem refractione multo magis deprimat stellam infra Horizontem quam simplex, & sic sufficiet aëris altitudo unius miliaris vel  $\frac{1}{2}$ . Neque hic objicias, cur non idem fiat eo tempore quando Sol discedit ab illo aëre & longæ noctis initium facit. Tunc enim minorem esse differentiam in aëris crassitie propter longam Solis motam est verisimile. Vel dicemus, matutinis temporibus in illa Zona post longam illam absentiam consistere crassiorem exhalationem. Tertio, si non placeat duplicem refractionem admittere, neque etiam concedere velis, partem supremam aëris in Zona Torrida & Frigida non facere refractionem, si, inquam, duæ præmissæ responsiones vel explanationes non placeant, tunc fatendum est, aërem in loco illò Zonæ frigida: tunc temporis multo altiore fuisse quam in Zona Temperata nostra, & simul multo crassiorem (sola quippe altitudo minuit refractionem); sed magna crassities si adsit, multo magis augetur ab hac refractione, quam ab altitudine decrescente minuitur. Sed mihi ex tribus hisce causis placet prima, quæ ponit altitudinem aëris duorum miliarium (namque non licet pro refractione Horizontali 4 gr. 30 min. minorem statuere in Nova Zembla): reliquæ duæ pluribus urgentur difficultatibus. Cur autem eadem manente altitudine non tot diebus Solem conspexerint postquam oriri desit, die 3 Novembr. causam dixi esse differentiam crassitiei aëris. Ita quoque respondendum est, cur Belgæ iidem anno 1596 die 30 Maii non conspexerint Solem media nocte sub elevat. 69 gr. 24 min. cum tamen ne uno quidem gradu sub Horizonte existeret: cur



hic non effecerit refractionem, causa eadem esse potest. Sed nimis multa de hoc negotio, quam prolixitatem difficultati doctrinae ascribant lectores. Ad accuratam hujus rei cognitionem requiruntur observationes accuratissimae. Neque tamen, si observationes instituta ad diversas ejusdem stellae in eodem loco elevationes non efficiant eandem altitudinem, ideo asserendum est diversas esse ejus altitudines. Causa quippe esse potest diversitas raritatis aëris, nimirum quo Horizonti propior, eo minus rarus. Hoc si ita sit, observationes eandem altitudinem nequaquam producent, etsi eadem sit; quoniam in calculo supponitur, eandem esse in utraque parte aëris raritatem & ideo eandem regulam refractionis.

PROPOSITIO XXX.

*Data depressione stellae infra Horizontem, cum primo apparere incipit (hoc est, data stellae refractione Horizontali), invenire minimam, qua esse possit, altitudinem aëris illius: aëris crassitiam pro tali refractione, & maximum, qui esse potest, excessum densitatis illius aëris super densitatem aetheris, hoc est regulam maximam qua esse potest refractionis. Item generalius: Data stellae refractione ad datam ejus apparentem altitudinem supra Horizontem, invenire minimam qua esse potest altitudinem.*

Sit data refractione Horizontalis  $n f L$ , sive depressio stellae infra Horizontem  $g f s$  vel  $g L s$ , cum primo apparere incipit, qualis fuit in Nova Zembla 4 gr. 30 min. Constat itaque ex opticis, si radius  $s f$  tangat aërem in  $f$ , hoc est, si angulus  $S f \infty$  vel  $n f T$  sit rectus, tunc quidem radium illum non refringi, si vero stella consistat infra tangentem in  $n$ , tunc nullum radium ad  $f$  accedere potest (immediate). Itaque requiritur, ut stella supra tangentem illam consistat, & angulus  $S f \infty$  vel

vel  $n f T$  sit minor recto sive quam  $90$ . Ponatur itaque esse  $89$  gr.  $59$  min. (vel ponatur  $90$ ) utcumque magnus, modo non major sit quam  $90$ . Porro auferatur ab  $n f T$  angulus datus sive refractione Horizontalis  $4$  gr.  $30$  min. Relinquitur angulus  $T f L$ ,  $85$  gr.  $29$  min. maximus qui esse potest. Unde si fiat, ut sinus  $T f L$  ad sinum totum  $f L T$ , ita  $L T$  ad  $T f$ . Et inventa  $T f$  erit minima, quæ esse potest altitudo aëris. Quoniam enim sinus  $T f L$  est maximus qui esse potest, erit quarta proportionalis  $T f$ , minima quæ esse potest si medii termini, nempe sinus totus  $T L f$  &  $T L$ , maneat iidem. Si non refractione ad apparentem radium Horizontalem  $T f$  detur, sed ad altitudinem stellæ  $x L g$ : agemus eodem modo, in  $\Delta$ ,  $t L r T$ .

Item ratio sinus anguli  $n f L$   $89$  gr.  $59$  min. ad sinum  $T f L$ ,  $85$  gr.  $29$  min. erit maxima, quæ esse potest, ratio densitatis aëris ad densitatem ætheris.

### PROPOSITIO XXXI.

*Data altitudine aëris & una refractione stella in eo ad certam ejus altitudinem, invenire ex eo regulam refractionis, sive proportionem sinuum angulorum incidentia ad angulos refractos, sive crassitiam illius aëris pro data refractione ad datam altitudinem.*

Debet autem data altitudo aëris esse major ea, quæ juxta præcedentem Propositionem invenitur minima esse. Si enim major non sit, signum est refractionem non recte esse observatam, & problema est impossibile. Sit itaque major illa,  $T r$  data. Ex. gr. ad apparentem altitudinem  $x L g$  sit cognita refractione in  $r L$ . Itaque in Triangulo  $T L v$  datur  $T r$ ,  $T L$ , & angulus  $T L v$ : ex hisce invenitur angulus  $T r f$ , refractus, cui si addatur  $m r L$ , habebitur angulus incidentiæ  $m r T$ , & ratio si-

nus

nus  $m r T$  ad sinum  $L r T$  inveniatur: hæc erit regula refractionis in isto aëre, sive ratio crassitici ejus ad densitatem ætheris.

PROPOSITIO XXXII.

*Data altitudine aëris & refractione ad unam stellæ altitudinem, invenire refractionem in alia stellæ altitudine.*

Exempl. gr. detur altitudo aëris  $Tf$  vel  $Tv$ , & refractionis  $nfL$  ad apparentem altitudinem  $o$ , nempe radius Horizontalis  $fL$  est ipse refractus. Dein detur altitudo stellæ appatens  $rLg$  vel  $xLg$ . Inveniatur per præced. Propos. regula refractionis, sive ratio sinus  $nfT$ ,  $TfL$ , sive sinus  $nfT$ ,  $TfL$ . Dein in Triangulo  $TrL$  ex notis  $Tr$ ,  $TL$ , & angulo  $rLT$  inveniatur angulus  $TrL$ . Et ut sinus  $TfL$  ad sinum  $Tfn$  ita sit  $TrL$  ad alium sinum, qui erit ipsius anguli  $m r T$ : à quo si auferatur  $Trf$ , relinquatur refractionis  $m r L$  quaesita.

Veteres optici longe alia & intricata magis sed tamen falsa methodo agebant.

PROPOSITIO XXXIII.

*Data aëris altitudine & regula refractionis, invenire refractionem ad datam stellæ altitudinem apparentem, & inde veram altitudinem.*

Hoc idem est cum priori, quia in priori ex data refractione ad datam altitudinem invenienda erat illa regula refractionis. Exempla pro exercitio ex Tabula antea posita desumi possunt.

*De Reflexione luminis in Aëre.*

PROPOSITIO XXXIV.

*Radix Solis & Luna in aërem seu atmosphæram ingressi non tantum refringuntur, sed etiam à particulis aëris reflectuntur vel reverentuntur tanquam ex speculo*

culo  
tum.

Etenim  
æther  
lucida  
confit  
non et  
lis. Qu  
sphaera  
flexio  
luminis

Re  
cipua  
occaf  
Ma  
enim  
dente  
sic O  
Sole  
rem  
& ad  
nostr

Cr  
talis  
decim  
& cr  
in O  
est o  
press

H  
vati  
hora  
ocul

de

*culo aspero propter particularum inordinatum situm.*

Etenim nisi à particulis aëris radii solares reflecterent ad oculos nostros, nulla pars aëris nobis lucida apparet, præterquam ea, supra quam Sol consistit, & sic Sole in parte Orientali constituto non esset lucidus aër meridianus neque Occidentalis. Quidam ergo radii refracti transeunt per atmosphæram, quidam reflectuntur hinc inde multis reflexionibus ab una particula ad aliam & sic aërem luminosum efficiunt.

PROPOSITIO XXXV.

*Reflexio radiorum solarium à particulis aëris est præcipua causa crepusculi, hoc est lucis ante ortum & post occasum solis.*

Manifestum est ex præced. Propositione. Sicut enim Sole existente in Oriente radii ejus ad Occidentem ejaculati reflectunt ad oculos nostros, & sic Occidentalem partem conspicuam faciunt, ita Sole infra Horizontem existente radii ejus in aërem nostrum missi reflectuntur ad oculos nostros & ad ipsum Occidentem & ab Occidente ad oculos nostros.

PROPOSITIO XXXVI.

*Crepusculi matutini initium fitus, hoc est, aër Orientalis illuminatus vel albicans conspicitur, cum Sol octodecim circiter gradibus infra Horizontem depressus est: & crepusculi vespertini finis est, (hoc est, nulla amplius in Occidentali aëre apparet illuminatio) cum Sol octodecim gradibus infra Horizontem Occidentalem depressus est.*

Hæc propositio experientiz innititur & observationi. Etenim si matutino tempore (hoc est post horam primam à media nocte vel secundam) oculis ad Orientem conversus diligenter observemus,




venus, quando aliquis albicans color in aëre Orientali circa Horizontem sese ostendat, atque ad id tempus horam & minuta horæ sciamus, possumus inde scire depressionem Solis infra Horizontem.

Intelligimus autem aërem serenum, cujus cum magna sit, vel esse possit differentia, inde factum est, ut alii ad vigesimum gradum depressionis Solis infra Horizontem crepusculum extendant, alii tantum ad decimum sextum. Etenim quò aër crassior est, eo minus sentitur crepusculi lux, contra quam in refractione fieri diximus.

PROPOSITIO XXXVII.

Ex crepusculi quantitate non potest inveniri altitudo aëris vel materia, qua crepusculi lucem per reflexionem creat, ut hactenus existimarunt, neque crepusculi initium à simplici, sed ad minimum duplici reflexione oritur.



Sit, T L h Tellus, g f o m terminus aëris. L locus telluris in quo apparet crepusculum, sive lux

in aëre  
flexus  
lunt i  
pulsul  
qui f  
& qui  
quam  
ideo  
xempl  
ejus r  
lunt ta  
esse a  
prehen  
depres  
162, &  
inveni  
altitud  
nius f  
millia

Hæc  
denda  
autem  
fit ex f  
radiun  
ipso so  
reflexio  
dio g l  
quam i  
le prov  
præstar  
Occide  
lis, cu  
ctum  
perven  
o, & f  
te f m  
& hic g

in aëre Horizontalis: & ideo  $fL$  est radius reflexus ab aëre  $f$ , incidens radius Solaris  $fgf$ . Volunt itaque Mathematici, qui hactenus de crepusculis scripserunt, radium incidentem in  $f$ , qui facit reflexum  $fL$ , provenire ab ipso Sole  $f$ , & quia nullus radius ad  $f$  à Sole provenire potest, quamdiu Sol infra Tangentem  $f h f$  consistit, ideo cum Sol accesserit in Tangentem  $f h f$  exempl. gr. in  $S$ , tunc primum potest ad  $f$  pervenire ejus radius, vel quia reflexionem ex  $f$  fieri volunt tanquam ex speculo cavo, ideo  $Tf h$  debet esse æqualis angulo  $TfL$ : Quoniam itaque apprehenditur Sol gradibus 18 infra Horizontem depressus, ideo angulus  $nff$  erit 18 gr. &  $Lfh$  162, &  $Tfh$  vel  $TfL$  81 gr. &  $L T f$  9 gr. unde invenitur  $Tf$  874 milliar. Germanic. circiter, & altitudo aëris undecim milliar. ut Clavius & Nonius faciunt. Imo Alhacén & Vitellio tredecim milliar. faciunt.

Hæc tanta aëris altitudo nequaquam concedenda est, cum alia phaenomena repugnent: quod autem juxta illam methodum tanta invenitur, id fit ex falsa hypothese, quam assumunt, nimirum radium  $ghf$ , qui facit reflexum  $fL$ , provenire ab ipso sole: hoc enim falsum est, quia provenit per reflexionem ab alio radio, exempli gratia, à radio  $gl$ . Quod autem ad efficiendam lucem exiguam in  $f$  non sit necesse ut  $fg$  radius ab ipso Sole proveniat, sed quod alius radius reflexus idem præstare possit, id probatur ex eo, quod in aëre Occidentali lucem perspicimus ante ortum Solis, cum tamen certum sit nullum radium directum à sole  $f$ , ad aërem Occidentalem in tunc pervenire, sed ab alio aëris puncto, ex. gr. ab  $f$  &  $o$ , & sic radius  $Lm$  reflexus provenit ab incidente  $tfm$ , qui ipse  $f m$  est reflexus ab incidente  $gf$ , & hic  $gf$  ab alio  $gl$ , qui fortasse & ipse ab alio

ad-

adhuc provenit. Secundo, id quoque animadversione dignum, quod reflexionem ab aëre tanquam à speculo cavo fieri statuerunt, cujus cavitatis centrum sit  $T$ , idem nempe, quod Telluris: falsum quippe & hoc est. Etenim radii reflectuntur à particulis aëris nulla habita ratione centri  $T$ , sed juxta superficiem illarum particularum: hoc manifestum est ex radio  $Lm$ , qui ab Occidentali aëre  $m$  allabitur ad  $L$ ; si enim ex  $m$  tanquam ex speculo cavo centri  $T$  veniret, deberet ejus incidens à plaga  $x$  venisse, jam autem venit ab  $o$  vel inter  $f$  &  $o$ . Itaque radius  $Lm$  ita reflexus est à particula  $m$ , sicut hujus figura postulavit. Et sunt in aëre particulæ diversissimæ figuræ; ideo diversas reflexiones hinc inde in omnes plagas fieri nihil mirum est.

#### PROPOSITIO XXXVIII.

*Supposito, quod lux crepusculi non per simplicem, sed duplicem reflexionem generetur, invenire inde aëris altitudinem, qua magis cum aliis observationibus consentiat.*

In priori proposit. dictum est, quod radius  $is$ ,  $ghf$ , qui reflexum primum  $fL$  facit in initio crepusculi, non proveniat ab ipso sole, sed quod ipse quoque sit reflexus in  $g$ . sit itaque ejus incidens  $gL$  (qui tangat terram in  $p$ , sic enim  $Lg$  est primus radius qui ad  $g$  pervenire potest): & hunc jam ponamus ab ipso Sole immediate provenire, propter refractionem tamen aliquantum deviasse, nimirum  $QL$  sit ipse radius Solis,  $lp$   $g$  refractus,  $ghx$  reflexus,  $fL$  reflexus secundus. Invenienda est altitudo aëris  $Tx$ . Quoniam itaque radius  $glx$  est refractus incidentis  $QL$ , ponamus refractionem factam esse 30 min. angulum nimirum  $Qlx$ : præterea Solis centrum existere infra Horizontem septendecim gradibus, cum crepusculum incipit;

cipit;  
tem  
tis 30  
pressi  
nian  
gp, 1  
Kfg;  
sump  
Kfg  
min.  
titudo  
quam  
runt:  
reflex  
non e  
reflex  
pulsu  
da ma  
rum t  
secun

Nu  
inven  
Aë  
aliqu  
la faci  
quar  
ita ut  
tione  
tudo  
exced

Qu  
dino.

cipit; ideo limbus Solis  $Q$  distabit infra Horizon-  
 tem 16 gr. 45 min. & propter refractionem abla-  
 tis 30 min. erit angulus  $n K x$  16 gr. 15 min. de-  
 pressio Solis limbi infra Horizontem refracta. Quo-  
 niam porro  $K L$ ,  $K p$  sunt æquales, & quoque  $f L$ ,  
 $g p$ , ideo  $K g$ ,  $K f$  sunt etiam æquales, & angulus  
 $K f g$  æqualis angulo  $K g f$ : sunt autem ambo simul  
 sumpti æquales angulo  $n K g$ . 16 gr. 15 min. Quare  
 $K f g$  est 8 gr. 7. min. &  $f T L$  est 4 gr. &  $T f L$  86  
 min. Unde invenitur  $T f$  86 $\frac{1}{2}$  milliar. & ideo al-  
 titudo aëris invenitur 1 $\frac{1}{2}$  mill. quæ longe minor est,  
 quam antehac Mathematici ex crepusculo deduxe-  
 runt: & minor adhuc multo invenietur si triplex  
 reflexio ponatur initium crepusculi facere, quod  
 non est impossibile. Atque hæc duplex vel triplex  
 reflexio rectius admittitur pro causa durationis cre-  
 pusculi, quam illa quam Keplerus affert de splendi-  
 da materia in vicinia Solis. Reliqua de crepusculo-  
 rum tempore & variatione longitudinis vide parte  
 secunda hujus libri.

## PROPOSITIO XXXIX.

*Nubium altitudinem per geodaticam dimensionem invenire.*

Aëre sereno & quieto existente eligatur in nube  
 aliquod punctum præ reliquis insigne vel nubecu-  
 la facile notabilis: Atque hujus altitudinem tan-  
 quam fastigii turris dimetire ex duabus stationibus,  
 ita ut eodem tempore unus observator in una sta-  
 tione, alter in altera consistat. Sic invenietur alti-  
 tudo nubis istius, quæ nunquam deprehensa est  
 excedere quadrantem milliaria.

## PROPOSITIO XL.

*Quantitatem aëris supputare, data ejus altitu-  
dine.*

Q 2

Nihil



Nihil aliud hoc est, quam spatium inter Tellurem & extimam superficiem aëris supputare, quod quidem facile est, modo de altitudine aëris constet. Supputetur enim soliditas Sphærae, cujus semidiameter composita est ex semidiametro Telluris & altitudine aëris: atque ab inventa soliditate auferatur soliditas Telluris: quod relinquitur, est soliditas seu quantitas aëris.

## PROPOSITIO XLI.

*Aër in quibusdam locis quadam habet peculiaris.*

Ita in Ægypto rarissime pluit, vel nunquam potius: & si quando levis pluvia cecidit, catarrhi, pulmonia, febres atque alii morbi sequuntur. Nili inundatio & quotidiana fere in matutinis horis pruina suppleunt vices pluviae. Sic in regno Peru nunquam pluviae visae sunt. In multis locis sub Æquatore pluit integra semisse anni, & altera semisse nunquam. Vide parte secunda caput xxvi.

Insula Pulon Timor plerunque tegitur nebula & pruina.

In insula Sumatra gravis aër propter multa stagna. Simile in multis aliis locis: ita in veteri Mexico, item Malacca, &c.

Insula Divi Thomae, sub Æquatore jacens, censetur pessimum & insaluberrimum omnium regionum aërem habere, etsi omnium fructuum feruillissima sit.

In Provincia Chili aër adeo subtilis, ut ensis vagina reconditus sine abstersione, ferrugine tamen non inficiatur.

In insulis Azoribus aër & ventus adeo acris, ut ferreas laminas & lateres in domuum tectis brevi tempore exedat & in pulverem redigat.

Aristoteles narrat, quod in Olympo monte nullus sit aëris motus, (imo ne aër quidem, si verum est, quod sequitur,) & characteres inscriptos pul-

pulve  
que u  
illum  
hume  
tione

In  
gua in  
rium  
equis  
mane  
reditu  
putar  
neque  
vero r  
contr  
ve teg  
supra  
Vide  
stis re  
nive

Ci  
arom  
arom  
huc t  
istis i  
eorum

Aë  
tus il  
feste  
Eten  
restr  
Terra  
nimi

Co  
forte  
lichi  
quæ

pulveribus post multos annos inventos esse absque ulla perturbatione; & ascendentes in montem illum non posse continuare vitam, nisi spongas humectas secum ferant, quarum beneficio inspirationem trahant.

In America, Hispanis transeuntibus ex Nicaragua in Peruanam provinciam, in summis montium interjectorum jugis multi subito cum ipsis equis animam exhalarunt vel gelu obriguerunt, manentes statuarum instar usque ad ceterorum reditum qui evaserant. Quidam defectum aëris putant fuisse causam: sed non verisimile id est, neque id quod Aristoteles de Olympo retulit, pro vero receperim, quoniam in altioribus montibus contrarium deprehensum est, quorum vertices nive teguntur. Unde firme concluditur, quod non supra aërem extent, sed quod aër supra eos meet. Vide caput de montibus. Busbequius oculatus testis refert, Olympum montem in ætate quoque nive oppletum esse.

Circa Insulas Oceani Indici aër fragrans odore aromatum, præsertim tempore eo, ubi matura sunt aromata. Eum odorem nautæ percipiunt, cum adhuc tribus vel quatuor etiã milliariibus absunt ab istis insulis, nimirum flante vento opposito itineri eorum.

Aër marinus gravior est terrestri, & minus gratus illis, qui non sunt assueti. Ea differentia manifeste percipitur, cum nautæ appropinquant littori. Etenim à distantia integri milliariis ex haustu terrestriis aëris cognoscunt, quod non longe absint à Terra, inprimis hoc nautæ de Soffala in Orientali nimirum Africæ littore sita referunt.

Cum hæc à Tyrothetis essent disposita, incidi forte in observationem quandam à Davide Froelichio in monte Carpatho Hungariæ institutam, quæ quoniam non parum facere videbatur ad judicium

dicium de aëris altitudine & regionum ejus constitutione ferendum, ideo eam hic adjungendam existinavi, etsi ad Propositionem xviii debuisset adjungi. E Montibus, inquit (Hungariæ), primas tenet Carpathus; qua vulgata appellatione nominatur omnis tractus Sarmaticorum montium, qui Hungaros à Ruthenis, Polonis, Moravis, Silesiis, & ea Austria parte, quæ citra Danubium est, dirimunt. Horridiora & sublimiora illorum juga, nubes transcendentia, existunt in Comitatu Scopusiensi, ad patriam meam dulcissimam, Casareopolim, vulgo Resmarck dictam, à qua civitate etiam das Resmarcker Gebürg / item das Schnee Gebürg / quod perpetuis fere nivibus tegantur, à Slavis Tatry, vel Tarczal, quasi calvi & abrasii montes, nuncupantur. Et hæc rupes asperitate & præcipitijs suis Alpes Italicas, Helveticas ac Tirolenses longe superantes, fere impervix sunt, & non nisi à naturæ admiratoribus rarissime petuntur.

Ego (ut incidenter hæc recenseam) mense Junio Anni Christi 1615. tum adolescens, sublimitatem horum montium, cum duobus comitibus scholaribus, experiri volens, ubi, cum in primæ rupis vertice, magno labore, me summum terminum assecutum esse putarem, demum sese obtulit alia multo altior cautes, ubi per vasta, eaque vacillantia saxa (quorum unum, si loco à viatore dimovetur, & versus convallem dejicitur, aut volvitur, aliquot centena, decuplo majora secum rapit, & quidem tanto cum fragore, ut illi metuendum sit, ne totus mons corruat eumque obruat) enixus essem, iterum alia sublimior prodit: atque ita aliquot minores vertices, quorum posteriores semper anteriores altitudine superarunt, per totidem convalles, summo vitæ periculo emectiri coactus sum, donec ad supremum cacu-

men

men  
cum  
prosp  
leum  
lum  
videb  
recta  
clivit  
fueru  
quasi  
etatis  
jam  
mi  
locis  
fisse  
supra  
nos  
lias  
liore  
vidi.  
prin  
nubi  
vapo  
stant  
rem  
dem  
diat  
cum  
aère  
tires  
vent  
sum  
mil  
gere  
qua  
in e  
son

men penetraverim. Ex declivioribus montibus, cum in subjectas valles, vastis arboribus confitas prospexissem, nil nisi obscuram noctem, aut cœruleum quid, instar profundi aëris, quod vulgo cœlum sudum appellatur, observare potui, mihiq̄ videbar, si de monte caderem, non in terram, sed recta in cœlum me prolapsurum. Nimia enim declivitate, species visibiles, extenuatæ & hebetatæ fuerunt. Dum vero altiozem montem peterem, quasi intra nebulas densissimas hærebam. His eluctatis, post aliquot horarum intervallum, cum jam non procul à summo vertice essem, de sublimi quiescens prospexi atque animadverti iis in locis, ubi mihi antea videbar intra nebulas hæsisse, compactas atque albas sese movere nubes, supra quas, per aliquot miliaria, & ultra terminos Sepusi commodus mihi prospectus patuit. Alias tamen etiam nubes altiores, alias item humiliores, nec non quasdam æqualiter à terra distantes vidi. Atque hinc tria intellexi: 1. me tum transivisse principium mediæ aëris regionis. 2. Distantiam nubium à terra, non esse æqualem, sed pro ratione vaporis, alicubi altiozem, alibi humiliorem. 3. Distantiam nubium, terris proximam, longe minorem esse, quam quidam Physici statuunt, & quidem non 72 mill. Germanica, sed tantum dimidiatum mill. Germ. In summum montis verticem cum pervenissem, adeo tranquillum & subtilem aërem ibi offendi, ut ne pili quidem motum sentirem, cum tamen in depressioribus montibus ventum vehementem expertus sim: Unde collegi summum cacumen istius montis Carpathici ad milliare Germanicum à radicibus suis imis exurgere, & ad supremam usque aëris regionem, ad quam venti non adscendunt, pertingere. Explosi in ea summitate sclopetum, quod non majorem sonitum primo præ se tulit, quam si ligillum vel



bacillum confregissem, post intervallum autem temporis, murmur prolixum invaluit, inferioresque montis partes, convalles & sylvas opplevit. Descendendo per nives annosas intra convalles, cum iterum scopetum exonerarem, major & horribilior fragor, quam ex tormento capacissimo inde exoriebatur: hinc verebar ne totus mons concussus mecum corrueret: duravitque hic sonus per semiquadrantem horæ usque dum abstruissimas cavernas penetrasset, ad quas aër undique multiplicatus resiliit. Et talia quidem objecta concava in summitate sese non illico offerebant, idcirco fere insensibiliter primum sonus repercutiebatur, donec descendendo antris & convallibus vicinior factus, ad eas fortius impedit. In his quoque celsis montibus, plerunque vel media æstate ningit grandinatve, quoties nempe in subjecta & vicina planitie pluit, uti hoc ipsum etiam expertus sum. Nives diversorum annorum ex colore & cortice duriore dignosci possunt.

*De Ventis in genere, & Plagis mundi.*

C A P U T XX.

**A**ëris quædam affectio est Ventus, atque ideo ad absolutam telluris contemplationem ejus consideratio pertinet, præsertim cum & in hydrographia & omnium maxime in arte Nautica, quæ Geographiæ parte est, ejus cognitio requiratur: quam etsi magis Physicam esse libenter concedam, tamen quoniam plurima continet ad Geographiam spectantia, ideo paucis de ea hic agendum.

PROPOSITIO I.

*Ventus est commotio aëris sensibilis tactu, sive cum aliquo nisu.*

Ita

Ita  
confe  
pugna  
ipirit  
riat p  
tali ag  
proba  
men  
mus  
tantu

Ve  
corpor

He  
nostr  
stribu  
sus ce

Na  
fed c  
tion

stima  
gam  
omit  
circu  
vent  
serve

T  
mus  
vers  
larit

T  
in q  
voca  
stan

Ita definiendum censeo cum omnium gentium consensu: neque libet hic argutulos quosdam oppugnare. Si levior sit commotio, dicitur aura & spiritus. Si autem ita parva sit agitatio, ut non feriat per se sensum tactus, non dicitur ventus: & tali agitatione particularum nunquam caret aer, ut probat immisus in conclave per angustum foramen solis radius: ideo vocabulum, *tactū*, addidimus in definitione. Ille enim atomorum motus tantum oculis percipitur.

## PROPOSITIO II.

*Venti plerique ab una plaga ad oppositam tendunt, & corpora impellunt.*

Hoc videre est tum ex ventorum in corpora nostra impetu, tum imprimis ex vexillis seu aplustribus in fastigio malorum navis defixis, quæ versus contrariam vento plagam extenduntur.

Non tamen omnino directe & continue id fit, sed cum aliqua vexillorum hinc inde facta agitatione. Sunt qui in definitione addendum esse existimant, Commotionem factam versus unam plagam, vel versus easdem partes, sed nos hæc rectius omittenda esse existimamus, cum & venti quidam circulares deprehendantur, & accurate loquendo, ventus nullus eandem constanter plagam obseruet.

## PROPOSITIO III.

*Plaga dicitur imaginarium planum, quod concipimus extensum à quovis telluris loco perpendiculariter versus unum punctum ex illis, quæ locum illum circulariter circumstant.*

Talis videtur esse vera & vulgaris plagæ notio, in qua invenienda non parum laboravi. Germani vocant, die gegend. Interdum ipsa puncta circumstantia vocantur plaga.

Explicatio quidem plagarum non pertinet ad hanc Geographiæ sectionem, sed ad tertiam de comparatis affectionibus: Verum quoniam ventorum species ab eis vel hæ à ventis denominantur, ideo hic anticipamus illam tractationem. Is autem plagarum usus est, ut cum variæ res & apparentiæ in vario à nobis situ appareant, id explicare possimus.

#### PROPOSITIO IV.

*Plaga numero infinita sunt, cum per singula Horizontis puncta duci possint plana: sed triginta dua tantum ex illis peculiare appellationes hodie sortita sunt, quæ etiam communes sunt ventis, qui à talibus plagis spirant.*

Sunt autem plagæ duplices (sicut & venti); Cardines, sive Cardinales, & collaterales. Cardinales, quæ transeunt per puncta quatuor circumstantia à circumvolutione quotidiana stellarum dependentia, qualia sunt Septentrio, Auster, Oriens, Occidens: quibus nominibus & plagæ & venti quoque designantur. Sed & dicimus plaga & ventus Septentrionalis, Australis, Orientalis, Occidentalis: & venti uno vocabulo appellantur: Aquilo seu Boreas, Auster seu Notus, Eurus, Zephyrus. Collaterales sunt, quæ inter duas cardinales interstant; quarum cum infinitæ sint, numerantur hodie tantum viginti octo, nimirum septem inter binas Cardinales, ut inter Septentrionem & Orientem, Orientem & Austrum, Austrum & Occidentem, Occidentem & Septentrionem. Ex intermediis hisce quatuor sunt primariæ plagæ seu venti, nempe quæ exacte mediæ sunt inter Cardinales, & ab illis distant 45 gradibus, quæ sunt Euro-Boreas, Nord-Ost / Euro-Notus, Syd-Ost / Zephyro-Notus, Syd-West / Zephyro-Boreas, Nord-West.

## PROPOSITIO V.

*Plaga illa triginta dua aequaliter à se invicem distant : unaquaque scilicet à vicinis suis ; unde efficitur inter duas plagas intercedere gradus Horizontu undecim & unam gradus quartam ( 11 gr. 15 min. ). Cardinales absunt à se invicem gradibus 90.*

Etenim cum Horizon, tanquam circulus complectens omnia puncta circa locum aliquem, habeat 360 gr. ut omnes alii circuli ; si 360 gr. dividantur inter 32 plagas, accipiet unaquaque gradus 11, & 15 min. sed si inter quatuor cardinales dividatur, accipiet unaquaque cardinalium 90. Itaque plaga à Septentrione prima versus Ortum est, quæ distat à Septentrione versus Ortum, 11 gr. 15 min. secunda, quæ 22 gr. 30 min. tertia, quæ 33 gr. 45 min. quarta, quæ 45 gr. hæc media est, &c. & ita porro in reliquis quadrantibus.

Vocabula hisce triginta & duabus plagis & ventis imposita à Germanis, commodissima, sed quæ aliæ linguæ difficulter possunt imitari : Ea atque ordinem plagarum in adjuncta Tabula videre est, cum gradibus : simul etiam Latinam atque Italianam applicationem addidimus.

## PROPOSITIO VI.

*Quoniam autem inter duas plagas satis magna adhuc intercedunt intervalla, à quibus venti spirare possunt, & in quibus alia corpora constituta sæpe sunt, quorum scium ad nostrum locum cupimus scire, ideo quidam bisecant unamquamque ex triginta duabus illis plagis & unam interlocant, ita ut sexaginta quatuor plagas, & ventos numerent, quod in longinquis navigationibus quidam nauta observant.*

Sed Mathematici videntes, quod ne hæc quidem ad accuratam designationem sufficiant, illi



tot plagas numerant, quot in Horizonte sunt gradus & minuta, illasque denominant & designant numero graduum & minorum, quibus à Cardinali aliqua plaga distant, sive quantum est arcus Horizontis interceptus inter Cardinalem plagam & quodvis punctum Horizontis: ita plaga 1 gr. ab Austro versus ortum, &c. Sed in ventorum observatione nautica non requiritur tam subtilis divisio.

Possent tamen excogitari ratio quibus 32 venti commodius appellarentur, ita ut omnium gentium linguæ & sermoni peræque facilis esset; Nimirum si ab ordine denominarentur quo se mutuo insequuntur ab uno Cardinali ad alterum.

Ex. gr. Primus ab Austro ad Eurus, sive primus Euro-Notus, primus Euro-Boreas, secundus, tertius, quartus, &c. Germanice, *der erste Suid-Ost/ der ander/ der dritte Suid Ost/ &c.*

#### PROPOSITIO VII.

*Veteres tam Græci quam Latini, pauciores ventos numerarunt, sive, ut rectius dicam, paucioribus ventis peculiaria imposuerunt nomina, neque in hisce consentiunt, sed eundem ventum diversis appellant nominibus qua non ab ordine sed aliunde desumerunt: unde non levis existit difficultas de ventorum distributione ab illis usurpata.*

Olim quidem apud Græcos quatuor tantum venti nomina acceperant, nempe cardinales, Eurus ab ortu spirans, Zephyrus ab occasu, Boreas à Septentrione, Notus ab Austro: neque ab Homero aliorum ventorum fit mentio. Deinde hisce, quatuor alios ventos, vel ventorum nomina addiderunt, nempe illorum, qui spirant à plagis hisce: 1. in qua Sol oritur, cum solstitium hybernum est inter Austrum & Eurus, quæ plaga dicitur ortus solstitialis brumalis: & Ventus dicitur est Eurus:

nam

nam ipsum Orientalem vocarunt Subsolanum: sed Gellius Vulturum vocat, & Orientalem appellatum esse Eurum mavult. 2. in qua tunc occidit; qui dictus est Africus &  $\lambda\psi$ . 3. in qua oritur tempore solstitii æstivi, inter Eurum & Septentrionem, quæ plaga dicitur ortus solstitialis absolute, & ventus ab illis dictus est Aquilo. 4. in qua occidit illo tempore solstitii, quæ plaga dicitur occasus solis æstivus seu solstitialis: Ventus vero hic appellabatur à Græcis Corus.

Horum ventorum ordinem repræsentat adjunctum diagramma, juxta Senecæ enumerationem in libro v Natur. quæstion.

## PROPOSITIO VIII.

*Ea Græcorum designatio ad navigationem aliosque usus perincommoda est, quam tamen incommoditatem illi non magnopere senserunt, cum non longo spatio à Græcia recederent in navigationibus.*

Etenim in locis diversæ latitudinis sive diversæ à polo distantix, diversa quoque est distantia ortus solstitialis & brumalis à Cardinibus, Septentrione, Austro, &c. Græci tamen eam retinuerunt, sed auctam aliis intermediorum quatuor ventorum appellationibus, ita ut duodecim venti essent, quos propriis singulos vocibus designarent; etsi quosdam alii aliter. Latini præter illos duodecim addiderunt aliorum duodecim ventorum nomenclaturam, qui inter binos priorum duodecim spirarent. Appellationes & ordinem exhibet sequens diagramma, in quo Græcorum venti literis majusculis designantur; illi, quos Romani inter binos quosque interposuerunt, minoribus. Seneca tamen monet, jam olim à Varone illam incommoditatem animadversam esse, atque ideo hunc duodecim ventos ordinasse, ita ut æqualibus distantis binæ quæque distarent,

Q

non

non habita ratione ortus solaris plagæ. Quod autem idem Seneca affirmat non esse plures ventos, quam duodecim, id falsum & ridiculum est. Sunt enim infiniti.

#### PROPOSITIO IX.

*Hactenus ventorum distributionem à plagis desumptam explicavimus, & veterum tam Græcorum quam Romanorum divisionem minus aptam esse usibus rei Nauticæ & Geographiæ simul ostendimus.*

Itaque recentiore, quæ 32 ventos, ab æqualiter distantibus plagis spirantes constituit, merito retinemus. *Venti autem oppositi, dicuntur & contrarii, qui spirant à plagis per diametrum oppositis. Ventos quippe concipimus, tanquam ex alio loco ad nostrum accedentes: plagam vero à nostro loco ad alium extendi cogitamus.*

#### PROPOSITIO X.

*Causa ventorum varia sunt. Etenim cum ventus nihil aliud sit, quam continua aëris protrusio, omnia illa, qua talem protrusionem efficere possunt, erunt causa ventorum. Sunt autem hæc:*

1. Præcipua & generalis causa est ipse Sol, qui igneo suo jubare aërem rarefacit & attenuat, imprimis illum in quem perpendiculares radios mittit, sive supra quem hæret. Aër enim rarefactus multo majorem locum postulat. Inde fit, ut aër à sole impulsus alium vicinum aërem magno impetu protrudat, cumque Sol ab Oriente in Occidentem circumrotetur, præcipuus ab eo aëris impulsus fiet versus Occidentem. Atque ejus indicium esse potest, quod in Zonæ Torridæ plerisque locis, & ubique in mari, continuus spirat ventus Orientalis, nimirum, aërem Sol protrudit ab Oriente versus Occidentem, & non excedit Zonam Torridam.

dam.  
verfu  
rient  
gas,  
mer  
quia  
hanc  
rida  
que  
post  
plagi  
recip  
fit pr  
nus  
ditu  
vent  
tand  
quar  
verfi  
nim  
lis  
est.  
fis n  
aute  
cauf  
fi im  
sape  
nera  
2  
freq  
piof  
tos  
3  
rare  
ab i  
culi  
4

dam. Protruditur quidem aër rarefactus circulariter versus omnes plagas, Septentrionem, Austrum, Orientem, Occidentem, atque ad intermedias plagas, sed non admittitur in omnibus plagis: vehementior autem fit protrusio versus Occidentem, quia Sol versus eam plagam movetur, itaque versus hanc plagam magis sensibilis est ventus in Zona Torrida fere continue, in nostra autem Zona plerisque diebus, horis matutinis ante Solis ortum & post eum, ubi plerunque alii venti cessant. Ex aliis plagis aliæ aliis interdum sunt magis dispositæ ad recipiendum hunc impetum. Itaque ubi major fit protrusio versus Septentrionem, ventus austrinus spirare dicitur; cum versus Orientem protruditur, ventus Occidentalis; cum versus Austrum, ventus Septentrionalis, & sic de aliis plagis. Et notandum est, cum hæc protrusio fit ad plagam aliquam extra quatuor illas Cardinales, tunc in diversis regionibus diversum videri ventum. Etsi enim plaga illa una sit respectu loci, cui sol verticalis est, tamen respectu aliorum locorum diversa est. Et sic eadem causa eundem ventum facit diversis nominibus appellari in diversis regionibus. Hæc autem causa vel adjuvatur vel impeditur ab aliis causis; si adjuvatur, vehementem ventum facit; si impeditur, minus vehementem ab illa plaga, & sæpe alius ventus tunc spirat, qui potius ab illa generali causa juvatur.

2. Secundam causam ventorum pono, eamque frequentissimam, exhalationes ex mari & terra copiose & cum impetu quodam elevatas: sed vix ventos efficiunt, nisi cum rarefieri incipiunt.

3. Nubium & nubecularum attenuationem & rarefactionem, sive illa à sole & aliis stellis fiat, sive ab inclusis & adjunctis igniculis & sulphureis particulis.

4. Nivium & glaciæ resolutio præsertim ejus, quæ



quæ in montanis jacet. Neque enim in aquam integre solvuntur.

5. Lunæ & reliquarum stellarum ortus & varius situs.

6. Condensatio & rarefactio aëris atque vaporum à quovis frigore vel calore.

7. Nubium descensus, quo subjectus aër premittur.

Ad causas hæcæ facilius intelligendas multum facit consideratio æolopilarum, in quas inclusa aqua admoto igne per angustum orificium magno impetu ventum emittit, donec omnis aqua exhalaverit. Angusti autem orificii vicem in aëre præstant, 1. Aër circumstant densior. 2. Si idem aër vicinis urgeatur vel cedere prohibeatur ab aliis vaporibus vel nubeculis. 3. Si aër versus unam plagam magis condensetur, atque ita viam præbeat flatibus.

#### PROPOSITIO XI.

*Cur venti ita spirent, ut perpendicularem lineam supra Horizontem faciant? sive, cur incessus ventorum sit perpendicularis ad Horizontem?*

Causa est, quod aër sphaerica figura Tellurem ambit, & Protrusio aëris fit plerumque per circum sphaeræ maximum, qui per centrum Telluris transit. Etsi enim quoque cogitare possimus aërem secundum transversam lineam impelli, tamen quoniam à lateribus minor est impetus, & major resistentia, inde fit, ut in medium iter venti incumbant.

Commodius autem concipimus hunc modum, si consideremus primam ventorum causam. Protrudit enim Sol aërem versus omnes plagas illius loci, cui verticalis est, sed non in omnibus ille impetus recipitur, ut dictum. Si jam consideremus ab illo loco ductos circulos maximos & inter  
hosce

hosce  
recipi  
femici  
allab  
nus  
perpet  
ratio  
lutis  
hosce  
etsi aë  
illum  
quus.  
Ge  
perpe  
sapiu  
hend  
Sic  
à ven  
jus in

Ca  
rant,  
impor  
gis cor  
tur?  
Ca  
non d  
ejus d  
requi  
tione  
motu  
non d

Ca  
Tellu

hosce illos, in quibus aër protruditur, vel imperus recipitur, omnia loca Telluris sita in hoc circulo vel semicirculo ventum experientur perpendiculariter allabentem, propterea quod omnis circulus maximus Telluris transiens per aliquem ejus locum, est perpendicularis ad Horizontem ejus loci. Eadem ratio est, si quando ex nubecula vel nubibus resolutis ventus erumpit. Illa vero loca, quæ extra hosce circulos sita sunt, non experientur ventum, etsi aër movetur supra eorum Horizontem, quia ad illum Horizontem non perpendicularis est sed obliquus.

Generaliter tamen non est verum, quod ventus perpendiculari via ad Horizontem incedat, quia sæpiuscule in ipso aëre transversæ spirationes deprehenduntur.

Sic fumum è camino egredientem videmus non à vento auferri versus unam plagam, sed partem ejus in alias plagas ferri.

## PROPOSITIO XII.

*Cur venti interciso quasi vel interrupto impetu spirant, ut modo cessent, mox resumunt quasi viribus cum importunitate vel cumulo redeant? Et, cur in mari magis continui videntur spirare, ut minus illa quies sentiantur?*

Causam esse puto, quod causa ventos excitans non continue duret, sed ad copiam & collectionem ejus quantitatis, quæ tali impetu aërem perumpat, requiratur tempus. Et ideo, quia in mari exhalationes magis continuæ sunt, & minus impeditur motus, ideo illa quies in mari minus sentitur, etsi non omnino tollatur.

## PROPOSITIO XIII.

*Cur ventus nullus perpendiculariter ex aëre in loca Telluris spirat?*

De

De hac quaestione Aristoteles, lib. 2. Meteor. cap. 9. admodum obscure agit, ita ut Peripaterici de illius sententia non sint concordēs: neque libet hic eorum placita recensere. Causa facilis explicatu esse videtur, nimirum quod aër deorsum protrusus versus centrum Telluris non possit percurrere hac via, propterea, quod alii vapores continue sursum expellantur vel ferantur, & ideo nimia resistētia aëris, qui directe situs est sub moto aëre, facit ut protrusio fiat ad latera illius loci, in quo impetus incipit. Quod eo magis verisimile sit, cum venti materia plerumque levior sit aëre illo, & ille magis rarefactus, quam qui Telluri vicinior est.

PROPOSITIO XIV.

*Cur venti Occidentales minus frequentes, quam Orientales.*

Hujus causa manifesta est ex Propos. x. ubi ventorum primam causam fecimus Solem qui aërem rarefacit ab Oriente ad Occidentem progrediens, & ideo magis truditur aër versus Occidentem. Itaque ut hac generalis causa impediatur, oportet copiosos admodum halitus vel nubes in occidentalibus plagis consistere, quod minus frequenter contingit.

PROPOSITIO XV.

*Cur venti Septentrionales & Orientales magis rigidi & impetuosius sunt; contra, Austrini & Occidentales, laxiores, & debiliores?*

Causa est, quia Septentrionalis aër propter frigus densior est, austrinus (in nostra Zona) propter majorem à Sole & calore factam dissipationem rarior. Quo autem rarior est aër, eo minus impetuoso fertur motu. Sciendum tamen est, Australes ventos frigidos esse & siccos & impetuosos  
in

in Te  
non  
autem  
alian  
per S  
feratu  
que in  
tem.

Sec  
impe  
Lulit  
les:  
tales.

Cu  
calidi  
signem

Ita  
sciend  
esse  
locis.  
Austra  
quia  
austra  
que  
Etenim  
& Se  
strin  
nior  
trion  
lari,  
obtin  
polu  
dunt  
bus.  
D

in Temperata Zona nostræ opposita sive Arctica, non minus ac nobis Septentrionales. Orientalis autem rigidus est, sive magis intensus propter aliam causam, nimirum quia plerunque ab aëris per Solem rarefactione oritur, qui cum continue feratur ab Oriente in Occidentem, majori quoque impetu protruditur aër ab Oriente in Occidentem.

Sed alias accedere causas, quæ vel juvent vel impediunt impetum illum, verisimile est. Nautæ Lusitani vocant *Brysas*, ventos Boreales & Orientales: sed *Vendavales* appellant Austrinos & Occidentales.

#### PROPOSITIO XVI.

*Cur venti Austrini & Occidentales deprehendantur calidiores, quam Orientales & Septentrionales, qui insignem præ illis frigesaciendi potestatem obtinent.*

Ita solet hæc quæstio vulgo proponi: verum sciendum est, non generaliter de omnibus locis esse intelligendam, sed tantum de nostræ Zonæ locis. Etenim in altera Zona Temperata versus Austrum ab Æquatore sita contrarium est verum, quia hisce locis Septentrionales venti tepidi sunt, australes vero magis frigidi deprehenduntur. Atque ita postulabat rei natura & causæ conditio. Etenim, quod nobis auster magis tepidus sentitur, & Septentrionalis frigidior est, inde fit, quod austrini venti veniunt ex plaga, & locis quæ viciniora sunt Zonæ Torridæ sive viæ Solis, Septentrionales autem à locis remotioribus ab ea solari, hoc est, à locis frigidis. Contrarium autem obtinet in locis ab Æquatore versus Antarcticum polum sitis, quia Septentrionales venti illis accedunt à via solari, Austrini à locis polo vicinioribus.

De Orientalibus vero & Occidentalibus aliter respon-



respondendum est, neque hic locum habet illa diversitas locorum nostræ Zonæ & alterius oppositæ. Primo itaque dictum est in præced. Propos. quod venti Occidentales minus frequentes sint in omnibus locis, cujus causa eadem est cum illa, propter quam Occidentales tepidiores sentiuntur, nimirum, quoniam plerunque spirant de nocte & post Solis occasum, ubi aër qui protruditur versus nostrum locum est calidior vel minus frigidus quam aër nostri loci, quippe qui ab Occidente Sole est remotior, quam ille, qui inter Solem & nostrum locum jacet. Accedit altera causa (quæ etiam in differentia inter Septentrionales & austrinos valet), quod venti Occidentales minus impetuosi & intensi spirant, sed cum quadam laxitate. Notum autem est, auram quamlibet vel ventulum eo magis frigidum sentiri, quo majori vel magis intenso impetu spirat, etsi revera calidior vel frigidior non sit, quod vel exspiratio nostra testatur, quam frigidam & calidam exhalare possumus.

#### PROPOSITIO XVII.

*Cur nauta ex conspecta nubecula, præsertim quæ pallidi vel subnigri coloris est, ventum ab ea plaga sibi promittunt. Simul alia ventorum futurorum signa exponere.*

Duplex potest reddi ratio. Vel enim nubes ejus coloris indicant, quod mox in status resolvendæ & dissipandæ sint: Vel ipsæ nubes sua gravitate subsidentes & ab aliis nubibus segregatæ aërem suppositum premunt atque ita spirare faciunt. De peculiari nubecula, quam Belgæ vocant oculum bovis, vide cap. seq.

Sol in ortu suo maculosus apparet & sub nube pallida latens vel atra, vel imbres vel ventos futuros prænnunciat. 2. Si Sol exoriens concavus videatur,

deatur  
humid  
3. Si  
& qui  
in nig  
ficat.  
futuri  
na plu  
circa  
8. Si a  
aquilo  
immi  
ortus  
cum l  
los vo  
ptent  
austra  
cessan  
pitus  
ret, in  
libus  
ferunt  
te, Ca  
tuis.

Cur  
major  
hyema  
In  
niviu  
cis, p  
plures  
por m  
esset.  
Veris  
pterea

deatur, ita ut è medio fulgeat & radios jaciatur, humidam & ventosam significat tempestatem. 3. Si Sol in occasu palleat: sed si rubeat, serenus & quietus erit sequenti die aër. 4. Si pallidus Sol in nigras nubes occidat, aquilonem ventum significat. 5. Luna rubens inliar auri censetur certum futuri venti signum, juxta versiculum: Pallida Luna pluit, rubicunda flat, alba serenat. 6. Corona circa Lunam. 7. Si Lunæ cornua tetra fuerint. 8. Si aquilonium cornu Lunæ apparet porrectius, aquilonius ventus imminet; si australe sit erectius, imminet Notus. 9. Lunæ & stellarum illustrium ortus, ut Arcturi, Orionis, hœdorum præsertim cum sole. 10. Si parvæ stellæ in Cancro, quas asellos vocant, tegantur nubecula, & quidem si Septentrionalis ex illis duabus tegatur, ventus erit australis; si australis, Septentrionalis. 11. Pluviis cessantibus plerunque venti flare incipiunt. 12. Strepitus & murmur quoddam, tanquam ebullitio fieret, in mari auditum. 13. Veteres etiam ab animalibus, ut ave cornice, pisce Delphino signa desumerunt. 14. Ab ignitis meteoris, fulgure, Chasmate, Capris, stellis cadentibus: sed non ex ignibus factis.

## PROPOSITIO XVIII.

*Cur in Vere & Autumno venti frequentiores & majori nisu spirant, quam in fervida æstate vel gelida hyeme?*

In Vere id fieri existimandum partim propter nivium resolutionem, præsertim in montanis locis, partim quia pori Telluris tunc aperiuntur & plures halitus emittunt: partim quia aër & vapor magis rarus tunc fit, cum hyeme densatus esset. Adde quod plerunque mense ante initium Veris & in ipso Vere multæ cadant pluvix, propterea quod humidæ constellationes jam eas Zodiaci

diaci domos occupaverint, in quas ingresso Sole, Veris initium numeramus. In Autumno autem pluvix frequentes & exhalationes ventorum causa censenda sunt, non minus ac in Vere, propterea quod calor mediocris à Sole profectus extollat quidem vapores & exhalationes, sed crassiores nec satis attenuatos. In æstate autem fervida ideo nulli venti sunt plerunque eandem ob causam, ob quam pluvix rara sunt eo tempore, nimirum quia Sol nimis attenuat exhalationes, neque permittit eas coire in eam copiam, quæ requiritur ad ventorum generationem. Quæ causa generalis quidem non est, nec semper vera: at neque generaliter verum est, in fervida æstate nullos ventos esse: hoc enim tantum de eo, quod sæpius fit, est intelligendum. In hyeme sæva venti sunt rariores, ideo quod & pauciores vapores è terra eleventur, & qui elevati sunt vel in nives condensentur vel certe præ gelu non ita dissipentur vel rarefiant, ut ventum faciant.

#### PROPOSITIO XIX.

*In quanta aëris altitudine sive in quam aëris regione venti flare incipiant?*

Sunt qui ventos non transcendere infimam regionem aëris existiment, propterea quod fastigia altorum montium, ut Olympi, nullos flatus sentire deprehendantur. Ego de observatione dubito, cum fumus ex summi montis Ætnæ apice eiectus vento agitari hinc inde cernatur. Ideo in suprema quoque regione aëris talem commotionem ventosam fieri posse arbitror.

#### PROPOSITIO XX.

*Ad quantum spatium unus idemque Ventus se extendat?*

R. Admodum magna in hoc est diversitas. Et enim

enim v  
Zona T  
rem. I  
Austro  
lent f  
ventis  
adeft,  
est, ut  
diximu

I  
PRæ  
diffi  
mus,  
dentur  
lis est  
quem  
alias v  
certo  
propri  
bere &  
ducent  
collegi

Ven  
Co  
ra spir  
door-g  
Inco  
tos ab  
cant,  
compa  
Cat

enim venti ab Oriente in Occidentem flantes sub Zona Torrida, videntur totam circumire Tellurem. Illi quoque, qui vel à Septentrione vel ab Austro spirant, per multos dies & longa spatia solent sequi nautas vel comitari. De collateralibus ventis idem videtur esse verum, sed hæc diversitas adest, quod idem ventus in diversis locis diversus est, ut Propos. x. in fine explicationis primæ causæ diximus.

## CAPUT XXI.

*De Ventis in specie, & Tempestatibus.*

PRæcedenti capite Ventorum distributionem, differentias, vel potius denominationes attulimus, quas à plaga unde spirant vel spirare nobis videntur, accipiunt; quæ proinde divisio accidentalis est, quoniam respectu certi loci Telluris (ad quem plaga illa referuntur) sumuntur. Hoc capite alias ventorum divisiones & phænomena quæ vel certo tempore anni, vel certis tractibus Telluris propria sunt, afferemus, etsi plures cuperemus habere & accuratiores de hisce observationes. Sed adducemus, quæ ex nautarum diariis multo labore collegimus.

## PROPOSITIO I.

*Ventus alius constans est, alius inconstans.*

Constans est, qui ad minimum una vel altera hora spirat ab eadem plaga; Belgæ nautæ vocant, *een door-gaende wind*.

Inconstans, qui modo spirat, modo in alios ventos ab aliis plagis spirantes mutatur; Belgæ vocant, *variable wind*, item *de wind loopt ronds om het compas*.

Causæ majoris vel minoris durationis ejusdem venti,



venti, itemque celeris immutationis esse videntur.  
 1. Si sit à generali causa, vel magis aut minus diu-  
 turna & constante.

Ita venti à motu aëris cum motu Solis in Zona  
 Torrida sunt constantes: ita illi, qui à nivium re-  
 solutione, in montibus præsertim, spirant. 2. Si  
 forte in aliis plagis non consistant tales vapores, qui  
 ad ventos generandos apti sunt. 3. Si aër circum-  
 stans illam nubeculam, è qua ventigenerantur, sit  
 densior, neque concedat viam illis halitibus. Sed si  
 aër sit minus densus vel laxior sit, & vapores pauci  
 hinc inde in diversis locis seu plagis; si denique  
 causæ generales cessent, tunc quidem venti va-  
 riabiles deprehendentur, qui plerunque lenes  
 sunt.

#### PROPOSITIO II.

*Ventus alius est generalis, alius particularis.*

Generalis ventus dicitur à nautis ( *den generalen  
 roind*, vel *passaet-wind* appellant ) qui in multis si-  
 mul locis longo Telluris tractu per totum fere an-  
 num spirat in mari. Particularis contra, qui non si-  
 mul pluribus locis per totam annum spirat.

Generalis autem impeditur, 1. In partibus ma-  
 ris Terræ vicinis: hic enim ex aliis plagis vapores  
 interpellant: & ideo generalis ventus præcipue  
 consideratur in medio mari à terris remotissimo.  
 2. Potest tamen etiam in medio mari alius flare  
 ventus, nempe si in alia plaga nubecula vel alia  
 causa ventum generans satis valida extiterit. Ex  
 hisce duabus causis fit, ut generalis ventus magis  
 & minus constans vel continuus sit in diversis lo-  
 cis.

Reperiuntur autem generales venti tantum in  
 mari Zonæ Torridæ, sive quod inter Tropicos ja-  
 cet, circa totam Tellurem: alicubi tamen extra  
 Tropicos se extendit ad septem gradus, & sunt  
 omnes

omnes  
 terales,  
 Oriente  
 num spi  
 sunt in  
 busdam  
 Constau  
 illius pa  
 quæ à N  
 pulco so  
 ortu in  
 naviger  
 vel coll  
 ro-bore  
 vastissim  
 de nau  
 secure c  
 ra opus  
 vem ad  
 insular  
 terpella  
 general  
 à capite  
 Africa  
 ea, qu  
 Americ  
 jacet in  
 solent r  
 est insu  
 liar. 35  
 etiam e  
 mens e  
 petua f  
 nautis  
 sulæ n  
 spei jac  
 in mari

omnes Orientales, hoc est, Eurus vel Euri collaterales, ut Euro-auster, Euro-boreas; nimirum ab Oriente versus Occidentem, qui per totum annum spirant. Non autem pari constantia consistunt in omnibus illius maris partibus, sed in quibusdam magis, in quibusdam minus impediuntur. Constantissimi sunt in Pacifico mari (ea nempe illius parte, quæ inter Tropicos jacet) ita ut naves, quæ à Novæ Hispaniæ (in America) portu, Aquapulco solvunt versus Philippinas, hoc est, quæ ab ortu in occasum tendunt, sæpe sexaginta diebus navigent continue sine ulla velorum mutatione vel collectione cum constanti vento Euro vel Euro-borea, neque in hunc usque diem ulla navis in vastissimo illo itinere (milliar. 1650) perit. Unde nautæ dicunt, licere sibi in hac navigatione secure dormire, neque ulla gubernandæ navis cura opus esse, cum generalis ille ventus deducat navem ad optatum portum, hoc est, Philippinarum insularum conspectum. Hic enim alii venti interpellant generalem. Eadem constantia hujus generalis venti Orientalis deprehenditur in mari à capite sive promontorio Bonæ spei in termino Africæ, vel potius ab Africæ procurrentis parte ea, quæ in Torrida Zona jacet usque ad ipsam Americam Brasiliensem, in cujus itineris medio jacet insula S. Helenæ, ad quam cursum dirigere solent nautæ ex India redeuntes in Europam. Abest insula S. Helenæ à promontorio Bonæ spei milliar. 350, & sæpe diebus sedecim absolvitur vel etiam duodecim (prout generalis ventus vehemens est vel debilis, namque in hoc non est perpetua similitudo) eadem securitate utentibus nautis (quando primum ad parallelum illius insulæ navigarunt, namque promontorium Bonæ spei jacet extra Tropicos), qua diximus uti eos qui in mari Pacifico ab Aquapulco ad Philippinas na-

R

vigant:

vigant: imò, superato promontorio Bonæ Spei, omni fere ventorum periculo & variatione defunctos se esse judicant, & secure dormiunt, vento constanter implente vela versus insulam illam & Brasiliam: hæc tantum illis maxima cura est & sollicitudo, ne insulam prætervehantur, cum admodum parva sit. Etenim si vel octava milliariis parte eam prætervecti sint, non possunt eam repetere, vento nimirum Orientali impellente navem versus Occidentem: ideo tunc a quationis causa vel ipsa Brasiliæ littora cum magno itineris dispendio, vel aliam Insulam dictam Ascensio, adire coguntur. Si quæras, quamam itaque ratione navigent, ubi contrarium iter faciunt naves in hoc mari, nempe dum à Philippinis ad Novam sive Americanam Hispaniam tendunt, vel dum à Brasilia & Insula S. Helenæ ad promontorium Bonæ Spei, dum Indiam petunt. In hisce navigationibus sciant Lectores, quod triplici utantur nautæ modo sive artificio. Vel enim navigant mare extra Tropicos situm (ideo non adeunt Insulam Helenæ dum ex Europa in Indiam navigant), vel ubi necessario ipsis hoc superandum est, non directe ab Occidente in Orientem cursum instituunt, sed oblique à Septentrione, ut collateralis ejus plaga, ad Austrum, aut hujus collateralem: vel denique illa tempora navigationis eligunt, in quibus norunt generalem illum ventum ab aliis crebro impediri: sed hoc postremum quia raro fit, ideo potius prioribus duobus modis utuntur, de quo pluribus dicemus in Capite de Navigatione.

Duo itaque maria sunt Zonæ Torridæ, in quibus generalis ille Orientalis ventus cum suis collateralibus per totum annum dominatur, nimirum id, quod inter Africam procurrentem & Brasiliam interjacet: alterum id, quod inter Novam Hispaniam sive rectius inter Americam & Insulas Ori-

Orien-  
ditur.  
Torri-  
rente  
quid  
in ho-  
sulas  
crebr  
fric  
mens  
mens  
positi  
neral  
Band  
mum  
laccar  
ti Pro  
Illu  
lem i  
usque  
esse in  
Ete  
gradil  
xidiar  
ad 15  
Ita  
Janua  
non d  
tum g  
Sic  
tibus  
Austr  
illos.  
Ite  
que a  
meric  
anno

Orien-

Orientalis, quarum pars Philippina sunt, extenditur. Tertia autem pars hujus maris sub Zona Torrida existentis, nempe inter Africam procurrentem & Philippinas seu Orientis insulas, non quidem destituitur hoc generali vento, sed saepius in hocce mari interpellatur propter frequentes insulas, quae tamen interpellatio in quibusdam locis crebrior est, quam in aliis. Inter Mozambique Africae & Indiam ventus ille Generalis maxime viget mense Januario, Febuario, Martio, Aprili; reliquis mensibus alii venti spirant, de quibus sequenti Propositione dicemus. Magis impeditur ventus hic generalis in mari Insularum Indicarum. Ad Insulam Bandam cum Maio mense Orientales vigere primum incipiunt vehementes & cum pluvia: ad Malaccam in Septembri & aliis locis aliter, ut sequenti Propositione dicetur.

Illud tamen sciendum est, ventum hunc generalem in maribus hisce non aequaliter se ad Tropicos usque extendere in omnibus partibus, sed magnam esse in hoc differentiam.

Etenim Tropici distant ab Aequatore utrinque gradibus  $23\frac{1}{2}$ ; ventus autem generalis in uno meridiano sentitur ad latitudinem 20 graduum, in alio ad 15, in alio ad 12, &c.

Ita in Indico Oceano cum mense Febuario & Januario ventus Orientalis (vel Euro-auster) spirat, non deprehenditur is, antequam ad decimum quintum gradum latitudinis pervenias.

Sic à Goa ad promontorium Bonae Spei navigantibus ventus hic generalis occurrit ad 12 gr. latit. Australis, & ad 28 gr. latitud. ejusdem comitatur illos.

Item inter 4 gr. latitudinis Septentrionalis usque ad 10 vel 11 gr. in mari inter Africam & Americam nullum generalem ventum spirare nautae annotarunt, quippe ubi à S. Helena ultra Aequato-



rem navigarunt eo vento usque ad quartum gradum latitudinis Arctica, tunc desistunt eo vento usque dum ad 10 gr. latitudinis perveniant. Ab eo enim gradu usque ad tricesimum spirare rursus manifeste & continue deprehenditur Euro-boreas, etsi tricesimus hic gradus septem gradibus absit à Zona Torrida. Nihilominus in parallelorum latitudinis 6 gr. 7 gr. 8 gr. &c. nonnullis locis quoque spirat, sed in decimi gradus parallelis omnibus locis fere usque ad 30 gr. borealem. Eodem modo ultra Tropicum Capricorni in mari inter Promontorium Bonæ spei & Brasiliam ventus Euro-auster spirat usque ad 30 gr. latitudinis, hoc est, septem gradibus extra Torridam Zonam versus Austrum, idque per totum annum.

Et licet, ut diximus, in omnibus littoribus, multo minus in locis mediterraneis hic generalis ventus non ita sentiatur, tamen in quibusdam satis notabilis est. Ita ad littora Brasiliæ Orientalis ad littora regni Lowango in Africa, Austro-eurus quotidianus est, etsi alii venti se admisceant.

Causa hujus generalis continui venti triplex affertur à Physicis recentioribus (namque veteribus omnino ignotus fuit cum ipsa Torrida Zona, qui ne verbo quidem ejus meminerunt). Quidam statuunt, Solem hujus venti ab Oriente ad Occidentem spirantis causam esse, quoniam is ingenti sua facultate rarefaciat aërem in Zona Torrida & ita protrudat ab Oriente in Occidentem, cum ipse incedat hac via.

Alii vero, & quidem ex illis, qui cum Pythagoreis cælum stare, Tellurem circumrotari statuunt, illorum, inquam, quidam existimant, ventum hunc generalem ex eo provenire, quod, dum Tellus circumrotatur atque aër cum eo, hic minus sequatur motum Telluris, sed aliquantum tardior

fit

fit ad  
ferim  
ri cele  
nobis  
veri

Te  
fert C  
ubi I  
dere  
Occi  
intel  
plice  
cum  
furi  
tem  
nicar  
non  
gr. la  
vent

V  
seuer  
Se  
bus  
done  
funt  
rede  
me  
guli  
stati  
dura  
alii

In  
qui  
tibu  
vent

fit ad motum, atque ideo dum nos cum Tellure ferimur ab Occidente in Orientem, aer vero minori celeritate in eandem plagam movetur, videtur nobis occurrere & ab Oriente in Occidentem moveri, cum tamen nos illi potius occurramus.

Tertiam causam, eamque omnino novam affert Cartesius Propositione 222 in suis Principiis, ubi Lunam efficere hunc motum conatur ostendere non minus ac motum maris ab Oriente in Occidentem. Sed quia sententia ejus non potest intelligi, nisi omnes ejus hypotheses Physicæ explicentur, ideo nihil hic de ea dicemus, præsertim cum causam illam non esse veram alio loco ostensuri simus. Nobis prima causa placet; secunda autem ideo non videtur recipienda, quod & Copernicani plurimi eam non concedent, & ratio dari non possit, cur tantum intra Tropicos vel ad 30 gr. latitudinis, & non in Temperatis totis Zonis is ventus deprehendatur spirare.

### PROPOSITIO III.

*Ventorum quidam sunt periodici & statii, alii vagi seu erratici.*

Statii dicuntur & periodici, qui certis anni diebus spirant & deinde certo dierum numero cessant, donec iterum spirare incipiant. Horum quidam sunt anniversarii, quidam semissis anni intervallo redeunt, quidam menstrui qui unius vel alterius mensis intervallo redeunt, quidam diarii, qui singulis diebus spirant. Aliter quoque subdividuntur statii venti, nempe quidam ubi incipiunt spirare, durant per aliquot menses, alii per semissem anni, alii uno mense, alii paucis diebus.

Inter hosce præcipue illi observantur à nautis, qui per aliquot menses spirant in certis maris partibus, atque illos (ut etiam ipsa tempora quo tales venti spirant) vocant Motiones, Belgæ, *Moussons*.

Atque tales motiones imprimis in Oceano Indico ab Africa ad usque Philippinas Insulas notabiles sunt, etsi neque aliis locis desint. Magnum momentum in observatione harum motionum situm est, quippe tempus illarum nauæ eligere debent ad navigationem quam instituunt versus eandem (vel collateralem) plagam, ad quam ventus ille spirat, neque suscipere navigationem in plagam motionis istius, sed expectare motionem contrariam. Etenim in Indici Oceani partibus ubi unus ventus per aliquot menses spirans cessat, succedit alius ventus priori contrarius, atque eadem constantia durat, donec suum tempus absolverit, atque ideo hæc motiones vocant contrarias. Tempus autem commutationis motionum (*verandering van Mousson*) appellant illos dies, qui intercedunt inter finem unius motionis & principium contrariæ. Neque enim cessante una motione statim altera incipit spirare, sed dies aliquot intercedunt, interdum plures, interdum pauciores; item, in quibusdam locis plures, in quibusdam pauciores. Atque hæc diebus intermediis, quibus nulla certa motio spirat, ventus est variabilis, insidiosa malacia, & plerumque incertis fluctibus agitur mare, atque tempestates crebre ingruunt. Quædam ex motionibus bis in anno redeunt, sed non eadem vehementia, unde nauæ unam vocant, *de groote Mousson*; alteram, *de kleine Mousson*.

1. In Oceani Atlantici parte ea, quæ in Zona Torrida jacet, ut etiam ea, quæ in Temperata, Boreas spirat frequens mensibus Octobri, Novembri & Januario. Et ideo hi menses maxime idonei sunt capessendæ navigationi ex Europa in Indiam, ut Æquatorem superent ope illorum ventorum. Etenim experientia constat, quasdam naves, quæ mense Martio ex Europa solverant, non citius

citius pervenisse ad Brasiliam, quam illas, quæ  
 mense Octobri solverant, nimirum utraq̃ue per-  
 venerunt illuc mense Februario, adjunctæ Borea.  
 Quia tamen non est ita continuus & certus hic  
 ventus, ideo nautæ non consueverunt eum ap-  
 pellare Motionem. Neque facile est causam red-  
 dere hujus venti in istis mensibus, nisi ad copio-  
 sos & densos vapores, vel ad continuam pressuram  
 à nubibus gravibus factam cum velis referre. Sed  
 & qui in Nova Zembla hybernarunt, testantur fre-  
 quentissimum ibi fuisse ventum Septentrionalem  
 toto hyemis tempore, ubi Soli rarefacienti aërem  
 nequit ascribi hic effectus, cum infra Horizontem  
 delitesceret. Id tamen in genere existimo posse  
 suos defendere, quod motionum harum pleræ-  
 que proveniant à resolutione nivium vel crassa-  
 rum nubium per hyemem in Septentrionalibus &  
 Australibus locis, præsertim montibus collecta-  
 rum. Ad quod credendum inductus sum eo po-  
 tissimum argumento, quod motiones hæ maxima  
 ex parte spirant à Boreali vel Australi plaga, vel  
 harum collateralibus. Quoniam itaque nix &  
 crassiores nubes in Septentrionalibus locis resol-  
 vuntur à Sole, ea potissimum semisse anni quo Se-  
 ptentrionalem Eclipticæ peragrat, ideo motiones  
 tunc erunt Septentrionales. Eodem modo in austra-  
 libus vel Antarcticis locis altera semisse anni Sol  
 resolvit nivem & crassiores nubes, ideo tunc mo-  
 tio Australis sentietur.

Quod autem motiones hæ in mari magis spi-  
 rant à collateralibus plagis, nempe Austro-curo,  
 Euro-borea, vel vicinioribus plagis ad Boream &  
 Austrum, ejus causa videtur referenda vel in di-  
 versum locorum situm, in quibus nix & nubes  
 crassiores collectæ sunt, vel potius in generalem  
 ventum, qui admodum motiones illas in aliam  
 plagam trahere potest. Etenim cum generalis ven-



tus per se & ex sua natura tendat directe ab Oriente ad Occidentem, motiones autem istæ ab uno polo ad alterum tendant, inde oritur mutuum impedimentum, atque inde fieri potest, ut plagam intermediam inter Eurum & Austrum, vel inter Eurum & Boream ventus fortiatur. Motiones vero Austro-zephyrinæ & Borea-zephyrinæ inconstantes, raræ & debiles sunt, ideoque vix inter motiones numerantur, cum Boreas & Auster per accidens videantur interdum ad Zephyrum declinare, ad Eurum vero trahantur à vento generali. Ad reddendas autem causas de magna illa diversitate harum motionum in diversis locis requiruntur observationes magis accuratæ, & quidem non unius anni, sed plurium, cum annotatione temporum hyemalium, pluvialium, nivalium, montium illorum locorum, ex quorum plagis venti hi statim spirant, Lunæ quoque motum & phasin, quidque ea varietatis hic inducat, scire debemus.

2. Mense Julio & aliquot vicinis spirant australes venti ad promontorium viride Africæ (Ibi tunc hyems est pluviae nempe.) Atque hoc non aliam ob causam fieri videtur, quam ob eam, qua in nostra Zona Septentrionales spirant hyeme.

3. Ad promontorium Bonæ spei in Septembri Euro-boreas fiat.

4. Ad Patanen (regnum est & urbs ejusdem nominis in India trans Gatem) mensibus Novembri, Decembri & Januario continua pluviae & ventus Euro-boreas, sed reliquis mensibus ventus Orientalis perflat, & æstas est.

5. Circa Sumatram motionum mutatio fit Novembri & Decembri.

6. In insula *del Mayo*, una ex Azoribus sive salinis, in fine Augusti aspirat ventus vehemens ab Austro, & multas pluvias affert, quæ terram aliàs aridam

aridam  
germ  
nem

7.  
Sept  
venti  
inter  
& ob  
Propo  
ti sun  
auter  
verfa  
obser  
tione  
Jam c  
regio  
rum t  
ea ob  
sunt,  
tur m

Mo

1.  
& ad  
ciden  
mens  
& Au  
Occid  
tionu  
trione  
ciden  
& Zep  
Zeph

2.  
rienta  
Mart  
tem v  
siam

atidam humectant, & tunc primum gramen progerminat, quo hirci plurimi impinguntur ad finem Decembris.

7. In regno Congi Africae, medio Martio ad Septembrem (quo tempore hyems ibi est) spirant venti Boreas, Zephyrus & Borea-zephyrus, vel alii intermedii, qui cogunt nubes in fastigia montium, & obscurum aërem cum pluviis generant. (Vide Propos. sequ.) Sed à Septembri ad Martium venti sunt prioribus contrarii Auster, Eurus & Euro-auster aliique intermedii. Hasce statorum & anniverfariorum ventorum differentias desumimus ex observationibus nautarum, qui illos vocant Motiones, *Mouffons*, si in maris longo tractu spirent. Jam de causis illorum agendum esset, sed omnium regionum montes, nivium & colliquationis earum tempora, aliaque multa ignoramus: præterea observationes illæ nautarum non satis accuratæ sunt, ut sollicitam inquisitionem de causis videantur mereri.

Motiones celebriores sunt hæc:

1. In Oceano Indico inter Africam & Indiam, & ad ipsas Moluccas motio Orientalis versus Occidentem incipit cum Januario & spirat per sex menses usque ad Junii initium: Mense Septembri & Augusto incipit motio contraria, nempe venti Occidentales. Mense Junio, Julio & Augusto motionum est mutatio, & sævæ tempestates à Septentrione. Quando autem dicimus, Orientales vel Occidentales venti, intelligimus non tantum Eurus & Zephyrum, sed etiam collaterales, Euro-austriam, Zephyro-boream.

2. Ad littora vero variat admodum motio Orientalis, ita ut tantum à Januario usque ad finem Martii vel medium Maium naves ex India cis Gattem vel Malabarico littore solvant petentes Persiam, Arabiam, Mechem, Africamque; namque

cum fine Maii, & toto Junio, Julio & Augusto crebræ & vehementissimæ tempestates sæviunt, immiscente se frequenter vento boreali vel furente Euro-borea: itaque hisce mensibus nullæ naves abeunt ex India cis Gatem: sed in littore Indiæ trans Gatem; hoc est Orientali vel Coromandelio littore ignorant tales tempestates. A Ceilano insula, Java aliisque ad Moluccas instituitur navigatio mense Septembri, quia tunc incipit motio Occidentalis, impediens ventum generalem. Ubi tamen ad 15 gr. latitudinis Australis ab Æquatore receditur, non ita animadvertitur Occidentalis motio in Oceano Indico, sed generalis ventus Euro-auster vela inflat.

3. A Cocino ad Malaccam, hoc est ab Occidente in Orientem, instituunt navigationem in Martio, quia motio Occidentalis tunc ibi incipit, vel potius Zephyro-boreas frequenter spirat.

4. In regno Guzaratensi, hoc est, in India cis Gatem & littore hujus semisse anni spirant venti Septentrionales à Martio ad Septembrem: altera semisse Australes, & quidem sine crebra interpellatione ab aliis ventis facta.

5. Belgæ ex Java solvunt plerunque mense Januario & Febuario, ubi Europam repetere volunt: navigant tunc vento Orientali usque ad 18 gr. latitud. Australis: hic incipit spirare Auster vel Austro-eurus, quo navigant usque ad S. Helenam.

6. Etsi in Oceano Indico à Januario usque ad Junium sit motio Orientalis, & dein ab Augusto ad Januariam motio Occidentis, nihilominus in diversis ejus partibus quando ab uno loco ad alium est navigandum, diversa tempora censentur magis vel minus commoda, propterea quod venti collaterales magis vel minus spirant, vel minus aut magis vehemens est motio illis temporibus, vel alii venti crebro aut raro se immiscunt illo

tem-

tem  
gatu  
ad M  
Japo  
7  
cum  
riabi  
rien  
8  
dict  
tus  
Zep  
nu  
Q  
diu  
etia  
vel  
9  
Ind  
tur  
Go  
Jul  
Infi  
nov  
1  
ptu  
ster  
in  
sen  
dir  
ult  
fed  
spi

tempore. Ideo aliam motionem observant navigaturi à Cocino ad malaccam; aliam à Malacca ad Maccou Chinæ emporium, aliam à Maccou ad Japoniam.

7. Ad Bandam Insulam cessant Occidentales cum fine Martii: atque ad finem Aprilis variabiles & malaciæ: Cum Maio incipiunt venti Orientales vehementes & cum pluvia.

8. Ad Ceilanum Insulam circa promontorium dictum Puncto Gallo, die xiv Martii primus ventus Occidentalis, nempe *West-zuyd-west*, dein Zephyro-auster in fine Martii constans & continuus usque ad 1 Octobris. Tunc Euro-boreas & *Ost-nord-ost* incipit, qui ad Martium usque medium spirat ibi. Sed interdum diebus decem vel etiam pluribus, venti hi statim sive motiones serius vel citius adsunt.

9. In itinere à Mozambique Africae ad Goam Indiae mense Maio, Junio, Euro-austri dominantur usque ad Æquatorem, sed ab Æquatore ad Goam Zephyro-austri & Austri mensibus quoque Julio & Augusto, & sequentibus.

10. In gradu 35 Elevationis Meridiani, qui per Insulam Tristan de conha transit, mense Maio in novilunio furit Zephyrus.

11. Ad  $2\frac{1}{2}$  latitudinis borealis, in mari septuaginta miliaribus à Guinea, ventus Euro-auster dominatur à xx Aprilis ad v Maii (sed non in littore vel ipsa Guinea): post quintum Maii sentitur etiam idem ventus ad 3 gr. &  $3\frac{1}{2}$  latitudinis.

12. Ad insulam Madagascar, à xv Aprilis ad ultimum Maii ventus Boreas & Zephyro-boreas: sed in Febuario & Martio ab Oriente & Austro spirant venti.

13. Mense Martio & Aprili in tractu Telluris



& maris ab insula Madagafcar ad promontorium Bonæ spei ventus Boreas & Boreæ collateralis ad Eurum spirat continue, ita ut pro miraculo habeatur, si duobus diebus spiret Auster vel Euro-auster.

14. Post xx Aprilis in mari de Bengala ventus Auster vehemens est: ante illum diem vigent Zephyro-austri & Zephyro-boreas, illique impetuosi.

15. Motio pro navigatione à Malacca ad Maccou mense Julio, Octobri, Novembri, Decembri, nempe Austri venti, & Austro-zephyrus, sæpe quoque Euro-auster. In Junio vero & Julio initio faviunt Zephyri circa Malaccam & in mari Chiniensi.

16. Motio, qua à Java ad Chinam navigant, ( ab Occidente in Orientem ) incipit cum Maio mense.

17. Motio, qua à China in Japonem navigatur ( ab Occidente in Orientem ) viget mense Junio, Julio, nempe Zephyro-auster; interpellant autem crebro Boreas & Boreæ collateralis ad Eurum, idque in primis de die: de nocte vero interpellant Euro-auster & Austri primus collateralis ad Eurum.

18. Contraria motio, nempe à Japone ad Maccou ab Oriente in Occidentem est in Februario & Martio, nempe Eurus & Euro-boreas, sed hi in mari non dominantur, sed ad littora Chinæ, quæ navigantes in itinere suo à Japonia observant: vocant eos, *windt over land*.

19. Motio, qua navigatur à Philippinis vel China ad Americanæ Hispaniæ portum Aquapulco, nempe venti Occidentalis flatus, mense Junio, Julio & Augusto observantur, sed admodum debiles, nisi in plenilunio: sunt autem Zephyro-austri: vitant autem Zonam Torridam, sed Americanæ Septentrionalis littora legunt ad vitandum  
ventum

ventum generalem ab Oriente, qui tamen tunc minus vehemens est. Id enim in genere sciendum est, Motiones Occidentales five Zephyri flatus esse debiliores motionibus Orientalibus: quia hæc juvantur à vento generali, illi imminuuntur ab hocce.

20. In mari Chienfi motio Austrina & Austrozephyrina Julio, Augusto, Octobri, &c. Si hi venti in Orientalem commutentur, nunquam statim ad Austrum redeunt, sed primo ad Boream, hinc ubi aliquot dies spirarint, redeunt ad Orientem, & denique ad Austrum: interdum tamen Euroboreas immediate mutatur in Zephyro-austrum, interdum à Borea statim ad Austrum, idque satis hic frequens est.

Sic in mari se habent anniversarii venti constantes, quibus addo illos, qui minus sunt constantes, & illos qui in littoribus vel etiam maritimis locis observantur anniversarii.

PROPOSITIO IV.

*Etesia, venti anniversarii in Græcia, oriuntur à nivibus & pluviiis resolutis in montibus.*

Duplices Græci observarunt in singulis annis statos ventos, quos Etesias appellavere, nempe 1. æstivos, five caniculares, quos generali vocabulo appellaverunt Etesias, quia validiores sunt & magis sensibiles. 2. hybernos, quos vocarunt Chelidionios, five Ornithias.

Etesia caniculares, sunt aquilones seu boreales, in quorum initio ad diem certum constituendo Scriptores dissentiunt. Aristoteles cum post solstitium æstivum eos spirare dixisset, nihil addidit de vero tempore, magna certe negligentia, quam auxit deinde, ubi ornithiarum mentionem faciens tam tempus quam ventorum horum plagam omisit: Caterum, qui annotarunt Etesiarum tempus,

illi prodromos illorum vel ad sextum Julii mensis diem, vel ad xv Julii, initium spirandi facere cum Caniculæ ortu annotarunt, stare autem illos per quadraginta dies caniculares, atque ideo cum Augusto desinere illos, sed alii ad medium Septembrem extendunt: spirant autem tantum de die, nocte cessant, neque matutine surgunt, ideo nautæ olim illos vocarunt somniculotos & delicatos.

Causa horum ventorum proculdubio est resolutio nivium in montibus Septentrionalibus facta à Solis magno actu, qui tunc temporis maximus est, propterea quod jam per aliquot menses continue fere illos montes sine occasu illustravit. Atque cum hac causa apte consentit, quod Etesis nocte cessant, nempe quia tunc cessat nivium resolutio, vel minor saltem est, quam generatio venti requirit, propterea quod Sol tunc Horizonti nimis vicinus sit vel etiam omnino occidat.

Idem hic canicularis Boreas non tantum in Græcia, sed etiam in Thracia, Macedonia, mari Ægeo, ejusque insulis (quas omnes regiones sub Græciæ nomine aliquando comprehendi non ignoro), imo in Ægypto quoque & Africa, atque verisimile est, eum quem in regno Congi (ultra Æquatorem sito) spirare diximus priori propos. à Borea inter Martium & Septembrem, eum, inquam eundem esse cum hisce Græcorum Etesis, vel saltem ab eadem causa foveri: sicut etiam illum Boream, quem eisdem mensibus diximus spirare in regno Guzaratensi à Martio ad Septembrem, nimirum hunc à resolutis nivibus montium Asiæ, quos Sarmaticos appellaverunt & orbis cingulum, provenire statuendum, & ideo inter motiones recensuimus illum.

Secundus anniversarius ventus Græcorum est Chelidonium, vel avicularis, quem incipere post  
bru-

brumam scripserunt, sed initii diem non annotarunt. Sunt autem hi australes (cancularibus contrarii) & admodum debiles, sine omni visu: præterea inconstantes & minus continui. Unde mare placidum reddunt, & avibus hybernis, quas Chelidones vocant. Aristoteles eos per vices spirare refert usque in mediam æstatem, donec Etesia canicularis, aquilones nimirum, incipiant, sed minus sensibiles esse.

Horum ventorum causa itidem est resolutio nivis in montibus Lunæ Monomotapæ, quos nivosos appellant Lusitani, quas nives Sol liquefacit & rarefacit, quoniam in nostra & Græciæ hyeme ibi æstas, Sole australem Zodiaci partem permeante. Atque hic etiam ventus in regno Congi, Ægypto, mari Ægeo, similisque in regno Guzaratensi deprehenditur, sed per multo plures menses, cum in regno Congi & Guzaratensi incipiat cum Septembri, & spiraret usque ad Martium.

Græcorum anniversarius est, quem ornithias vel avicularem vocarunt, emque post æquinoctium vernali Sole ascendente ad Europæorum verticem spirare dixerunt.

PROPOSITIO V.

*Cur in Italia, Gallia, Germania, Persia, aliisque regnis Etesia non spirant? præsertim cum viciniora sint montibus Septentrionalibus, à quibus Etesia Græcorum, Congi, Guzarata, &c. oriri & spirare asseveravimus?*

Dubium non leve habet hæc quæstio: & sane optarem magis accuratas habere de hoc negotio observationes, nempe annotationes ventorum qui eo tempore in singulis regnis observantur, an singulis annis nunquam iidem redeant, namque in Galliæ parte Aquitanix anniversarium esse aliquem ventum meminisse me legisse aliquando.



Si quid tamen dicendum est ad quaestionem, hæc videntur mihi esse commoda: Primo, in canicularibus nostris Boream sæpe flare non est negandum. Secundo, quod minus continue neque singulis annis sentiatur, causa fortassis est aliorum ventorum crebri flatus, qui illius perceptionem impediunt. Tertio dici posset, montem à quo prima incipit nivium resolutio, situm esse directe è Græcia, atque ideo primum ventum canicularum huc ferri, vapores vero è reliquorum montium nive huc ferri, propterea quod hic jam liberam viam factam reperiant. Sed hæc meas extemporaneas cogitationes libenter rejiciam, ubi meliorem causam & accuratiores observationes videro.

#### PROPOSITIO VI.

*Venti quidam proprii sunt & fere perpetui alicui loco vel tractui Telluris, alii cessantes.*

Paucissima loca Telluris sunt, quæ ventum aliquem perpetuo tempore experiuntur, hæc nimirum.

1. Loca Zonæ Torridæ, præsertim maris Pacifici & Æthiopici partes in Zona ea sitæ fruuntur perpetuo vento, Orientali nempe vel ejus collateralis, quem generalem vocari, diximus Propositione 11, ubi prolixè egimus de illo. Imo hic ventus non tam inter proprios est numerandus, quam omnibus locis communis statuendus; quandoquidem per accidens fit, quod in omnibus locis non sentitur, nimirum quia alii venti spirant fortius. Causa ejus loco citato allata est.

2. In littoribus Peru regni & partis Chili, atque adjacenti vicino mari ventus perpetuus fere est Auster, & collateralis ejus ad Zephyrum. Incipit ad 46 gradum latitudinis atque perflat ultra Pannam Isthmi Americani, atque efficit, ut paucis diebus

diebus  
auro  
mul  
aute  
tus  
pere  
tur,  
esse  
bus  
solu  
cion  
mos  
bus  
tur,  
quo  
vent  
Aust  
gent  
aust  
3  
circa  
adm  
& q  
clin  
Neq  
dent  
ad l  
taliu  
nisi  
bibu  
li il  
se ex  
renc  
4  
ann  
solu  
Ima

diebus naves à Lima ad Panamam argento atque auro onustæ perveniant : sed à Panama ad Limam multorum dierum navigatione opus sit. In mari autem à littoribus Peru remoto non spirat hic ventus. Causam hujus venti reddere difficile est, propterea quod Terra Australis, ex qua spirare videtur, nondum cognita nobis est. Verisimile tamen esse puto, quod in ea quidem perpetuis recti nivibus montes reperiantur, ex quarum continua resolutione venti hi generentur. Sed nolo hic suspicionibus vel conjecturis meis lectorum inficere animos. Fortasse enim nives, quæ in excelsis montibus ad fretum Magellanicum toto anno reperiuntur, causa sunt horum ventorum, sed id obstat, quod montes illi ab Austro versus ortum jacent, venti autem hi spirant à plaga versus Zephyrum ab Austro declinante: relinquamus itaque hæc diligentiori inquisitioni vel majori cognitioni Terræ australis.

3. Ad littora Terræ Magellanicæ sive *del fuego* circa fretum *le Maire*, continui fere, vel saltem admodum frequentes, spirant venti Occidentales, & quidem cum impetu, ita ut arbores quoque inclinent versus ortum à perpendiculari reſtitudine. Neque est ulla pars Telluris in qua toties illi Occidentales spirent, sed ab altera parte freti *le Maire* ad littora terræ Australis spirat Auster. Occidentalium illorum causam aliam reddere nequeo, nisi quod existimem eos excitari à nivibus & nubibus in Terra Australi, quæ à latere Occidentali illius freti, ab Austro versus Septentrionem se extendit. Dubia hæc sunt & diligentius inquirenda.

4. In littoribus Malabaricis Indiæ toto fere anno Boreas & Zephyroboreas spirant. Causa à resolutione nivium in montibus Sarmatiæ Asiaticæ, Imao, Caucaſo, vel à nubibus in montibus aliis

Aliis

Afix congregatis & suppositum aërem prementibus petenda est.

5. In mari prope Guineam frequens est Zephyro-boreas, in remoto Euro-boreas.

6. Medio itinere inter Japoniam & Liampo, urbem maritimam Chinæ, usque ad hæc semper reperiuntur venti Occidentales, qui in Japonia spirant mense Novembri & Decembri.

7. Ad insulam Guoton non procul ab insula *dos Cavallos* in mari Chinensi ventus australis frequens est, cum in vicino mari Borealis dominatur.

#### PROPOSITIO VII.

*Ad periodicos seu statos ventos pertinent illi quoque quos diales appellavimus, qui in quibusdam regionibus & certo anni tempore, singulorum dierum quibusdam horis spirant.*

Sunt autem illi duplices deprehensi, & quidem tantum in locis quibusdam maritimis. Quidam enim spirant è locis mediterraneis ad littora versus mare: alii contra à mari ad littora. Illos vocant Lusitani *Terreinbos*, item, *vento di terra*, Belgæ *Landswindt*: hosce *viracoins*, *windt uyt de Zee*.

1. In Malabarico littore tempore æstatis, nimirum à Septembri ad Aprilem spirant venti terrestres sive *Terreinbos* ab hora duodecima noctis ad duodecimam diei, nimirum Orientales venti, neque sentiuntur in mari ultra decem milliaria. Sed à duodecima diei ad duodecimam noctis spirat marinus ventus sive *Viraconus*, nempe *Zephyrus*, verum hic admodum debilis est, ut vix ejus beneficio naves possint littora attingere. Illorum Orientalium à XI I noctis ad XI I diei causam esse puto partim generalem ventum, partim nubes in montibus Gatis: Occidentalium vero à XI I diei ad XI I noctis spirantium è mari causam esse nubium

bium resolutio per occidentem Solem facta, quæ nubes antea per ventum Orientalem versus Occidentem erant coactæ. Hæ sunt meæ conjecturæ. Extra vero dictos illos menses dominatur ibi Boreas, Eurus & Euro-boreas. Neque propter tempestates crebras sentiuntur lenes hi terrestres & marini venti.

2. In Coromandelii littoris urbe Masulipatan incipiunt spirare *Terreinos* cum primo die Junii, durant tantum quatuordecim dies, & tunc abeunt inde naves. Sed hi potius ad Motiones referendi sunt, quia quantum ex verbis nauticæ descriptionis conjicere possum, illi terrestres per illos dies ibi sunt continui, neque marini succedunt.

3. In littore Americanæ seu Novæ Hispaniæ ad Pacificum mare spirant venti terrestres media nocte: sed marini de die.

4. In regno Congi & in provinciis ad Lopo Consalvo spirant terrestres à vespere per noctem: marini mane incipiunt, atque ita calorem diei minuunt.

5. Subsolani quoque venti qui ante Solem & cum Sole Oriente spirare deprehenduntur singulis diebus in omnibus locis præsertim mari, nimirum quando ab aliis ventis quies est, præsertim in Brasilia, ubi singulis diebus matutino tempore. Causam explicare non est difficile. Vel enim generalis venti particulam esse dicemus, vel Solem crassiores aëris per noctem densatas particulas discutere & rarefacere.

6. Pertinent etiam ad diarios ventos Etesiarum Græcorum, & Chelidonii.

7. In littore Camboiensi à Varella ad Pulo Catta, à vicesimo octavo Julii ad quartum Augusti sæpe spirant terrestres & marini venti successive singulis diebus, quia tunc motiones ibi cessant,  
&



& malaciam faciunt. Terrestres sunt Zephyrus & Zephyroboreas: marini autem collaterales Euri, qui in Boream transeunt, statim ad Austrum reflectuntur, tunc malacia succedit, donec terrestres iterum spirare incipiant, qui tamen in mari non ultra duo milliaria à littore sentiuntur.

8. Reperiuntur quoque terrestres illi & marini venti ad Havanam nocte spirantes in America.

### PROPOSITIO VIII.

*Quo propius ad aequatorem ab Arctico polo acceditur, eo venti Septentrionales minus vigere apprehenduntur, & superato Aequatore in parte Terra Australi vigent venti Australes, qui in hisce locis frigidi sunt & sicci, praesertim in Chili & Peru.*

Causa utriusque est eadem, quia à locis polaribus veniunt. Reperiuntur tamen in Septentrionali Tellure venti australes, & in australi Septentrionales.

### PROPOSITIO IX.

*Ex dictis hactenus constat, Ventorum differentias esse quatuor.*

1. Communes, qui omni tempore & omni loco spirant, nisi impediuntur ab aliis; qualis est unicus, nempe Generalis.
2. Proprios, qui omni tempore, sed tantum in certo loco vel tractu Telluris, non in omni.
3. Qui multis locis, sed non continue sive omni tempore; ut sunt motiones, anniversarii & diarii venti quidam.
4. Qui nec omni tempore nec plurimis locis.

### PROPOSITIO X.

*Venti quidam subitanei sunt & impetuosissimi, non diu durantes.*

Tales sunt Prester, Typhon, Turbo, Exhydrias, Ecnephas. Hi venti quibusdam locis sunt anniverfarii, quidam locis quibusdam in mari magis frequentes.

Prester dicitur impetuofus ventus cum fulgure feu flamma erumpens. Raro tales obfervantur, & vix folitarius fine ecnephia. Seneca autem presterem dicit effe typhonem feu turbonem cum incenfo aere.

Ecnephas dicitur fubitanuus & impetuofus ventus prorumpens ex aliqua nube vel nebecula; Tales ecnephiae crebri funt in mari Aethiopico inter Brafiliam & Africae procurrentem, inprimis ad promontorium Bonae Spei, & ab altero Africae latere ad Terram de Natal, item ad Guineam fub Aequatore. Nautae eos vocant *Travados* vocabulo Lufitanico, Latinis dicitur procella: fed graecum vocabulum eft aptiffimum. Quibusdam etiam anni menfibus in quibusdam maribus magis frequentes.

Nubecula illa, & interdum plures nubeculae atrae & fubnigrae manifefte à nautis confpiciuntur, coire paulatim & augeri, & quidem caelo fereniffimo, antequam prorumpat ventus: atque ideo cum eas vident, illico vela colligere & navem contra mox affuturam favitiam munire debent. Sed antequam nubecularum harum naturam & prognoficon didicerant nautae pelagus iftud ingreffi, pluribus navibus exitio fuit, quod primi experti funt Lufitani, quandoquidem hi primi ex Europaeis Oceanum Aethiopicum navigaverunt. Etenim cum patefacta per Gammam India, Rex Lufitanus novam claffem, & quidem majorem, nimirum tredecim ingentis alvei & majoris formae navium fub Praetore Caprali illuc ablegaffet anno millefimo & quingentefimo, haec prima omnium ex Europaeis delata eft ad Brafiliam ingenti Lufitanorum gaudio.

Hic

Hic cum aliquo tempore nempe per Aptilem mensem hæssissent, solverunt inde mense Maio versus Promontorium Bonæ Spei: sed favissimam ab ecnephia, cujus signum etsi videbant, tamen ignorabant, tempestatem experti sunt, quam Maffeus ita descripsit: A Brasilia ad Bonæ Spei promontorium immani trajectu leucas numerant fere mille ducentas (mille circiter Germanica milliaria); Oceani favientis, ventorumque furentium ea præcipue regna sunt. In id spacium audacius quam feliciter ingressis Maio mense Lusitanis, flammeus Cometes horribili specie in decimum usque diem continenter apparuit. Jamque variante sæpius caelo, pelagoque, atræ ac sordidæ nubes ad Septentrionem conglobatæ, omnem in se flatum quasi reciprocando collegerant: mare languidum erat, insidiosâ tranquillitas. Nautæ locorum atque tempestatum ignari, ad auram undique captandam totos velorum expanderant sinus: Cum ex iis, quas dixi, nubibus, universo repente impetu sese effundens Aquilo transversas quatuor naves, quarum ad contrahendum minus apte fuerant armamenta disposita, inspectantibus cæteris, momento ita evertit, obruitque, ut è tanto hominum numero nemo prorsus evaserit. Saluti reliquis fuere vel demissæ raptim antennæ, vel ubi id non licuit, vela ipsa vento disrupta. Deinde, Borea pertinaciter fiante pelagus identidem intumescere, fluctus modo ad astra ferri, modo ad tartara pene ima subsidere: salum ipsum interdium piceo, noctu igneo colore terebat. Viginti ipsos dies tempestat atrocissima tenuit, &c.

Hactenus Maffeus. Inprimis autem tali ecnephia (*Travados*) infame est Promontorium Bonæ Spei.

Est non procul ab eo littore excelsus mons non in apicem desinens, sed planitiem in fastigio habens

bens instar mensæ, unde Belgæ illum vocant, *den Tafel-berg*. Ab illo fastigio ecnephias frequentissime prorumpit ingenti cum impetu & mirabili prognostico. Etenim celo serenissimo existente & mari placido nubecula conspicitur super illam montis mensam consistere, quæ adeo parva est, ut vix granum hordei: deinde juglandem nucem æquare videatur, unde Belgæ vocant Oculum bovis, Lusitani *Olho de Boy*, quoniam huic similis esse dicitur illa nubecula. Deinde mox augetur, atque extendit se super totam planitiem montis, quod Belgæ vocant, *de tafel word gedeckt*, quia narrant, quod non aliter hæc appareant ac si mensa sterneretur & cibi varii in patinis apponerentur. Tum vero illico ecnephias prorumpit è montis illo fastigio, tanto quidem impetu, ut naves imparatas & non munitas, præsertim si vela expansa sint, obruat & in tartara præcipitet. Sed nautæ jam cautiore facti, ubi oculum illum bovis viderunt, statim recedunt à littore, quantum possunt, & vela dein colligunt, aliisque utuntur ad tuendas naves artificiiis. Neque enim unquam fallit hoc prognosticon: ideo ferale convivium fugiunt. Eodem modo ad terram de Natal ecnephias furit, præcedente oculo bovis, quo multæ naves perierunt: Et toto tractu inter illam terram & promontorium Bonæ Spei. In Delphinatu quoque Gallix non procul à Vienna mons altus est, in cuius vertice stagnum, unde tempestas omnis in his locis oriri videtur. In ejus vertice procreatur nebulosa exhalatio, quæ statim futura tonitrua aut imbres prænotat.

In mari sub Æquatore inter Americam & Africam, atque in vicinia Æquatoris frequentes sunt tales ecnephix & *Travados*, præsertim illis mensibus, quibus nulli venti ibi continue & constantes spirant vel admodum rari, nempe fere per totum



tum annum, imprimis mense Aprili, Maio, & Junio (in aliis mensibus rarior est) atque admodum insignes sunt ad littora Guineæ: Lusitani, ut dixi, vocant *Travados*, quam vocem Belgæ quoque retinent: incolæ Guineæ vocant *Agremonte*. Illi frequenter ingruunt, ter vel quater in uno die, mox cessant, nimirum sesquialteram plerunque horam dominantur, sed primus impetus est vehementissimus. Erumpunt ex atris & sordidis nubeculis cælo serenissimo & mari quieto existente, unde nautæ eos affuturos conjiciunt. Eorum adminiculo nautæ plerunque superant Æquatorem, quia alii venti continui ibi sæpiuscule desunt, præsertim tribus illis mensibus; neque navibus adimunt navigandi potestatem excepto primo impetu.

Sed in mari, quod vicinum est ei parti Africæ, in qua regnum Lowango situm est, ecnephias frequens est mense Januario, Febuario, Martio, Aprili. Atque in aliis locis Africæ alios observat menses. Sic ad promontorium Africæ veteribus dictum *Aromata*, hodie *Guardafu*: non procul à faucibus maris rubri, mense Maio singulis annis sævit boreas & vehementissimus ecnephias.

Namque sciendum est, quod sicut venti quidam minus impetuosi sunt anniversarii, ita quoque tempestates & ecnephiaë anniversarii sunt certis locis. Tali ecnephia non procul ab illo promontorio perit Prætor Lusitanus Sodreus, anno cdo 10v circiter, qui præmonitus ab Africanis noluit optimis consiliis obtemperare.

Sed in faucibus hisce Arabici maris, ut etiam in Arabia & Æthiopia, peculiaris & mirabilis interdum ecnephias accidit: nimirum densa & atra nubes mixta cum flammeis nubeculis instar candentis & resplendentis camini (horrendum visu) tenebras inducit dici, mox erumpit procella, cujus  
tamen

tamen savitia mox sedatur, sed rubram arenam ingenti copia ejicit in terram atque mare, ita ut Arabes asserant, aliquoties contigisse, ut arenales tales procellæ obruerint annuos illos mercatorum & peregrinantium cœtus vel comitatus cum ipsis Camelis (*Caravanen* vocant, vel *Cassilam*; nimirum singulis annis bis vel semel mercatores ex variis Asiæ partibus in Syria congregati, ex Alepo proficiscuntur in Arabiam, ad 6000 personæ, quia propter crebra Arabum latrocinia & viæ molestias non audent solitarii iter capeßere: quod itidem ex India in Chinam & Tartariam faciunt); atque inde volunt existere Mumiam Arabum & Ægyptiorum, nimirum corpora illa arenis obtecta magno Solis æstu exsiccantur. Oritur autem ille ecnephias à plaga Septentrionali, in qua Rubrum mare extenditur, atque ideo verisimile est, cum in littore illius maris magna copia reperiatur talis arena, quod vî venti in sublime rapiatur atque inde rubicundum illum colorem in nubibus existere, atque deinde arenam è nubibus ejici.

Talem etiam arenalem ecnephiam oriri in Libya propter copiosos illius arenæ cumulos non est vero absimile, & jam antiquis innotuit de hac re, qui ideo difficilem accessum ad templum celeberrimum Jovis Ammonis in Libya esse scripserunt, neque Mumia generationis modus illis omnino ignotus fuit. In India regno Guzarath nubes arenosas vel pulvisculorum ingentem copiam continentes (qui propter fervorem solis elevati sunt) sæpe viatores opprimere autor est Twistius Belga, qui ibi diu vixit.

Jam de causis hujus venti procellosi, nempe unde ecnephias existit, dicendum est. Ex nube eum erumpere manifestum est. Duo autem modi sunt, quibus à nube talis ventus videtur posse generari. Primus si nubes sua gravitate deorsum ver-

gens aërem magno impetu elidat, sicut experimur, si vela passa decidant, commoveri inde cum impetu aërem. Atque inde fit, ut quo minor apparuerit nubecula sive oculus bovis, eo major sequatur tempestas, nimirum, quia nubes altior est, & ideo parva apparet: demittens autem se ab altiori loco vehementius elidit aërem. Alter generationis modus est, si spiritus in nube inclusus repente erumpat, vel propter aliquem ignem sive sulphuream materiam ex nubibus angustâ factâ viâ & aliis effugiis prohibitis vapor elidatur, sicut ex vase angusti orificii aquam continente, si calefiat, prorumpit ventus. Sed prima causa videtur verisimilior.

#### PROPOSITIO XI.

*Exhydrias dicitur ventus ex nube prorumpens cum magna aqua copia.*

Germani vocant eïn Wetstenbruch. Parum differt ab ecnephia, nisi quod nubes illa, ex qua prorumpere videtur, in aquam jam densata sit & ab aliis circumstantibus nubibus tamdiu sustentata & forte à ventis in unum coacta, donec gravitate sua deorsum ruat, aëremque elidat, unde magnus ventus existit. Sed rari sunt exhydriæ: ipse tamen ecnephas plerunque habet comites pluvias & imbres sive potius nimbos: ideoque ab exhydria tantum differt secundum magis & minus. Nimbus enim nihil aliud est, nisi ventus cum impetuosa pluvia, ideo generalior est quam Ecnephas. Exhydrias autem plerunque perpendiculariter à vertice decidit.

#### PROPOSITIO XII.

*Typhon dicitur impetuofus ventus cum celeritate per omnes plagas circumcirca locum aliquem vagans, ac plerunque desuper à vertice irruens.*

Sarā-

Saraceni vocant Olifant, Indi Oragan. Frequens est in Orientali Oceano, imprimis in mari Sionis, Chinenfi & Japoniæ (inter Malaccam & Japoniam). Is ex Occidentali ferme plaga violentus erumpens, & rapida vertigine circa Horizontem rotatus, assiduis incrementis horarum circiter viginti spatium circulum conficit; impetu horribili, saxisque turbinibus vasta illa æquora vehementissime commovens, decumanis undique fluctibus insurgentibus, qui inter sese velut arietantes atque collisi omnem salutis spem navigantibus adimunt. Et tum propter typhones hocce, tum propter procellas alias, navigatio ex India in Japoniam periculosissima est, ita ut faustam censeatur iter, si ex tribus navibus una cursum tenuerit. Autumni maxime tempore furiosissimus typhon dominatur sæpe tanto impetu & rabie, quantam qui oculis non subjecerint, animo concipere non possint, ita ut mirum non sit, quasvis ingentes ac validas naves immensis fluctibus verberatas laxatis compagibus labefactari: dicas, cælum & terram chaos velle repetere.

Nec tantum in mari, sed in littoribus quoque furit, multasque domos prosternit, ingentes arbores radicitus evellit, magnas naves ex mari in Terram ad quadrantem miliaris propellit.

Nautæ vocant, *de windt drayt rond-om het compas*. In Indico Oceano raro ultra sex horas dominatur. Mare autem primo ita planum sternit, ac si dolabra lævigatum esset, sed mox horribiles sequuntur fluctus. Ita circa urbem Ardebil in Persia, mensibus Junio, Julio, singulis diebus Sole meridiem occupante turbo oritur durans ad unam horam, quo pulvis ingens excitatur.

Causa typhonis proculdubio est, quod ventus magno impetu ex aliqua plaga erumpens versus aliam, in hac reperit impedimentum, atque ideo



in seipsum contorquetur & circumagitur, sicut videmus aquam celeriter motam, si obstaculum ei obijciatur, ibi in gyrum quasi celeriter & cum impetu circumagi. Potest etiam esse ut ab oppositis ventis simul impetuose spirantibus oriatur typhon, qui superficiem maris ita planam reddant & naves medias comprehendant. Si desuper irruat, dicitur *Cætegis*: & tunc mare primo planum redditur ac si scopis purgatum esset, sed mox decumani insurgunt fluctus.

### PROPOSITIO XIII.

*An venti quidam ex ipsa Tellure, Terra nimirum vel aqua, erumpant?*

Id quidem fieri posse facile comprehendimus. Etenim cum in Terra & fundo aquæ hinc inde sint cavitates, sint quoque spiritus, substantia sulphurea & humor, nihil obstat, quin flatus ibi satis vehemens generetur, nempe si prohibeatur paulatim ut genitus est, exire vel si statim magna copia, quantum venti requirunt, generetur.

Si autem exitus prohibeatur, generatur terræ motus, vel spiritus violento impetu sibi viam facit & Terram protrudit. Sic in Mauricis insulis sæpe è terra erumpit fumus: sic è specubus quibusdam. In Japonia fons est ingenti cum strepitu certis diei horis erumpens.

E mari erupisse ventum, non memini me legisse.

### PROPOSITIO XIV.

*An ventus quidam oriatur à fluxu maris & fluviorum?*

Testatur experientia, quod in illis locis, ubi fluxus & refluxus maris sentitur, si quando aër ab aliis ventis liber est, plerunque cum affluente aqua ex mari etiam ventus ex mari spiret. Verisimile

simile itaque videtur, aërem propter contiguitatem moveri vel rapi cum aqua in eandem plagam. Sed diligentius hoc observandum est, an aëre quieto cum affluxu maris perpetuo sentiatur is ventus. Futo tamen aliam quoque ejus venti posse dari causam, nimirum quod aër pellitur è loco ab affluente aqua: movetur autem aër multum ad levem impressionem. Sic volunt aërem moveri cum fluviis celeriter currentibus, ut Zaire, Rheno, &c.

## PROPOSITIO XV.

*Cur ignes fatui, Castor, Pollux, Helena existant inter tempestates?*

Lusitani vocant, *Corpo Santo*; Hispani, *Sant Elmo*: Belgæ, *Vrede-vyer*. Non autem una tantum, sed sæpe plurimæ hinc inde in navibus ad malos conspiciuntur, vagantes incerto motu, ut alii ignes fatui, etsi aliquando velis & malis insidere videantur: sed plerunque saltantes sursum & deorsum sine ulla intermissione similem præbent flammam, ac obscure ardens candela. Si quinque tales candelæ vicinæ conspiciantur, vocantur à Lusitanis, *Cora de nostra Senhora*, *Corona Dominae nostræ*, hoc est, *Mariæ*, atque hæc pro certissimo signo habent cessaturæ mox tempestatis. Causa illorum ignium est pars sulphurea & bituminosa per magnum illum aëris motum deorsum pulsâ & in unum coacta atque incensâ per agitationem vel congregationem. Ita videmus per agitationem lactis butyrum separari. Ex hoc phænomeno quoque colligitur, quod tempestates illæ sævæ plerunque fiant à sulphureo spiritu nubes rarefaciente & commovente.

## PROPOSITIO XVI.

*Cur tam frequens malacia est in mari prope Gui-*

neam & sub Equatore in mari Atlantico inter Americam & Africam?

Est hoc unum ex phænomenis circa ventos non parvæ difficultatis, quod ad Guineam, quæ duobus gradibus abest ab Equatore, & sub ipso Equatore perpetua fere fit malacia, inprimis mense Aprili, Maio, Junio, ubi motiones nullæ ibi reperiuntur, cum tale quid in aliis Oceani partibus sub Equatore fitis non sit observatum. Ecnephias quidem quibusdam temporibus satis frequens ibi est, sed interdum hic quoque desideratur à nautis, quoniam frequentium ecnephiarum impetu solent conari Equatoris transnavigationem. Accidit non raro, ut naves Indiam ex Europa petentes integram mensem detineantur ad Equatorem, antequam transire cum possint. Inprimis autem Guineæ littora fugiunt, & maliciam, atque ideo cum dispendio itineris Brasiliam versus navigant. Imo quædam naves per tres menses hic detentæ sunt, antequam in medium Oceanum à littore recedere possint. Causam phænomeni nondum inveni, nisi fortassis hæc sit, quod in Africæ inter Guineam & Barbariam interceptæ nullis montibus nives reperiuntur, quæ flatus continuos generent.

#### PROPOSITIO XVII.

*Quibusdam regionibus tempestates anniversariae sunt.*

Hujus exempla jam dedimus in prioribus propositionibus quædam, nempe 1. de mutatione motionum. 2. de ecnephia. 3. de typhone. 4. ad promontorium Bonæ Spei mense Junio, Julio. 5. in insula *del Maio* cum fine Augusti Austriæ. Hisce adde 6. tempestatem ad Tercera mense Augusto. 7. In 35 gr. meridiani Tristan de Cunha, mense Maio in novilunio ventus Zephyrus furit &

& absorbet naves. Sed in 33 gr. ejusdem meridiani Boreas & Euro-boreas. 8. In Junio & Julio in mari Chinesis ad Pulon Timor venti Zephyri impetuosi & periculosi. 9. Inter Chinam & Japonem multæ procellæ à novilunio Julii ad XI r diem Lunæ. 10. Ibidem si in mense Julio alii venti præter motionem spirent, modo ab hac, modo ab alia plaga, donec confiterint in Euro-boreali plaga, certo ingruit tempesta.





GENERALIS  
GEOGRAPHIÆ  
LIBER SECUNDUS.

DE

*Affectionibus locorum Telluris à motu stellarum  
apparente dependentibus.*

CAPUT XXII.

*De præcognitis hujus doctrina.*



Astenus in absoluta Telluris contemplatione occupati fuimus, jam accedimus ad secundam hujus doctrinae partem, in qua proprietates seu affectiones illas considerabimus, quæ Telluri à motu Solis atque stellarum apparente accidunt, neque essent, nisi motus ille appareret, quarum explicatio majori jure ad Geographiam pertinebit, si ipsi Telluri motus ille tribuendus sit, de quo cap. VI. diximus. Ad illas recte intelligendas requiritur cognitio sequentium Definitionum & hypothesisum.

*Definitiones.*

1. *Globus terrestris* artificialis dicitur globus factitius, ex cujus superficie partes Telluris, earumque situs ita repræsentantur, sicut in ipsa Tellure existunt, juxta proportionem hujus superficiem ad superficiem Telluris.

*Mappa* five *Tabula Geographica* dicitur figura plana, in qua partium superficiem terrestris situs  
repræ-

representatur. Estque universalis vel particularis. Illa quæ totam superficiem Telluris exhibet, hæc quæ unam vel alteram regionem.

Præterea quædam mappæ sunt rectilineæ, aliæ curvilineæ. illæ, in quibus circulorum terrestrium peripheriæ representantur lineis rectis. Hæ, in quibus per curvas lineas eadem peripheriæ exhibentur. Cæterum de compositione tam globi terrestris quam mapparum Geographicarum docebimus in fine libri, quia ea intelligi nequit, antequam doctrina, quam trademus, intellecta sit.

2. *Poli Telluris* dicuntur duo puncta in superficie ejus per diametrum opposita, quæ in diurna circumrotatione immobilia manent, vel quæ poli apparentis syderum quotidiani motus subjacent. Axis autem Telluris dicitur diameter polos connectens. Vel ita: *Axis Telluris* dicitur ea Telluris diameter, circa quam diurnus motus stellarum vel ipsius Telluris perficitur. Poli autem Telluris dicuntur puncta extrema axis in superficie globi terrestris.

Et ille polus, qui sideri uræ subjacet, dicitur Arcticus & Septentrionalis: alter dicitur Antarcticus & Australis. Hæc multo facilius per globum artificialem terrestrem, quam per verba, explicantur. Si ille circumrotetur, conspicientur duo illa puncta immota, quæ poli sunt, & diameter, per imaginationem ab uno polo ad alterum per centrum Telluris ducta, erit axis.

3. *Aquator* dicitur peripheria circuli maximi in globo terrestri ab utroque polo æqualiter distans, sive medio loco inter polos sita, sive cujus poli sunt iidem, qui poli Telluris: Dicitur etiam Linea æquinoctialis. Nautæ vocant, lineam, *de lineæ*, per excellentiam; unde phrasis, *de lineæ passæren*, quando æquatorem transeunt. Omnes stellæ motu diurno describunt peripherias æqui-

distantes seu parallelas *Æquatori*; ideo *Æquator* est regula motus diurni.

4. *Paralleli Æquatoris* dicuntur peripheriæ minores, quæ *Æquatori* parallelæ sunt. In globo artificiali *Æquator* magnitudine præ reliquis conspicuus est, & ipsum nomen ascriptum, divisusque est in 360 gradus. Paralleli quoque conspicui sunt, qui etiam dicuntur circuli latitudinis locorum, ut sequenti capite docebimus.

In Mappis quoque Geographicis Universalibus hæc ostendi possunt. In rectilineis quidem, poli non representantur, sed cuiusvis meridiani extremitates poli sunt: in curvilineis autem Mappis poli sunt illa puncta, in quibus concurrunt curvæ lineæ. *Æquator* in utrisque Mappis transversus per medias transit & latitudinem majorem præ reliquis habet, estque linea recta (etsi in particularibus *Asiæ* atque *Europæ* curva fiat). Paralleli *Æquatoris* in rectilineis Mappis sunt lineæ rectæ, in curvilineis curvæ.

5. *Ecliptica* dicitur circulus cæli maximus, quem Sol annuo motu describit, sive in cælo designat. In Tellure quidem non existit, sed propter insignem usum in globo artificiali, ut etiam Mappis Geographicis, denotatur.

6. *Tropici* dicuntur duo *Æquatoris* paralleli, qui tanto intervallo ab *Æquatore* distant, quantus est maximus Solis recessus ab *Æquatore* versus polos, sive quanta est maxima Solis declinatio vel *Eclipticæ* obliquitas.

*Tropicus Cancris*, qui inter *Æquatorem* & *Polum Arcticum* jacet; *Tropicus Capricorni*, qui inter *Æquatorem* & *polum Australem*.

In Globo & Mappis notari solent duplici peripheria, & ipsa appellatio ascripta est. *Polares* circuli dicuntur duo paralleli, quorum unus à *polo Arctico*, alter ab *Antarctico* distat tot gradibus,

elbus

Et

Æcus

Ci

tis lo

cis al

7.

dicitu

cum

autem

ortus

bifeca

Th

trung

In

ducti

locor

omni

neus

quicu

neun

dianu

In

summa

va, q

8.

citur

parte

etiam

distin

bo ar

in qu

servit

doce

plicit

H.

satia

ibus, quot Sol in maximo recessu ab Æquatore. Et prior dicitur circulus Arcticus, alter Antarcticus.

Circuli hætenus explicati non dependent à certis locis, quales sunt sequentes, qui in diversis locis alii atque alij sunt.

7. *Meridianus loci* alicujus in superficie Telluris dicitur linea per locum illum transiens, in quam cum solvenit, meridies illo in loco est. Meridies autem dicitur momentum diei, quod à tempore ortus atque occasus solis æqualiter abest, sive diem bifecat in æquales partes.

*Theorema. Meridianus cujusvis loci transit per utranque polum Telluris.*

In globo per denos quosque gradus Æquatoris ducti sunt Meridiani, qui sunt omnium illorum locorum meridiani, per quæ transeunt. Sed pro omnium locorum meridianis inservit is, qui æneus est, in quo globus pendet, nimirum si locus quicumque in globi superficie adducatur ad æneum meridianum, erit hic illius loci meridianus.

*In mappis rectilineis, meridiani sunt recta linea à summo ad imum ducta. In curvilineis sunt illa linea curva, qua in polis coeunt.*

8. *Horizon loci* alicujus in superficie Telluris dicitur, circulus maximus in cælo conceptus qui partem cæli visibilem in illo loco terminat. Dicitur etiam rationalis Horizon, ut à visibili Horizonte distinguatur, qui improprie ita appellatur. In globo artificiali non habet locum, sed ligneus circulus, in quo globus cum æneo meridiano sustinetur, inservit pro cujusvis loci Horizonte, ut sequ. capite docebitur, ideoque dicitur ligneus Horizon, & simpliciter Horizon.

Hæ sunt Definitiones, quarum cognitio necessaria est ad sequentem doctrinam: præter illas



quoque ex Astronomia scire oportet modum motus solaris & stellarum.

1. *Motus primus & communis* dicitur is, quo Sol, Luna atque omnes stellæ spatio vigintiquatuor horarum circumvolvi circa Tellurem, nobisque oriri, meridiem agere atque occidere videntur. Singulæ stellæ atque Sol singulis diebus hoc suo communi motu videntur describere circulos parallelos Æquatori: quia motus hic fit super axem Telluris & polos ejusdem, & ideo Æquator est circulus maximus hujus motus, & regula atque norma, per quam reliquorum parallelorum motus metimur. Singulis horis quindecim gradus tam Æquatoris quam cujusvis paralleli transeunt per meridianum, quia 360 gradus divisi inter horas 24 dant singulis horis quindecim. Itaque hora una & quindecim gradus Æquatoris faciunt paria. Horas indicat cyclus horarius, qui in globo artificiali affixus cernitur a neo Meridiano, ubi index extremitati axis Telluris adharet & in cyclo horario circumducitur ad indicandas horas.

2. *Motus Solis proprius & secundus, item annuus*, dicitur is: quo Sol movetur (sive id Tellus faciat) ab Occidente in Orientem, sive contra primum motum. Tempus sive numerus dierum, quibus Sol redit ad punctum unde digressus fuit, sive quibus integram periodum seu circuitum perficit, dicitur annus. Sunt autem dies 365 & una quarta diei circiter. Via hujus secundi solaris motus dicitur Ecliptica, ut antea diximus, quæ dividitur in duodecim partes, quæ signa dicuntur. Etenim Astronomi observarunt illa sydera seu constellationes cæli, per quas via ista solaris transiret, & ab istis constellationibus denominarunt duodecim Eclipticæ partes, & quia constellationes hæ sunt omnes animalium, ideo ipsam illam viam seu Eclipticam vocarunt veteres Zodiacum. Sed qui distinctius

finct  
Zona  
Eclip  
que  
prop  
quen  
habe  
descr  
decli  
gradu  
latitu  
parte  
omn  
extra  
quan  
hare  
per c  
quas  
V<sup>21</sup>  
Arie  
E<sup>21</sup>  
Libr  
ph  
Arci  
corn  
que  
stant  
& 3  
Æqu  
rum  
ratic  
exist  
cis,  
num

finctius loquuntur, Zodiacum vocant fasciam seu Zonam in cælo, cujus medium quidem sit ipsa Ecliptica seu orbita solis, at extremitates ab utraque Eclipticæ parte octo gradibus ab ea distent, propterea quod reliqui etiam planetæ motum quendam proprium ab Occidente in Orientem habeant, quo quidem motu non ipsam Eclipticam describunt, sed orbitas aliquantum ab Ecliptica declinantes, quæ declinatio quia non superat octo gradus, ideo Zodiaco attribuunt sedecim gradus latitudinis, nimirum octo ab utraque Eclipticæ parte, ut ita Zodiacus sit illud cæli spatium, in quo omnes planetæ semper versantur, neque unquam extra illud: Ecliptica vero linea media Zodiaci, quam Sol annuo motu describit, & in qua semper hæret. Porro signa illa cæli seu constellationes, per quas Ecliptica & Zodiacus transit, sunt hæc, quas duo versicali comprehendunt: Sunt

$\gamma$ <sup>21</sup> Mart.    ♈    II    ♊<sup>21</sup> Jun.    ♋    ♌  
 Arius, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,  
 $\epsilon$ <sup>21</sup> Sept.    ♍    ♎    ♏<sup>21</sup> Decem.  
 Libraque, Scorpius, Arcitenens, Capet, Am-  
 phora, Pisces.

Arcitenens dicitur alias Sagittarius: Capet, Capricornus: Amphora, Aquarius. Porro Ecliptica oblique secat Æquatorem, ita ut maxima ejus distantia sive puncti remotissimi distantia sit 23 gr. & 30 min. circiter. Ubi itaque Ecliptica secat Æquatorem, quod fit in duobus punctis, in illorum uno statuitur Eclipticæ initium & numerationis principium signorum. In illis punctis Sol existens facit diem nocti æqualem in omnibus locis, atque veris & autumnii initium. Fit autem numerationis initium ab eo puncto, in quo Sol

nobis ( hoc est ab Æquatore versus polum Arcti-  
ctum sitis ) verisfacit principum , & primum si-  
gnum sive prima pars duodecima Eclipticæ dicitur  
Aries ; secunda , Taurus ; tertia Gemini , &c. juxta  
ordinem , quo in versiculo sequuntur , quoniam  
olim , ante viginti secula circiter , signa illa cæli erant  
in hisce Eclipticæ partibus , à quibus jam excesserunt : appellatio tamen manet , nullâ habitâ stella-  
rum illarum ratione .

Singula ex duodecim hisce partibus seu signis di-  
viduntur in triginta gradus . Etenim tota Ecliptica  
habet 360 gradus , qui si dividantur inter 12 , acci-  
pient singuli triginta .

Præterea cum Sol totam Eclipticam ( hoc est 360  
gradus ) percurrat diebus  $365 \frac{1}{4}$  , inde colligitur ,  
quod singulis diebus progrediatur 59 min. 8 sec.  
hoc est paulo minori via , quam unius gradus , pro  
quibus tamen assumimus integrum gradum , ubi  
numerus dierum non est magnus , neque accuratâ  
inquisitione opus est , ut plerunque facimus , quan-  
do animi tantum causa ista tractamus .

Quemadmodum autem Sol toto anno , hoc est  
duodecim mensibus , percurrit totam Eclipticam ,  
hoc est omnes duodecim partes seu signa Zodiaci ,  
ita singulis mensibus unam absolvit circiter par-  
tem seu unum signum , sed ingressus ejus in signa  
non incidit in mensium initium , sed in vicessi-  
mum primum circiter diem mensis cujusvis juxta  
Calendarium Gregorianum , vel undecimum diem  
juxta Calendarium vetus Julianum , nempe die  
xxi Martii , Arietis signum vel ipsam sectionem  
Eclipticæ cum Æquatore ingreditur , dein xxi  
Aprilis Taurum , & sic porro . Non quidem in sin-  
gulis mensibus incidit ingressus iste in vicessimum  
primum diem , sed in quibusdam ante hunc , in  
quibusdam post . Ideo ubi accuratum locum solis  
scire desideramus , petendus is erit vel ex epheme-  
ridi-

ridib  
rizon  
locus  
rest  
cont  
absq  
ex vi  
temp  
Nim  
rum  
Dein  
Juni  
veni  
H  
quod  
men  
cunc  
Mart  
signo  
lis in  
Juni  
inter  
num  
vige  
dent  
abil  
vero  
oster  
tes c  
pe e  
re S  
tes,  
quo

ridibus, vel calculo, vel Tabulis vulgaribus. In Horizonte quoque ligneo globi artificialis reperitur locus Solis ad singulos anni dies, ubi inquiri potest, quando globus in promptu habetur. Qui vero contenti sunt cognitione, quæ facilis sit memoriæ, absque libris, etsi aliquantum à vero abluat, illi ex vigesimo primo dici cujusvis mensis poterunt ex tempore deducere locum Solis pro quovis alio die. Nimirum firmiter memoriæ infixere debent signorum ordinem, ut antea posuimus, sunt Aries &c. Deinde mensium ordinem, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Julius, Augustus, September, October, November, December, Januarius, Februarius.

Hiscæ memoriæ infixis & præterea illo signo, quod Sol ingreditur vigesimo primo die unius mensis, cognoscere poterunt locum Solis ad quemcunque anni diem. Etenim si sciant, quod die XXI Martii Sol ingrediatur arietem, inde juxta ordinem signorum & mensium concludent, quod XXI Aprilis ingrediatur Taurum, XXI Maii Geminos, XXI Junii Cancrum, &c. Pro diebus itaque intermediis inter vigesimum primum unius mensis & vicini numerandi erunt tot gradus in signo illo, quot in vigesimo primo diem propositum proxime antecedente Sol ingressus est, quotus dies est propositus ab illo vigesimo primo. Ita inveniatur locus, qui à vero non multum aberit. Exercitium facillimum ostendet hanc esse methodum; ideoque adolescentes oportet crebro usu hæc memoriæ infixere. Turpe enim est, literatum & doctum hominem ignorare Solis motum, cum ab eo omnes anni tempestat, dies noctesque atque alia multa dependeant, quorum in vita humana maximus est usus.



## CAPUT XXIII.

## De locorum latitudine &amp; elevatione poli.

## PROPOSITIO I.

**L**atitudo loci in superficie Telluris dicitur distantia ejus ab *Æquatore*.

Hanc autem distantiam metitur perpendicularis linea vel arcus à dato loco ductus ad *Æquatorem*. Et quoniam meridianus cujusvis loci est perpendicularis ad *Æquatorem*, ideo latitudo loci est arcus meridiani ejus loci interceptus inter eum locum & *Æquatorem*.

*Latitudo* autem *Telluris* dicitur extensio ejus in superficie ab uno polo ad alterum: sicut *Longitudo Telluris* dicitur extensio ab Occidente per Orientem ad Occidentem rediens, quæ est ipsa æquinoctialis linea. Sed nullus harum definitionum usus est, & præstare illam homonymiam tollere è *Geographia*. Alia est significatio horum vocabulorum, cum alicui regioni attribuuntur. *Circulus latitudinis* loci alicujus dicitur parallelus per locum illum transiens.

## PROPOSITIO II.

*Elevatio poli* loci alicujus, sive supra *Horizontem* loci alicujus, dicitur arcus meridiani caelestis illius loci, interceptus inter polum caelestem alterutrum & inter *Horizontem* illius loci.

Potest etiam dici, quod sit arcus meridiani terrestris interceptus inter polum alterutrum *Telluris* & *Horizontem*. Etenim hoc modo majori jure definitur, si *Terra* primum motum efficiat: sed *Astronomi* ad caelestem polum imaginarium definitionem plerunque accommodant.

PRO-

La  
grad  
ritudIn  
num,  
locumIn  
ducat  
rallat  
tantu  
termi  
indicaSi v  
aliqui  
circin  
in dat  
loci d  
cabit  
descri

Sim

Da

ut Hor

Dat

nume

num i

stituat

gneus

latio s

cebim

Lat  
supra

## PROPOSITIO III.

*Latitudinem loci in superficie globi dati invenire in gradibus & minutis (si magnus sit globus) eandem latitudinem in Mappis Geographicis.*

In Globo. Adducatur datus locus ad Meridianum, & numerentur gradus ab Æquatore ad illum locum. Illi erunt quæsitæ loci istius latitudo.

In Mappis Geographicis. Si Mappa sit rectilinea, ducatur per datum locum linea recta æquatori parallela, nisi jam in Mappa sit ducta: vel applicetur tantum regula loco, ita ut æquatori parallela sit. Sic terminus hujus lineæ in lateralibus Mappæ lineis indicabunt loci latitudinem.

Si vero Mappa sit curvilinea, neque parallelus aliquis per datum locum transeat, erit unus pes circini constituendus in polo Mappæ, & alter pes in datum locum; atque hoc intervallo parallelus loci describendus qui in laterali linea iterum indicabit latitudinem loci, si paralleli ex isto polo sint descripti.

Simul invenietur distantia loci à polo.

## PROPOSITIO IV.

*Dato loco in superficie globi, ita constituere globum, ut Horizon ligneus sit illius loci Horizon.*

Datus locus ad meridianum adducatur, & ab eo numerentur nonaginta gradus versus polum vicinum in Meridiano. Terminus numerationis constituatur in creña Horizontis. Sic erit Horizon ligneus loci propositi Horizon. Id tamen in Corollario sequentis Propositionis facilius expedire docebimus.

## PROPOSITIO V.

*Latitudo loci æqualis est altitudini sive elevationi poli supra Horizontem illius loci.*

Osten-

Ostenditur per globum ita: Assumatur locus pro libitu in superficie globi: dein constituatur globus ita ut Horizon ligneus fiat Horizon istius loci. Numerentur jam gradus latitudinis istius loci & elevationis poli. Æquales deprehendentur.

Per Mathematicam vero Demonstrationem ita ostenditur theorema: Sit C centrum telluris, L locus in superficie quicumque. P polus, erit HP LZ Meridianus, & H Z Horizontis diameter: PH elevatio poli. QT sit diameter Æquatoris, five sectio Meridiani & Æquatoris. Erit itaque PQ quadrans Meridiani, five 90 graduum, quia P est polus Æquatoris. Eandem ob causam LH arcus erit 90 graduum, quia L est polus Horizontis. Igitur LH arcus est æqualis arcui PQ, & ablata parte communi LP, erunt residui arcus PH, LQ æquales.

*Corollarium.* Cognita itaque latitudine loci alicujus, habetur quoque elevatio poli pro eodem. Distantia autem loci à polo & distantia ab Æquatore simul junctæ faciunt 90 gradus. Itaque unâ cognita innotescit quoque reliqua.

*Corollarium* I I. Dato loco in superficie globi, elevare polum ita ut hujus loci elevatio poli postulat. Hoc idem est cum eo, quod in Proposit. præced. proponebatur, facere ut Horizon ligneus fiat dati loci Horizon. Inveniatur primo latitudo loci, & hæc à polo numeretur in Meridiano deorsum versus Horizontem. Terminus numerationis constituatur in crena Horizontis. Ita polus elevatus erit, prout dati loci situs postulat.

#### PROPOSITIO VI.

*Dato loco in superficie globi, vel data loci alicujus latitudine, exhibere omnia Telluris loca, quæ eandem latitudinem vel distantiam ab Æquatore, five elevationem poli habeant. Vel: Invenire omnia*  
Tellu-

Telluris  
habeant

In  
num  
ridian  
acum  
bus ci  
quæ c  
cum c  
In  
linea  
quæ i  
to lo  
scriba  
ria tr  
quo a  
certus  
in pol  
neam  
lelus c

Inve  
trionis  
plano.

Var  
potest  
i.  
utitur  
mitate  
indica  
Quon  
nalem  
vero h  
cebim  
linea  
ciat,

*Telluris loca, qua datam distantiam ab Æquatore habeant.*

In Globo. Locus datus adducatur ad Meridianum æneum, vel numeretur ab Æquatore in Meridiano versus polum data latitudo. Deinde creta acuminata applicetur termino numerationis, & globus circumvolvatur. Ita creta describet peripheriam, quæ omnia illa loca continebit, quorum eadem est cum dato loco latitudo.

In Mappis rectilineis ducatur per datum locum linea recta Æquatori parallela. Omnia loca, per quæ illa linea transit, habebunt eandem cum dato loco latitudinem. In curvilineis Mappis describatur ex polo Mappæ tanquam centro peripheria transiens per datum locum. Sic eodem modo, quo antea, quæsitæ loca invenientur. Si vero non certus locus, sed latitudo detur, unus per circini in polo Mappæ collocandus, alter in lateralem lineam ad datam latitudinis gradum, & tunc parallelus describendus.

#### PROPOSITIO VII.

*Invenire lineam meridianam, sive plagam Septentrionis & Austri, in dato loco Telluris, sive in dato plano.*

Varii sunt modi, quibus quæsitæ linea inveniri potest.

1. Facillimus est modus, qui acu magnetica utitur. Etenim cum acus magnetica unâ extremitate Septentrionem, alterâ Austrum respiciat, indicabit illius extensio lineam meridianam. Quoniam autem in paucis locis ipsam Septentrionalem & Australem plagam respicit, in plurimis vero locis declinat ab eis, ut cap. xxxviii docebimus, ideo non accurate invenitur per illam lineam meridianam, sed tantum vicina, quæ etsi sufficiat, ubi non magni momenti est negotium, ad  
quod



quod illam habere cupimus, tamen in majoris momenti operibus magno errori causam præbere potest. Si tamen declinatio acus magneticæ à vero meridiano, nota sit per aliorum observationes (est autem in plurimis locis nota, præsertim illustrioribus), designabitur in dato plano linea meridiana satis accurate. Ducatur enim primo linea, quam acus magnetica monstrat: dein assumpto quovis puncto in hac linea, describatur ex eo tanquam centro peripheria circuli, in qua numerentur gradus declinationis acus incipiendo à ducta falsa linea meridiana, idque versus Orientem si data declinatio sit versus Occidentem; & contra, versus Occidentem, si data declinatio sit versus Orientem. Denique per terminum numerationis vel resectionis & centrum peripheriæ ducatur linea recta. Hæc erit vera linea meridiana.

Non opus erit hac opera, si pyxis nautica in promptu sit, in qua jam correcta sit declinatio acus magneticæ ad locum propositum: Solent enim qui instrumenta hæcce parant, signum Septentrionis, quod est lilium, non pingere supra locum ipsius acus magneticæ (quæ infra papyrus latet) sed tot gradibus ab ea remove, quantam cognoverunt esse declinationem acus in loco illo.

II. Beneficio stellarum accuratius invenitur linea meridiana. Primo, lucente Sole observetur hora duodecima, erectoque stylo umbra denotabit lineam meridianam. Sed quia horologiis non satis tutum est credere, ideo neque hic modus omnino accuratus est, veramque lineam monstrat, parum tamen à vera distantem.

III. Ducta peripheria in dato plano, erigatur stylus è centro ejus, & notetur terminus umbræ ante meridiem: vel notata primum umbræ extremitate describatur ex loco styli peripheria per umbræ extremitatem. Deinde tamdiu expectandum donec

donec  
eande  
bifari  
Hæc e

I  
co ob  
re line  
mo pe  
zonte  
tunc e  
tanqu  
inde p  
ne; l  
quadr  
vara a  
mul n  
tusque  
te, n  
cepti i  
Tot g  
scripta  
tum v  
rit, &  
culi d  
diana.

Faci  
tis ver  
ducatur.  
tur. r  
cus So  
tercep  
Austru  
ria del  
tionis  
ra line

donec post meridiem umbræ extremitas attingat eandem peripheriam. Arcus inter duo notata loca bifariam secandus est per lineam à centro ductam. Hæc erit ipsa Meridiana.

IV. Si nota sit elevatio poli sive latitudo in loco observationis, poterimus beneficio globi invenire lineam meridianam, hoc pacto. inveniatur primo per observationem altitudo Solis supra Horizontem: & ducatur in plano linea recta, in qua Sol tunc existere videtur, & sumto in ea quovis puncto tanquam centro describitur peripheria circuli: Deinde polus in globo elevetur pro data loci elevatione; locus Solis in Ecliptica pro dato die notetur; quadrans applicetur vertici, & in eo notetur observata altitudo Solis. Tunc globus atque quadrans simul moveantur donec punctum quadrantis, notatusque Solis locus conveniant. Globo ita manente, numerentur in Horizonte ligneo gradus intercepti inter Meridianum & quadrantem verticalis. Tot gradus abscondantur in peripheria antea descripta incipiendo à linea plagæ solis, versus ortum vel occasum, prout tempus observationis fuerit, & per terminum resectionis atque centrum circuli ducatur linea recta. Hæc erit vera linea meridianæ.

Facilior multo erit inventio & sine usu quadrantis verticalis, si observetur plaga, vel linea in plano ducatur, in qua Sol Oriens vel Occidens conspicitur. Descripto enim iterum circulo adducatur locus Solis ad Horizontem, & numerentur gradus intercepti inter locum Solis & Septentrionem vel Austrum. Totidem gradus abscondantur in peripheria descripta à ducta linea. Et per terminum resectionis & centrum ducatur linea recta. Hæc erit vera linea Meridianæ.

## PROPOSITIO VIII.

*Globum constituere, ut cardines ejus respiciant cardines Telluris, hoc est, ut meridianus æneus in vero loci meridiano situs sit.*

Inveniatur linea meridiana in plano illo, cui globus insidit, & globus ita constituatur, ut æneus meridianus lineæ meridianæ exacte superimmineat. Sic erit globus constitutus secundum plagas mundi. Vel, pyxis nautica imponatur pedimento globi, & globus cum pede tamdiu moveatur in plano, donec meridianus æneus & linea meridiana pyxididis in eodem plano existere deprehendantur. Sic iterum erit globus constitutus juxta plagas Telluris, hoc est ita ut Septentrio globi respiciat Septentrionem Telluris, Austrum Austrum, Oriens Orientem, Occidens Occidentem.

Potest etiam de Mappis Geographicis problema proponi (& in arte Nautica usus ejus est), nimirum illas in plano ita ponere, ut loca Septentrionalia Septentrionem Telluris, Australia Austrum, &c. respiciant. Solutio facilis est, si inventa sit linea meridiana in plano illo, vel si pyxis nautica accurata habeatur. Etenim linea Mappæ lateralis ponenda erit supra lineam meridianam plani. Sic Mappa habebit postulatum situm.

## PROPOSITIO IX.

*Latitudinem loci de celo observare, sive Elevationem poli supra Horizontem loci alicujus invenire, beneficio stellarum.*

Etsi latitudo loci in superficie Telluris existat, nempe distantia ejus ab Æquatore, tamen inveniri nequit sine stellis. Modi varii sunt.

I. Observetur altitudo Solis supra Horizontem, quando is in meridianam lineam venit, ejus-

ejusque  
rice su  
ad die  
Zodiac  
trion:  
latitud  
Solis  
inveni  
clinati  
enim  
notetur  
meridi  
cepti e  
diem.  
II.  
bi ita  
in qua  
xidem  
(requi  
Eadem  
gneo gl  
observa  
crena  
minusy  
veniat  
tio poli  
observa  
lutio. S  
lutione  
eam om  
vabitur  
No  
Arietis  
hæc me  
una &  
plaga ve  
his æqu

ejusque complementum sive distantia Solis à vertice sumatur. Ab hac auferatur Solis declinatio ad diem observationis, si quidem Sol in Australi Zodiaci parte hæreat, sed addatur, si in Septentrionali. Residuum vel aggregatus numerus erit latitudo loci vel elevatio poli. Declinatio autem Solis (distantia ab Æquatore) in die observationis invenitur ex loco Solis, idque vel ex Tabula Declinationis partium Eclipticæ, vel ex globo. Et enim in Globo locus Solis ad diem observationis notetur & ad meridianum adducatur. Gradus meridiani inter æquatorem & locum Solis intercepti exhibent Declinationem Solis ad datum diem.

II. Oriente vel occidente Sole; beneficio globi ita invenietur latitudo loci. Observetur plaga in qua Sol oritur vel occidit, quod nautæ per pyxidem suam vel compassum facere consueverunt. (requiritur autem ad id vera linea meridiana.) Eadem plaga vel gradus notetur in Horizonte ligneo globi. Locus etiam solis in Ecliptica pro die observationis notetur. Dein meridianus æneus in crena Horizontis eousque moveatur, polo magis minusve elevato, donec notatus locus Solis conveniat cum notato Horizontis puncto. Sic elevatio poli in globo erit eadem, quam locus habet, ubi observatio instituta est. Calculo accuratior erit solutio. Sed quia Sphæricorum Triangulorum solutionem pauci Geographiæ studiosi callent, ideam omitto, quod in sequentibus quoque observabitur.

NOTA. Tempore æquinoctiorum, ubi Sol in Arietis vel Libræ initio versatur, non habet locum hæc methodus, quia tunc omnibus locis Sol in una & eadem plaga oritur & occidit, nempe in plaga veri Orientis vel Occidentis, vel in plaga orientis æquinoctialis & occasus.



III. Lucente Sole in meridie, erigatur stylus AB perpendicularis super planum Horizontale, & longitudo umbræ AC atque ipsius styli AB in divisa aliqua linea sumatur. In Triangulo itaque rectangulo ABC erunt nota ambo crura AB, AC, unde invenietur distantia Solis à vertice angulus ABC nimirum si fiat, ut AB ad AC ita sinus totus ad tangentem anguli ABC. Ex hac invenietur latitudo loci, ut in primo modo dictum est. Si vero observatio sit instituta die æquinoctii, tunc ipsa inventa Solis à vertice distantia est latitudo loci.

Ita Plinius cap. 72. lib. 2. scribit, in urbe Roma nonam partem gnomonis deesse umbræ. unde elevatio poli colligitur 41 gr. 25 min. Carthagine gnomon ad umbram habet rationem, sicut 11 ad 7. Unde elevatio poli colligitur 32 gr. 13 min.

IV. Nocturno tempore, ubi stellarum adspectus conceditur, si instrumento capiamus altitudinem stellæ alicujus in meridiano existentis, & ex Tabula Declinationem stellarum cognoverimus, inde haud difficili opera inveniemus latitudinem loci seu Elevationem poli.

Etenim si stella illa sita sit inter verticem nostrum & æquatoris semicirculum nobis extantem vel elevatum, addemus.

Si declinatio stellæ fuerit Septentrionalis, & stella sita sit inter verticem nostrum & stellam polarem, subtrahemus à declinatione illa distantiam stellæ à vertice nostro: residuus numerus erit loci latitudo.

Si declinatio fuerit Septentrionalis & stella sita sit inter stellam polarem & proximam Horizontis partem, complementum declinationis addendum erit inventæ altitudini stellæ. Aggregatus numerus dabit latitudinem loci seu elevationem poli.

Si declinatio fuerit Septentrionalis, & stella

verfe-

verfetur  
zontis à  
clivatio  
comple  
erit lati

Dem  
renda  
vatz. R  
nem lo  
in stella  
dem de  
trionale  
inter A

trario m  
V. Si  
tur vel c  
neficio g  
ctum est

VI. S  
in prom  
lam aliq  
rum qu  
tem mar  
meridian  
duplex e  
hæc obf  
denda n  
Sic nanc  
vationer

VII.  
loci, sed  
tum à v  
dinem, c  
Ea enim

Loca

versetur inter verticem nostrum & partem Horizontis à polari stella remotam, addenda erit declinatio illa ad distantiam stellæ à vertice, sive ad complementum altitudinis. Aggregatus numerus erit latitudo loci.

Denique si declinatio stellæ sit australis, auferenda erit hæc à complemento altitudinis observatæ. Residuus enim numerus indicabit latitudinem loci. Neque in hoc casu varietas occurrit, sicut in stella Septentrionalis declinationis: quod quidem de locis inter Æquatorem & polum Septentrionalem fitis intelligendum est: nam de illis, quæ inter Æquatorem & polum Australem jacent, contrario modo se res habet.

V. Si observetur plaga, in qua stella aliqua oritur vel occidit, invenietur latitudo loci illius beneficio globi cælestis, non aliter ac modo tertio dictum est.

VI. Si tabula declinationis stellarum non sit in promptu, poterimus quæsitum obtinere, si stellam aliquam non occidentem observemus, nimirum quæ in tota circumrotatione supra Horizontem manet. Etenim illæ stellæ bis accedunt ad meridianum, & ideo altitudo meridiana earum duplex est, una major, altera minor. Utraque hæc observanda erit, & dimidia differentia addenda minori altitudini vel à majore auferenda. Sic nanciscemur quæsitam latitudinem loci vel elevationem poli.

VII. Si non accuratam quæramus latitudinem loci, sed contenti velimus esse tali, quæ non multum à vera recedat, sumemus stellæ polaris altitudinem, quando ea è meridiano longissime recessit. Ea enim fere æqualis est latitudini loci.

#### PROPOSITIO X.

*Loca Telluris in æquatore sita nullam habent latitudinem.*

T

titu-

titudinem vel elevationem poli, sed ambo poli in illorum Horizonte jacent. Locus sub polo habet latitudinem nonaginta graduum, nempe polum in vertice, Æquatorem in Horizonte. Loca inter polum & Æquatorem habent latitudinem minorem, quam nonaginta gradibus.

Manifesta est veritas hujus Propositionis: ideo probatione vel explicatione non eget.

PROPOSITIO XI.

Si in mari vel terra versetur, ignorantes locum in quo versamur, inventa autem sit latitudo loci: exhibere in globo illum parallelum, in cujus uno puncto constitutus esse certi esse possimus.

Fit eodem modo, quo in Propositione VI usum sumus, nimirum parallelus describendus erit ad datam vel observatam latitudinem. Hic parallelus est is, qui queritur. Idem in mappis facile est.

CAPUT XXIV.

De Divisione Telluris in Zonas, & apparentiis celestibus in diversis Zonis.

PROPOSITIO I.

A motu Solis proprio sive annuo eritur divisio quaedam superficiei Telluris in quinque partes, quas Zonas vocamus.

Etenim cum Sol non perpetuo permaneat in Æquatore, sed ab eo declinans describat motu suo Orbitam quæ Æquatorem secat, ita ut maxima declinatio sit 23 graduum cum dimidio tam versus Septentrionem ab Æquatore, quam versus Austrum, in qua declinatione describit Tropicum Cancris & Capricorni, inde fit ut non perpetuo verticalis sit locus in Æquatore jacentibus, neque ab aliis locis unam distantiam perpetuo servet, sed modo

modo  
que ca  
tum c  
mus:  
pis m

Zo  
cis atq  
sunt T  
quinq  
duz, E

Zo  
Tropic  
Temp  
polare  
quæ in  
Temp  
corni

Zo  
circa p  
que Zo  
Austra

Loco  
nor est q  
Quorun  
cu, nem

Quo  
min. 1  
in Zo  
30 mi  
in Ter  
major  
frigidis

Hæc  
rum Tr  
tradidi

modo vicinior modo remotior sit à certo loco, atque calorem, frigus, pluvias atque alias tempestatum conditiones varie mutet. Hæc quæ jam diximus, adolescentibus tam in globo, quam in Mapis monstrari possunt.

Zona itaque dicitur pars Telluris inclusa Tropici atque circulis polaribus. Quoniam autem duo sunt Tropici, & duo polares, inde efficitur ut Zonæ quinque sint, quæ dicuntur Torridæ, Temperatæ duæ, Frigidæ duæ.

Zona Torrida dicitur pars Telluris quæ inter Tropicum Cancræ & Tropicum Capricorni jacet. Temperatæ, quæ inter Tropicum unum & vicinum polarem jacent: & Temperata Septentrionalis, quæ inter Tropicum Cancræ & circulum Arcticum: Temperata Australis, quæ inter Tropicum Capricorni & circulum Antarcticum.

Zonæ frigidæ dicuntur illæ Telluris partes, quæ circa polos jacent usque ad circulos polares, suntque Zona frigida Septentrionalis & Zona frigida Australis.

### PROPOSITIO II.

*Loca Telluris, quorum latitudo vel elevatio poli minor est quam 23 gr. 30 min. illa jacent in Zona Torrida. Quorum latitudo est 23 gr. 30 min. illa jacent in Tropico, nempe in Torrida Zona extremitate.*

*Quorum latitudo major est, quam 23 grad. 30 min. minor vero quam 66 gr. 30 min. illa jacent in Zona Temperata. Quorum latitudo est 66 gr. 30 min. illa jacent in circulis polaribus, nempe in Temperatarum termino. Quorum latitudo est major, quam 66 gr. 30 min. illa jacent in Zonis frigidis.*

Hæc manifesta sunt ex Definitionibus circulorum Tropicorum & Polarium, quas capite XXI II tradidimus.



## PROPOSITIO III.

**ÆQUATOR** Telluris transit per loca hæc : Per insulam S. Thomæ in magno sinu Africa, qui Oceanus Æthiopicus appellatur: per Æthiopiam Africæ procurrentis partem : per Oceanum Indicum, per mediam Sumatram sive Taprobanen, per Chersonesum auream sive Malaccensem, aliasque insulas Oceani Indici, perque ipsas Moluccas : per Oceanum Pacificum : per Peruanæ provinciæ initium, per lacum Parimam, per Oceanum Atlanticum usque ad insulam S. Thomæ.

**ÆQUATOR** dividit Zonam Torridam in duas æquales partes, ut non immerito duæ Zonæ Torridæ dici possent, una Septentrionalis, altera Australis. Res clara est ex Definitione Zonæ Torridæ, Æquatoris, & Tropicorum.

**IN ZONA TORRIDA** jacent hæc loca : Maxima Africæ pars, Abassia, Oceanus Indicus, Arabiæ portio, Cambaia, India, insulæ Oceani Indici, Java, Ceilanum, &c. Peruvia, Mexicana Hispania, Oceani Atlantici magna pars, insula S. Helenæ, Brasilia, Nova Guinea:

**TROPICUS CANCRI** transit per loca hæc : Paulo ultra Atlantem montem in Occidentali Africæ littore, per confinia Libyæ aliaque Africæ interioris loca, per Syenen Æthiopiæ. Inde trajecto mari Rubro ultra montem Sinai & Meccam Mahometis patriam, Arabiam felicem transit : hinc ingreditur Oceanum Indicum, Persiæ extrema tangit, & pervadit Cambaiam, Indiam, Cambaiam vel Sinenfis regni terminos, donec perveniat in mare Pacificum, quo superato infra Americæ Chersonesum Californiam in Mexicanum regnum incidit, iterumque in Oceanum Atlanticum ingressus per sinum Mexicanum radit littora Cubæ insulæ, atque inde ad Occidentale Africæ littus redit.

TRO-

T  
loca  
pars  
proc  
pam  
Nov  
cam  
cum.  
IN  
T  
omnia  
(exce  
ni In  
Ocea  
IN  
LI  
ia, p  
teuris  
nz Sp  
portio  
fretur  
Pacific  
P  
transi  
Norw  
Lapp  
Tatta  
diam  
P  
cus  
lem,  
IN  
NA  
& La  
Zem  
trion  
IN

TROPICUS CAPRICORNI transit per loca admodum pauca in Terra, sed maxima ejus pars in mari jacet: nempe transit per Africam procurrentem sive Africæ linguam, Monomotapam, per Madagascar, per Oceanum Indicum, Novam Guineam, Oceanum Pacificum, Americam Peruvianam & Brasiliam, Oceanum Atlanticum.

IN TEMPERATA ZONA SEPTENTRIONALI jacent plurima Terra loca, eaque omnia fere nota & habitata, nempe tota Europa, Asia (exceptâ Indiâ, Chersoneso aureâ atque insulis Oceani Indici), Americæ Septentrionalis magna pars, Oceani Atlantici atque Pacifici pars.

IN TEMPERATA ZONA AUSTRALI jacent pauca Terra loca, eaque non omnia cognita, plurima vero maris pars: nempe pars procurrentis Africæ, Monomotapæ, promontorium Bonæ Spei, Terræ Magellanicæ seu Australis magna portio, Brasiliz portio, Chili, Magellanicum fretum, portio magna Oceani Atlantici, Indici, Pacifici.

POLARIS CIRCULUS ARCTICUS transit per mediam fere Islandiam, per supremam Norwegiam, per Oceanum Septentrionalem, per Lappiam, Sinum maris Russicum, Samoiedam, Tartariam, Americam Septentrionalem, Gronlandiam.

POLARIS CIRCULUS ANTARCTICUS transit per Magellanicam terram sive Austrolem, cujus hodie nihil cognitum habemus.

IN ZONA FRIGIDA SEPTENTRIONALI jacent, dimidia Islandia, pars Norwegiæ & Lappiæ ultima, Finmarchiæ, Samoiedæ, Nova Zembla, Gronlandia, Spitzberga, Americæ Septentrionalis incognita quædam.

IN ZONA FRIGIDA AUSTRALI

quid sit, terrane an aqua, ignotum est. Hæc, quæ hætenus dicta sunt, ostenduntur per globum & Mappas, probantur autem ex tabulis latitudinis locorum, quæ ex observationibus factæ sunt.

PROPOSITIO IV.

*Locis Telluris, quæ in ipsis Tropicis jacent, Sol quovis anno semel tantum fit verticalis in meridie. Locis vero in Zona Torrida jacentibus bis quovis anno fit verticalis, nempe duobus diebus, qui à longissimo die æqualiter distant. Locis vero extra Zonam Torridam atque extra Tropicos suis Sol nunquam sive nullo anni die, fit verticalis.*

Etenim cum Sol versatur in primo gradu Cancræ, quod fit die XXI Junii circiter, tunc describit Tropicum Cancræ in celo; atque quanto spatium hic Tropicus ab Æquatore cælesti distat, tanto spatium Tropicus Cancræ terrestris ab Æquatore terrestris distat, atque ideo Tropicus terrestris subjicitur cælesti, & Sol ideo verticalis fiet locis in Tropico Cancræ sitis. Locis vero in Tropico Capricorni eodem modo idem fiet die XX Decembris circiter, Sole Capricornum ingresso. Hæc ex globi inspectione manifesta sunt, ut etiam ex Mappis.

Sumamus jam locum in Zona Torrida jacentem; ostendendum est, quod Solei bis verticalis fiat in anno. Adducatur locus sumtus ad Meridianum, & applicatâ cretâ acuminatâ, circumvolvatur globus, ut parallelus loci illius describatur. Is secabit Eclipticam in duobus punctis, quæ æqualiter à primo gradu Cancræ vel Capricorni distabunt. Dico, quod Sol existens in hisce Eclipticæ punctis verticalis fiet sumto loco. Etenim parallelus, quem Sol his diebus describet, directe imminet parallelo loci descripto. Transibit itaque

que S  
illi fic  
vero  
in ma  
na no  
Qu  
picos  
tet, q  
ralliel  
& Fri

Lo  
anno  
non or  
sunt  
tegro  
Locis  
jacent  
èr  
aritur

Af  
da pr  
ci po  
illius  
ta ac  
polo  
ut cr  
lelur  
pund  
stabu  
bus i  
man  
puna  
ta ci

C

cren

que Sol per verticem loci illius, adeoque verticalis illi fiet in meridie duorum illorum dierum: aliis vero diebus nequaquam. Quod autem non nisi in meridie locis fiat verticalis, ex revolutione diurna notum est & perspicuum.

Quod vero locis extra Zonam Torridam & Tropicos sitis Sol nunquam fiat verticalis, id ex eo patet, quoniam nullus Solis parallelus imminet parallelo illorum locorum. Temperatis itaque Zonis & Frigidis Sol nunquam fit verticalis.

## PROPOSITIO V.

*Locis in Zona frigida alterutra sitis Sol quovis anno aliquot diebus non occidit, & totidem diebus non oritur, & quidem pluribus eo diebus, quo loca sunt polo magis vicina: ita ut in loco ipsius poli integro semestri non occidat, & altero non oriatur. Locis vero in ipso Arctico vel Antartico circulo jacentibus uno tantum die Sol non occidit in anno, & uno die non oritur, reliquis diebus occidit & oritur.*

Assumatur in globo quilibet locus Zone frigida pro libitu: & polus ita elevetur ut latitudo loci postulat, sive ut Horizon ligneus fiat Horizon illius loci, juxta Propos. cap. preced. Dein creta acuminata applicetur crenæ Horizontis, quæ polo elevato vicinior est, & circumrotetur globus, ut creta in eo designet aliquem Equatoris parallelum. Hic parallelus secabit Eclipticam in duobus punctis, quæ à primo gradu Cancris aequaliter distabunt, & Sol in his punctis Eclipticæ & omnibus intermediis existens non occidet, quod ex eo manifestum est, quoniam paralleli ejus in hisce punctis existentis manent supra Horizontem in tota circumrotatione.

Contra, si cretam acuminatam applices alteri crenæ Horizontis, & parallelus describatur, re-



periemus ea Eclipticæ puncta, sive eum arcum circa initium Capricorni, in quo dum Sol versatur, non oritur loco illi Zonæ frigidæ, sed manet infra Horizontem. Contrarium obtinet, si locus sumtus sit in Zona frigida Antartica.

Quod vero dictum est de locis in ipso Arctico vel Antartico jacentibus, ostenditur eodem modo. Nimirum polus elevandus est ad 66 gr. 30 m. ita Horizon ligneus erit Horizon cujusvis loci ex illis, quæ in Arctico circulo jacent. Et manifestum erit, quod Tropicus Cancræ non occidat, & Tropicus Capricorni non oriatur, sed quod tangant Horizontem: ideo Sol in primo gradu Cancræ existens non occidet, & in primo gradu Capricorni non oriatur, sed ambobus diebus radet Horizontem. In aliis vero gradibus Eclipticæ oriatur & occidet, quod conspicietur ex punctis Eclipticæ Orientibus & Occidentibus.

#### PROPOSITIO VI.

*Locus extra Zonas frigidas situs, hoc est in Temperata vel Torrida Zonæ, Sol singulis diebus oritur & occidit.*

Assumatur in globo aliquis locus pro libitu extra Zonas frigidas & polares circulos jacens, & polus elevetur juxta illius latitudinem, ita ut Horizon ligneus fiat illius loci Horizon. Si jam globus circumrotetur, conspicuum erit, quod omnia Eclipticæ puncta orientur & occidant, hoc est, quod aliquo tempore infra Horizontem depressa maneant, aliquo supra Horizontem existant. Sol itaque in illis punctis existens idem faciet.

#### PROPOSITIO VII.

*Dato loco in Zona Torrida sito, invenire duas illos anni dies, quibus Sol verticalis sit illi loco.*

Datus locus adducatur ad Meridianum æneum, atque

atque  
dinis  
bus,  
trans  
Hæc  
Sol e  
iraqu  
occup  
lis, ve  
runt  
tium,  
fict, u  
In  
facile  
Ete  
rallel  
pæ in  
in du  
scent.

Si v  
solver  
greder  
tam,  
nem l  
N e  
miner  
te & p  
co, qu

Da  
quibus  
orietu  
quibus  
eidem.

I N  
dianu

atque in hoc fiat signum creta, sive gradus latitudinis notetur supra locum. Deinde moveatur globus, donec unum & alterum Eclipticæ punctum transeat per hocce notatum Meridiani punctum. Hæc duo puncta notentur: sunt enim illa, in quibus Sol existens fiet verticalis dato loco. Inveniantur itaque dies anni, quibus Sol illa puncta Eclipticæ occupat, quod vel in Horizonte ligneo vel ex Tabulis, vel ex methodo capitis XXI I fieri potest. Illi erunt quæsitæ dies, quorum unus erit ante solstitium, alter post illud, quibus Sol loco illi verticalis fiet, ubi ad Meridianum accesserit.

In Mappis quoque Universalibus problema hoc facile dissolvitur.

Etenim per datum locum si ducatur linea parallela *Æ*quatori, recta vel circularis ex polo Mappæ in Curvilineis, hæc ducta secabit Eclipticam in duobus punctis: ex quibus dies anni innotescunt.

Si vero sine Globo & Mappis placeat problema solvere, nota debet esse loci Latitudo. Cum hac ingredi Tabulam Declinationis capite XXI I positam, & excerpe dies, quibus Sol talem declinationem habeat. Illi erunt quæsitæ.

**NOTA.** Hisce diebus ipsum Solis centrum imminet loci vertici, aliquot tamen vicinis diebus ante & post illos Sol adhuc videtur imminere illi loco, quia limbus Solis à centro distat.

### PROPOSITIO VIII.

*Dato loco in Zona Frigida sito, indicare illos dies, quibus Sol illi loco non occidet, & quibus diebus non orietur: item: diem primum & ultimum ex illis, quibus non occidit illi loco, vel, quibus non oritur eodem.*

**IN GLOBO.** Datus locus adducatur ad Meridianum & elevetur polus pro loci illius latitudine.

Dein circumrotato globo notentur iuxta crenas Horizontis puncta Eclipticæ, quæ non occidunt, & in altera crena, quæ non oriuntur. Ille itaque gradus, qui inter 1 gr. Arietis & 1 gr. Cancri existit, indicabit primum diem, quæ Sol illi loco non occidet: & alter gradus inter 1 gr. Cancri & 1 gr. Libræ diem ultimum. Et hisce diebus Sol rader Horizontem, manebit tamen supra eum, quod de centro Solis intelligendum est. Diebus autem intermediis perpetuo manebit supra Horizontem. Eodem modo illi dies inveniuntur, quibus in opposita anni parte Sol manebit infra Horizontem, dieque primus ac ultimus ex illis.

Faciliori quidem methodo per globum hoc fieri potest, sed minus manifestæ Demonstrationis, nempe quot gradibus datus locus à polo distat, totidem numerentur in meridiano ab Æquatore, atque terminus notetur ab utraque Æquatoris parte. Deinde observetur globo circumvoluto, quanam Eclipticæ puncta transeant per notata Meridiani puncta. Duo enim illa, quæ initio Cancri vicina sunt, atque arcus comprehensus, indicabunt dies perpetuæ moræ Solis supra Horizontem loci dati. Alter arcus inter puncta circa initium Capricorni indicabit dies perpetuæ absentis Solis seu delitescentis infra Horizontem loci dati.

IN MAPPIS. Latitudinis loci complementum sive loci distantia à polo numeretur in laterali Mappæ linea ab Æquatore versus utrumque polum, & describatur per terminum numerationis linea parallela Æquatori, sive rectilinea sive curvilinea mappa fuerit, ut in præcedentibus Propositionibus docuimus. Hæc ita ductæ secabunt Eclipticam singulæ in duobus punctis. Hæc puncta indicabunt diem primum & ultimum perpetuæ moræ Solis supra Horizontem, atque arcus interceptus omnes dies perpetuæ moræ. Contra altera  
linea

linea  
dies p  
tiz.

P  
fit it  
pleme  
que q  
loci,  
tuor d  
bet. I  
& xx  
bris e  
moræ  
moræ  
dii au  
infra

Qu  
Solis  
ponat  
qui q  
remot  
pticæ.

Da  
mappa  
rum u

Ex

juxta

IN

ridian

globu

transf

natâ a

locas

IN

tur,

linea in oppositis Eclipticæ punctis monstrabit dies perpetuæ Solis infra Horizontem delitescentia.

PER TABULAM DECLINATIONIS fit ita, si nota sit loci latitudo. Ingredere cum complemento latitudinis, tabulam Declinationis, atque quære eam declinationem, qualis est latitudo loci, quam quidem quater inuenies, & sume quatuor dies illos, quibus Sol eam declinationem habet. Duo ex illis, quorum unus inter XXI Martii & XXI Junii, alter inter XXI Junii & XXI Septembris est, sunt primus & ultimus perpetuæ Solis moræ supra Horizontem. Reliqui duo perpetuæ moræ infra Horizontem loci propositi. Intermedii autem dies erunt perpetuæ Solis moræ supra vel infra Horizontem.

Quæ dicta sunt hæcenus, intelligenda sunt de Solis centro. Quod si de extremo Solis limbo proponatur problema, sumendus erit locus in Mappis, qui quindecim minutis sit Æquatori propior vel remotior, vel quærendi erunt dies pro punctis Eclipticæ, quæ limbus Solis occupet.

#### PROPOSITIO IX.

*Dato die anni, inuenire illa loca Telluris in globo vel mappa, quibus Sol eo die verticalis sit in meridie, nimirum uni loco post alterum.*

Ex dato die inueniatur locus Solis in Ecliptica juxta methodum capituli XXI.

IN GLOBO. Adducatur locus Solis ad Meridiani punctum, quod ei imminet: Volvatur globus: sic omnia loca, quæ notatum punctum transeunt, sunt illa quæ quærentur. Vel cretâ acuminatâ applicatâ describatur parallelus: hujus omnia loca sunt quæsitâ.

IN MAPPIS. Locus Solis in Ecliptica notetur, & per eum ducatur parallelus Æquatoris re-



ctus vel curvus, prout Tabula rectilinea vel curvilinea fuerit. Sic omnia hujus paralleli loca erunt illa, quæ quæruntur. Debet autem in utroque Mapæ hemisphærio id fieri.

PER TABULAM Declinationis traditam capite præced. invenietur latitudo locorum illorum, nempe declinatio respondens dato diei, est illi latitudini æqualis.

PROPOSITIO X.

*Dato die anni, invenire illa Telluris loca, quibus Sol (centrum ejus) non occidit, ita ut dies hiece primus sit ex omnibus illis, quibus Sol non occidit in illis locis. Et illa loca invenire, quibus Sol non oritur: eadem cum conditione.*

Debet autem datus dies esse unus ex illis, qui inter XXI Martii & XXI Junii vel inter XXI Septemb. & XXI Decemb. cadunt.

Inveniatur primo omnium, locus Solis in Ecliptica ad datum diem: deinde reliqua fient ita.

IN GLOBO. Locus Solis in Ecliptica notatus adducatur ad meridianum, & quot gradus inter illum Æquatorem in meridiano sunt intercepti, totidem numerentur à polo versus Æquatorem: vel quot gradus inter locum Solis & polum sunt, totidem numerentur ab Æquatore versus polum. Terminus numerationis notetur creta vel parallelus ad eum describatur.

Omnia loca, quæ in hoc parallelo sita sunt, satisficient quæsito primo. Illa vero loca, quæ secundo loco quæruntur, erunt in parallelo ab altero polo æqualiter distante.

Ad demonstrandam veritatem solutionis, elevetur polus pro locorum inventorum latitudine.

Ita conspicuum est, quod Sol in notato Eclipticæ puncto existens non occidat infra Horizontem locorum illorum (qui jam est Horizon ligneus) in

in p  
occid  
ter p  
Sol  
illis

I  
num  
linea  
toris  
que  
ca in  
bus n

E  
veni

C

die a  
ultim

occid  
tus i

xxi  
illud

loca  
& to

Cap  
blem

L  
nar  
sura.

L  
pe 2

Tem  
Frigi

in  
quit

Zon

in punctis vero ante notatum Eclipticæ punctum occidet infra Horizontem. Præterea omnia loca inter polum & parallelum hunc jacentia habebunt Solem perpetuo apparentem illo die, sed non erit illis locis hicce dies primus.

IN MAPPIS. Declinatio loci Solis notati numeretur à polo versus Æquatorem in laterali linea, & per terminum ducatur parallelus Æquatoris. Omnia loca in hoc parallelo jacentia utriusque planisphærii sunt quæsitæ. Secundi quæsitæ loca in parallelo ab altero polo distantia eisdem gradibus reperientur.

EX TABULA DECLINATIONIS invenietur latitudo pro locis quæsitis.

*Corollarium.* Eodem modo solvetur hoc: Dato die anni, invenire loca Telluris, quibus ille dies ultimus est illorum dierum, quibus Sol non occidit illis locis. Debet autem datus dies esse situs inter XXI Junii & XXI Septembris, vel inter XXI Decembr. & XXI Martii. Possent hic etiam illud solvi: Dato numero dierum, invenire illa loca Telluris, quibus Sol tot diebus non occidit, & totidem non oritur. Sed reservabimus hoc ad Caput sequens, ubi commodior locus hujus problematis erit.

PROPOSITIO XI.

*Latitudinem & Magnitudinem singularum Zonarum supputare in milliaribus vel alia famosa mensura.*

Latitudo Zonæ Torridæ est 47 graduum, nempe  $23\frac{1}{2}$  ab utraque Æquatoris parte: Utriusque Temperatæ latitudo est 43 graduum. Utriusque Frigidæ Zonæ latitudo est 47 gr. Hosce gradus si in milliare commutes, æstimato uno gradu quindecim milliaribus Germanicis, erit latitudo Zonæ Torridæ milliarium 705.

Unius ex temperatis 645,

Unius ex Frigidis 705.

Magnitudinem vero, vel superficiem singularum Zonarum inueniemus per hanc proportionem, quam ex Geometricis deduxi: ut sinus totus vel radius cuiusvis circuli 100000 ad sinum 23 gr. 30 min., qui est ita superficies dimidia Telluris capite IV inventa, milliarium 0 ad superficiem dimidiæ Zonæ Torridæ milliarium quadratorum & proinde superficies totius Torridæ erit milliarium

Deinde, Ut sinus totus 100000 ad differentiam sinuum 23 gr. 30 min. & 66 gr. 30 min. ita dimidia superficies Telluris, milliarium ad superficiem unius Zonæ Temperatæ, milliarium quadratorum.

Si itaque dimidiæ Zonæ Torridæ atque integræ Temperatæ superficiem auferas à dimidia superficie Telluris, relinquetur superficies unius Frigidæ, milliarium statuunt quidem plurimi Astronomi, non esse constantem Eclipticæ & Tropicorum declinationem ab Æquatore, unde fiet ut Zonarum magnitudo non sit semper eadem, sed quia ea est exigua differentia, & prætereà à Tychone in dubium revocata, ideo non est necesse eam hoc loco considerare.

Postularet quidem locus, ut jam de tempestatibus in diversis Zonis & locis ageremus, sed quia quædam sequentis Capitis sunt, quæ ad rectius formandum iudicium faciunt, ideo illud interponere consultum duxi.

## CAPUT XXV.

*De longitudine dierum in diversis Telluris locis, & inde orta divisione Telluris in Climata.*

## PROPOSITIO I.

**D**obus anni diebus sunt æquinoctia sive nox æqualis diei in omnibus Telluris locis.

Dies illi sunt, quibus Sol Æquatorem ingreditur sive motu vel circumvolutione diurna describit, quod fit, quando primum gradum Arietis & primum Libræ ingreditur, nempe die XXI Martii & XXI Septembris juxta Calendarium Gregorianum. Hisce itaque diebus noctem diei æqualem fieri, nempe duodecim horarum, ostendendum est in omnibus Telluris locis. Dies autem hic denotat tempus moræ Solis supra Horizontem: nox moram infra Horizontem.

Assumatur in globo locus quilibet pro libitu, & polus elevetur pro illius loci latitudine, ita ut Horizon ligneus fiat illius loci Horizon. Deinde primus gradus Arietis vel Libræ collocetur in Horizonte Orientali, Index ad horam XI: cycli horarii. Circumvolvatur globus, donec primus gradus Arietis perveniat ad Occidentalem Horizontem. Videbis in cyclo horario Indicem duodecim horas transfuisse. Eodem modo de nocte manifestum fiet, quod duodecim horas habeat.

Vel sine cyclo horario, perspicuum est, quoniam Æquator est parallelus, quem Sol illis diebus peragrat, hunc in duas æquales partes secari ab Horizonte, ita ut pars extans supra Horizontem sit æqualis parti infra Horizontem. Sol itaque cum æquabili motu circumrotetur, æquales partes peragrat æquali tempore.

Et



Et quoniam locus Telluris pro lubitu assumptus fuit, ideo quod de uno hoc ostendimus, de omnibus verum est.

Locis vero sitis in ipsis polis Telluris, quæ tantum duo sunt, Sol neque orietur neque occidet illis duobus anni diebus, sed centrum ejus in Horizonte (qui idem hic est cum Æquatore) circumrotabitur, ut ita simul diem noctemque habeant. Cum enim in aliis locis terminus seu intermedium diei ac noctis sit momentum, ibi contra, integra revolutio sive dies naturalis est terminus sive medium perpetuæ apparentiæ Solis & perpetuæ delitescentiæ. Atque istis duobus diebus æquinoctiorum (xxi Martii & Septembr.) dimidius Sol supra Horizontem illorum duorum locorum, dimidius infra eum hærebit, & die quidem xxi Martii polo Arctico faciet initium longi diei sex mensium: die vero xxi Septembris erit initium longæ noctis totidem mensium, ut in sequentibus docebimus. Non itaque absurdum est, dari loca, ubi viginti quatuor horis nec dies sit nec nox. Placet hic plura enumerare quæ poli habent peculiaria præ cæteris locis Telluris, nimirum,

2. Sol integro anno semel tantum oritur, semel occidit, nempe in uno æquinoctio oritur illi, in altero occidit.

3. Non habent meridiem vel mediam noctem definito tempore, sed omnibus horis sive perpetuam meridiem habent sex mensibus, contra sex reliquis mensibus perpetuam mediam noctem.

4. Nullæ stellæ fixæ oriuntur, nullæ occidunt, sed quædam perpetuo supra Horizontem manent, quædam semper infra eum. Hasce nunquam vident, si qui sunt ibi incolæ, quod verisimile non est: illas semisse anni integro, quo Sol infra Horizontem est, conspiciunt, nisi nubes vel alia meteo-  
ra impediunt.

5. Stel-

5-  
tem  
Sol i  
6  
lis,  
tra,  
les,  
tales.  
7-  
perni  
lus p  
omn  
que i  
Ha  
dunt

Le  
Etium  
totius  
quam  
dies b  
Af  
pro li  
ni die  
tanto  
mane  
anni  
qui i  
consti  
rizon  
locor  
merid  
illo d  
punct  
stum  
pra H

5. Stellæ eandem altitudinem supra Horizontem atque distantiam à vertice servant, sicut etiam Sol integra circumvolutione diurna.

6. Nullus ibi ventus dici potest Septentrionalis, Australes omnes, nempe in polo Arctico: contra, in polo Antartico omnes venti Septentrionales, nulli Australes, nulli Orientales vel Occidentales.

7. Si non stellæ & Sol moventur, sed juxta Copernicanam hypothesein ipsa Tellus, siquidem oculus punctum esset, ut in ipso polo constitui posset, omnes stellæ & ipse Sol atque Luna immobiles atque in eadem plaga apparerent.

Hæc omnia per globum facili opera ostenduntur.

#### PROPOSITIO II.

*Locis in Æquatore sitis perpetua est dierum ac noctium aequalitas. Locis ipsorum polorum unus est dies totius anni & una tantum nox. Dies autem est longior quam nox in polo Septentrionali: sed in polo Australi dies brevior est, quam nox.*

Assumatur in Æquatore globi quilibet locus pro libitu. Ostendendum est, quod in singulis anni diebus nox æqualis sit diei, hoc est, quod Sol tanto tempore sive tot horis infra Horizontem maneat, quanto supra Horizontem. Sumatur dies anni pro libitu, & inquiratur ad eum locus Solis, qui in Ecliptica notetur. Deinde assumtus locus constituatur in vertice, ut poli incumbant ipsi Horizonti; sic enim Horizon ligneus erit Horizon locorum Æquatoris. Locus Solis adducatur ad meridianum & describatur parallelus, quem Sol illo die perficiet. Deinde notentur hujus paralleli puncta duo existentia in Horizonte. Et manifestum erit, quod arcus hujus paralleli existens supra Horizontem sit æqualis arcui infra Horizontem

tem existenti. Et quia Solis motus diurnus sicut omnium stellarum est æquabilis, ideo æquali tempore perambulabit arcus æquales paralleli. Ita de quovis die ostenditur Propositionis prima pars. Ad alteram partem de locis polorum ostendendam, collocandus erit polus alteruter in vertice Horizontis lignei: ita enim hic erit Horizon poli.

Et circumvoluto globo conspiciemus, quod una integra Eclipticæ semissis maneat supra Horizontem, altera infra eum. Itaque Sol dum versatur in illa semisse, non occidet; dum in hac, non orietur. Pluribus autem diebus versatur in Septentrionali Eclipticæ semicirculo, quam in Australi propter eccentricitatem motus sui proprii, nempe in illo dies 187 moratur, in altero dies 178. Itaque perpetua mora supra Horizontem erit longior quam mora infra Horizontem poli-Arctici, contra in polo Antartico.

### PROPOSITIO III.

*In locis inter Aequatorem & polum jacentibus nulli dies aequales sunt noctibus suis præter duos æquinoctiorum dies, sed reliqui omnes majores vel minores noctibus.*

Assumatur in globo aliquis pro libitu locus inter Aequatorem & polum, atque polus elevetur juxta illius loci latitudinem, & sumto quovis anni die, exceptis æquinoctiorum diebus (nempe 21 Martii & 21 Sept. circiter) inveniatur locus solis ad eum diem, atque is in Ecliptica globi notetur, & ad meridianum adducto, describatur parallelus ejus, quem Sol circumrotatione sua diurna efficiet. Notentur duo hujus paralleli puncta in Horizonte existentia, & manifestum erit, quod arcus paralleli supra Horizontem existens sit major vel minor quam arcus delitescens infra Horizontem,

zont  
Hori  
fra H  
rit i  
vero  
V  
lem  
rii, 8  
zont  
mon  
xi i  
fra H  
dex i  
& m

D  
die a  
illius  
est, i  
datu

A  
ptica  
polu  
Orie  
xi i  
Hori  
strab  
erun

In  
Arct  
fit So  
nii):  
prim  
cemb

zontem, atque ideo dies five mora Solis supra Horizontem major vel minor erit quam mora infra Horizontem: major quidem, si locus Solis fuerit in semicirculo Eclipticæ magis vicino: minor vero, si in semicirculo magis remoto.

Vel, adducto loco Solis ad Horizontem Orientalem collocetur Index supra XII horam cycli horarii, & volvatur globus, donec locus Solis ad Horizontem Occidentalem perveniat. Index in cyclo monstrabit horarum diei numerum: dein indice ad XII reducto volvatur globus donec locus Solis infra Horizontem transiens redeat ad Orientem: Index iterum monstrabit horarum noctis numerum, & manifesta erit inæqualitas.

## PROPOSITIO IV.

*Dato loco in globo, vel latitudine ejus data, & dato die anni, invenire quot horas Sol supra Horizontem illius loci illo die commorabitur, & quot infra eum; hoc est, invenire longitudinem diei ac noctis pro illo loco ad datum diem.*

Ad datum diem inveniatur locus Solis in Ecliptica, atque is in globi Ecliptica notetur. Elevetur polus juxta dati loci latitudinem, locus Solis ad Orientalem Horizontem adducatur, & Index ad XII cycli. Volvatur globus, donec locus Solis ad Horizontem Occidentalem perveniat. Index monstrabit numerum horarum diei: reliquæ horæ ad 24 erunt horæ noctis.

## PROPOSITIO V.

*In omnibus locis inter Equatorem & polum Arcticum situs, dies longissimus, & nox brevissima fit Sole in primum gradum Cancræ ingresso (XXI Junii): brevissima contra dies & longissima nox (Sole in primum Capricorni gradum occupante (XXI Decembr. circiter). In locis vero inter Equatorem*



& Antarcticum polum sitis contrarium verum est, nempe dies brevissimus est Sole primum Cancris gradum occupante; longissimus, primum Capricorni gradum.

Ad ostendendum hoc in globo, assumatur locus pro libitu, & elevetur polus juxta illius latitudinem. Inveniatur per præced. Prop. horarum numerus, Sole in 1 gr. Cancris existente. Deinde alio quovis puncto Eclipticæ assumpto pro quovis alio anni die inveniatur iterum numerus horarum pro hoc die. Et manifestum erit, quod numerus horarum diei, Sole in 1 gr. Cancris existente sit major, quam numerus horarum alterius diei: & quoniam hic alter dies pro libitu est assumptus, & in singulis diebus eadem valet demonstratio, ideo dies Sole in 1 gr. Cancris est longissimus omnium, & ideo nox brevissima omnium.

Eodem modo ostendemus, Sole in 1 gr. Capricorni existente diem brevissimum, noctem longissimam.

Eadem quoque demonstrationis methodus observabitur pro locis ab altera Æquatoris parte versus Antarcticum polum sitis.

*Corollarium.* Dato loco in globo vel latitudine loci invenire horas longissimi diei pro illo loco. Inveniatur per præcedentem Propos. numerus horarum pro illo loco Sole in 1 gr. Cancris existente (siquidem locus fuerit inter polum Arcticum & Æquatorem, sed si ab altera Æquatoris parte, sumatur 1 gr. Capricorni). Is enim est dies longissimus. Eodem modo quantitas diei brevissimi invenietur, quanquam ea ex inventa diei longissimi quantitate deducitur facillime. Est enim æqualis nocti diei longissimi.

## PROPOSITIO VI.

In locis Telluris Septentrionalibus, dum Sol movetur à primo gradu Capricorni ad primum gradum Cancrì (à XXI Decembris ad XXI Junii), dies accrescunt continue: dum vero à primo Cancrì gradu movetur ad primum Capricorni, continue decrescunt. In locis Australibus contrarium verum est, accrescunt enim à 1 gr. Cancrì ad 1 gr. Capricorni, decrescunt à 1 gr. Capricorni ad 1 gr. Cancrì.

Assumatur in globo locus pro libitu Septentrionalis, hoc est, inter Æquatorem & polum Arcticum jacens, & elevetur polus pro illius loci latitudine. Assumtis deinde duobus & pluribus Eclipticæ punctis inter 1 gr. Capricorni & 1 gr. Cancrì jacentibus inveniatur quantitas diei pro illis punctis, sive sole occupante ista puncta. Et manifestum fiet, quod dies à die 1 gr. Capricorni remotior sit major, quam is, qui eidem diei 1 gr. Capricorni propior fuerit. Eodem modo cum diebus inter 1 gr. Cancrì & 1 gr. Capricorni sitis agemus. Et in locis australibus non dissimili methodo ostendemus propositum. magis perspicua erit Demonstratio, si per ipsos parallelorum arcus supra & infra Horizontem existentes fiat.

## PROPOSITIO VII.

Si locus Telluris ab Æquatore est remotior, vel polo propior, quam alius locus, major est differentia inter dies & noctes, & dies longissimus major, dies brevissimus minor. Contra, si locus propior est Æquatori, minor est differentia inter quantitatem dierum ac noctium, & dies longissimus minor, dies brevissimus major, ita ut loca Æquatori vicina sive in Zona Torrida sita, habeant fere omnes dies aequales noctibus, sicut ipsius Æquatoris loca, & longissi-

*longissimi diei excessus supra æquinoctialem sit unius circiter hora.*

Sumantur in globo duo loca, quorum unus ab Æquatore sit remotior, alter eidem propior. Et sumatur quicumque anni dies (exceptis æquinoctiorum, XXI Martii & Septemb.); Ostendendum est, quod in loco remotiori dies magis discrepet à noctis quantitate quam in loco viciniore Æquatoris.

Locus Solis in Ecliptica ad assumptum diem inveniat, atque in Ecliptica globi notetur. Dein elevetur, polus pro unius loci assumpti Telluris latitudine, & inveniat longitudo diei & noctis (sive mora Solis supra & infra Horizontem) in illo loco ad assumptum diem, per Propos. VI hujus. Dein elevetur polus pro alterius loci latitudine, & inveniat longitudo diei ac noctis sive mora Solis supra & infra Horizontem ad eundem assumptum diem. Conferatur hæc inventa longitudo cum priori, & manifesta erit Propositionis veritas.

Itaque locus remotior habet omnes dies unius semissis anni majores, quam locus viciniore: contra omnes dies alterius semissis habet minores.

Quod vero de locis Zonæ Torridæ dictum est, ostenditur ita. Inveniat quantitas longissimi diei in locis Tropicorum, hoc est, quæ Torridam Zonam terminant, per Propos. VI hujus, & conspicua erit veritas Propositionis. Sed commodior & multo facilior erit Demonstratio, si ipsi arcus paralleli notentur, qui supra Horizontes extant, & deinde hi arcus conferantur.

*Corollarium.* Quod itaque de omnibus anni diebus (exceptis æquinoctiis) ostensum est, idem etiam in diei longissimi & brevissimi quantitate valet. Atque in hisce potissimum spectatur

& at-

& at-  
& diei  
aliis  
qui ab  
habe  
Æqua  
norem

*Om-  
lelo sit  
eandem*

Fac  
per gl  
globo  
latitu  
Solis  
matur  
stituat  
ut ita  
rizon  
tunc  
sive di  
enim  
tem  
cus a  
ligner  
cus T  
cum  
quale  
cyclo  
So  
rum  
quale

& attenditur, quia hic maxima est inter noctis & diei longitudinem discrepantia, non tanta in aliis anni diebus. Duorum itaque locorum is qui ab Æquatore est remotior vel polo propior, habet longissimum diem majorem quam locus Æquatori vicinior: & diem brevissimum minorem.

PROPOSITIO VIII.

*Omnia loca Telluris, qua in uno eodemque parallelo sita sunt, habent omnes anni dies aequales, & ideo eandem longissimi diei quantitatem.*

Facilis est demonstratio hujus Propositionis per globum. Assumatur quilibet parallelus in globo, & loca in eo quotvis. Eleuetur polus pro latitudine istius paralleli, & assumatur quilibet Solis parallelus pro aliquo anni die, ex.gr. assumatur Tropicus Cancræ pro die longissimo. Constituaturs unus ex assumtis locis sub Meridiano ut ita verticem Horizontis occupet sive ut Horizon ligneus sit Horizon illius loci: Notetur tunc arcus Tropici existens supra Horizontem, sive duo puncta ejus existentia in Horizonte. His enim arcus denotatur Solis moram supra Horizontem illius loci. Deinde adducatur secundus locus ad meridianum seu verticem, ut Horizon ligneus fiat illius Horizon, & notetur iterum arcus Tropici existens supra Horizontem, qui si cum priori conferatur, deprehendemus quod æquales sint. Potest etiam ostensio fieri per horas in cyclo horario.

Sol itaque æquali tempore supra Horizontes eorum locorum commoratur, & ideo dies erunt æquales, ut etiam noctes.



## Definitiones.

Ex hisce origo Divisionis Telluris in Climata facilis est intellectu.

**CLIMA** enim dicitur una pars Telluris, ex illis partibus, in quas superficies inter *Aequatorem* & *polum* sita ita secatur ductis parallelis, ut longissimus dies in parallelo remotiori ab *Aequatore* excedat longissimum diem paralleli vicinioris *Aequatori* certa ac definita hora parte vel horarum numero, nimirum semisse horæ in locis usque ad *Arcticum* fere circum sitis, deinde in reliquis integra hora vel aliquot horis & diebus.

Principium Climatis dicitur parallelus, cum quo *Clima* incipit, propiorque est *Aequatori*: Finis Climatis dicitur parallelus terminans *Clima*.

Medium Climatis dicitur parallelus per mediam circiter Climatis superficiem ductus, ita ut in illo longissimus dies excedat longissimum diem principii Climatis per quadrantem horæ vel per dimidiam differentiam, qua longissimus dies finis Climatis excedit longissimum diem principii Climatis.

Parallelum spatium dicitur, quod parallelus Climatis medius cum principio vel fine Climatis comprehendit. Sed inutilis hæc est vocabuli usurpatio & homonymiæ introductio.

## PROPOSITIO IX.

Si sumantur in Tellure plurima loca ab *Aequatore* versus *polum*, quorum distantia ab *Aequatore* aequaliter accrescat, ex. gr. decem graduum, viginti, triginta, quadraginta, &c. longissimi dies in istis locis non erunt aequaliter majores, sive non aequaliter accrescent, sed magis accrescent in locis remotioribus & quo propior est locus polo.

Ad

Ad  
per glo  
polum  
pe prop  
30 gr  
paralle  
titud.  
Horizo  
etiam T  
rizonte  
Horizo  
Horizo  
moræ p  
rium co  
Dein  
dinem  
Cancri  
pici pur  
Horizo  
quæ eti  
poteff.  
Eode  
tudo 3  
bus fact  
næ Soli  
erit, qu  
fimi die  
bus *Aq*  
dici mag  
locorum  
No r  
ostensur  
bus veru  
pro Tro  
loci. Et  
sint, ta  
præcipue

Ad ostendendam hujus Propositionis veritatem per globum, sumantur loca ab Æquatore versus polum remota æquali incremento distantia, nempe propter commoditatem, paralleli 10 gr. 20 gr. 30 gr. 40 gr. 50 gr. 60 gr. &c. latitudinis. Hi enim paralleli in globis existunt. Eleuetur polus ad latitud. 10 gr. & adducto primo gradu Cancræ ad Horizontem Orientalem, & notato eo, notetur etiam Tropici punctum quod in Occidentali Horizonte tunc existit. Arcus enim Tropici supra Horizontem existens ostendit moram Solis supra Horizontem loci 10 gr. latitudinis. Horæ istius moræ possunt etiam per Indicem & cyclum horarium cognosci.

Deinde polus eleuetur juxta secundi loci latitudinem 20 gr. & adducto iterum primo gradu Cancræ & Orientalem Horizontem, notetur Tropici punctum in Occidentali. Arcus enim supra Horizontem existens denotabit iterum moram quæ etiam per Indicem & cyclum in horis cognosci potest.

Eodem modo agatur cum locis, quorum latitudo 30 gr. 40 gr. 50 gr. 60 gr. 70 gr. &c. Quibus factis conferantur arcus Tropici vel horæ diurnæ Solis moræ supra Horizontes, & manifestum erit, quod multo magis accrescat quantitas longissimi diei in locis remotioribus quam in propioribus Æquatori, adeoque incrementum longissimi diei magis accrescere quam incrementum distantia locorum ab Æquatore.

NOTA. Quod de longissimo die dictum est & ostensum, id de omnibus unius semissis anni diebus verum est, & eodem modo demonstratur, si pro Tropico Cancræ assumatur parallelus istius loci. Erit itaque generalia generaliter tradenda sint, tamen quia doctrina de Climatibus requirit præcipue explicationem longissimi diei incre-

memi, ideo non solemus in hac doctrina striete observare illam legem  $\alpha\epsilon\theta\acute{o}\lambda\omicron\varsigma \ \omega\epsilon\theta\acute{o}\tau\omicron\nu$ .

PROPOSITIO X.

Si inter *Aequatorem Telluris & polum plurima loca vel plurimi paralleli sumpti sint ita, ut longissimus dies unius loci excedat longissimum diem vicini loci (qui *Aequatori* propior sit), aequalis ubique excessu, sive ut longissimi dies aequaliter accrescant, isti paralleli non aequaliter à se invicem, nempe bini quique vicini distabunt, sed qui ab *Aequatore* sunt remotiores, minorem distantiam habebunt, quam illi, qui *Aequatori* sunt viciniore.*

Hujus Propositionis veritas ex præcedenti ostenditur. Etenim si paralleli hi aequaliter distarent à se invicem, bini nempe quique vicini, non accresceret quantitas longissimi in istis parallelis aequali incremento, ut in præcedenti ostensum est. Atqui ponitur jam aequaliter accrescere sive loca & paralleli ita sumti sunt, ut aequaliter in illis accrescat longissimus dies. Quare non aequaliter bini quique vicini distabunt à se invicem, sed sumtis multis parallelis ab *Aequatore* versus polum hac conditione ut aequaliter accrescat longissimus dies, isti paralleli non aequaliter distabunt à se invicem, verum minor erit distantia tertii à secundo quam secundi à primo, minor adhuc quarti à tertio, adhuc minor quinti à quarto, dein sexti à quinto, septimi à sexto, & sic porro.

COROLLARIUM. Quoniam itaque *Climata* pleraque ita sumuntur, ut longissimus dies in finali parallelo *Climatis* superet longissimum diem principii *Climatù* per hora semissem, sequitur ex hac Propositione quod *Climata* ab *Aequatore* remotiora sint minus lata vel magis angusta, quam vicina *Aequatori*, atque ideo *Climatum* latitudinem & magnitudinem versus polum decrescere. Hinc sa-

Etiam

Etiam  
reut  
servat  
termin  
integ

Dat  
fimi in  
latitud  
ralleli  
sive,  
dies.

Ad  
1 gr.  
ad me  
rarii:  
ram ill  
diei de  
medic  
contin  
Tropic  
1 gr. C  
ridian  
depress  
tum ex  
Cancr  
retur g  
elevati  
invenie  
no ab  
ad term  
Descrip  
Ptohati  
No  
hjus po  
vis diei

Etiam est, cum Climates tandem admodum angusta fierent versus polum si idem excessus, semissis nempe hora, servaretur, ut Geographi Climates Septentrionalium terminos non semisse hora, sed primo horis integris, deinde integris diebus definiant.

## PROPOSITIO XI.

Data quantitate vel numero horarum diei longissimi in aliquo loco seu parallelo Tecturis, invenire latitudinem loci seu Elevationem poli istius paralleli, & ipsum parallelum in globo exhibere, sive, exhibere illa loca, ubi tantus sit longissimus dies.

Adducatur locus Solis longissimi diei qui est 1 gr. Cancri in omnibus locis Septentrionalibus, ad meridianum, Index ad horam XII cycli horarii: Volvatur globus, donec Index monstrat horam illam cycli, à qua numerus datus longissimi diei denominatur (nempe in cyclo ad horam XII mediæ noctis adjungendæ erunt reliquæ horæ continua numeratione), & tunc notetur punctum Tropici existens in Meridiano. Deinde adducatur 1 gr. Cancri ad Orientalem Horizontem, & meridianus in crena ita moveatur polo elevato vel depresso, donec alterum Tropici punctum notatum existat in Occidentali Horizonte, ita ut 1 gr. Cancri sit adhuc in Oriente. Quo facto, numeretur gradus elevationis poli. Ea enim est quæ sita elevatio vel latitudo paralleli, quem in ipso globo invenies, si totidem gradus numeres in meridiano ab Æquatore versus polum, & cretâ applicatâ ad terminum numerationis globum circumrotas. Descriptus enim parallelus est is, qui quæritur. Probatio methodi facilis est.

NOTA. Hæc etiam Propositio multo generalius potest proponi ita: Datâ longitudine cujusvis diei anni in aliquo loco, invenire loci seu paralleli



ralleli istius latitudinem, & ipsum parallelum seu loca in Tellure exhibere. Vel: Dato numero horarum, invenire loca Telluris, ubi ad datum aliquem anni diem tantus sit diurnarum horarum numerus.

Solutio fit eodem modo, quo in Propositionis solutione diximus, modo pro Tropico Cancrî, qui est parallelus Solis in longissimo die assumatur parallelus alius, ille nempe qui dato diei anni convenit. Ex die enim invenitur locus Solis in Ecliptica, qui quando habetur, facile est parallelum diei describere, ut in præcedentibus aliquoties id jam docuimus.

**COROLLARIUM.** Facile itaque est, invenire latitudinem singulorum parallelorum in singulis Climatibus, quum datur longissimus dies Climatium, nempe in termino primo Climatatis est  $12\frac{1}{2}$  hor. in termino secundi 13 hor. in tertii termino,  $13\frac{1}{2}$ , & sic porro. In parallelis vero mediis Climatium dies longissimi sunt  $12\frac{1}{4}$  hor.  $12\frac{1}{4}$ ,  $13\frac{1}{4}$ , &c.

### PROPOSITIO XII.

*Dato numero dierum aliquot, invenire latitudinem locorum sive paralleli, atque ipsa Frigida Zona loca in Tellure exhibere, ubi Sol tot diebus non occidat, totidemque diebus non oriatur.*

Numerus dierum bifecetur sive dimidietur. Et numerentur tot gradus in Ecliptica à primo Cancrî, quantus est dimidius ille numerus, sive quot unitates hic habet (potest ab utraque parte istius initii numeratio fieri), terminus notetur cretà. Si dies plures sint, quam triginta, debet numerus graduum unitate minor sumi. Deinde adducatur hoc notatum punctum ad meridianum & numerentur gradus inter illud & polum intercepti. Hi enim

enim  
rum,  
det,  
paral  
tam  
merid  
signes  
contin

Ad  
tur po  
manif  
circa  
tem,  
eta Ecl  
bulat  
ut ex  
mus v  
non o  
paralle

Co  
rum q  
re, qu  
mus  
nume

Tab  
Tab  
lorum  
peritu  
ralleli  
tiam C  
stantia  
Co  
tum e  
diei p

enim sunt quæ sita elevatio poli seu latitudo locorum, ubi tot diebus, quot dati sunt, Sol non occidat, & totidem diebus non oriatur. Ipsa loca & parallelum in globo invenies, si numeres inventam latitudinem ab Æquatore versus polum in meridiano, atque ad terminum applicatâ cretâ designes parallelum. Hic enim est is qui quæritur, & continet omnia loca quæ sita.

Ad Demonstrationem solutionis hujus elevatur polus pro inventorum locorum latitudine, & manifestum erit, quod gradus Eclipticæ notati circa 1 gr. Cancrî non occidant infra Horizontem, sed supra eum maneat. Sol itaque ista puncta Eclipticæ perambulans non occidet: perambulat autem ista puncta tot diebus, quot dati sunt, ut ex constructione patet. Eodem modo ostendemus veritatem solutionis de diebus, quibus Sol non oriatur omnino locis inventis, sive invento parallelo.

**COROLLARIUM.** Facile itaque est, illorum quoque Climatum Elevationem poli invenire, quæ in Zonis frigidis jacent, ubi dies longissimus accrescit non horis sed integrorum dierum numero.

**PROPOSITIO XIII.**

*Tabulam Climatum construere.*

Tabula Climatum vocatur, in qua ad singulorum Climatum initium, medium & finem reperitur annotata elevatio poli seu latitudo paralleli, & ipsa longissimi diei quantitas, ut etiam Climatum intervallum sive parallelorum distantia.

Constructio facilis est. Etenim ex ipsa Climatum consecutione & ordine quantitas longissimi diei pro initio, medio, sine cujusvis Climatis in-

venitur, addendo  $\frac{1}{4}$  horæ ad horas duodecim continua successione.

Deinde ex quantitate longissimi diei singulorum parallelorum, invenitur singulorum elevatio poli seu latitudo, juxta Propos. XI. Denique intervalum climatum five latitudo habetur, si latitudinem paralleli inchoantis auferas à latitudine paralleli finientis. Hisce omnibus in Tabula cancellatim divisâ annotatis habemus Tabulam Climatum, quam hæc subjungo.

T A

CLIMATA.

TA.

Primum

Secundum

Tertium

Quartum

Quintum

Sextum

Septimum

Octavum

Nonam

Decimum

Undecimum

Duodecimum

Decim tertium

T A

TABULA CLIMATUM ET PARALLELORUM.

CLIMATA.	PARALLELI.	Dies longissimus.			Elevatio poli.		Intervallum.
		hr.	min.	gr.	m/r.		
Primum	Principium	12	0	0	0		
	Medium	12	15	4	15	0	1
	Finis & Secundi Principium	12	30	8	25	8	25
Secundum	Medium	12	45	12	30		
	Finis.	13	0	16	25	8	
Tertium	Medium	13	15	20	15		
	Finis.	13	30	23	50	7	25
Quartum	Medium	13	45	27	40		
	Finis.	14	0	30	20	6	30
Quintum	Medium	14	15	33	40		
	Finis.	14	30	36	28	6	8
Sextum	Medium	14	45	39	2		
	Finis.	15	0	41	22	4	52
Septimum	Medium	15	15	43	32		
	Finis.	15	30	45	29	4	7
Octavum	Medium	15	45	47	20		
	Finis.	16	0	49	1	3	31
Nonam	Medium	16	15	50	33		
	Finis.	16	30	51	58	2	7
Decimum	Medium	16	45	53	17		
	Finis.	17	0	54	27	2	49
Undecimum	Medium	17	15	55	34		
	Finis..	17	30	56	37	2	10
Duodecimum	Medium	17	45	57	32		
	Finis.	18	0	58	29		
Decimum tertium	Medium	18	15	59	14		
	Finis.	18	30	59	58		



CLIMA- TA.	PARAL- LELI.	Dies lon- gissimus.		Elevatio poli.		Inter- vallum.
		hor.	min.	gr.	min.	
Decimum quartum	<i>Medium</i>	18	45	60	40	
	<i>Finis.</i>	19	0	61	18	
Decimum quintum	<i>Medium</i>	19	15	61	55	
	<i>Finis.</i>	19	30	62	25	
Decimum sextum	<i>Medium</i>	19	45	62	54	
	<i>Finis.</i>	20	0	63	22	
Decimum septimum	<i>Medium</i>	20	15	63	40	
	<i>Finis.</i>	20	30	64	6	
Decimum octavum	<i>Medium</i>	20	45	64	30	
	<i>Finis.</i>	21	0	64	49	
Decimum nonum	<i>Medium</i>	21	15	65	6	
	<i>Finis.</i>	21	30	65	21	
Vicesi- mum	<i>Medium</i>	21	45	65	35	
	<i>Finis.</i>	22	0	65	47	
XXI.	<i>Medium</i>	22	15	65	57	
	<i>Finis.</i>	22	30	66	6	
XXII.	<i>Medium</i>	22	45	66	14	
	<i>Finis.</i>	23	0	66	20	
XXIII.	<i>Medium</i>	23	15	66	25	
	<i>Finis.</i>	23	30	66	28	
XXIV.	<i>Medium</i>	23	45	66	30	
	<i>Finis.</i>	24		66	31	

Ult  
quent  
ris fed  
& inu  
quent  
five la  
accre  
Menfes.  
Latitudo  
locorum

Al  
dis, Cli  
plicare  
Ver  
vam  
propte  
Torric  
tantur  
beban  
nume  
cum p  
in signi  
transir  
PRIM  
(Efi  
SECT  
Ag  
TER  
GY  
QUA  
Ma  
QUI  
Ali  
SEX  
VIU

Uterius non solent extendi climata, quia in sequentibus locis accrescit longissimus dies non horis sed integris diebus sive revolutionibus diurnis, & inutilis est opera in illorum supputatione: sequens tamen canonion ostendet elevationem poli sive latitudinem locorum, ubi integris mensibus accrescunt longissimi dies.

Menses. latitudo locorum.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	67 gr. 30	69. 30	73. 20	78. 20	84. gr.	90 gr.

## PROPOSITIO XIV.

*Aliorum Geographorum methodum in enumerandis Climatibus & construenda Tabula Climatuum explicare.*

Veteres Geographi, imprimis Græci, cum partem Telluris portionem habitari existimarent, propterea quod tam loca Septentrionalia quam Torridæ Zonæ habitari posse negarent, ideo eam tantum Telluris portionem, quam cognitam habebant, diviserunt in Climata, & tantum septem numerarunt Climata ab Æquatore versus Arcticum polum, eaque denominarunt à loco aliquo insigniori, per quem medius parallelus Climatuum transiret, nimirum hæc:

PRIMUM Clima appellarunt CLIMA PER MEROEN  
(Est insula & urbs Africa Nilo circumdata).

SECUNDUM PER SYENEN. Est urbs Ægypti.

TERTIUM PER ALEXANDRIAM ÆGYPTI. Maritima est urbs.

QUARTUM PER RHODUM. Insula in Mari Mediterraneo est.

QUINTUM PER HELLESPONTUM. Alii per Romam.

SEXTUM PER BORYSTHENEM. Fluvius insignis est Sarmatiæ Euiopæ.

## SARMATIÆ.

Climata autem ab altera Æquatoris parte versus Austrum non numerabant antiqui, quia omnia hujus loca illis erant incognita, & multi putabant, Oceanum omnem hanc Telluris superficiem occupare. Quod cum quibusdam posterioribus minus verisimile videretur, numerarunt hi quoque Climata ab altera Æquatoris parte. denominarunt autem illa non ab insignibus locis (nulla enim cognita habebant,) sed eisdem appellationibus, quibus Septentrionalia Climata, præponentes tantum Præpositionem ἀπὸ, ut Clima ἀπὸ Ἰσθμοῦ Μεσσηνίας, quasi dicas Clima oppositum Clima per Meroën, vel Syenen, &c.

Deinde cum progressu temporis plures partes Telluris versus Arcticum polum jacentes cognoscerentur habitari, plura Climata numerata & constituta sunt. Quidam octavum Clima denominarunt à palude Mæotide, Nonum à mari Balthico, Decimum, Undecimum & sequentia ab aliis locis. Quæ denominationes etsi non sint necessariae ad Tabulæ Constructionem, possunt tamen etiam nostræ Tabulæ addi in illis arcibus, ubi numerum Climatum posuimus: sic enim & memoriarum firmius hærebunt Climata, & loca in quovis Climate sita, meliorque comparatio de frigoris atque caloris differentia institui poterit. Hoc autem lectorum & studiosorum industria maluimus relinquere, quam ipsimet adjicere, ut ita majorem animam illis præberemus contemplandi terrestris globi: Et multo facilius hoc modo memoriarum mandabunt.

Sciendum quoque est, Veteres non incepisse Climatum numerationem ab ipso Æquatore, sicut nostra Tabula facit, sed à loco sine parallelo, ubi longissimus dies est 12½ horarum, ideoque illorum primam Clima est secundam in nostra Tabula,

bula  
stima  
affrici  
ne ha  
Soli  
debet  
osten  
mina  
maus  
gissim  
distan  
Re  
ipso i  
Clim

Uf  
1.  
ne, c  
loco  
Qu  
gione  
& Cl  
non i  
mino  
ritur.  
2. I  
quam  
gnos  
atque  
Ing  
debis  
quam  
3.  
longi  
Tabul

bula, illorum secundum nobis tertium, &c. Existimarunt enim illa loca, quæ nos primo Climati asseribimus, nempe ad 9 gr. latitudinis, nullâ ratione habitari posse ab hominibus propter ingentem Solis æstum, & propterea censebant, illa loca non debere numerari. Sed cum experientia contrarium ostenderit, non potuimus illorum Climata denominandi & constituendi modum observare. Proloxæus primum Clima incipit à parallelo, ubi longissimus dies est 12 $\frac{1}{2}$  horarum, sive ubi latitudo seu distantia ab Æquatore est 4 gr. 15. min.

Res est non magni momenti: præstat tamen ab ipso incipere Æquatore, ut omnia loca in aliquo Climate jaceant.

## PROPOSITIO XV.

*Usum Tabula Climatum monstrare.*

1. Data loci alicujus latitudine vel poli elevatione, cognoscere quantitatem diei longissimi in illo loco & Clima in quo jacet.

Quæritur elevatio poli data in Tabula, & è regione inveniæmus & quantitatem diei longissimi & Clima atque parallelum. Si ipsa elevatio data non inveniatur in Tabula, sumenda est proxime minor & proxime major, quæ in Tabula reperitur.

2. Datâ longitudine diei longissimi alicujus loci, quam aliquis observavit vel narrando acceperit, cognoscere ex eo latitudinem illius loci & parallelum atque Clima in quo ille locus jacet.

Ingredere cum data longitudine Tabulam, & videbis è regione tam latitudinem loci quæsitam quam Clima & parallelum.

3. Dato Climate determinare longitudinem diei longissimi & elevationem poli. Facile hoc est ipso Tabulæ aspectu.



## CAPUT XXVI.

*De luce, calore, frigore, & pluviis in diversis Telluris partibus seu Zonis, atque aliis Zonarum proprietatibus.*

## PROPOSITIO I.

**A**D lucem, calorem, frigus, pluvias atque alia meteorora generanda & procreanda in Telluris locis atque aëre vicino causa hæc efficaces sunt.

1. *Radiatorum Solis ad locum quemque venientium & emissorum obliquitas major vel minor vel nulla. Radii enim perpendiculariter in locum incidentes maximum efficiunt calorem, & reliqui radii oblique allabentes eo minorem calefaciendi potentiam habent, quo obliquitas eorum major, hoc est quo à perpendiculari radio magis declinant.*

2. *Mora Solis supra Horizontem loci diuturna. Etenim idem calidum magis calefacit & mutat aërem longiori tempore, quam brevior.*

3. *Depressio Solis infra Horizontem major vel minor tempore noctis. Etenim hæc differentia depressionis facit, ut major vel minor lux in aëre sentiatur, major quoque vel minor tepor, pluvix, densæ nebulae, &c. Huc pertinet lux Crepusculi.*

4. *Luna major vel minor elevatio supra Horizontem, ejusdem major vel minor depressio infra Horizontem, ejusdem diuturna mora vel minus diuturna supra Horizontem. Causæ eadem sunt, quas in tribus præcedentibus paragraphis adduximus.*

5. *Eadem de stellis fixis præsertim insignioribus & quinque reliquis planetis, Saturno, Jove, Marti, Venere & Mercurio dici possunt. Namque &*

lu.

lucem aliquam in aëre generant & calorem, exiguum licet, & aërem variis modis mutant, vapores excitant, si Astrologis credimus.

6. *Terra cujusvis loci proprietates sive species.* Etenim ubi saxea & petrosa est terra, ibi plerumque frigidior est aër, quam ubi sulphurea, pinguis; hic quoque major fertilitas. Ubi multa arena, nulli fluvii, ibi magnus calor, siccitasque.

7. *Adjacentes lacus vel mare.* Etenim & halitus inde procreantur in aëre humidiores atque frequentiores, & radii minus potenter reflectuntur à mari quam à terra.

8. *Situs locorum.* Aliter enim in montes & montana agit Sol, aliter in valles atque planitiem. Præterea montes prohibent radiorum Solis ad subiecta loca liberum accessum, ad illos vapores aëris trahuntur quodammodo, ut capite xx diximus. Unde montes mutant vicinorum locorum tempestates, calorem, pluvias, &c. nempe aliter hæc forent in subiectis locis si montes abfuissent.

9. *Venti, præsertim generales & statii.* Sic Etæsiæ temperant canicularium æstus, generalis ventus in Zona Torrida, præsertim Subsolani in Brasilia, temperatum reddunt calorem, quando in Africa Occidentali vehementissimus est æstus, quia ventum generalem non ita sentiunt ista loca. Venti Septentrionales frigidi & sicci, Australes tepidi & humidi in nostris locis.

10. *Nubes pluvia, nebula tollunt vel imminuunt calorem, lucemque.* Plures causas non arbitror esse varietatis, quæ in luce, calore, &c. observatur in Telluris diversis locis vel etiam iisdem, sed diverso tempore.

PROPOSITIO II.

*Quomodo tempestates anni, Ver, Æstas, Autumnus & Hyems desinienda sunt?*

Etsi in scientiis de Definitionibus non sit litigandum vel disputandum, tamen quia hic occurrunt quædam homonymiæ, sine quarum explicatione magna in sequenti doctrina existeret confusio, ideo quæstionem hanc ita proponere volui, ut adolescentes eo cautius homonymiam hanc vitent vel ab ea ne decipiantur & intricentur, sibi caveant.

Quæstio duas complectitur difficultates. I. An definiendæ sint illæ tempestates ex ingressu Solis & mora ejus in certis Eclipticæ seu Zodiaci signis? Ita enim communiter faciunt Astronomi & Astrologi, dicentes, Ver esse dum Sol à primo Arietis movetur ad primum usque Cancræ: Æstatem, dum Sol à primo Cancræ ad primum Libræ movetur: Autumnum, dum à primo Libræ ad primum Capricorni: Hyemem, dum à primo Capricorni ad primum Arietis. Hasce autem Definitiones non esse generales & omnibus locis competentes, manifestum est, quia tantum in locis Septentrionalibus (ab Æquatore versus Arcticum polum sitis) non in Australibus valent. Pro hisce enim ipsimet alias Definitiones prioribus contrarias proferunt, dicente in hisce locis Ver esse Sole à primo Libræ ad primum Capricorni eunte, Æstatem à primo Capricorni ad primum Arietis, Autumnum à primo Arietis ad primum Cancræ, Hyemem à primo Cancræ ad primum Libræ.

Sed ex eo sequeretur, tempestates illas non posse generaliter definiiri; quod falsum est, & debent generalia generaliter definiiri. Secundo, ne ita quidem factæ Definitiones locum habere possunt in locis Zonæ Torridæ. Etenim quando Sol per verticem locorum transit, tunc nemo non fatetur ibi debere esse Æstatem (nisi alia causa impediât) respectu cælestis causæ, & ita locis in Æquatore sitis non debet esse Ver vel Autumnus Sole in primum

Arie.

Atietis vel Libræ ingresso, sed Æstas, quoniam tunc transit per illorum locorum verticem, & maximum calorem creat, nisi causa alia impediatur, neque illa Æstas ad primum Cancris vel Capricorni potest transferri. Idem valet de locis inter Æquatorem & Tropicos sitis, quia Sol illorum verticem transit, antequam ad primum Cancris vel Capricorni accedit, & ideo prius Æstatem efficit. Sciendum enim est, etsi Definitiones liberae sint, tamen cum omnium populorum communes notiones Æstatem calore, Hyemem frigore vel saltem minore calore definiant, ita debere fieri definitiones, ut ab istis notionibus quam minimum recedant, & ne pugnent cum illis. Eadem difficultas est de Vere & Autumno locorum Zonæ Torridæ, imo non videntur hic locum habere, præsertim in locis quæ in Æquatore jacent.

Secunda difficultas, ob quam proposita est quæstio, occurrit hæc: Utrum ab ipso caloris & frigoris gradu definiendæ sint Tempestates, Ver, Æstas, Autumnus, Hyems, an à solis accessu & recessu? Etenim hominum Europæorum communis notio, quam de illis tempestatibus formant sive quibus illas concipiunt, utrumque complectitur, etsi magis ad calorem & frigus respiciant: Astronomi autem magis ad Solis accessum & recessum vel ingressum Solis in certa Zodiaci signa, ut antea dictum, attendunt. Præterea in locis Zonæ Torridæ non paucis observatum est, quod tempestates illæ non respondeant Solis accessui vel recessui, sed quod contra cælestem Solis motum & causam, hyemem experiantur (non quidem frigore sed pluyiis sævientem & procellis) cum æstatem agere deberent propter Solis viciniam, & contra, æstatem cum remoto Sole, ubi hyemem debebant sentire (cujus rei mirabilis sane exempla infra adducemus) atque ideo illi populi Æstatem,

Hy-



Hymemque non definiunt Solis accessu vel in certa signa ingressu, sed serenitate Æstatem, pluviis & frigidiusculo aëre Hyemem. Atque ita impossibile est, Definitiones Veris, Æstatis, Autumni, Hyemis facere, quæ generales sint & omnibus hisce locis competant juxta populorum notiones.

Ego consideratis hisce difficultatibus, ita censeo. 1. Primo, cum in multis locis *Zonæ Torridæ* (ut in secunda difficultate dictum), atque etiam in quibusdam locis *Zonarum Temperatarum* Calor atque frigus contra cælestem rationem sive Solis motum accidant, neque tamen calore & frigore possint definitiones illæ fieri accuratæ, ideo distinguenda esse vocabula hæc tempestatum tanquam homonymica ut tempestates aliæ esse dicantur cælestes, aliæ terrestres. Fateor vocabula hæc minus apta esse, sed meliorum defectus coegit ea usurpare. Ita Æstas terrestris loci alicujus dicetur tempus anni, quo in illo loco maximus fit à Sole æstus singulis annis. Æstas vero cælestis dicetur illud anni tempus, quo maximus æstus esse debebat in loco illo propter Solis viciniam. Ita Hyems cælestis loci alicujus dicetur illud anni tempus, quo proximum debebat in loco illo esse frigus propter maximam Solis distantiam. At Hyems terrestris loci alicujus dicetur tempus anni, quo maximum est frigus in illo loco singulis annis. Et licet in plurimis locis Hyems cælestis & terrestris in unum tempus anni incidant, ut etiam Æstas cælestis & terrestris, tamen quædam loca *Zonæ Torridæ* sunt, ubi diversa tempora anni observant, ut in sequentibus dicemus. Ita de Vere terrestris atque cælesti, & similiter de Autumno, disendum erit.

2. Secundo, cum pauca ea loca sint, ubi terrestris Æstas atque Hyems à cælesti discrepat in anni tempore, sed in plurimis locis in idem anni tempus

pus in  
redici  
tum  
est, a  
simp  
intelli  
tribus

Sec  
defini  
ris. A  
que in  
hi san  
illæ fi

1.  
tempu  
Sol m  
(idque  
vertica  
minore  
medioc  
tiam.

2.  
cujus i  
mam  
vero ill  
loci illi

3.  
nem H  
tium e  
quisvi  
stantia  
nimam  
tiam.

4.  
pus int  
sive c  
medioc

pus incidant, ideo caelestem Æstatem posse absolute dici Æstatem, ita quoque Hyemem, Ver, Autumnum, atque ubi de terrestri sermo faciendus est, addendum esse vocabulum terrestris, ubi vero simpliciter dicitur Æstas, Hyems, Ver, Autumnus, intelligendas esse caelestes tempestates cum terrestribus convenientes.

Sed quomodo distinctas & accuratas faciemus definitiones Æstatis (caelestis nempe) Hyemis, Veris, Autumni, ut generales sint omnibus locis atque in Torrida quoque Zona locum habeant? Mihi sane non alius occurrit modus, quo definitiones illæ fieri possint tales, nisi hic:

1. *Æstas* (caelestis) loci alicujus, dicitur anni tempus, cujus initium est dies ille, in cujus meridie Sol minimam habet à vertice loci illius distantiam, (idque prima vice, si duabus vicibus Sol ei loco fiat verticalis) finis vero ille dies, in cujus meridie (sive minorem, quam in omnibus aliis diebus anni) Sol mediocrem à vertice loci illius primo recipit distantiam.

2. *Hyems* loci alicujus dicitur illud anni tempus, cujus initium est dies ille, in cujus meridie Sol maximam à vertice loci illius adipiscitur distantiam: finis vero ille dies, in cujus meridie Sol mediocrem à vertice loci illius acquirit distantiam.

3. *Ver* loci alicujus dicitur anni tempus, inter finem Hyemis & initium Æstatis cadens, sive cujus initium est dies ille, in cujus meridie Sol mediocrem acquisivit à vertice distantiam veniens à maxima distantia: finis vero ille dies, in cujus meridie Sol minimam primo acquisivit à vertice loci illius distantiam.

4. *Autumnus* loci alicujus dicitur anni tempus inter finem Æstatis & initium Hyemis cadens, sive cujus initium est dies ille, in cujus meridie Sol mediocrem recepit à vertice loci illius distantiam,

veniens à minima, finis vero ille dies, in cuius meridie Sol maximam à vertice loci illius distantiam adeptus est.

Juxta has definitiones omnibus Telluris locis attribui possunt Ver, Æstas, Autumnus, & Hyems, neque facile invenietur alius modus ea definiendi; ita ut omnibus locis conveniant. Hisce itaque positis Definitionibus ad ipsam rem accedemus.

### PROPOSITIO III.

*Æstas (caelestis) locorum Telluris, quæ inter Tropicum Cancræ & polum Arcticum jacent, incipit cum Solis ingressu in primum gradum Cancræ (xxi Junii) & desinit cum Solis ingressu in primum Libræ (xxi Septemb.) & quidem simul in omnibus illis locis. Ita Autumnus illis locis est, Sole à primo Libræ ad primum Capricorni eunte: Hyems, dum Sol à primo Capricorni ad primum Arietis movetur. Ver, dum idem Sol à primo gradu Arietis ad primum Cancræ movetur.*

Veritas Propositionis per antecedentes definitiones facile ostenditur, & in globo monstrari potest, ut etiam in Mappis Universalibus. Etenim Sol in primum gradum Cancræ perveniens habet minimam, quam habere potest, à verticibus singulorum locorum Zonæ Septentrionalis Temperatæ & Frigidæ distantiam in meridie. Æstas itaque illorum locorum juxta caelestem legem tunc incipiet. Eodem modo Sol in 1 gr. Libræ mediocrem habet distantiam à verticibus illis. In 1 gr. Capricorni maximam: in 1 gr. Arietis iterum mediocrem & ascendit versus majorem, quæ tum ex declinatione Solis tum ex globo & mappis perspicua. Infertur itaque per definitiones antea positas, quod Autumnus, Hyems, Ver illorum locorum incipiant & desinant illis diebus quibus dictum est.

Loco-

Loco-  
polum  
perat a  
primus  
lu in  
illorum  
tis, &  
nii).  
finit co  
Cum h  
in 1 gr  
incipit  
Hæ  
Defini  
priora  
nimar  
rum le  
dit ad  
1 gr.  
mam.  
Loco  
sive int  
stas, V  
cipiunt  
singuli  
divers  
die tri  
Toric  
Austria  
I.  
bent,  
Verna  
nis, i  
ab xx  
pora,  
xta n  
tiantu

Locorum Telluris, quae inter Tropicum Capricorni & polum Antarcticum jacent, sive Zona Australis Temperata & Frigida Aestas incipit cum Solis ingressu in primum Capricorni (xxi Decemb.), & desinit cum Solis ingressu in 1 gr. Arietis (xxi Martii): Autumnus illorum locorum incipit cum Solis ingressu in 1 gr. Arietis, & desinit cum Solis ingressu in 1 gr. Cancræ (xxi Junii). Cum hoc incipit Hyems illorum locorum, quae desinit cum Solis ingressu in 1 gr. Libræ (xxi Septemb.). Cum hoc incipit illorum Ver, & desinit cum Solis ingressu in 1 gr. Capricorni (xxi Decemb.) ubi rursus Aestas incipit.

Hæc ostenduntur eodem modo per traditas Definitiones & per globum vel Mappas, quo priora ostendimus. Quia in 1 gr. Capricorni minimam Sol habet distantiam à verticibus illorum locorum: in 1 Arietis mediocrem, & descendit ad minimam: in 1 gr. Cancræ maximam: in 1 gr. Libræ mediocrem, & ascendit ad maximam.

Locorum autem Telluris, quae in Zona Torrida sive inter Tropicum Cancræ & Capricorni jacent, Aestas, Ver, Autumnus, & Hyems (caelestes), non incipiunt uno & eodem anni die, sed diebus diversis in singulis Zona hujus locis diversorum parallelorum, sive diversa latitudinis. Sunt autem Loca Zonæ Torridæ triplicia, nempe Loca Aequatoris, Loca Zonæ Torridæ Septentrionalia, & Loca Zonæ Torridæ Australia.

1. Loca in Aequatore jacentia hoc peculiare habent, quod duas sentiant Aestates, duas Hyemes, duo Verna tempora, duos Autumnos, idque singulis annis, ita ut in femisse anni nempe sex mensibus, ab xxi Martii ad xxi Septemb. quatuor illa tempora, Aestatem, Autumnum, Hyemem, Ver, juxta nostras definitiones & caelestem legem expectantur vel experiri debebant: easdem quatuor tem-

tem-



tempestates denuo ab XXI Sept. ad XXI Martii sentiunt: nimirum

æstas una est, dum Sol movetur à 1 gr. Arietis ad 2 gr. Tauri (ab XXI Martii ad XXI Aprilis)

Autumnus, dum Sol movetur à 2 gr. Tauri ad 1 gr. Cancræ (à XXI Aprilis ad XXI Junii)

Hyems, dum Sol movetur à 1 gr. Cancræ ad 2 gr. Leonis (ab XXI Junii ad XIX Augusti)

Ver, dum Sol movetur ab 28 gr. Leonis ad 1 gr. Libræ (à XIX Augusti. ad XXI Sept.)

Æstas altera est, dum Sol movetur à gr. Libræ ad 2 gr. Scorpæ (ab XXI Septem. ad XXI Octob.)

Autumnus alter est, dum Sol movetur à 2 gr. Scorpæ ad 1 gr. Capricorni (à XXI Octob. ad XXI Decem.)

Hyems altera est, dum Sol movetur à 1 gr. Capricorni ad 28 gr. Aquarii (ab XXI Decem. ad XIX Febru.)

Ver alterum est, dum Sol movetur à 28 gr. Aquarii ad 1 gr. Arietis (à XIX Febru. ad XXI Martii.)

Demonstrantur hæc omnia facillime ex traditis Definitionibus, quia Sol in 1 gr. Arietis & in 1 gr. Libræ minimam habet distantiam in meridie à verticibus locorum jacentium in Æquatore; nullam enim habet, quia verticalis eis fit: itaque tunc æstates incipient. Deinde in 2 gr. Tauri & 2 gr. Scorpæ (ubi Solis declinatio est 11 gr. 45. min.) mediocrem acquirit distantiam discedens ad maximam, itaque tunc incipient Autumni: Porro in 1 gr. Cancræ & 1 gr. Capricorni existens maximam habet distantiam ab Æquatoris locis, itaque tunc hyemes incipient. Denique in 28 gr. Leonis & 28 gr. Aquarii, mediocrem recipit distantiam à locis Æquatoris, (10 gr. 45. min.) ascendens versus minimam, itaque tunc verna tempora incipient. Magis perspicue ex globo hæc intelliguntur. Etsi itaque ita distinguantur hic tempestates juxta cælestem legem, tamen terrestres tempesta-

tes in  
ut in f

2.  
trional  
tium  
bru; j  
tiam  
ca dive

Ete  
locis fi  
ce loco  
Defini  
bus lo  
quod  
mam  
bus ill  
bus vic  
pricorn  
de Sep  
fnois,  
brum.

Alte  
batur.  
hoc el  
beant  
lis fiet  
tis cu  
quand  
nit ad  
vertica  
Æstati  
tamen  
tii & x  
Æstas,  
bus ad  
ptica,  
bent)

tes in plurimis Æquatoris locis aliter observantur, ut in sequentibus dicemus.

2. *Lōca Telluris omnia in Zona Torrida Septentrionali jacentia habent quidem Autumni finem & initium Hyemis simul eodem tempore, nempe XXI Decembri; sed Æstatu, & Veris initium atque finem, ut etiam Autumni initium non habent simul, sed diversa loca diversis diebus.*

Etenim Autumni finis Hyemisque initium in locis fit, ubi Sol maximam, quam potest, à vertice locorum illorum distantiam adipiscitur, ut in Definitionibus suppositum fuit. Atqui de omnibus locis *Zonæ Torridæ Septentrionalis* verum est, quod Sol in 1 gr. Capricorni ingrediens maximam in meridie distantiam acquirat à verticibus illorum locorum, quia reliquis diebus omnibus vicinior illis locis est. Itaque Sole in 1 gr. Capricorni ingresso omnibus illis locis *Zonæ Torridæ Septentrionalis* fit Hyemis initium & Autumni finis, quod est primum Propositionis hujus membrum.

Alterum membrum quoque facili negotio probatur. Si enim loca illa diversæ sunt latitudinis, hoc est diversam ab Æquatore distantiam habeant, non eisdem sed diversis diebus Sol verticalis fiet in meridie illis locis. Est autem tunc æstatis cujusvis loci *Zonæ hujus Torridæ* initium, quando Sol ascendendo à 1 gr. Capricorni pervenit ad eum gradum *Eclipticæ Septentrionalis*, ut verticalis sit loco illi. Itaque diversis diebus fiet Æstatis initium in diversis illis locis: in omnibus tamen locis illis cadet initium hoc inter XXI Martii & XXI Junii. Diversis quoque diebus finiatur Æstas, & Autumnus incipiet, quia Sol diversis diebus ad mediocrem distantiam (sive ad puncta *Eclipticæ*, quæ mediocrem à locis illis distantiam habent) perveniet, quia puncta hæc inter 1 gr. Libræ

bræ & 1 gr. Capricorni sita diversa sunt: cadet tamen initium hoc inter XXI Sept. & XXI Decemb. Eodem modo diversis diebus finietur Hyems & Verincipiet, quia rursus puncta Eclipticæ mediocris distantia à verticibus illorum sunt diversa, Illa autem attingens Sol facit Veris initium: quod tamen in omnibus cadet inter XXI Decemb. & XXI Martii.

3. Denique Loca Telluris omnia in Zona Torrida Australi sita habent etiam Autumni finem & initium Hyemis simul eodem tempore, nempe XXI Junii: sed Æstatis & Veris initium atque finem, ut etiam Autumni initium non habent simul, sed diversa loca diversis diebus, ita tamen ut Æstatis omnium horum locorum initium cadat inter XXI Septembr. & XXI Capricorni: Autumni initium, finisque Æstatis inter XXI Martii & XXI Junii: Veris initium, & Hyemis finis inter XXI Junii & XXI Septembris.

Probantur membra hujus Propositionis eodem modo, quo in precedenti id factum est.

Etenim die XXI Junii Sol existit in 1 gr. Canceri, atque ideo à locis Australis Zone Torridæ habet maximam, quam potest, distantiam. Erit itaque tunc omnibus illis initium Hyemis. Æstatis vero, Veris atque Autumni initia diversis diebus fient, quia Sol in diversis punctis Eclipticæ sit verticalis diversis locis, & distantiam quoque mediocrem ab illis locis diversis diebus acquirit.

4. Peculiare aliquid habent illa loca Telluris, in Zona Torrida, qua inter Equatorem & octavum gradum latitudinis tam versus Septentrionem, quam versus Austrum jacent. Sol enim motu suo proprio, vel accessu & recessu facit illis duas Æstates, duo Verna tempora, unum tamen modo Autumnum, unamque Hyemem, idque perturbato quodam

ordi-

ordine,  
monus,

Car-

dens à

quato

initium

initium

stantiar

tices,

priman

quam p

distant

adipisc

gradibu

tiam Se

Æquat

tis exit

maxim

tice hu

(nemp

ab Æo

Æquat

itaque

cris di

Sol fue

co vel

min. tr

Ver qu

loci ve

tam di

tem Ec

& 45 r

bræ, 3

scium

puncto

corni a

diam

ordine, nempe hoc: Ver, Æstus, Ver, Æstus, Autumnus, Hyems.

Causa hujus paradoxii est, quoniam Sol recedens à verticibus horum locorum, quæ inter Æquatorem & 8 gr. latitudin. Borealis jacent (ubi initium primæ æstatis fecit) versusque Cancræ initium progrediens mediocrem hic acquirit distantiam, à verticibus regrediatur versus illos vertices, non Autumnum faciet post Æstatem illam primam, sed aliud Ver, cum primum fecisset, antequam primam Æstatem inciperet, ubi mediocrem distantiam inter 1 gr. Capricorni & 1 gr. Arietis adipiscitur. Ex gr. sumamus locum, qui quatuor gradibus distat ab Æquatore. Quoniam itaque etiam Sol in 10 gr. Arietis declinat sive distat ab Æquatore gradibus quatuor, itaque in 10 gr. Arietis existens faciet loco illi initium Æstatis. Porro maxima distantia, quam Sol habere potest à vertice hujus loci in meridie, est 27 gr. 30 min. (nempe in 1 gr. Capricorni, ubi declinatio ejus ab Æquatore est 23 gr. 30 min. quibus loci ab Æquatore distantia Borealis additur 4 gr.) cum itaque minima distantia sit 0 gr. 0 gr. erit mediocri distantia sive media, 13 gr. 45 min. Quare cum Sol fuerit in punctis Eclipticæ quæ ab assumpto loco vel loci parallelo distant gradibus 13, & 45 min. tunc Sol faciet Ver vel Autumnum illi loco; Ver quidem, si Sol à punctis illis moveatur versus loci verticem: Autumnum vero, si Sol ad remotam distantiam tendat à puncto illo. Puncta autem Eclipticæ, quæ ab assumpto loco distent 13 gr. & 45 min. reperiuntur quatuor, nempe 25 gr. Libræ, 3 gr. Geminorum, 27 gr. Cancræ, 5 gr. Piscium, quod probatur ex Declinatione horum punctorum. Quoniam itaque Sol à 1 gr. Capricorni ad 5 gr. Piscium accedens acquirit hic mediam distantiam à vertice loci assumpti, & tendit versus



versus locum, faciet tunc nempe in 5 gr. Piscium existens, Veris initium in loco illo, quod Ver durabit donec Sol accedat ad 10 gr. Arietis, ubi loco fiet verticalis, eritque æstatis initium. Cum jam motu suo Sol ad 3 gr. Geminorum recesserit à loco, habebit iterum mediocrem distantiam à vertice illius loci in meridie, nempe 13 gr. 45 min. itaque tunc Æstatis illius finis erit, & initium Veris, non Autumni, quia Sol à 3 gr. Geminorum non tendit ad maximam distantiam à vertice, sed redit ad minimam, nempe dum per Cancrum motus & Leonem pervenit ad 20 gr. Virginis. Tunc enim iterum loco assumpto fit verticalis, facitque novæ Æstatis initium, quæ durat eo usque donec Sol ad 25 gr. Libræ pervenerit. Tunc enim iterum adipiscitur mediam distantiam & tendit versus punctum maximæ distantia (1 gr. Capricorni:) itaque tunc initium Autumni faciet: & in 1 gr. Capricorni Hyemis initium. Sic itaque monstravimus, quomodo locus talis, qui inter Æquatorem & 8 gr. latitudinis Borealis in Zona Torrida jaceat, habeat duas Æstates, duo Verna tempora, unum Autumnum & unam Hyemem. Quod eodem modo ostenditur de locis ab Æquatoris altera parte inter 8 gr. latitudinis jacentibus.

In locis vero ultra 8 gr. sitis versus Tropicos non habet hoc locum, quia puncta illa 1 gr. Cancræ vel 1 gr. Capricorni non habent ab illis mediam distantiam sed minorem media. Etenim à loco 9 gr. latitudinis maxima Solis distantia, quæ fieri potest, est 32 gr. 30 min. media itaque est 16 gr. 45 min. Si itaque locus sit in 9 gr. latitud. Borealis, Sol in 1 gr. Cancræ existens habebit minorem ab eo distantiam, quam media est: est enim illa tantum 14 gr. 30 min. hæc vero 16 gr. Itaque in illo loco Æstas, quæ incepit cum primo Solis accessu ad verticem, (in 24 Ariet. 15 April.) non

non fu  
bitur  
Cancr  
jus gra  
finet.

Vide  
stere d  
ses non  
do itin  
que ali  
cri rece  
æstatem  
Sed ad  
sed non  
cessu a  
hoc ipse  
recessus

2. D  
jacentib  
sit austr  
à locis i  
fieri pri  
veris, q  
rursus v  
pe ad 1  
sciendur  
ut nulla  
num ve  
ris rece  
pestati,  
imus es

Alite  
nimiru  
quod Ve  
nuam æ  
pus hui  
ejus, qu

non finietur ante Tropicum Cancrī, sed continuabitur toto Solis itinere per Taurum, Geminos, Cancrum, Leonem, Virginem, Libram, in cuius gradu 24, nempe 15 Octobris circiter, desinet.

Videntur quidem hic novæ quædam rursus existere difficultates, nempe dux: 1. Quod hi menses non sint ascribendi æstati, quia Sol non directo itinere à vertice recedat, sed prius ad aliam atque aliam distantiam, dum versus Tropicum Cancrī recedit à loci vertice, & deinde rursus accedit: æstatem vero definiendam solo recessus tempore. Sed ad hoc respondeo, definiiri æstatem recessu, sed non recessu ad quamvis distantiam, verum recessu ad mediocrem vel mediam distantiam, neque hoc ipso excludi accessum mixtum recessui, modo recessus non fuerit major mediâ distantia.

2. De locis inter Æquatorem & 8 gr. latitudinis jacentibus, cum ante 1 gr. Cancrī (vel si latitudo sit australis, ante 1 gr. Capricorni) Sol mediocrem à locis illis acquirit distantiam, ubi diximus finem fieri primæ æstatis, non videtur ponendum initium veris, quia Sol ab illo puncto non directe movetur rursus versus locum, sed prius magis recedit, nempe ad 1 gr. Cancrī, & ab hoc ad locum redit. Verum sciendum est, illum recessum adeo parvum esse, ut nulla ejus debeat haberi ratio, quia vix unum vel alterum gradum facit, atque illud majoris recessus tempus non potest alteri ascribi tempestati, nisi quintam aliquam novam & sextam velimus effingere.

Aliter etiam de locis hisce videri posset alicui, nimirum non esse ponendum intermedium ali-quod Ver inter duas Æstates, sed unam & continuam æstatem, atque illud intermedii veris tempus huic æstati attribuendum non habitâ ratione ejus, quod Sol ad mediam distantiam removeatur à

loco, quandoquidem adeo propinquus maneat loco & tam parum recedat ultra mediam distantiam, ut vix calorem aëris minuere, sed potius propter continuitatem augere possit illo tempore. De hoc cum nemine certavero: puto tamen commodius fore, si explicata methodo insistamus. Sed nimis multa de hoc negotio.

PROPOSITIO IV.

*Dato loco in Zona Torrida invenire dies anni, quibus Æstas, Autumnus, Ver atque Hyems incipiant & desinant in illo loco.*

1. Si locus in ipso Æquatore situs sit, diximus in præced. propos. theoremate 3., quibus diebus incipiant & desinant hæc anni tempora, quæ ibi duplicia sunt.

2. Si locus sit extra Æquatorem & ultra 8 gr. latitudinis vel distantia ab eo remotus, adducatur is ad meridianum, & punctum meridiani imminens notetur cretâ. Deinde volvatur globus donec punctum aliquod Eclipticæ inter 1 gr. Arietis & 1 gr. Cancris situm ad idem meridiani punctum perveniat (si locus datus sit in Septentrionali Torrida, sed si in Australi Torrida, tunc punctum inter 1 gr. Libræ & 1 gr. Capricorni debet transire: ) Hoc erit punctum, quod Sol ingrediens faciet æstatis initium in proposito loco. Deinde gradus intercepti inter notatum meridiani punctum & Tropicum Capricorni (Cancris, si locus Australis sit datus) secentur in æquales duas partes, atque medium punctum in meridiano notetur, & moveatur globus donec punctum Eclipticæ situm inter 1 gr. Capricorni, atque 1 gr. Arietis (inter 1 gr. Cancris & 1 gr. Libræ, si locus australis), transeat per notatum punctum ultimum meridiani; item rursus moveatur, donec aliud punctum inter 1 gr. Capricorni & 1 gr. Libræ (1 gr. Cancris

Canc  
ent id  
notab  
Autu  
corn  
1 gr.  
Ide  
curati  
cum c  
clinat  
cui vi  
sume  
si qui  
ptent  
inter x  
erit af  
Dei  
11 gr.  
in Tab  
ne qu  
diam  
datus  
tuor d  
Decem  
tium):  
Hic eri  
rit Aus  
bus, di  
pro ini  
ter xx  
erit xx  
si locu  
3. S  
latitud  
na ter  
nisi for  
æstates

Cancrī & 1 gr. Arietis, si locus Australis) transeat idem meridiani punctum. Prius punctum denotabit diem pro initio Veris, posterius pro initio Autumni. Hyemis vero initium est 11 gr. Capricorni, si locus datus Septentrionalis sit; verum in 1 gr. Cancrī, si Australis datus.

Idem quoque per Mappas solvi potest: sed accuratissime ex Tabulis declinationum: nimirum cum data latitudine loci ingredi Tabulam Declinationis solaris: in qua eam latitudinem quaere, cui videbis appositos quatuor anni dies. Ex hisce sume eum, qui inter 21 Martii & 21 Junii cadit, si quidem datus locus sive data ejus latitudo sit Septentrionalis: sed si australis, sume eum diem, qui inter 21 Septemb. & 21 Decembr. cadit. Hic dies erit æstatis initium.

Deinde datæ loci latitudinis dimidium aufer ab 11 gr. 45 min. atque residuum numerum quaere in Tabula Declinationis. Videbis iterum e regione quatuor anni dies, in quorum duobus Sol mediam distantiam à dato loco obtinebit. Si itaque datus locus fuerit Septentrionalis, sume ex quatuor diebus illos duos, quorum unus inter 21 Decembr. & 21 Martii cadit (Hic erit veris initium): alter inter 21 Septemb. & 21 Decembris; Hic erit Autumni initium. Sed si locus datus fuerit Australis, sumendus erit ex quatuor illis diebus, dies inter 21 Junii & 21 Septembris cadens pro initio Veris, & pro initio Autumni is, qui inter 21 Martii & 21 Junii cadit. Hyemis initium erit 21 Junii, si locus australis; sed 21 Decembr. si locus Septentrionalis.

3. Si locus datus sit inter Æquatorem & 8 gr. latitudinis, habebit is duas æstates & duo verna tempora præter Autumnum & Hyemem, nisi forte velimus Ver illud secundum inter duas æstates intermedium, ut in fine præcedentis Propo-



positionis dictum, rejicere, & continuam ætatem illi tempori tribuere. Quod si placeat facere, non aliter cum dato loco agimus ac in priori modo. Sed si duas Æstates & duo Verna tempora illi tribuere velimus, ut accurate observatæ definitiones Æstatis atque Veris postulant, agemus primo eodem modo, ac in prioribus, nempe initium Æstatis Hyemisque inveniemus, atque mediocris distantie dies inventos in Tabula quatuor excerpemus. Ex illis quatuor duo illi, quos in priori modo jussi sumere pro initio Veris atque Autumni, hic iterum sumemus eisdem conditionibus: sed reliquorum duorum dierum ille tantum qui æstatis diei propinquior est, sumendus erit.

Hic enim primæ Æstatis finem & secundi Veris initium denotabit. Pro die autem secundæ æstatis, sumendus erit in area ea, ex qua primæ æstatis initium sumtum est, etiam alter dies ex tribus residuis: is nempe qui æquali dierum numero à XXI Junii distat, ac (XXI Capricorni si locus Australis) dies primæ æstatis. Ita inventi erunt dies, quibus Æstas, Ver, Autumnus atque Hyems incipiunt & desinunt in locis Zonæ Torridæ.

#### PROPOSITIO V.

*In locis Zonarum temperatarum atque frigidarum quatuor anni tempora, Æstas, Autumnus, Hyems atque Ver æqualia sunt fere, sive æquali dierum numero constant. In locis vero Zona Torrida inæqualia sunt. Neque tantum ipsa tempora diversarum tempestatum inæqualia, sed etiam ejusdem tempestatis tempus in diversis Zona locis inæquale est.*

1. De locis Zonarum Temperatarum atque Frigidarum quod dicitur, facilem habet Demonstrationem. Etenim cum Sol singulis ex quatuor illis anni temporibus percurrat tria signa, ideo ipsa

Tem-

Temp  
æqua  
diebu  
tuor  
dit A  
libus  
atque  
nire i

2.  
dem f  
sed an  
via su  
quod  
ut am  
beant  
vel qu  
longio  
ita ut  
dierum  
mensi  
pro in  
tempe

3.  
sunt a  
minor  
Autum  
decim  
ultra  
mnus,  
tioner

Qu  
lestibu  
recessu  
hoc au  
gus, &  
causas

Tempora Veris, Æstatis, Autumni, Hyemis erunt æqualia sive æqualium dierum, exceptis aliquot diebus, quinque nimirum, quibus Æstas, & quatuor quibus Ver locorum Septentrionalium excedit Autumnum & Hyemem: in locis vero Australibus contra, Autumnus & Hyems excedunt Ver atque Æstatem, quod à Solis Eccentricitate provenire in superioribus monuimus.

2. In locis jacentibus in ipso Æquatore duæ quidem sunt æstates (sicut & reliquæ tempestates), sed ambæ breves, sicut & ambo verna tempora brevissima sunt, nimirum unaquæque æstas & unumquodque Ver habet tantum dies triginta duos, ita ut ambæ æstates, sicut & ambo verna tempora habeant dies 64, hoc est duos tantum menses & duos vel quatuor dies. Sed Autumnus & Hyems sunt longiores, nempe quinquaginta quinque dierum, ita ut ambo Autumni sicut & ambæ Hyemes sint dierum centum & decem, hoc est fere quatuor mensium. Hæc manifesta sunt ex assignatis diebus pro initio Æstatum, Autumnorum, Hyemum, & temporum vernorum.

3. In locis Zonæ Torridæ, quo minus remota sunt ab Æquatore, eo majorem habent Æstatem, minorem Hyemem, magis vel minus mediocrem Autumnum atque Ver: nempe in locis non ultra decimum gradum ab Æquatore remotis durat æstas ultra sex menses. Quanta autem sit Æstas, Autumnus, Hyems, atque Ver, cognoscitur per Propositionem præcedentem.

Quæ hæcenus dicta sunt, de tempestatibus cælestibus, hoc est à cælesti causa sive solari accessu & recessu dependentibus, tantum intelligenda: ab hoc autem solo non provenire lucem, calorem, frigus, &c. jam aliquoties monuimus: itaque reliquas causas in sequentibus considerabimus.

## PROPOSITIO VI.

In locis Zona Torrida sicut Sol de die vertici admodum vicinus fit, ita de nocte contra profunde infra Horizontem demergitur & à vertice locorum illorum quammaxime removetur, ita ut loca hæc de nocte in media fere umbra Telluris jaceant, neque aër illorum, ullis radiis Solis per frequentem reflexionem aliquo modo illustrari vel calefieri possit.

In locis Zona frigida sicut Sol de die non admodum vicinus fit illorum vertici, ita de nocte non profunde infra Horizontem manet, sed maximâ noctis parte ita rotatur infra Horizontem, ut multi radii ab eo in aërem illorum locorum per reflexionem penetrant.

In locis Zonarum Temperatarum sicut Sol de die mediocri viciniâ accedit ad verticem illorum locorum, ita de nocte mediocri distantiâ infra Horizontem deprimitur, ita ut aliqui saltem radii in aërem illorum à Sole per reflexionem repetitam deriventur.

Ad hæc ostendenda per globum, elevetur primo polus pro loco aliquo in Zona Torrida sito, vel potius, polus in ipso Horizonte constituitur, ut loca Æquatoris sint in vertice Horizontis, sive ut Horizon ligneus fiat Horizon locorum Æquatoris. Consideretur deinde parallelorum, quos Sol circumrotatione suâ describit, depressio infra Horizontem; & conspicua erit veritas primæ membri Propositionis,

Deinde elevetur polus pro locis Zonæ Frigidæ, sive polus constituitur in vertice Horizontis: Et consideratis parallelis Solis infra Horizontem existentibus à 1 gr. Libræ ad 1 gr. Arietis; iterum manifestum erit, quod parum infra Horizontem deprimantur, atque ita secundum membrum Propositionis ostensum est.

Deni-

Denique elevetur polus pro latitudine loci alicujus in Zona Temperata siti, & iteram consideratâ parallelorum depressione infra Horizontem probabitur tertium Propositionis membrum.

## PROPOSITIO VII.

*Dato loco in globo, & die anni, inveniri longitudinem crepusculi in dato loco ad datum diem.*

Crepusculi autem longitudo dicitur tempus, quo ante ortum Solis vel post occasum ejus, lux aliqua in aëre animadvertitur.

Ad inveniendam temporis hujus quantitatem supponendum nobis est id quod ab Astronomis est observatum (ut capite XIX diximus), crepusculum matutinum incipere plerunque, si aër sit serenus, Sole accedente ad 18 graduum depressionis infra Horizontem, & vespertinum desinere, ubi Sol ad eum depressionis gradum accesserit.

Elevetur itaque polus pro dati loci latitudine, & locus Solis in Ecliptica, ex die anni inventus quaratur in globi Ecliptica, ejusque punctum oppositum notetur. Deinde quadrans applicetur vertici, & notatum punctum adducatur ad Horizontem, Index ad horam XII cycli. Volvatur tunc globus donec notatum punctum elevatum fuerit octodecim gradibus supra Horizontem, quod ope quadrantis cognoscetur. Sic enim locus Solis totidem gradibus infra Horizontem depressus erit. Et index in cyclo monstrabit, quot horis vel horæ partibus crepusculum illo die in dato loco duret, positâ aëris serenitate. Adolescentes tribus exemplis hujus Problematis usum discere commodum est, uno Zonæ Torridæ, altero Temperatæ, tertio Frigidæ locum eligentes.

## PROPOSITIO VIII.

*In locis Zone Torridæ crepuscula sunt minima,*



*in Zonis Frigidis longissima, in locis Temperatarum Zonarum mediocria.*

Etenim in locis *Æquatoris* & vicinis crepusculum juxta hypothelin in priori propositione positam est unius circiter horæ, quod tamen dimidia tantum horæ vel paulo amplius esse experientia testatur, nimirum quia aër crassior non est ibi tam altus quam requiritur, ut ad 18 gr. depressionis creperam lucem faciat; tunc etiam quia hypothesis de 18 gradibus, accipienda est de valde exigua luce, cum qua incipiat crepusculum, qualis à vulgo nondum habetur pro crepusculo.

In Zonis frigidis crepuscula durant per multos dies, quando ipse Sol infra Horizontem illorum manet.

In Zonis Temperatis durant crepuscula horis 3, 4, 5, 6 & per totam noctem alicubi & in diebus æstatis, prout loca vicina sunt frigidæ Zonæ magis aut minus,

Hæc omnia probantur per modum in precedente Propositione positum.

### PROPOSITIO IX.

*Dato loco in Zona Temperata vel Frigida, & alio loco in Zona Torrida, datoque præterea die anni, invenire horam loci Zona Torrida, in qua hora Sol eam altitudinem habeat supra Horizontem illius loci (atque ideo radiis æque elevatis illum locum feriat) quantum habet in loco Zona Temperata in ipse meridie.*

Elevetur polus pro latitudine loci Zonæ Temperatæ vel Frigidæ: Et locus Solis ex dato die inventus adducatur ad Meridianum, atque altitudo ejus numeretur. Hæc enim est altitudo radorum, locum illum calefacientium & illuminantium in meridie.

Deinde polus elevetur pro alterius loci in Zonæ Torrida

Torridi,  
venti  
dex a  
globu  
niat c  
habeb  
quant  
bit in  
cum r  
arque  
Horiz  
sequit  
lor fut  
loco Z  
accede  
diebus  
rit loc  
lem ve  
gidæ.  
Zonæ  
rarios  
& ad u  
efficac  
Sol ob  
tur &  
plaga  
in locu  
calefac  
Exe  
locis j  
rum S  
Amste

Qu  
sa, g

Torrída dati latitudine; Quadrans applicetur vertici, & notetur in eo gradus altitudinis antea inventæ: locus Solis ad meridianum adducatur, Index ad horam XI cycli. Moveatur deinde tam globus quam quadrans, donec locus Solis conveniat cum notato quadrantis gradu. Ita enim Sol habebit supra Horizontem hujus loci altitudinem, quanta est in meridie prioris loci. Index monstrabit in cyclo horam quæsitam. Hac itaque hora cum radii Solis illustrantes & calefacientes locum atque ærem Zonæ Torrídæ sint æque elevati supra Horizontem ejus ac radii in meridie prioris loci, sequitur inde, quod ad inventam horam idem calor futurus sit in loco Zonæ Torrídæ, quantus in loco Zonæ Temperatæ in meridie, nisi alix causæ accederent; nimirum 1. quod Sol præcedentibus diebus calidam aliquam constitutionem induerit loco atque aëri Zonæ Torrídæ, non autem talem vel tantam in locis Zonæ Temperatæ vel Frigidæ. 2. quod Sol supra Horizontem locorum Zonæ Torrídæ recte ascendens versus Meridianum radios omnes ad locum mittit quasi in uno plano & ad unam plagam atque ideo majorem calorem efficit, quam in Zona Temperata vel frigida, ubi Sol oblique ab Horizonte ad Meridianum movetur & radios versus loca mittit ex alia atque alia plaga & in alio atque alio plano: itaque radii non in locum ita angustum contrahuntur vel continue calefaciunt.

Exempli causa, Quæramus quotâ horâ diei in locis jacentibus in ipso Æquatore, die æquinoctiorum Sol eam sit habiturus altitudinem, quantam Amstelodami habet in meridie ejusdem diei?

PROPOSITIO X.

Quomodo lucis, caloris atque tempestatum causa, quæ Propositione prima hujus capituli enumerata

vimus, in Zona Torrida locis se habeant, exponere.

1. Sol singulis anni diebus recte ascendit supra Horizontem illorum locorum (præsertim Æquatoris) versus Meridianum & verticem illorum, atque ideo horâ nonâ circiter antemeridianâ radios quadraginta circiter gradibus à perpendicularibus declinantes incipit ejaculari ad illa loca, quæ radorum recitudo sive radorum perpendicularum accrescit ad meridiem, & decrescens rursus durat usque ad quartam horam post meridiem; ubi Sol versus Occidentalem Horizontem discedens radios magis obliquos incipit emittere ad illa loca. Præcipuus itaque æstus in illis locis esse debet à nona circiter hora ante meridiem usque ad tertiam vel quartam post meridiem, si hæc causa sola respectetur. Quoniam tamen Sol à singulorum locorum vertice modo recedit, modo propius accedit, ideo Hyems singulorum locorum erit, ubi Sol à punctis Eclipticæ maxime remotis ab illis locis, hoc est, à 1 gr. Cancrî vel 1 gr. Capricorni graditur versus puncta mediam distantiam habentia à loco aliquo assumpto: Ver, ubi à puncto mediocris distantie graditur versus ipsum loci verticem, sive ad punctum Eclipticæ, quod loco vel paralelo loci verticale est: Æstas, ubi à puncto verticali graditur Sol ad punctum aliud medie distantie. Autumnus illo tempore, quo Sol à puncto hoc altero medie distantie graditur ad punctum maximæ distantie, hoc est ad 1 gr. Capricorni vel 1 gr. Cancrî.

2. In locis ipsius Æquatoris Sol nullo anni die commoratur supra Horizontem pluribus vel paucioribus horis quam duodecim, & totidem infra. In aliis Zone Torridæ locis, unâ vel sesquialterâ ad summum horâ (nempe in locis extremis Zone hujus circa Tropicum Cancrî & Capricorni) cum dies est longissimus, Sol commoratur supra Horizontem

zontem  
villim  
circite  
duode  
& inf  
noctes  
duret

3.  
tur inf  
nullis  
fa faci  
& frig  
contra  
suâ gra  
(semil  
ejus C  
riuntu

4.  
dit ab  
corum  
ab Ecl  
cedat  
quoq  
ras sup  
dem f  
dixim  
lari vi  
fit, te  
propt  
lius et  
vertic

5.  
locis  
modi  
non e  
que i  
sensil

zontem ultra illas duodecim horas, & in die brevissimo tanto minori tempore, nempe undecim circiter horis, & intermediis diebus non multum à duodecim horis discrepat tempus moræ solis supra & infra Horizontem. Hæc itaque causa faciet, ut noctes non sine frigore sint, & æstus dici non diu duret circa vespertina tempora.

3. Nocturno tempore, profunde Sol deprimetur infra Horizontem, ita ut ærem loci-cujusvis nullis radiis ne reflexis quidem illustret. Hæc causa faciet, ut & densissimæ tenebræ noctis ibi sint, & frigus noctis augeatur, ær condensetur & se contrahat atque frigidus versus terram descendat suâ gravitate. Præterea exiguo admodum tempore (semisse horæ circiter) ante Solis Ortum & post ejus Occasum crepusculi lucem & calorem experiuntur illa loca.

4. Luna eodem modo fere ac Sol recte ascendit ab Horizonte versus Meridianum illorum locorum, aliquantum tamen obliquius, quoniam ab Ecliptica atque adeo extra Zonam Torridam recedat quinque circiter gradibus. Commoratur quoque eodem modo ac Sol parum ultra XII horas supra Horizontem; deprimetur infra eum totidem fere horis, & quidem profunde, sicut de Sole diximus. Itaque radiis suis rectis sive perpendiculari vicinis, præsertim cum loco alicui verticalis sit, teporem noctis augebit, in recessu minuet, sed propter parvam moram supra Horizontem vix illius effectus erit sensibilis in loco aliquo, nisi cum verticalis est illi.

5. Omnes stellæ oriuntur, omnes occidunt in locis Æquatori vicinis (quæ polo vicinæ sunt admodum stellæ in locis remotioribus ab Æquatore non quidem oriuntur, sed paucissimæ ex sunt) atque ideo nocte teporem vel lucem exiguam & insensibilem in ære procreare possunt.



6. In multis *Zonæ Torridæ* locis, ut in insulis Indicis, atque India ipsa, in procurrente seu lingua Africa, in Guinea Africa, in Mexicana Hispania terra est sulphurea, quæ halitus calidiores emittit, unde aërit eporem aliquem & peculiarem proprietatem communicat. In quibusdam locis est arenosa, ut in parte Africa Septentrionali in *Torrida* jacente, nempe in parte Libya, Nigritarum regione, &c. ita in Arabia multis locis, in Peruviano regno, in locis inter Peruviam & Brasiliam. Unde in his locis ingens æstus à Sole excitatur, quia grana arenæ diutissime retinent acceptum à Sole calorem & vicino aëri continue communicant. In aliis locis plures sunt fluvii, in arenosis illis pauci. Plures sunt in Abassia, in Guinea, in Congo, in India, in Brasilia. Unde humidi vapores excitantur, qui admodum retundunt vires radiorum Solis, atque calorem magis tolerabilem reddunt.

7. Pleraque loca *Zonæ Torridæ* vicinum habent mare, ut India, Insulæ Indicæ, lingua Africa, Guinea, Brasilia, Peruvia, Mexicana Hispania; pauca loca *Zonæ Torridæ* sunt mediterranea, ut Africa interior, regiones inter Peruviam & Brasiliam. Unde fit, ut in hisce locis major æstus & siccitas: in illorum vero plerisque aër humidior & minus fervens à Sole fieri possit, nisi aliæ causæ accedent.

8. Pleraque regiones *Zonæ Torridæ*, cum à mari fere undique cingantur singulæ, habent in mediis locis juga montium magis vel minus exselsorum, ut India, insulæ Indicæ, lingua Africa, Peruvia. Hæc juga montium admodum variant lucem, calorem, pluvias illorum locorum. Alicubi enim impediunt Orientales Solis radios, alibi Occidentales: præterea humidi vapores in aëre condensati ad illorum vertices moventur, ut ex-

plica-

plicav  
bus c  
& ter  
sunt  
rior  
sunt.

9.  
cis Z  
riente  
nue v  
quæ C  
tus A  
ut Gu  
Alii v  
venti  
ipsi s  
suffici  
modu  
quand  
ordin  
cunt a  
tes, a

10.  
jis Zo  
nem r  
laris r  
nostru  
ordin  
opina

Cæ  
riæ fir  
prieta  
dam e  
fis an  
pedia  
sit in  
condi

pluviam cap. xx. Unde pluvia, nubes, &c. quibus calor atque lumen Solis admodum impeditur, & tempestatum ratio caelestis turbatur. Pauca loca sunt Zonae Torridae, quae illis jugis carent, ut interior Africa, Mexicana Hispania, & si quae alia sunt.

9. Ventorum varii & insignes sunt effectus in locis Zonae Torridae. Etenim ventus Generalis ab Oriente vel Orientis lateralibus plagis spirans continue versus Occidentem refrigerat loca maritima, quae Orientem spectant, ut Brasiliam, Orientale litus Africae; non ita illa, quae Occidentem spectant, ut Guineae & Congi, Angolae, Peruviae littora, &c. Alii venti sunt proprii, ut australis in Peruvia, qui venti vapores pellunt versus eam plagam in quam ipsi spirant. Alii statim venti: de quibus omnibus sufficienter egimus, cap. xxi. Hi itaque venti admodum turbant caelestem rationem tempestatum, quandoquidem illi aequae fere constantes sunt atque ordinem observant, quam ipsius calis motus. Diducunt aera, compellunt versus montium juga vapores, atque aliis modis variant tempestates.

10. Nubes, pluviaque anniverfariae sunt in multis Zonae Torridae locis, atque ita caelestem rationem tollunt, cum aequae constantes sint ac ipse Solaris motus. Errant enim illi, qui sublunarem hunc nostrum orbem omnia inconstantia & sine certo ordine, sola caelestia constantem motum servare opinantur.

Ceterum cum causae haec enarratae tam variae sint quae calorem atque alias tempestatum proprietates efficere possunt, atque in uno loco quaedam ex illis causis, in alio aliae vigeant vel diversis anni temporibus concurrant vel se mutuo impediant, inde cognoscimus causam, cur adeo varia sit in locis Zonae Torridae tempestatum ratio & conditio.

## PROPOSITIO XI.

*Quando Ver, Æstas, Autumnus & Hyems (terrestres) se habeant, & quibus anni mensibus fiant in locis diversis Zona Torrida, enarrare.*

Monuimus in superioribus, Propositione imprimis secunda, quod tempestates in locis Zonæ Torridæ multis fiant contra Solaris motus vel viciniam rationem, nempe æstatem fieri ibi, cum Sol maxime recedit, Hyemem cum omnium maxime vicinis imo verticalis est vertici. Ideo distinximus tempestates, in cælestes & terrestres. Diximus hæcenus, & quidem Propositione tertia & quarta, quomodo dato loco quovis Zonæ Torridæ inveniendi sint menses anni, quibus locus ille Æstatem, Ver, Autumnum atque Hyemem habere debeat, si solus accessus & recessus Solis spectetur, hoc est, cælestium tempestatum tempora designare docuimus. Verum enimvero cum in locis plurimis hujus Zonæ non fiant dictæ tempestates illis mensibus, sed aliis, idque in diversis locis diverso tempore, ideo tempora terrestrium tempestatum non ex cælo vel certa methodo, sed ab ipsa experientia in locis illis facta, sunt desumenda, & quantum id fieri potest, causæ singulorum, eorum ita repugnent cælesti causæ, explicandæ sunt, nempe ex illis decem causis, quas Propositione prima posuimus. Id primo sciendum est, hyemem in Zona Torrida non gelu vel frigore sævire, sed pluviis potius & minori astu definiri, quam sit tempore æstatis. Deinde in plurimis Zonæ Torridæ locis non quatuor, sed duas tantum numerari anni tempestates, nempe Æstatem & Hyemem, atque hæc non calore & frigore distingui, sed siccitate & humiditate potissimum. Etenim hyeme sæpe major calor quam in ætate illorum cum respirationis angustia, quia pluvix & nubes deorsum

sum  
 annu  
 repet  
 In  
 qua  
 prog  
 à no  
 mus  
 O  
 co C  
 quat  
 ream  
 quan  
 greg  
 gni  
 tem  
 libu  
 tis h  
 conf  
 prac  
 exor  
 dum  
 num  
 los v  
 state  
 Æst  
 ann  
 cord  
 leg  
 cul  
 sper  
 tii  
 hys  
 vem  
 nium  
 nit.  
 Sol

sum premunt calidum aërem. Ver vero & Autumnum non ita manifestis indicibus vel differentiis reperiri.

*Incipiemus autem enarrationem ab Africa parte, qua in Zona Torrida jacet, & versus Orientem progredientes, cum Brasilia, in Occidente sitam à nobis dimensi ita totam Torridam Zonam finimus.*

Occidentalis litoris Africae regiones à Tropico Cancris usque ad Promontorium Viride (hoc quatuordecim gradibus ab Æquatore versus Boream distat) omnes sunt fertiles tam frumenti quam variorum pomorum, armenta quoque ac greges magna copia ibi reperiuntur: incolæ insigni robore. Calor aëris paulo excedit mediocritatem, ita ut incolæ nudi incedant, exceptis nobilibus & divitibus qui panno se vestiunt. Fertilitatis hujus & temperati aëris contra Zonæ Torridæ consuetudinem causa est, 1. Multi fluvii, quorum præcipui Senega & Gambea, antequam in mare se exonerant viciniam, regiones illas irrigant, humidumque ac frigidiorē aërem reddunt. 2. Vicinum mare, quod humidos vapores, frigidiusculos ventos præbet. Quomodo autem anni tempestates hic se habeant, & quibus anni mensibus Æstas Hyemsque incidant & vigeant, non inveni annotatum apud Scriptores, quæ ipsorum est sollicitudo & negligentia. In uno tamen itinerario legi, quod in una insularum, quæ jacent non procul à Viridi Promontorio (nomine Salinæ vel Hesperides); in una, inquam, illarum dicta S. Vincentii (latitudo est 16 gr.) menses pluviales, hoc est, hyems, sint Augustus, September, October, November, December, Januarius, usque ad Februarium. Hocce tempus cum caelesti lege fere convenit. Etenim mensibus Maio, Junio, Julio, quia Sol admodum vicinis vel etiam verticalis illi lo-



co fit, ideo æstatem cælestem facit, & hic terrestris convenit cum ea: namque tunc æstum majorem experiuntur & siccum aërem sine ullis pluviis. Mensibus Februario, Martio, Aprili, Ver est ipsis, quia Sol à mediocri distantia ad minimam movetur, ideoque sine pluviis tunc sunt, & mediocrem æstum experiuntur. Menses Augustus, September, October, Autumno ascribendi propter pluvias, etsi serius debebat incipere, quia Sol in Augusto nondum à minima distantia ad mediam rediit. Menses denique November, December, Januarius, sunt hyemis, quia Sol tunc maximam habet à vertice illorum distantiam, & tunc plures magisque continuas pluvias cum aliquo frigore experiuntur. Addit tamen Scriptor ille, non singulis annis hæc ita observari, sed plerisque tantum. Quomodo autem in continenti Africa vicinæ tempestates se habeant, non meminit, nisi quod de littore Sierra Leona subjungit contrarium, ut jam dicemus.

2. Succedunt jam regiones littoris Africani, quod Austrum respicit, atque à promontorio viridi ad curvaturam Africa, hoc est, ab Occidente in Orientem se extendit. Hæ regiones dicuntur uno nomine Guinea, etsi alii vocabulum hoc uni tantum parti tribuant: jacent autem in Torrida Septentrionali, duobus, tribus, quatuor & pluribus gradibus ab Æquatore. In hisce regionibus continuus quidem est sine frigore intercurrente calor aëris, nihilominus quosdam menses æstati, quosdam hyemi attribuunt (idem de priori Occidentali littore puto intelligendum esse). Etenim in littoris, quod Sierra Leona dicitur, atque novem circiter gradibus ab Æquatore versus boream removetur, regionibus, ut etiam in plurimis Guineæ tractibus, menses Martium, Aprilem, Maium, Junium, Julium, ascribunt hyemi, imprimis tres il-

los

los A  
men  
vix,  
ingru  
prest  
quisq  
Procel  
modo  
mensi  
quam  
terran  
præter  
bones  
per d  
tresce  
tantus  
num r  
asserve  
mense  
vix fav  
stas O  
Januar  
piunt  
Hæc  
sunt c  
Etenim  
ibi æst  
tici vic  
tepor  
vembr  
Sol cir  
istens  
ce. Hi  
à temp  
antem  
tonitru  
lucis il

Jos Aprilem, Maium, Junium, propterea quod hiſce  
 menſibus frequentes & fere continuæ cadant plu-  
 viæ, calidæ vel tepidæ, tonitrua & fulgura crebra  
 ingruant, atque tantæ procellæ cum ſubitaneo  
 preſtere, ecnephia, typhone, ſæviant, quanta vix  
 quiſquam concipere queat, qui non expertus eſt.  
 Procellas hæſce à Luſitanis vocari *Travados*, & quo-  
 modo ſæviant diximus cap. XXI. Hiſce quoque  
 menſibus agri inanes ſine ſegete jacent. Sed poſt-  
 quam procelloſi hi menſes ceſſarunt, tum demum  
 terram ſiccam (utcunque enim magnas pluvias  
 præteritorum menſium abſorbet), fodiunt, & car-  
 bones contuſos admifcent (loco ſtercorationis); ita  
 per decem dies ſinunt terram aliquantum pu-  
 treſcere: tunc ſemina injiciunt. Eſt autem hic  
 tantus æris calor junctus humiditati propter vici-  
 num mare, ut piſces capti forteant ſi dimidio die  
 aſſerventur incocti. Hiſce itaque locis hyems erit  
 menſe Aprili, Maio, Junio, ubi procellæ & plu-  
 viæ ſæviant. Ver, Julio, Auguſto, Septembri. Æ-  
 ſtas Octobri, Novembri, Decembri. Autumnus,  
 Januarius, Februarius, Martius, ubi pluviz inci-  
 piunt & procellæ.

Hæc autem tempora tempeſtatum in illis locis  
 ſunt contra cæleſtem legem ſive Solis motum.  
 Etenim menſibus, Maio, Junio, Julio, debebat  
 ibi æſtas eſſe ingens, quia Sol verticalis vel ver-  
 tici vicinus tunc eſt, quod etiam pluviz calor vel  
 tepor teſtatur: contra menſibus Octobri, No-  
 vembri, Decembri, debebat eſſe hyems, quia tunc  
 Sol circa principium & Tropicum Capricorni ex-  
 iſtens remotiſſimus eſt ab illorum locorum verti-  
 ce. Hic itaque terreſtrium tempeſtatum tempus  
 à tempore cæleſtium diſcrepat admodum. Cauſa  
 etiam iſtarum pluviarum & procellarum atque  
 tonitruum eo tempore cum Sol adeo vicinus eſt  
 locis illis, non facilis eſt explicatu. Mihi videtur  
 id.

id fieri, quod Sol de die multos vapores ex mari & halitus sulphureos ex terra Guineæ (est enim sulphurea & metallifera) eliciat, qui vapores noctis frigore condensati pluvias efficiant, præsertim cum in hisce locis non spiraret continuus aliquis ventus, qui vapores discutere possit, sed plerumque malacia hic sit exceptis procellis. Et pluviarum isti menses, quos hyemi attribuunt, non sunt frigidi sed calidi, quoniam nullus ventus spirat, & Sol est verticalis: imo calor est suffocativus, qui hominibus angustæ sit respirationis causa.

Etsi vero ager frumento sit vacuus pluviis hisce mensibus; nihilominus tamen arbores & frutices toto anno virent & fructus ferunt.

Dies hic nocti per totum annum fere æqualis est, Sole Oriente ad sextam matutinam & Occidente ad sextam vespertinam: sed rarissime Sol Oriens vel Occidens conspicuus ibi est, quoniam plerumque oritur tectus nubibus ad semissem horæ, & semisse horæ antequam occidat, rursus involvit se nubibus.

Illud quoque considerationem hic meretur, cur mensibus Julio & Augusto non eadem pluvix & procellæ ibi sæviant, cum tunc Sol æque vicinus sit illis locis ac in mense Maio & Junio. Præterea cur in insulis Hesperidum, quæ à Sierra Leona & Guinea non ita multum removentur, contrariis mensibus hyems accidat. Sed hic cælestis ratio causa est.

3. Quomodo tempora tempestatum se habeant in parte Africae interiore vel mediterranea, quæ includitur Tropici Cancræ arcu, regionibus littoris Occidentalis & Guinea (dicitur autem Nigritarum terra) de eo nihil adhuc repperi annotatum: nisi quod omnia ea loca fere sterilia sunt exceptis iis, quæ Nigro fluvio adjacent. Hic enim singulis annis

annis m  
que in  
agris, E  
Libyæ  
nosa sit  
videntur  
nea vige

4. Se  
quod à  
que Oc  
niconge  
usque a  
Æquat  
Austral  
lis vern  
Italia,  
vestes r  
rum un  
pluvios  
durat qu  
que ad  
quæ rel  
Æstate  
contin  
hyeme  
lem: a  
sident:  
tem no  
horis an  
des cad  
sorbent  
num in  
Æstate  
distribu  
annum  
comple  
zum Æ

annis mense Junio, & Julio & Augusto exundat atque ingentem fecunditatem communicat istis agris, præterea multos lacus efficit. Reliqua loca Libyæ confinia magno urgentur æstu, cum arena sola sint maxima ex parte. Pluvii menses hic non videntur obtinere eo modo, quo diximus in Guinea vigere.

4. Sequuntur regiones littoris linguæ Africae, quod à Septentrione versus Austrum porrigitur atque Occidentem respicit: eæ regiones sunt Manicongo, Angola, &c. à 2 gr. latitudinis borealis usque ad Tropicum Australem Capricorni ultra Æquatorem. Congi autem regnum incipit à 2 gr. Australis latitudinis. Hyems in his locis est similis verni temporis constitutioni in Romano agro Italiae, calor temperatus, ita ut nulla anni parte vestes mutant, neque vertices montium vicinorum urgentur frigore. Incipit autem hic hyems pluviosa fere cum nostro vere, nempe xv Martii, duratque Aprili, Maio, Junio, Julio, Augusto, usque ad xv Septembris. Cum hoc incipit æstas, quæ reliquos menses usque ad xv Martii occupat. Æstate hac pluvix nullæ, vel saltem rarissimæ, continua serenitas: sed mensibus pluviis sive hyeme vix dies aliquis conspiciendum præbet Solem: adeo continuæ nubes & pluvix aerem possident: *Travados* quoque frequentes. Pluit autem non integris diebus, sed plerunque duabus horis ante & duabus post meridiem, guttæ grandes cadunt, quæ tamen statim à terra sitiente absorbentur. Etsi itaque duas tantum in partes annum incolæ harum regionum dividant, nempe in Æstatem & Hyemem, possunt tamen in quatuor distribui (nostrum quoque vulgus communiter annum dividunt in Æstatem & Hyemem, quia Ver complectuntur Æstate, Autumnum Hyeme), nimirum Æstati tribuemus menses à xv Decembris, Janua-



nuarium, Februarium usque ad xv Martii. Veri tribuimus tempus à xv Septembris ad xv Decembris. Autumnò, à xv Junii ad xv Septembris. Hyemi, à xv Martii ad xv Junii.

Hæc tempora terrestrium tempestatum cum celesti ratione in hisce locis fere conveniunt. Etenim à xv Martii, Aprili, Junio, Julio, Augusto ad xv Septembris Sol recedit à locis illis versus Tropicum Cancrì, ubi remotissimus est ab illis xxv Junii, & reliquo tempore iterum accedit, ita ut xxx Septembris illis fiat verticalis, & ad mediocrem distantiam versus Tropicum Capricorni eat atque ab illo redeat mensibus Octobri, Novembri, Decembri, Januario, Febuario, ita ut in Martio iterum verticalis fiat. Itaque hosce menses æstatem experiuntur propter Solis viciniam, cujus effectus non impeditur hic à terrestri causa: & deinde reliquis mensibus à xv Martii ad xv Septembris hyemem, quia Sol tunc magis removetur. Sed tempora Veris, Autumni, Æstatis, Hyemis, quæ nos assignavimus, non ita bene conveniunt cum celesti ratione, & dubito egomet, an ita Æstas & Hyems in Ver atque Autumnum distinguantur in illis locis.

Facilior itaque causa hic redditur, Cur mensibus illis à xv Martii ad xv Septembris pluvias quotidianas & aliqualem hyemem sentiant, nimirum quia Sol recedit ab illorum vertice versus maximæ distantix locum. Sed hæc causa sola non sufficit, quia sola non potest talem effectum producere: itaque alia adjungenda est, Nimirum jurga montium, quæ non procul ab hisce maritimis regionibus versus Ortum jacent, mensibus illis pluviis continue nubibus tecti conspiciuntur, cujus causa est ventus status, qui istis mensibus ibi spirat Zephyro-boreas. Sol itaque vapores elevat è mari multos: illos ventus hicce status compellit  
vel

vel cogi  
sita plag  
conden  
quod in  
imbres  
fricæ flu  
ximus c

Præte  
vios Co  
magnar  
quoque  
tate cur  
omnia  
gregie.

5. In  
procul à  
Australi  
males 8  
est, me  
vicino  
Lowang  
mensib  
cum ta  
æstas fir  
pestas re  
non est  
pluviâs  
Causa e  
tus statu

6. In  
nobon  
sacchari  
auranti

7. Q  
dentalis  
pricorni  
tum inv

vel cogit versus juga montium ( ab altera vel opposita plaga resistit ventus Euro-auster Generalis) ubi condensantur & deinde in pluvias abeunt: signum quod in montibus hisce continuæ fere pluvix & imbres (unde Nili inundatio existit aliorumque Africæ fluviorum) sæviunt præter illas nubes quas diximus conspici in illis.

Præterea sciendum pluviis istis mensibus fluvios Congi exundare in vicinos agros, atque inde magnam fertilitatem illis conciliare, magnam quoque copiam aquæ in mare evomere: Fertilitate cum ipsa Ægypto certat hoc regnum, atque omnia hic crescunt & adolefcunt opime & egregie.

5. In provincia maritima Lowango, quæ non procul à Congi distat, est enim in 4 gr. latitudinis Australis, observantur etiam pluviæ menses hyemales & alii sereni æstatis: sed, quod mirandum est, menses non sunt iidem cum illis, quibus in vicino regno diximus pluvias vigere. Etenim in Lowango vehementes & continuæ pluvix vigent mensibus Januario, Februario, Martio, Aprili; cum tamen Januario & Februario in Congi regno æstas sit, aërque serenus. Hic itaque terrestris tempestas repugnat cælesti, quia Januario & Februario non est Sol remotissimus ab illis locis, adeoque non pluvias sed siccitatem potius experiri debebant. Causa est sine dubio alius montium situs, alius ventus status, &c.

6. Insulæ S. Thomæ (in ipso Æquatore) & Anobon ( $1\frac{1}{2}$  gradu ab Æquatore) sunt fertilissimæ, sacchari, frumenti, pomorum, imprimis citriorum, aurantiorum ingens copia.

7. Quomodo in reliqui Africani littoris Occidentalis regionibus à Lowango ad Tropicum Capricorni tempestates se habeant, nondum annotatum invenit.

8. Relicto itaque illo littore, & promontorio Bonæ spei circumnavigato redimus ad Tropicum Capricorni, ubi littus Orientale linguæ Africæ spectatur, in quo jacent Zofala, Mosambique, Quiloa usque ad Æquatorem, quæ ab Oriente Sole illustrantur. In hisce locis hyems est mensibus Septembri, Octobri, Novembri, Decembri, Januario, reliquis æstas & siccitas, quod tempus contrarium est illi, quo in Congo regno hyemem pluvialem senti-ri diximus, & tamen hæc regiones ab eadem jacent Æquatoris parte. Sed juga montium, quæ procur-rentem hanc linguam Africæ bifecant in terram O-rientalem & Occidentalem, sine dubio causa sunt hujus diversitatis. Terra harum regionum medio-cris tantum est fertilitatis, multis locis arenosa & sterilis, insignique calore aduritur, sed fluvii & ad-jacens mare, ventusque generalis Orientalis tempe-rant æstum.

9. Reliquæ regiones Africani Orientalis littoris ab Æquatore versus boream jacentes ad fauces A-rabici sinus & hinc ad littus ipsius sinus usque ad Tropicum Cancræ, hæc, inquam, regiones, quales tempestates & quibus anni temporibus experian-tur, nondum annotatum inveni, nisi quod areno-sum & sterilem hunc tractum esse quidam scribant atque ingenti ideo æstu premi (nota est Arabiæ Troglodyticæ sterilitas & æstus). Accedit, quod nul-lis fere fluviiis irrigatur: sed expecto accuratiores annotationes.

10. Sed qualis tempestas in mediterranea Affi-cæ parte, quæ Abassinorum est? Hæc enim media fere ab Æquatore secatur, ita ut aliquas provincias in Torrida Australi, aliquas easque plurimas in Tor-rida Septentrionali habeat.

11. *Relicta jam Africa*, ingredimur Asiæ regio-nes in Zona Torrida jacentes, ubi primo se offe-runt Arabiæ regiones mari Rubro adjacentes à  
Mecca

Mecca  
ream),  
bent A  
jam tur  
magis  
ca illum  
moratu  
mis, fri  
vel affu  
nis jace  
& Merc  
est. Ca  
rum, qu  
paucissi  
general  
pores ex  
arenam  
aëri con

Conv  
pus cum

12. E  
ejus litte

13. I

Cancræ

Orienta

spectant

8 gr. lat

te, inq

tempest

gustum,

ad medi

bus hisc

continu

continu

bus plui

in Cam

pluvia f

Mecca ad Aden (12 gr. ab Æquatore versus Boream), quæ Occidentem respiciunt, ab Oriente habent Arabia montana. Hæ maximo urgentur æstu jam tum in Martio & Aprili mense & sequentibus magis, dum Sol ad illorum verticem accedit & circa illum mense Maio, Junio, Julio & Augusto commoratur Æstus tantus, ut incolæ, ditiores imprimis, frigidam continue de die corpori suo instillare vel affundere curent, vel etiam in vasibus aqua plenis jaceant. Mercatores in Aden nocte conveniunt & Mercaturam exercent, quæ tamen hic satis calida est. Causam esse puto defectum vaporum aqueorum, quia à parte Orientali petrosa est regio, fluvii paucissimi & exigui, ventus autem Orientalis, qui generalis est, etsi ibi non ita sentiatur, repellit vapores ex mari Rubro assurgentes. Adde copiosam arenam, quæ calorem conceptum nocte retinet & aëri communicat.

Conveniat itaque hic Æstatis Hyemisque tempus cum cælesti ratione.

12. Eadem est ratio totius Arabia & Orientalis ejus littoris.

13. In Cambaia India, quæ in ipso Tropico Canceri jacet, ut etiam in Malabarici littoris seu Orientalis India regionibus, quæ Occidentem spectant, atque à Septentrione versus Austrum ad 8 gr. latitud. Septentrionalis se extendunt; in hisce, inquam, regionibus, hyems sive pluvialis tempestas occupat menses Junium, Julium, Augustum, Septembrem, sed imprimis à medio Junio ad medium Septembrem. Neque vero in omnibus hisce locis æquali tempore pluit, sed magis continue in Goana & Cocinensi provincia, minus continue in Cambaia (ubi tantum tribus mensibus pluit). In reliquis octo mensibus rarissime pluit in Cambaia, in Goa vero mense Aprili & Maio pluvia sed minus vehementes incipiunt cum tonitru



nitru & procellis: ita ut Autumno hic possint ascribi mensis Martii semissis, Aprilis & Maius ad xv Junii: deinde à xv Junii & Julius atque Augustus usque ad xv Septembris Hyemi: deinde à xv Septembr. ad Decembrem Ver, reliqui à xv Decembri ad xv Martii Æstati. Etenim hisce mensibus magna est siccitas, quia aqua pluviarum priorum à Sole tunc extracta est à terra. Incolæ tamen non numerant quatuor tempestates, sed tantum duas, Æstatem & Hyemem, vel potius siccam & pluvialem tempestatem. Nam hyems juxta nostram notionem frigoris non convenit illis locis, sed proprie tamen, quia hyems à pluviis dicitur.

Præter pluvias hæcæ, frequentes in littore sunt procellæ, tonitrua illis pluvialibus mensibus, ita ut mare tunc clausum censeatur; fluvii quoque multi exundant illo tempore. Septembri mense mare aperitur, & tunc naves à Malabarico littore solvere solent in varias mundi partes. Neque pluvia hisce locis sæva est (exceptis procellis) in agris, sed quia multis diei horis cessat, ideo incolis concedit tempus ferendi & plantandi. Hisce enim pluvialibus mensibus incolæ agris semina injiciunt, contra quam in Guinea fieri supra diximus. Aër quoque eo tempore moderati teporis, quia Sol nubibus tegitur, ita ut incolæ remotiores à littore exspatiantur animi causa in colles & agros (ubi exundatio non est). Magna & incredibilis à pluvia illa fertilitas terræ conciliatur. Si quando pluvix hæc in anno aliquo non cadant (quod rarissime accidit, ut anno 1630) omnis sementis & messis spes sublata est: inde annonæ caritas, aër æstuosus, febres ardentes, pestilentes, & myriadum hominum interitus. Anno 1630 & sequenti, caro humana publice divendita fuit in quarundam urbium Cambajæ macellis. Interdum vero adeo sæviunt imbres ut domus (quæ leviter

adi-

rdificat  
alias to

Seme  
Novem

Æst

contra o  
mense f

est vel a  
ingente

Magna e  
pe si pl

obreger  
deret s

byamiqu  
vicino

Januari  
vel pluv

tunc So  
Æstater

gidus est

ad xi i f  
gratus est

14. In  
delium v

riunt. E  
nio inger

Distribut

gna ex pa  
in Fervid

zitas vig

Maior, J

medio N

prentior  
tantum a  
mino ap  
versatur i  
stantem

edificatae sunt) corruant, fluvii exundatione nimia alias tollant.

Sementem faciunt Maio & Junii initio, messem Novembri & Decembri. Aliter in Guinea.

Aestas hæc atque Hyems horum locorum est contra caelestem legem sive Solis motum. Etenim mense Julio & Augusto Sol illis locis verticalis est vel admodum vicinus vertici, ideoque æstum ingentem & siccitatem aëris debebant experiiri. Magna est hæc illorum locorum felicitas: quippe si pluviae hæc non caderent, nubesque Solem obtegerent, ingens ille Solis æstus arenosum redderet solum atque sterile sicut Arabiam, Libyamque, ubi hæc pluviae non adsunt Sole vertici vicino existente. Contra, mense Decembri, Januario, Febuario Hyemem debebant agere vel pluvias minoremque calorem sentire, quia tunc Sol maxime removetur ab illis: atqui tunc Aestatem experiuntur. Noctu tamen aër satis frigidus est: præterea ventus continuus à XI I diei ad XI I fere noctis spirat è mari, qui admodum gratus est.

14. In Orientali Indiae littore quod Coromandelium vocant, tempestates etiam à caelo dissentiunt. Etenim mense Martio, Aprili, Maio & Junio ingentes ibi æstus Sol excitat, pluviae nullae. Distribuant autem incolae, qui Saraceni sunt magna ex parte, annum in tres tempestates, nempe in Fervidam, Pluvialem & Frigidam. Fervida sive aestas viget, ut dixi, mensibus Martio, Aprili, Maio, Junio. Præcipuus & intolerabilis æstus à medio Maio ad medium Junium; ventus à Septentrione spirat, ad quem si faciem convertas, tantum aëris fervorem senties, ac si candenti camino appropinques. Sol enim in illa plaga tunc versatur in meridie. Ligna quoque & lapides constantem atque magnum concipiunt fervorem:

aqua tamen puteorum frigidissima est, ut multi præ magno æstu illam bibentes moriantur.

Maximus diei calor inter horam nonam ante meridiem usque ad tertiam post meridiem : hisce intermediis horis ab itinere quiescendum est ; reliquis horis, nempe ante nonam matutinam & post tertiam pomeridianam, aër temperatus saltem tolerabilis, serenus & gratissimus existit, iter jucundum, cælum latum.

Pluvialis tempestas quatuor menses occupat, Julium, Augustum, Septembrem & Octobrem. Frigida Novembrem, Decembrem, Januarium atque Februarium : in Decembri & Januario frigus, præsertim noctis, sensibile satis est.

Multa hic sunt, quæ causarum investigationem merentur. Etenim mensibus Martio, Aprili, Maio, Junio, Sol accedit ad illa loca Coromandelii littoris atque verticalis illis sit, ideo nil mirum si æstum experiuntur maximum : sed cur non eundem æstum experiuntur Julio & Augusto, cum hisce mensibus æque vicinus illis sit & propter priorem æstum jam major esse debeat ? Præterea cur ita dissentiant horum locorum littoris Coromandelii tempestates à Malabarici littoris tempestatibus, cum in eodem Climare jaceant & iisdem diebus Solem verticalem, iisdem remotum habeant ? Et, quod magis mireris, intercedit inter hæc regiones alicubi tantum septuaginta, alicubi viginti tantum milliarium intervallum : ita ut ex loco sereni & fervidi aëris pervenire possis in regionem, ubi pluvialis hyems sæviat, unius diei itinere. Maffeus ita loquitur de hisce locis : In iis regionibus cum alia multa admiranda, tum illud imprimis omnium Physicorum ingenium superat, quod in eadem cæli plaga, pari solis accessu recessuque, iisdem anni mensibus ab ortu trans Gatis Jaga ( quæ recto ad Cori promontorium excursu  
totam

totam  
ac fici  
plaviz  
quod ac  
ne pop  
Hæc Ma  
in aliis  
antea de  
sa anten  
deliam  
diens à  
adjuge  
Coroma  
magis se  
Junio )  
unde in  
mensibu  
spiciunt  
ubi in M  
delia reg  
sicut in  
mensibu  
terra plu  
15. In  
nuntur C  
tionali  
sus Mala  
fluvii ex  
vember  
anni heb  
Januario  
siccitas.  
fiunt, &  
adjacenti  
men non  
bus obse  
tilitatis

totam Malabaris longitudinem interfecant) aritas ac siccitas, ab occasu cis Gatem hyems & assidua pluvia sunt: ut in tanta locorum propinquitate, quod ad rationem tempestatum attinet, iidem pene populi sibi mutuo Antipodes videantur esse. Hæc Maffæus. Sed non in solis hisce locis, verum in aliis quoque hanc diversitatem inveniri jam antea docuimus, & in sequentibus dicemus. Causa autem est situs jugi montium, quod Coromandeliam terram à Malabarica determinat, progrediens à Septentrione versus Austrum. Huic causæ adjungendi sunt statim & diversi venti. Etenim in Coromandelio littore ventus generalis Orientalis magis sentitur (exceptis mensibus Æstatis Maio, Junio) qui vapores versus juga montium pellit, unde in Malabaricam terram pluvia. Juga hæc mensibus pluvialibus continue nubibus tecta conspiciuntur, in illis quoque vehementiores imbres, ubi in Malabarico pluvia: sed cum in Coromandeliam regione pluvia sunt, tunc in jugis montium sicut in ipsa Malabarica terra serenitas (exceptis mensibus, Julio, Augusto). Hisce enim in utraque terra pluvia existunt.

15. In regionibus Gangetici maris, quæ opponuntur Coromandelio littori & ibidem in Septentrionali Torrida jacent, ut Siam, Begu, Chersonesus Malaccensis, pluviales menses, quibus etiam fluvii exundant, sunt September, October, November. Verum in Malaccensi agro pluit singulis anni hebdomadibus bis vel ter, exceptis mensibus Januario, Febuario & Martio, quibus continua siccitas. Hæc omnia contra caelestem rationem sunt, & causa eorum in montibus, ventis statis, adjacenti mari atque aliis quaerenda est: quia tamen nondum accuratas habemus de illis regionibus observationes, nolumus hic ea excutere. Fertilitatis autem harum regionum causa est præcipua,



pua, Exundatio fluviorum, æstum temperant vapores vicini maris & fluviorum, venti statim: unde jucundissima hic habitationes, uberrimus omnium fructuum proventus. In regno Patanae & vicinis Æstas incipit cum Februario, & ad finem Octobris durat, quo tempore continuus calor, quia continuo Orientali vento temperatur. Aër salubris. Novembri, Decembri & Januario continua pluviae, quae tamen non impediunt, quo minus singulis mensibus novo gaudeant fructu. Idem de Cambaia intelligendum est. Hæc autem hyems cum caelesti ratione convenit.

16. Relicta Asia, transnavigato mari Pacifico ingredimur Americae partem in Zona Torrida jacentem, quæ duplex est, Australis & Septentrionalis. Australis iterum duplex, Peruviana & Brasilia. Peruviana partes etsi vicinae sint, contrariis tamen tempestatibus eodem tempore fruuntur. Etenim Peruviana regio dividitur in tres partes, Littoralem seu Maritimam, Montanam, & planam post montanam, quæ in eodem Climate jacent. In montanis locis hyemem pluvialem experiuntur à mense Octobri usque ad Martii finem, cum æstatem deberent sentire ex Solis vicinia. Æstatem autem habent ab Aprili ad Octobrem, quibus mensibus nullæ cadunt ibi pluviae: in hyemalibus vero mensibus continuæ. Terrestris itaque tempestatibus à caelestibus hic discrepant. In littorali sive maritima Peruvia hyems fere nulla toto anno. Etenim nunquam in hisce locis pluit toto anno: sed à mensibus Aprili ad Octobrem censetur hyemis tempus (quod cum caelesti causa congruit, quia tunc Sol ab illis removetur ad Tropicum Cancris atque inde redit) propterea quod hisce mensibus non quidem pluat, sed singulis fere diebus aër fit nebulosus & Solem tegat, densaque nubes ita conspiciantur ac si mox pluvia affu-

affutur  
tantur  
tribus  
diebus  
bris e  
valles.  
serena  
guitur  
lissima  
dunt,  
quam

In i  
Aqua  
mensi  
cellis,  
Julio,  
stem r

In c  
frigus  
paiana  
hyeme  
non c  
fere e  
tem,  
duntur

Ex  
æstu t  
annur  
bus. V  
borum  
quam  
re sing  
à mor  
in mo  
Atque  
ctus a  
nulli

affutura esset, quæ tamen non sequitur, sed ros tantum vel psecas (*Stoff-regen*) idque imprimis tribus mensibus Junio, Julio & Augusto, singulis diebus ante meridiem: non tamen nebula insalubris est, sed in rorem densata & decidens irrigat valles. In montanis hocce tempore non pluit, sed serena est tempestas. Peruvia hæc littoralis distinguitur in valles & arenosa loca. Valles sunt fertilissimæ; arenosa, quæ inter singulas valles intercedunt, sterilia. In adjacentibus quoque insulis nunquam pluit, sed ros tantum decedit.

In insula vero Gorgon, quæ tribus gradibus ab Æquatore versus Austrum removetur, pluit octo mensibus continue fere cum tanto tonitru & procellis, ut cælum terræ misceri dicas. Maio, Junio, Julio, Augusto, Æstas est & siccitas, contra cælestem rationem.

In quibusdam hujus partis Torridæ Zonæ locis frigus insigne est. Etenim in provincia Pastoa Popaianæ regionis in valle Atrifina tam æstate quam hyeme frigida valde est tempestas, ut ideo fruges non crescant. In Cusco urbis agro, qui medius fere est inter Tropicum Capricorni & Æquatorem, gelu non debile & nives quoque deprehenduntur.

Ex quibus colligitur, Peruviam nullo insigni æstu torreri, sed potius temperato aëre per totum annum frui, exceptis arenolis ejus locis & collibus. Valles vero fertilissimæ & jucundissimæ arborum atque frugum proventu conspiciuntur. Aquam accipiant hyeme ex rore quem dixi decidere singulis diebus. In æstate vero à torrentibus qui à montanis locis devolvuntur, & ruunt, quoniam in montanis tunc hyems & continui imbres sunt. Atque ex torrentibus hæc incolæ per certos ductus aquam deducunt ad valles suas. Namque nulli fontes ibi reperiuntur. Quædam tamen val-

les solo rore sunt contentæ & optime producunt fructus.

Causa hujus diversitatis inter Peruvia planæ & montanæ tempestates, & cur in plana Peruvia nunquam pluat, difficilem habet explicationem. Etenim montana hæc vicina sunt adeo planæ maritimæ Peruvia, ut mane descendens aliquis ex illis pluviis & imbribus sævientibus, vesperi in planam Peruviam pervenire possit, ubi nulla unquam pluvia, sed aer serenus est. Causa duplex esse videtur. 1. Juga illa montium. 2. Ventus Austro-zephyrus, qui proprius & perpetuus est Peruvia. Hic enim ventus compellit vapores versus montana, ubi condensantur, vel saltem discutendo prohibet, ne in plana Peruvia possint nubes in guttas densari atque decidere. In montana vero loca attrahuntur eo modo, quo explicavimus capite de Montibus.

Habet itaque hoc Peruvia cum Ægypto & aliis nonnullis locis commune, quod venti Austrini non sunt pluviosi & tepidi, sed potius serenantes aërem, et si in omnibus Austrum versus ab Æquatore jacentibus locis idem locum habere videatur.

17. America Australis pars, quæ Brasilia dicitur atque Orientem respicit, à 2 gr. latitudinis Australis ad 24 gr. extenditur, jucunda atque salubri adeo temperie aëris excellit, ut nulli regioni Telluris cedat. De hujus tempestatibus ita refert Fiso in suo de Medicina Brasiliensi libro: Habitata ejus (Basilix) frons blandum & benignum subolanum ab auris matutinis natum continenter recipit (*imo ventus ille generalis esse videtur, non status subsolanus*), qui homines cæteraque animantia demulcet, & ab intolerabili solis verticalis æstu vindicat. Qui, si mare accedat, summo quidem mane; si recedit, adultiori aurora perferentiscitur. Nec languescit circa vesperam, sicut solet multis Indiarum

diarum  
le, ut  
conder  
nem &  
tare au

Alco  
fissima  
(spacia)  
que ve  
dosos l  
bus ma  
aura r  
queat

Qua  
mis hi  
nes, i  
gunt,  
ipatiis  
Sol al  
num p  
se oce  
mam  
rigidu  
na cir  
pora f  
lestum  
non e  
aliis  
ignari  
xta le  
sturn  
queu  
Po  
fima  
res,  
scant  
No

No

diarum locis, sed intenditur adeo à comitante Sole, ut ultra medias noctis horas non raro vigeat, condensatioque aëris nocturna nequeat dilatationem & motum illum naturalem Aeris facile hebetare aut vincere.

Alterum vero latus (quod à Peruano regno cellissima montium juga & immensa determinant spacia) Zephyrus licet insaluber, mediterraneusque ventus, propter infinitos quos perflat paludosos lacus, sera nocte infestet, tamen à montibus mari vicinis perpetuo coërcetur, adeoque ab aura matutina pellitur, ut ad littora usque vix queat penetrare.

Quemadmodum jucundissimis ac constantissimis his anni tempestatibus haud magnæ mutationes, ita diurnis & nocturnis evidentiores contingunt, quod dies & noctes non magis pares sint spatii, quam differentes calore & frigore. Nam Sol altius ascendens, postquam terrarum & hominum poros aperuit, profundius & pari intervallo se occulit, unde condensatio aëris major extremam partem noctis magis rorifluam efficit. Hinc rigidum & penetrans frigus à tertia hora nocturna circa gallicinium ad exortum usque Solis corpora ferit, ita ut hanc terram recens ingressis molestum, summeque noxium esse soleat: quod qui non evitat, haud facile vitam beatam in hisce vel aliis Indiarum oris exordietur. Cujus rei non ignari Brasiliani focum perennem in tuguriis juxta lectos pensiles alunt; ejusque beneficio nocturnum frigus tolerare & venenata insecta arcere queunt.

Porro rectus ascensus Solis & descensus brevissima facit crepuscula, noctesque adeo diebus pares, ut ne quidem unius horæ discrimen agnoscant.

Noctibus æstivis frigus intensius: hybernis, quod



quod mireris, mitius sæpe perſentiscitur, aëre ſcilicet tranquillo & nubibus undiquaque preſſo plu-  
vias moliente.

Pluvialis temporis initium fit menſe Martio vel Aprili, Auguſto finitur, quo Sol redux ex Can-  
cro materiam pluviæ ex parte diſſolvit in ventos. Unde procellæ & turbines ſubinde naſcuntur, quas mox vernum tempus excipit, eaſque blandiſſime componit. Nullam circa anni tempeſta-  
tes mutationem bis accedente & retrocedente Sole, ut multi exiſtimarunt, Tropicorum incolæ agnoſcunt (atqui nos in præcedentibus contra-  
rium probavimus exemplis, imo ipſius Braſi-  
liæ tempora repugnant), ſed ſolummodo abeun-  
te ab Æquatore ad Tropicum Cancræ vel Capri-  
corni.

Duo tantum dantur anni tempora, quorum unum calidum & ſiccum, æſtas dicitur: alterum calidum & humidum æſtati Europææ ſimile Brumæ vicem ſupplet. idque in omnibus Indiis intra utrunque Tropicum veriſſimum deprehenditur. Licet enim hyberni & æſtivi temporis finis & initium, ob particularia incidentia loci, tum & Æquatoris majorem vel minorem vicinitatem non in idem incidant, plerumque tamen Annus ſex circiter menſibus ad humidum & totidem ad ſiccum vergentibus abſolvitur. Et quidem ea ratione, ut in multis Africæ ac Aſiæ, ejuſdem nobiſcum latitudinis oris, maxima exinde intensio & remiſſio æſtus, hic nulla vel ſaltem exigua percipiatur, ſole licet Braſilienſium Zenith menſe Octobri & Februario tranſeunte, radiiſque ſecundum angulos acutiſſimos reflexis terram feriente.

Quæ diverſitas iſtarum regionum incolis ob  
occebras malacias noxiſque tepores interitum,  
hiſce

hiſce o  
perpetu

Unde  
tam im  
vento  
regioni  
bere.

Qui  
Occide  
timis, u  
buldam

Iiſde  
æſtas &  
paludes  
vero Br

Cal  
ſus Occ  
ſimis &  
Oriens

Mira e  
veſpera  
tradit v  
claras,

conſpic  
comm

Æth  
acceden  
peries.  
ſub veſ  
rena, ſe

Pluv  
que de  
tepor p

Ros  
to imp  
tior &  
tet in

hisce ob dominatricem auram, salutem promittit perpetuam.

Unde facile est colligere Anni tempestates non tam immediate à Sole, ejusque motu, quam ipsa ventorum specie, astrorum aspectus diversitate, regionisque qualitate & situ peculiari discerni debere.

Quin in locis hisce Mediterraneis paulo versus Occidentem noctes sunt frigidiores quam in maritimis, usque adeo ut aliquando pruina capillos quibusdam riguisse constet.

Iisdem anni mensibus ab Ortus circa Oceanum æstas & siccitas, ab Occasu trans juga montium & paludes Brasiliæ, hyems nebula & pluvia (Littori vero Brasiliæ nullæ objacent insula).

Cælum sæpe quidem nubibus ex Oriente versus Occidentem latis obductum videas, sed rarissimis & tenuissimis, exceptis diebus pluvii. Sol Oriens & Occidens immotis oculis aspici potest. Mira enim undique serenitas est, præsertim circa vesperam, quæ nullos unquam succedenti Lunæ tradit vapores vel nebulas, sed noctes reddit adeo claras, ut vetus & novilunium uno eodemque die conspiciantur, litteræque ad quadrantem Lunæ commode legi possint.

Æther pro diversitate ad spectuum Planetarum, accedentibus causis inferioribus suas recipit intemperies. Crebris fulguribus absque tonitru cælum sub vesperam coruscat, tempestate vel maxime serena, sed sicca.

Pluviarum guttæ admodum sunt magnæ, gravique decidunt impetu, quas suffocativus aliquando tepor præcedere vel sequi solet.

Ros hic Europæo tum pinguior, & nitro multo imprægnatus foecundior, tum multo penetrantior & tenuior, præcipue æstate, existit: quod patet in omni metallo & ferro imprimis (ut materias

minus solidas prateream) quas absque ullo nubium adminiculo facile exedit.

Prata & aprici campi minus æstate, sed mensibus potissimum pluviis (licet solum tunc habitantibus tristius videatur) lætissime virescunt, locaque messem negantia pabulis vigent. Hæc ex Pisonæ desumpta sunt, quibus ad iudicium rectius formandum adjungo ea, quæ ex aliis autoribus desumpti: Solum omne Brasiliæ assurgit in colles mediocres & amœnos: montes insigni aliqua altitudine nulli sunt in littoralibus, in solitudinibus tamen hinc inde nonnulli è longinquo conspiciuntur. Inter colles aridos, non ubique tamen, sed aliquot milliatium intervallo, valles interjacent singulæ exiguis aliquibus fluviolis irriguæ, atque ob id non pluviis tantum mensibus, sed & æstivis ipsis fertiles. Colles ipsis æstivis mensibus ob ardorem Solis sunt infrugiferi & penitus arefcunt, ut non gramen tantum, sed & arbores interdum emoriantur. Raro per totum diem & noctem pluit, rarissime per aliquot dies continuos sine intermissione. Menses pluviales aliquantum variant. Anno 1640 (ut observavit Marcgravius) menses pluviæ fuerunt septem, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Julius, Augustus; maxime autem & pene continuo Maius & Julius. Anno 1641 menses iidem septem pluviæ, sed maxime & pene continuo, Aprilis, Maius & Julius. Anno 1642 menses maxime pluviæ sex fuerunt, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Julius & Augustus. Reliquorum annorum non multum dissimilis fuit ratio. Hæc autem observationes tantum de uno loco (non de omnibus Brasiliæ locis) accipienda sunt, nempe Pernambuco Præfectura, quæ octo circiter gradibus ab Æquatore distat. Namque non omnibus locis iidem menses æque pluviæ, neque omnibus idem initium vel finis idem,

Ex h  
lix aliq  
maxim  
nima &  
runt ta  
terre su

/ 18.

nali alit  
ampla  
verur a  
integris  
sto, Sep  
& siccit  
tem co  
nio, &  
cinus ex  
tatem n  
bri, ma  
bebat fa

Mon  
Æquate  
runque

Sic it  
locorum  
ter se in  
busdam  
sentiri,  
frigore  
cis frige  
re, præ  
propter  
4. Non  
quod h  
quod di  
ctibus æ  
Sole su  
perataru

Ex hisce patet, Hyemem atque Æstatem Brasiliæ aliquomodo cælesti legi respondere, cum in maxima Solis distantia pluvias experiantur, in minima & mediocri versus Austrum fervorem: occurrunt tamen non pauca irregularia, quorum causa ex terræ situ ventorumque ratione petenda est.

18. Satis de America Australi: in Septentrionali aliter se habet. Etenim in Nicaragua provincia ampla, cujus medium decem gradibus removetur ab Æquatore versus Septentrionem, pluit integris sex mensibus, Maio, Junio, Julio, Augusto, Septembri, Octobri: reliquis mensibus æstus & siccitas, ut nocte iter facere debeant. Hæc autem contra cælestem legem, quippe Maio, Junio, &c. Sol hisce locis verticalis vel vertici vicinus existit, itaque tunc æstum debebant & siccitatem non pluvias experiri: in Novembri, Decembri, maxime distat: itaque tunc hyems pluviis debebat favere.

Montes ad S. Martham (undecim gradibus ab Æquatore versus Septentrionem distat) nive plerumque teguntur.

Sic itaque totius Zonæ Torridæ præcipuorum locorum tempestates enarravimus, ex quibus inter se invicem collatis hæc colligimus. 1. In quibusdam locis vix sensibile frigus aliqua anni parte sentiri, adeoque Hyemem pluviis potius, quam frigore in illis locis definiri. 2. In quibusdam locis frigus satis sensibile vigere. 3. Nocturno tempore, præcipue ultima vigilia ærem gelidum sentiri propter Solis infra Horizontem depressionem. 4. Non minimam causam tolerabilis æstus & quod habitabiles sint regiones illæ, esse hanc, quod dies nulli ibi longi sunt, sed omnes fere noctibus æquales. Etenim si dies ibi tam longi essent Sole supra Horizontem commorante ac in Temperatarum & Frigidarum Zonarum locis, tum de-



num procul dubio inhabitabiles vel difficulter habitabiles forent. 5. Ventos multum imminuere æstus Solis. 6. Loca diversis temporibus experiri Æstatem atque Hyemem, etsi in eodem Climate jaceant, imo sibi invicem valde vicina sint. 7. Loca illa, quæ contra Solaris accessus vel recessus rationem experiuntur siccitatem atque humiditatem, sive Æstatem & Hyemem, ita sita esse ut ab Oriente juga montium habeant, & ipsa Occidentem respiciant. Peruvia hic excipitur. 8. Nullam certam regulam tempestates in Zonæ Torridæ diversis locis observare. 9. Etsi plerique incolæ Torridæ Zonæ duas tantum in tempestates annum dividant, & plurimi Scriptores idem observent, nempe siccam & pluvialem, posse tamen non incommode in quatuor dividi, ut non tantum Æstas & Hyems, sed etiam Ver & Autumnus constituantur. Sicut enim in nostris locis Ver accedit ad Æstatis naturam, Autumnus ad Hyemis, ita quoque sicca tempestas locorum Zonæ Torridæ dividi potest. 10. In quibusdam locis continuam esse messem, in quibusdam duabus tantum anni partibus, in aliis una tantum anni parte.

### PROPOSITIO XII.

*Quomodo tempestates, Ver, Æstas, Autumnus & Hyems in locis Zonarum Temperatarum fiant & se habeant, explicare.*

1. In hisce locis Causa illa, quam primo loco posuimus inter causas tempestatum Propositione prima hujus capituli (Solis nempe accessus & recessus versus loca), ita potens est respectu reliquarum causarum, ut ipsa sola fere constituat & moderetur illas. Nimirum in Zonæ Temperatæ Septentrionalis regionibus Ver & Æstas est Sole ab Ariete per Cancrum gradiente ad Libram, quia tunc propior illis est: deinde Sole à Libra per Capricor-

pricor  
Hyem  
res hab  
vires  
pesta  
lent,  
2.  
pestate  
vel plu  
te loca  
statem  
pe tem  
to grac  
les, ar  
3.  
gentem  
pestate  
ram f  
te ext  
ses & i  
jacent  
pestate  
Solis  
ubi m  
rataru  
non e  
dicam  
In l  
sine p  
ste in  
quam  
Per  
mare  
ctobri  
crude  
autem  
frigus

pricornum redeunte ad Arietem Autumnus atque Hyems. In Temperata Australi contrario modo seres habet. Neque causæ illæ reliquæ, primæ istius vires omnino tollere & contrarium inducere tempestatum rationem vel tempora transponere valent, ut in Torrida Zona.

2. Variant tamen ex diversorum locorum tempestates, ita ut in uno loco sit major calor vel frigus vel pluvia quam in alio loco, etsi in eodem Climate loca jaceant. (Sed non efficiunt ut Hyems in Æstatem & Æstas in Hyemis tempus transeat.) nempe terra petrosa, paludosa, maritima alium aliquanto gradum caloris vel frigoris experitur, quam valles, argillacea terra, mediterranea, &c.

3. Loca Tropicis vicina pleraque in Æstate ingentem æstum sentiunt, quadam pluvialem tempestatem, ita ut ad locorum Torridæ Zonæ naturam fere accedant. Sic in regni Guzaratensis parte extra Tropicum jacente iidem fere pluvii menses & sicci observantur, qui in parte ultra Tropicum jacente, atque æstas mutatur in pluviam tempestatem. Nihilominus major tunc calor est (ut Solis vicinia postulat) quam in sicca parte anni, ubi mediocri frigus sentiunt: & vero in Temperatarum Zonarum locis Æstatem & Hyemem non ex siccitate vel pluviis, sed calore & frigore judicamus.

In littoribus vero Persiæ & Ormus tantus æstus sine pluviis in æstate propter Solis viciniam, ut nocte in alveis aqua plenis somnum capiant tam viri quam uxores. Non minor calor in Arabia.

Per totam fere Barbariam (regiones Africæ ad mare mediterraneum ita appellantur) medio Octobri transacto occipiunt imbres atque frigus incrudescere, ut refert Leo Africanus: Decembri autem atque Januario (quod ubique fere accidit) frigus intentius aliquantulum percipitur: verum

hoc mane duntaxat, idque adeo remisse, ut nemo ignem magnopere curet. Februarii Hyemi bonam frigoris partem adimit, sed inconstans adeo, ut quinques inter dum aut sexies uno die incidat aura mutatio. Martio mense, summo impetu flant Boreas atque Zephyri, efficiuntque ut totæ arbores floribus vestiantur. Aprilis omnibus propemodam fructibus dat formam, ita ut Maii initium ac Aprilis exitus natura soleat dare cerasa. Medio Maio ficus ex arbore colligunt, medioque Junio uvas quibusdam locis maturas invenite licet. Autumnifcus, Augusto maturi decerpuntur, nulla tamen major ficuum atque malorum persicorum copia, quam in Septembri.

Nulla illis tanta anni intemperies, quin tres illos Veris menses semper temperatos habeant: Veris autem initium (*non caelesti sed terreste hoc est*) ad decimumquintum Februarii diem constituunt, finem vero decimo octavo Maii annumerant; quo toto tempore aura illis perpetuo gratissima. Quod si à vigesimoquinto Aprilis usque ad quintum Maii nulla iis obtingat pluvia, sinistra quippiam ominis exinde colligere volunt. Æstatem computant ad decimumsextum usque Augusti, quo tempore calo utuntur calidissimo atque serenissimo. Autumnum à decimasextima Augusti usque in decimumsextum Novembris diem collocant, habentque duobus illis mensibus, Augusto videlicet atque Septembri, non tam ingentem. Id tamen tempus, quod inter xv Augusti ac xv Septembris includitur, ab antiquis totius anni furnum appellari consuevit, eo quod ficus, mala cotonea atque id generis fructus ad maturitatem perducere solet. A decimoquinto Novembris die principium hyemis numerant, quam in decimumquartum Februarii diem protrahi volunt. Ad hujus initium eam arare terram incipiunt, quæ  
in

in plan  
agricul  
persuas  
calidiss  
mere  
à duob  
quino  
ptemb  
bris die  
bona  
& gran  
dis disc  
cis nix  
idque p  
seges fl

In A  
pico C  
tes. N  
illis Hy  
statem  
gus): r  
summi

In N  
enim r  
los: à  
nuariu

Oste  
rendi s  
lem s  
monte  
cul à T

Bore  
Æqua  
dinis a  
paulo  
sumit  
cujus c

in planicie est: in montibus vero Octobri mense agriculturam exercent. Certissimum sibi Africani persuasum habent, annum quadraginta dies habere calidissimos, quos à duodecimo Junii initium sumere volunt, contraque totidem frigidissimos, quos à duodecimo Decembris die inchoare dicunt. Æquinoctio ad decimum sextum Martii & xvi Septembris, Solstitia vero ad xvi Junii & xvi Decembris diem constituunt. Autumni finis, tota Hyems, bonaque Veris pars impetuosis plena ventis, quin & grandinibus, fulguribus, fulminibusque horridis diferuciantur: neque deest multis Barbaria locis nix copiosa. Maxime infestantur segetes à nive, idque præsertim, si nix interdiu cadere incipiat, cum seges floribus ornatur.

In Atlante monte (distat septem gradibus à Tropico Cancrì) dividunt annum tantum in duas partes. Nam ab Octobri usque ad Aprilem continua illis Hyems est, & ab Aprili rursus in Octobrem Æstatem id tempus nominant (sicut nostrum vulgus): nullus vero datur dies, quo non montium summitates multa nive niteant.

In Numidia velocissime fluunt anni partes. Maio enim mense frumentum colligunt, Octobri dactylos: à medio autem Septembri frigus ingens in Januarium usque durat.

Octobri à pluviis abstinente, omnis agricolæ ferendi spes adimitur: idem evenit, si Aprilis pluvialem secum non adferat aquam. Multos nivosos montes commemorat Leo in Africa esse non procul à Tropico Cancrì.

Borealis pars Chinæ etsi non sit remotior ab Æquatore, quam Italia (nempe à 30 gr. latitudinis ad 42 gr. se extendit); tamen frigus haud paulo acrius videtur, inquit Trigautius. Nam & flumina per magna laculque gelu concresecunt, cujus causa nondum satis explorata, nisi eam in



Tartariæ nivales montes non remotos referamus : ad quæ frigora propulsanda , non infimis vulpium & Scythicarum mustelarum pellibus abundant.

Nova Albion etsi in 42 gr. latitudinis Borealis jaceat , adeoque non remotior sit ab Æquatore , quam Italia , tamen mense Junio adeo frigido urgebatur aëre , cum Draco Anglus istuc appelleret , ut hic versus Austrum remeare coactus sit , montes adhuc tum nive tecti erant. Causa est frigida terræ constitutio , petrosa nempe.

In Ægypto , quæ Tropico Cancrī terminatur , (ut Prosper Alpinus narrat , l. 1. de Medic. Ægypt.) Ver atque anni tempus temperatum observatur Januario atque Februario. Æstas incipit cum Martio & Aprili , duratque Junio , Julio usque ad Augusti finem : Autumnus Septembrem & Octobrem tenet. Hyems Novembri & Decembri absolvitur. Sub Aprilis initium segetes succidunt , succisas confestim triturant , post vicesimum Maii nulla arista amplius in agris , nullus fructus in arboribus. Idibus Junii incipit inundatio Nili.

In freto Magellanico & adjacentibus regionibus , etsi non magis ab Æquatore distent quam nostra loca ( sub 52 gr. latitud. australis ) tamen æstatem non admodum calidam experiuntur , ita ut Belgæ mense Januario ( qui ibi esse debebat ferventissimæ æstatis ) glaciæ frustum in sinu quodam freti invenerint ; in montibus adjacentis litoris tota æstate nives conspiciuntur. Et in omnibus fere Zonæ Temperatæ Australis regionibus observatum est , quod longe intensius hyeme frigus & pluviarum impetum , æstate autem minorem calorem sentiant , quam Zonæ nostræ Temperatæ Septentrionalis provinciæ. An hujus rei causa sit , quod Sol in Septentrionalis Zodiaci semicirculo diutius hæreat & tardius progrediatur , quam in Australi , dubito.

In

In vi  
Imperia  
deprehe  
nihil ibi

In r  
lis ad 5  
se Augu  
definit

Novem  
rii , à

Maium  
bosa est  
gelu spa

vitur ,  
aliquoc  
libus.

aggerer  
& cum  
veluti

durent  
tes , qu

usque i  
cundan  
planici

multis  
quod a

vicinit  
subtile

suppo  
temper

Alia  
dem C  
diosus

gr. qu  
in Belg  
includ  
loco n

In vicinia urbis Peruvia, quam vocant *la valla Imperial*, in Provincia Potosi frigus magnum adeo deprehenditur, ut ad quatuor miliarium circuitum nihil ibi crescat.

In regno Chili, quod à 30 gr. latitudinis Australis ad 50 gr. se extendit, Ver sumit exordium à mense Augusto (citius, quam caelestis ratio patitur) & desinit in medium Novembrem: & à medietate Novembris aestas incipit usque ad medium Februarii, à quo Autumnus ducitur usque ad medium Maium, quem incipit hyems, quæ admodum nimbofa est & spoliat arbores foliis, & cum vehementi gelu spargit altam nivem, quæ tamen à Sole dissolvitur, nisi quod raro, Sole non comparente, ad aliquod dies durat. Raro autem nives accidunt vallibus. Nam licet copiosissimæ sint, & in tantum aggerentur, ut ad cacumina montium ascendant, & cum iis exæquentur, & in aperturis montium veluti in puteis coacerventur, & pene toto anno durent, ibidem dissolutæ inflant fluvios & torrentes, qui per valles cum magno impetu decurrunt usque in mare, & terras mirum in modum fecundant. Verum licet hic non ningat, nisi raro in planicie, frigus facit tamen tam excessivum, ut in multis Europæ partibus vix tantum sentiatur; quod accidit partim ab altitudine poli, partim à vicinitate montium, è quibus descendunt venti subtiles & penetrantes, qui nonnunquam sunt insupportabiles. Unde fit ut loca maritima sint magis temperata.

Alias tempestatum differentias regionum in eodem Climate vel vicinis Climatibus sitarum studiosus harum rerum ipse colliget è Scriptoribus, ex gr. quod in Anglia aër minus frigidus est quam in Belgio & Germania, ita ut armenta hyeme non includantur stabulis. Inter Siberiam & Tartariam loco non procul à Zona Frigida sito in fine Temperatæ

perata nostræ Zonæ ager latus & amœna pascua esse dicuntur, frigus nullum fere, cum hyemem vix sentiant, ubi ædificata est jussu Mosci urbs dicta Toorn, quæ hodie ita accrevit, ut Tartarorum insultus repellere valeat.

In Japonia (quæ à 31 gr. ad 39 latitud. Septentrionalis extenditur) Hyems frigida, nivosa, pluviosa, cum tamen aliæ regiones Europæ & Asiæ in eodem Climate jacentes minorem longe hyemis inclementiam sentiant. Causa est, quoniam Japonia ex multis insulis parvo Euripo disjunctis constat & in medio Oceano jacet.

In Armenia & vicinis locis ingens æstate calor, quoniam inter montes hinc inde agris immistos jacet: unde ditiores alicubi æstate se conferunt in montium fastigia, atque aliquot menses ibi manent: minus opulenti die quidem in iisdem montibus se defendunt ab æstu, circa vesperam tamen descendunt.

### PROPOSITIO XIII.

*Quomodo in locis Zonarum Frigidarum, quatuor anni tempestates, Ver, Æstas, Autumnus & Hyems cum ipsa luce se habeant, explicare.*

Causæ tempestatum illarum & luminis, propositæ in initio hujus Capituli, ita se habent in Zona Frigida.

1. Solis centrum aliquot diebus vel mensibus, (prout locus polo propior vel ab eo remotior) non oritur supra Horizontem, & totidem diebus non occidit.

2. Illis diebus, quando supra Horizontem est, radiis tantum obliquis loca illa illustrat, quia non admodum elevatur supra Horizontem, sed circa illum rotatur, quoniam loca illa à via Solari sunt nimis remota.

3. Sol non alte deprimatur infra Horizontem.

Imo

Imo in  
Solis cen  
ris aliqu  
zontem  
niam d  
celo. Ex  
distantia  
levetur p  
dionali  
tur grad  
picorni  
non orie  
x Decem  
limbi So  
tem, no  
Horizon  
1 Janua  
midius i  
zonte.  
bitur, u  
picorni  
totus po  
pabit 16  
Decemb  
Sed in  
ibi hæc  
riens cen  
vel sesqu  
nimiru  
cum qu  
accrescit  
Ex ea  
quod cr  
Solis m  
Sol non  
multis l  
Acce

Imo in locis circulo polari sive Arctico vicinis, etsi Solis centrum non oriatur, tamen pars limbi Solaris aliquot diebus oritur & conspicitur supra Horizontem antequam ipsum centrum oriatur: quoniam dimidius Sol occupat quindecim minut. in caelo. Ex. gr. sumamus loca, quorum ab Æquatore distantia sit 67 grad. prope Arcticum circulum. Elevetur polus juxta hanc latitudinem, & in meridionali crena Horizontis videbis, quod non oriatur gradus Eclipticæ à 19 gr. Sagittarii ad 11 gr. Capricorni, hoc est Solis centrum in arcu illo existens non oriatur viginti tribus diebus, nimirum à die x Decembris ad initium Januarii: & tamen pars limbi Solaris toto eo tempore erit supra Horizontem, nempe die XXI Decembris limbus stringet Horizontem: sed die x Decembris, ut etiam die 1 Januarii, Sol dimidius erit supra Horizontem, dimidius infra eum, quia centrum tunc est in Horizonte. Torus autem Sol supra Horizontem elevabitur, ubi Solis centrum tenebit x v gradum Capricorni, hoc est die quarto Januarii circiter: item torus postremo apparebit, ubi centrum ejus occupabit 16 gr. Sagittarii, hoc est die septimo circiter Decembris.

Sed in locis, ubi elevatio poli est 70 gr. 75 gr. &c. ibi hæc differentia inter Orientem limbum & oriens centrum perexigua est, ita ut limbus vix uno vel sesquialtero die anticipet Solis centri ortum, nimirum declinatio Solis in illis punctis Eclipticæ, cum quibus Sol oritur in illo Horizonte, celerrime accrescit.

Ex eadem depressionis parvitate sequitur etiam, quod crepusculi luce ante ortum & post occasum Solis multis horis fruantur, & licet integris diebus Sol non oriatur, tamen vel omnibus dici horis vel multis lucem in aëre habeant.

Accedit alia causa, quæ facit ut Sol prius videatur,

tur,



tur, quam supra Horizontem elevetur, nimirum refractionis radiorum ejus in atmosphæra, de qua diximus capite XIX.

Inde enim fit, ut non tantum ipse Sol prius conspicatur, quam supra Horizontem sit elevatus & prius quam radius directe ab eo ad oculum possit pervenire, sed etiam ut crepusculi lumen citius illustret aërem, quam si absque refractione hac esset. Exemplum apparentiæ Solis ex refractione ortæ afferemus in sequentibus.

4. Luna plena & plenæ vicina multis diebus supra Horizontem manet, quando Sol infra eum depressus tenetur, nempe eo pluribus diebus, quo locus polo propior. Non tamen ita alte elevatur supra Horizontem, ut aliquam calefaciendi facultatem obtineat. Luna autem plena iis mensibus, quibus Sol infra Horizontem commoratur, est supra Horizontem multis diebus: iis vero mensibus, quibus Sol supra Horizontem manet integra revolutione, Luna plena nunquam supra Horizontem est.

5. Stellæ fixæ semper easdem fere habent supra Horizontem; planetas non item. Saturnus enim quindecim annos commoratur supra Horizontem locorum polo vicinorum, quindecim annis infra eum: Jupiter, sex annis infra, sex supra eundem Horizontem: Mars uno anno: Venus & Mercurius semisse anni circiter. Ex hac causa magnam diversitatem motuum aëris & tempestatum in diversis annis fieri verisimile est.

6. Terra in Zonæ frigidaë plerisque locis est saxea, petrosa & lapidis instar dura, in paucis locis bituminosa, argillacea, & sulphurea atque pinguis. In hisce locis mediocri fertilitas, in illis sterilitas.

7. Regiones illæ mari cinguntur, de mediterraneis nondum liquido constat.

8. Quæ-

8. Quæ  
mediocr  
tibus ca  
vasta spa

9. V  
ibi spirat  
frigida t  
ftrales.

10. I  
giones h

Ex h  
tempest  
enim te  
non ori  
lx pler  
habitab  
tuentur  
Luna s  
præbeb  
vicino

nives,  
nebulæ  
discuti  
sum p  
culta &  
quo pr  
frigoris  
agros &  
non fr  
bus: 6  
gradib  
perta f  
æstare  
Neque  
plum  
vem g  
dix p

8. Quædam ex regionibus Zonæ Frigidæ habent mediocri altitudinis montes, pleraque vero montibus carent, & plana exporriguntur superficie in vasta spatia.

9. Venti à polari plaga frigidi frequentissime ibi spirant, raro Euri, rarius Zephyri. In Arctica frigida furunt Septentrionales: in Antarctica Australes.

10. Nebula & pluvia frequentissime vexant regiones hæc.

Ex hisce jam non est difficile colligere qualis tempestatum conditio in hisce regionibus sit. Et enim tempore hyemis, cum Sol integris diebus non oriatur, fieri aliter nequit, quin densæ nebulae plerunque, frigus vero & gelu continuum inhabitabiles reddat terras. Luce quidem non destituentur omnino continuo eo tempore: quippe & Luna supra Horizontem existens multo tempore præbebit lumen, & crepusculum à Sole Horizonti vicino quotidie concedetur. Sed utramque causam nives, nubes, pluviaque impedire valent. Crassæ nebulae circa terram hærent cum Solis calore non discutiantur, adeoque remotarum rerum aspectum prohibent. Fertilitas nulla, omnia fere inculta & aspera. Quod enim quidam opinantur, quo propior regio aliqua sit polo, eo minorem frigoris intensionem sentiri, atque magis fertiles agros & campos repertum iri, id mihi verisimile non sit, cum neque in Nova Zembla, quæ gradibus 16 distat à polo, neque in Spitzberga, quæ gradibus duntaxat octo, talis terræ constitutio reperta sit, sed asperitas atque durities, & mediâ fere æstate nives vel certe imbres ventique frigidissimi. Neque juvat illorum opinionem unicum exemplum à nautis observatum in regione quadam novem gradibus distante à polo, quam Groenlandiæ partem esse arbitrantur plerique. In hac enim

her-

herbam virentem repertam esse & aërem multo topidiorem quam in Nova Zembla, certum est; animalia vero non alia, præter Rhencervos, quæ species Septentrionalibus regionibus propria existit. Hi cervi unius mensis spatio ita pingues redduntur pastu herbæ illius, ut sapidissimam præbeant carnem.

Verumenimvero cum nondum hætenus plures hujus conditionis regiones repertæ sint in Zona frigida, non licet ex illo singulari exemplo generalem conjecturam facere, præsertim cum causâ peculiaris illius constitutionis manifesta sit. Terra enim ea paludosa & uliginosa est, & herba illa, qua passî cervi impinguantur non est graminis terrestris species, sed ulva & alga. Aliæ vero herbæ nullæ ibi repertæ neque arbores. Ex quibus colligere licet, terram illam pinguem aliquam atque sulphuream substantiam continere, quæ aqua marina mixta vel etiam fluviorum aqua talem oleosam & impinguantem algam proferat. Similem vero terram reperiri in aliis Frigidæ Zonæ locis, nondum est observatum, sed contrarium potius.

Hyeme itaque in hisce locis parum lucis, sed frigoris, nivis, imbrium & ventorum polarium magna & incredibilis sævitia, atque ea incipiet in Boreali Frigida Sole primum Capricorni ingresso, etsi Autumnus quoque Sole à 1 gr. Libræ ad 1 gr. Capricorni eunte ab hyemis sævitia parum absit. Vere minor quidem est inclementia aëris, non tamen sine nivibus, imbribus, & polaribus frigidis ventis: incrementum tamen caloris de die vel potius frigoris decrementum sentitur eo tempore, nempe Sole à 1 gr. Arietis ad 1 gr. Cancrî eunte. Atque in hoc tempore verno vel ejus posterioribus diebus Sol integris circumvolutionibus commorabitur supra Horizontem, atque ideo  
tunc

tunc ca  
ejus est  
faciat &  
ciem;  
ciem  
le à 1 gr  
priori p  
zontem  
get, ita  
clemen  
inter m  
benigni  
bulæ, v  
interdu  
neque t  
nire, e  
cinis.

Ut d  
commo  
Zona fr  
cum a  
navigat  
quibus  
dant.

Die s  
sex mill  
occider  
itudin  
esset, a  
erant,

Die:  
curretu  
batur o  
poterat

Die  
transire  
quæ ex

tunc calor mediocri sentietur, qui tamen non  
 ejus est vigoris, ut nives omnium locorum lique-  
 faciat & resolvat in aquam, multo minus gla-  
 ciam; unde nautæ perhibent, nives hic atque gla-  
 ciam repetiri æternæ ætatis: æstas deinde erit So-  
 le à 1 gr. Cancr. ad 1 gr. Libræ tendente, in cujus  
 priori parte Sol adhuc integris diebus supra Hori-  
 zontem manet & calorem aliquâ accessione au-  
 get, ita ut Junius, Julius & Augustus menses sint  
 clementis & tolerabilis aëris, in quibusdam locis  
 inter montes Solis calor intensus. Sed hanc Solis  
 benignitatem sæpissime impediunt imbres & ne-  
 bulæ, ventique Septentrionales durissimi, quibus  
 interdum nix adjungitur, ita ut nullæ hic fruges  
 neque frumentum ad maturitatem possint perve-  
 nire, exceptis quibusdam locis Arctico circulo vi-  
 cinis.

Ut de hisce lectores rectius judicare queant,  
 commodum fuerit ea hic recensere, quæ Belgæ in  
 Zona frigida aliquando commorantes observarunt,  
 cum ad fretum Waigats & Novam Zemblam  
 navigassent. Adolescentes quoque hic reperient,  
 quibus globi usum magis sibi familiarem red-  
 dant.

Die XXI Junii, Anno 1594 (Calendarii novi)  
 sex milliaribus circiter à Nova Zembla cum Sol non  
 occideret illi loco, dimensi sunt minimam ejus al-  
 titudinem, nempe cum in Meridiano mediæ noctis  
 esset, atque ex ea invenerunt latitudinem loci, ubi  
 erant, 73 gr. 25 min.

Die XXI Junii in latitudine 77 gr. 20 min. oc-  
 currerunt copiosæ glaciæ, quæ totum mare vide-  
 batur opplere, quantum ex specula mali cognosci  
 poterat.

Die XXI Augusti fretum Waigats nondum  
 transire navis poterat propter glaciæ copiam,  
 quæ ex Oceano Tartarico in illud ferebatur, at-  
 que



que hoc impedimentum tota æstate senserunt, ita ut rebus infectis coacti sint in Hollandiam redire.

Ex alia navigatione. Die v Junii Solis altitudo meridiana minima, quia non occidebat illi loco, ubi erant, deprehensa fuit 1 gr. Ex quo collegerunt latitudinem illius loci esse 74 gr. mare glacie tectum conspiciebatur.

Die xix Junii deprehenderunt ex Solis altitudine, latitudinem loci, ubi tunc erant, 80 gr. 11 min. circa Groenlandiam vel Spitzbergam, Angli littora lustraverunt usque ad 82 gr. latitudinis, sed mare media æstate glacie ita constrictum invenerunt, ut terræ pars vel illi adherere videretur. Densa præterea nebula & crassus vapor supra aquam ferebatur, ut vix prospectum concederet.

Die xi Augusti anno 1596 in latitudine 76 gr. circa Novam Zemblam invenerunt glaciem ad fundum usque maris continuam: die xxvii navis à glacie ita cincta fuit, ut in Nova Zembla commorari coacti sint per hyemem Sole carentem.

Die xxvii Septembris frigus, adeo sævum, ut vix tolerarent: nives continuæ: terra gelu constricta nullam fissionem neque adhibito igne regelationem concedebat.

Die primo Novembris Sol parum admodum supra Horizontem elevabatur in australi plaga: Luna vero pleno orbe elevabatur in plaga Septentrionali & integra fere circumvolutione commorabatur supra Horizontem.

Die secundo Novembris Solem Orientem conspiciebant in plaga, quæ tertia numeratur ab Austro (Sund-Sund-Ost) sed non totus Solis orbis oriebatur, verum in Horizonte ferebatur, quasi secundum telluris longitudinem procederet.

Die tertio Novembris Solem oriri conspiciebant

bant in p  
non quic  
poterant  
tur, reli  
seebat.

Die qu  
nihil tam  
infra Hor  
diebus er  
Frigus hi  
mum, viz

Die ix  
gidus, ut  
ti mereat  
præbebat

Toto h  
luce tame  
fruebantur  
facit meri

Die xi  
tempore f  
mentum,  
in meridi

Die xx  
viderunt  
& sequent  
pra Horiz

Die sect  
aliquibus  
tandam di  
res & imb

In hisce  
deratione  
tate die sec  
refractione  
diebus So  
infra Hori

bant in plaga secunda ab Austro (Zuyd ten Oosten) non quidem ipsum Solem, sed limbum spectare poterant, etsi è mali specula illum contemplarentur, reliquum corpus infra Horizontem delitebat.

Die quarto Novembris, etsi àer quietus esset, nihil tamen amplius de Sole conspiciabant, quia infra Horizontem manebat. Luna contra integris diebus erat supra Horizontem. Erat enim plena. Frigus hisce & sequentibus diebus vehementissimum, vix igni cedens: nives & venti continui.

Die IX, X, XI Decembris àer serenus, sed adeo frigidus, ut cum eo nostræ hyemis frigus vix comparari mereatur. Stellarum circumrotatio jucundum præbebat spectaculum.

Toto hoc tempore Sol quidem non oriebatur, luce tamen circa meridiem inprimis ex crepusculo fruebantur. In his enim locis hyemæ crepusculum facit meridiem.

Die XIII Januarii àer fuit serenus. Atque ex hoc tempore senserunt insigne crepusculi lucis accrementum, frigoris remissionem aliquam, & levem in meridie calorem.

Die XXIV Januarii àer serenus. Hoc die primum viderunt in Australi Horizonte Solis limbum, & sequentibus diebus rotum Solem elevatum supra Horizontem.

Die secundo Maii ventus impetuofus glaciem ex quibus Oceani partibus removebat. Calor quibusdam diebus parvus, plerisque venti frigidi, nives & imbres, &c.

In hisce observationibus illud inprimis consideratione dignum videtur: Cur Sol desierit apparere die secundo Novembris, cum tamen propter refractionem (quæ deinde effecit, ut novendecim diebus Sol citius apparuerit, quam depressio ejus infra Horizontem admittebat) tardius multo debuisset

buisset non apparere? Diversitas atmosphaerae seu aëris aliquid in hoc negotio efficere posse videtur, quoniam Sol accedens ad Horizontem post trium mensium absentiam, invenit hic aerem crassiorem & densiorem, quam is aër erat, cum priori anno post longam moram infra Horizontem occultaretur: Verum ut tot dierum differentiam hæc aëris diversitas procreare possit dubito. Atque aliter observatum est ab illis, qui anno 1634 in Spitzberga hyemem egerunt. Hisce enim Sol desit apparere die xx Octobris, & rursus post longam absentiam apparere incepit die xxiv Februarii anno 1635, qui dies æqualiter fere absunt à die Brumæ xxi Decembris: nimirum à xx Octobris ad xxi Decembris sunt dies LXI, & à xxi Decembris ad xxiv Februarii sunt dies LXV. Et vero in posteriori annotatione facile aliquot diebus errarunt. Namque lecto decumbentes non animadverterunt Solem die xx, xxi, xxii Februarii Orientem: potest etiam esse ut in meridie forte dormierint, vel ut pluviz & nubes aspectum Solis impediunt.

### CAPUT XXVII.

*De Umbris, quas corpora in Tellure erecta & à Sole illuminata spargunt, atque de Divisione Telluris inde orta.*

Cum in diversis Telluris locis umbræ, quas corpora à Sole illuminata spargunt, admodum diversas in plagas ferantur & in sensum incumbentes varietates experiantur, inde factum est, ut homines hanc diversitatem, cujus causam ignoscabant, admirati sint, atque respectu umbrarum Telluris incolas in tres quasi species distribuerint (quæ tamen divisio ipsis Telluris locis sive superfici

fici a  
Amph  
Quoru  
stinan  
quæ  
propte  
pite pr

Um  
mundi  
quæ in  
tuto:  
dental  
tur Ur  
est, sive  
ter ere  
dianun  
lis, & A

Hete  
ubi cor  
bus an  
ferunt

Perij  
corpore  
omnes  
umbræ  
plagam  
Amph  
ubi cor  
busdam  
Australi

Sed r  
tertia h  
bra me  
dividen  
Hetero  
umbræ  
nimiru

fici applicanda est); ut quosdam appellaverint Amphiscios, alios Heteroscios, reliquos Periscios. Quorum explicatio cum exiguam contineat doctrinam, nos quædam alia de Umbris adjiciemus, quæ etsi ad Geographiam non pertineant, tamen propter affinitatem materiæ adolescentibus hoc capite proponi possunt.

Umbræ accipiunt denominationes suas à plagis mundi, in quas sparguntur, ut umbra Orientalis, quæ in Orientem tendit Sole in Occidente constituto: contra, umbra Occidentalis, quæ in Occidentalem plagam abit. Sed præcipue hic consideratur Umbra Meridiana, quæ in plano Meridiani sita est, sive quæ projicitur à corporibus perpendiculariter erectis vel in Meridiani plano sitis, Sole Meridianum obtinente: estque duplex, Septentrionalis, & Australis.

*Heteroscii* dicuntur incolæ illius partis Telluris, ubi corporum erectorum umbræ meridianæ omnibus anni diebus alterutrum in polum constanter feruntur.

*Periscii* dicuntur incolæ illius partis Telluris, ubi corporum erectorum umbræ uno eodemque die in omnes Horizontis plagas circumferuntur, sive ubi umbræ meridianæ uno die utramque Meridiani ad plagam sparguntur.

*Amphiscii* dicuntur incolæ illius partis Telluris, ubi corporum erectorum umbræ meridianæ quibusdam anni diebus ad Septentrionem, aliis ad Austrum sparguntur.

Sed ne loca Tropicorum excludantur, rectius pro tertia hac specie substituuntur *Ascii*, quorum umbra meridiana aliquo anni die nulla est. Et hi subdividentur in duas species, Amphiscios nempe, & Heteroscios: *Ascii Amphiscii* dicuntur, quorum umbra meridiana quibusdam anni diebus, duobus nimirum, nulla est, quibusdam in Septentrionem,



quibusdam in Austrum fertur. Ascii heteroscii dicuntur, quorum umbra meridiana uno anni die nulla est, reliquis in alterutram meridiani plagam constanter projicitur.

PROPOSITIO I.

*Umbra corporum erectorum supra Horizontale planum cadunt in plagam oppositam illi, in qua Sol existit.*

Optici & Gnomonici dicere solent, umbram, opacum & luminosum esse in uno plano: terminus autem umbræ, extremitas opaci & Sol sunt in una recta linea.

Quoniam enim opacum, umbra & linea ab extremitate opaci ad extremitatem umbræ concepta faciunt Triangulum, omnè vero Triangulum in uno est plano, ideo tres illæ lineæ in uno erunt plano: Est autem Sol in linea extremitatem opaci & umbræ conjungens. Itaque Sol etiam in eo plano erit. Porro erectum corpus est rectum ad planum Horizontale. Quare planum per illud ductum, nempe Trianguli dicti, est etiam rectum ad illud Horizontale planum, & ideo in verticali plano situm. Et quoniam corpus erectum tanquam vertex inter Solem & umbram situm est, ideo umbra & Sol erunt in plagis oppositis.

Umbræ hujus, quam stylus erectus à Sole illuminatus spargit, tres partes constituuntur, nempe umbra densa, centralis & penumbra. Densa umbra dicenda est, quam terminat radius è superiori Solis limbo veniens. Umbra centralis dicitur, quæ inter radium superioris limbi & centralem radium intercipitur. Penumbra dicitur, quæ inter centralem radium & inferioris limbi radium intercipitur.

Incol.  
pricorni  
Quar  
fatur, e  
cti pun  
eorum e  
è vertice  
ejus loc  
opaco in  
in Hori  
opacum  
Aliis  
locorum  
bra spar  
quam v  
pricorni  
(except  
versus S

Incol.  
Assu  
da, &  
plicatâ  
pticam  
Sol in  
cum vol  
immin  
bus die  
bit, in  
tallelo  
Horizo  
hifce d  
ascii. I  
sed um

## PROPOSITIO II.

*Incola locorum Telluris, qua in Tropico Cancræ & Capricorni jacent, sunt aescii herosicii.*

Quando enim Sol in primo gradu Cancræ versatur, eo die corpora erecta in aliquo Tropici Cancræ puncto umbram absorbent Sole meridiano eorum occupante, quia Sol tunc perpendiculariter è vertice imminet Horizonti, atque ideo omnia ejus loca illuminat, neque ullus radius ab erecto opaco impeditur quam iste, qui perpendiculariter in Horizontis planum decidit, atque ideo in ipsum opacum impetit.

Aliis vero anni diebus, quoniam Sol à vertice locorum Tropici declinat versus Austrum, ideo umbra spargetur in meridie versus Septentrionem, nunquam versus Austrum. Contra in locis Tropici Capricorni omnibus diebus spargetur versus Austrum (excepto uno die, quo nulla umbra erit) nunquam versus Septentrionem.

## PROPOSITIO III.

*Incola Zona Torrida sunt aescii amphiseii.*

Assumatur in globo locus aliquis Zone Torridæ, & adducatur ad Meridianum, atque cretâ applicatâ describatur parallelus latitudinis, qui Eclipticam secabit in duobus punctis. Quando itaque Sol in hisce Eclipticæ punctis erit, describit circumvolutione suâ diurnâ parallelum qui directe imminet descripto parallelo: Atque ideo duobus diebus, quibus puncta illa Eclipticæ obtinebit, in assumpto loco & omnibus in descripto parallelo sitis, verticalis erit in meridie, & omnia Horizontis loca illustrabit: ideoque nulla umbra hisce duobus diebus spargetur: & incolæ erunt aescii. Reliquis vero anni diebus non erunt aescii, sed umbra meridiana spargetur vel ad Septentrio-

nem vel ad Austrum : ad Septentrionem quidem , dum Sol movetur in ea Eclipticæ parte, quæ à duobus illis punctis antea signatis versus Austrum jaçent, contra, ad Austrum, dum Sol movetur in ea Eclipticæ parte, quæ à duobus illis punctis versus Septentrionem sita sunt.

PROPOSITIO IV.

*Incola Zonarum Temperatarum sunt Heteroscii.*

Quoniam enim Sol omnibus anni diebus in meridie versus eandem plagam, Austrum nempe, removetur à Temperatæ Borealis Zonæ locis, & contra versus Septentrionem à locis Temperatæ Australis Zonæ, sequitur ex Propof. prima hujus, quod umbra meridiana locorum Zonæ Temperatæ Borealis, in eandem plagam, Septentrionalem nempe, tendant omnibus anni diebus, contra in Australem in locis Zonæ Temperatæ Australis.

PROPOSITIO V.

*Incola Zonarum Frigidarum sunt Periscii.*

Quoniam enim hisce locis Sol aliquot anni diebus non occidit, sed supra Horizontem circumvolvitur, necessarium quoque est ut umbra in omnes plagas circumferatur, atque Sole in superiori meridiani semicirculo existente umbra spargetur versus Septentrionem, deinde vero, ubi Sol in inferiori meridiani semicirculo extiterit, umbra feretur versus Australem plagam.

PROPOSITIO VI.

*Dato loco Zonæ Terridæ, invenire dies anni, quibus ascii erunt incola illius loci, & quibus diebus umbra in Septentrionem, quibus in Austrum ferentur.*

Inveniantur dies anni, quibus Sol verticalis sit dato loco, illi erunt dies, quibus ascii erunt incolæ.

colæ da  
in Prop

Da  
cujus in  
Inve  
die ann  
runt ea

Dat  
incola il  
Inve  
dato lo  
sunt qu

Dat  
incola p  
Inve  
dato di  
quæ sita

Loci  
anni c  
sus A  
la ascii  
Qu  
tore re  
trione  
fitam  
umbra  
tâ in A

colæ dati loci, nimirum agendum est juxta modum  
in Propositione IIII hujus monstratum.

## PROPOSITIO VII.

*Dato die anni, invenire illa Telluris loca in globo  
cujus incolæ ascii sunt eo die.*

Inveniantur loca, quibus Sol verticalis fit dato  
die anni, juxta Propos. IX, cap. XXIV. Illa loca e-  
runt ea, quæ quæruntur.

## PROPOSITIO VIII.

*Dato Zona Frigida loco, invenire dies anni, quibus  
incola illius periscii sunt.*

Inveniantur dies anni, quibus Sol non occidit in  
dato loco, juxta Proposit. X, cap. XXIV. Illi dies  
sunt quæriti.

## PROPOSITIO IX.

*Dato die anni, invenire loca Zona Frigida, quorum  
incola periscii fiant eo die, ita ut hic dies primus sit.*

Inveniantur ea loca Zonæ Frigidæ, quibus Sol  
dato die primum non occidere incipit. Illa erant  
quæriti.

## PROPOSITIO X.

*Locis in Equatore sitis umbra meridiana semisse  
anni cadit versus Septentrionem, altera semisse ver-  
sus Austrum. Diebus autem æquinotiorum sunt inco-  
læ ascii.*

Quoniam enim Sol unâ semisse anni ab Equatore  
recedit versus Austrum, altero versus Septen-  
trionem, umbræ autem feruntur in plagam oppo-  
sitam plagæ Solis, inde fit, ut semisse anni unâ  
umbræ meridianæ ferantur in Septentrionem, alte-  
râ in Austrum.



## PROPOSITIO XI.

*Supra planum Horizontale nostri loci constituere planum aliquod, in quo erecti styli perpendiculares sint ascii quibusdam anni diebus, quibusdam anni diebus umbra meridiana ferantur versus Septentrionem, alii versus Austrum, hoc est, in quo umbra meridiana ita projiciantur, sicut in loco aliquo Zona Torrida dato.*

Latitudo loci *Zonæ Torridæ* dati auferatur à latitudine nostri loci, si latitudines fuerint cognomines; sed si diversæ speciei, addantur ambæ latitudines, & residui gradus asserventur. Deinde in plano Horizontali inventâ lineâ meridianâ & lineâ *Æquatoris*, quæ ad meridianam est perpendicularis, erigatur supra hanc *Æquatoris* lineam planum aliquod, ita ut inclinet supra Horizontem tot gradibus quot antea asservati sunt, nimirum ut angulus inter hoc planum & Horizontis nostri eam partem, cui polus vicini or est, sit tot graduum, quot asservati fuerint. In hoc plano erecti styli projicient tales umbras, ac si in loco dato *Zonæ Torridæ* essent erecti.

## PROPOSITIO XII.

*In locis sitis in *Æquatore* umbra styli perpendiculariter erecti diebus æquinoctiorum integris in una manet recta linea, sive ante meridiem projicitur in unam continue plagam Occidentis, post meridiem in plagam Orientis. Diebus autem anni reliquis in semicirculum umbra quotidie circumfertur.*

In locis extra *Æquatorem* in *Zona Torrida* sitis, dum Sol movetur in parte *Eclipticæ*, quæ inter verticem loci alicujus & vicinum *Tropicum* interjacet, umbræ minorem semicirculo partem subjectæ superficiæ pererrant. In locis *Zonarum Temperatarum*, dum Sol movetur in remotiori

ab

ab illis  
micircu  
dum Se  
rit. Die  
mnibu  
in sem  
Hæc  
ex decl  
fient.

In lo  
Ecliptic  
intercep  
rectas  
post mer  
inspicer

Sum  
& polu  
scribatu  
duobus  
arcu E  
& vicin  
tur reg  
bis reg  
tur quo  
tur para  
puncto  
lutione  
corni &  
erit par  
dians v  
puncta  
quadra  
in hac  
sum su  
regredi

ab illis semicirculo Zodiaci, umbræ minorem semicirculo superficiem perreptant, majorem vero, dum Sol viciniorem Zodiaci semicirculum percurrit. Diebus æquinoctiorum, umbra erecti styli in omnibus Telluris locis (excepto æquatore & polo) in semicirculum circumfertur.

Hæc omnia partim ex inspectione globi, partim ex declinatione Diagrammatum nota & perspicua fiunt.

### PROPOSITIO XIII.

*In locis Zona Torrida, dum Sol versatur in arcu Eclipticæ inter Tropicum vicinum & loci parallelum intercepto, illis diebus umbra styli erecti bis regreditur & relictas lineas repetit, semel nempe ante meridiem, semel post meridiem. Ipse quoque Sol hisce diebus cursum suum inflectere videbitur.*

Sumatur in globo locus aliquis Zonæ Torridæ, & polus eleuetur juxta ejus latitudinem, atque describatur parallelus loci, qui Eclipticam secabit duobus punctis. Dico, quod dum Sol movetur in arcu Eclipticæ intercepto inter hunc parallelum & vicinum Tropicum, illis diebus Sol bis videbitur regredi, umbra quoque styli perpendicularis bis regredietur & relictas lineas repetet. Assumatur quodlibet ex illius arcus punctis, & describatur parallelus Solis, quem nimirum Sol in illo puncto existens describit per diurnam circumvolutionem, ex. gr. sumatur i gr. Cancræ vel Capricorni & ipsorum Tropicorum alter, sic non opus erit paralleli descriptione. Deinde applicetur quadrans vertici. Et applicetur ad paralleli aliquot puncta, donec ad punctum perveniatur, in quo quadrans tangit parallelum. In hoc enim situ vel in hac plaga Sol existens inflectere videbitur cursum suum versus verticem loci, & umbra incipiet regredi à linea Æquatoris versus Meridianam.

Eodem modo si Occidentali parti paralleli applices quadrantem, videbis in illo puncto, in quo quadrans tangit parallelum, Solem relictas plagas repetere & occidere in plaga illa, in qua ante aliquot horas jam fuerat.

Diagrammate, quod amplum satis sit, magis perspicua fiet propositionis veritas. Locus aliquis in Zona septentrionali Torrida sit L, in quo stylus erectus esse concipiatur. Ponamus Solem in initio Cancri versantem & parallelum A B C D E F describentem oriri in plaga L A, erit umbra L a. Deinde umbra progredietur versus L o c, donec perveniat ex. gr. in L c. (namque in ipsam L o cadere nequit). Ubi Sol erit in plaga ea, quæ tangit ipsum parallelum, nempe in L C. Hic incipiet regredi Sol versus plagam L A, nempe in arcu C G H, & ideo umbra ex L C regredietur versus L a, & sic perveniet demum in Meridianam lineam L m. Ita post meridiem, postquam Sol à plagis L F, L E, pervenit ad plagam L D, quæ tangit parallelum in D, redibit ad priores plagas L E, L F, ubi occidet. Interim umbra eodem modo regredietur, neque ubi ab L m pervenit ad L d, remeabit versus L m usque in L f, ubi Sole Occidente in L F umbra cessabit.

*Corollarium.* Non itaque præter naturam est, umbram in horologiis sciathericis regredi: sed tum demum miraculum est, si id subito fiat insigni spatio, item si lineas horarias repetat, nempe si stylus non sit perpendicularis, sed axi mundano parallelus: imo etsi sit perpendicularis, non tamen lineæ ipsius umbræ indicant horas, sed lineæ umbrarum axis mundi, cujus pars mente concipitur in horologiis, si absit.

PROPOSITIO XIV;

Dato loco in Zona Torrida, & die uno ex illis, quibus S

quibus S  
pendicul  
tunc erit

Eleva  
Solis ad  
notetur  
in eo p  
cetetur ve  
ptum pa  
tis in  
Ut aute  
punctur  
xi i cyc  
leli pun  
quot ho  
piat.

Umb  
altitudi  
Umbra  
sunt,  
umbra.

Sol  
elevatu  
umbra  
pterea  
Sol m  
longitu  
su altit  
infini.

Dat  
tudines  
prater  
Lo

quibus Sol cursum suum inflectere & umbra styli perpendicularis regredi videtur, invenire plagam in qua Sol tunc erit, & horam quando id fiet.

Elevetur polus pro dati loci latitudine, & locus Solis ad datum diem inveniatur & in Ecliptica notetur, describaturque cretâ parallelus, quem Sol in eo puncto existens describit. Quadrans applicetur vertici & ita circumducatur, donec descriptum parallelum tangat: ita extremitas quadrantis in Horizonte monstrabit plagam quæsitam. Ut autem hora inveniatur, notetur id paralleli punctum, in quo contactus fit, Index ad horam XXI cycli collocetur, & volvatur notatum paralleli punctum ad meridianum. Index monstrabit, quot horis ante & post meridiem regressus incipiat.

## PROPOSITIO XV.

Umbra<sup>rum</sup> longitudo decrescit, accrescente Solis altitudine; & contra, decrescente Solis altitudine, Umbra accrescit: nimirum ab ortu ad meridiem decrescunt, & à meridie ad occasum iterum accrescunt umbra.

Sol enim eo propior fit styli vertici, quo magis elevatur supra Horizontem: igitur radius Solis umbra<sup>m</sup> terminans etiam fit propior stylo, & propterea umbra brevior evadit. Porro in meridie Sol maximam habet altitudinem: umbra<sup>e</sup> itaque longitudo tunc minima erit. In ortu vero & occasu altitudo Solis nulla: itaque umbra<sup>e</sup> longitudo infinita tunc erit.

## PROPOSITIO XVI.

Datâ longitudine styli & umbra invenire Solis altitudinem supra Horizontem, atque inde horam diei, si præterea nota sit latitudo loci & dies anni.

Longitudo styli, umbra<sup>e</sup>, & radius terminans



umbram faciunt Triangulum rectangulum. Itaque instituaturs proportio juxta Propof. xv capit. fecundi. Ut longitudo umbræ ad longitudinem styli, ita finus totus ad tangentem anguli, qui indicat altitudinem Solis.

Deinde ex altitudine hac & latitudine loci atque die anni invenietur hora diei. Propof. 111 capit. XXIX.

### PROPOSITIO XVII.

*Dat à semidiametro Solis & Telluris, atque Solis à Tellure distantia, investigare umbra, quam rota Telluris spargit in calum, longitudinem.*

Umbra Telluris Conica est, ut optici demonstrant, & facile ostenditur per Diagramma. Itaque verticis hujus Coni, qui Lunæ Eclipsin facit, distantia à Tellure quæritur: Ea invenitur per hanc proportionem: Ut differentia semidiametrorum Solis atque Telluris ad distantiam datam: ita semidiameter Telluris ad longitudinem umbræ Telluris si-ve ad axem Coni umbrosi.

### PROPOSITIO XVIII.

*Dat à Luna à Tellure distantia & umbra Telluris longitudine, invenire quanta Luna pars obscuranda sit, sive quanta Eclipsis futura sit, si Luna in ipsa Ecliptica hæreat.*

Instituatur regula trium juxta hanc proportionem: Ut longitudo umbræ ad excessum hujus longitudinis supra Lunæ distantiam: ita semidiameter Telluris ad semidiametrum coni umbrosi Telluris eâ parte, ubi Luna eum ingreditur.

Deinde: Ut distantia Lunæ ad semidiametrum umbræ inventam: ita finus totus Canonis ad tangentem anguli visionis, quem dimidia illa umbræ diameter in oculo nostro subtendit: quæ si duplicetur, habetur angulus visionis pro integra diame-

ro un  
gulus  
qui in  
Ex  
securat  
mensu  
gnitud  
parent  
rum l  
hoc m  
diame  
digito

Qu  
Solis,  
meridia  
longior  
Que  
remo  
minan  
longiu

Si s  
tione,  
fit, um  
nissim  
ximo l  
Sol ad  
Ete  
tuti ca  
Sol ex  
num,  
test,  
no, u  
styli c

no umbræ illius. Cum hoc angulo conferatur angulus visionis sive semidiameter apprensus Luna, qui in oppositione Solis sive tempore Eclipsis.

Ex hac comparatione innotescet quantitas obscurationis, quam si in digitis habere cupis (quæ mensura exprimere solent Astronomi Eclipsis magnitudinem, & ipsam Lunæ semidiameterem apparentem, quia hæc est duodecim circiter digitorum latitudinis) institues regulam proportionis hoc modo: Ut Diameter Lunæ ad 12. digitos, ita diameter apprensus umbræ sive angulus visionis ad digitos Eclipticos.

#### PROPOSITIO XIX.

*Quo loca Telluris ab Equatore vel à parallelo Solis, quovis die, sunt remotiora, eo tam umbra meridiana, quam reliquarum horarum umbra sunt longiores.*

Quoniam enim Sol à vertice eorum locorum est remotior, ideo radius quoque Solis umbram terminans à stylo est remotior, ac proinde umbra eo longius protenditur.

#### PROPOSITIO XX.

*Si supra planum aliquod constituatur stylus tali ratione, ut sit pars axis mundi, sive ut axi illi parallelus sit, umbra ejus styli ad aliquam horam cadet in eam planissimam lineam, in qua planum hoc secatur à circulo maximo horario sive declinationis sive à Meridiano, in quo Sol ad eam horam existit.*

Etenim umbra axis mundi sive styli ita constituti cadit in circuli horarii vel meridiani (in quo Sol existit ad aliquod temporis momentum) planum, neque enim extra hoc planum cadere potest, cum Sol, opacum & umbra in uno sunt plano, ut Propos. prima dictum. Atqui eadem umbra styli cadit in planum, supra quod constitutus est

stylus. Quare cum umbra hæc sit in hoc plano, & sit quoque in plano meridiani, quem Sol ad horæ aliquod momentum vel initium tenet, inde sequitur, quod umbra ista cadat in communem sectionem plani hujus & plani Meridiani vel circuli horarii. Si enim linea aliqua sit in duobus vel pluribus planis, erit in communi horum planorum sectione.

### PROPOSITIO XXI.

*Horologium sciathericum æquinoctiale describere.*

Debet planum aliquod ex ligno, charta, ære vel alia materia confectum erigi super Horizontem tot gradibus, quot gradibus Æquator elevatur supra Horizontem illum, sive quot gradus sunt in complemento latitudinis loci.

Antequam autem erigatur, commodius est Sciatherici lines ducere. Assumatur itaque in eo plano punctum pro libitu, atque ex eo tanquam centro describatur peripheria circuli: ducatur per idem centrum linea Horizonti parallela, sive communi sectioni Æquatoris & Horizontis, quæ erit linea umbræ horæ sextæ vespertinæ & sextæ matutinae. Huic ex centro perpendicularis ducatur, quæ erit horæ XII umbra. Deinde dividatur uterque quadrans in tres partes, & singulæ harum trium in duas, ita ut sex arcus in unoquoque habeantur, quorum singuli erunt quindecim graduum, atque ex centro ducantur ad arcuum terminos lineæ rectæ, hæc erunt lineæ umbrarum pro reliquarum horarum initiis, quæ inter XII & VI cadunt, quarum numerus & ordo ascribendus est extremitatibus ductarum linearum: iidem arcus quindecim graduum infra Horizontalem lineam in descripta peripheria sunt sumendi, pro horis ante VI matutinam & post VI vespertinam, & li-

nez

nez um  
stylus pe  
Deine  
planum  
meridi  
ctialis,  
locandu  
paralle  
bra styl  
anni die

Sed c  
misse an  
se, ideo i  
do conf  
Æstatis  
umbrar

Facil  
noctiali  
Ecliptic  
ci signa  
quos S  
Assuma  
accurat  
cem un  
culas s  
Declina  
5 gr. A  
1 gr. T  
Gemi  
comple  
ne Ma  
lorum.

Por  
tis cor  
pheria  
5 gr. A  
lis pro

nez umbrarum ducenda. Ex centro erigendus est stylus perpendicularis.

Deinde in plano Horizontali (si Sciatherici planum nondum sit erectum) invenienda est linea meridiana, & linea ortus atque occasus æquinoctialis, atque supra hanc planum sciatherici collocandum, ut linea Horizontalis sciatherici sit parallela lineæ isti ortus atque occasus. Ita umbra styli monstrabit horarum initia ad quemlibet anni diem.

Sed quia Sol hujus plani superficiem unam semisse anni tantum illustrat, & alteram altera semisse, ideo in utraque superficie sciathericum dicto modo construendum, ut in una facie tempore Veris & Æstatis, in altera tempore Autumni & Hyemis umbrarum beneficio hora innotescant.

Facili quoque opera in sciatherico hoc æquinoctiali delineantur circuli qui locum Solis in Ecliptica vel ingressum Solis in duodecim Zodiaci signa indicent, atque parallelos representent, quos Sol in cælo circumvolutione sua describit. Assumatur enim certa styli magnitudo, atque ea accurate dividatur in decem partes, & harum decem una in alias decem, ut tota linea in 100 particulas secta esse concipiatur. Deinde ex Tabula Declinationum Solis excerpantur declinationes 5 gr. Arietis, 10 gr. 15 gr. 20 gr. 25 gr. 30 gr. five 1 gr. Tauri, 15 gr. Tauri, 1 gr. Geminorum, 15 gr. Geminorum, 1 gr. Cancræ. Harum declinationum complementa ad 90 gr. sumantur & ex Canone Mathematico Tangentes complementorum illorum.

Porro ex centro horologii intervallo Tangentis complementi 5 gr. Arietis describatur peripheria circuli; hæc denotabit Solis ingressum in 5 gr. Arietis & 25 gr. Virginis, & parallelum Solis pro eo die, nimirum cum umbræ extremitas  
diurna



diurna circumrotatione in descriptam hanc peripheriam incidet, indicium erit, Solem in 5 gr. Arietis existere vel 25 Virginis. Eodem modo describantur peripheriæ intervallo complementorum 10 gr. Arietis, 20 gr. Arietis, 1 gr. Tauri, 15 gr. Tauri, 1 gr. Geminorum, 15 gr. Geminorum, 1 gr. Canceri. Hæ denotabunt parallelos Solis existentis in illis punctis, & simul in punctis 20 gr. Virginis, 10 gr. Virginis, 1 gr. Virginis, 15 gr. Leonis, 1 gr. Leonis, 15 gr. Canceri.

Eodem modo in altera facie sciatherici describentur peripheriæ pro parallelis Solis, in 5 gr. Libræ & 25 gr. Piscium, in 10 gr. Libræ & 20 gr. Piscium, in 15 gr. Libræ & 15 gr. Piscium, in 1 gr. Scorpii & 1 gr. Piscium, in 15 gr. Scorpii & 15 gr. Aquarii, in 1 gr. Sagittarii & 1 gr. Aquarii.

Singulis hæc peripheriis characteres signorum Zodiaci ascribendi sunt.

## CAPUT XXII.

*Sciathericum Horizontale sive in plano Horizontali describere.*

Per Globum. Elevetur polus pro loci latitudine, & Meridianus, qui præ reliquis in ipsius globi superficie conspicuus & colore & magnitudine, adducatur sub æneum Meridianum, Index ad horam XII constituitur. Volvatur globus, donec Index monstrat horam I vel XI, sive donec quindecim Æquatoris gradus transeant æneum Meridianum. In hoc situ globi numerentur in Horizonte ligneo gradus intercepti inter æneum & globi Meridianum, & numerus hic annotetur pro hora I post meridiem & XI antemeridiana.

Deinde iterum volvatur globus, donec Index monstrat horam I vel X, & gradus in Horizonte intercepti inter Meridianos illos duos æneum & assumptum annotentur pro hora X & I I. Eodem modo

modo f  
VII & v  
VII, pr  
ita ann  
in plan  
jus line  
batur p  
eandem  
linea ur  
pomeri  
XII line  
cus ante  
sus line  
ne, ne  
deinde  
& IV, &  
lineæ ac  
rum in  
horatur  
bendus.

Stylu  
meridia  
cum ea  
tioni p  
quod fa  
latitudi  
ducatur  
arcum a  
facta nu  
tur supr  
umbra l  
sciatheri  
scientes  
ris opera  
ptione.

modo fiat pro horis IX & III, pro VIII & IV, pro VII & V, pro VI & VI (hac non indigemus) pro V & VII, pro IV & VIII, pro III & IX. Gradibus hisce ita annotatis pro singulis ascriptis horis, inveniatur in plano Horizontali linea meridiana, atque ex hujus lineæ puncto quolibet, tanquam centro, describatur peripheria circuli, & ex centro ducatur ad eandem perpendicularis ab utraque parte. Hæc erit linea umbræ ad horam VI antemeridianam & VI pomeridianam. Linea meridiana est umbræ horæ XII linea. In descripta peripheria abscindantur arcus antea notati, incipiendo à linea meridiana versus lineam horæ VI antemeridianæ & pomeridianæ, nempe primo arcus notatus pro hora XI & I, deinde pro hora X & II, pro IX & III, pro VIII & IV, &c. Arcubus ita abscissis ducantur ex centro lineæ ad terminos illos, hæc erunt lineæ umbrarum in reliquarum horarum initiis & fine. Atque horarum numerus extremitati linearum erit ascribendus.

Stylus autem ex centro Horologii supra lineam meridiana[m] ita elevandus est, ut angulus, quem cum ea facit, sit æqualis latitudini loci vel elevationi poli: Sed commodius est Triangulum aliquod fabricare, cujus angulus ad basin sit æqualis latitudini loci. Si in charta sit facta delineatio, ducatur ex centro linea, quæ à peripheria auferat arcum æqualem latitudini loci (à meridiana linea facta numeratione) atque Triangulum excindatur supra meridiana[m] lineam constituendum. Ita umbra horas monstrabit. Facilis quoque est hujus sciatherici constructio sine globo, quam adolentes felicius ex ostensione & prævia Præceptoris operatione discent, quam ex verbis facta descriptione.

## PROPOSITIO XXIII.

*Sciathericum in plano Verticali describere, quod directe Ortum & Occasum aquinoctialem respicit.*

Hujus constructio eodem perficitur modo, quo in Horizontali usi sumus, si modo polus elevetur non juxta loci latitudinem, sed juxta complementum ejus, & deinde stylus quoque juxta hoc complementum elevetur supra meridianam lineam: sed melius hæc ex ostensione & manuactione quam longis præceptis percipiuntur.

## PROPOSITIO XXIV.

*Sciathericum in nostro Horizontali vel alio plano construere, quod indicet horas aliorum locorum à nostro utcumque remotorum.*

Potest hoc in eodem sciatherico fieri, quod pro indicandis horis nostri loci conficitur. Primo consideretur, an locus datus versus Ortum vel Occasum à nostro jaceat: si versus Ortum, prius numerabitur in illo hora duodecima, quam in nostro loco: si versus Occasum, serius. Adducatur deinde noster locus ad meridianum, Index ad horam XII, & volvatur globus, donec alter locus ad meridianum perveniat, Index monstrabit, quæ hora sit in hoc loco, cum in nostro est XII. Ex hoc facile est colligere horas illius loci, quæ cum nostri loci I, II, III, IV, item XI, X, IX, VIII, &c. convenient, quæ proinde illis ascribi debent. Sed elegantius hæc sine globo possunt absolvi juxta modum, quo Horizontalia conficiuntur.

## PROPOSITIO XXV.

*Planum elevare supra Horizontem nostri loci, atque in eo plano sciathericum construere, in quoslibet horarum regredi videantur, sicut in locis Zona Terrida.*

Quo-

Quo-  
gitar,  
fit com  
pra nost  
& occa  
las, elev  
bra regr  
singulis  
Sol per  
Sit it  
constitu  
Erit pla  
nit supr  
plano c  
elevatio  
diximus  
rum ex  
product  
existent  
diculari  
sto ejus  
nicum e  
bra sua  
horas,  
diebus.  
Possu  
sciather  
que om  
hæc ma  
ideo inc  
tractare,

Quoniam plani elevatio nostro arbitrio relinquatur, ideo eligemus talem, quæ proposito nostro sit commoda: ex. gr. planum ita constituemus supra nostrum Horizontem (sive supra lineam ortus & occasus æquinoctialis), ut axis mundi, sive polus, elevatus sit supra illud gradibus decem. Ita umbra regredi incipiet Sole in 26 gr. Arietis ingresso, singulis diebus id faciet, donec ad 4 gr. Virginis Sol pervenerit.

Sit itaque in loco latitudinis 52 gr. planum ita constituendum & horologium construendum. Erit planum elevandum gradibus 42, ita polus erit supra illud elevatus gradibus decem. In hoc plano construatur sciathericum Horizontale pro elevatione poli decem graduum, eo modo quo diximus Propos. XXII. Ubi jam lineæ umbrarum ex centro horologii ductæ sunt, & satis productæ, deleantur earum partes circa centrum existentes & ipsum centrum, atque stylus perpendicularis erigatur in aliquo lineæ meridianæ puncto ejus altitudinis, qualem Triangulum Gnomonicum exhibebit. Ita hujus styli extremitas umbra sua in lineas umbrarum incidente indicabit horas, & simul umbra apparebit regredi dictis diebus.

Possunt etiam beneficio globi terrestris describi sciatherica meridionalia, polaria, inclinantia atque omnis generis: sed quia ad aliam disciplinam hæc materia pertinet, nempe ad Gnomonicen, ideo inconveniens fore existimo illa omnia hic pertractare,



## C A P U T XXVIII.

*De Comparatione affectionum caelestium  
in diversis Telluris locis.*

**E**X consideratione convenientiæ & discrepantiæ apparentiarum caelestium in diversis Telluris locis orta est denominatio incolarum (quam quidam male acceperunt pro Divisione), qua quidam dicuntur Antœci, alii Periœci, alii Antipodes.

*Antœci* dicuntur incolæ duorum locorum, quæ in eodem quidem ejusdem Meridiani Semicirculo jacent, sed à diversa Æquatoris plaga, unus nempe versus Septentrionem, alter versus Austrum, ita tamen ut ab Æquatore æqualiter distent.

*Periœci* dicuntur incolæ duorum locorum, quæ in eodem parallelo jacent & in ejusdem meridiani diversis semicirculis. Interdum accipitur pro omnibus incolis alicujus paralleli: sed ad vitandam confusionem abstinēbimus hac usurpatione.

*Antipodes* dicuntur incolæ duorum locorum, quæ è diametro sibi mutuo opponuntur.

**N O T A.** Vocabula hæc tria ita plerunque usurpantur, ut amborum locorum, quæ comparantur, incolas denotent, sicut nos definivimus illa: interdum tamen, quando certus aliquis locus illis adjungitur, denotant tantum alterum locum, ut cum dicimus, periœci, antipodes illius vel hujus loci.

## P R O P O S I T I O I.

*Qui in eodem ejusdem Meridiani semicirculo habitant, illi & meridiem sive horam duodecimam simul habeant, & reliquas omnes horas simul numerant.*

Etenim

Etenim  
nitur p  
ridianu  
in eod  
quoque  
sum et  
mnibu  
diem fa  
finitur,  
lius, q  
duos a  
semicir  
est tem  
justem  
ma qua  
ac proi  
tidie.

Qui  
facit sive  
habitant  
tempore  
tero h  
cum in i  
Æst  
lestem  
minima  
tur: H  
Sol mo  
de sit,  
pinquar  
gisque  
lpharii  
pore co  
tamno  
In lo

Etenim merides sive hora diei duodecima definitur per Solis existentiam vel appulsum ad meridianum. Quoniam itaque illa loca Telluris, quæ in eodem Meridiano Telluris habitant, eundem quoque cœli meridianum habent, inde manifestum est, quod Sol eodem momento temporis omnibus in eodem meridiano habitantibus meridiem faciat & horam duodecimam. Porro hora definitur, quod sit vigesima quarta pars temporis illius, quod inter duas vicinas merides vel inter duos appulsus Solis ad eundem ejusdem meridiani semicirculum intercedit. Quoniam itaque idem est tempus quod inter duas merides locorum ejusdem meridiani intercedit, erit quoque vigesima quarta ejus pars in omnibus eadem & æqualis, ac proinde simul numerabunt omnes horas à meridie.

#### PROPOSITIO II.

*Qui in diversis Telluris hemisphæriis, qua Equator facit sive distinguit, vel qui à diversis Equatoris plagis habitant, illi tempestates anni contrarias habent eodem tempore, easdem autem diverso anni tempore, ita ut altero hemisphærio sit Hyems cum in altero est Æstas, & cum in illo Ver, in hoc Autumnus.*

Æstas enim incipit in quovis loco juxta cœlestem rationem, Solis nimirum motum, cum Sol minimam distantiam à vertice ejus loci adipiscitur: Hyems, cum maximam. Quoniam autem Sol movetur ab uno hemisphærio in alterum, inde fit, ut, quando locis unius hemisphærii appropinquat, ab alterius hemisphærii locis magis magisque recedat, atque adeo Æstas unius hemisphærii cum Hyeme alterius hemisphærii in tempore conveniat, & unius Ver cum alterius Autumno.

In locis Zonæ Torridæ tempestatum vicissitudo habet

habet aliquid peculiare, de quo abunde diximus capite xxvi.

PROPOSITIO III.

Qui in hemisphario Telluris Septentrionali habitant, illis faciem ad Æquatorem convertentibus Oriens est à sinistra, Occidens à dextra, Auster in antico, Septentrio à postico. Qui autem in hemisphario Telluris Australi habitant, illis faciem Æquatori obvertentibus stella oriuntur à dextra, occidunt ad sinistram.

Qui in ipso Æquatore habitant, illis si ad polum Septentrionalem convertant faciem, oriens est à dextra, occidens à sinistra; contra, si ad polum australem convertant faciem.

Qui in hemisphario Septentrionali habitant, illis facie ad Æquatorem conversa Sol in Zodiaci semicirculo boreali ambulans videbitur oriri & occidere in postico: Sed alterum semicirculum perambulans in antico. Contrarium evenit in hemisphario Australi. Contrarium quoque observabitur, si facies ad polos convertatur.

Hæc manifesta sunt ex consideratione ipsius circumvolutionis: possunt ostensione in globo facta illustrari. Solent autem id mirari nautæ & alii motuum cælestium imperiti, quando ex nostro hemisphario navigatione perveniunt in Australe hemispharium.

PROPOSITIO IV.

*Antæcorum affectiones cælestes comparata inter se, ita se habent.*

1. Simul agunt meridiem, mediam noctem, atque omnes horas simul numerant, ut patet ex prima Propos. hujus Cap.

2. Tempestates anni contrarias habent eodem tempore, nempe cum unus locus Ver agit, alter ex-

experit  
nem;

3. I  
bus;

4.  
mum

crecur

Calen

loci ad

ro locc

5. I  
& occi

teri. D

altitud

gula te

6. I  
ad Æq

debitu

à sinist

do on

rientur

7. C  
teri in

stico, c

8. I  
vazione

9.  
non oc

semper

tra, q  
quam  
Hæc

Qui  
es. P  
podibus

esperitur Autumnum, cum ille Æstatem, hic Hyemem, ut patet ex secunda hujus.

3. Dies unius loci sunt æquales alterius noctibus; Et hujus dies prioris noctibus.

4. Cum unius loci dies accrescunt in longissimum usque diem, interea alterius loci dies decrescunt usque ad brevissimum. Habent enim dies Calendariis oppositos æquales. Ex. gr. Dies unius loci ad xx Aprilis æquatur diei xx Octobris in altero loco.

5. Diebus æquinoctiorum Sol illis simul oritur & occidit, aliis autem diebus uni citius, quam alteri. Duobus quoque illis diebus eandem habet Sol altitudinem supra Horizontes Antæcorum ad singula temporis momenta: aliis diebus diversam.

6. Faciem illis sibi mutuo obvertentibus vel ad Æquatorem respicientibus, uni Sol à dextra videbitur oriri, ad sinistram occidere; alteri contra, à sinistra oriri, ad dextram occidere. Eodem modo omnes stellæ uni à dextra, alteri à sinistra orientur.

7. Cum uni Sol in postico oritur & occidit, alteri in antico oritur & occidit; contra huic in postico, cum illi in antico.

8. Polos diversos elevatos habent æquali elevatione.

9. Stellæ uni loco perpetuo apparentes, five non occidentes, alteri loco nunquam orientur, sed semper infra Horizontem depressæ manent: Contra, quæ huic loco nunquam occidunt, illi nunquam orientur.

Hæc omnia ex globo manifesta sient.

PROPOSITIO V.

*Qui in Æquatore habitant, non habent Antæcos. Pericæci autem illorum sunt iidem cum Antipodibus eorum. Poli Telluris non habent Pericæcos, ipse*



ipsi vero sibi mutuo sunt simul Antæci & Antipodes.

Propositionis hujus veritas ex Definitionibus Antæcorum, Periæcorum & Antipodum perspicua est, ideo non indiget probatione.

### PROPOSITIO VI.

*Dato loco in globo exhibere ejus Antæcorum, Periæcorum & Antipodum locum.*

Adducatur datus locus ad zneum Meridianum, & quot gradus inter hunc & Æquatorem intercepti sunt, totidem numerentur ab altera Æquatoris parte: Terminus numerationis erit Antæcorum locus.

Deinde Index applicetur ad horam XII cycli, noteturque punctum meridiani, quod dato loco imminet, item illud, quod loco Antæcorum. Hisce factis, volvatur globus donec Index in cyclo horario monstret alteram duodecimam. Ita punctum globi, quod subjicitur notato Meridiani puncto loci dati, erit locus Periæcorum, & punctum globi, quod subjicitur alteri notato puncto meridiani erit locus Antipodum.

### PROPOSITIO VII.

*Qui in eodem Telluris parallelo habitant, illi & singulos anni dies noctesque aequales habent: singula quoque stella aequali tempore commorantur supra illorum Horizontes: eadem stella nunquam occidunt, eadem nunquam oriuntur: Sol singulis diebus & omnes quoque stella in eadem illis plaga oriuntur & occidunt, eisdem quoque horis stella aque sunt elevata supra Horizontem vel infra eum depressa: eundem polum habent aque elevatum: facie ad Æquatorem vel eundem polum conversa, stella illis ab eodem oriuntur latere, ab eodem occidunt: tempestates anni, Ver, Æstas, Autumnum, Hyemem simul & eodem tempore*

*expe-*

*experium  
propriet*

*Hæc  
tuque lo  
si eliga  
titudine  
verur. e  
paralleli  
dianum  
quz Pro*

*Periæ  
par a it a*

*1. P  
sitione  
memora*

*2. Ho  
eisdem,  
XII ho  
& XII r  
tant 1,  
merant*

*3. Di  
co, dum  
loci est n  
pe semifi  
diaci sem  
fate pri  
atque ad  
simul di  
pe dum  
jam sup  
meridian  
Autumn  
ci semici  
quam al*

*experiuntur, exceptis quorundam locorum singularibus proprietatibus.*

Hæc ex ipsa motus stellarum consideratione, si-  
nque locorum Telluris, manifesta sunt: in globo,  
si eligatur unus aliquis parallelus, & juxta ejus la-  
titudinem siue ab Æquatore distantiam, polus ele-  
vetur. erit Horizon ligneus omnium locorum illius  
paralleli Horizon, si nempe singula loca ad meri-  
dianum adducantur, atque tunc perspicua erunt ea,  
quæ Propositio hæc continet.

PROPOSITIO VIII.

*Periæcorum affectiones caelestes ad se invicem com-  
parata ita se habent.*

1. Primo omnia illa, quæ in præcedenti propo-  
sitione de incolis unius & ejusdem paralleli com-  
memoravimus, habent communia.

2. Horas diei contrarias numerant re ipsa, nomine  
eisdem, nimirum cum in uno loco est meridies &  
xii hora meridiana, tunc in altero est media nox  
& xii mediæ noctis. Itaque hujus incolæ nume-  
rant I, II, III, &c. à media nocte, dum illi nu-  
merant I, II, III, &c. à meridie.

3. Diebus æquinoctiorum Sol occidit uni lo-  
co, dum alteri oritur, atque adeo tempus diei unius  
loci est nox alterius. Aliis vero anni diebus, nem-  
pe semisse anni, qua Sol vicinum locis illis Zo-  
diaci semicirculum percurrit, hoc est, Vere & Æ-  
state prius oritur uni loco, quam alteri occidat,  
atque adeo quibusdam horis vel horarum partibus  
simul diem habent Solemque conspicuum, nem-  
pe dum uni loco Sol versus occasum tendit, alteri  
jam supra Horizontem emersus ascendere versus  
meridianum incipit. Altera vero anni semisse,  
Autumno & Hyeme, qua Sol remotiorem Zodia-  
ci semicirculum decurrit, prius occidit uni loco,  
quam alteri (Pericecis) oriatur, atque adeo nul-

iam diei, sed aliquam noctis partem communem habent, & Solem aliquibus horis vel horarum partibus depressum infra Horizontem, ita tamen ut uni loco sit finis noctis, alteri initium.

4. Eodem modo stellas illas, quæ ab Æquatore declinant versus polum Pericæcis elevatum, quibusdam horis vel horarum partibus simul videre possunt, nimirum antequam uni occidant, alteri jam ortæ sunt; & contra, antequam isti oriententur, huic nondum occiderunt: atque hoc eo majori tempore, quo stella ab Æquatore remotior est versus polum elevatum. Contra, illas stellas, quæ ab Æquatore declinant versus polum depressum Pericæcis, nunquam simul vident, sed illæ prius occidunt uni loco, quam alteri oriententur, atque adeo quodam tempore sive quibusdam diei horis vel horarum partibus neutri Pericæcorum sunt conspicuæ, idque eo majori tempore, quo stella vicinior est polo, atque illæ stellæ, quæ Antæcis perpetuo supra Horizontem manent, perpetuo Pericæcis occultantur.

5. Quem locum Telluris Pericæcorum alter in occasu æquinoctiali vel etiam ad occasum habet, eundem alter Pericæcorum monstraturus in orientalem plagam digitum dirigit (quarum pars una Antæcis, reliqua Pericæcis communis est).

#### PROPOSITIO IX.

*Antipodum affectiones caelestes ad se invicem comparata, ita se habent.*

1. Omnibus anni diebus Sol atque stellæ uni loco oriententur, dum alteri occidunt: Habent enim eundem Horizontem, etsi diversam ejus faciem.

2. Unius dies alterius nox est.

3. Dies anni oppositos æquales habent, sicut etiam noctes, ita ut unius loci dies longissimus, sit alterius brevissimus.

4. Tempestates anni contrarias eodem tempore,

re, eas  
uni Ve  
alteri H

5. P  
tione  
suejus  
diversis

6. H  
numera  
alteri m

7. Q  
supra H  
infra alt

stellæ di  
illæ par  
loci Hor

8. U  
terius à  
torem ce

alteri à  
tione.

Unius  
tripdes, e

Ita un  
loci Peri

Hæc e  
ægent pr

Dato  
et merid

qua contr  
dato loco

Addu  
nam: sic  
semicitu

re, eandem opposito tempore experiuntur, nempe uni Ver, dum alteri Autumnus, uni Æstas, dum alteri Hyems. Et contra.

5. Polos diversos habent elevatos æquali elevatione: ab Æquatore æqualiter distant, sed à diversis ejus plagis: in eodem Meridiano siti sunt, sed diversis ejus semicirculis.

6. Horas diei contrarias revera, nomine easdem numerant, nimirum uni loco meridies est, dum alteri media nox.

7. Quæ stellæ uni loco perpetuo apparent sive supra Horizontem commorantur, illæ perpetuo infra alterius loci Horizontem manent. Item, quæ stellæ diu manent supra Horizontem unius loci, illæ parvo tempore commorantur supra alterius loci Horizontem.

8. Unius loci incolis Sol & stellæ à dextris, alterius à sinistris oriri videntur, si ambo ad Æquatorem converterint faciem, item si uni ab antico, alteri à postico per semissem anni facta permutatione.

#### PROPOSITIO X.

*Unius loci Pericæci sunt Antæcorum illius loci Antipodes, & Antipodum illius loci Antæci.*

Ita unius loci Antipodes sunt Antæcorum illius loci Pericæci, & Pericæcorum Antæci.

Hæc ex Definitionibus clara satis sunt, neque indigent probatione.

#### PROPOSITIO XI.

*Dato loco in globo invenire ea loca, quæ omnes horas & meridiem simul cum dato loco agunt, item illa loca, quæ contrarias horas numerant, & mediam noctem, cum dato loco meridies est.*

Adducatur datus locus ad æneum meridianum: sic omnia loca, quæ eidem meridiano hujus semicirculo subjacent, sunt illa, quæ omnes horas simul



simul easdem numerant: deinde Index ad horam XII cycli collocetur, & volvatur globus donec Index monstret alteram horam XII, sic loca quæ eidem semicirculo ænei meridiani subjacent, sunt illa quæ contrarias horas loci dati horis numerant.

### PROPOSITIO XII.

*Dato loco in globo invenire illa loca, apud quos dies omnes anni æquales sunt noctibus prioris loci.*

Datus locus adducatur ad meridianum, & invenitur ejus Antæcorum parallelus. Omnia loca in hoc parallelo sita satisfaciunt quæsito.

Sed si quæratur locus, cujus dies æquales sint dati loci noctibus & omnes horæ eadem, tunc solus Antæcorum locus est is qui quæritur.

Si autem omnes horæ contrariæ esse debeant, solus Antipodum locus quæsito satisfacit.

### PROPOSITIO XIII.

*Dato loco in globo & die anni, invenire horas, quibus incolæ illius loci & Antæci ejus simul Solem videre possunt, sive quibus horis Sol supra utriusque loci Horizontem existet, item horas, quibus in uno loco citius vel prius videtur, quam in altero loco.*

Inveniatur longitudo sive tempus moræ Solis supra Horizontem dati loci ad datum diem, juxta Proposit. IV, cap. XXV. Horæ, quibus hoc tempus à viginti quatuor horis deficit, sunt horæ diei in loco Antæcorum. Tot autem horis simul Solem habent elevatum duo hæc loca, quot horarum, vel ipsius dati loci dies est vel Antæcorum, nimirum, illius, qui non major quam duodecim horarum, quantus est in diebus æquinoctiorum, aliis vero diebus minor. Vel, ut clarius dicam, si dati loci dies est minor quam duodecim horarum, tunc Antæci iisdem horis Solem videbunt, sed pluribus,

pluribus  
veco d  
zarum  
enim  
pluribus  
que lo  
rus an  
niam f

Dei  
ter die  
horas  
tem on  
quam

Dat  
incola  
quibus

Inve  
Horizo  
fra Ho  
inveni  
titatem  
quibus  
dat, &  
huic or

D

D  
alt  
Loc  
dianur

pluribus, nempe ante illud tempus & post illud. Si vero dati loci dies sit major, quam duodecim horarum, sumendus erit numerus horarum noctis. Tot enim horis Antæci simul Solem videbunt, neque pluribus horis. Et hæ horæ circa meridiem utriusque loci numerandæ sunt, nempe dimidius numerus ante meridiem, dimidius post meridiem, quoniam simul agunt meridiem.

Deinde differentia dierum (sive differentia inter diem & noctem ejusdem loci) semissis exhibebit horas quibus Sol citius supra unius loci Horizontem oritur atque etiam tardius vel serius occidit, quam alteri loco Antæco.

#### PROPOSITIO XIV.

*Dato loco in globo & die anni, invenite horas, quibus incolæ illius loci Solem simul vident cum Peræcus suis, & quibus horis non simul eum cernunt.*

Inveniatur tempus moræ Solis supra dati loci Horizontem ad datum diem, & tempus moræ infra Horizontem, hoc est, quantitas diei æ noctis inveniatur. Differentia interdici & noctis quantitatem semissis indicabit horas, vel horæ partes quibus uni loco Sol prius oritur, quam alteri occidat, & eidem loco serius quoque occidat, quam huic oriatur.

#### CAPUT XXIX.

##### *De Comparatione Temporis in diversis Telluris locis.*

#### PROPOSITIO I.

*D* *Ata hora unius loci in globo dati, invenire horas alterius loci dati.*

Locus, cujus hora datur, adducatur ad Meridianum æneum, Index ad horam eam cycli horarii,

rarii, qualis datur. Volvatur globus, donec alter datus locus sub Meridianum veniat, Index in eo globi situ monstrabit horam quæsitam hujus alterius loci.

### PROPOSITIO II.

*Datâ horâ nostri loci (vel alterius loci in globo dati) exhibere in globo omnia illa loca, in quibus ad eam horam sit meridies, item illa, in quibus media nox, item illa, in quibus sit hora, quamcumque volumus. De ipsa Tellure proponendum esset & solvendum Problema, si scientificè ageremus. Est enim Telluris affectio. Idem intellige de plurimis sequentibus Problematis.*

Datus locus adducatur ad Meridianum, Index ad datam horam cycli horarii. Volvatur globus, donec Index monstrat horam XII meridiei. Ita loca, quæ meridiani semicirculo superiori (à polo elevato ad polum depressum) subjecta conspiciuntur, sunt ea, quæ meridiem ad datum tempus agent. Si vero globus volvatur, ut Index monstrat XII cycli inferiorem, loca, quæ eidem meridiani semicirculo subjecta conspicientur, sunt illa, in quibus media nox tunc erit.

Quod si loca cupiamus, in quibus sit alia aliqua hora; volvatur globus donec Index monstrat eam horam. Sic loca meridiani semicirculo subjecta sunt ea, quæ quæruntur.

### PROPOSITIO III.

*Datâ Solis altitudine, die anni, & latitudine loci, invenire horam ad tempus illius altitudinis.*

Elevetur polus pro data loci latitudine: ex dato die inveniatur locus Solis in Ecliptica, atque is in Ecliptica globi notetur & ad meridianum adducatur. Deinde quadrans applicetur vertici, & in eo  
note-

potenti  
ram x r  
Tun  
tatus l  
conve  
quæsit

Dat  
fieri dat  
di.

Fian  
vertici  
eam pla  
volvatu  
quadra  
bit in c  
observa

Luce  
dati, fru

Elev  
situati  
de acic  
dicular  
applic  
lis incu  
& Ind  
acicula  
Index

Dat  
ra ab er  
rimberg  
Olin

notetur gradus datæ altitudinis, Indexque ad horam XII cyclo horarii collocetur.

Tunc moveatur globus & quadrans, donec notatus locus Solis cum notato quadrantis puncto conveniat. In eo situ Index monstrabit horam quæsitam.

## PROPOSITIO IV.

*Datâ plagâ in qua Sol conspicitur aliquo tempore sui data, & datâ latitudine loci, invenire horam diei.*

Fiant omnia, ut in præced. Proposit. ut quadrans vertici applicatus sit. Ejus extremitas adducatur ad eam plagam Horizontis, quæ observata fuit. Et volvatur globus, donec notatus locus Solis ad quadrantem perveniat. In hoc situ Index monstrabit in cyclo horam diei. Plagam autem Solis navæ observant in pyxide sua.

## PROPOSITIO V.

*Lucente Sole, beneficio globi cognoscere horam loci dati, sive cujus latitudo data est.*

Elevetur polus pro data loci latitudine, & constituantur globus ad quatuor mundi cardines. Deinde acicula infigatur loco Solis in Ecliptica perpendiculariter, vel, quod melius, Gnomon sphericus applicetur Eclipticæ, ita ut apex gnomonis loco Solis incumbat, atque ita ad meridianum adducatur, & Index ad horam XII. Volvatur globus, donec acicula nullam umbram faciat in globo. In hoc situ Index monstrabit horam quæsitam.

## PROPOSITIO VI.

*Datâ horâ nostræ numerationis invenire quota sit hora ab ortu Solis, hoc est, horam Babylonicam sive Norimbergensem.*

Olim Babylonii, hodie Norimbergenses, & quidam



dam alii populi numerant horas viginti quatuor ab uno ortu Solis ad sequentis diei ortum.

Elevetur polus pro dati loci latitudine, & locus Solis ex dato die inventus adducatur ad meridianum, Index ad horam XII cycli horarii. Volvatur globus, donec Index monstreret datam horam. Tunc globo immoto manente Index reducatur ad XII. Quo facto volvatur globus ab occasu versus ortum donec locus Solis in Orientali Horizonte appareat: Et in cyclo horario numerentur horæ à XII versus ortum usque ad Indicem. Hæ enim sunt horæ quasitæ sive Babylonice vel Norimbergenfes.

#### PROPOSITIO VII.

*Contra, Data hora ab ortu sive Babylonica, invenire horam nostræ numerationis, quæ à media nocte vel meridie fit.*

Elevetur polus pro dati loci latitudine, locus Solis in Ecliptica notetur & ad Orientalem Horizontem adducatur, Index ad horam XII. Volvatur globus versus occasum, donec Index monstreret in cyclo datam horam ab Ortum.

Quo facto, Index reducatur ad horam XII, & dein moveatur globus donec locus Solis reductus sit ad meridiani semicirculum; quem proxime transiit, & numerentur horæ à XII ad Indicem in eam plagam, in quam motus globi factus est. Ita horam nostræ numerationis à meridie vel media nocte reperies.

#### PROPOSITIO VIII.

*Data hora nostræ numerationis, invenire quæta hora sit ab occasu Solis procedente, hoc est horam Italianas.*

Hodie in multis Italiae locis, olim in Græcia numerant viginti quatuor horas ab uno occasu Solis ad

ad sequentis diei ortum.

Elevetur polus pro dati loci latitudine, & locus Solis ex dato die inventus adducatur ad meridianum, Index ad horam XII cycli horarii. Volvatur globus, donec Index monstreret datam horam. Tunc globo immoto manente Index reducatur ad XII. Quo facto volvatur globus ab occasu versus ortum donec locus Solis in Orientali Horizonte appareat: Et in cyclo horario numerentur horæ à XII versus ortum usque ad Indicem. Hæ enim sunt horæ quasitæ sive Babylonice vel Norimbergenfes.

Numerantur horæ à XII versus ortum usque ad Indicem. Hæ enim sunt horæ quasitæ sive Babylonice vel Norimbergenfes.

*Data hora ab ortu sive Babylonica, invenire horam nostræ numerationis, quæ à media nocte vel meridie fit.*

Elevetur polus pro dati loci latitudine, locus Solis in Ecliptica notetur & ad Orientalem Horizontem adducatur, Index ad horam XII. Volvatur globus versus occasum, donec Index monstreret in cyclo datam horam ab Ortum. Quo facto, Index reducatur ad horam XII, & dein moveatur globus donec locus Solis reductus sit ad meridiani semicirculum; quem proxime transiit, & numerentur horæ à XII ad Indicem in eam plagam, in quam motus globi factus est. Ita horam nostræ numerationis à meridie vel media nocte reperies.

*Data hora nostræ numerationis, invenire quæta hora sit ab occasu Solis procedente, hoc est horam Italianas.*

Hodie in multis Italiae locis, olim in Græcia numerant viginti quatuor horas ab uno occasu Solis ad

ad sequentem sive vicinum, ad quas inveniendas ex horis nostræ numerationis ita agimus.

Elevetur polus pro dati loci latitudine : locus Solis in Ecliptica notetur, & ad meridianum adducatur, Index ad horas XII meridiana cycli collocetur. Volvatur globus, donec Index monstrat horam datam. Tunc immoto globo reducatur Index ad horam XII, & hoc facto volvatur globus versus ortum, donec locus Solis in Occidentali Horizonte conspiciatur.

Numerentur deinde horæ à XII usque ad Indicem, juxta plagam motus. Hæ enim erunt horæ Italice numerationis.

### PROPOSITIO IX.

*Data hora ab occasu Solis sive Italica numerationis, invenire quæta ea sit hora nostra numerationis à meridie vel media nocte.*

Elevetur polus pro dati loci latitudine, Solis locus in Ecliptica notetur atque ad meridianum adducatur, Index ad horam XII collocetur. Volvatur globus versus occasum, donec Index monstrat datam horam Italicam. Tunc immoto globo reducatur Index ad XII. Hoc facto, locus Solis revolvatur ad eum meridiani semicirculum, quem proxime transiit. Sic horæ inter XII & indicem interceptæ (numerando à XII versus ortum) sunt horæ à meridie vel media nocte juxta nostram numerationem.

### PROPOSITIO X.

*Data hora nostra numerationis in dato die invenire quæta sit ea hora juxta antiquam Judæorum aliarumque gentium numerationem.*

Vetustis temporibus Judæi (ut patet ex sermone Christi de patrefamilias, qui operarios ad vineam colendam conducebat), atque aliæ gentes,

nondum exulta Astronomia, singulos dies ab ortu Solis ad occasum diviserunt in duodecim horas, & noctem in totidem, quæ horæ ideo dicuntur Judaicæ, planetariæ (ob aliam causam), sed rectius horæ inæquales. Etenim cum neque noctes neque dies inter se æquales sint, sive æqualis longitudinis, sed semisse anni accrescant, altera decrescant (exceptis locis Æquatoris) inde fit, ut horæ illæ modo majores modo minores sint, nimirum accrescunt cum accrescente dierum longitudine, decrescunt hac decrescente. Verum in locis Æquatori vicinis non magnum est hoc incrementum, ut capite xxv ostendimus, sed dies omnestotius anni fere æquales, atque inde factum est ut populi ab Æquatore remotiores, ut Europæi, nunquam usi sint hisce horis, sed tantum illi, qui non admodum longe à Torrida Zona removentur vel in ipsa Torrida habitant.

Problema itaque clarius ita proponetur: *Data hora æquali in dato die, invenire horam inaequalem.* Hora æqualis dicitur duodecima pars cujuscvis diei vel noctis: sive temporis quo Sol supra Horizontem vel infra eum commoratur.

Hora inæqualis dicitur vigesimaquarta pars temporis, quo Sol à meridiani semicirculo movetur donec ad eundem semicirculum redeat, quod tempus dicitur dies Astronomicus.

Ad Problematris itaque solutionem ita agimus:

Elevetur polus pro dati loci latitudine: locus Solis in Ecliptica notetur atque ad Orientem adducatur, Index ad horam xii cycli. Volvatur globus donec locus Solis notatus ad Occidentem perveniat. Index monstrabit horas pro longitudine istius diei sive mora Solis supra Horizontem, quæ annotentur. Deinde inveniatur quota sit data hora ab ortu (vel occasu, si hora aliqua post Solis

Solis oc  
Et insti  
annotat  
duodec  
Occasi  
rum Ju

Data  
sa hora  
ram in a

Elev  
lis in E  
Orient  
ad Occ  
istius in  
Deinde  
ad hora  
lem Ho

Dein  
rum, it  
merun  
mus ho  
tionem  
denari  
strabit

Qua  
Judaic  
numera  
tur: ita  
etiam  
ejus se  
iam es  
solstiti  
noctia  
sit me  
cium a

solis occasum data sit) juxta Propof. VI vel VIII.  
 Et instituatür proportio hunc in modum: Ut horæ  
 annotatæ longitudinis totius diei (vel noctis) ad  
 duodecim horas ita horæ ab Ortū inventæ (vel ab  
 Occafu, si noctis hora data fit) ad numerum hora-  
 rum Judaicarum.

## PROPOSITIO XI.

*Datâ horâ Judaica, in dato die invenire quata ea  
 fit hora juxta nostram numerationem. Sive, Datam ho-  
 ram inaequalem reducere ad horam aequalem.*

Elevetur polus pro dati loci latitudine, locus So-  
 lis in Ecliptica ex dato die inventus adducatur ad  
 Orientem, Index ad horam XII: & volvatur globus  
 ad Occidentem, ut in cyclo horario longitudo diei  
 illius in horis æqualibus innotescat, quæ notetur.  
 Deinde locus Solis adducatur ad meridianum, Index  
 ad horam XII, & volvatur locus Solis ad Orienta-  
 lem Horizontem, Index monstrabit horam ortus.

Deinde fiat, ut 12 ad datæ horæ Judaicæ nume-  
 rum, ita inventa longitudo totius diei ad alium nu-  
 merum, qui si addatur ad horam ortus, habebi-  
 mus horam à media nocte juxta nostram numera-  
 tionem: si numerus harum horarum fit major duo-  
 densario, rejiciantur 12 & residuus numerus mon-  
 strabit horam à meridie.

Quæ in sermone Christi commemorantur horæ  
 Judaicæ, eæ non possunt accurate reduci ad nostræ  
 numerationis horas, quoniam dies anni non addi-  
 tur: itaque hora illius tertia potest esse nona nostra,  
 etiam decima, etiam octava. Ita undecima hora  
 ejus sermonis potest esse nostra septima, potest et-  
 iam esse sexta, vel quinta, nimirum prout vel circa  
 solstitium æstivum vel hybernium vel circa æqui-  
 noctia dies ille sumatur. Quia autem de æstu diei  
 fit mentio, verisimile est diem intelligi circa solsti-  
 tium æstivum.



## PROPOSITIO XII.

Qui à loco aliquo Telluris progrediuntur vel navigant versus Ortum, totoque Telluris ambitu emenso redeunt ad locum, unde abierunt, illi interea temporis una vice sapius Solem Orientem, Occidentem, Meridiem, mediamque noctem habuerunt, quam incolæ loci, à quo profecti sunt, & ideo quando redeunt, numerant unum diem anni amplius, quam in isto loco, ita ut si in loco hoc sit dies 1 Januarii, illi numerent diem secundum Januarii; si illi diem Saturni, hi diem Solis, &c. Et si bis, ter, quaterve Tellurem circumnavigaverint, totidem quoque dies amplius numerabunt.

Qui vero instituto cursu versus Occidentem circumnavigant totam Tellurem, illi interea temporis una vice rarius Solem occidentem, orientem, meridiem, mediam noctem habuerunt, ideoque quando redeunt, numerant unum diem minus quam in loco isto, nempe 31 Decembris, si in loco fuerit 1 Januarii, & diem Saturni vel ultimam feriam hebdomadis agitent, si in loco hoc fuerit dies Solis vel feria prima novæ hebdomadis. Et si bis, ter, quaterve Tellurem circumnavigaverint, totidem quoque dies minus numerabunt.

Magnæ admirationis hæc res olim fuit ante aliquot secula nautis atque aliis, cum in Occidentem instituto cursu ubi in Orientales insulas pervenissent, ad alios Europæos die uno numerationes Calendariorum discrepare cernerent, adeoque alter alterum vel negligentia vel somnolentia infimularent. Sed frequentia hujus experientia minuit deinde admirationem atque causæ cognoscendæ occasionem Mathematicis suppeditavit.

Neque difficilem habet explicationem, modo Solis motus & meridiani locorum Telluris bene  
conci-

conci-  
Depen  
(non  
runt)  
ad faci  
ridie e  
pus ad  
diani a  
redit.

Qu  
perven  
diem a  
Sole in  
exister  
gt. 2 J  
rem d  
solver  
rx. H  
ortur  
ciat,  
lum p  
dies ag  
huc no  
nerint  
tiores  
bebur  
ubi it  
merid  
prios.  
tionis  
loca  
horis  
agent  
piens,  
ad ips  
horis  
in loc

concipiatur, atque certum diei initium ponatur. Dependet enim à circumvolutione diurna Solis, (non à motu ejus proprio, ut quidam existimant) quam incipere possumus à quovis circulo, sed ad faciliorem intelligentiam commodius est à meridie eam incipere, ut dies sit ab uno meridie tempus ad sequentem meridiem, sive dum Sol à meridiano alicujus semicirculo ad eundem semicirculum redit.

Quoniam itaque qui versus ortum navigant, perveniunt ad loca, ubi Sol prius oritur & meridiem agit, quam in loco unde abeunt, inde fit, ut Sole in meridiano ejus loci ad quem pervenerunt, existente, incipiant novum diem numerare, ex. gr. 2 Januarii ubi in loco profectionis adhuc priorem diem numerant, nempe 1 Januarii (si in hoc solverint) eritque differentia unius vel alterius horæ. Hæc anticipatio quotidie accrescit, dum versus ortum proficiscuntur, ita ut dimidiæ diei horas faciat, quando ad oppositum meridiani semicirculum pervenerunt. Hic enim illi meridiem novæ diei agent, quando in loco profectionis media adhuc nox præcedentis diei erit. Ubi deinde pervenerint ad Meridianum quindecim gradibus remotiorem, in illo constituti tredecim horis prius habebunt meridiem, quam in loco profectionis: Et ubi iterum ad quindecim gradibus remotiorem meridianum pervenerint, ibi quatuordecim horis prius habebunt meridiem, quam in loco profectionis, atque ita porro prout ad meridianos vel loca quindenis gradibus remotiora perveniunt, horis quindecim, sedecim, septendecim, &c. prius agent meridiem, & novum diem numerare incipient, quam in loco profectionis, ita ut tandem ubi ad ipsum locum redierint, tunc viginti quatuor horis prius meridiem novæ diei numerabunt, ubi in loco quidem etiam meridies est, sed quæ adhuc

respondeat in numero illi meridiei, quam nauta priori die egerunt.

Contrario modo se res habet cum illis qui versus occasum instituto cursu Tellurem circumnavigantes redeunt ad locum profectiois. Quo enim magis recedunt à loco hoc, eo serius Solem in meridie habebunt, quia sunt in remotiori meridiano, atque ideo serius incipient novæ diei numerationem quam in loco, unde profecti sunt. Ita ut tandem hæc postpositio, ut ita dicam, sive tardior appulsus in reditu integrum diem auferat.

*Corollarium I.* Si duo ad idem tempus ex aliquo loco Telluris proficiscantur, unus versus ortum, alter versus occasum, atque tota tellure circumnavigatâ redierint simul ad locum illum, ille qui versus ortum instituit iter, duos dies amplius numerabit, quam ille, qui versus occasum profectus est: & si bis Tellurem circumnavigaverint, quatuor dies amplius numerabit, si ter, sex dies, si quater, octo dies, & ita porro: Et tamen unum & idem est amborum tempus. Sed horum dies sunt longiores, illorum breviores.

*Coroll. II.* Idem eveniet si in quocunque loco Telluris obviam sibi mutuo fiant. Atque ex hoc primum & deinde sæpius deprehensa est hæc apparentia. Etenim cum Ferdinandus Magellanes directo in Occidentem cursu, inventoque freto penetrasset in Indiam, deprehensum est à nautis, qui ibi congregiebantur cum aliis Europæis ordinario itinere versus ortum istuc delatis, quod Calendaria sive numeratio dierum, integro die discreparet. Idem deinde ab omnibus, qui Tellurem circumnavigarunt ubi in Indiam pervenerant, observatum fuit.

*Coroll. III.* Hæc causa quoque est, quod in duobus locis vicinis diversæ diei numeratio observetur, nempe in Insulis Philippinis & Macao urbe

urbe m  
lippina  
Etenim  
in Mac  
in Phi  
diei, it  
nis est  
Pascha  
in Phi  
carne,  
sa huj  
urbe ap  
cursu,  
autem  
occafus  
perven  
fertur,  
grediun  
niunt,  
flectio

De Di  
qu

G  
luc  
in ipsa  
pareat  
moment  
bus om  
quoque  
ram loc  
Loc

urbe maritima Chinæ, quam Lusitani tenent: Philippinas autem Hispani Castilienses, ut loquuntur. Etenim etsi sub eodem Meridiano jaceant, tamen in Macao numerant dies Calendarii prius quam in Philippinis, & quidem anticipatione unius diei, ita ut in Macao sit dies Solis, ubi in Philippinis est dies Saturni, atque dum in illo loco agunt Pascha, & carne licite atque avide vescuntur, tum in Philippinis est dies Cinerum & abstinencia à carne, Pascha autem sequenti die celebratur. Causa hujus diversitatis est, quod Lusitani in Macao urbe agentes ex Europa versus ortum instituto cursu, nempe ex India, istuc pervenerunt. Hispani autem in Philippinis agentes, ex Europa versus occasum instituto itinere, nempe ex America, istuc pervenerunt. Itaque ex præcedenti Corollario inferitur, quoniam hic in Macao & Philippinis congregiuntur fere vel in eundem Meridianum perveniunt, quod illi uno die debeant superare dies posteriorum.

## CAPUT XXX.

*De Diverso ortu, occasu, altitudine Solis atque aliis apparentiis in diversis Telluris partibus.*

## PROPOSITIO I.

**G**lobum terrestrem ita suspendere vel constituere, ut lucente Sole partes ea globi illuminentur, quas Sol in ipsa Tellure quovis tempore illuminat, & simul appareat, quibus populus Sol oriatur ad singula temporis momenta, quibus occidat, quibus meridiem agat, quibus omnino occultatus sit: cui loco verticalis sit: ipsum quoque locum Solis in Ecliptica & diem anni: item horam loci.

Locus, in quo globus ita collocandus est, notetur



tetur in ipso globo & ad meridianum adducatur, fiatque in puncto meridiani imminente signum eretâ. Si itaque globus è fune suspendendus est, alligandus est funis huic meridiani puncto, si autem in loco aliquo firmiter collocari debet, trajiciendus erit stylus ferreus ex hoc loco per centrum globi usque ad oppositum punctum, atque hic ferreus stylus Horizontali plano arcte insigendus, ut immobilis sit.

Deinde globus juxta quatuor mundi cardines disponendus, nempe ut Septentrio globi Septentrionem Telluris vel Cæli respiciat, quod inventâ lineâ meridianâ vel per pyxidem nauticam vel acum magneticam facile est. Globo ita constituto, ad singula momenta diei, Sole lucente, licebit in illo globo contemplari partem Telluris illuminatam, partem non illuminatam. Illa vero loca, quæ in medio semicirculo partis illuminatæ jacent, sunt illa, quæ meridiem habebunt ad illud temporis momentum. Illis, quæ in semicirculo Orientali, discernente partem illuminatam à non illuminata, sita sunt, Sol occidit: illis autem quæ in semicirculo Occidentali, discernente partem illuminatam à non illuminata, jacent, Sol oritur.

Ad locum Solis in Ecliptica inveniendum, circa medium partis illuminatæ acicula vel gnomon sphericus hinc inde perpendiculariter moveatur, donec nullam umbram faciat, punctumque in globo notetur. Hoc enim ad meridianum adductum indicabit hic declinationem puncti Eclipticæ, in quo Sol est tempore observationis, unde pro conditione temporis, Verni nempe vel Æstatis, Autumni vel Hyemis, ipse locus Solis cognoscetur, & inde anni dies.

Ipse quoque locus in globo, cui acicula infixâ nullam dedit umbram, est is, cui Sol verticalis est ad illud momentum temporis, & parallelus per-  
hunc

hunc I

Sol fiet

Porro

bus ita

cus,

dex ad

bus, C

est, ac

horam

Sed

test qu

no affi

lo fueri

Hic eni

strabit

ipse So

in Æqu

tur gra

dus in l

cim gra

nostri l

ridianu

si inter

auferen

horas à

Si gl

lem dis

usque a

sunt pe

perpen

neque g

tori obr

Globi  
tione di  
populis

hunc locum transiens exhibet omnia loca, quibus Sol fiet verticalis ad illum diem.

Porro ad inveniendam horam loci, in quo globus ita collocatus est vel suspensus, adducatur is locus, cui Sol verticalis est, ad Meridianum, Index ad horam XI 1 cycli horarii, & volvatur globus, donec locus noster, sive, in quo globus situs est, ad meridianum perveniat. Index monstrabit horam.

Sed quoniam globi circumvolutio fieri non potest, quando is per stylum ferreum Horizontali plano affixus est, ideo commodum erit, si quadrans polo fuerit alligatus vel pars circulo peripheriæ  $113\frac{1}{2}$ . Hic enim arcus ad aciculæ locum adductus monstrabit declinationem Solis ab Æquatore, unde ipse Solis locus & dies anni invenietur. Idem arcus in Æquatore gradum ostendet, à quo si numerentur gradus usque ad æneum meridianum, & hi gradus in horas & horarum partes mutantur (quindecim gradus unam horam faciunt) habebitur hora nostri loci, siquidem Sol inter Occidentem & meridianum æneum, hoc est nostri loci consistat; sed si inter Orientem & meridianum, horæ inventæ auferendæ erunt à XI 1, residuus numerus indicabit horas à media nocte.

Si globi polo adjunctus sit talis arcus æneus, qualem dixi,  $113$  gr.  $30$  min. poterit is ab extremitate usque ad  $47$  gr. hoc est ad Solis ab Æquatore recessum perforari atque trusatilis lamina ei inferi, quæ perpendicularem stylum gerat. Sic neque aciculâ neque gnomone sphaerico opus erit, minusque errori obnoxia operatio.

#### PROPOSITIO II.

*Globus terrestris ita collocatus, ut in priori propositione diximus, ostendit quoque Lunâ lucente, quibus populis ad momentum quodvis temporis, quo supra nostrum*

nostrum Horizontem commoratur, conspicua, quibus erit, quibus occidat, quibus verticalis sit.

Hæc omnia manifesta sunt ex præcedenti propositione.

### PROPOSITIO III.

*Quo loca Telluris à parallelo Solis ad aliquam diem sunt remotiora, eo minorem ad altitudinem eisdem horis Sol elevatur supra illorum Horizontem.*

Assumantur in globo loca ejusdem meridiani: hæc enim omnes horas easdem & simul numerant. Deinde describatur parallelus Solis pro quovis assumpto die. Et manifestum erit, quod quodvis hujus paralleli punctum à locis remotioribus (à parallelo) meridiani longius distet, quam à locis prioribus.

Sol itaque existens supra paralleli istius puncta longius distabit à vertice locorum remotiorum meridiani, quam à vertice vicinorum, atque ideo minus erit elevatus supra illorum locorum quam horum Horizontem.

### PROPOSITIO IV.

*Quo loca Telluris ab Æquatore sunt remotiora vel polo magis vicina, eo magis distant partes Horizontis, in quibus Sol die solstitii & die brumæ oritur, ut etiam illæ, in quibus occidit. Idem de Luna atque omnibus planetis verum est.*

Assumantur loca quotvis diversæ distantia ab Æquatore, & polus elevetur pro singulorum latitudine, notenturque in Horizonte puncta, in quibus Tropicus Cancræ & Capricorni illum secant. Instituta comparatione perspicua erit veritas Propositionis. Eodem modo ostenditur hoc: Quo loca ab Æquatore sunt remotiora, eo magis ab ortu æquinoctiali Sol distat in Oriente singulis  
anni

anni di  
nem or

Stel  
Æquat  
supra H  
alterum  
orum in  
rum.

Potest  
cujus ste  
& assum  
la, para  
loco ver  
stellæ su  
festa fier

Locis  
ræte asc  
nem atq  
æquatorem  
quidem eo  
mior.

Descri  
quales in  
pe ipse  
corni, &  
tuantur i  
rum Æq  
tallelorum  
ad Meric  
rum quo  
cum erit  
Horizont  
quo ligne

anni diebus. Vocant autem Astronomi amplitudinem ortivam.

## PROPOSITIO V.

*Stella sita inter parallelum alicujus loci (extra Aequatorem jacentis) & polum, minus elevatur supra Horizontem locorum inter parallelum hunc & alterum polum sitorum, quam supra Horizontem locorum inter parallelum hunc & polum vicinum sitorum.*

Potest in globo terrestri designari parallelus alicujus stellæ, vel tantum punctum notari pro stellâ, & assumpto aliquo loco remotiori à polo, quam stellâ, parallelus loci designari. Deinde assumpto alio loco versus alterum polum sito, inveniatur mora stellæ supra utriusque loci Horizontem. Et manifesta fiet veritas Propositionis.

## PROPOSITIO VI.

*Locis in Aequatore sitis atque vicinis, Sol & stella recte ascendunt supra Horizontem usque ad Meridianum atque iterum descendunt: sed locis extra Aequatorem sitis oblique ascendunt & descendunt, & quidem eo magis oblique, quo locus ab Aequatore remotior.*

Describatur in globo aliquis parallelus Solis, quales in globo quidam jam delineati sunt, nempe ipse Aequator, Tropicus Cancrî atque Capricorni, & quidam intermedii. Deinde poli constituentur in ipso Horizonte, ut Horizon sit locorum Aequatoris, & conspicuum erit, quod parallelorum puncta recte ascendant ab Horizonte ad Meridianum. Deinde elevetur polus pro aliorum quorumvis locorum latitudine, & conspicuum erit, quod eo magis obliqui sint paralleli ad Horizontem, quo polus magis elevatur, hoc est quo ligneus Horizon sit Horizon locorum magis ab



ab Æquatore remotorum vel polo vicinorum.

PROPOSITIO VII.

*Quo locus ab Æquatore est remotior, eo majus tempus signa Zodiaci & reliqua constellationes requirunt ad ortum suum, ut etiam ad occasum. Meridianos autem omnium locorum equali tempore transeunt.*

Sumantur in globo duo loca inæqualiter ab Æquatore distantia, atque pro singulis seorsim elevetur polus, atque observetur, quantum temporis signum aliquod Zodiaci requirat ad emersionem supra Horizontem, nimirum adducto initio signi ad Orientalem Horizontem, Index collocetur ad horam XII, & volvatur globus, donec integrum signum ortum sit. Index monstrabit horas elapsas interea dum signum ortum fuit. Ex comparatione temporis perspicua erit veritas propositionis.

PROPOSITIO VIII.

*Dato die anni invenire vel exhibere in globo ea loca, quibus Sol ortur in plaga aliqua data.*

De ipsa Tellure proponi & solvi debebat Problema hoc & sequentia, si scientificè ageremus. Ejus enim sunt affectiones. Sed de globo proponuntur, quia hic Tellurem repræsentat: etsi aliâ methodo in ipsa Tellure utendum esset, vel aliâ constructione, quæ mente tantum etsi comprehendi possit, sufficit, utut in praxi propter obstacula impediat.

Idem hoc est cum eo Problemate: Dato die & plagâ, in qua Solis ortus observatus fuit, invenire latitudinem loci illius, sive parallelum, in cujus aliquo puncto nos constitutos esse certum sit. Cujus solutionem tradidimus capite XXI I. Propos. XI.

## PROPOSITIO IX.

*Dato die & hora vel hora parte exhibere in globo eum locum, cui Sol verticalis tunc est.*

Primo locus Solis ex dato die inventus notetur in globo Ecliptica, atque eo ad meridianum adducto fiat signum cretâ in superimminente puncto.

Deinde, inveniantur ea loca, in quorum meridiano Sol existit ad datum temporis momentum, atque ea ad æneum meridianum adducantur.

Hiscæ factis locus ille, qui notato meridiani puncto subjacet, est quaesitus, nimirum cui Sol verticalis est ad datum temporis momentum.

## PROPOSITIO X.

*Dato die & hora exhibere in globo omnia loca, à quorum vertice ad illam horam Sol distet gradibus datis. Oportet autem datos gradus non esse plures quam centum & octuaginta.*

Vel: Dato die & hora exhibere in globo ea loca, supra quorum Horizontem Sol habeat datam altitudinem vel infra eum datam depressionem. Oportet autem altitudinem datam vel depressionem non esse majorem nonaginta gradibus.

Inveniarur in globo locus, cui Sol ad datam horam verticalis est, atque hic ad meridianum adducatur, & quadrans affigatur puncto imminenti meridiani. Notetur in quadrante gradus distantiz à vertice datus. Et circumducto quadrante, globo autem immoto manente, omnia loca Telluris, per quæ transit notatus quadrantis gradus sunt ea, à quorum vertice Sol datam distantiam vel supra quorum Horizontem datam altitudinem habet.

## PROPOSITIO XI.

*Ad datam data diei horam exhibere in globo omnia loca,*

loca, quibus Sol tunc oriatur, quibus occidat, quibus in meridiano hæreat, & omnia quæ illuminantur, & quæ non illuminantur.

Inveniatur locus in globo, cui Sol ad datum tempus verticalis est: atque is locus ad Meridianum adducatur & polus elevetur pro illius loci latitudine, sive constituatur ille locus in vertice Horizontis. Sic omnia loca illa, quæ sub meridiani semicirculo existente supra Horizontem conspiciuntur, habebunt meridiem: illa vero loca, quæ in Horizontis semicirculo Orientali conspiciuntur, sunt ea quibus Sol tunc occidit: illis autem, quæ in Occidentali Horizontis semicirculo jacent, oritur Sol ad datum tempus. Atque omnia loca supra Horizontem existentia illuminantur à Sole: contra, omnia infra eum sita, carent tunc Solis præsentia.

NOTA. Problema intelligendum est de ipso centri Solaris corporis ortu atque occasu. Nam corpus ipsum solare illustrat partem Telluris aliquanto majorem hemisphærio, quæ quanta sit, sequenti Propositione investigabimus.

*Corollarium.* Licet itaque exhibere loca, quibus Sol oritur, vel occidit, cum nobis est meridies vel media nox. Et contra, illa quibus occidat, cum nobis oritur, quibus tunc media nox, & quibus meridies. In hisce adolescentes se ipsos exercant.

### PROPOSITIO XII.

*Datà semidiametro Solis, Telluris, atque distantia Solis à Tellure cognitâ, investigare partem Telluris, quam Sol illuminat.*

Sit Telluris semidiameter AB, AC. A centrum. ABCDE circulus Telluris maximus: S centrum Solis, SL, SO, semidiameter Solis, Radii tangentés globum Solis & Telluris sint LB, OC.

O C. B  
notâ di  
partem  
B E C  
O C, p  
paralle  
N L, e  
stantia  
tangit  
nietur  
Ut B N  
li N B  
equant  
angulo  
Itaque  
quo P B  
quoque  
Si sen  
mus  $5\frac{1}{2}$   
to A S  
positis,  
Sol illu  
M P Q.  
*Coroll.*  
aliquib  
qui hab  
natis in  
quibus  
lumbus  
occidat  
à nostro

Data  
vertice ej  
cem mont  
Ex da

O C. Hi enim partem illuminatam à non illuminatâ distinguunt: itaque arcus BDC repræsentat partem superficiæ Telluris illuminatam, & arcus BEC partem non illuminatam. Tangentes LB, OC, producantur, donec concurrant in R: & BN parallela AS. In Triangulo itaque BNL dantur NL, excessus SL supra AB, & BN æqualis distantia AS: angulus BLN est rectus, quia BL tangit circulum. Quare in Triangulo BLN invenietur angulus NBL, juxta proportionem hanc: Ut BN ad NL, ita sinus totus ad Tangentem anguli NBL. Porro duo anguli LNB, NBL, simul æquantur uni recto sive 90 gr. & BNL est æqualis angulo ASL, sive BAR.

Itaque arcus anguli NBL est æqualis arcui BM, quo PB major est quam 90 gr. sive quam PM. Ita quoque arcus PC.

Si semidiametrum Solis Ptolemaicam assumamus  $5\frac{1}{2}$  semidiametrorum Telluris: distantiam vero AS 1168 Semidiametrorum hisce, inquam, positis, invenietur arcus MB 13 minutorum, quot Sol illustrat de ambitu Telluris ultra semissimam MPQ.

*Corollarium.* Quando itaque Solis centrum oritur aliquibus locis, tunc limbus ejus oritur populis, qui habitant in parallelo Horizontis tredecim minutis infra Horizontem sito. Eodem modo illis, quibus occidit. Et quando centrum occidit, tunc limbus adhuc manet conspicuus, donec centrum occidat populis, qui tredecim minutis remoti sunt à nostro Horizonte.

PROPOSITIO XIII.

*Data montis altitudine, investigare, quanto citius in vertice ejus Sol videatur oriri, quam ad pedem vel radicem montis, & quanto tardius occidere.*

Ex data altitudine inveniatur per Proposit. v. cap.



cap. IX. intervallum vel arcus ex quo vertex montis conspici potest, sive in cuius termino linea à vertice montis ita ducta, ut tangens sit Telluris, eam stringit: Hæc enim linea indicat radium primum, qui à Sole ad verticem montis pervenire potest directo itinere.

Porro punctum illud Telluris, in quo à linea hæc tangitur, est is locus, cui Sol oritur, quando in vertice montis conspici incipit. Et arcus inter illud punctum & radicem montis interceptus est æqualis illi, quo Sol deprimitur adhuc infra Horizontem radicis montis, quando in vertice conspicius fit.

Problema itaque huc reductum est: Data depressione Solis infra Horizontem invenire tempus, quod consumitur dum Sol ab illa depressione ad Horizontem movetur. Ex quo simul manifestum est, diversis anni diebus tempus hoc esse diversum. Notetur itaque in globo locus radicis montis, & polus elevetur pro ejus latitudine; quadrans affigatur vertici. Locus Solis ex assumpto aliquo die inventus in Ecliptica notetur, punctum quoque Eclipticæ oppositum loco Solis. Deinde hoc oppositum punctum adducatur ad Occidentalem Horizontem, & Index ad horam XI collocetur. His factis in quadrante notetur gradus depressionis antea inventus, & volvatur punctum oppositum supra Horizontem donec habeat altitudinem æqualem arcui depressionis (quod ex applicatione Quadrantis cognoscetur). Ita locus Solis infra Orientalem Horizontem habebit depressionem eam. Et index in cyclo horario ostendet tempus interceptum inter hanc depressionem ejus & emerisionem supra Horizontem.

Sed quia in hoc negotio fere minutis tantum agitur, ideo præstat calculo, quam globi adminiculo hæc investigare. Invenietur autem, si altitu-

do montis  
ris Germ  
circiter g  
38 gr. lo  
tempus  
quam ad  
minutor  
esse, quo  
refert, &  
rum illa  
occasum  
radiis sol  
tur ad ho  
venite.

Dato  
spicitur,  
titudinem  
Elevetur  
montis,  
ptica opp  
infra Ho  
arcu hoc,  
tis videtur  
probl. IV

Dato  
ejus, in  
quibus L  
ione.

Locus  
Ecliptica  
mitas app  
Ecliptica  
ia quadr

do montis ponatur trium stadiorum sive  $\frac{3}{4}$  milliaris Germanici, quod arcus depressionis sit trium circiter graduum, & si latitudo radices montis sit 38 gr. locus autem Solis in medio circiter Leone tempus, quo in vertice prius Sol conspicietur, quam ad radicem montis, esse tantum tredecim minorum horæ. Unde patet, minus verisimile esse, quod Aristoteles de summis Caucaſi partibus refert, & Plinius de Casii montis fastigiis, nimirum illa mane ante ortum Solis & vesperi post occasum ad tertiam usque noctis partem illustrari radiis solaribus. Quanta autem altitudo requiratur ad hoc, docebimus sequenti Propositione invenire.

**PROPOSITIO XIV.**

*Dato tempore, quo in vertice montis Sol prius conspiciatur, quam ad montis radicem, invenire montis altitudinem.*

Elevetur in globo polus pro latitudine radices montis, & notato puncto quod loco Solis in Ecliptica opponitur, inveniatur arcus depressionis Solis infra Horizontem pro dato tempore. Deinde ex arcu hoc, tanquam intervallo, ex quo vertex montis videtur, investiganda est montis altitudo per probl. IV capit. IX.

**PROPOSITIO XV.**

*Dato loco Lunæ in Zodiaco, unâ cum latitudine ejus, invenire vel exhibere in globo omnia illa loca, quibus Luna verticalis sit in ejus diei circumrotatione.*

Locus Lunæ ex ephemeridibus excerptus in Ecliptica notetur. Deinde quadrantis una extremitas applicetur polo Eclipticæ, altera puncto in Ecliptica notato sive loco Lunæ, & numerentur in quadrante gradus latitudinis Lunæ, fiatque ad

numerationis terminum in globo signum. Deinde hoc ad meridianum adducto atque cretâ applicatâ describatur parallelus, quem Luna eo die circumvolutione sua describet. Et omnia loca in hoc parallelu sita sunt ea quæ quæruntur.

Eodem modo cum reliquis planetis agimus si datur eorum longitudo & latitudo.

#### PROPOSITIO XVI.

*Dato loco Lunæ in Zodiaco & latitudine, & die anni, invenire horam, qua in loco aliquo dato oriatur, quâ occidet, in qua meridiem aget.*

Elevetur polus pro dati loci Telluris latitudine. Locus Solis ex die anni inventus notetur in Ecliptica. Deinde signetur etiam in globo punctum pro loco Lunæ, ut in Propos. præced. monstravimus. Hisce factis, adducatur locus Solis ad meridianum, Index ad horam XII cycli. Et volvatur globus donec locus Lunæ oriatur, vel in meridiano sit, vel occidat. Index enim in cyclo monstrabit horam ortus, meridiei atque occasus.

Eodem modo agimus cum aliis Planetis, Saturno, Jove, &c.

#### PROPOSITIO XVII.

*Exhibere in globo omnia illa loca, quibus Luna oriatur ad datam horam, & quibus in meridiano sit, & quibus occidat, si Luna longitudo & latitudo nota sit.*

Notetur in Ecliptica locus Solis & locus Lunæ, ut in præcedentibus monuimus: & adducto loco Solis ad meridianum, atque Indice ad horam XII cycli, volvatur globus donec locus Lunæ ad meridianum perveniat, & in cyclo observentur horæ, quæ annotentur, vel in ipso cyclo fiat signum: Indicant enim, quanto tardius Luna ad meridianum quemlibet perveniat quam Sol. Porro loco Lunæ con-

constituit  
imminet  
factis ad  
dex ad h  
niatur l  
hujus lo  
meridian  
Porro loc  
meridian  
globus d  
loca mer  
bus Sol m  
reducatur  
donec In  
horam. I  
diani pun  
tunc est.

Hic ita  
notis, e  
riori subje  
diano est  
notis sen  
na tunc o  
dentali H  
onitur ad d

Eodem  
Saturno,  
nota sit.

Dato die  
fuit, exhib  
piterant, a  
ridiano erit  
occider.

Hoc pro  
multo faci

constituto in meridiano, notetur in hoc punctum imminens: vel describatur parallelus Lunæ. Hisce factis adducatur locus Solis ad meridianum & Index ad horam XII, volvatur globus donec inveniat hora, in qua Luna attinget meridianum hujus loci quemlibet perveniat: Notetur etiam meridiani punctum, quod imminet loco Lunæ. Porro locus is, cujus hora datur, adducatur ad meridianum, Index ad horam datam: Volvatur globus donec Index monstret XII meridiem. Sic loca meridiani semicirculo subjecta sunt illa, quibus Sol meridiem agit ad datam horam: Index reducatur ad XII, atque iterum volvatur globus donec Index perveniat ad notatam antea in cyclo horam. In hoc globi situ, locus qui notato meridiani puncto subjacet, est ille, cui Luna verticalis tunc est.

Hic itaque locus constituatur in vertice Horizontis, omnia loca meridiani semicirculo superiori subjecta sunt illa, quibus Luna tunc in meridiano est: illa vero loca, quæ in Orientali Horizontis semicirculo conspiciuntur, sunt quibus Luna tunc occidit: denique illis locis, quæ in Occidentali Horizontis semicirculo spectantur, Luna oritur ad datum temporis momentum.

Eodem modo agimus cum reliquis Planetis, Saturno, Jove, &c. si eorum longitudo & latitudo nota sit.

#### PROPOSITIO XVII.

*Dato die & hora, qua Eclipsis Luna futura est vel fuit, exhibere in globo omnia loca, qua illam videre poterunt, atque in specie illa, quibus Luna tunc in meridiano erit, quibus eclipsata orietur, quibus eclipsata occidet.*

Hoc problema à precedente parum differt: at multo faciliorem solutionem habet.



Ex dato die inveniatur locus Solis, nisi is jam cogitatus sit, atque in Ecliptica globi notetur punctum illi oppositum. Hoc enim est locus Lunæ.

Inveniatur locus in globo, cui Sol ad datam horam verticalis est: & hujus loci antipodes inveniuntur juxta Propos. VI cap. XXVI II. Hic enim locus erit, cui Luna eclipsata verticalis est. Constituaturn hic in vertice Horizontis polo elevato vel depresso pro illius loci latitudine. Sic loca omnia globi, quæ supra Horizontem sunt, poterunt videre Eclipsin illam: Et quæ sub meridiano æneo jacent, videbunt illam in meridiano: quæ in Orientali Horizontis semicirculo jacent, videbunt eam in occasu sive cum Eclipsi occidentem: quæ vero in Occidentali Horizontis semicirculo jacent, videbunt eam in Ortum, sive Lunam eclipsatam oriri.

Verum cum Eclipsis non in uno horæ momento fiat, sed aliquot horas duret, ideo solet dividi in initium, medium, & finem; & horum momenta annotari: itaque de mediæ Eclipsis tempore potissima consideratio suscipienda est.

Præterea cum Luna sit minor quam Tellus, illustrabit partem minorem quam est hemisphærium, à minoris quoque partis incolis simul videtur, ita ut iis qui in Orientali Horizontis semicirculo jacent, non sit amplius conspicua: illis vero qui in Occidentali, nondum appareat: sed concipiendus est quidam circulus Horizonti parallelus, qui partem illustratam terminet. Quantum autem differat hæc pars ab hemisphærio, sive quanta sit ea superficies Telluris portio, investigabimus sequenti Propositione.

#### PROPOSITIO XIX.

*Data semidiametro Lunæ atque Telluris & distantia earum, invenire quanta portio Telluris à Luna illustratur in plenilunio.*

Ab-

Abso  
Propos  
trum S,  
sentet  
maxim  
Hæ eni  
rem per  
denotab  
à Luna  
videre p  
misphæ  
sive arc  
parallela  
cellus sen  
trum L  
angulus  
Triangu  
N B L H  
totus ad  
quo H  
phærix  
maximo  
minatan  
Lunæ co  
Telluris  
nis: Dist  
nilunio  
N L erit  
64 ad 7  
39 min.  
minutis  
Loco  
Horizon  
oritur 8  
zonte co  
tis, min

Absolvitur Problema hoc eodem modo, quo in Propositione XI usi sumus. Sit enim Telluris centrum S, circulus maximus, qui superficiem repræsentet, OFLH. Lunæ centrum A, circulus maximus CPBQ. Ducantur tangentes LB, OC. Hæ enim sunt ultimi radii; qui à Luna ad Tellurem pervenire possunt, atque ideo arcus OHL denotabit partem superficiæ Telluris eam, quæ à Luna illustratur, & cujus incolæ Lunam simul videre possunt, quæ quanto minor sit quam hemisphærium, id cognoscemus si angulum HSL sive arcum HL invenerimus. Ducatur BN ex B parallela ipsi AS, erit BA æqualis SN, & NL excessus semidiametri Telluris SL supra semidiametrum Lunæ AB, & BN æqualis est distantiæ AS; angulus vero NLB rectus sive 90 gr. Itaque in Triangulo rectangulo NBL inveniemus angulum NBL hac proportione. Ut NB ad NL. ita sinus totus ad sinum anguli LBN, cujus arcus est is, quo HL differt ab arcu 90 sive quadrante peripheriæ Telluris. Et tanto intervallo distat à circulo maximo peripheria partem Telluris à Luna illuminatam terminans. Ponamus semidiametrum Lunæ continere partes 4, qualium semidiameter Telluris continet 15 sive  $\frac{4}{15}$  semidiametri Telluris: Distantia vero maxima Lunæ à Tellure in plenilunio est 64 semidiametrorum Telluris: Itaque NL erit  $\frac{1}{15}$ , eritque instituenda proportio hæc: ut 64 ad  $\frac{1}{15}$  ita 10000000 ad 114583, qui est sinus 39 min. Itaque arcus HL minor est quam 90 gr. minutis 39, ac proinde 89 gr. 21 min.

Loco itaque, cui Luna verticalis est, in vertice Horizontis constituto, populi quibus tunc Luna oritur & occidit, non erunt illi, qui in ipso Horizonte conspiciuntur, sed qui in parallelo Horizontis, minutis triginta novem ab eo distant.

## PROPOSITIO XX.

*Data stella cujusvis declinatione, exhibere in globo terrestri omnia loca, quibus ea stella verticalis sit in circumvolutione diurna.*

Numerentur in æneo meridiano gradus datæ declinationis ab Æquatore, & in termino numerationis fiat signum cretâ, vel applicatâ cretâ, & globo circumrotato designetur parallelus in globo. Omnia loca in hoc parallelo sita, vel notatum meridiani punctum transeuntia sunt illa, quorum verticem stella illa singulis circumvolutionibus diurnis aliquo temporis momento occupabit.

## PROPOSITIO XXI.

*Data stella alicujus ascensione rectâ, & datâ horâ datâ diei, exhibere in globo terrestri omnia loca, in quorum meridiano stella ea existit ad datam horam.*

Numerentur in Æquatore dati gradus ascensionis rectæ stellæ, & fiat signum cretâ. Locus quoque Solis ex dato die inventus adducatur ad meridianum, & notetur gradus Æquatoris in meridiano existens. Arcus Æquatoris inter duo hæc notata puncta interceptus annotetur. Vel, quod idem est, in horas & horarum scrupula mutetur: indicant enim tempus, quod intercedit inter Solis & stellæ illius appulsus ad quemlibet meridianum.

Hisce factis inveniantur loca, in quorum Meridiano Sol existit ad datam horam vel horæ momentum, atque Indice ad XII collocato, volvatur globus donec index monstret horam antea notatam, vel donec annotati gradus Æquatoris transierint meridianum. In hoc situ globi omnia illa loca quæ meridiano subjecta conspiciuntur, sunt illa quæ queruntur, nimirum in quorum meridiano stella illa erit ad datum tempus.

PRO-

Dat.  
dato q  
licum  
ca, su  
è illa,  
illa, in  
rum m  
quibus  
occidet.

Prim  
quorum  
pus, a  
Deinde  
gradus  
quod si  
Hoc er  
tempor  
tis, po  
quæ me  
habebu  
meridi  
inferio  
no meo  
Horizo  
bus ste  
quæ in  
stella e

Exh  
Luna,  
tem occ  
pra Hor  
Nost  
meridi

## PROPOSITIO XXII.

*Data stella declinatione & ascensione rectâ, & dato quovis diei tempore exhibere in globo, 1. illum locum cui stella tunc verticalis est. 2. omnia illa loca, supra quorum Horizontes stella illa tunc erit, & illa, quorum infra Horizontes tunc erit: item illa, in quorum meridiano meridiei erit, & in quorum meridiano mediæ noctis: item omnia illa loca, quibus stella tunc orietur, & omnia illa, quibus tunc occidet.*

Primo, ex ascensione rectâ inveniantur loca, in quorum meridiano stella existit ad datum tempus, atque ea meridiano æneo subjecta mancant. Deinde ab Æquatore versus polum numerentur gradus datæ declinationis, atque punctum globi, quod subjicitur termino numerationis, notetur. Hoc enim est locus, cui stella verticalis erit illo tempore. Constituatur illud in vertice Horizontis, polò elevatò pro illius latitudine. Sic illa loca, quæ meridiani semicirculo superiori subjecta sunt, habebunt eam stellam dato tempore in meridiano meridiei: Sed quæ loca in meridiani semicirculo inferiori conspicientur, habebunt eam in meridiano mediæ noctis: Atque illa loca, quæ in Orientali Horizontis semicirculo conspiciuntur, sunt ea quibus stella ad id tempus simul occidit: illis vero, quæ in Occidentali Horizontis semicirculo jacent, stella ea tunc simul orietur.

## PROPOSITIO XXIII.

*Exhibere in globo terrestri omnia loca, quibus Sol, Luna, atque omnes stellæ tanto tempore infra Horizontem occultantur, quanto nobis vel alteri dato loco supra Horizontem commorantur.*

Noster locus vel alius datus locus adducatur ad meridianum, & inveniatur parallelus Antæco-



rum. Omnia loca in hoc parallelo sita sunt ea, quæ quaruntur, ut in globo monstrari potest, si polus elevetur pro dati loci & deprimatur pro hujus paralleli inventi latitudine.

PROPOSITIO XXIV.

*Causam ostendere, cur dies celerius augeantur & minuantur circa æquinoctia, tardius circa solstitia, ubi multu diebus nullum videtur esse incrementum vel decrementum, idque excepto Equatore, in omnibus Telluris locis, eo tamen magis, quo ab Equatore sunt remotiora.*

Ex. gr. Assumamus triginta dies ante æquinoctium vernalium (ab xx Februarii ad xx i Martii), & triginta dies post Solstitium hybernium sive Solstitium Capricorni (à xx i Decembr. ad xx i Januarii); Ostendenda est causa, cur excessus diei xx i Martii (sive mora Solis supra Horizontem) supra longitudinem diei xx Februarii sit multo major, quam excessus diei xx i Januarii supra diem xx i Decembris.

Locus Solis pro singulis illis quatuor diebus notetur in globi Ecliptica, nempe 1 gr. Piscium, Arietis, Capricorni, & Aquarii, atque describantur paralleli Solis, quorum duo jam existunt in globo, nempe Equator ipse & Tropicus Capricorni. Conspicuum itaque erit, quod Equator sive parallelus Solis in 1 gr. Arietis multo longiori intervallo absit à parallelo Solis in 1 gr. Piscium, quam parallelus Solis in 1 gr. Aquarii à parallelo ejusdem in 1 gr. Capricorni existentis. Inde fit, ut non multo major portio paralleli 1 gr. Aquarii existet supra Horizontem, quam paralleli 1 gr. Capricorni sive ipsius Tropici Capricorni, ista autem portiones denotant moram Solis supra Horizontem illis diebus. At multo major portio Equatoris sive paralleli 1 gr. Arietis extat supra

supra E  
Quonia  
tem d  
hæc aut  
gimus  
nationi  
Ecliptic  
dierum  
dies æq  
mentum  
stitione  
parum r  
Major  
menti i  
Equato  
lus elev  
distanti  
parallelo

Locis  
Zona Te  
quam lo  
corni.

Notet  
quis ex.  
loco in  
18 gr. a  
cretâ in  
cum gra  
iterum l  
quod So  
rum Æ  
tidie, q  
dibus.

Volva  
cum ver

supra Horizontem quam paralleli 1 gr. Piscium. Quoniam itaque arcus hi extantes supra Horizontem denotant moram Solis supra Horizontem, hæc autem est ipsa dierum longitudo, inde colligimus magnum vel parvum incrementum declinationis Solis ab Æquatore (sive punctorum Eclipticæ) esse causam istius inæqualis incrementi dierum. Verum in locis ipsius Æquatoris omnes dies æquales sunt, adeoque nullum hic est incrementum vel decrementum: etsi sol circa dies Solstitiorum stare, hoc est altitudinem meridianam parum mutare videatur.

Majorem autem reperiri inæqualitatem decrementi istius & incrementi dierum, quo loca ab Æquatore sunt remotiora, manifestum fiet, si solus elevetur pro diversorum locorum ab Æquatore distantia, & in utroque situ considerentur arcus parallelorum elevati supra Horizontem.

PROPOSITIO XXV.

*Locis Zona Torrida in ipso Æquatore sive medio Zona Torrida sitis Sol multo celerius à vertice recedit, quam locis qua vicina sunt Tropico Cancræ vel Capricorni.*

Notetur in meridiano æneo globi gradus aliquis ex. gr. quintus ab Æquatore. Et assumpto alio loco in Zona Torrida, ex. gr. cujus latitudo sit 18 gr. adducatur hic ad meridianum, fiat signum cretæ in hoc, & numerentur ab eo versus Tropicum gradus quinque in meridiano æneo, atque iterum hic fiat signum cretæ. Ostendendum est, quod Sol paucioribus diebus removeatur à locorum Æquatoris vertice gradibus quinque in meridie, quam à vertice alterius loci totidem gradibus.

Volvatur globus donec aliquod Eclipticæ punctum veniat sub notato meridiani puncto Æqua-

tori vicino, & numerentur gradus Eclipticæ inter  
 1 gr. Arietis vel Libræ & inter illud punctum, at-  
 que arcus hic annotetur: Deinde volvatur globus  
 iterum, donec transeat aliquod Eclipticæ pun-  
 ctum per notam in meridiano factam pro loco,  
 atque hoc Eclipticæ punctum notetur: rursus vol-  
 vatur donec per punctum quinque gradibus re-  
 motum & notatum aliud Eclipticæ punctum  
 transeat, quod iterum notetur: atque arcus inter  
 duo postrema Eclipticæ puncta numeretur, qui  
 multo major deprehendetur, quam ille qui prius  
 annotatus fuit, & proinde Sol plures dies in hoc  
 arcu hærebit quam in isto arcu, adeoque tardius à  
 vertice loci secundi recedet, quam à vertice loci in  
 Æquatore assumti.



G E

De



que circ  
 Meridia  
 longitud  
 habità  
 quantat  
 diani, ide  
 bis & M  
 que Æ. q  
 2. L  
 jus loci  
 cus Æ. q  
 ridianun  
 num. H  
 rum Me  
 tum dic  
 tem ipf

G E

GENERALIS  
GEOGRAPHIÆ

LIBER TERTIUS,  
nempe  
COMPARATIVA PARS

*De affectionibus ex comparatione locorum.*

CAPUT XXXI.

*De Longitudine loci.*

DEFINITIONES.

**C**irculus longitudinis loci alicujus in Tellure dicitur circulus transiens per locum illum & ambos Telluris polos. Dicitur etiam Meridianus, quia loci meridianus & circulus longitudinis loci sunt unus idemque circulus, sed ratione distinguuntur, quoniam Meridianus respicit ad motus stellarum, circulus longitudinis ipsam Telluris extensionem, nullâ habitâ cælestium motuum ratione. Verum frequentata magis & commodior est usurpatio Meridiani, ideoque nos etiam hac voce utemur. In Globis & Mappis conspicui sunt, per denarios quosque Æquatoris gradus transeuntes.

2. Longitudo loci dicitur distantia Meridiani ejus loci à certo aliquo Meridiano, sive dicitur arcus Æquatoris aut paralleli interceptus inter Meridianum illius loci & certum aliquem Meridianum. Hic Meridianus, à quo reliquorum locorum Meridiani numerantur, ab occasu versus Ortum dicitur Meridianus primus. Longitudo autem ipsius Telluris dicitur ejus extensio ab Occidente



dente in Orientem concepta secundum lineam *Æ*-  
quatoris. Meridianus primus in Mappis & Globis  
magnitudine & colore præ reliquis insignis est at-  
que in oculos incurrit.

3. *Distantia* unius loci ab altero dicitur linea  
brevissima inter duo illa loca in Telluris superficie  
intercepta.

4. Punctum quodvis in Globo & Mappis locum  
aliquem Telluris vere representare & exhibere dicitur,  
si ad reliqua Mappæ puncta eum habeat situm  
& distantiam, qualem locus Telluris, quem repræ-  
sentare debet, ad alia Telluris loca, quæ à reliquis  
Mappæ punctis representantur.

#### PROPOSITIO I.

*Dimensionis Telluris sive extensionis ab Occidente in  
Orientem vel secundum *Æ*quatorem, Natura nullum  
posuit initium vel terminum, sed omnia loca & singu-  
la possunt assumi pro initio, atque primus Meridianus  
in eis constitui.*

Ad hæc rectius intelligenda, res paulo altius re-  
petenda est, quoniam quidam mysteria nescio  
quæ hic latere existimant. Omnis superficies tam  
plana quam curva duabus dimensionibus vel ex-  
tensionibus (sicut linea unâ & corpus tribus)  
mensuratur & determinatur, ut notum est ex Geo-  
metria & communi vita; quarum extensionum  
una dicitur longitudo superficiæ vel figuræ illius,  
altera dicitur latitudo, atque altera ad alteram per-  
pendicularis concipitur. Neque hæ extensiones  
naturâ suâ differunt, sed eam quam pro longitudi-  
ne assumimus, licet assumere pro latitudine,  
& contra: plerunque tamen si duæ hæ extensiones  
sint inæquales, longissimam assumimus pro longi-  
tudine, brevissimam pro latitudine.

In figuris autem ordinatis, ut Triangulo æqui-  
latero, Quadrato, &c. duæ illæ extensiones omni-

no æqu  
longitu  
perficie  
ne non  
ceptu  
gnitio  
rica sup  
in alii  
tur per  
opposit  
extens  
sione  
riam i  
in omni  
do) a  
donec  
cies cu  
itaque  
tantum  
rior au  
bi, qu  
quippe  
pheria  
sam, r  
polum  
dente i  
Por  
semipe  
sione  
nis ext  
perficie  
dius et  
quatu  
liquis  
liare &  
Tellur  
santa

no æquales sunt, neque ulla differentia est inter longitudinem & latitudinem. Est autem figura superficiei Telluris Sphærica, & latitudo à longitudine non differt revera, sed tantum juxta nostros conceptus qualis nos in ea concipimus distinctioris cognitionis ergo. Dux vero illæ extensiones in Sphærica superficie concipiuntur commodissime ita (ut in aliis curvis superficiebus) si primo in ea assumatur peripheria semicirculi ducta ab uno puncto ad oppositum, atque hæc linea constituatur una extensio superficiei illius, deinde pro altera extensione assumenda erit peripheria priorem peripheriam in medio secans ad angulos rectos (ita enim in omnibus figuris sumuntur longitudo & latitudo) atque hæc circa totam superficiem extendi donec in seipsam redeat, concipitur, ut ita superficiei curva in planum extensa cogitetur. Quoniam itaque primo assumpta peripheria sive extensio est tantum semicirculi, erit illa latitudo globi: posterior autem sive altera extensio erit longitudo globi, quoniam longior est, quam prior extensio, quippe quæ in seipsam redit & integri circuli peripheria est. Alii appellationis aliam afferunt causam, nimirum quod minor pars Telluris à polo ad polum cognita esset antiquis, major vero ab Occidente in Orientem.

Porro in globorum superficiebus licet quamvis semiperipheriam assumere pro latitudinis extensione, atque ejus perpendicularem pro longitudinis extensione, & proinde in Telluris quoque superficie idem facere liceret: verum quia commodius est ad memoriam, si assumantur peripheriæ, quarum termini vel ipsæ etiam peripheriæ præ reliquis peripheriis in superficie ista aliquid peculiare & insignem proprietatem habent, ideo in Telluris superficie pro latitudinis extensione assumpta est merito peripheria aliqua inter polos

Telluris ducta, & quoniam huic peripheriæ nulla alia est perpendicularis, quæ simul per ejus medium transeat, præterquam Æquatoris linea, ideo pro longitudinis Telluris extensione assumendus fuit ipse Æquator.

Sic itaque, ut puto, clare satis explicatum, propter quam causam latitudo Telluris inter polos, pro longitudine ipsa Æquatoris linea fuerit assumpta.

*Hæc latitudo & longitudo Telluris non est confundenda cum latitudine & longitudine locorum, sive punctorum in Tellure, ideo autem eisdem vocabulis exprimentur, quia latitudo locorum sive punctorum sumitur in peripheria latitudinis Telluris ipsius, atque ejus pars est: longitudo vero locorum sive punctorum sumitur in peripheria longitudinis Telluris, nempe in ipso Æquatore atque ejus parallelis.*

Impropria tamen est hæc usurpatio, quia latitudo & longitudo proprie, ut dictum est, figuris & superficiæ tantum conveniunt: punctum vero nec longitudinem nec latitudinem habet. Atque istam homonymiam sive diversam usurpationem vocabulorum Latitudinis & longitudinis adolescenteris observare debent, quia frequenter in lectione Geographorum occurrunt, nimirum *alia est usurpatio & significatio, cum dicimus longitudo & latitudo Hispania, Gallia, &c.* quia tunc in propria significatione sumuntur hæc vocabula: Est enim Hispania figura, sicut etiam Gallia & aliæ provinciæ, ac proinde longitudo tunc denotat Hispaniæ longissimam extensionem, latitudo vero brevissimam, quæ usurpatio convenit cum ea, qua tot Telluris superficiæ latitudinem & longitudinem assignari antea diximus. *Alia vero est significatio, cum dicimus, latitudo loci istius vel longitudo, si per locum intelligamus punctum aliquod vel urbem*

aut inf  
distanti  
distanti  
dicio,  
superficie  
nis ab Æq  
rum cu  
sit, ideo  
quoque  
longitu  
Æquato  
primo.

Porro  
ris, ha  
meratio  
gitudi  
ditur a  
certum  
ubique  
similis  
potest a  
Meridia  
Meridia  
puncto  
paterur

Cur  
distanti  
certo M  
111 dic

Prim  
longitud  
Telluris  
Dixi  
gula Æ

aut insignem locum, quia tunc latitudo denotat distantiam loci ab Æquatore; longitudo vero distantiam à certo meridiano. Et meo quidem iudicio, confusionis vitanda ergo præstaret hac usurpatione vocabulorum latitudinis & longitudinis abstinere, & pro illis adhibere hæc, Distantia ab Æquatore, Distantia à primo Meridiano: verum cum tot jam seculis hæc homonymia recepta sit, ideo vix abolere eam poterimus. Et ideo nos quoque in sequentibus vocabula hæc, latitudo & longitudo loci, usurpabimus pro distantia loci ab Æquatore, distantia Meridiani loci à Meridiano primo.

Porrò latitudo loci, sicut latitudo totius Telluris, habet insignia Telluris puncta pro initio numerationis, nempe polos & Æquatorem: at longitudo Telluris quia circa totam Tellurem extenditur atque in seipsam recurrit, nullum habet certum initium & finem, sed ubique est initium, ubique finis, quoniam peripheria infinitæ lineæ similis est. Quare quodlibet Æquatoris punctum potest assumi pro initio longitudinis Telluris, & Meridianus per illud punctum transiens pro primo Meridiano, à quo Meridiani omnium Telluris punctorum numerentur vel longitudo eorum supputetur.

Cur autem in singulis Telluris punctis duas illas distantias, nempe unam ab Æquatore, alteram à certo Meridiano, inquiramus, illud Propositione III dicemus.

#### PROPOSITIO II.

*Primum Meridianum & initium numerationis pro longitudine locorum constituere & determinare in globo Telluris.*

Diximus in præcedenti Propositione, quod singula Æquatoris puncta possint assumi pro initio  
exten-



extensionis Telluris secundum longitudinem, atque ab ejus meridiano numerari locorum longitudes. Sed quoniam non simul omnia assumi possunt, sed præstat unum figere principium sive eligere certum aliquod punctum (id autem arbitrio hominum relinquitur), ideo Geographi certum in Telluris superficie locum sumserunt per quem ductus Meridianus primus esset, atque in Æquatore, ubi hunc secat, initium numerationis longitudinis locorum indicaret. Verum non eundem omnes locum sumserunt sive eundem pro primo meridiano, sed diversos. Ptolemæus elegit vicinum Fortunatis Insulis, quas uno tantum gradu removeret à primo, & hinc versus Orientalem plagam per Africam atque Asiam numerat Meridianos reliquos & longitudinem locorum. Cum enim liberum esset eligendi initii arbitrium, maluerunt Veteres simul habere rationem portiones Terræ, quam habitari ab hominibus sciebant, quæ portio non in seipsam recurrit, sicut ipsius Telluris superficies, atque adeo in eâ portione potest assignari initium longitudinis atque finis in alio puncto. Quoniam itaque Ptolemæi seculo insule Fortunatæ erant ultimæ in Occidentali plaga ex omnibus Terris, quas tunc cognitæ habebant, ideo ab eo termino Ptolemæus incepit numerare longitudinem Terræ & ad Orientales regiones progressus finem numerationis Meridianorum fecit in ultimo Asiæ litore Sinensi.

Sed cum ante aliquot secula diu post Ptolemæi ævum inventæ essent plurimæ regiones Terræ habitatæ versus Occidentem atque ingens illa America detecta, tunc Geographi nonnulli promoverunt initium numerationi longitudinis versus Occidentem. Quidam enim meridianum Insulæ S. Nicolai, quæ una est ex adjacentibus promontorio Viridi Africæ, primum fecerunt; Hondius

dias ve  
Alii  
ve Az  
assum  
no m  
linea  
Septen  
strare.  
servat.

Sed  
acus M  
ridiani  
existit  
tem,  
primun  
primis  
regressi  
monter  
appella  
ridiano  
corum  
& multi  
tium e  
tibus se  
stat, &  
cam &  
rendam  
Meridia  
lem pa  
riis tra  
dovicus  
observa

Astro  
ridiano  
gum sit  
gere, a  
tare, a

dus vero insulam S. Jacobi in Mappis suis elegit.

Alii Meridianum insulæ unius ex Flandricis sive Azoribus, quæ *del Corvo* dicitur, pro primo assumerunt, propterea quod in hac insula & vicino mari acus Magnetica nullam declinationem à linea meridiana habere deprehensum sit, & ipsam Septentrionalem atque Australem Cardinem monstrare. Hoc initium Mercator in suis Tabulis observat.

Sed cum neque alia loca desint in Tellure, ubi acus Magnetica id faciat, neque in omnibus Meridiani hujus loci id faciat, ideo alii Geographi existimarunt, illam causam non esse sufficientem, & quidam in littore procurrente Brasiliæ primum Meridianum defixerunt: recentiores, imprimis Belgæ, ad Fortunatas seu Canarias Insulas regressi elegerunt in una illarum dicta Teneriffa montem, qui altissimus censetur totius Telluris, appellatum *el Pico de Teneriffa*, atque ab hujus Meridiano instituendam esse censent longitudinis locorum numerationem, propterea quod insignem & multis seculis durabilem locum ad istud negotium existiment eligendum esse, de quo sequentibus seculis non facile dubitatio apud posteros existat, & præterea non sine gravi ratione Ptolemaicam & tot seculis observatam assignationem defendendam esse. Galli hodie ab anno 1634. primum Meridianum observant eum, qui per Occidentalem partem insulæ Ferri (*de Ferro*) una è Canariis transit, quod initium ipse Rex Gallix Ludovicus XIII jussit suos nautas & Geographos observare.

Astronomi quoque diversa loca pro primo Meridiano assument. Tychonici enim ad Uranoburgum situm in insula Freti Danici eum solent designare, atque ad illum locum caelestes motus supputare, atque inde ad alia loca accommodare. Alii  
alia

alia initia tenent, prout alium atque alium Ephemeridum scriptorem sequuntur. Scriptores enim Ephemeridum, ut etiam Tabularum Planetariorum supputatores ad sui loci quisque meridianum solent supputare motus Planetarum & apparentias, ut Origanus ad Francofurtensem, Maginus ad Venetum (quia Patavina Academia Venetorum est) Eicstadius ad Stetinensem. Lansbergius in suis Tabulis ponit Goesam Zeelandiæ Reinholdus in Prutenicis Regium montem Borussiae.

Verumenimvero ut libere, quod sentio, dicam, omnis hæc autorum discordia sine ulla sufficienti ratione enata est, ita ut illi qui primi Ptolemaicum initium loco moverunt, culpandi sint. Perinde enim est, quodcumque hujus numerationis initium assumatur in Tellure, sive locus sit insignis sive ultimus ad Occidentem sive ad Orientem, modo reliquorum locorum situs & distantia ad eum accurate cognoscatur, & illa varietas initii meridianorum multis confusionibus & difficultatibus Geographicorum scriptorum lectionem gravat. Quoniam tamen Magnetis declinationis à linea meridiana cognitio magnæ est utilitatis & dignitatis, atque ea declinatio crescit ad certum usque meridianum, & deinde rursus decrescit, non exillimo incommodum esse ad observationes declinationis Magneticæ & faciliorem comparationem augmenti & decrementi illius, si assumatur primus meridianus ille, in quo acus Magnetica nullam vel exiguam facit declinationem, modo talis aliquis meridianus daretur, in cujus nempe omnibus locis vel saltem plurimis acus magnetica id faceret.

Cæterum cum Belgæ hoc tempore observent montem Teneriffæ pro initio longitudinis, atque hodie in omnes Telluris partes navigent, ideo conveniens videtur idem initium cum illis agnoscere

scere ad  
edere sol

In le  
sciant ad  
ci vel n  
derate d  
gitudini  
mum m  
num lon

Dat a  
ve dat a  
meridian  
loci situm  
Vel ita  
versetur  
ad alia  
bis hujus  
hujus loc  
tiam.

Hoc e  
pe & n  
longitue  
mur, P  
longitue  
tamen  
problem  
primit  
tudine  
fastidio  
tanti lab  
tanda si

Eteni  
indigen  
gressi &  
confecti

scere ad faciliorem intelligentiam diatorum, quæ edere solent.

In lectione autem autorum id sibi observandum sciant adolescentes, ubi mentio fit longitudinis loci vel meridiani certi numerati, quod tunc considerare debeant, quodnam autor ille initium longitudinis statuerit, vel per quem locum duxerit primum meridianum. Ad eum enim aliorum locorum longitudinem exquirere debent.

### PROPOSITIO III.

*Datâ loci alicujus latitudine & longitudine, sive datâ loci distantia ab Equatore & certo aliquo meridiano, qui in Mappis vel Globo reperitur, ipsius loci situm & punctum in Mappis & Globo exhiberi. Vel ita: Si in aliquo Telluris loco terra vel mari versetur, qui nobis incognitus sit, sive cujus situm ad alia Telluris loca ignoramus, nota autem fiat nobis hujus loci latitudo & longitudo, inde investigare hujus loci situm in Tellure atque ab aliis locis distantiam.*

Hoc est problema illud, propter quod adeo anxie & magna industria methodus quaeritur, qua longitudo loci quovis tempore, quo in eo versamur, possit inveniri. Atque ideo, etsi prius de longitudinis hujus inventionem fuisset agendum, tamen mihi magis consultum visum fuit, ipsum problema, propter quod illa longitudo quaeritur, præmittere, idque eam ob causam, cum de longitudine hac prolixè agendum sit, ne adolescentes fastidio corripiantur, ignorantes quem ob finem tanti laboris opera suscipiatur & tam varia viâ tentandæ sint.

Etenim nautæ (nam terrestria itinera non ita indigent hac cognitione) à littoribus longe progressi & in Oceano versantes, quia viam itineris confecti propter varia impedimenta non possunt

accu-



accurate scire, atque in Mappis suis notare, sæpissime ignorant, in quo loco Telluris versentur, qualem hic locus situm habeat ad illa loca, quæ petunt vel petenda sunt, si salvi & incolumes evadere velint, atque ideo etiam ignorant, in quam plagam dirigenda sit navis. Ad illius vero cognitionem nulla promptior methodus est, quam si loci illius latitudinem & longitudinem, hoc est, distantiam ab Æquatore & certo aliquo meridiano Telluris, habeant perspectum, vel investigent. Et loci quidem latitudinem variis modis noctu per stellas, die per Solem investigare haud difficili opera docuerunt illos Mathematici, quales modos tradidimus in prioribus (qui enim existimant, solius acus magneticæ beneficio id cognosci, suam imperitiam in hac disciplina produunt). Ex qua latitudine inventa cognoscunt, in quonam parallelo Telluris versentur, quod quidem non levis est quæriti pars: sed cum infinita sint illius paralleli puncta, nondum ex illa latitudinis cognitione sciunt, in quonam paralleli puncto hæreant. Hoc autem cognoscerent, si scirent, in quoniam meridiano constituti sunt, sive quot gradibus hic meridianus ab aliorum locorum aliquo meridiano distet. Etenim ubi hic meridianus parallelum antea inventum secat, istud punctum est locus in quo sunt. Ita enim in omnibus disciplinis Mathematicis observatur, ut quando de puncti alicujus loco quæritur, is plerumque non aliter inveniatur quam per duarum linearum sectionem.

*Sit itaque cognita loci alicujus sive puncti in superficie Telluris latitudo & longitudo. Invenietur ejus puncti situs sive locus in globo ita:*

Numerentur in meridiano æneo ab Æquatore gradus latitudinis, atque ad terminum numerationis applicata creta describatur parallelus loci sive circulus latitudinis. In hujus itaque aliquo puncto

puncto  
punctum  
venta la  
inventu  
is meri  
meratur  
hujus n  
meridia  
tunc no  
cere) at  
meridia  
gitudin  
fuerit.  
ridianu  
meridia  
ridianu  
incogni  
ventus  
ctum si  
cus est  
& inve  
nempe  
diano a  
negotiu  
strator  
modo:

Nun  
tore ab  
nu: te  
ridianu  
gradus  
est locu  
jacet.

In M  
fit ita  
descen  
regula

puncto constitutos nos esse, sive hujus aliquod punctum esse id quod quaeritur, certum est ex inventa latitudine. At ipsum hoc punctum porro ex inventa longitudine cognoscitur. Adducatur enim is meridianus sive locus, à quo illa longitudo numeratur, sub æneum meridianum (si per initium hujus numerationis transeat meridianus, vel si meridianus primus globi sit ipsum illud initium, tunc non opus est ad æneum meridianum adducere) atque in Æquatore ab eo puncto, quod in meridiano est, numerentur gradus cognitæ longitudinis versus Occasum vel Ortum, prout data fuerit. Terminus numerationis adducatur ad meridianum æneum (nisi per illum transeat aliquis meridianus). Ita meridianus hic representabit meridianum, in quo punctum quaesitum sive locus incognitus necessario situs est. Atqui antea inventus est parallelus, in quo idem quaesitum punctum situm esse ostensum fuit. Quare quaesitus locus est punctum illud, ubi meridianus inventus, & inventus antea parallelus, se mutuo secant, nempe illud paralleli punctum, quod sub meridiano æneo conspicitur. Paulo prolixius explicavi negotium, ut Lectores simul causam & demonstrationem perspicerent: Sed *facillima praxis est hoc modo:*

*Numerentur gradus data longitudinis in Æquatore ab illo puncto, quod initium est data longitudinis: terminus numerationis adducatur ad æneum meridianum, atque ab æquatore in meridiano numerentur gradus latitudinis data. Terminus hujus numerationis est locus quaesitus, sive puncti, in quo locus incognitus jacet.*

In Mappis rectilineis, ut sunt omnes nauticæ, fit ita: Gradus latitudinis numerantur in lineis descendens seu lateralibus, atque applicata regula ducitur parallelus loci, in quo certum est locum

locum ignotum jacere. Deinde in transversis lineis, summa & ima, numeratur longitudo, & applicata regula ducitur linea meridiana; ubi hæc secat priorem, is est loci quæsitum punctum.

Expeditius ita: Applicata regula ad gradus longitudinis datæ in transversis lineis, sumitur deinde circini intervallo in linea laterali alterutra pars ea, quæ inter datum latitudinis gradum & punctum summum vel imum interjacet, atque circini hoc intervallo ad regulam accommodato statim habetur quæsitum puncti locus in Mappa.

Hujus itaque situs simul ad omnia loca perspiciuntur, unde facile est colligere, in quam plagam navis dirigenda sit, si ad hunc vel istum locum velint pervenire.

In Curvilineis Mappis eodem modo agimus, nisi quod lineis rectis curvas ducere necessum habemus.

Hic est *primus usus* & insignis utilitas inventæ longitudinis in arte Nautica.

*Secundus usus* multo maximus est ipsa Constructio Globi & Mapparum, quia eo modo, quo indicavimus, per latitudinem & longitudinem cognitam omnia loca in globis & mappis consignantur, ut in sequentibus dicitur, neque possibile fuisset globum terrestrem construere, nisi locorum longitudes notæ & investigatæ fuissent. Atque inde fit, ut globi & mappæ plurima loca falso exhibeant loco, quia longitudo eorum vera non fuit cognita.

*Tertius usus* cognitæ longitudinis locorum est etiam insignis, nimirum quod ex illa cognoscimus facillime, temporis diversitatem in diversis locis & qua hora horæ parte singula phænomena cælestia in diversis regionibus accidunt vel conspiciantur, de quo in sequenti Propositione dicitur.

Quarta  
duorum  
locorum.  
gitudinis  
dum.

Sol, om  
(at Equ  
cujusvis lo  
bus quinde  
decim min  
cedunt un  
ta distant

Etenim  
pars temp  
Occident  
talem Ho  
est, per in  
setur aut  
vidas int  
dere uni  
gradibus  
dem quo  
cum rota  
num dep  
recedunt  
& in qua

Potest  
strari. A  
toris pur  
dex coll  
inde glo  
ram, at  
tatum r  
sive, u  
gradus

*Quartus usus*, quod ex differentia longitudinis duorum locorum & latitudinis invenitur distantia locorum. Jam satis explicata utilitate cognita longitudinis accedimus ad ipsius inventionis methodum.

PROPOSITIO VI.

*Sol, omnes stella atque omnia in caelo concepta puncta (ut Aequatoris & parallelorum puncta) singulis horis à cujusvis loci Meridiano remouentur vel recedunt gradibus quindecim, in uno hora scrupulo  $\frac{7}{60}$  remouentur quindecim minutis, & proinde in quatuor hora scrupulis recedunt uno gradu, nempe in cuiusvis stella parallelo sumpta distantia.*

Etenim hora nihil aliud est, nisi vigesima quarta pars temporis, quo Sol à loci cuiusvis meridiano ad Occidentem delatus per imum caelum atque Orientalem Horizontem redit ad meridianum cum, hoc est, per integram peripheriam circumuoluitur. Censetur autem peripheria gradibus 360. Et si 360 diuidas inter 24, reperies quindecim gradus respondere uni horæ. Itaque Sol in una hora remouetur gradibus quindecim à cuiusvis loci meridiano. Eodem quoque tempore cum Sole omnes stellæ circumrotari per integram peripheriam ad meridianum deprehenduntur. Quare & illæ singulis horis recedunt à quouis meridiano gradibus quindecim, & in quatuor horæ scrupulis uno gradu.

Potest hoc etiam in globo monstrari vel illustrari. Assumatur enim & notetur quodvis Aequatoris punctum, eoque adducto ad meridianum Index collocetur ad horam XII cycli. Volvatur deinde globus, donec Index monstret primam horam, atque deprehendes punctum Aequatoris notatum recessisse quindecim gradibus à meridiano, siue, ut vulgo loquimur, quindecim Aequatoris gradus transiisse meridianum: si deinde iterum  
volvas



volvās globum, donec Index monstrēt horam 11, 111, 1V, &c deprehendes singulis horis punctum notatum recessisse quindecim gradibus longius à meridiano. Eodem modo idem deprehendemus in quovis parallelo, quem Sol atque stellæ extra Æquatorem motu diurno describunt.

*Corollarium.* Quæ itaque loca sita sunt in meridianis quindecim gradibus à se invicem remotis, eorum ille qui orientior est, numerat omnes horas prius, quam alter locus, una hora: Ex. gr. 8, 9, 10, 11, 12, 1. cum alter 7, 8, 9, 10, 11, 12, &c. Si triginta gradibus distent meridiani, orientior numerabit 8, 9, 10, 11, 12, 1, cum alter 6, 7, 8, 9, 10, 11. atque ita porro si quadraginta quinque gradibus sejungantur, tribus horis anticipabit orientior locus numerationem loci occidentalioris, si sexaginta gradibus, horis quatuor, &c. Et proinde eandem caelestem apparentiam planetarum ut Eclipses, conjunctiones, &c. quam occidentalioris loci incolæ vident hora 8, vel 9, 10, 11, &c. eandem orientioris meridiani loci videbunt hora 9, 10, 11, 12, siquidem quindecim gradibus sit orientior, sed si gradibus 30, vel 45, vel 60 sit orientior iste Meridianus, duabus, tribus vel quatuor horis citius vidisse eam loca illius meridiani existimabuntur, cum tamen eodem tempore & simul viderint, sed tempore diversimode denominato, hoc est nomine diverso, revera eodem.

Contra, si duorum locorum unus numeret horam 8, 9, 10, 11, 12, &c. dum alter locus numerat 9, 10, 11, 12, 1, vel si iis horis eandem Eclipsin videant incolæ, erit meridianus illius loci à meridiano huius loci remotus vel orientior gradibus quindecim, si duas horas in numerando anticipet, gradibus triginta; si tres horas, gradibus 45: si quatuor horas, gradibus 60, atque ita porro.

Ex

Ex quo  
rum hor  
dinem u  
No r  
mirum  
quovis n  
stellæ & c  
li tempo  
Sole; ho  
est omnia  
ridianum  
Æquator  
in uno l  
Ecliptica  
Occident  
stella, ve  
nil rece  
ad eum n  
rit ad cur  
tia vel  
perveniat  
anni part  
& occida  
singulis d  
aliquot m  
nam ita ac  
bus, qua  
veniat ad  
lis, plure  
transcunt  
Sed cum a  
Solis prop  
nuta adda  
cim gradu  
tione neg  
in numeri  
na quindec

Ex quo patet, si detur ad idem temporis momentum hora in diversis locis, haberi quoque longitudinem unius loci ab altero.

NOTA. Quod diximus de Sole & Luna, nimirum quindecim gradibus removeri ea sydera à quovis meridiano in una hora, non minus ac alix stellæ & cœli puncta, & quod omnes stellæ æquali tempore circumvolvuntur ad meridianum cum Sole; hoc, inquam, si accurate loqui velimus, non est omnino verum. Etenim Sol serius redit ad meridianum quam stellæ fixæ & punctum quodvis Æquatoris, propterea quod Sol non manet fixus in uno Eclipticæ loco, sed versus Orientem in Ecliptica continuo movetur interea, dum versus Occidentem circumrotatur, & proinde quando stella, vel punctum Æquatoris, quod cum Sole simul recedit à meridiano aliquo, altero die redit ad eum meridianum, tunc Sol nondum pervenit ad eum, sed aliquantum remotus est, ita ut post tria vel quatuor horæ scrupula demum ad eum perveniat. Atque inde fit, ut stellæ quibus una anni parte Sol vicinus est, ita ut cum eis oriatur & occidat, quoniam Sole recedente rursus ab illis singulis diebus citius ad meridianum perveniat aliquot minutis, quæ progressu multorum dierum ita accrescunt, ut stella tandem duabus, tribus, quatuor, & quinque horis ante Solem perveniat ad meridianum. Proinde in una hora Solis, plures particule de Æquatore & parallelis transeunt Æquatorem, quam quindecim gradus. Sed cum adeo exigua sit hæc differentia à motu Solis proprio profecta, ut vix decem secunda minuta addat in una hora arcui Æquatoris quindecim graduum, ideo in meridianorum comparatione negligitur, & quæ loca hora una discrepant in numeratione ad idem tempus, eorum meridiani quindecim gradibus Æquatores ponuntur distare

stare à se invicem; quæ duabus horis, ea triginta gradibus; quæ tribus horis, ea quadraginta quinque gradibus, &c.

PROPOSITIO V.

*Datis ad unum idemque tempus, sive Ad unam eandemque apparentiam caelestem datis horis atque minutis horariis nostri loci atque alterius alicujus loci, invenire quot gradibus nostri loci meridianus ab alterius loci meridiano remotus sit, hoc est, invenire longitudinem nostri loci ab illo.*

Hujus solutio ex modo dictis jam facilis est, quia ostensum est, si locus aliquis una hora anticipet numerationem horarum alterius loci, illius meridianum ab hujus esse magis Orientalem gradibus quindecim, si duabus horis, triginta gradibus; si tribus horis, quadraginta quinque gradibus, &c.

Datarum itaque horarum differentia commutetur in gradus & minuta Æquatoris, nimirum pro singulis horis numerando gradus quindecim; pro  $\frac{1}{4}$  horæ, gradus tres & minuta quadraginta quinque; pro horæ scrupulo unum gradum. Inveni gradus & minuta indicabunt meridianorum distantiam, nimirum si horæ nostri loci fuerint plures quam alterius loci, erit noster meridianus ab altero versus Orientem situs, si pauciores, versus Occidentem.

PROPOSITIO VI.

*Datis iterum horis atque scrupulis horariis diversorum locorum ad unum idemque tempus sive ad unius ejusdemque apparentiæ caelestis tempus, & dato uno loco vel unius loci Meridiano in Mappis & Globo, exhibere etiam alterius loci meridianum vel longitudinem in Mappis iis & Globo.*

Differentia horarum atque scrupulorum horariorum

riorum c  
nuta. D  
cujus me  
pauciore  
ridianum  
nus verlu  
plures,  
locus ad  
cat aliqu  
simul ex  
atque mi  
que versu  
alterius l  
ad x i i ap  
monstret  
rationis r  
num add  
quæfitus  
abit ejus  
In Ma  
meridian  
atque im  
in rectili  
tis usus).

Inveniri  
incogniti  
mar, dista  
que situs  
poteß.

Hoc est  
topere na  
tem Naut  
obnoxian  
(quibus  
per totum

tiorum commutetur in gradus  $\text{\AA}$ quatoris & minuta. Deinde consideretur, utrum horæ ejus loci, cujus meridianus in Globo & Mappis datur, sint pauciores vel plures quam alterius loci, cujus meridianus quaeritur. Si pauciores, alter hic meridianus versus ortum situs erit à dato meridiano; si plures, versus occasum. Adducatur itaque datus locus ad meridianum  $\text{\AA}$ neum (nisi per eum transeat aliquis meridianus), & ab  $\text{\AA}$ quatoris puncto simul existente in meridiano numerentur gradus atque minuta ex horarum differentia inventa, idque versus occasum vel ortum, prout collegimus alterius loci situm (facilius per Indicem horarium ad XII applicatum, & voluto globo, donec Index monstrat differentiam horarum). Terminus numerationis notetur cretâ, atque sub  $\text{\AA}$ neum meridianum adducatur: ita hic  $\text{\AA}$ neus meridianus erit quaesitus meridianus & punctum  $\text{\AA}$ quatoris indicabit ejus longitudinem.

In Mappis iidem gradus atque minuta à dato meridiano numerentur in transversis lineis summa atque ima, & applicata regula ducatur linea (nam in rectilineis ut sunt nauticæ, præcipuus problematis usus). Hæc erit meridianus quaesitus.

#### PROPOSITIO VII.

*Invenire longitudinem loci, in quo versamur, incogniti, sive, invenire meridiani in quo versamur, distantiam ab aliquo meridiano noto sive cuius situs in Mappis & Globo exprimitur vel exprimi potest.*

Hoc est illud problema, cujus solutionem tantopere nautæ à Mathematicis exoptant, quod artem Nauticam fere perfectam & nulli fere errori obnoxiam redderet, quod duobus hisce seculis (quibus incredibili antiquis conatu & successu per totum terrarum orbem atque omnia vasti O-



ceani loca Europæi navigarunt ) tantorum virorum ingenia exercuit & torfit, in quod denique Angli, Galli & Belgæ ad quinquaginta millia floren. singuli fere constituerunt præmium & mercedem Inventori vel solutionem exhibituro. Cæterum nemini hætenus palmam in medio positam rapere licuit, etsi varias vias & methodos tentaverint & proposuerint, atque quidam suarum inventionum amore capti rem à se confectam existimantes præmia illa ab Anglis, Gallis, & Belgis postulaverint: verum re examinata deprehensum est, illorum solutiones magno laborare defectu, neque sufficientes esse, ut mox videbimus. Nautæ Belgæ atque Germani interdum juxta latinam phrasin problema exponunt, Die tengde von ein orth zu finden: sed plerunque alia phrasi utuntur, dicentes, Ost und West finden / oder suchen / quasi dicas Orientalem & Occidentalem plagam quarere, quæ equidem phrasis & modus loquendi admodum ab ipsa re alienus est, ut vel hinc manifestum sit, quantam licentiam & potestatem vulgus obtineat in novis terminis atque phrasibus etsi ineptis formandis & introducendis.

Ista enim phrasi effectum est, ut homines artis Nauticæ & Geographiæ imperiti ignorent, quid nautæ sibi velint, cum de inveniendo Oriente & Occidente loquuntur: existimant enim plerique illos hoc quarere, quod verba dicunt, nempe Orientalem & Occidentalem plagam, quod tamen falsum est, & quæstione indignum.

Etenim hæc plagas in quovis loco maris constituti sciunt ejusdem acus magneticæ quæ Septentrionem & Austrum indicat, beneficio, quia in pyxide plagæ omnes notantur, atque etiam sine pyxide cognita plaga Septentrionis & Austri facillimum est ostendere plagam Orientis & Occidentis; quippe facie ad Septentrionem conversa

Oriens

Oriens e  
tra, facie  
stra, Oc  
quod qu  
acu A  
tur verfu  
ndiano.  
alienam  
vulgus f  
tancum  
rebus vo  
appellati  
diam O  
rectam  
perta fu  
herbæ,  
ber firmi  
tendere  
phrasi  
Etenim  
strum in  
tur, &  
dine m  
nautæ æ  
cognosce  
prætere  
in Orie  
hanc fir  
sio hanc  
hoc non  
ridianor  
quia plu  
rem & f  
quid ill  
Hisce  
nem ad  
sunt, u

Oriens est à dextra, Occidens ad sinistram: Contra, facie ad Austrum conversa, Oriens est à sinistra, Occidens ad dextram. Hoc itaque non est id quod quaeritur, sed loci longitudo, hoc est, quanto aciu Aequatoris meridians loci istius removeatur versus occasum vel ortum à certo aliquo meridiano. Cur itaque nautæ, dicat aliquis, tam alienam phrasin assumerunt? Causa est, quod vulgus fere omnia confuse atque superficie tenus tantum concipit & levi ex similitudine cum aliis rebus vocabula & phrasés imponit, ut patet ex appellatione Americæ, quam vulgo vocant Indiam Occidentalem (quia aliquot annis post detectam Indiam proprie dictam ipsa quoque reperta fuit), & appellatione Convolvuli Hispanici, herbæ, quæ cum nostro Convolvulo exignam habet similitudinem. & pluribus exemplis hoc ostendere facile est. Ita etiam se res habet cum phrasi hæc, Orientem & Occidentem quaerere. Etenim cum problema hoc, Septentrionem & Austrum invenire, beneficio acus Magneticæ solvatur, & vero problema de invenienda loci longitudine maximi quoque sit momenti, cuperentque nautæ æque facilem modum habere, quo illam cognoscere possent, atque loci latitudinem, & præterea illa longitudo numeretur ab Occidente in Orientem in Aequatore, ideo propter levem hanc similitudinem & rationem usurparunt phrasin hanc, Orientem & Occidentem invenire, cum hic non plaga aliqua quaeratur, sed distantia meridianorum. Hæc propterea explicanda putavi, quia plurimos sciebam phrasi ista nautica in errorem & falsos conceptus abduci, vel saltem ignorare, quid illa significetur.

Hisce jam mihi ad ipsam Problematis solutionem accedamus. Varii modi à variis excogitati sunt, ut dictum est, quibus ad solutionem perveniri

niri posse opinati sunt. In eo omnes consentiunt, absque cælo id fieri non posse, hoc est, sine apparentiis & motu planetarum, sicut ipsa loci latitudo non potest inveniri absque Solis vel stellarum aspectu (de Terrella enim Magnetica nimis dubia & errori obnoxia res est). Sine tamen Planetarum apparentiis id fieri posse certum est, si horologium automaton nulli errori & defectui obnoxium possimus fabricari.

Ostendimus in Propositione precedente, si ad unius ejusdemque apparentiæ cælestis tempus nota sit hora cum scrupulis horariis, qua in duobus diversis locis ea apparet & conspicitur vel observatur; ostendimus, inquam, facile esse tunc ex horarum differentia invenire longitudinem unius loci ab altero. Quoniam itaque in Calendariis & ephemeridibus (ingenti sane Astronomiæ liberalitate & beneficio), habemus consignata ad singulos dies & horas loci alicujus phænomena omnia & motus Planetarum, ut sunt Eclipsis initium, medium, finis, item Lunæ conjunctio cum Planetis aliis, ingressus in Eclipticam, &c. ideo in incognitæ longitudinis loco versantes si inquiramus horam (& scrupula horæ) qua idem phænomenon conspicimus in hoc loco, inde inveniemus differentiam nostræ horæ ab hora illius loci, ad quem Tabulæ supputatæ sunt, & hinc porro meridiani, quo versamur, distantiam à meridiano, quem sive ejus horas Tabulæ indicant, atque ita habemus loci quæsitam magnitudinem. Neque consistit difficultas in horæ & scrupulorum horariorum inventione, quoniam illa ex stellæ aut Solis altitudine vel plaga cognoscuntur facili negotio, sed difficultas est in defectu talium apparentiarum cælestium, quæ ita observari possint.

Et si vero alii quoque modi sint, quibus sine horarum cognitione & Planetariorum motuum considera-

fideratione  
hic locu  
longitudi  
requirun  
ritur, x  
bus expli  
mus, qu  
ficus loci  
supponu  
poris, c  
duobus  
sunt ad h  
andi sun  
ferentia i  
tur. Ex  
una hora  
ex ephe  
quæ sit  
(hoc est  
pticam)  
de fit ut  
tur, in eo  
possit ip  
ubi sum  
proinde  
loci Tab

Ita Sc  
circiter  
dum cir  
dus est  
tæ ob  
nem ho  
facile er  
venire  
tales eff  
mitrice

fideratione loci longitudo inquiratur, illi tamen hic locum non habent, quia non ipsam primo longitudinem, sed ipsum locum exhibent, & alia requirunt, quæ in illis casibus, ubi longitudo quaeritur, æque ignorantur, quos modos in sequentibus explicabimus. Jam enim tales modos quaerimus, quibus illa loci longitudo inveniatur, ubi situs loci incognitus est. Qui modi omnes præsupponunt cognitionem & comparisonem temporis, quo apparentia aliqua motus Planetarii in duobus diversis locis conspicitur. Inepti autem sunt ad hoc negotium illi motus, qui admodum tardi sunt, ita ut multis horis nulla vel exigua differentia in loco eorum Planetarum deprehendatur. Ex. gr. Saturnus progreditur in Ecliptica in una hora vix quinque secundis minutis. Etsi itaque ex ephemeridibus haberi possit tempus & hora, quæ sit in illo loco quando Saturnus in Ecliptica (hoc est, in puncto orbitæ suæ ubi hæc secat Eclipticam) erit, tamen quia tardissime movetur, inde fit ut multis horis, si observationes instituantur, in eodem loco hæreere videatur, & proinde non possit ipsum horæ momentum cognosci in loco, ubi sumus, quando in ipso illo minuto hærent, & proinde neque horam nostri loci conferre cum hora loci Tabularum.

Ita Sol, singulis horis in Ecliptica promovet  $\pm \frac{1}{2}$  circiter minuta prima (quia integro die gradum circiter promovet), qui motus nimis tardus est ad hoc negotium, quia utcumque accuratæ observationes instituantur ad initium & finem horæ, idem locus Solis reperietur, adeoque facile error duarum, trium, &c. horarum hic obvenire posset. Sciendum enim est, quod modi tales esse debeant, ut in investigatione etiam semitriciesimæ partis horæ error præcaveri possit,



hoc est, ut phænomenon illud cæleste quod ad investigationem adhibendum est, intra duo scrupula horæ sensibilibiter varietur. Si enim ad duo scrupula horæ idem omnino & in eodem statu, quoad sensum & diligentem observationem, maneat, non poterimus certi esse de horæ parte quæ id contigerit in cælo vera; & si erratum sit in observatione per duo scrupula horæ, tunc in longitudinem irrepet error dimidii gradus, ut meridianum nostrum, in quo tunc sumus, in Mappis & Globo existimemus esse & notemus eum, qui non est verus sed dimidio gradu  $7\frac{1}{2}$  millianibus Germanicis in Æquatore à vero remotus sumenda; itaque sunt talia phænomena planetarum, quæ intra duo scrupula horæ vel etiam ad unum scrupulum aut si potest fieri ad dimidium scrupulum varientur. Talia autem nulla sunt nisi hæc. 1. Lunæ Eclipsis initium, medium, finis. 2. Lunæ longitudo sive locus in Zodiaco. 3. Lunæ distantia à stellis fixis, vel appulsus ad illa. 4. Lunæ ingressus in Eclipticam sive in puncta Orbitæ suæ, ubi hæc secat Eclipticam. 5. Conjunctio, distantia, & Eclipses Planetarum Jovialium, nimirum quatuor illorum Planetarum, qui circa Jovem nostro hoc demum seculo ope Telescopii reperti sunt circuitum facere, ingenti sane miraculo, unde Copernicana hypothelisis magnum nata est confirmationis argumentum.

*Modus primus per Luna Eclipsin.*

Hic modus optimus est & satis accuratus, si modo singulis noctibus Eclipses fierent. Eo momento temporis, quo conspiciamus adhibito Telescopio Eclipsis Lunaris initium vel medium, tunc, inquam, observetur stellæ alicujus fixæ altitudo vel plaga, & simul Elevatio poli inventa sit antea, vel simul ex aliqua stella in meridiano con-

consisten  
cum scrup  
docebitur  
itudinis  
tur. Ha  
feratur cu  
exhibent  
horæ resp  
rides sup  
idem ter  
stem hor  
meridian  
nidum no  
à meridi  
rentiam  
gradus &  
ximus. E  
ridianus  
tio signat  
ros gradu  
sum vel  
fuerint p  
Ephemer  
cenda eri  
firi loci  
no ea Ecl

Et si pr  
tium exp  
Eclipses  
locis con  
solvit sus  
vagantes  
ad consi  
stium,

consistente investigetur. Ex altitudine stellæ hora cum scrupulis invenitur satis accurate, ut deinde docebimus ex Astronomia, & facilius absque altitudinis inventionem si stella in meridiano versetur. Hæc itaque inventa hora cum scrupulis conferatur cum hora & scrupulis, qua Ephemerides exhibent ejus Eclipsis initium, vel medium (quæ horæ respiciunt meridianum, ad quem Ephemerides supputatæ sunt). Sic itaque inventa est ad idem tempus vel ad eandem apparentiam celestem hora duorum locorum; nempe nostri loci & meridiani Ephemeridum: Et meridianus Ephemeridum notus est. Itaque longitudinem nostri loci à meridiano Ephemeridum inveniemus, si differentiam horarum utriusque loci convertamus in gradus & minuta Æquatoris, sicut Propos. v diximus. Et quoniam in Mappis datur & Globo meridianus Ephemeridum notus est vel facili negotio signari potest, ideo ab eo numerabimus invenios gradus in lineis transversis Mappæ versus occasum vel ortum prout horæ nostri vel ignoti loci fuerint pauciores vel plures quam horæ meridiani Ephemeridum, & per terminum numerationis ducenda erit linea meridiana. Ea est meridianus nostri loci in quo tum versamur, sive in quo observatio ea Eclipsis instituta fuit.

*Modus secundus per Lunæ locum  
in Zodiaco.*

Et si præcedens modus, per Lunæ Eclipsin negotium expediens, sit accuratissimus, tamen quoniam Eclipses eæ raræ sunt neque omnes in omnibus locis conspicuæ, ideo modus hic Problema non solvit sufficienter, neque nautas in mari incerto vagantes juvare potest: sed magis commodus est ad constituendas & inveniendas locorum terrestrium, ubi Mathematici agunt vel proficisci pos-

sunt, atque omnium fere locorum longitudines, quas scimus, per istum modum inventæ sunt: namque ex annotati temporis, quo conspecta sunt Eclipsis initia vel media, comparatione facile est unius loci ab altero longitudinem invenire, ut satis superque explicatum esse puto. Verum nautarum usus requirit phænomenon vel apparentiam, quæ sæpius nempe singulis noctibus ad minimum (si diebus non liceat) accidat, quoniam singulis noctibus accidere potest, ut in loco ignoto versentur tempestatibus seducti. Frequentius phænomenon est Lunæ locus in Zodiaco, sed observatio & calculus admodum molestus & perplexus requiritur propter parallaxes duplices, ut vix præcaveri possit non dico parvus sed insignis error dimidiæ vel etiam integræ horæ, unde falsus meridianus invenitur à vero remotus multis milliariibus, nempe centum & pluribus.

Minus tamen aberrabitur si expectetur horæ momentum, quo Luna meridianum occupat; tunc enim satis accurate invenietur longitudo loci quæsita hoc modo: Ubi accurate observatum fuerit, Lunam in meridianum venisse loci, ubi sumus, statim capienda est altitudo alicujus stellæ (elevationis poli præsupponitur antea inventa) insignis, atque ex hac & elevatione poli licebit inquirere horam: sed præstat per stellam aliquam in meridiano tunc hærentem id facere, ut deinde monebimus. Porro ex cognita hora inveniat, quodnam Eclipticæ sive Zodiaci punctum in Meridiano tunc hæreat, sive medium cæli occupet (ut loquuntur Astronomi) quod etiam facile est, ut in Lemmate secundo docebimus. Sic itaque ad horam nostri sive ignoti loci habebimus cognitum locum Lunæ in Zodiaco. Deinde ex Ephemeridum Tabulis inveniat, quæ in meridiano Ephemeridum sit, ubi Luna in eo Zodiaci loco versatur,

versatur  
docetur  
bebimus  
nempe lo  
ta est, &  
rides sup  
betur & c

Quare  
tudo loc  
satis mor

Mod

Quon  
nimis no  
maltum  
nium,  
frequen  
aliud qu  
non in I  
veniend  
appropi  
de enim  
datum  
propter  
ipharicc  
est diffic  
que ado  
potius c  
culo ho  
cissimi  
asserunt

Hasc  
thus qu  
vel sup  
mat. E  
lum, i

versatur, quod in Introductione Ephemeridum docetur, neque difficile est. Sic itaque rursus habebimus ad idem tempus horas duorum locorum, nempe loci in quo versamur, cujus longitudo ignota est, & loci ejus, ad cujus meridianum Ephemerides supputatae sunt, & cujus situs in Mappis habetur & Globis.

Quare ex differentia temporis inveniatur longitudo loci nostri quaesita, ut in praecedenti modo satis monstratum est.

*Modus tertius, per distantiam Luna à stella fixa est aliqua.*

Quoniam Lunam in Meridiano observare plurimis noctibus non licet, quando nimirum non multum à Sole remota est post & ante noviluniam, atque adeo phaenomenon hoc non satis frequens est, ac usus nauticus requirit, propterea aliud quod frequentius sit, à nonnullis phaenomenon in Lunæ motu, consideratur, atque ex eo inveniendæ longitudinis modus traditur, nimirum appropinquatio & recessus Lunæ à stellis fixis. Inde enim locus Lunæ verus investigari potest ad datum observationis momentum. Sed calculus propter parallaxes & obliquorum Triangulorum sphaericorum solutionem atque varios casus adeo est difficilis, ut neque nautis inservire possit, neque adolescentes ejus præceptis onerare velim, sed potius omittere. Requirit enim ingenium in calculo hoc versatissimum, quale nulli fere vel paucissimi adolescentes ad Geographiam discendam afferunt.

Hæc autem modi hujus difficultates, Monachus quidam Gallia, Duillerius nomine, evitari vel superari posse singulari sua methodo existimat. Edidit enim ante duos circiter annos libellum, in quo veram & nautis commodam inventionem



tionem longitudinis se tradere profiteretur ( et si multa alia admiscuerit ) eumque librum primo inscripsit Regi Galliarum, deinde ( quoniam fortassis nihil impetraverat à Rege ) Ordinibus Belgii Fœderati, atque hoc ipso, quo hæc scribebam tempore, promissum præmium postulavit; Cæterum in libro eo duas tradit regulas, quæ tamen parum discrepant, sed prior est magis intricate & obscure proposita, neque nautis commoda, præterea impingit in Geometrica Euclidis theoremata ( autor autem affirmat, ex hoc vitio nullum in praxin redundare errorem ); ideo in fine fere libri altera addita est facilior methodus, quæ hæc est: Globum cælestem accuratissime factum habere oportet, in quo Ecliptica & poli Eclipticæ accurate sint designata. 2. Ephemerides Solis & Lunæ præsto esse debent nullo vitio laborantes ( autor è Rudolphinis Tabulis supputatis se adhibuisse affirmat, & cælo congruas deprehendisse ). 3. Ex istis ephemeridibus excerpenda est longitudo ( vel locus in Ecliptica ) & latitudo Lunæ pro istius diei, quo observatio instituenda est, meridiæ. Deinde quadrantis ænei crassi una extremitate applicata ad polum Globi Eclipticæ, altera ad locum Lunæ in Ecliptica, numeretur in quadrante latitudo Lunæ, & in Globo fiat punctum ad terminum numerationis: ita hoc punctum representabit Lunam in Globo & ejus situm ad meridiem istius diei. Eodem modo per ephemerides notetur locus Lunæ in Globo pro meridiæ sequentis diei. Hisce factis sumatur Charta exiguæ latitudinis & longitudinis, atque hæc applicetur ad Globum supra illa duo puncta ( in hoc consistit totum autoris artificium, ut ipse fatetur ) & notatis in charta iisdem punctis atque applicata regula ducatur linea ab uno puncto ad alterum. Hæc linea representabit portionem orbitæ seu viæ Lunæ; per quam eo die in cælo motu proprio

prio mov  
stantia L  
mentum  
gradus o  
globi m  
stellam,  
prius in  
notetur.  
polum  
transcat  
Lunæ in  
supputat  
dum sit  
tinet: E  
observat  
unde fa  
alia de a  
cepta.  
tionur  
rate inv  
esse vid  
jam pri  
potui ad  
excuter

Orbi  
in qua  
tur in E  
vetur  
vandur  
longitu  
git. Po  
meridi  
fiat. E

prio movetur. Hisce factis observetur de celo distantia Lunæ à certa aliqua stella (ad idemque momentum horæ scrupula de celo cognoscenda), & gradus observati capiantur circino in circulo aliquo globi maximo, atque uno circini pede defixo in stellam, alter pes moveatur, donec orbitam Lunæ prius in charta notatam secet; punctum sectionis notetur. Deinde quadrans iterum applicetur ad polum Eclipticæ, ita ut per notatum punctum transeat ad Eclipticam: ita in hac ostendet locum Lunæ in Ecliptica ad tempus observationis. Porro supputetur, quæ hora in meridiano Ephemeridum sit quando luna illud Eclipticæ punctum obtinet: hoc enim tempus si conferatur cum hora observationis nostræ, dabit differentiam temporis, unde facilis est inventio longitudinis. Omitto hic alia de æquando tempore & quibusdam aliis præcepta. Ita putat autor evitari parallaxium & refractionum difficultates, & longitudinem satis accurate inveniri. Mihi plurima hujus methodi vitia esse videntur: sed quia eo primum tempore, quo jam priora typis subjecta erant, nactus sum, non potui ad accuratius judicium ferendum regulas ejus excutere.

*Modus quartus per Lunæ ingressum  
in Eclipticam.*

Orbita Lunæ secat Eclipticam duobus punctis, in quæ quando motu suo proprio pervenit, versatur in Ecliptica, aliis temporibus extra eam movetur recessu maximo quinque graduum. Observandum itaque exacte est tempus in loco ignotæ longitudinis, quo tempore Luna Eclipticam attingit. Porro ex Ephemeridibus excerpitur hora ad meridianum Ephemeridum, in qua ille ingressus fiat. Deinde ex comparatione temporis nostri sive

ignoti loci cum tempore meridiani Ephemeridum habetur differentia temporis, unde longitudo loci nostri à meridiano Ephemeridum inveniatur. Sed hic modus etiam propter difficilem praxin inutilis censendus est. Difficiliter enim observari potest ingressus Lunæ in Eclipticam, calculus perquam intricatus & errori obnoxius.

*Modus quintus per Planetas Joviales.*

Hoc phaenomenon Lunæ phaenomenis in hoc negotio præferendum esse plurimi judicant, propterea quod parallaxibus non sint obnoxii hi Jovis satellites, & præterea in omni Jovis situ supra Horizontem præbeat commodam observationem. Quatuor sunt planetae, magni Galilæi inventum, qui circa Jovis tanquam Domini sui centrum moventur, adeo exigui, ut libero visu videri nequeant, sed tantum adhibito Telescopio. Horum motus (proprius, quo circa Jovem moventur, namque diurnum motum cum omnibus stellis, motum in Ecliptica cum Jove & reliquis planetis communem habent) est celer. Qui enim proximus est Jovi, is circuitum suum absolvit die uno cum octodecim horis & semisse horæ. Secundus diebus tribus cum horis tredecim & triente. Tertius diebus septem, horis duabus. Quartus & supremus diebus sedecim cum horis octodecim. Horum motuum progressus ad singulas horas calculandus est, & ideo in communibus Ephemeridibus non reperitur, sed in aliis libris habentur eorum ephemerides. Si itaque horum motuum beneficio investigare cupimus longitudinem loci, perfectissimo Astrosopio instructi esse debemus, & nocte illo ad Jovem (si supra Horizontem loci illius sit) conversio observare conjunctionem duorum illorum planetarum, vel conjunctionem cum Jove aut similem

appa-

apparent  
mul hora  
diano sit  
rum fate  
hora &  
junctio  
des supp  
duorum  
phaenome  
rum, si  
nem loc  
notus est

Quoniam  
phaenomen  
cuius  
noctibus  
Jovis ve  
quoniam  
& oriuntur  
observa  
habeant  
tellitum  
ad horo  
dio arti  
automa  
ita ut v  
pore, c  
quatuor  
ponat i  
Si ita  
mum e  
nis præ  
quo ab  
illius a

apparentiam, atque ad id momentum temporis simul horam loci invenire ex alicujus stellæ meridiano situ vel altitudine. Deinde Ephemerides horarum satellitum Jovis consulendæ sunt, atque inde hora & horæ scrupula eximenda, quibus talis conjunctio fiat in meridiano, ad quem illæ ephemerides supputatæ sunt. Sic itaque rursus habebimus duorum locorum horam ad unius ejusdemque phænomeni tempus. Unde ex differentia horarum, si in gradus vertatur, inveniemus longitudinem loci nostri à meridiano Ephemeridum, qui notus est.

*Modus sextus per Horologium  
Automaton.*

Quoniam modi omnes, quibus per cælestia phænomena longitudinem locorum invenire docuimus, laborant eò defectu, quod non singulis noctibus appareant (de Luna enim notum est, de Jovis vero satellitibus eodem modo se res habet, quoniam Sole eis & Jovi vicino cum eo occidunt & oriuntur), & præterea insignem difficultatem observandi in navi & maris fluctibus conjunctam habeant, ideo non pauci relictis Lunæ atque satellitum Jovis apparentiis confugiendum censent ad horologium automaton, atque in id omni studio artifices automatarios jubent incumbere, ut automaton parent, quod nulli vitio sit obnoxium, ita ut viginti quatuor horas indicet eodem tempore, quo Sol circumvolvatur & diem sive viginti quatuor horas efficit, neque vel anticipet vel postponat indicium.

Si itaque tale automaton confici posset, aptissimum esset & facillimam inventionem longitudinis præberet nautis. Etenim antequam è loco aliquo abirent, observanda esset accurate hora loci illius ad aliquod tempus (quod non est difficile), &

auto-



automaton ad illam horam disponendum. Ita deinde singulis sequentibus diebus horas istius loci indicabit, si nulli vitio obnoxium sit. Quando itaque illo loco relicto peruentum fuerit ad alium locum, cuius longitudinem sive meridiani distantiam à meridiano loci discessus scire cupimus, nihil restat agendum, nisi ut observetur in hoc loco de caelo hora (quod die per Solem, nocte per stellas fit non difficili opera, ut in Lemmate dicemus) huius loci, & simul inspecto automato videamus, quamnam hora tunc sit in loco sive Meridiano, unde discessimus. Sic habebimus horas duorum locorum ad idem temporis momentum. Differentia itaque illarum horarum si commutetur in gradus & minuta, ut sæpius jam dictum est, ostendet longitudinem loci nostri à meridiano loci, unde discessimus, ac proinde gradus illi in Mappis vel Globo numerati ab hoc meridiano, unde profecti sumus, exhibebunt meridianum, in quo sumus.

Verumenimvero utcumque magnam in talis perfectionis automato fabricando industriam hactenus posuerint artifices, nemini tamen ea felicitas contigit, ut tale paraverit. Etenim & materiae conditio, ex qua fiunt automata, impedit talem perfectionem, & diversitas aëris tollit perpetuam motus æqualitatem. Namque aëre frigido existente tardius moventur automata, quam aëre calido, adeo quidem ut automaton quod Belgæ in Nova Zembla hyemem agentes in ædibus suis collocaverant, omnino à motu cessaverit, etsi multo majus pondus ei addidissent, quam antea ferre solebat. Ad defectum hunc horologiorum automatorum corrigendum vel supplendum quidam jubent singulis diebus horologium disponendum ad horam illius loci, in quem tunc peruentum est (eam autem horam in quovis loco de caelo observari posse diximus). Sed licet hoc fiat, nihi-

nihilomi  
ncepet er

Etenim  
horis con  
rum est  
ridianus  
curate cu  
sentiant,  
& falsus  
navis, a  
iterum fa  
rata à fal  
vitium.  
vitium:  
porro. E  
tuor hor  
ne per o  
perfectio  
inventa

minor  
proinde  
istius die  
sive per q  
iterum a  
parte, et  
tudine,  
etiam un  
meratio p  
ridianus  
triginta r  
bus grad  
60 millia  
signatus  
quo tunc  
que hic  
negligatu  
fuerunt

nihilominus magnus in longitudinis inventionem irrepet error.

Etenim si secundo die profectionis ex automati horis comparatis cum horis loci ad quem perventum est, inveniatur longitudo hujus loci sive meridianus, & vero horæ automati non omnino accurate cum horis loci, à quo profectum est, consentiant, inde fiet, ut vitiosa longitudo assumatur & falsus meridianus in mappis notetur pro loco navis, ad hunc diem. Sequenti die nempe tertio iterum falsa longitudo invenietur, atque ea numerata à falso meridiano præcedentis diei duplicabit vitium. Quarto die rursus augetur, & triplicabitur vitium: quinto die quadruplicabitur, atque ita porro. Ex. gr. si horologium spatio viginti quatuor horarum deficiat à caelesti motu & revolutione per decimam quintam horæ partem (quam perfectionem raro superant nostri artifices), erit inventa ex ea longitudo integro gradu major vel minor (nam  $\frac{1}{15}$  horæ efficit unum gradum), & proinde in mappis signabitur meridianus pro loco alius diei falsus, qui nempe à vero per gradum sive per quindecim milliaria abest. Tertio die quia iterum automaton peccat decimâ quintâ horæ parte, erit iterum vitium unius gradus in longitudine, cumque prioris diei signatus meridianus etiam uno gradu absit à vero, atque ab eo fiat numeratio pro meridiano tertii diei, erit jam hic meridianus duobus gradibus à vero remorus, hoc est triginta milliariibus in Æquatore: quarto die tribus gradibus, quinto quatuor gradibus, hoc est 60 milliariibus, ita ut tandem putata longitudo & signatus meridianus longe absit à meridiano in quo tunc navis est. Hæc itaque causa est, cur neque hic modus perfectus sit, & proinde à nautis negligatur. Hoc ipso, quo hæc scribo, tempore fuerunt Haga, qui talis automati fabricam Ordinibus

nibus hujus Reipublicæ promiserunt & præmia promissa petierunt: sed adhibiti arbitri harum rerum periti insufficientiam ostenderunt.

## L E M M A.

Quoniam in singulis præcedentibus modis inveniendæ longitudinis investiganda fuit hora de cælo ad tempus observationis, ideo hic ex Astronomia explicabimus modum quo id fiat (nam de elevatione poli, quæ etiam requiritur, diximus capite XXI 11). De die Sol adhibendus est, nocte stellæ illustres. Utroque tempore præstat expectare tempus, quo Sol vel stellæ in meridiano sint, atque ad reliqui temporis horas & scrupula horaria cognoscenda exactissimum automaton adhibere. Etenim intra dimidii diei spatium parum aberrabit automaton, si magnâ diligentiam factum sit. Et ita non habebimus opus elevatione poli ad hoc negotium, quam tamen scire debemus propter parallelum.

De die itaque Sole in Meridianum delato scimus horam in illo loco esse duodecimam, atque adeo ad ipsum hoc momentum temporis automaton disponendum est ad sequentis temporis indicandas horas. Quod si ante meridiem observandum sit phænomenon, disponatur automaton ad ipsum tempus observationis, atque deinde diligenter observetur Solis ad meridianum appulsus, atque tunc inspecto automato cognoscatur hora à tempore observationis ad meridiem seu XII horam elapsæ, unde ipsius observationis hora cognoscetur.

Verum si extra meridianum constituto Sole, velis de cælo investigare horam, observetur altitudo Solis ad phænomeni tempus. Deinde in Triangulo sphaerico ex datis tribus lateribus quæ sunt ele-

elevation  
distantia  
cum die  
nis Solis  
guli Sp  
autem i  
declinat  
sive qui  
quod qu  
nometri  
tudine S  
docuimu  
Geograp  
non ita a  
te nautic  
sphaeriar  
nimium  
tempore  
plerunq  
test, id  
existente  
in merid  
quo aliq  
matur e  
lius ascen  
illius Ecl  
Et si Sol  
ab ascens  
plement  
ni. Grad  
& scrupu  
servation

Alios  
qui prop  
cum ipsu

elevationis poli complementum (sive loci à polo distantia), complementum declinationis Solis ad eum diem & complementum observatæ altitudinis Solis; ex tribus, inquam, hisce lateribus Trianguli Sphærici invenietur angulus quilibet, in hoc autem inveniendus est ille qui à complementis declinationis & elevationis poli comprehenditur, sive qui complemento altitudinis Solis opponitur: quod quomodo fiat, studiosi ex sphærica Trigonometria petant. Quomodo per globum ex altitudine Solis ad quodvis tempus inveniatur hora, docuimus cap. **XXIX** Propos. **III**, quod quidem Geographiæ studiosis plerisque satisfaciet, cum non ita accuratam horæ partem quarant, sed in arte nautica calculus est adhibendus, etsi per Planisphærium Catholicon quidam solvant, sed metuo nimium vitium in horariis scrupulis. Nocturno tempore stellæ, ut dixi, adhibendæ sunt, & quia plerunque una vel altera in meridiano haberi potest, ideo non opus est aliam extra meridianum existentem adhibere, sed præstat eligere aliquam in meridiano harentem, vel id tempus expectare, quo aliqua vicina meridiano accedat in ipsum. Sumatur deinde ex Tabulis Astronomicis stellæ illius ascensio recta, & simul ascensio recta puncti illius Eclipticæ, in quo Sol ad eum diem versatur: Et si Solis ascensio recta fuerit minor, auferatur ab ascensione stellæ; si major, sumatur ejus complementum ad 360, & hoc addatur stellæ ascensionis. Gradus hoc pacto acceptos commuta in horas & scrupula horæ: hæc erunt quæ sita ad tempus observationis.

## PROPOSITIO VIII.

*Alios modos inveniendæ longitudinis exponere, qui proprie & primario non longitudinem, sed locum ipsum puncti, (cujus longitudo sive meridia-*  
*nas*



nus tantum quaeritur) exhibent: quibus tamen ad locorum terrestrium longitudinem constituendam, vel examinandam uti commodum est.

### Primus Modus.

Dat à duorum locorum distantia & utriusque latitudine invenire longitudinem unius loci ab altero, in mappis vero nauticis & globo ipsum loci ignoti punctum, si alter locus datus est (est autem semper unus locus cognitus vel datus).

Si calculo Trigonometrico accuratam longitudinem velis exquirere, inveniendus erit angulus in Triangulo Sphaerico, cujus omnia latera dantur, nempe distantia in gradus conversa, complementa latitudinis sive locorum à polo distantia: supputatio autem fieri debet anguli comprehensi à lateribus duobus, quæ sunt complementa latitudinum, sive quæ sunt arcus inter ambo loca & polum intercepti. Methodus ex Trigonometria sphaerica est petenda.

Verum in mappis nauticis & globo ipsius puncti ignotus locus ita invenitur ex datis.

IN MAPPIS nauticis. Data distantia intervallo circini ex appositâ scalâ sumitur, & uno pede in datum locum defixo alter pes circumducitur donec attingat vel fecerit parallelum alterius latitudinis, quæ est loci ignoti. Punctum contractus vel sectionis est locus quaeritus sive ignotus. Aliæ vero mappæ ad hoc negotium ineptæ sunt, neque ipsæ nauticæ accuratam locorum distantiam exhibent, de quo pluribus loquemur capite sequenti.

IN GLOBO. Data distantia convertatur in gradus & minuta, arque intervallo circini in Aequatore sumantur. Deinde in Meridiano notetur gradus latitudinis ignoti loci, pes vero circini unus collocetur in loco dato, & volvatur globus donec

donec a  
globi no  
quaeritu  
nis loci  
locum  
parallelu  
tus vel  
do tunc

Dat à  
situs inco  
triusque  
longitudi  
tici glob

Per d  
terceptu  
neam ab  
bo vel p  
itaque c  
unius ab  
nicum,  
menta l  
utri late  
comprel  
quaerita

In G  
tudinem  
cus igno

IN C  
ridianu  
applicet  
tiam cre  
gniti loc  
data Ho  
tus loc

donec alterius pedis extremitas attingat punctum globi notato meridiano signo subjectum. Id erit quaesitus locus. Vel describatur parallelus latitudinis loci ignoti cretâ, & deinde uno pede circini in locum datum defixo alter circumducatur, donec parallelum illum secet, vel tangat. Punctum hoc tætus vel sectionis est locus quaesitus, cujus longitudo tunc in Æquatore numeratur.

*Modus secundus.*

*Datâ plagâ, in qua locus aliquis incognitus (cujus situs incognitus est) jacet à loco noto sive dato, & utriusque loci latitudine datâ, invenire illius loci ignoti longitudinem à loco noto & ipsum locum in mappis nauticis globo exhibere.*

Per datam plagam intelligimus hic angulum interceptum inter meridianum alterutrius loci & lineam ab uno loco ad alterum ductam, quod in globo vel per Diagramma commodius explicatur. Si itaque calculo longitudinem velis investigare loci unius ab altero, solvendum erit Triangulum sphaericum, in quo dantur duo latera (nempe complementa latitudinis utriusque loci), & angulus alterutri lateri dato adjacens, inquiritur autem angulus comprehensus à duobus datis lateribus. Hic enim quaesitam longitudinem exhibebit.

*In Globo verò & Mappis nauticis non opus est longitudinem invenire, neque potest primo inveniri, sed ipse locus ignotus ex datis invenitur.*

**IN GLOBO:** Locus datus adducatur ad meridianum, polus elevetur pro ejus latitudine & applicetur ei quadrans verticalis: Describatur etiam cretâ parallelus ad latitudinem alterius incogniti loci. Tunc quadrantis extremitas applicetur datæ Horizontis plagæ, in qua nempe alter ignotus locus à noto loco jacet. Punctum paralleli ubi qua-

quadrans eum secat vel tangit, est quaesitus locus, cujus longitudo in Aequatore numerabitur.

IN MAPPIS nauticis. Ducatur parallelus ad latitudinem ignoti loci. Deinde ex dato loco ducatur linea pro data plaga, punctum ubi haec secat parallelum, est locus quaesitus. Si autem plaga Loxodromica detur, aliter agendum esset, de quo capite xxxix.

### Modus tertius.

*Datâ plagâ & distantia unius ignoti loci ab altero cujus latitudo data est, invenire longitudinem illius ab hoc: in globo autem & mappis, si hic locus detur, illius quoque situm exhibere.*

Si calculo investigationem experiri libet, dantur in Triangulo sphaerico duo latera ( complementum latitudinis loci noti & distantia ab ignoto in gradus conversa ) & angulus comprehensus ex plaga data : inquirendus ex tribus hisce datis est angulus oppositus distantiae. Hic exhibebit alterius loci longitudinem à loco altero sive noto.

In Globo autem & mappis nauticis invenitur ipse locus ita: Elevetur polus pro dati loci latitudine, quadrans applicetur vertici, & altera extremitas applicetur ad datam Horizontis plagam. Deinde distantia data in gradus conversa numeretur in quadrante à vertice. Terminus numerationis erit locus quaesitus in globo. Si vero sine ipsius loci designatione queratur tantum longitudo, hoc est, si Triangulum sphaericum per globum placeat solvere, fiet illud simili modo. Exempla dabimus in capite xxxix, quod etiam de sequentibus tenendum est. Ibidem quoque uno exemplo ostendimus, quomodo per planisphaerium talia problemata solvantur. De hisce omnibus

bus sicut  
ptores e  
nasti fu  
vel calcu  
enim u  
IN M  
tur linea  
piatur in  
uno ped  
ducta pr  
locus qu  
ti capite

Datâ  
illum &  
inquirere

IN C  
stantia u  
pede un  
jam sum  
sicie glo  
habeat.

Eode  
scribatu  
punctur  
situs loc

In ma  
nisi quo  
sed in ap  
à datis  
tor com  
accurate.

Inven  
multum  
tit, ide

bus

bus sicut etiam de methodo logarithmica Præceptores edocere possunt discipulos suos, si capaces nacti fuerint, & studiosos harum rerum. Nautæ vel calculum vel planisphærium adhibent. Globi enim usus in navi minus commodus est.

IN MAPPIS nauticis. Ex dato loco ducatur linea pro data plaga, & intervallo circini capiatur in scala, apposita locorum distantia, atque uno pede defixo in locum datum alter pes in linea ducta pro data plaga collocetur. Punctum hoc erit locus quaesitus, sed tamen non accuratus, ut sequenti capite docebimus.

#### Modus quartus.

*Dat à loci ignoti à duobus notis distantia, exhibere illum & notum facere in globo & mappis, calculo vero inquirere ejus longitudinem.*

IN GLOBO. Sumatur circini intervallo distantia una (in gradus conversa) in Æquatore, & pede uno in locum unum ex datis (cujus distantia jam sumpta fuit) defixo describatur arcus in superficie globi altero pede, qui cretam in extremitate habeat.

Eodem modo sumptâ distantia ab altero loco describatur ex hoc tanquam centro arcus in superficie: punctum, in quo hic arcus priorem secat, est quaesitus locus.

In mappis nauticis eodem modo agendum est, nisi quod datae distantiae non in gradus mutantur, sed in apposita scala sumuntur. Verum si locus sit à datis aliquantum remotior, nimis magnus error committetur, quia mappæ hæc non præstant accurate.

Inventio autem longitudinis per calculum quia multum habet difficultatis & diagramma requirit, ideo malui vivæ Præceptoris informationi  
& osten-



& ostensioni relinquere, quam hic multis verbis describere.

*Modus quintus.*

*Datis duobus locis in Tellure, & plagis quibus tertius aliquis ignotus locus situs est ad illa, invenire hunc tertium locum in Tellure, mappis, globo, & calculo longitudinem hujus loci inquirere.*

**IN GLOBO.** Duorum datorum locorum unus adducatur ad meridianum, & polus elevetur juxta ejus latitudinem, quadrans applicetur vertici atque alterâ extremitate ad plagam Horizontis datam (in qua nempe ad locum huncce notum tertius ignotus jacere ponitur, & ad marginem quadrantis cretâ acuminatâ describatur peripheria subtilis sive exiguæ crassitie. Deinde alter datus locus adducatur ad meridianum & polus elevetur juxta ejus latitudinem, quadrans affigatur vertici, altera extremitas datæ Horizontis plagæ, in qua nempe tertius locus ignotus ponitur jacere ad huncce notum locum. Punctum, in quo margo quadrantis secat peripheriam antea cretâ delineatam est quæsitus locus tertius.

In Mappis fit ita: Ducatur linea ex uno dato loco pro data plaga tertii loci; eodem modo ex altero dato loco ducatur linea plagæ. Punctum, in quo duæ hæ lineæ se mutuo secant, est locus quæsitus.

Eodem modo in ipsa Tellure agendum esset, si scientifice agere vellemus: neque enim in scientia curamus impedimenta & obstacula, modo modum mente comprehendamus.

Calculum, quo longitudo loci ignota invenitur ex datis hisce, relinquamus vivæ Præceptorum voci & delineationi, si aptos & capaces discipulos nati fuerint.

Sed

Sed ja  
tione di  
plicavim  
Propt  
tudinis  
rum, ut  
cujus qu  
phia. C  
certos ef  
pterea u  
tis hæc d

Sed jam satis superque de longitudinis inventionem dictum est, cujus amplissimum usum explicavimus Propositione II.

Propterea etiam hic subjungo Tabulam Longitudinis & Latitudinis præcipuorum Telluris locorum, ut adolescentes exercitii materiam habeant, cujus quoque insignis est utilitas in tota Geographia. Collegi eam è variis autoribus: attamen incertos esse plerosque numeros non inficio, & propterea unicuique autor sum, ut cognitis magis certis hæc deleat & illa substituat.

TABULA LONGITUDINIS ET  
LATITUDINIS LOCORUM.

Nomina locorum.	Latitud.		Longit.	
	gr.	min.		
Adrianopolis Thraciæ.	43	0	53	
Ænipontum.	46	55	35	
Ætna mons Siciliæ.	38	20	39	
Agta in Mogoris regno.	34	38	87	7
Alba Græca, sive Belgrado, in Hungaria.	47	40	45	
Alexandria Ægypti.	30	58	60	30
Algerium Africa.	32	30	22	
Amstelodamum.	52	26	26	30
Ancona.	43	40	38	30
Angola Africae Austr.	9			
Antiochia Syriæ.	37	0	75	15
Antverpia.	51	16	26	
Alepo Syriæ.				
Aquileia Italiæ.	45	12	34	
Aquinum D. Thomæ.	41	56	38	30
Aquisgranum.	50	48	27	30
Aden Arabiæ.				
Ostium Araxis fl.	46	0	81	0
Arbela.	35	52	89	
Ostia Argentei fluvii.	35			
Argentoratum.	48	44	27	50
Ariminum.	43	50	35	
Armusa, Ormus.	27	24	95	57
Aromata promontor. Afri- cæ, hodie Guardafu.	14	20	88	40
Ascalon.	32	27	67	20
Athenæ.	37	15	53	0
Avenio, Avignon.	43	52	23	0
Augusta Vindelic.	48	21	33	0
Aurasicum, Aurange.	43	30	26	30
Auræ Chersonesi, Malac- ca.	2	0	161	

Au-

Aurelia

Babylon

die Ba

Bactra, f

Badena

Bamberg

Barcelon

Basilea F

Belgrad

Banda in

Benevent

Bengala

Berlinum

Berna H

Berga N

Bethlehe

Biturigæ

Bononia

Brandeb

Brema.

Brixia.

Brugæ F

Brandun

Brunsvig

Bruxella

Buda H

Burdigal

Byzantiu

Cæsar-A

Caieta.

Calerum

Calecut

Calis Hi

Nomina locorum.

Latitud.

Longit.

gr. min.

		Aurelia.	47	30	22 0
		B.			
		Babylon Chaldaeorum, hodie Bagdet.	33	50	73 30
		Bactra, s. Badagfan.	39	26	
	7	Badena Helvetia.	48	44	31
		Bamberga.	49	56	31 45
		Barcelona Hispan.	41	24	18 30
	30	Basilca Helvetia.	47	3	28 30
		Belgradum, s. Alba Græca.	47	40	45 0
	30	Banda insula.	6		115 55
	30	Beneventum.	42	0	41
		Bengala India.	23		
	15	Berlinum German.	52	50	36 30
		Berna Helvetia.	46	25	29 45
		Berga Norwegia.	60	30	27 30
		Bethlehem.	31	50	65 45
	30	Bituriga.	46	45	22 40
	30	Bononia Italia.	43	54	34 30
		Brandeburgum.	52	36	35 30
	0	Brema.	53	10	30 15
		Brixia.	44	30	32 30
		Brugæ Flandria.	51	19	24 45
	50	Brundisium.	40	0	42 30
		Brunsviga.	52	30	32 40
	57	Bruxella Brabant.	50	48	26
	40	Buda Hungaria.	47		42
		Burdigala.	44	30	18
	20	Byzantium, Constantinop.	43	5	56
		C.			
	0	Cæsar-Augusta, Saragossa.	41	45	14 15
	0	Caieta.	40	50	38 20
	30	Caletum Gallia.	52		16 2
		Calecut India.	11	0	104
		Calis Hispania.	17	0	5 10

An-

Dd 2

Cam-



Nomina locorum.

	Latitud.		Longit.	
	gr.	min.		
Campen Frisiz.	52	40	27	15
Cameracum.	49	40	25	
Candia in Creta.	35	15	54	10
Cantuaria Angliz.	53	40	21	
Capernaum.	34		70	48
Caput Bonæ spei.	35		38	
Caput Viride.	13			
Chalcedon, Scutari.	43	7	56	26
Coburgum.	50	20	31	30
Colonia Agrippinz.	50	56	28	15
Compostella S. Jacob.	42	30	10	15
Comorinum Indiz.	7			
Complutum Hisp.	41	40	10	30
Confluentia, Coblentz.	50	30	27	30
Conimbrica Lusitania.	40	0	10	45
Constantia, Costnitz.	47	30	32	0
Constantinopolis.	43	5	56	
Corduba Hispan.	37	50	9	40
Cochin Indiz.	9	30	116	38
Corfinium, Corfu.	38	45	45	10
Corinthus.	36	55	51	15
Corlicæ medium.	40	50	31	
Cracovia Poloniz.	50	0	46	
Cremona.	44		33	
Cuba insula.	22			
Cuzco Peruviz.	15			
D.				
Damascus.	33	20	69	30
Dantiscum.	54		44	
Daventria.	52	30	28	4
Drepanum promont.	37		37	
Dyrachium.	41	27	46	0
E.				
Eboracum Angliz.	57	20	20	
Ecbatana Tauris.	40	52	89	13

Eden.

No

Edenbu

Edessa.

Eislebi

Ephesiu

Epidaur

Erfordia

Euphrat

Famagu

Fessia Af

Finis te

Florent

Forum

Francof

Francof

Friburg

Gades.

Gandav

Geneva

Genua

Goa In

Gorlici

Gossari

Granat

Gronin

Halber

Hambu

Haffnia

Herbig

Heidell

Hispali

Hydrus

ongit.

Nomina locorum.

Latitud.

Longit.

			gr.	min.		
15	Edenburgum Scotia.	56	10	19	0	
	Edeffa.	38		74	47	
10	Eillebia.	51	46	32	30	
	Ephesus Ioniz.	37	40	67	40	
48	Epidaurus.	36	25	51	45	
	Erfordia.	51	10	34	30	
	Euphrates fluv.	31	15	84	10	
	F.					
26	Famagusta Cypri.	35	10	66	45	
30	Fessia Africa.	35				
15	Finis terraz.	44	2	4	23	
15	Florentia.	43	40	34		
30	Forum Julii.	45	12	32	50	
7	Francofurdia ad Mœnum.	50	8	29	30	
30	Francofurdia ad Oderam.	52	20	39	30	
45	Friburgum Brisgoiz.	48	1	28		
2	— Misnix.	50	58	39	39	
6	G.					
40	Gades.	22	20	6		
6	Gandavum.	51	8	25	30	
5	Geneva.	45	45	28	0	
1	Genua Italiz.	43	50	30	0	
1	Goa Indiz.	18	30	106		
6	Gorlicium Silesiz.	51	0	35	45	
3	Goslaria.	52	0	32	40	
	Granata Hispaniz.	37	50	111	0	
9	Groninga Frisiz.	53	12	28	0	
4	H.					
8	Halberstadium.	52	10	32	40	
7	Hamburgum.	53	44	33	0	
6	Hassnia Daniz.	55	43	36	45	
0	Herbipolis.	49	57	30	10	
0	Heidelberga.	49	22	31	45	
9	Hispalis.	38	5	13	15	
13	Hydrus Italiz, vulgo Orranto.	41	26	45	20	

## Nomina locorum.

	Latitud.		Longit.	
	gr.	min.		
J. I.				
Java.	10			
Jerosolyma.	31	55	70	30
Ilium.	41	0	55	50
Ingolstadium.	48	30	34	
Juliacum.	52		27	30
L.				
Lima Peruvia.	12			
Lipsia.	51	17	34	30
Lisbona.	39	0	11	30
Londinum Angliæ.	51	32	20	30
Lovanium.	50	50	26	30
Lubeca.	54		31	20
Luca.	43	30	33	
Lucerna Helvetiæ.	46	34	26	
Lugdunum Galliæ.	45	0	26	15
Luneburgum.	54		34	50
Lutetia.	48	52	23	15
M.				
Mechlinia.	51	15	26	50
Magdeburgum.	52	20	31	20
Mecha.	23		65	36
Magellanicum fretum.	54			
Moguntia.				
Majorca insula.	39	35	18	25
Malepum S. Thomæ.	14			
Manicongo Africa.	7			
Mantua.	44	30	32	45
Marpurgum.	51		30	10
Massilia.	42	20	26	45
Meaco Japoniæ.	36			
Mediolanum.	44	35	31	0
Melite insula & civitas.	34	40	38	45
Meroë Ægypti.	16	25	61	30
Messana.	38	30	40	30

Metæ.

Ne  
Metæ.  
Minor  
Molu  
Monac  
Monaf  
Mons  
Mons  
Monsp  
Mosco  
Mozar  
  
Nancæ  
Narbo  
Neapo  
Nicca.  
Negro  
Bæ  
Nola C  
Norim  
Novio  
  
Olmur  
Oxon  
  
Panar  
Palerr  
Peluz  
Pernar  
Philip  
Praga.  
Quit  
  
Ragul  
Rhod  
Riga

Nomina locorum.

Latitud.  
gr. min.

Longit.

	Metz. Metz.	49	12	27	30
	Minorca insula.	40	10	19	30
30	Moluccæ insulæ.	0	0		
50	Monachium.	48		32	50
	Monasterium.	52		28	10
30	Mons regius Borussiæ.	54	20	46	45
	Mons Pessulanum, sive	43	10	22	15
	Monspelim Galliæ.	42	40	25	
30	Moscovia.	56			
30	Mozambique Africæ.	15			
30	N.				
30	Nanczum Lotharing.	49	20	28	25
20	Narbona.	43	0	21	
	Neapolis.	40	50	38	15
	Nicea.	41	40	57	0
15	Negropontus insula, olim	38	15	53	40
50	Boeotia.				
15	Nola Campaniæ.	40	45	40	15
	Norimberga.	49	24	35	45
50	Noviomagus.	47	0	18	
20	O.				
36	Olmutz Moraviæ.	49	30	41	
	Oxonium Angliæ.	51	50	19	30
	P.				
25	Panama Americæ.	8			
	Palermo Sicilia.				
	Pelusium, Damiatæ.	31		64	50
45	Pernambucum Brasiliæ.	7			
10	Philippinæ insulæ.	12			
45	Praga. Q.	50	6	36	30
	Quito in Peru.	20			
0	R.				
45	Ragusa.	42	30	44	40
30	Rhodus insula.	36	0	58	0
30	Riga Livoniæ.	58	30	46	45



	Latitud. <sup>1</sup>		Longit.	
	gr.	min.		
Rupella, Rochelle.	45	15	18	15
Roma.	42	2	36	15
Rostochium.	54	0	34	45
Rhotomagus.	49	15	22	0
S.				
Saguntum.	39	40	14	36
Salmantica.	41	12	13	
Samos insula.	41	15	52	40
Sardinia.	38			
Sidon.	34	35	68	
Siene.	25	50	62	
Soffata Africæ.	20			
Spira.	49	20	27	40
Spoletum.	42	45	36	20
Stetinum.	53	36	36	45
Stockholmia.	58	50	37	
Strigonium.	47	20	9	15
T.				
Tanaïs ostia.	52	34	66	
Taprobana five Sumatra.	0			
Tarentum.	40		45	30
Tarragona.	41		16	20
Tauris.	41			
Tigurum Helvetiæ.	47	0	30	30
Trajectum.	53	20	26	30
Treveris.	49	30	26	
Tridentum.	45	20	33	40
Tubinga.	48	24	31	
Tunetum.	32	30	33	0
Tyrus.	34	8	68	0
V. U.				
Varna, Chiechia.	42	48	82	47
Veneriæ.	45	20	35	0
Vienna.	48	22	39	
Vilna.	53	30	52	

Ulyf-

No

Ulyfip  
Ulna  
Viaritia  
Witteb  
Worma  
Zeilon

Ufus  
dentib  
dinis c  
vimus  
horâ u  
Eclipsi  
conjun  
Planeta  
râ futu  
bulis  
hujus  
quam t  
nes due  
horæ m  
nius ac  
fi majo  
quænar  
illud in  
Ver  
Tabula  
Forn  
graphia  
licensio  
primæ  
declara  
Ex Astr  
tempo  
stellatu

Nomina locorum.

Latitud.

Longit.

	Latitud.		Longit.	
	gr.	min.		
15 Ulyssipolis, Lisbon.	39	38	5	20
15 Ulma.	48	24	31	45
45 Viatiflavia.	51	10	39	30
0 Witteberga.	51	54	36	
36 Wormatia.	40	45	28	
Zeilon insula.	7			

40 Usus Tabulæ latitudinis maximus satis in præcedentibus explicatus: præclarum quoque longitudinis cognitæ multorum locorum usum indicavimus in fine Proposit. III hujus. Ex gr. Datâ horâ unius loci vel ephemeridum, quæ erit cum Eclipsis Lunæ fiet, vel Solarietem ingreditur, vel conjunctio Solis & Lunæ, vel appulsus alicujus Planetæ ad Stellam fixam, &c. invenire quotâ horâ futura sit in alio loco, cujus longitudo in Tabulis annotata reperitur vel aliunde scitur. Ad hujus horæ cognitionem nihil aliud facimus, quam ut sumamus differentiam inter longitudes duorum illorum locorum, eamque in horas & horæ minuta convertimus, & horis datis loci unius addimus, si longitudo illius minor, contra si major sit, auferimus ab illis. Ita cognoscimus quænam hora sit in altero loco, ubi phenomenon illud incidit.

40 Verum capite sequenti illustrissimus usus hujus Tabulæ apparebit.

0 Porro, cum admodum necessarius sit in Geographia & arte nautica usus Declinationis & Ascensionis rectæ stellarum fixarum, adjungo hic primæ magnitudinis stellarum Catalogum cum declaratione & ascensione recta ad annum 1650. Ex Astronomia enim notum est, quod progressu temporis in hisce mutatio fiat propter motum stellarum proprium super polos Eclipticæ. In usu

vero ipso Tabulam talem omnium stellarum habere convenit, quia non semper commoditas iisdem stellis utendi. Nos vero hac tantum pro exercitio adolescentum ponimus, ut in hisce proposita problemata exerceant. Ad Astronomiam pertinet hoc negotium, sed usus tum in aliis tum in Geographia etiam insignis.

Astronomia vero docet, quomodo ad singulos annos inveniatur declinatio & ascensio recta.

Et ✓

---

 Oculu  
 Regul  
 Cauda

---

 Spica  
 Cor S  
 Lucid

---

 Arctu  
 Lucid  
 Cauda

---

 Capel  
 Pes O  
 Syriu

---

 Humo  
 Canis  
 Cano

TA-

TABULA DECLINATIONIS

*Et Ascensionis recta Stellarum, ad annum 1650.  
S denotat declinationem Septentriona-  
lem, A Australem.*

Nomina stellarum.	Declinatio, Asc. recta.			
<i>Prima magnitudinis.</i>	<i>gr.</i>	<i>min.</i>	<i>gr.</i>	<i>min.</i>
Oculus Tauri.	15.	46. S.	64.	0.
Regulus sive Cor Leonis.	13.	39. S.	147.	27.
Cauda Leonis.	16.	32. S.	172.	59.
Spica Virginis.	9.	17. A.	196.	44.
Cor Scorpii.	25.	34. A.	242.	4.
Lucida Aquarii.	31.	24. A.	339.	28.
Arcturus Bootis.	21.	4. S.	209.	59.
Lucida Lyrae.	38.	30. S.	206.	17.
Cauda Cygni.	44.	3. S.	307.	23.
Capella.	45.	35. S.	72.	44.
Pes Orionis sinister.	8.	38. A.	74.	29.
Syrius, Canis major.	16.	13. A.	97.	26.
Humerus dexter Orionis.	7.	18. A.	84.	7.
Canis Minor.	6.	6. S.	110.	17.
Canopus in Argo navi.				



## CAPUT XXXII.

*De situ Locorum mutuo & compositione  
globi terrestris & mapparum.*

## PROPOSITIO I.

**D**ato loco in Tellure, reliquorum locorum situm ad illum invenire.

Situs autem loci unius ad alterum dicitur *plaga* in qua hic ad illum jacet, sive *angulus positionis*, hoc est *angulus* quem facit *meridianus* dati loci cum *linea* sive *peripheria* ab hoc loco ad alterum ducta. Ex. gr. Si in urbe *Amstelodamo* simus, & cupiamus scire, quonam situ ad illam jaceant reliqua loca, nempe *Roma*, *Constantinopolis*, *Stockholmia*, & *Leida*, *Alcmaria*, *Haga Comitum*, *Ultrajectum*, &c.

*Modus Primus.*

Ad quæ loca *aspectus* ex dato loco conceditur, illorum *situs* ad hunc instrumentis accurate observari potest. *Goniometricum* enim constituatur in *excelsa turri* vel loco dati loci, ita ut *Horizonti* parallelum sit, atque *inventâ lineâ meridianâ* applicetur huic una instrumenti *regula*, altera vero *dioptras* habens dirigatur ad locum *conspicuum*. *Arcus peripheriæ* inter duas *regulas* interceptus est *angulus positionis* istius loci observati ad hunc, & ex eo *plaga* ejus nota erit.

Ita omnium vicinorum locorum *situs* sive *positio* observanda erit. Deinde in hæc loca conferemus nos, & ex hisce aliorum locorum *situm* rursus eodem modo observabimus, deinde in hæc atque ita per totam *Telluris superficiem* agere possemus, nisi alia *vix notæ* essent, quibus *facilius* ad *quæsitum* perveniri potest.

*Modus*

Si in  
locus  
eius  
applice  
pimus  
rizont  
quæsit  
polin  
istam p  
concip  
plaga S  
Occide  
bene  
concip  
de Pla

E m  
perian  
culis p  
nea m  
strum  
transv  
dicat  
hisce  
conspi  
neis &  
tur, li  
accura  
laribu  
In  
curate  
runtu

*Modus secundus.*

Si in globo habeantur proposita loca, addicatur locus datus ad meridianum, & polus elevetur pro eius latitudine, quadrans affigatur vertici, atque applicetur uni & aliis locis, quorum situm scire cupimus ad nostrum. Extremitas quadrantis in Horizonte monstrabit angulum positionis & plagam quaesitam. Dicemus itaque Romam, Constantinopolin, &c. jacere ab Amstelodamo versus hanc vel istam plagam inventam. Quam ut in ipso mundo concipiamus, nota debet esse meridiana linea sive plaga Septentrionis & Austri, item Orientalis & Occidentalis (nempe æquinoctialis). Ex hisce enim bene conceptis reliquæ intermediæ plagæ facile concipiuntur. Repetenda hic sunt ea, quæ capite xx, de Plagis dicta sunt.

*Modus Tertius.*

E mappis rectilineis, si loca proposita in eis reperiantur, facile est situm horum ad illum vel oculis perspicere. Per datum enim locum recta linea meridiana concipitur Septentrionem & Austrum monstrans, atque alia linea per eundem transversa sive parallelum loci denotans, quæ indicat plagam Orientalem & Occidentalem. Ex hisce plagæ intermediæ, in quibus singula loca conspiciuntur, facile concipiuntur, vel ductis lineis & quadrante peripheriæ accuratius cognoscuntur, si opus sit accuratiore cognitione. Non tamen accurata est hæc methodus nisi in mappis particularibus.

In curvilineis mappis minus apte, minus accurate plagæ vel situs locorum ad alium exquiruntur.

*Modus quartus.*

Data duorum locorum latitudine & longitudine, accuratissime invenitur situs unius ad alterum, calculo Trigonometrico, tam vulgari quam Logarithmico vel Catholico Planisphario, vel etiam globo. Habetur enim Triangulum Spharicum, in quo dantur tria: nempe complementa latitudinis utriusque loci & angulus comprehensus ab hisce, qui notus est ex differentia longitudinis. Quæritur autem angulus oppositus vel adiacens alterutri datorum laterum. Hic enim indicabit angulum positionis unius loci ad alterum & ipsam plagam. Diagramma & viva Præceptoris informatio facient hæc adolescentibus magis perspicua. Et hic elucet usus Tabulæ latitudinis & longitudinis locorum.

*Modus quintus.*

Ex data distantia loci à duobus locis, vel etiam ex data distantia & latitudine invenitur plaga ejus five situs ad alium locum per Spharicorum Triangulorum solutionem, ut ex Diagrammatibus adolescentibus informari possunt. Hic enim ea pluribus exponere supervacuum esse puto.

*Modus sextus.*

Data duorum locorum latitudine, & distantia, invenitur plaga unius ad alterum, triplici methodo, ut dictum est.

Possunt etiam alia data proponi, è quibus investigare possumus plagam.

## PROPOSITIO II.

*Dato loco in Tellure vel Globo exhibere omnia loca, qua ad datum locum in una aliqua data plaga vel dato situ jacent.*

Ex

Ex.  
stelodEle  
cus ad  
vertic  
Horiz  
quasi  
gini q  
pars i  
posituPro  
per da  
li, qu  
positi  
sunt qDa  
loca,  
seu pl  
Ex  
gula  
reali.Po  
poni  
lodan  
profu  
mum  
unaPr  
locus  
culi  
uno  
lidu  
enim  
perip  
ga d

Ex. gr. Cupimus scire omnia loca, quæ ab Amstelodamo jacent in plaga Euroboreali.

Elevetur polus pro dati loci latitudine, atque locus ad meridianum adducatur, quadrans affigatur vertici, & altera extremitas applicetur datæ plagæ Horizontis. Sic conspiciemus omnium locorum quæsitorum dimidiam partem, nempe quæ margini quadrantis adjacent in globo, altera dimidia pars infra Horizontem est ad punctum vertici oppositum.

Pro ipsa Tellure constructio facilior est: nempe per datum locum ducatur peripheria maximi circuli, quæ cum meridiano illius loci faciat angulum positionis datum. Omnia loca in semiperipheria sunt quæsitæ.

### PROPOSITIO III.

*Dato loco in Tellure vel globo, exhibere omnia illa loca, ad quæ datus locus unum aliquem datum situm seu plagam habet.*

Ex. gr. Cupimus scire omnia loca, ad quæ singula Amstelodamum jacet in plaga Zephyro-boreali.

Potest etiam Problema majori delectatione proponi ita: Dato loco in Tellure vel globo ut Amstelodamo, exhibere omnia illa loca, à quibus dum proficisci cupimus ad datum locum Amstelodamum, iter instituendum est à singulis locis versus unam eandemque plagam datam.

Præcedens problema erat locale planum, quia locus quæsitorum punctorum fuit peripheria circuli, quæ in plano exhiberi potest, & semper in uno plano sita est. Sed præsens problema est Solidum, vel potius ad superficiem. Quæsitorum enim punctorum locus in superficie globi non est peripheria aliqua circuli (excepto eo casu, si plaga data sit Septentrionalis vel Australis). Sed peculiaris

culiaris



cularis aliqua curva linea solida, hoc est, quæ non  
 in plana superficie sed curva, Sphærica nempe,  
 existere potest: neque tamen est Loxodromia (de  
 qua capite proprio dicemus) sed linea curva sui  
 generis utrinque terminata. Ad eam vero lineam  
 concipiendam vel ipsa loca in globi superficie, da-  
 tus locus adducatur ad meridianum. Deinde si  
 plaga data sit Orientalis, certum est quod quæsitæ  
 loca sita sint in parte globi versus occasum à dati  
 loci meridiano remota (contra si Occidentalis  
 plaga data sit) & si quidem plaga data sit una ex il-  
 lis, quæ ab ortu vel occasu vergunt versus Septen-  
 trionem, quæsitæ loca jacebunt inter Austrum &  
 dati loci verticalem primarium. Contra, si plaga  
 data sit una ex illis, quæ ab Ortū vel Occasū ver-  
 sus Austrum vergunt. Si itaque data plaga sit or-  
 tus vel occasus æquinoctialis, erit locorum quæsi-  
 torum locus curva aliqua linea incipiens à dato  
 loco & terminata in polo vicino, sita à parte Ori-  
 entali meridiani, si data plaga sit occasus, sed ab  
 Occidentali, si datus sit ortus, & concipienda  
 ut ista linea. ita: Sint quærenda vel exhibenda lo-  
 ca, à quibus Amstelodamum jacet versus occasum  
 æquinoctialem. Quoniam omnium locorum pla-  
 ga sive verticalis quadrans respiciens ortum vel  
 occasum æquinoctialem incidit in punctum Æ-  
 quatoris, quod nonaginta gradibus abest à meri-  
 diano singulorum locorum, ideo primo concipia-  
 tur à dato loco ducta plaga ad occasum æquino-  
 ctialem sive ad punctum æquatoris in Horizonte  
 situm. Certum itaque est, quod omnia loca quæ-  
 sita debeant ita sita esse à parte orientali Meridiani  
 Amstelodamensis, ita ut plaga eorum sive verti-  
 calis primarius occasum respiciens secet quadran-  
 tem Æquatoris inter puncta in Occidente & Me-  
 ridiano sita. A. singulis igitur hujus quadrantis  
 punctis concipiantur periphæriæ maximæ per Am-  
 stelo-

stelodam  
 quam p  
 concep  
 nos, su  
 quales  
 finita e  
 hanc cu  
 non ori  
 æquino  
 agimus  
 rum me  
 90 grad  
 incurra

Ubi  
 nes dat  
 lodame  
 plaga g  
 locorum  
 mota.  
 Amstel  
 sita sita  
 nus, q  
 graduu  
 interce  
 erit ter  
 eum in  
 poterit  
 steloda  
 cularis  
 versus  
 loca qu  
 cujus l  
 2 pars  
 & polu  
 Amstel  
 vicinur  
 In h

Amstelodamum transeuntes, & ex eisdem punctis tanquam polis meridiani ducti. Puncta, in quibus prius conceptæ peripheriæ secant suos singulæ meridianos, sunt quæ sita: ea autem faciunt curvam talem qualem dixi, quæ in polum se induit, neque infinita est. Unde patet manifestum discrimen inter hanc curvam lineam & Loxodromiam. Hæc enim non oritur in itineribus versus ortum vel occasum æquinoctialem institutis. Hujus autem, de qua jam agimus, omnes species ita se habent, ut inter duorum meridianorum, quorum distantia non superat 90 gradus, quadrantes contineantur & in polum incurrant.

Ubi autem plaga aliqua intermedia inter Cardines datur, ex. g. quæruntur loca, quibus Amstelodamum jacet versus Zephyro-astrum, sive in plaga gradibus quadraginta quinque à singulorum locorum meridianis versus occasum ab Austro remota. Primo itaque concipiatur à parte meridiani Amstelodamensis orientali (in hac enim loca quæ sita esse debere manifestum est) alius meridianus, qui cum Amstelodamensi faciat angulum 45 graduum, sive inter quem & Amstelodamensem interceptus arcus Æquatoris sit 45 graduum. Hic erit terminus quæsitum locorum, neque ultra eum in aliquo meridiano aliquis locus reperiri poterit quæsito satisfaciens. Concipiatur ab Amstelodamo in istum meridianum ducta perpendicularis peripheria. Porro quia plaga data vergit versus Austrum ab occasu, inde certum est, quod loca quæ sita debeant sita esse in spatio Trianguli, cujus latera sunt 1. ducta modo perpendicularis. 2. pars meridiani istius inter ductam peripheriam & polum vicinum intercepta. 3. pars meridiani Amstelodamensis inter Amstelodamum & polum vicinum.

In hoc spatio linea curva, cujus omnia puncta quæ-

quæsito satisfaciunt, sita est, quæ ab Amstelodamo ad polum usque curvo itinere prorepet. Ad descriptionem illius, concipiendi vel ducendi sunt multi Meridiani in hoc spatio, & in singulis tale punctum assumendum, ex quo ducta peripheria maxima ad Amstelodamum faciat cum meridiano eo ex quo ducitur, angulum 45 graduum pro nostro exemplo. Ita enim plurima puncta describendæ hujus curvæ invenientur.

Pluribus de linea hac curva egimus in libro de Lineis Curvis. Hic autem, quia proprius ejus explanationis, quippe ad Geographiam pertinentis, locus erat, non debuit omitti.

#### PROPOSITIO IV.

*Datâ latitudine loci unius, & distantia ab altero loco, atque plaga, in qua alter hic locus ab eo situs est, inveniri plagam alterius hujus loci, in qua prior locus ad hunc alterum situs est.*

Facilior erit ex exemplo intelligentia; nempe datur plaga, in qua urbs Hamburgum sita est ab Amstelodamo: quærimus plagam, in qua Amstelodamum urbs sita est ab Hamburgo. Vulgaris enim est opinio, quod contraria plaga sit sumenda, quod falsum est. Et in hoc admodum peccant Mappæ nauticæ & omnes rectilineæ. solutio vera per calculum Trigonometricum vel per Globum aut planisphærium est facilis.

#### PROPOSITIO V.

*Globum terrestrem componere.*

Ita vulgo de problemate hoc loquuntur confuse admodum. Stylo Mathematico autem ad distinctam intelligentiam ita proponendum est:

Dato in cujusvis Globi superficie puncto aliquo, quod aliquem in Telluris superficie situm locum representare ponitur (vel data semiperipheria),

pheria),  
cta quo  
ad se m  
ficie Te  
sita su  
vicem.

Opti  
est, qu  
tudine  
quæsita  
tantia c  
ciendis  
vendun  
id præf  
venditi  
non qu  
pensæ  
torum  
compo  
nimæ i  
men fu  
globo c  
ea ubi  
dine ex  
cie loca  
mathes  
bo, te  
n curav  
diamet  
sive in  
raque  
cietate  
sulæ cu  
Pratore  
Belgio

pheria), invenire in ejusdem Globi superficie puncta quotvis & lineas, quæ ad datum punctum & ad se mutuo ita sita sint, ut loca & lineæ in superficie Telluris, quæ debent ab illis representari, sita sunt ad locum primo assumptum, & ad se invicem.

*Modus primus.*

Optima, facillima & accuratissima methodus est, qua ex cognita locorum latitudine & longitudine in ipsius globi superficie loca & puncta quæ sita sive Telluris superficie partes representantia consignantur, quam etsi artifices in conficiendis globis terrestribus qui magno numero divenduntur, non adhibeant (quoniam alio modo id præstari potest, ubi ex copia distractionis vel venditionis sumtus & impensæ refunduntur, qui non quidem majoris est facilitatis & minoris impensæ ad unius globi confectioem, sed ad multorum & innumerorum ejusdem magnitudinis compositionem aptissimus, promptissimus, & minimæ impensæ, de quo tertio loco dicemus); tamen fundamentum ejus constructionis ex hac in globo concepta descriptione dependet, & præterea ubi peculiare globi terrestres insigni magnitudine ex ære conficiendi sunt, atque in ejus superficie loca Telluris designanda, sicut Principes Philomathematici eos habere solent, & hoc, quo scribo, tempore Societas Belgica Indiæ Orientalis fieri curavit Directore Blavio æneum globum, cujus diameter erat quinque pedum, terrestrem nempe, sive in cujus superficie depicta & incisa erant pleraque superficie Telluris loca, qui globus à Societate dicta missus fuit in Indiam ad Regem insulæ cujusdam dono, quia Rex illius societatis Prætozem Indicum rogaverat ut talem Globum in Belgio fabricandum & ad se deferendum curaret,

pre-



pretium large & liberaliter pollicitus. Præterea hoc ipso tempore Illustrissimus Dux Holsatiæ Fredericus, omnis eruditionis, inprimis Mathematices & Physices, non tantum fautor & promotor, sed etiam peritissimus & diligentissimus Cultor, quem ideo honoris causa nomino, fieri curat sibi Globum, cujus cavitatis tantæ esse debet (diameter est pedum) ut in ea aliquis sedere possit commode, & in cava superficie omnes stellæ fixæ appingentur colore aureo vel stellulæ factæ locis convenientibus exiguo stylio infigentur, & Sol in Zodiaco mobilis vel trusatilis, atque instrumento addito exiguo circumrotabitur viginti quatuor horis: ita ut spectator intra cavitatem sedens videat stellas in alio atque alio situ nempe oriri, ad meridiem ascendere, occidere, non aliter sicut nos in ipso celo stellas facere videmus; Exterior autem superficies, ut ad nostrum propositum veniam, omnia Telluris loca exhibebit, ita ut globus iste simul cælestis & terrestris futurus sit: quando, inquam, in magnorum talium globorum superficie loca incidenda vel depingenda sunt, non possunt tunc vulgari suo modo uti artifices per Mapparum chartacearum applicationem, neque id in tam magnis & spectandis operibus consultum foret: sed debent tunc in illis globis incidi & coloribus illustrari loca, peripheriæ, ductus fluviorum, &c. quæ in Tellure reperiuntur. Id autem ex Tabula longitudinum & latitudinum (adhibito simul globo alio vulgari, in quo ductus fluviorum, marium, atque Terrarum conspiciantur) fit commodissime ita:

Per datum (vel assumptum pro libitu, si non datum sit) punctum in superficie describatur peripheria maxima globi, quam constituemus pro meridiano istius loci. Deinde sumatur in hac arcus à puncto illo, æqualis latitudini loci, quem punctum

ctum ill  
tetur, a  
eadem  
mento  
arcus t  
ris Arc  
quia ita  
Telluri  
nitur.  
globi.  
punctu  
fecat.

Itaq  
illo ad  
maxim  
potest  
Æquat

Dein  
positus  
& cent  
extanti  
artifice  
habens  
applica  
drantu  
initia i  
quator  
dati lo  
mere p  
assume  
& lati  
designa  
numeri  
latitud  
ti non  
Tabula  
tore to

Etum illud representare ponitur: & terminus notetur, atque ab eodem puncto ab altera parte in eadem peripheria sumatur arcus æqualis complemento latitudinis sive distantie loci à polo. Hujus arcus terminus erit punctum, quod polum Telluris Arcticum vel Antarcticum representare debet, quia ita situm est ad datum punctum, sicut polus Telluris ad locum, qui à puncto representari ponitur. Vocabimus itaque istud punctum, polus globi. Terminus vero prioris arcus notatus indicat punctum, in quo Æquator Meridianum dati loci secat.

Itaque ex polo Globi intervallo circini à polo illo ad terminum dictum describatur peripheria maxima in globo (quæ tamen facilius describi potest & ab artificibus describitur) quæ erit linea Æquatoris sive Æquator globi.

Deinde sumatur in meridiano polus priori oppositus, & ab uno ad alterum per globi cavitatem & centrum trajiciatur axis ferreus, atque in ejus extantibus partibus affigatur meridianus æneus ab artifice diligentissimo paratus & in gradus divisos habens singulos quadrantes. Debent autem axi applicari illa puncta, ubi o, o, est, sive ubi quadrantum divisiones desinunt, ita ut primi gradus initia ipsi Æquatoris lineæ exacte immineant. Æquator accurate dividatur in gradus. Porro sive dati loci meridianum sive alterius loci velis assumere pro primo, perinde fuerit, sed præstat illum assumere pro primo, quem Tabulæ longitudinum & latitudinum, quibus utendum est in locorum designatione, agnoscunt pro primo, sive à quo numerant reliquorum locorum longitudinem & latitudinem. Si itaque meridianus loci primo dati non est is, quem Tabulæ agnoscunt, sumatur ex Tabulæ longitudo loci primo dati, atque in Æquatore totidem gradus numerentur ab eo puncto,  
ubi

ubi meridianus primi loci eum secat. Terminus numerationis erit punctum pro meridiano primo Tabularum. In quam vero plagam debeat fieri numeratio, notum est, nempe versus occasum: at quamnam pars Globi pro Occidentali, quamnam pro Orientali à primi loci meridiano habenda sit, ita cognosces. Globum ita pone ut meridiani semicirculus punctum primum continens sit superior, alter inferior, atque aspice Globum, polus autem Arcticus vicinior esse debet, Antarcticus remotior, siquidem datus locus sit polo Arctico vicinus; sed si polo Antartico, tunc Antarcticus polus vicinior nobis poni debet, ita illud hemispharium quod à dextra est, pro Occidentalibus locis assumendum, alterum pro Orientalibus.

Cæterum meridiani primi sectione in Æquatore notata, ascribantur gradibus Æquatoris numeri incipiendo à sectione illa, nempe 10, 20, 30, &c. Deinde pro quovis alio loco in representando ita agendum. Excerptatur ex Tabula loci illius longitudo & in Æquatore numeretur à primo Meridiano. Terminus numerationis constituatur sub meridiano, & in hoc ab Æquatore numerentur gradus latitudinis illius loci, quos ibidem è Tabula excerptimus. Punctum globi, quod subiectum tunc est meridiani puncto, ubi latitudinis numeratio desit, representabit locum illum Telluris. Atque ita cum omnibus locis, ostiis & fontibus fluviorum agendum est, & appellationes calatura addi. Ita Problemati satisfactum: Namque singula loca in Globo ita sita erunt, sicut in ipsa Tellure.

In praxi tamen non ita omnino agendum in principio, quia præstat assumere pro puncto primo ipsum polum, sive id, quod polum representet: & in ipsa Globi confectioe axis additur, cujus extremitates signant polos. Atque meridianus  
primus

primus T  
que dein  
ex Tabul  
ad imita  
longitudo  
ram trac  
tate Indi

Hic n  
num vel  
aptus est  
adhiberi  
Ducatur  
vel arcus  
puncto s  
loci à da  
locus alt  
signare v  
lius terti  
quam ce  
cini. Pur  
tertii loc

Ut di  
tegram  
jam con  
qui in il  
tia nota  
periunt  
nobis v  
tertii igr  
calculi.  
sitam it  
gitudine  
tunc hor

Data  
bo repe

primus Tabularum statim in Globo signandus, atque deinde reliqua loca, ut dictum est. Raro autem ex Tabulis tales magni Globi fiunt, sed plerunque ad imitationem alterius minoris Globi, ex quo longitudo & latitudo desumuntur, & fluviorum tractus, &c. Sic ille, quem Blavius pro Societate Indica fieri curavit.

*Modus secundus.*

Hic modus ad quædam potius loca, nempe unum vel alterum, in globo signanda ex aliis datis aptus est, quam ut ad totius Globi constructionem adhiberi debeat: Utitur autem locorum distantis. Ducatur per datum punctum peripheria maxima vel arcus peripheriæ maximæ, atque in hoc à dato puncto sumatur arcus, quanta est alterius cujuscvis loci à dato primo distantia. Terminus arcus erit locus alter. Deinde si tertium quemcunque locum signare velis, sume intervallo circini distantiam illius tertii à duobus jam signatis, atque ex hisce tanquam centris describantur arcus intervallis istis circini. Punctum, in quo hi arcus se mutuo secant, est tertii loci punctum.

Ut dixi, non commodus est hic modus ad integram Globi designationem; sed ubi in Globo jam confecto volumus designare aliquem locum, qui in illo nondum habetur, & id ex sola distantia nota illius loci à duobus aliis, quæ in globo reperiuntur, præstare cupimus, quia facile est, neque nobis vacat longitudinem & latitudinem hujus tertii ignoti numeris investigare propter molestiam calculi. Sic enim hoc modo reperiemus facillime situm istius puncti vel loci in Globo, & simul longitudinem & latitudinem; nimirum Problema tunc hoc est:

Data loci distantia à duobus locis, quæ in Globo reperiuntur, designare in Globo situm illius loci,



loci, cujus distantia datur, de quo sequenti capite.

*Modus tertius, vulgaris Artificum.*

Tertius modus in dato Globo superficiem & loca Telluris exhibendi & representandi est ille, quo artifices utuntur ad Globos illos omnes, quos videmus (exceptis illis magnis, de quibus dictum est) tam terrestres quam caelestes conficiendos, qui equidem nihil habet compendii vel commendationis à facilitate, si in unius tantum Globi superficie representanda sint loca Telluris, sed si in multorum ejusdem magnitudinis Globorum superficie id faciendum sit, qui magno numero divenduntur, ingentem habet praxis hæc præ prioribus prærogativam. Etenim modus hic ita se habet: Concipitur superficies Globi & Telluris divisa esse in duodecim partes (vel plures, si majoris formæ Globi sint conficiendi) per meridianos à polo ad polum ductos, ut ita binis quibusque meridianis sit inclusa duodecima pars superficiei à polo ad polum. Deinde in plano delineatur similis figura tali duodecimæ parte duobus arcibus (qui deinde in Globo faciunt semiperipherias Meridianorum) inclusa, & multis meridianis per singulos Æquatoris gradus ductis atque parallelorum portionibus sive segmentis divisa speciem cancellorum præbet: æquatoris portio in medio est: in polis coeunt omnes meridiani. Deinde sumto uno meridiano pro primo, quem Tabulæ longitudinum agnoscunt, notantur ab eo in Æquatore gradus ascriptis numeris, ut ita in Æquatore gradus longitudinis singulorum locorum numerari possint. Deinde in singulis hisce duodecimam Globi superficiei partem representantibus planis notantur loca pro locis Telluris ad suos quæque gradus longitudinis & latitudinis, quæ excerpuntur è

Ta-

Tabula,  
finuum m  
ce ita ir  
ita illud  
minas,  
ta exem  
postea G  
rur, ita  
Globi, i  
ex non at  
attingant  
pro spati  
ita applic  
in Globi  
Juris loca  
Horizon e  
dex.

Duo su  
explicatio  
ta satis &

1. Quo  
illæ partes  
exemplar

2. Quo  
væ globi su  
Primum

sa, appli  
portio à pe  
Globi diam  
quantitas  
tionem pe  
causa diam  
longitudo  
digitos, &  
partes sint i  
ad 22, ita  
des pro pe

Tabula, & locis ascribitur nomen, fluviorum & sinuum tractus ducuntur, ut etiam terrarum. Hic ita in charta vel ligno descriptis, fit deinde juxta illud exemplar incisio & calatura in æris laminas, atque deinde typographico artificio infinita exemplaria in chartam excuduntur. Quæ chartæ postea Globi superficiæ applicantur & conjunguntur, ita ut extremitates attingant axem sive polos Globi, in plerisque tamen constructionibus chartæ non attingunt polos, sed tantum fiunt ita, ut attingant circulos Arcticum & Antarcticum, & pro spatiis polaribus peculiare chartæ sumuntur. Ita applicatio est facilior, præsertim in magnis. Ita in Globi istius superficiæ exhibita sunt omnia Telluris loca, cui deinde additur meridianus æneus, Horizon cum pedimento, cyclus horarius, & Index.

Duo sunt in hac Descriptione, quæ pleniorém explicationem requirunt (reliqua omnia puto clarescatis & intelligibilia esse).

1. Quomodo in plano describantur duodecimæ illæ partes vel etiam viginti quatuor, ad quarum exemplar deinde incisio fit in æs?

2. Quomodo chartæ planæ possint applicari circum globi superficiæ?

Primum fit ita satis commode. Sit exempli causa, applicanda Globo duodecima hemisphærii portio à polo ad Æquatorem. Primo, ex cognita Globi diametro inveniatur peripheriæ maximæ quantitas juxta Archimedeam vel aliam proportionem peripheriæ ad diametrum. Sit exempli causa diameter Globi duorum pedum: & pedis longitudo in charta notata dividatur in decem digitos, & digitus in decem grana, ut centum partes sint in pede, & ducenti in duobus. Fiat, ut 7 ad 22, ita 200 ad 628 $\frac{4}{7}$  centesimas, sive 6 $\frac{28}{100}$  pedes pro peripheria. Hujus quarta pars, hoc est,

quadrans peripheria erit  $157\frac{1}{2}$  centesimalium, sive  $1\frac{57}{10071}$  pedum, & duodecima pars  $52\frac{19}{24}$  centesimalium sive  $\frac{1}{2}$  ped. & 2 centesimalium &  $\frac{29}{11}$  unius centesimalium. Hisce inventis in charta ducatur linea longa  $52\frac{19}{24}$  centesimalium (ex ascripta scala); ex hujus lineae medio erigatur perpendicularis longa  $157\frac{1}{2}$  centesimalium, quae erit quadrans (eius extremitas erit polus), & dividatur in gradus (unius gradus longitudo habetur, si  $628\frac{1}{2}$  dividat per 360). Deinde ex polo per singulorum graduum vel decimi cujusque initium describatur peripheria (paralleli erunt), & in hisce peripheriis à ducta perpendicularis utraque parte circino abscindatur ea portio, quanta est  $\frac{1}{24}$  peripheriae. Quanta autem sit in apposita scala cognoscetur ex proportione parallelorum ad Aequatorem, quam tradidimus capite IV in fine. Signatis ita, in qualibet peripheria vel arcu punctis, ducenda est perea linea, & chartae pars lineis hisce terminata abscindenda. Hæc enim Globo applicata occupabit  $\frac{1}{2}$  hemisphaerii. Applicatio autem fit non difficulter, nempe si parvæ sint portiones, in hisce enim differentia illa inter rectum & curvum parum sensibilis est, Telluris præsertim cum charta prius humectetur: ita prompte applicatur. Loca vero in charta illa, antequam applicetur, consignantur ad debitos gradus longitudinis & latitudinis.

## PROPOSITIO VI.

*Mapas Geographicas componere.*

Mathematico stylo ita proponemus problema;  
*Dato situ plani infiniti sive pro lubitu producendi, representare in illo loca superficies Telluris juxta Perspectivæ leges.*

Vel

Vel ad  
 ito, quod  
 tare ponit  
 finita al  
 commodiss  
 Telluris lo  
 cum & ac  
 tur sensus

Quoni  
 & cultori  
 men ulla  
 tiam. de  
 sione &  
 commod  
 menta no  
 dam in h  
 sunt expl  
 tum est,  
 mibus o  
 videntur  
 ut pictura  
 invicem,  
 orulo in  
 poris, qu  
 imis Perse  
 tinere vel  
 simant,

Quando  
 quod cuj  
 Tabula (f  
 deam men  
 illud consp  
 ceptum ocu  
 fiat, assign  
 finitum al  
 quia meli  
 lucidum et

Vel adhuc generalius: Dato in plano aliquo puncto, quod locum aliquem superficiei Telluris representare ponitur, invenire in eodem plano (infinito), infinita alia puncta & lineas, quae quam fieri potest commodissime & ad vivum representent superficiei Telluris loca & lineas, sive horum situm ad datum locum & ad se invicem. Ita, ut puto, melius intelligitur sensus Problematis.

Quoniam paucissimi ex Geographiae studiosis & cultoribus callent leges Perspectivae, neque tamen ullam distinctam cognitionem vel intelligentiam de Mapparum Geographicarum constructione & natura adipisci possunt vel de earum commoditatibus & vitiis judicare, nisi fundamenta norint, juxta quae fiunt, ideo pauca quaedam in hac doctrina necessaria è Perspectiva arte sunt explicanda. Versatur ars illa, ut cuivis notum est, in representandis in Tabula aliqua omnibus objectis vel corporibus hujus mundi, quae videntur vel quae saltem concipiuntur, nimirum ut picturae partes ita conformatae sint & sitae ad se invicem, atque ita etiam visui nostro appareant, oculo in certo loco constituto; sicut ipsius corporis, quod representat, partes. Hic quidem est finis Perspectivae: Methodus autem, qua illum obtinere vel praestare allaborant, atque assequi se existimant, est haec:

Quando punctum, superficiem, vel corpus aliquod cujuscunque figurae representare volunt in Tabula (sive illud aspiciant, sive tantum ejus ideam mente comprehenderint) concipiunt primo, illud conspici ab oculo uno tanquam puncto, & ceptum oculo locum sive situm, ex quo aspectus fiat, assignant. 2. Deinde concipiunt planum infinitum aliquod, sive tabulam (vitrum vocant, quia melius est ad conceptionem, si planum pellucidum esse intelligatur) inter oculum & obje-



etiam representandum interponi in certo aliquo situ. 3. Denique concipiunt à singulis objecti punctis radios sive lineas duci per planum illud ad oculus. Puncta plani hujus per quæ radii ita penetrare ad oculus concipiuntur, dicunt esse punctorum ipsius objecti representationem sive umbram, ut loquuntur, & connexis punctis hæc per lineas, figuram, quæ inde oritur, in Tabula censent ipsius objecti corporis vel superficiæ representationem esse in tali situ oculi, atque oculo in eo situ manenti non aliter apparere hanc figuram plani sive Tabulæ in situ suo manentis, ac si ipsum objectum adspiceret (quod tamen optica non omnino in omnibus verum esse docet, & facile est intelligere ex diversa plani interjecti positione. Sed quia melior methodus representandorum objectorum nondum inventa est, ideo illa contenti sumus oportet). Exempli causa, sit superficies Telluris & omnes ejus peripheriæ atque loca in Tabula representanda. Concipimus itaque primo, oculus tanquam punctum extra Tellurem in aëre hætere vel situm esse in loco quovis. Deinde inter oculus & Tellurem extendi Tabulam aliquam sive planum vitreum, cujus situs etsi prohibita assumi potest, tamen ita in praxi ad meliorem & ordinatam atque æquabilis formæ figuram assumitur, ut perpendiculare sit ad lineam, quæ ex oculo ad centrum Telluris ducitur. Denique à singulis superficiæ Telluris punctis sive locis & peripheriis (ut à punctis Æquatoris, Tropicorum, circulum polarium, item meridianorum, sicut etiam ab omnibus urbibus, ostiis fluviorum, fontibus, &c.) concipimus duci lineas vel emitti radios per tabulam sive vitrum ad oculus. Illi radii perforabunt Tabulam in certis singuli punctis. Hæc puncta itaque sunt umbræ seu representationes locorum superficiæ Telluris, & si puncta illa,

quæ

quæ à  
ab Æ. quæ  
ab aliq  
ita lin  
periph  
Tabula  
habebit

Qui  
uris lu  
uno pla  
luris lo  
rent, &  
falsa fa  
superfic  
alia rep  
intra ip  
num ho  
oculus  
catus,  
present  
tum par  
beat in  
centro T  
ita place

Ex hi  
re natur  
Telluris  
duo su  
do hæc d  
veritas

Dixit  
pro loco  
ut extra  
nix, E  
quodvis  
eo infini  
superfici

quæ à radiis ab una aliqua peripheria emissis (ut ab Æquatore, vel à Tropico uno, vel à polari, vel ab aliquo Meridiano) facta sunt, conjungantur ducta linea, sive ea recta fiat, sive curva, hæc erit illius peripheriæ representatio sive umbra, atque ita in Tabula omnes Telluris circulos atque omnia loca habebimus representata.

Quia autem Tellus est rotunda, ideo tota Telluris superficies cum omnibus locis non potest in uno plano commode representari, quia duo Telluris loca unum idemque punctum in plano facerent, & quæ ultra hemisphærium sita sunt, nimis falsa facie representarentur: propterea dimidia superficies Telluris in Tabula aliqua, & altera in alia representari debet. Atque adeo oculus potest intra ipsam Tellurem assumi, nempe quando unum hemisphærium suscipimus representandum, oculus in altero hemisphærio concipitur collocatus, & Tabula inter illum & hemisphærium representandum. Idem intelligendum est, si tantum pars superficiei, ut Europa, Asia, Hispania debeat in Tabula representari. Tunc enim in ipso centro Telluris possumus oculi locum assumere, si ita placeat.

Ex hisce puto Lectores clare satis posse intelligere naturam & modum hujus perspectivæ artis, quæ Telluris loca in plano representantur. Cæterum duo sunt plenius explicanda ex illis, quæ in methodo hæc diximus, quia inde dependet varietas & diversitas Tabularum Geographicarum.

Diximus ad representationem assumi punctum pro loco oculi extra objectum representandum, ut extra hemisphærium Telluris, vel extra Hispaniæ, Europæ superficiem. Quoniam itaque circa quodvis objectum infinitum est spatium, atque adeo infinita sunt puncta, in quibus oculus Telluris superficiem (vel Europam, Asiam, si particularis

Tabula sit facienda (contemplans poni potest, & vero si ad diversa puncta ab eisdem objecti sive superficies punctis ducantur radii qui tabulam eandem penetrent, admodum diverso in loco & situ penetratio radiorum fit, atque adeo admodum diversa & dissimilis figura in Tabula inde oriuntur, inde fit, ut pro vario oculi situ, (quem ei attribuimus extra Tellurem vel extra illam partem, quæ representari debet) varia existat superficies illius in Tabula representatio.

Sicut enim alia existit frontispicii & parietum domus alicujus representatio, quando oculus eam directe opposito è situ contemplari ponatur; alia, si obliquo è situ, alia si è loco superio, alia si ex infero, & alia atque alia pro diverso oculi situ (quod Præceptores discipulis suis aptis Diagrammatibus explicare possunt); ita quoque alia oritur partium Telluris in Tabula representandarum positio, si oculus constituitur vel concipiatur in aëre tali situ ut ipsi Aequatori Telluris imminet, alia si in axe Telluris protenso vel in alterius hemisphaerii semiaxe existere fingatur, alia si loco alicui Telluris alteri imminere concipiatur. Inde enim fit ut tam aequator & paralleli, quam meridiani diversas nanciscantur representationes, quoniam radii ab eis in Tellure existentibus ducti ad oculum, in diversis & diverso situ præditis punctis perforant Tabulam, quod quidem Lectores hoc negotium bene animo concipientes facile intelligent, præcipue si accedat viva præceptoris informatio & ostensio.

*Alterum, quod lectoribus ad meliorem intelligentiam considerandum esse in hac methodo existimo, est de causa varietatis in magnitudine Tabularum sive representationum: eandem enim Telluris superficiem sicut & omnia corpora mundi, ut ædes, templum, &c. in magna & parva Tabula exhibe-*

re possit  
à Tellur  
ponitur  
presen  
sive vit  
fieri re  
propius  
accipit  
objecto.

Cate  
objecto  
centro  
una per  
maneat  
tur, se  
manet.  
tur ocul  
stura o  
sed tam  
omnia lo  
la in acc  
observat  
piat, ite  
etiam à  
orientur  
suum in  
magnitu  
in situ l

Verum  
etiam in  
consuev  
situm, v  
cto, ad  
est ad sup  
centrum  
majorem  
mus ma

re possumus. Causa ejus est duplex. 1. Quo oculus à Tellure & quovis objecto longius remotum esse ponitur, eo minorem magnitudinem accipit representatio, nempe manente eodem situ Tabulæ sive vitri. 2. Quo Tabula sive vitrum (in quo debet fieri representatio per radiorum perforationem) propius admovetur oculo, eo minorem formam accipit representatio sive projectura; quo propius objecto, eo majorem.

Cæterum si oculus utcumque removeatur ab objecto (manente Tabula); modo in eadem cum centro Telluris linea removeatur, sive modo in una perpendiculari ad superficiem Telluris lineam maneat, non ideo ipsa figura projecturæ immutatur, sed magnitudo tantum, similitudo autem manet. Ita quoque si tabula utcumque admoveatur oculo vel versus objectum removeatur, projecturæ omnes diversæ quidem fiunt magnitudinis, sed tamen similes manent inter se invicem & omnia loca simili situ representant, si modo tabula in accessu vel recessu ab oculo situm parallelum observaverit. Sed si Tabula aliam positionem accipiat, item si oculus non tantum moveatur, sed etiam à linea illa perpendiculari recedat, tunc non orientur similes projecturæ, neque loca similem situm in Tabulis habebunt, sed præter diversam magnitudinem erit quoque insignis dissimilitudo in situ locorum, unius ad reliqua.

Verum in projecturis omnium corporum, ut etiam in superficiem Telluris projectura, ita fieri consuevit, ut Tabulæ sive Vitro tribuamus talem situm, ut corpus sive superficiem tangat in eo puncto, ad quod ducta linea ab oculo perpendicularis est ad superficiem corporis, sive quæ ab oculo ad centrum Telluris ducitur: ad minorem vero vel majorem projecturam nanciscendam removeamus magis vel minus oculi punctum à Tellu-



re. Sed concipimus tunc Tellurem valde parvam esse.

Hicce in genere de projectura Telluris & origine Mapparum Geographicarum explicatus, ipsam methodum illud præstandi edocebimus: ubi primo illud movendum est, an Tabulæ hæc fieri debeant juxta Perspectivæ leges, & an omnes fiant juxta eas. Tabularum enim harum finis est, ut quam fieri potest aptissime & ad vivum exprimant situm locorum in superficie Telluris: quaeritur itaque non immerito, An hoc non possit fieri alia methodo, quæ perspectivæ leges non observet? sive enim fiat juxta perspectivæ leges, sive contra eas, modo apte repræsentet locorum situm, recte & bene facta esse censetur Tabula. Ad illud respondeo, etsi particulares quædam Tabulæ parvæ alicujus provinciæ possint fieri atque etiam fiant alia methodo, nempe per angulos positionis, vel etiam per distantias, ut ultimo loco dicemus, tamen in magna parte superficiæ Telluris non posse id alia methodo commodiori fieri, quam juxta leges Perspectivæ, etsi verus locorum situs in Tabulis juxta leges hæc factis, non repræsentetur.

Sciendum enim est ad triplicem finem respiciendum esse & attendendum in confectioe harum mapparum. 1. Ut omnia loca ad præcipuos Telluris circulos, nempe ad Æquatorem, parallelos, meridianos, habeant talem situm & distantiam sicut in ipsa Tellure, ut ita ex illis Tabulis locorum singulorum parallelus, distantia ab Æquatore, à Polo, Zona, Clima, &c. conspici possit, quoniam inde dependent plurimæ proprietates regionum, & apparentiæ celestes. 2. Ut magnitudines singularum regionum eam proportionem habeant, quam in ipsa Tellure. 3. Ut loca quælibet eum ad se invicem situm, eam

eam que  
Tellure.

Ex h  
præstare  
quonia  
locorum  
illud in  
dem præ  
serventur  
remotio  
tionem,  
tamen in  
oculus,  
concipia  
bulæ ma  
tuor Tell  
præstare  
que id præ  
bulis ea  
scription  
hic in ge  
habemus  
salibus il  
quod occ  
illum in  
bulæ situ  
cipere de  
que, non  
Porro  
cesint lec  
compara  
& clarior

M

Primo  
Sphærii

eam quoque distantiam habeant, quam in ipsa Tellure.

Ex hisce tribus requisitis primum accurate præstare debent Tabulæ & plerunque præstant, quoniam ex Tabula longitudinis & latitudinis locorum conficiuntur, neque Perspectivæ leges illud impediunt. Secundum vero accurate quidem præstare nequeunt, si Perspectivæ leges observentur, quia superficiæ curvæ partes ab oculo remotiores faciunt in vitro minorem representationem, quam partes oculo directe subjectæ: ea tamen inæqualitas exigua est & fit insensibilis, si oculus, infinito intervallo à Tellure remotus esse concipiatur. Tertium autem requisitum nullæ tabulæ majores, ut sunt totius Telluris, item quatuor Telluris partium, & majorum provinciarum, præstare possunt, etsi in parvis regionibus utcumque id præstent, & vulgus in magnis quoque Tabulis ea haberi posse opinetur. Verum in ipsa Descriptione hæc plenius explicabimus. Id tantum hic in genere monemus, in omnibus Tabulis, quas habemus, & quæ ab artificibus venduntur, universalibus illum locum sumendum esse pro puncto, quod oculo directe subjectum fuerit in projectura; illum, inquam, Telluris locum, qui in medio Tabulæ situs est. Huic itaque oculum immingere concipere debemus. In particularibus quoque plerisque, non tamen omnibus id locum habet.

Porro ad sequentia facilius intelligenda bene fecerint lectores & Præceptores, si varias Tabulas sibi comparent, ut ita verba nostra exemplis illustrare & clariora reddere possint.

*Modus primus, oculo constituto  
in Axe, facilis.*

Primo loco exhibeo illam depingendi hemisphærii Telluris methodum, quæ oculum consti-

tuit in aliquo axis Telluris puncto. Exempli gratia, velimus representare hemisphaerium Telluris Arcticum, nempe quod inter Æquatorem & polum Arcticum jacet, & loca in eo contenta, hoc est, Mappa Geographica orbis Arctici conficienda sit. Concipiemus itaque oculum constitutum esse extra hoc hemisphaerium, ita tamen, ut iumineat medio hemisphaerii illius puncto, nempe polo Arctico, ut oculus cum Polo Arctico & centro Telluris sit in una recta linea, hoc est, ut oculus sit in axe Telluris. Erit itaque vel in axe à parte Æquatoris versus polum Antarcticum, vel in axe producto à parte poli Arctici. Perinde est, in qua parte ponatur. Pro tabula (sive vitro) in qua representatio fieri debet, assumitur ipsius Æquatoris planum, vel aliquod tangens Tellurem in polo Arctico, si ab hac parte oculus constitui concipiatur. Sed vitanda confusionis ergo & ut verbis melius exprimere possimus sensum, ponamus oculum in polo Antarktico constitutum esse, Æquatoris planum est Tabula (Tellurem parvæ magnitudinis concipimus). Porro concipimus ab omnibus locis & peripheriis hemisphaerii Arctici emitti radios ad oculum (sive polum Antarcticum sive aliud axis punctum occupet) qui radii propterea penetrabunt planum Æquatoris. Puncta, in quibus sit perforatio, exhibent singula Telluris illius hemisphaerii loca, & puncta à peripheriarum ex. gr. Tropici radiis perforantibus facta si conjungantur, exhibent lineas, quæ representant illas peripherias. Hac ratione sive methodo fit, ut Æquator sit Terminus projecturæ hujus sive representationis: polum Telluris representetur à centro hujus circuli sive Æquatoris: meridiani faciant lineas rectas per polum omnes transeuntes usque ad Æquatorem. Paralleli Æquatoris, sive circuli latitudinis, Tropicus Cancræ, polaris Arcticus &c.

etiam

etiam p  
ciant, c  
nempe  
sentat. L  
quæque  
na, nem  
lum loci  
Reliquæ  
rix, quæ  
faciunt i  
sed Ellip  
zontem &  
mnes ha  
(sectione  
escipient

Ad faci  
circuli rep  
est Conus  
sit circuli  
radii à p  
Conum s  
diversam  
na est assu  
ipsa Eclip  
phaerio A  
tionem.

non repræ  
concepi in  
ad certum  
cum Æqu  
tis puncto  
per com  
tum Æqu

Sic itaq  
tis Tabular  
sincte exp  
scribenda s

etiam projectura hac circulos sive peripherias efficiant, quarum centrum idem quod *Æquatoris*, nempe punctum, quod polum *Arcticum* representat. Loca vero *Telluris* representantur in suis quaque peripheriis latitudinis & linea meridiana, nempe ubi meridiana linea loci secat parallelum loci, punctum sectionis est loci representatio. Reliquæ autem peripheriæ omnes & semiperipheriæ, quæ in hæmisphærio illo concipi possunt, non faciunt in projectura lineas rectas neque circulares, sed *Ellipses*: Ex. gr. si velimus loci alicujus *Horizontem* & verticales circulos representare, illi omnes hac in projectura efficiunt arcus *Ellipticos* (sectionem subcontrariam *Conicæ* doctrinæ gnari escipient).

Ad faciliorem imaginationem projecturæ, quæ circuli representantur in *Tabula*, concipiendus est *Conus* radiosus: cujus vertex sit oculus, basis sit circulus *Telluris* representandus, latera sint radii à peripheria ad oculum ducti: hunc porro *Conum* secari à *Tabula*, & pro diversa positione diversam fieri sectionem & lineam, quæ projectura est assumptæ peripheriæ in *Tellure*. Ita quoque ipsa *Ecliptica*, cujus semissis tantum cum hæmisphærio *Arctico* representatur, facit *Ellipsis* portionem. Propriè tamen loquendo ipsa *Ecliptica* non representatur, quia in *Tellure* non potest concipi immutabilis, sed tantum in certo situ, sive ad certum diei momentum: Atque ejus intersectio cum *Æquatore* potest assumi in quovis *Æquatoris* puncto, omnibus tamen *Mappis* assumitur propter commoditatem intersectio meridiani primi cum *Æquatore*.

Sic itaque originem & methodum primi generis *Tabularum*, quæ oculum in axe habent, distinctè explicavimus: jam quomodo in praxi describenda sit talis *Tabula*, ex istu fundamentis doce-



*Limus.* In plano quovis vel charta assumatur punctum medium P pro polo, & ex illo tanquam centro describatur peripheria magna vel parva (prout Tabulam magnam vel parvam esse cupimus) quam pro Æquatore habebimus. Hæc duo pro libitu assumere licet, reliqua vero puncta & peripheriæ ex illis inveniendæ. Dividatur Æquator in 360 gradus, & ductis lineis rectis per centrum & singulorum graduum initia, erunt hæc meridiani, ex quibus ille, qui ad initium primi gradus ex istis 360 ductus est, pro primo assumendus erit, ita reliquæ lineæ referent reliquos Telluris meridianos & longitudes à primo meridiano. Jam paralleli latitudinum erunt describendi. Quatuor quadrantes Æquatoris sunt, primus 0, 90: secundus 90, 180: tertius, 180, 270: quartus, 270, 0. notentur ad faciliorem appellationem litteris AB, BC, CD, DA, & assumatur unus ex istis, exempli causa, BC, à cujus singulis gradibus ut etiam à 20 gr. 30 min. & 66 gr. 30 min. ducantur occultæ rectæ lineæ ad punctum D (terminum diametri BD) vel tantum regula applicetur ad D, & circumducatur per singulos gradus quadrantis BC: & 23 gr. 30 min. atque 66 gr. 30 puncta, in quibus hæc rectæ vel regula secat semidiametrum PC, notentur, atque ex P tanquam centro, & describantur peripheriæ per singula puncta in PC accepta. Hæc peripheriæ erunt paralleli latitudinum, quibus in meridiano primo & opposito, nempe AP. & CP, possunt ascribi numeri ab Æquatore versus P, nempe 1, 2, 3, 4, usque ad 90, ut ita singulorum latitudo sit conspicua: Sed ad parallelum 23 gr. 30 min. ascribendum erit Tropicus Cancræ, ad 66 gr. 30, Circulus Arcticus. In ipsa praxi neque omnes meridiani, neque omnes paralleli, colore notandi sunt, sed tantum decimi quique, reliqui occultis sive cæcis lineis

repræse  
pediren  
scriptio

Posit  
sunt,  
nis loc  
minum  
Æquat  
loci m  
mus p  
ubi m  
locum  
latio il  
inscrip  
nec Ta

Si E  
illa, f  
Dixim  
ciat Ec  
da est i  
punctu  
toris a  
torem  
Ultim  
sive al  
nemp  
sto 18  
ridian  
nacti  
benda  
quæ s  
bræ: p  
& 15  
inveni  
nes ho  
pe hic

Dei

repræsentandi, quoniam usus illorum mox erit impedirent autem deinde locorum appellationis ascriptionem.

Postquam meridiani omnes & paralleli descripti sunt, facile est ex Tabula longitudinis & latitudinis locorum notare ipsa loca superficiæ Telluris, nimirum à primo meridiano assumpto numeratur in Æquatore longitudo cujusvis loci, ita incidimus in loci meridianum, deinde ex loci latitudine eligimus parallelum ejusdem latitudinis, & punctum, ubi meridianus secat parallelum, est punctum, quod locum assumptum Telluris repræsentat, cujus appellationi illi ascribenda. Ita cum omnium locorum inscriptione sive projectura accipienda agimus, donec Tabula confecta sit.

Si Eclipticæ semicirculus etiam notandus sit in illa, fieri id debet ante locorum designationem. Diximus quod Ellipticam lineam in projectura faciat Ecliptica, ideoque ejus puncta, per quæ ducenda est illa portio Ellipsis, erunt invenienda. Primum punctum sive pro intersectione Eclipticæ & Æquatoris assumitur id, quo primus Meridianus Æquatorem secat, quod propterea Arietis signo notatur. Ultimum vero punctum hujus dimidiæ Ellipsis sive altera intersectio Æquatoris & Eclipticæ, finis nempe Virginis, erit in opposito Æquatoris puncto 180. Intermedium punctum est id, in quo meridianus 90 secat Tropicum Cancræ. Ita tria puncta nacti sumus, per quæ transit portio Ellipsis describenda (quæ minor est quam dimidia Ellipsis), quæ sunt puncta initii 1 gr. Arietis, Cancræ & Libræ: pro reliquis punctis, ut 1 gr. Tauri, 15, 1 gr. & 15 gr. Geminorum, 1 gr. Leonis, 1 gr. Virginis inveniendis, sumendæ sunt ex Tabula declinationes horum punctorum, & ascensione recta: nempe hic ascriptæ.

Deinde, ubi meridianus 13 gr. vel 4 gr. secat

Declinat. Ascensio recta.

	gr.	m.	gr.	m.
15 Arietis & Virginis	5	56	13	48
1 Tauri & Virginis	11	31	27	
15 Tauri & Leonis	16	24	42	
1 Geminor. & Leon.	20	13	57	
15 Geminor. & Canc.	22	41	73	
	166			pro initio Virginis 15 gr.
	152			pro initio Virg.
	137			pro 15 Leonis.
	122			pro initio Leonis.
	106			pro 15 Cancr.

ascensiones rectæ, eo modo quo signavimus gradum 15 gr. Tauri, 1 gr. Geminor. &c.

Hiscæ factis, absoluta est Mappæ hujus Geographicæ compositio, quæ dimidiam Telluris superficiem representabit, nempe partem inter Æquatorem & polum Arcticum.

Modum hunc facillimum esse, & jucundum, patet ex ipsa Descriptione, & ipsa praxis monstrabit jam de usu ejus & incommodis dicendum est: Tria requiri in Tabulis, sive propter triplicem finem constructionem fieri, diximus in superioribus. Primum ex illis, nempe singulorum locorum longitudinem & latitudinem satis accurate monstrant

parallelum 5 gr. vel potius 6 gr. id punctum erit 15 gr. Arietis. Ita ubi meridianus 27 secat parallelum  $11\frac{1}{3}$ , ubi erit 1 gr. Tauri, sic ubi meridianus 42, parallelum 16 gr. ubi 15 gr. Tauri; atque ubi meridianus 106 secat parallelum 22 gr. 41 min. ibi erit 15 gr. Cancr: ubi meridianus 122 secat parallelum 20, ibi initium Leonis, & sic reliqui meridiani 137, 152, 166, secant parallelos 16, 11, 5, pro 15 gr. Leonis initio Virginis & 15 Virginis. Hiscæ punctis curvâ lineâ conjunctis, habebimus portionem Ellipsis pro semicirculis Eclipticæ boreali, cujus puncta & gradus in singulis signis facile notabuntur, si pro singulis excerpantur ex Tabulis declinationes & ad-

strant M  
Tabula  
dicant  
Zonas.  
dinis f  
tam,  
quippe  
majore  
habere  
est hæc  
tiam,  
te, quæ  
ca regi  
tem ve  
nempe  
tiam n  
istæ,  
haben  
luris f  
quem  
tum &  
zontes  
Horiz  
in Æq  
ginta  
nis un  
nempe  
tem.  
zontis  
diani  
versus  
paralle  
indica  
cardin  
punct  
nire,  
teprac

stant Mappæ hæc methodo confectæ, quoniam ex Tabula longitudinum & latitudinum fiunt: indicant simul locorum à via Solis distantiam, sive Zonas. Secundum requisitum, nempe magnitudinis singularum regionum proportionem debitam, Mappæ hujusmodi non omnino præstant, quippe regiones quo Equatori sunt viciniore, eo majorem accipiunt in projectura hæc locum quam habere debebant proportione suâ. Verum exigua est hæc differentia, propter magnam oculi distantiam, & hoc vitium compensatur eâ commoditate, quod melius notari possunt loca, quoniam paucæ regiones circa polum sunt habitatæ, plures autem versus Equatorem. Tertium autem finem, nempe situm unius loci ad alia & locorum distantiam non possunt hæc Tabulæ præstare, quia lineæ istæ, quæ talia in mappis denotant, longe alium habent situm & proportionem, quam in ipsa Telluris superficie. Si tamen placeat ad unum aliquem locum expendere reliquorum locorum situm & Solis ortum & moram supra illius Horizontem, poterit in Mappa delineari illius loci Horizon formâ Ellipticâ hoc modo: Numerentur in Equatore à dati loci meridiano gradus nonaginta ab utraque parte: Terminorum numerationis unus erit punctum ducendû Horizontis unum, nempe Orientale, in quo Equator secat Horizontem. Alter terminus erit idem punctum Horizontis pro occasu æquinoctiali. Porro in meridiani loci opposito quadrante numerentur à polo versus Equatorem paralleli tot, quotus est loci parallelus ab Equatore. Terminus numerationis indicabit tertium Horizontis punctum, nempe cardinem Septentrionalem. (Cardinis Australis punctum docebimus in mox subjungendis invenire, si major quam hemisphærii portio in mappa repræsentetur, namque in solo hemisphærio non

repe-



reperitur, nisi Horizon ipsius poli, qui est ipse *Æquator*.) Sic tria vel quatuor præcipua puncta habebimus, per quæ Horizon transire debet. Ad reliqua puncta inveniendâ non est commodior vel facilior via, quam globi beneficio: nimirum elevetur polus pro assumpti loci latitudine. Deinde in singulis parallelis unum punctum eligatur, per quod primus meridianus transit, atque id adducatur ad Horizontem, quo factò annotetur gradus sub meridiano existens, atque ita in singulis parallelis fiat. Hisce annotatis numerentur à dati in mappa loci meridiano in *Æquatore* utrinque gradus totidem pro singulis parallelis, nempe pro decimo, xx, xxx, &c. atque ubi meridiani secant parallelos convenientes, illa puncta erunt quaesita, nempe per quæ Horizon est ducendus, poteritque ad illum expendi aliquo modo situs reliquorum locorum.

Potest hac methodo integra fere superficies Telluris representari in una Mappa: nimirum si polus alteruter, nempe Antarcticus, assumatur pro oculo, Tabula vero sive vitrum assumatur alicujus paralleli polo vicini planum, ex. gr. planum circuli Antartici, si partem Telluris inter polum Arcticum & circulum Antarticum exhibere cupias in uno plano, neque aliud restat agendum vel addendum ad priorem constructionem, nisi ut meridiana linea protrahantur, & ducantur paralleli ab altera *Æquatoris* parte. Deinde *Ecliptica* ducatur integra, & si placet, Horizon compleatur. Verum enimvero cum partes (& gradus) ultra *Æquatorem* versus Antarcticum polum sitæ hoc modo multo majores evadant, quam partes circa *Æquatorem* & in ipso *Æquatore*, quod est contra rei veritatem, ideo præstat duobus hemisphæriis projectionem facere, ut unum referat Arcticum Orbem, alterum Antarcticum.

Tabul  
sunt fun  
lent dua  
rum una  
ca Antr  
quæ dict  
tores.  
quam pr

M

Præce  
graphica  
locorum  
hemisph  
atque u  
repræsen  
viderur  
atque a  
ita descr  
venta fu  
præcede  
tat loca  
mover.

Ad h  
mūs sup  
cari à m  
duabus  
pe in ur  
tuitur in  
dibus à  
vitrum,  
planum  
rium (  
culi) in  
In hac  
fit linea

Tabulæ juxta hanc methodum descriptæ paucissimæ sunt. Mappis generalibus rectilineis addi solent duæ parvæ Mappæ hac methodo descriptæ, quarum una regiones circa Arcticum polum, altera circa Antarcticum exhibet, quas ad meliorem eorum, quæ dicta sunt, intelligentiam inspicere possunt lectores. Caterum hæc facilius addiuntur ex præmi quam præceptis.

*Modus secundus, oculo constituto in  
plano Æquatoris.*

Præcedens methodus describendi mappas Geographicas neque apte refert magnitudines & situm locorum, neque commoda est ad describendum hemisphærium inter ambos polos interceptum, atque ut omnia loca in eodem meridiano jacentia repræsenter: præterea conceptui nostro repugnare videtur polum Telluris in ipsum centrum cadere, atque adeo difficiliorem imaginationem Tabulæ ita descriptæ præbent. Propterea alia methodus inventa fuit, quæ quidem aliquantum difficilior est præcedente, sed magis apte & concinne repræsenterat loca Telluris, atque polum ab Æquatore removet.

Ad hanc methodum intelligendam, concipimus superficiem Telluris in duo hemisphæria secari à meridiano primi peripheria integra, atque duabus Tabulis exhibemus illa hemisphæria, nempe in una unum, in altera alterum. Oculus constituitur in puncto Æquatoris, quod nonaginta gradibus à primo meridiano removetur: Tabula vel vitrum, in quo representatio fieri debet, assumitur planum ipsius primi meridiani, atque hemisphærium (quod infra illud planum jacet respectu oculi) suscipimus in plano illo representandum. In hac projecturæ forma Æquatoris semicirculus fit linea recta, & is meridianus, qui 90 gradibus à primo

primo abest, cui oculus imminere concipitur, fiet etiam linea recta: reliqui vero meridiani & omnes Æquatoris paralleli fiunt arcus circularum, quia Coni eorum secantur à plano Tabulæ sectione subcontraria, cujus rei explicatio è doctrina Conica est petenda, & melius per ostensionem quam verba adolescentibus explicari potest. Ecliptica autem fit Ellipsis portio ob causam in præcedenti methodo adductam.

Descriptio fit ita: Assumpto in Tabula puncto E pro centro describitur peripheria circuli magna vel parva, A B C D (prout Tabulam magnam vel parvam habere cupimus). Hæc representat primum meridianum & ejus oppositum, nimirum ducta diametrò BD oriuntur duæ semiperipheriæ, quarum una B A D est primus meridianus, altera B C D oppositus sive longitudinis 180. Diameter hæc BD representat meridianum 90 gradibus à primo distantem, & ejus punctum B est polus unus, nempe Arcticus, sed punctum D est polus Antarcticus: diameter autem AC ad BD perpendicularis est linea Æquatoris. Dividuntur quadrantes AB, BC, CD, DA, singuli in nonaginta gradus. Porro ad meridianorum & parallelorum representationem sive ad inveniendos arcus meridianorum & parallelorum ita agendum est. Primo Æquatoris linea AC dividenda est in gradus suos, nempe 180 (quia dimidium tantum Æquatorem exhibet), sive AE, EC in 90, hoc pacto: A puncto D ducantur ad singulos gradus semiperipheriæ ABC lineæ rectæ, vel, quod perinde est, regula applicetur puncto D & singulis gradibus semiperipheriæ ABC: lineæ hæc secabunt lineam Æquatoris in 180 partes, quæ representabunt gradus, qui sunt gradus longitudinum, & proinde numeri ascribendi sunt 1, 2, 3, 4, &c. incipiendo à primo meridiano DAB. Per singula ista pun-

puncta  
sunt ar  
dianos.  
gr. B 1  
id doc  
centra  
centra i  
ridiani  
sta juxt  
lineæ B  
cularib  
nem):  
toris li  
centra  
Sed cer  
cidunt  
autem  
gradus  
que ad  
a, b, c,  
ni, qu  
& ita 3  
bifecen  
ridiane

Min  
operati  
nonem  
mus li  
EA, E  
vidimu  
tes. D  
 $\frac{1}{2}$  gr. 1  
hocce t  
in EA  
sta gra  
cienda

puncta 1, 2, 3, & ambos polos B D, describendi sunt arcus circularum, qui representabunt meridianos. Quomodo autem per tria data puncta, ex gr. B 1 D, vel B 2 D, &c. sit describenda peripheria, id docet Geometria, nimirum inveniendae sunt centra pro singulis describendis peripheriis, quae centra in ipsa Aequatoris linea sunt sita, sicut meridiani D A B centrum est E. Inveniuntur illa puncta juxta Methodum Euclideanam propof. 1. lib. 3. si lineae B 1, B 2, B 3, &c. bifecentur lineis perpendicularibus (facillimum est per normae applicationem): ubi haec perpendiculares incidunt in Aequatoris lineam E C protractam, si opus est, ibi sunt centra pro describendis arcibus B 1 D, B 2 D, &c. Sed centra arcuum B 91 D, B 92 D, B 93 D, &c. incidunt in E A, si opus est protractam. Facilius autem in praxi est inventio, si ex B per singulos gradus quadrantum B A, B C, ducantur rectae usque ad A C protensam, quae in hac faciant puncta a, b, c, d, e, &c. Ita a erit diameter ejus meridiani, qui per 1 debet transire; & 26 ejus, qui per 2, & ita 3 c, 4 d, &c. Si itaque 14, 26, 30, 4 d, &c. bifecentur, habebimus centra describendorum meridianorum.

Minus autem errori obnoxia & facilius erit operatio (praesertim in magnis Mappis) per Canonem Tangentium, nam sic nullis opus habebimus linearum ductibus. Etenim ad dividendam E A, E C, E B, E D in gradus, ita agimus: Dividimus E B in apposita scala in 100000 partes. Deinde; Ex Canone excipimus Tangentes  $\frac{1}{2}$  gr. 1 gr.  $1\frac{1}{2}$ , 2,  $2\frac{1}{2}$ , 3,  $3\frac{1}{2}$ , 4, &c. atque singulos hosce tangentes ex apposita scala sumtos ponimus in E A, E C, E B, E D, ex E, ita bina vicina puncta gradum unum continebunt, est ascriptio faciendae, ut prius. Deinde ad centra singulorum meri-



meridianorum in E A, E C, inveniendâ, sumatur numerus inter B C vel E & quævis gradum interceptus, atque hujus duplum auferatur à 90 gr. (vel ipse numerus à complemento suo) residui tangens defumatatur ex canone, & ponatur ex E in E C, vel E A. Terminus erit centrum describendi meridiani per assumptum gradum. Ita cum omnibus meridianis erit agendum. Praxis hæc facilia esse monstrabit. Fundamentum hujus posterioris operationis ad inveniendâ centra est Theorema Trigonometricum: Differentia tangentium duorum arcuum quadrantem simul adimplentium est dupla ad tangentem differentia arcuum. Sic itaque meridiani representantur.

Ad parallelorum arcus ducendos, meridianus DB eodem modo in gradus 180 est dividendus, sicut Æquatoris quadrantibus E A, E C, nempe si ex C ducantur ad singulos gradus peripheriæ D A B lineæ occulta: verum non opus est hac opera, cum ex E A in E B possint transferri ex partes, puncta sive gradus ab E versus B, hoc est ab Æquatore versus polum numerandi 1, 2, 3, 4, &c. ita ab E versus alterum polum D.

Deinde per singula hæc puncta & cognominis numeri gradus quadrantum AB, CB describendi sunt arcus circulorum, nempe per gradus primos, deinde per initium tertii, &c. ita quoque ab altera Æquatoris plaga versus D.

Ita omnium graduum parallelos, & Tropicos atque polares nanciscemur cum meridianis prius inventis.

Ad designandam Eclipticam duplex est methodus. Vel enim ponimus eum Eclipticæ situm in Tellure vel supra Tellurem, ut interseccio ejus cum Æquatore, sive initium Arietis imminet loco E, & in hoc situ, Eclipticæ semicirculi nempe à 1 gr. Cancrî ad 1 Capricorni projectura in Tabula est  
linea

linea re  
versus B,  
diameter  
lam in e  
suos divi  
enim in  
cidit, ne  
stz ad fir  
cabunt E  
bus dein  
nor. &c.

Sed si  
ejus & A  
tidiano  
cujus du  
tidianus  
invenier  
cavimus  
ascensio  
Tauri, S  
tionum  
ascensio  
sunt 15  
atur cu  
ram. A  
mappis  
bobus q

Porro  
excerper  
longitudo  
titudini  
nis ejus  
cum in  
ita omni

Potes  
superficie  
non pla

linea recta: nempe ab A numerentur 23 gr. 30 m. versus B, & à termino numerationis per E ducatur diameter. Hæc repræsentabit Eclipticæ semicirculum in eo situ. Quæ linea eodem modo in gradus suos dividetur, sicut semiquator A C. Punctum enim in quadrante B C, ubi circulus arcticus incidit, nempe  $66\frac{1}{2}$  gr. est id, ex quo si ducantur rectæ ad singulos gradus semiperipheriæ F A D G, secabunt E F in 90 gradus & eodem modo E G: quibus deinde numeri & signa Arietis, Tauri, Gemini, &c. ascribenda.

Sed si situs Eclipticæ ponatur talis, ut intersectio ejus & Æquatoris immineat loco A in primo meridiano, tunc fiet ejus projectura Ellipsis portio: cujus duo puncta sunt A, C, tertium id, in quo meridianus 90 secat Tropicum Cancræ, reliqua puncta invenientur eo modo, quo in primo modo explicavimus, nempe si habeantur declinationes & ascensiones rectæ 15 gr. Arietis, 1 gr. Tauri, 15 gr. Tauri, &c. Ubi enim paralleli pro singulis declinationum gradibus secant meridianos pro singulis ascensionibus rectis sumtos, illa sectionum puncta sunt 15 Arietis, 1 Tauri, &c. per illa itaque si ducatur curva linea, habebimus Eclipticæ projecturam. Atque hoc modo plerumque exhibetur in mappis Ecliptica, quoniam ita in hemisphæris ambobus quasi continua manet.

Porro ad inscribenda loca singula hisce Tabulis, excerptæ sunt ex Tabulis singulorum locorum longitudo & latitudo, atque ubi parallelus latitudinis loci cujusvis secat meridianum longitudinis ejusdem loci, id punctum repræsentat illum locum in Tabula, cujus appellatio ascribenda: atque ita omnia loca designantur.

Potest etiam simili methodo integra Telluris superficies una in Tabula repræsentari, nempe si non planum ipsius meridiani primi assumatur pro  
vitro,

vitro, sed aliud ei quidem parallelum, sed oculo valde vicinum: sic enim & integri paralleli & integri meridiani sive meridiani singuli suis oppositi continui describentur. Sed admodum diversa à vera Telluris superficie inde oriatur apparentia, & propterea omittitur ab artificibus, qui potius duo hemisphæria in una Mappa exhibent. Utile tamen fuerit, ut adolescentes in hisce quoque se exercent. Commodius tunc erit, oculum constituere in ipso primo meridiano A, ut ita BD sit primus; Æquatoris linea erit non AC, sed alia ex puncto rectæ ED ducta ipsi AC parallela, quæ in tot gradus dividetur, quot sunt in arcu ablato, eodem artificio.

Secunda laus est, quod hemisphærium inter polos interceptum apte exhibet.

Tertia, quod latitudines, longitudines singulorum locorum, distantiam ab Æquatore & polo ita fere exhibet, sicut in ipsa Tellure jacent.

Incommoda sive defectus sunt, 1. Quod Æquatoris gradus inæquales habet, nimirum quo propiores sunt primo meridiano DAB vel opposito BCD, eo sunt majores, & propterea regiones Telluris æquales in hisce Tabulis etiam fiunt inæquales, sicut in præcedenti modo (Hic defectus ex parte corrigitur, si oculus removeatur longissime à Tellure): nempe regiones circa E fiunt minores: circa A, C, majores quam ex proportione debebant esse: eodem modo regiones circa polos B, D, fiunt majores, quam debebant. 2. Situs unius loci ad alterum non potest commode expendi, neque distantias locorum inde venari licet.

*Modus tertius, quartus & quintus, de  
rectilineis mappis.*

Exponuntur quoque venales ab artificibus map-  
pæ

pæ Geog  
in quibu  
quam la  
tias line  
impossib  
assignari  
lorum,  
lineæ rec  
represent  
mus, me  
fiunt rec  
titudinis  
tem quin  
lineæ, se  
dis, qui  
species fi  
thodo, j  
sed circu  
si oculus  
& aspicia  
ridiani p  
aspectus,  
no. Ita  
culi lati  
Æquato  
methodu  
nerate d  
jucundit  
bolarum  
est: idec  
tare volu  
tur. Re  
Perspecti  
dum est.  
tur. Qua  
gradus æ  
grado K

per Geographica Universalis rectilinearum, nimirum in quibus tam circuli longitudinis (meridiani), quam latitudinis (paralleli) designantur per rectas lineas, quod quidem juxta Perspectivæ leges impossibile est, neque potest ullus oculo & vitro assignari situs vel positio, ut ambæ species circulorum, nempe & latitudinis & longitudinis fiant lineæ rectæ, sed alterutra tantum species per rectas representari potest. In prima, quam explicavimus, methodo meridiani vel longitudinis circuli fiunt rectæ lineæ juxta Perspectivam, & circuli latitudinis fiunt circuli, non rectæ: in methodo autem quinta sequenti latitudinis circuli fiunt rectæ lineæ, sed meridiani curvæ ellipses. In aliis Modis, qui juxta Perspectivam instituuntur, ambæ species fiunt curvæ lineæ, excepta una adhuc methodo, juxta quam meridiani fiunt lineæ rectæ, sed circuli latitudinis fiunt Hyperbolæ, nimirum si oculus constituitur in centro Telluris (terrellæ) & aspiciat hemisphærium ab alterutra primi meridiani parte, tabula vero seu vitrum per quod fit aspectus, sit planum parallelum primo meridiano. Ita enim meridiani fiunt lineæ rectæ, & circuli latitudinis fiunt hyperbolæ. Divisio lineæ Equatoris & meridianorum in gradus juxta hanc methodum est facilis: & illi, qui harum rerum varietate delectantur, hunc quoque modum cum jucunditate exercere poterunt: at propter hyperbolarum descriptionem minus ad praxin aptus est: ideo non dicemus de eo plura. Qui eum tentare volunt, viva Præceptoris informatione utantur. Rectilinearæ itaque mappæ non fiunt juxta Perspectivæ præcepta, sed potius contra ea, ut dictum est. Duplices vel duorum generum inveniuntur. Quædam tam longitudinis quam latitudinis gradus æquales numerant (Belgæ vocant *gelijk-grads Kaarten*), quales olim fiebant: aliæ vero, sicut



sicut hoc tempore construuntur, longitudinis gradus sive *Æquatoris* habent æquales (quod est contra *Perspectivam*), sed non gradus latitudinis sive meridianorum. Horum enim magnitudinem versus polos magis magisque adaugent, ita ut ad 80 gr. decuplo major sit gradus quam ad *Æquatorem*, & deinde versus polum propiores gradus infinitam fere accipiant magnitudinem, quæ in nulla mappa exprimi possit, quod incrementum *Perspectivæ* repugnat, quæ tantum concedit triplum pro incremento.

Rectilinearæ primi modi sunt omnium facillimæ. Assumpta enim *AB* pro longitudine mappæ dividitur in 180 (pro hemisphærio uno) æquales partes, quæ erunt gradus: & per singulos gradus ducuntur meridiani, nempe rectæ perpendiculares, & in his sumuntur partes æquales illis, quæ in linea *Æquatoris* sumptæ sunt, & per singulas partes (quæ denotant gradus latitudinis) ducuntur rectæ *Æquatori* parallelæ. Hæ erunt circuli latitudinis. Loca quælibet signabuntur, ut in prioribus modis, nempe ubi ejus loci Meridianus & circulus latitudinis concurrunt.

Secundus autem modus mapparum rectilinearum in divisione *Æquatoris* in æquales gradus seu partes non differt à priori, & propterea assumpta *AB* dividitur in 180 æquales partes (pro alterutro hemisphærio) seu gradus, sicut in priori, & per singulos ducuntur rectæ perpendiculares, quæ designant meridianos, seu circulos longitudinis. Sed ad circulos latitudinis seu *Æquatoris* parallelos designandos aliam observant methodum. Non enim meridiani dividuntur in gradus æquales, sed inæquales, sicut antea inuimus, ita ut accrescant ab *Æquatore* versus polos. Causa autem hujus inventæ constructionis est, quod Mappæ aliæ non monstrent veram positionem unius loci ad alterum,

rum, vel potius lineam nauticam ab uno loco ad alterum, neque methodum admittant invenientis distantia. Ista autem duo per hujuscemodi Mappas obtineri posse statuunt. Etenim quia Meridiani per gradus lineae Aequatoris ducuntur omnes ad se invicem æquidistantes, inde fit ut loca vel puncta in singulis Meridianis sita eo magis supra veram & debitam distantiam removeantur à primo meridiano, quo ab Aequatore magis ad polum accedunt: nimirum distantia in chartis à primo meridiano tantum superat debitam & legitimam distantiam, quantum semidiameter sive sinus totus superat sinum complementi arcus latitudinis cujusvis puncti. Namque ut sinus totus ad sinum complementi latitudinis cujusvis loci, ita gradus unus vel plures in Aequatore ad gradum unum vel plures in circulo istius latitudinis. Et propterea gradus in circulis hisce debebant minores exhiberi quam in Aequatore, & quidem eo magis minores, quo circuli illi sunt polo magis vicini. Sed in Mappis rectilineis, quia meridiani ducuntur æquidistantes, non fiunt minores, sed æquales in omnibus parallelis. Quantum itaque supra debitam magnitudinem augentur gradus in singulis circulis latitudinis, tantumdem gradus latitudinis singuli augeri debent in hisce Mappis supra magnitudinem gradus unius in Aequatore. Illud autem fit hac methodo in cujusvis gradus magnitudine designanda. Ut gradus unius quantitas in singulis parallelis ad gradus unius quantitatem in Aequatore, hoc est, ut sinus complementi latitudinis cujusvis paralleli incipientis illum gradum ad sinum totum, ita magnitudo partis in Aequatore, quæ unum gradum designat, ad magnitudinem partis, quæ in meridiano istum gradum denotabit, è cujus principio parallelus ille ducitur. Si autem accuratius velis agere, non sumendus est

sinus complementi latitudinis cujusvis paralleli, sed sinus complementi latitudinis, quæ incipit gradum, addendus est ad sinum complementi latitudinis, quæ terminat gradum illum, & hujus aggregati dimidium sumendum pro primo termino in regula proportionis.

## E X E M P L U M.

Sit designandus terminus in meridiano primo pro primo gradu latitudinis ab Æquatore. sit autem unius gradus Æquatoris magnitudo decem particularum in scala apposita sumtarum. Juxta primam proportionem fiet ejus magnitudo æqualis gradui Æquatoris: quia Æquator est ipse parallelus qui hunc gradum incipit: sed juxta secundam proportionem, sumo sinum complementi 0 gr. latitudinis, qui sinus est 100000 (nam complementum est 90), & addo ad sinum complem. 1 gr. nempe ad sinum 89 gr. qui est 99985, sunt 199985, dimidium 99992. Itaque ut 99992 ad 100000, ita 10 (magnitudo gradus in Æquatore vel gradus æqualis) ad  $10\frac{8}{100000}$  pro primo gradu, sed quia incrementum supra decem particulas adeo exiguum est, ut in Mappa notari non possit, ideo gradus hic fit etiam decem particularum, nempe æqualis gradui Æquatoris. Progressu autem versus polos factò magis magisque accrescunt gradus. Exemplum. Sit designanda magnitudo gradus sexagesimi, nempe qui inter terminum 59 gr. & initium 61 gr. interjacet. Juxta primam proportionem. Sinus complementi 59 gr. est 51503. Itaque

Ut 51503 ad 100000, ita 10 ad  $19\frac{2}{5}$ . Quare pro quantitate illius gradus signanda sumi debent ex scala  $19\frac{2}{5}$  particule, quarum gradus in Æquatore continet decem.

Juxta

Juxta  
Sinus d  
60 gr.  
Itaque  
magn  
operâ d  
secund  
tudine  
latitud  
est in n  
gradus.  
litarii  
duorum  
magnit  
diano p  
dum cu  
studiofi  
singulo  
mo aut  
Æquat

Juxta secundam proportionem ita agendum. Sinus complem. 59 gr. est 51503. Sinus complem. 60 gr. est 50000. Aggregati dimidium est 50751. Itaque ut 50751 ad 100000, ita 10 ad 19½. Quæ magnitudo parum major quam prior, neque eâ operâ digna. Porro quando inventa est magnitudo secundi gradûs solitarii, illa addenda est ad magnitudinem primi gradus: aggregatum erit accrescens latitudo (*de vergrootende breedte,*) quanta sumenda est in meridiano ab Æquatore pro termino secundi gradus. Deinde inventa magnitudo tertii gradûs solitarii addenda est ad accrescentem latitudinem duorum graduum prius positâ, sic habebimus magnitudinem ab Æquatore sumendam in meridiano pro termino tertii gradus. Atque ita agendum cum reliquis gradibus. Porro ut facilius esset studiosis labor, appono hic Tabulam pro terminis singulorum graduum sumendis in meridiano. Sumo autem tales particulas, quales gradus unus Æquatoris ponitur habere 100.



Grad.  
term.Grad.  
term.Grad.  
term.

1	100	29	3032	57	6970
2	200	30	3147	58	7157
3	300	31	3263	59	7349
4	400 $\frac{2}{3}$	32	3347	60	7546
—	—	—	—	—	—
5	500 $\frac{2}{3}$	33	3499	61	7749
6	601	34	3619	62	7960
7	702	35	3740	63	8175
8	802	36	3863	64	8399
—	—	—	—	—	—
9	903	37	3988	65	8631
10	1005	38	4114	66	8872
11	1107	39	4241	67	9023
12	1209	40	4371	68	9384
—	—	—	—	—	—
13	1311	41	4502	69	9691
14	1414	42	4636	70	9943
15	1517	43	4772	71	10243
16	1621	44	4909	72	10558
—	—	—	—	—	—
17	1725	45	5053	73	10900
18	1830	46	5193	74	11243
19	1936	47	5338	75	11617
20	2042	48	5486	76	12017
—	—	—	—	—	—
21	2150	49	5637	77	12445
22	2256	50	5791	78	12908
23	2364	51	5981	79	13409
24	2473	52	6109	80	13960
—	—	—	—	—	—
25	2583	53	6274	81	14565
26	2694	54	6441	82	15243
27	2806	55	6611	83	16009
28	2918	56	6790		

Signa-

Signa  
mo,  
cum  
locor  
circul  
curru  
Re  
mis c  
in hu  
circul  
Mapp  
Mapp  
Uli  
& lat  
2. Dat  
quem  
vis. E  
angul  
det. N  
duo d  
inter  
meric  
absint  
ca. Se

Pto  
bri p  
atque  
fenta  
culi l  
ridian  
tur in  
trem  
inter  
propt  
& q

Signatis ita gradibus latitudinis in meridiano primo, ducuntur per singulos illos lineæ parallelæ cum Æquatore, quæ erunt circuli latitudinis. Et locorum singulorum inscriptio fit in puncto, ubi circulus longitudinis & latitudinis ejus loci concurrunt.

Regiones autem circa polos minus apte & nimis contra naturalem dispositionem exhibentur in hujuscemodi Mappis, ideo partes inter polos & circulos polares sitæ solent duabus peculiaribus Mappellis juxta primum Modum factis adjungi Mappæ universali.

Ulus Mapparum harum talis est. 1. Longitudo & latitudo locorum invenitur ut in præcedentibus. 2. Dato loco A, ex quo navigatur, & loco B ad quem, exhibetur plaga, in quam dirigenda est navis. Etenim si per A ducatur parallelus & recta AB, angulus quem hæ duæ lineæ faciunt, plagam ostendet. Nautæ alio utuntur modo. 3. Distantiam inter duo data loca inveniri volunt, si circino capiatur intervallum illorum locorum & transferatur in meridianum divisum, ita ut pedes circini æqualiter absint à parallelo, qui medius est inter duo illa loca. Sed hæc minus accurata esse puto.

*Modus sextus & septimus.*

Ptolemæus in posteriori parte ultimi capituli libri primi Geographiæ alium proponit modum, atque partem Telluris tunc cognitam eo repræsentare docet: In hac Methodo Æquator, & circuli latitudinis fiunt etiam arcus circularum: Meridiani vero fiunt arcus Elliptici. Oculus statuitur imminere meridiano, qui medius est inter extremos habitatæ Terræ: & quidem medio loco inter extremos gradus cognitæ latitudinis. Verum propter incommoda describendarum Ellipsium, & quia magis ad partem Telluris repræsentandam,

dam, nempe ad inhabitatam partem excogitatus à Ptolomæo videtur, ideo ab artificibus non adhibetur. Huic is quoque affinis est modus, qui circulos quidem latitudinis exhibet per lineas rectas: sed meridianos semilibus Ellipsium, qualis projectura existit, si in planum meridiani primi concipias lineas perpendiculares cadere à singulis hemisphærii alterutrius punctis. Oculum autem infinito spatio removeri à Tellure supponendum est, ut ita omnes radii à locis Telluris ad eum ducti possint haberi pro parallelis & perpendicularibus ad planum meridiani primi, sicut Gnomonici dicunt omnes radios à puncto aliquo Solis ad Tellurem emissos adeo parum divergere, ut pro parallelis haberi possint & easdem faciant in umbris apparentias. Est autem non admodum difficilis.

Si itaque hanc formâ placeat Telluris hemisphærium repræsentare, assumatur in plano punctum quodvis E, & ex eo tanquam centro describatur peripheria ABCD, quadrantes sint AB, BC, CD, DA; dividantur singuli in 90 gradus ab AC incipiendo versus B & B. BAD erit primus meridianus, BCD oppositus, recta BD medius inter hosce est nonagesimus à primo BAD. Ducantur ipsi AC, quæ Æquatoris semiperipheriam refert, parallelæ rectæ per singulos gradus quadrantum: illæ referent parallelos Æquatoris, sive circulos Latitudinis, & Tropici atque Polares simul invenientur. Partes, in quas EB, ED, dividitur, per hæc ductas, sunt gradus meridiani BD, qui notentur 1, 2, 3, &c. Eadem partes sumantur in Æquatoris quadrante EA, & quadrante EC, atque ascribantur numeri 1, 2, 3 usque ad 180, incipiendo à puncto primo sive proximo ipsi meridiano primo BAD. Ita partes ipsius AEC referent gradus, in quos semiperiphæria

pheria  
gitudin  
semiel  
est ax  
psium  
noris f  
ipsius  
cepta,  
describ  
die fat  
structis  
Ellipsi  
manu  
eas del

Des  
omnia  
bentur  
lus lat  
pa. Ec  
bitur  
explic

Hu  
quod  
bus in  
culoru  
versus

Si d  
tus  
tiam,  
illas p  
propo

Ut  
finu c  
se hab  
li à T  
tantu  
Ex.

phæria  $\text{\AA}$ quatoris dividitur, qui sunt gradus longitudinis: Per quos & polos B, D, sunt ducendæ semiellipses pro meridianis. Quoniam itaque BD est axis major singularum describendarum Ellipsium, semissis vero EB vel ED: axis vero minoris semissis est in diversis diversa, nempe pars ipsius EA, inter E & gradum longitudinis intercepta, idcirco ex datis facile erit apto instrumento describere hæc Ellipses, quod instrumentum hodie satis vulgare est, neque difficilem habet constructionem. Possunt tamen puncta singularum Ellipsium facili negotio inveniri, per quæ liberâ manu ducendæ sunt: sed melius est instrumento eas delineare.

Descriptis ita circulis latitudinum & Meridianis, omnia hemisphærii loca in Mappam hanc inscribentur ad puncta, quibus meridianus loci & circulus latitudinis concurrunt: eritque confecta Mappa. Ecliptica vel rectâ lineâ vel Ellipticâ representabitur eâ methodo, quam in secundi modo Mappis explicavimus, negotio minus operoso.

Hujus methodi Mappæ idem præstare valent, quod præcedentium Modorum Tabulæ, præ quibus insuper hanc habent prærogativam, quod circulorum latitudinis decrementum in magnitudine versus polos manifeste referunt.

Si divisio HG & HK non per linearum ductus fieri possit propter magnam oculi D distantiam, facile erit per calculum invenire particulas illas pro singulis gradibus, nimirum juxta hanc proportionem:

Ut distantia oculi à centro Telluris sumpta cum sinu complementi arcus  $\text{\AA}$ quatoris representandi se habet ad sinum ejusdem arcus, ita distantia oculi à Tabula ad partem lineæ HG vel HK, quantum arcum  $\text{\AA}$ quatoris representabit.

Ex. gr. Ponamus oculum D removeri à centro



Telluris E semidiametris illius ducentis : Tabulam vero sive vitrum HK semidiametris centum. Erit itaque DE 200, & DH 100, qualium EB vel EA, EC est 1. Inveniemus primo longitudinem ipsius GHK, quæ semiperipheriam Æquatoris ABC repræsentare debet in hac oculi & vitri distantia. Erit itaque :

Ut DE ad EA, ita DH ad HS vel HK  
 200      100      1      ad  $\frac{1}{2}$  semidia-

metrum Telluris.

Ex quo patet, HK vel HG esse debere longitudinis dimidiæ semidiametri Telluris, quæ profecto nimis vasta est, cum tantam talem lineam in nullo plano exhibere possimus. Ideo pro ipsa Tellure concipimus Terrellam sive globum terrestrem minorem, cujus semidiameter si sit duorum pedum, erit HG vel HK unius pedis, nimirum si oculus ducentis pedibus à centro illius Terrellæ ponatur remotus, vitrum vero pedibus centum.

Si tamen scire placet, quantâ distantia remotus esse debeat oculus ab ipsa Tellure, ut semidiameter Æquatoris EA vel EC faciat projecturam HG datæ magnitudinis, ex. gr. unius pedis, (quorum semidiameter ipsius Æquatoris hoc est semissis axis Telluris continet 19598300) poterit illud investigari hac proportione, suppositâ tamen vitri ab oculo distantia, nempe HD 100000

Ut HG ad DH, ita EA ad DE

1      100000      19598300 ad 1959830000000  
 pedes, quorum 18000 faciunt milliare Hollandicum, ingens profecto distantia.

Sed in praxi non assumimus ipsam Tellurem, sed ejus typum sive Terrellam, à qua non necesse est oculum tanto intervallo remotum supponere : verum ipsa projectura propterea non variatur.

*Modus octavus, quo quilibet datus in Tellu-  
re locus centrum sive medium Mappa  
locum accipit.*

Si placeat habere Mappam, in qua omnium lo-  
corum situs ad nostrum locum vel ad aliquem da-  
tum, ut etiam illorum distantia à nostro loco  
commode queant conspici & inveniri, inventa est  
methodus, quâ ita Telluris superficies repræsentatur,  
ut quivis ejus locus datus medium Mappæ lo-  
cum sive centrum occupet: reliqua loca circa eum  
tanquam centrum jaceant: quales Mappas amant  
illi populi, qui vana opinione gaudent, suam re-  
gionem in medio totius Telluris sitam esse, ut Chi-  
nenses, & olim Judæi.

Cæterum ad Mappam talem describendam, su-  
mamus Amstelodamum debere centrum Mappæ  
occupare: Ejus latitudinem sive elevationem poli  
sumemus esse 52 gr. Oculus constituitur in puncto  
vertici opposito sive in Nadir loci: Vitrum seu ta-  
bula est Horizontis planum, vel ei parallelum  
aliud, si majorem portionem, quam hemisphærium  
placeat repræsentare, quod in hac methodo com-  
modius est, nempe ut planum saltem per depres-  
sum polum transeat.

Assumatur itaque in plano centrum E pro Am-  
stelodamo, & descripta peripheria A B C D, quæ  
Horizontem referet, dividatur in quatuor qua-  
drantes: hi singuli in 90 gradus: diameter B D  
sit meridiana: B Septentrionalis cardo: D Auster.  
Diameter. Ac linea ortus & occasus æquinoctialis  
refert verticalem primarium. A occidens: Co-  
rientalis cardo sive refert locum, qui 90 gradibus  
abest in verticali primario. Omnes verticales re-  
præsentantur lineis rectis per centrum E ad singu-  
los Horizontis gradus ductis, sed ad vitandam

confusionem præstat ommittere, atque infixo ipsi E paxillo regulam circumductilem annexere.

Deinde dividatur B D in gradus 180, nempe ut in prioribus modis, ducendo ab A rectas ad singulos gradus semiperspheriæ B C D. Illud punctum in E B, quod refert 52 gr. arcus B C, erit projectura poli Arctici: notetur literâ P punctum in E D, quod repræsentat 52 grad. arcus D C (à C versus D numerando) erit projectura intersectionis Æquatoris & Meridiani Amstelodamensis. Notetur literâ Q. Et ab illo versus P ascribantur numeri graduum, 1, 2, 3, &c.

Item à Q versus D, & ab B versus P, nempe 52, 53, 54, 55, &c.

Deinde sumtis punctis æqualium graduum à P, nempe 99 & 99, item 88 & 88, &c. describendæ sunt circa hæc partes tanquam diametros peripheriæ circularum, quæ repræsentabunt parallelos sive circulos latitudinis, & Tropicos atque polares cum Æquatore.

Ad Meridianos repræsentandos, primo describatur peripheria per tria puncta A P C: Ea referet meridianum, qui nonaginta gradibus abest ab Amstelodamensi. Ejus centrum sit M in B D (protracta, in N punctum, quod polum Antarcticum referat) situm. P N diameter, ducatur per M parallela ipsi A C, quæ sit F H, protracta ab utraque parte in K, L. Porro circulus P H N F dividatur in 360 gradus, & ex puncto P ad singulos gradus rectæ lineæ (vel solâ regulæ applicatione) quæ lineam K F H L secabunt. Per singula sectionis puncta & ambos polos P, N, tanquam per tria data puncta describendi sunt circuli, qui repræsentabunt omnes meridianos: Centra describendorum arcuum in eadem K L sita sunt, nempe eadem quæ per priorem sectionem inveniuntur, sed hac conditione sumenda, ut pro proximo meri-

merio  
moti  
hoc, &

De  
noru  
Map  
ad A  
loco  
in qu  
bendi  
Ita es  
tim so  
stelod  
Quon  
ciend  
rium.

Mod

Sat  
faliun  
lat,  
positi  
quas  
magn  
Africa  
lineat  
Gene  
modi  
niam  
comm  
xta se  
toris  
qui A  
in hi  
vero

412

meridiano à BDN versus A eligatur centrum remotissimum ad L, & pro secundo, secundum ab hoc, &c.

Descriptis ita circulis latitudinum & Meridianorum facile est ipsa Telluris loca inscribere Mappæ. Et conspicuus erit omnium illorum situs ad Amstelodamum. Porro in regulam affigendam loco Amstelodami debent inferri eadem partes, in quas EB divisâ fuit, & numeri graduum ascribendi (vel milliarum ex commutatione graduum.) Ita enim circumductâ regulâ ad singula loca statim sciemus, & quanto intervallo distent ab Amstelodamo, & in qua plaga jaceant respectu ejus. Quomodo beneficio Globi talis Tabula sit conficienda monstrabimus in Modo quarto Particularium.

*Modus primus Tabularum Geographicarum  
Particularium.*

Satis de Mapparum Generalium sive Universalium constructione diximus: jam locos postulat, ut etiam Particularium sive Specialium compositionem doceamus. Partes itaque Telluris, quas in Mappa representare volumus, sunt vel magnæ vel parvæ. Si magnæ, ut Europa, Asia, Africa, America, commodum erit instituerè Delineationem juxta modos explicatos pro Mappis Generalibus: in diversis tamen partibus diversi modi sunt commodiores. Africa & America, quoniam per eas transit Æquator, non exhibentur commode per primum Modum, sed aptissime juxta secundum, oculo constituto in plano Æquatoris supra meridianum medium inter extremos, qui Africam vel Americam claudunt. Propterea in hisce Mappis Æquator est linea recta, paralleli vero & meridiani sunt arcus circulorum. Sed ad



Europam & Asiam representandam modus primus & sextus sunt magis commodi. Ad terras polares five Zonas Frigidas aptissimum esse Modum primum diximus in illius explicatione.

Primum itaque ducenda est in plano linea recta pro meridiano loci, cui oculus imminere volumus, atque ea in gradus dividenda est juxta methodum explicatam in præcedentibus, & qui gradus erunt latitudinis, quorum numerus ascribendus est. Deinde ex Tabulis excerptenda est latitudo utriusque paralleli, nempe qui regionem illam terminat ab utroque latere quod polos respicit. Harum latitudinum gradus in linea recta five meridiano oculi sunt notandi, & per illa puncta ducendæ rectæ linæ perpendiculares, quæ Mappam claudent versus Septentrionalem & Australem plagam. Deinde paralleli & meridiani ducendi sunt ad singulos gradus: & loca inscribenda sunt, donec Mappa perfectâ sit.

*Modus secundus describendi Tabulas  
particulares.*

Verum in regionibus non ita magnis sed tantum mediocribus vel parvis aliâ methodo uti consueverunt artifices. Primo ducitur linea transversa in extremitate Tabulæ pro circulo latitudinis, in quo regionis describendæ fines Æquatorem respicientes jacent. In ea sumuntur partes æquales tot, per quot gradus longitudinis regio illa extenditur ab illa parte. Deinde ex medio hujus linæ ducitur perpendicularis, quæ tot partes habeat quot sunt gradus latitudinis inter regionis terminos versus Æquatorem & polum. Hæ autem partes quantæ esse debeant, cognoscitur ex proportionem gradus circuli maximi ad gradum paralleli, qui ab inferiori transversa linea representatur. Per terminum hujus perpendicularis ducitur  
alia

alia p  
qua t  
quot  
linæ

Æq

Se

magn

pra il

runt

sume

mino

gradu

paral

bula,

Pe

tz su

ëtâ d

tium

meri

pend

sto e

grad

indie

scrib

loco

ridia

graph

In

runc

expl

teru

bear

los

ta

alia perpendicularis sive inferiori lineæ parallela, in qua totidem gradus longitudinis sumendi sunt, quot in linea inferiori, & quidem æquales illis ipsis lineæ inferioris, si quidem latitudines hæ neque ab Æquatore neque à se invicem multum distent.

Sed si magna sit ab Æquatore distantia, vel si magnus sit excessus ultimæ latitudinis regionis supra illam, quæ Æquatori vicina magis est, non erunt partes (gradus) in superiori transversa linea sumendæ æquales partibus lineæ inferioris, verum minores esse debent juxta proportionem, quam gradus istius paralleli remotioris habent ad gradus paralleli inferioris, quæ proportio cognoscitur è Tabula, quam capite IV posuimus.

Postquam ita in linea superiori & inferiori sumptæ sunt partes pro gradibus longitudinis, lineæ rectæ ducendæ sunt per partium ejusdem numeri initium & finem: quæ rectæ representabunt lineas meridianas. Denique per singulos gradus ejus perpendicularis, quam ex inferioris lineæ medio puncto erigere jussimus, ducendæ sunt per singulorum graduum initia parallelæ lineæ ipsi inferiori, quæ indicabunt parallelos latitudinis. Ultimo loca inscribenda sunt ad puncta, in quibus singulorum locorum latitudinis parallelus & longitudinis meridianus concurrunt. Ita perfecta erit Mappa Geographica pro data regione.

*Modus tertius describendi Tabulas  
particulares.*

In parvi tractûs provinciis representandis plerunque utimur alia methodo, quam in prioribus explicavimus, nimirum ut situm unius loci ad alterum & locorum distantiam accuratius exhibeant Tabulæ. Methodus in eo consistit, ut angulos positionis unius loci ad alios per instrumenta Mathematica inveniamus & deinde apte in

chartam transferamus. Sint, exempli gratia, quinque loca alicujus regionis in Tabula disponenda juxta situm & distantiam suam; appellabimus ea loca A, B, C, D, E. Primo eligemus ex hisce illum, A, ex quo reliqua vel plurima ex illis commode possunt conspici; & adhibito instrumento observabimus angulos positionis ad singula loca, nimirum angulos inter lineam meridianam loci, in quo observamus, & inter plagas reliquorum locorum B, C, D, E. Porro in charta vel plano, in quo representare volumus illa loca, sumemus locum A pro libitu, & ex illo descriptam peripheriam secabimus in gradus (quod tamen non est necesse, si habeamus divisum semicirculum, vel aliud Geometricum instrumentum huic usui aptum); unam diametrum assumemus pro linea meridiana loci A, nempe F A G: altera huic perpendicularis H A K monstrabit ortum æquinoctialem extremitate H, occasum K. F est cardo Septentrionalis, G Australis. Sit jam angulus positionis loci B ad A observatus 30 graduum ab Austro versus ortum, numerabimus in quadrante G H tot gradus, & ducemus ex A lineam per illum gradum. Hæc representabit plagam loci B ab A loco. Eodem modo plagæ reliquorum locorum D E in charta sunt notandæ, si observatæ sint. Deinde eligendus est alter locus ex B, C, D, E, cujus distantia ab A nota sit vel inventa, ex. gr. B locus, & in illo adhibitis instrumentis observandæ plagæ reliquorum trium locorum C, D, E. Hisce factis, in charta nostra apponemus scalam milliarium vel leucarum, quæ magna vel parva assumemus, prout magnam vel parvam Tabulam esse cupimus. Et in linea plagæ loci B ab A sumemus notam distantiam, atque ibi signabimus locum B, & per B ducemus parallelam ipsi F G, quæ representabit meridianum loci B,

& def  
mus e  
C, D,  
A du  
ipso  
si plu

Pol  
moto  
tum  
Tellu  
dium  
neral  
feri  
non e  
rium  
pone  
mum  
vel p  
lodan  
pheri  
pten  
que  
tum  
dran

De  
meri  
stelo  
& ap  
Amf  
ex. g  
Itali  
atqu  
lis ap  
angu  
mur

& descripta peripheria circa B, sicut circa A duce-  
mus ex B lineas, quæ denotent plagas locorum  
C, D, E, atque ubi hæ lineæ secant illas, quæ ex  
A ductæ sunt, puncta intersectionum erunt loca  
ipsorum C, D, E. Atque eodem modo agendum,  
si plura fuerint loca.

*Modus quartus, qui Globum adhibet.*

Possumus beneficio Globi terrestris locorum re-  
motorum à se invicem & diversorum regnorum si-  
tum & distantiam exhibere in plano; imo totam  
Telluris superficiem: ita ut datus quivis locus me-  
dium occupare videatur, sicut in modo sexto ge-  
nerali explicavimus. Ita ut hic modus possit accen-  
feri modis pro Generalibus Mappis: sed præstat  
non extendere representationem ultra hemispha-  
rium. Ex. gr. Propositum sit in charta ante oculos  
ponere omnium locorum situm ad Amsteloda-  
mum, & distantiam ab hoc loco. Primo in charta  
vel plano sumatur punctum medium pro Amste-  
lodamo, notetur litera A. Ex eo describatur peri-  
pheria F H G K. F G sit linea meridiana sive Se-  
ptentrionis & Austri linea: H K sit linea ortus at-  
que occasus. F Septentrionem, G Austrum, H or-  
tum, K occasum monstret. Dividantur singuli qua-  
drantes in gradus nonaginta.

Deinde in Globo adducatur Amstelodamum ad  
meridianum æneum, & polus elevetur juxta Am-  
stelodami latitudinem, quadrans affigatur vestigi,  
& applicetur ad singula loca, quorum situm ad  
Amstelodamum in charta representare volumus,  
ex. gr. ad Gallix initium, medium & finem, ita ad  
Italix, Hispanix, Hungariæ, Sueciæ, &c. terminos,  
atque annotentur anguli quos quadrans in singu-  
lis applicationibus facit cum meridiano, hoc est  
anguli positionis illorum locorum ad Amsteloda-  
mum: præterea gradus quadrantis inter Amstelo-  
damum



damum & singula loca, hoc est distantia singulorum. Hisce factis seponatur globus, in charta vero ducantur ex A lineæ pro plagis singulorum locorum, nimirum quæ cum meridiana linea tales angulos faciant, quales annotati sunt antea, & quidem inter puncta Cardinalia notata. (quomodo hoc labore ducendarum linearum superledere possimus, monebimus infra.) In hisce plagarum lineis inveniendæ sunt puncta pro ipsis locis, sumendo distantias ab Amstelodamo, quod duplici modo facere possumus. Vel enim parvo intervallo remota sunt loca, quæ notare volumus, vel magno quidem intervallo, at parvam Tabulam conficere placeat; vel denique loca magno intervallo removen- tur & majoris formæ Tabulam formare animus est. In prioribus duobus casibus, sufficit scalam graduum facere, dividendo lineam aliquam in æquales partes, quarum singulæ representent gradum. Ex hac scala sumemus distantias singulorum locorum antea notatas intervallo circini, & in plaga singulorum locorum lineam inferemus. Terminus erit notandus appellatione loci istius. Atque ita omnia loca in Tabula notabimus circa Amstelodamum.

Sed si Mappa sit majoris formæ conficienda, & regiones remota sint norandæ, non sufficit scalam æqualium partium pro gradibus usurpare, sed alio modo dividenda erit linea, nimirum juxta Perspectivæ leges, quoniam in hoc modo ponimus oculum infra Horizontem Amstelodamensem in loco Antipodum, & pro vitro assumimus ipsum Horizontem, si hemisphærium representare animus est, vel si majorem vel minorem hemisphærio partem, tunc assumimus planum Horizonti parallelum, quod tanto arcu ab eo distet, quanto pars representanda ab hemisphærio. Describatur itaque periphæria circuli in alia char-

ta, M  
perper  
dus 90  
ultra  
minu  
nemp

Por  
quadr  
hemis  
tam  
indica  
tamcu  
loci ab  
volun  
viden  
tes no  
dibus  
cis ab  
tur, e  
erit M

In  
gis d  
in reg  
tium  
ducat  
rum l  
quovi  
princi  
esse d

Ma  
lineæ  
los, f  
exhib  
ces e

ta, M centrum, NO diameter una, PQ altera perpendicularis. Quadrans PQ dividatur in gradus 90, & sumatur infra Q tot gradus, quota pars ultra Hemispharium est representanda, & per terminum R ducatur ipsi QM parallela ad MO, nempe RS.

Porro ex O ducantur rectæ ad singulos gradus quadrantis NQ vel NQR, (si major portio quam hemispharium exhibendum sit) quæ dividunt rectam MQ vel SR in partes tales, quæ in projectura indicabunt gradus. Dein assumatur linea, quantumcumque volumus esse distantiam remotissimi loci ab Amstelodamo in Tabula, hoc est quantum volumus esse dimidiam Tabulam. Illa linea ita dividenda erit sicut MQ vel SR divisa fuit: & partes notandæ numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c. pro gradibus. Ex hac scala sumtæ distantia pro singulis locis ab Amstelodamo si in lineas plagarum inferantur, exhibebunt puncta pro ipsis locis, & confecta erit Mappa, quam cupiebamus.

In praxi supersedere possumus linearum pro plagis ducendarum labore, quippe scalam graduum in regula designare commodum erit, cujus initium si applicetur Amstelodamo, & regula circumducatur ad gradus peripheriæ pro plagis singulorum locorum, poterit statim notari punctum pro quovis loco, numerando distantiam in regula à principio scalæ. Ipsa praxis facilem hanc methodum esse docebit.

#### *Modus quintus. De Mappis nauticis.*

Mappæ nauticæ (*Pat-caerte*, *Zee-Caerte*) rectilinae sunt, & habent meridianos omnes parallelos, secus ac secundus modus in posteriori membro exhibebat. Duplices sunt, sicut univ ersales duplices esse diximus in modo quarto & quinto univ-

ver-

versalium, nempe æqualium graduum latitudinis vel inæqualium quas nautæ Belgæ vocant *gelyck Graden Pas-Caerten*, & *wassende Graden Pas-Caerten*. Constructio eadem est, quæ illarum universalium; differentia tantum est, quod partem tantum representant, & plures compassos nauticos exhibent. De usu dicemus in arte Nautica. Chartæ æqualium graduum fiunt, si representetur pars terræ parva in latitudine varians, sicut sunt Mappæ pro navigatione maris mediterranei: Inæqualium graduuna fiunt, si magna sit latitudo.

## CAPUT XXXIII.

*De distantia locorum.*

## PROPOSITIO I.

**D**atis duobus punctis sive locis in globo, ducere ab uno ad alterum lineam sive arcum, qui sit pars peripheriæ maximæ Globi istius. Sive, In superficie Globi describere peripheriam circuli maximi quæ transeat per duo data puncta.

Concipiamus ductas rectas lineas ab uno puncto ad alterum, & ab ambobus ad centrum Globi vel Telluris, quæ tres rectæ lineæ facient Triangulum, atque ideo in uno plano sunt. Secet hoc planum protensum superficiem Globi: erit sectio peripheria circuli maximi, & arcus inter loca interceptus erit is qui quaeritur. Vel, Sumatur circino intervallum quadrantis peripheriæ maximæ, & uno pede defixo in punctum unum ex datis describatur arcus in superficie Globi: Deinde alius arcus pede defixo in alterum datum punctum. Communis sectio horum arcuum erit polus describendæ peripheriæ, sive in quo si designatur pes unus circini, & describatur in superficie Globi peri-

periph  
loca in

Dig  
brevis  
est tan  
arcus p  
loca.

Brev  
linea  
constat  
finitio  
rum  
distan  
co ad  
luris  
recta il  
vissim  
perfici  
vias ab  
ficie T  
mus i  
superfi  
ptas li  
nemp  
ter du  
cedent  
arcus  
quam  
tes (c  
mate  
pheria  
æqual  
minor  
curvæ  
tes su

peripheria, habebimus arcum quaesitum inter data loca interceptum.

PROPOSITIO II.

*Distantia duorum locorum in superficie Telluris brevissima, sive Via brevissima ab uno loco ad alium est tantum una (exceptu antipodum locu) nempe arcus peripheria maxima, qua intercipitur inter duo illa loca.*

Brevissima duorum punctorum distantia, est linea recta ab uno puncto ad alterum ducta, ut constat ex Archimedea definitione, & ex aliis definitionibus facile est deducere. Itaque etiam duorum locorum in superficie Telluris existentium distantia brevissima est linea recta, quae ab uno loco ad alterum ducta esse concipitur. At cum Telluris superficies sit convexa curva, inde fit, ut recta illa linea, quae vere est duorum locorum brevissima distantia, cadat infra cavitatem istius superficies. Nos vero consideramus illas tantum vias ab uno loco ad alium, quae in ipsa sunt superficie Telluris, & proinde curvae lineae: ideo addimus in Propositione, distantiam brevissimam in superficie Telluris. Inter haec vias sive interceptas lineas una est, quae omnium est brevissima, nempe arcus peripheriae maximae interceptus inter duo quaelibet puncta, ita ductus, sicut in praecedenti Propositione diximus. Quod itaque hic arcus sive haec curva intercepta linea sit brevior, quam omnes aliae curvae lineae interceptae circulares (quarum infinitae sunt) patet ex hoc theoremate Geometrico: Si duarum inaequalium peripheriarum arcus sumantur, quorum subtensa sit aequalis vel eadem, erit majoris peripheriae arcus minor quam minoris peripheriae. Etenim omnes curvae lineae circulares per duo puncta transeuntes sunt minores peripheriae Telluris excepto illo arcu



arcu, qui supponitur maximæ esse peripheriæ. Quod autem hic arcus etiam minor sit, quam alia curvæ non circulares (solidæ lineæ, ut helices) quales infinitæ cogitari possunt in superficie Telluris interceptæ inter duo loca, ostensum est ab aliis: pertinet enim hoc Theorema non ad Geographiam sed ad Geometriam, quæ etiam ostendit, quod tantum unus arcus peripheriæ maximæ duci possit ab uno loco ad alium, non plures.

### PROPOSITIO III.

*Distantia locorum non mutantur.*

Itineraria quidem locorum distantia modo major, modo minor esse potest: at vera & brevissima distantia Geographica manet eadem, nisi superficiem telluris divelli vel disrumpi concipias. Loca autem hic intelligimus puncta Telluris immobilia sive immota. Si itaque superficies inter duo loca intercepta sit facta altior, erit quoque distantia locorum facta major; si depressior, erit minor.

### PROPOSITIO IV.

*Nulla loca Telluris distant majori intervallo, quam 2700 milliarium Germanicorum, quorum quindecim ponuntur gradum unum facere.*

Etenim quoniam Telluris superficies Sphærica est, non potest inter duo ejus puncta cadere arcus brevissimus, qui major sit quam 180 gr. hoc est quam semiperipheria circuli maximi. Atqui 180 gr. faciunt 2700 milliaria Germanica, si unus gradus ponatur facere quindecim. Quare nulla loca distant pluribus, quam 2700 milliariibus Germanicis. Alia vero est conditio itinerariæ distantiæ.

*Dist*  
607177,  
*Dist*  
fed inf  
prie lo  
tia, sec  
*Dist*  
periph  
lium in  
tur, su  
Peri  
per loc  
*Dist*  
tipodu  
Itaque  
quoqu  
tius lo  
Qui  
veritat  
perspic

*Da*  
illa lo  
tiam  
tiam n  
nicor  
*Dat*  
polus  
drans  
stanti  
rentur  
nus r  
deind  
tum

PROPOSITIO V.

*Distancia antipodum est 2700 miliarium Germanicorum, sive 180 graduum.*

Distancia inter antipodes brevissima non est una, sed infinita sunt, eaque omnes aequales, etsi proprie loquendo non possint dici brevissima distantia, sed, quibus nulla breviores sunt.

Distanciae circulares inter antipodes sunt omnes peripheriae maximae nulla peripheriae minores, quantum inter alia loca; quae non e diametro opponuntur, sunt infinitae.

Peripheria per duo loca transiens, transit etiam per loca antipodum istorum locorum.

Distanciae loci alicujus a duobus locis, qui antipodum sunt, simul sumtae faciunt 180 gradus. Itaque cognita distantia loci alicujus ab alio, nota quoque erit distantia loci illius ab antipodum alterius loco.

Quinque haec propositiones ita manifestae sunt veritatis, ut cuilibet eas perpendiculari facile sit eam perspicere & intelligere.

PROPOSITIO VI.

*Dato loco aliquo in superficie Globi, exhibere omnia illa loca, quae habeant unam & eandem datam distantiam a loco illo dato; oportet autem datam distantiam non esse majorem quam 2700 miliarium Germanicorum.*

Datus locus adducatur ad aeneum meridianum, polus elevetur juxta loci latitudinem atque quadrans affigatur verticali puncto. Porro data distantia convertatur in gradus, qui gradus numerentur in quadrante a puncto verticali. Terminus numerationis noletur creta: circumducatur deinde quadrans super superficiem globi; notatum punctum indicabit vel monstrabit omnia loca

loca Telluris, quæ datam distantiam à dato loco habent.

Vel, Sumatur intervallo circini in Æquatore gradus conversæ distantix, & uno pede defixo in datum locum, circumducatur pes alter. Loca, per quæ transit, sunt quæsitæ.

Si vero gradus ex conversa distantia orti, plures sint, quam nonaginta, hoc est quadrante, sumatur eorum complementum ad 180: & antipodum locus adducatur ad superiorem ænci Meridiani semicirculum; polus elevetur pro ejus latitudine, & quadrans verticali puncto affigatur, & numerentur in eo gradus complementi; terminusque numerationis cretâ notetur. Si tunc circumducatur quadrans, notatum ejus punctum omnia quæsitæ loca, quæ nimirum à dato loco datam habebunt distantiam. Si circino expedire negotium placet, ages, ut antea diximus in Mappis Chorographicis.

#### PROPOSITIO VII.

*Quanam faciant, ut itineraria distantia sit major quam vera sive brevissima & Geographica.*

1. Sylvæ, quæ inter loca aliqua jacent, inviæ.
2. Montes alti & valles profunda.
3. Paludes, lacus & aqua in genere, si terrestria itinera spectemus.
4. In maritimis itineribus, hoc est in navigationibus, procurrentes terræ, & insulæ obstant directo itincri.
5. Maris peculiaris fluxus.
6. Venti.

Sed quærat aliquis, annon fieri possit, sive annon sint loca, quorum itineraria distantia sit minor, quam Geographica brevissima? Ad hoc respondeo, etsi Telluris figura sit spherica quod ad sensum, tamen in primo libro jam indicavimus, hanc figuram non esse omnino Geometricam, sed multis locis elevatis atque depressis inæqualem reddi

reddi.  
perficie  
ex. gr.  
respeçt  
pressa  
loca ita  
Geogra  
in supe  
tro rem  
prellius

*Duo  
nre, ut*

Add  
neum,  
alterun  
gradus  
hi grad  
suram  
rum lo

Vel,  
rum, &  
quot gr  
corum  
suram c

Si ve  
vel circ  
major  
loci an  
Inquir  
bus: re

In M  
cularib  
te & ve  
laribus  
mijjari

reddi. Si itaque concipiamus certam Telluris superficiem, sive superficiei à centro distantiam, ex. gr. vulgarem semidiametrum 860 milliarum, respectu cujus sumenda sint loca elevata vel depressa; hoc, inquam, supposito, possunt esse duo loca ita sita, ut itineraria distantia sit minor, quam Geographica brevissima: nimirum si loca illa sint in superficie Telluris, quæ 860 milliaribus à centro removetur, spatium autem intermedium sit depressius.

## PROPOSITIO VIII.

*Duorum locorum in Globo datorum distantiam invenire, ut etiam in Mappis Chorographicis.*

Adducatur unus è datis locis ad meridianum æqueum, quadrans affigatur vertici, & applicetur ad alterum locum datum: numerentur tunc in hoc gradus intercepti inter verticem & hunc locum: hi gradus convertantur in millaria vel aliam mensuram, in qua cognoscere volumus distantiam illorum locorum; hæc erit quæsitæ.

Vel, capiatur circino intervallum duorum locorum, & translato hoc ad Æquatorem consideretur, quot gradus in hoc occupet: hi enim sunt ipsa locorum distantia, quos in millaria vel aliam mensuram convertere debemus.

Si vero major sit distantia, quam ut quadrante vel circino intervallum sumi possit (nimirum si major quam 90 gradus), erit unius loci ab alterius loci antipodibus distantia minor, quam 90 grad. Inquiratur itaque hæc, & auferatur, ab 180 gradibus: residui gradus erunt distantia quæsitæ.

In Mappis universalibus, sicut etiam in particularibus magnarum partium non potest accurate & vere inveniri distantia locorum: in particularibus autem Chorographicis solet apponi scala milliarium vel leucarum, cujus beneficio cognoscitur



scitur locorum distantia in illis Mappis contentorum. Si enim circino sumas duorum locorum intervallum, & hoc in scalam transferas, statim cognosces locorum illorum distantiam.

Sed si Mappa sit majoris alicujus portionis, non caret vitio hæc methodus. Etenim nulla Mappa fieri potest ulla methodo, quæ locorum distantias veras exhibeat: sed talis quidem potest, quæ unius loci à reliquis omnibus distantiam monstrat, ut diximus in Methodo constructionis Mapparum.

### PROPOSITIO IX.

*Dat à latitudine & longitudine duorum locorum, invenire eorum distantiam.*

Facilis est solutio hujus problematis per Globum, & Planisphærium Catholicum; difficilis vero, sed accurata per calculum & Trigonometricam supputationem.

In Globo fit hoc modo: Assumatur meridianus aliquis pro libitu (præstat assumere unius loci meridianum, si per ejus longitudinis punctum aliquis transeat, nempe si longitudo sit 10, 20, 30, &c. vel sequentium denariorum, vel quod commodius erit, assumatur primus meridianus) & numeretur in Æquatore ab eo differentia longitudinis locorum, terminus numerationis adducatur sub æneum meridianum, & numeretur in hoc latitudo alterius loci; punctum Globi, quod subjicitur termino numerationis, notetur cretâ: in primo quoque meridiano notetur punctum latitudinis pro altero loco. Deinde circino capiatur intervallum inter notata puncta, & transferatur vel in Æquatorem vel in primum meridianum: ita cognoscemus distantiam locorum in gradibus & graduum partibus: qui gradus convertendi erunt in milliaria vel aliam mensuram, quam

quam v  
circino  
VII, ve

Quo  
est ad  
cio pro  
matis fr  
dum pe

Sunt  
una & c  
differen  
vel dive  
alia met  
vertatur  
tia est  
speciei f  
ra austr  
Si differ  
semicirc  
modo a  
gere. Al  
hoc est f  
extra Æ

Sed r  
telligent  
solution  
manifest  
cere deb

1. Si  
gnomin  
tudinum  
liaria ve

2. Si e  
si nomin  
stralis. I  
nam sum  
bus.

quam volumus. Si intervallum majus sit, quam ut circino commodè sumi possit, agemus, ut in Prop. VI, vel filum accurate tensum adhibebimus.

Quoniam planisphaerium aptius vel commodius est ad usum, praesertim nautis, & multi ejus beneficio problemata solvere amant, atque hujus Problematis frequens usus est, placet etiam hanc methodum per planisphaerium proponere.

Sunt autem casus duo problematis. Vel enim una & eadem est locorum data longitudo aut  $180$  differentia, nempe si in eodem meridiano jaceant, vel diversa est longitudo. Si eadem, non opus est alia methodo, nisi ut differentia latitudinis convertatur in milliaria: namque ipsa illa differentia est distantia locorum in gradibus: si diversae speciei sint latitudines, nempe una borealis, altera australis, addendi erunt gradus latitudinum: Si differentia  $180$  graduum, nempe si in diversis semicirculis ejusdem circuli longitudinis, simili modo agendum erit, quod cuivis facile est colligere. Aliter fit, si longitudo locorum sit inaequalis, hoc est si in diversis meridianis sita fuerint loca, & extra Aequatorem.

Sed utile fuerit ad distinctam problematis intelligentiam, enumerare prius casus, qui variant solutionem, & plerique facillimam habent, ut manifestum erit per exempla, quae studiosi exercere debent.

1. Si eadem sit locorum longitudo & sint cognominis latitudinis. In hoc casu differentia latitudinum est ipsa distantia in gradibus, qui in milliaria vel aliam mensuram mutari possunt.

2. Si eadem sit locorum longitudo, sed sint diversi nominis latitudines, unius borealis, alterius australis. In hoc casu, addendae erunt latitudines in unam summam, haec indicabit distantiam in gradibus.

3. Si differentia longitudinum sit 180 graduum, & sint cognominis latitudinis, erunt sumenda complementa latitudinum ad 90 gr. sive locorum distantia à polo vicino, & illæ addendæ: summa enim indicabit distantiam in gradibus.

4. Si differentia longitudinum sit 180 graduum, & sint diverfi nominis latitudines, sumatur latitudinum differentia, & auferatur ab 180 gradibus vel semicirculo. Residuus numerus exhibebit distantiam in gradibus.

5. Si ambo loca fuerint in Æquatore, differentia longitudinis est ipsa distantia.

6. Si latitudo locorum fuerit una & eadem, neque major viginti gradibus, & differentia longitudinis parva, ingrediemur cum ea latitudine Tabulam magnitudinis parallelorum positam cap. xv. & gradus unius quantitatem excerpemus. Deinde differentiam longitudinis sumemus, & hosce gradus convertemus in excerpta milliaria vel excerptam mensuram.

7. Si vero & longitudo & latitudo sit diversa, vel, si latitudo quidem eadem, sed major quam 20 gr. & longitudinis differentia majuscula, quod quidem in plerisque exemplis usu venit, in hoc casu non licet uti prioribus compendiis, sed difficilior est solutio, & de hoc casu præcipue proponitur Problema. Solutionem per globum jam tradidimus; per planisphærium methodus hæc est: Regula planisphærii adducatur ad unius loci latitudinem sive gradum elevationis poli: deinde numeretur differentia longitudinum in meridianis, incipiendo ab altera parte, & ubi punctum observetur, quo meridianus hic terminans numerationem secat parallelum alterius loci latitudinis. Super istud punctum Indicis extremitas constituitur. Hoc facto regula applicetur ad Æquatoris lineam. Numerus parallelorum inter po-

polun  
quæsi

Ita  
est m  
nearu  
ne ex  
ne eti  
vitur  
circuli  
cus B  
num  
180 g  
ad 360  
sumat  
loci A  
B: de  
& FH  
ex pun  
æquali  
plagar  
nes; s  
ab una  
factis  
sive sub  
in grad  
tur arc  
gradib  
Mod  
goloru  
neque  
tiam ex  
sola me  
sphæric  
distanti  
nicum,  
distanti  
angulus

polum & Indicem interceptorum est distantia  
quæ sita in gradibus.

Ita per planisphærium solvitur problema. Alia  
est methodus à Maurolico inventa, quæ per li-  
nearum ductus in circulo docet jucundâ operatio-  
ne exhibere distantiam, ex qua lineari descriptio-  
ne etiam deducitur modus quo per calculum sol-  
vitur problema. Describatur centro E peripheria  
circuli quædam: semidiameter una BE: ar-  
cus BA sumatur æqualis differentiæ longitudi-  
num locorum (si differentia sit major, quam  
180 gr. sumpta, hujus differentiæ complementum  
ad 360 gr.), & ducatur semidiameter AE. Deinde  
sumatur arcus AF (versus B) æqualis latitudini  
loci A, & ex B arcus BG æqualis latitudini loci  
B: demittatur GI ex G perpendicularis in BE,  
& FH ex F in AE. Ducatur IH, & super hanc  
ex punctis I & H erigantur perpendiculares, IL  
æqualis IG, & HK æqualis HF (in eandem  
plagam, si latitudines locorum fuerint cognomi-  
nes; sed si diversi nominis, tunc ducenda erit IL  
ab una plaga rectæ IH, & HK ab altera). Hisce  
factis recta LK erit subtensa quæ sita distantia  
sive subtensa arcus illius, qui distantiam indicabit  
in gradibus. Itaque intervallo circini KL, sum-  
atur arcus BX: hic representabit distantiam in  
gradibus.

Modus iste Maurolici ex sphæricorum Triangulorum solutione vel habitudine est desumptus, neque linearis hæc methodus accuratam distantiam exhibebit, etsi facilis sit & jucunda praxis: sed sola methodus per numeros vel Trigonometriam sphæricorum Triangulorum exhibet accuratam distantiam. Habetur hic enim Triangulum sphæricum, in quo dantur duo latera, nempe locorum distantia à polo (complementa latitudinum) & angulus contentus, cujus mensura est differentia



longitudinis. Quæritur latus tertium. Cujus inveniendi etiam plures sint methodi, tamen generalissima & casuum varietatem negligens est hæc:

1. Si latitudines locorum sint cognomines, fiat: Ut quadratum sinus totius ad rectangulum contentum sub sinibus distantiarum locorum à polo, ita sinus versus differentiarum longitudinum (si ea major sit quam 180 gr. sumitur ejus complementum ad 360 gr.) ad quartum quendam numerum. Sumatur deinde latitudinum differentia, & hujus complementi sinus. Porro inventus antea quartus numerus conferatur cum hoc sinu: Si huic fuerit æqualis, erit locorum distantia 90 graduum. Si minor fuerit, subtrahatur, & residuus erit sinus arcus, cujus complementum est distantia locorum. Si denique major sit inventus quartus dicto sinu, subtrahatur hic ex illo, & residuus erit sinus arcus, qui adjectus ad 90 gradus exhibebit distantiam quæsitam in gradibus, qui convertendi sunt in distantiam itinerariam.

2. Si latitudines sint diversi nominis, nempe una borealis, altera australis, sumatur pro loco alterutro ejus antipodum locus, & hujus distantia inveniatur ab altero loco juxta dictam methodum. Erit enim hujus latitudo eadem quæ loci istius, sed ejusdem nominis cum altero loco: Itaque in Triangulo spherico erunt duo latera data & angulus est complementum differentiarum longitudinis locorum ad 180 grad. (vel excessus supra 180, si differentia hæc major fuerit quam 180.) Inventâ itaque distantia inter unum locum & alterius loci antipodes, habetur quoque ipsorum locorum distantia. Etenim hæc est prioris complementum ad 180 gr. ut in præcedenti propositione dictum est.

In locis propinquis & non multum ab Æquatore distantibus (nimirum non ultra 18 gradum)

faci-

facilio  
quæ d  
nimir  
dratur  
drata  
cem qu  
parum

Vel  
loca n  
bula c  
nem p  
Et, ut  
leli, it  
differe  
joris la  
ferent

Faci  
Logari  
obliqu  
Sic eni  
est.

Dat  
unus ab

Hoc  
co abft  
laterib  
inveni  
in hoc  
locoru  
to later  
unius l  
mentu

Per g  
modo.  
diano

faciliori methodo, etsi non Apodictica, utemur, quæ distantiam exhibebit à vera parum diversam: nimirum differentiæ longitudinis sumemus quadratum, atque etiam latitudinis differentiæ. Quadrata addemus atque ex aggregato extrahemus radicem quadratam. Hæc indicabit distantiam locorum parum à vera discrepantem.

Vel ita ages magis certâ methodo, quæ etiam ad loca ultra 20 gr. latitudinis adhiberi potest: Ex tabula quantitatis parallelorum excerne præportionem paralleli majoris latitudinis ad Æquatorem: Et, ut quantitas Æquatoris ad quantitatem paralleli, ita differentia longitudinis ad alium, sive ad differentiam longitudinis sumtam in parallelo majoris latitudinis. Hæc quantitas assumatur pro differentia latitudinis, & fiat ut prius.

Facilior est problematis solutio, si Tabulas Logarithmorum adhibeamus, & Triangulum obliquangulum in duo rectangula resolvamus. Sic enim nulla multiplicatione vel divisione opus est.

#### PROPOSITIO X.

*Datâ latitudine duorum locorum, & plagâ in qua unus ab altero situs est, invenire distantiam.*

Hoc problema idem est cum illo Trigonometrico abstracto: Datis in Triangulo spherico duobus lateribus, & angulo qui uni lateri dato opponitur, invenire latus tertium. Data enim duo latera sunt in hoc problemate Geographico, distantia duorum locorum à polo, & angulus oppositus alterutri dato lateri est angulus positionis sive angulus plagæ unius loci ad alterum, vel hujus anguli complementum ad 180 gr.

Per globum itaque solutio problematis fit hoc modo. Assumatur primus meridians pro meridiano loci, cujus plaga ad alterum non datur: &

in hoc meridiano notetur punctum latitudinis pro isto loco. Deinde polus eleuetur pro latitudine alterius loci, & quadrans affigatur vertici, altera autem ejus extremitas applicetur Horizontis plagæ vel gradui, pro data plaga.

Deinde volvatur globus, donec notatum in meridiano primo punctum ad quadrantem perveniat. Ita arcus quadrantis inter verticem & punctum illud interceptus est distantia quæsitæ duorum locorum: simul habebitur differentia longitudinis in Equatore, nempe arcus Equatoris inter æneum & primum meridianum interceptus.

Quomodo per planisphærium, & per calculum tam vulgarem quam Logarithmicum problema fit solvendum, relinquo vivæ Præceptorum informationi, ne multa hic dicam, quæ multis non erunt usui.

#### PROPOSITIO XI.

*Datâ duorum locorum longitudine, unius latitudine & plaga in qua alter locus ad hunc jacet, invenire distantiam.*

Habemus iterum Triangulum sphericum, cujus latera sunt, distantia locorum à polo & ipsorum locorum mutua distantia, in quo datur unum latus, nempe distantia unius loci à polo, & dantur duo anguli, unus, cujus mensura est differentia longitudinis, alter ex data plaga alterius loci cognoscitur. Ex hisce tribus datis quæritur latus oppositum angulo differentia longitudinis. Solutio fieri potest facilis per globum, & per planisphærium: & per calculum Logarithmicum satis accurata, sicut etiam per calculum vulgarem. Nos ob causam in præcedenti propos. allatam solam methodum, quæ globum adhibet, monstrabimus, etsi per planisphærium facilior sit; sed quæ per globum fit, ipsum Triangulum representat.

Pri-

Pris  
loci,  
ab eo  
longit  
& ad  
presen  
tur in  
ro pol  
figatur  
zontis  
quadra  
bit alt  
ptus in  
quæsit  
jus loc

Dat  
sive ej  
tertius  
terris a  
Hab  
jus tria  
datur  
rum (c  
& ang  
reliqu  
Om  
rium a  
tantum  
magis  
Gra  
in æne  
termin  
stantia  
termin  
applic

Primus meridianus assumatur pro meridiano loci, cujus latitudo non datur: Et in Æquatore ab eo meridiano numerentur gradus differentię longitudinis locorum. Terminus notetur creta, & ad meridianum æneum adducatur: ita hic representabit meridianum alterius loci; numerentur in eo gradus datę latitudinis, & globo immoto polus elevetur pro ea latitudine: Quadrans affigatur vertici, altera extremitas ad plagam Horizontis datam. In hoc globi situ punctum, in quo quadrans secat primum meridianum, representabit alterum locum, & arcus quadrantis interceptus inter verticem & illud punctum est distantia quę sita. Habetur quoque eadem operę alterius huius loci latitudo.

## PROPOSITIO XII.

*Datę duorum locorum in uno Meridiano sitorum, sive ejusdem longitudinis distantia, & plagę, in quibus tertius aliquis locus ab illis duobus jacet, invenire huius tertii ab utroque illorum distantiam.*

Habemus iterum Triangulum sphericum, cujus tria latera sunt distantię inter tria illa loca. Et datur unum latus, nempe distantia duorum locorum (quę in gradus convertenda erit, nisi ita detur) & anguli duo adjacentes dantur, quæruntur duo reliqua latera.

Omissis methodis per calculum & planisphærium agentibus, etsi accuratioribus, trademus hic tantum eam, quę per globum solvit, & ipsam rem magis ob oculos ponit.

Gradus distantię duorum locorum sumantur in æneo meridiano ubicunque libet, & notentur termini: ita ut hi representent loca, quorum distantia datur. Deinde elevetur polus pro unius termini latitudine, quadrans affigatur vertici & applicetur ad plagam datam, in qua alter locus ad



locum, qui à termino illo representatur, situs est, & cretà notetur quadrantis in globo extensio sive vestigium. Dein polus eleuetur pro alterius termini latitudine, & quadrans illi termino affigatur, altera extremitas ad alteram plagam datam. Punctum, in quo quadrans secabit arcum cretà descriptum, representabit locum tertium, unde facile erit ejus distantiam à duobus istis terminis sumere.

### C A P U T XXXIV.

#### *De Horizonte sensibili sive visibili.*

**H**orizon sensibilis dicitur peripheria in superficie Telluris, quæ terminat oculi circumducti prospectum, sive quæ terminat partem superficiæ, quam oculus circumductus videre potest, sive ex qua radii ad oculum pervenire possunt. Ejus semidiameter, dicitur arcus Telluris maximus inter pedem spectatoris & peripheriam illam interceptus, qui proinde in eam perpendicularis est.

#### PROPOSITIO I.

*Horizontis sensibilis extensio sive semidiameter tam pro diversa oculi altitudine, quam pro diversitate assumpta semidiametri Telluris varia existit.*

Sit Telluris circulus maximus  $M P N Q$ .  $T$  centrum:  $TP$  semidiameter,  $PO$  altitudo oculi:  $O$  sit oculus. Ducantur ex  $O$  tangentes  $ON$ ,  $OM$ : & concipiamus radium  $NO$  quasi circumduci in superficie Telluris: atque ita describere peripheriam: hæc erit Horizon sensibilis: ejus semidiameter  $PN$ ,  $PM$ : Etenim radii  $NO$ ,  $MO$ , sunt ultimi, qui ad  $O$  oculum possunt pervenire à superficie Telluris, quam hic perfecte rotundam esse supponimus.

Et

Et  
assum  
cus m  
FP p  
erit c  
rium.

Hæ  
tiqui  
Horiz  
crobit  
dioru  
nes ft  
bertus  
rium  
liarius  
millia  
tis ha  
duas,  
sumta  
festun

Da  
diamet  
zontis  
PC  
midia  
ciem,  
ctum:  
tudo  
pedun  
habeb  
TO &  
sive 9  
hanc p  
Ut  
NOT

Et manifestum est, si minorem vel majorem assumamus altitudinem  $PO$ , quod etiam  $PN$  arcus major vel minor sit futurus. Eodem modo si  $FP$  ponatur plurium vel pauciorum milliarium, erit quoque  $PN$  plurium vel pauciorum milliarium.

Hæ duæ causæ esse videntur, quod Autores antiqui diversas opiniones de magnitudine hujus Horizontis sive extensionis Visus secuti sint. Macrobius enim assignat ei semidiametrum  $PN$  stadiorum 180, hoc est  $22\frac{1}{2}$  milliarium. Eratosthenes stadiorum 350, quæ faciunt 44 milliaria. Albertus Magnus, stadiorum 1000, hoc est, milliarium 125. Proclus stadiorum 2000, hoc est milliarium 250. Plurimi assignant 500 stadia, sive milliaria  $62\frac{1}{2}$ . Existimo tamen causas diversitatis harum assignationum non esse tantum illas duas, quas dixi, sed etiam ipsorum stadiorum assumptam diversitatem, ut ex sequenti Propos. manifestum est.

## PROPOSITIO II.

*Datâ staturâ hominis à pede ad oculum, & semidiametro Telluris datâ, invenire semidiametrum Horizontis sensilis.*

$PO$  sit hominis statura:  $O$  oculus.  $TP$  est semidiameter.  $ON$  radius tangens Telluris superficiem, terminat Horizontem sensilem sive aspectum: itaque  $PN$  est semidiameter; hujus longitudo quaeritur. Addatur  $PO$ , ex. gr. quinque pedum ad  $TP$  semidiametrum 19598300: ita habebitur  $TO$ , & in Triangulo  $NTO$  præter  $TO$  &  $TN$  scimus angulum  $TNO$  esse rectum, sive 90 gr. Itaque angulus  $NTO$  invenitur juxta hanc proportionem:

Ut  $TO$  ad  $TN$ , ita sinus totus ad sinum anguli  $NOT$ , cujus complementum ad 90 gr. est angulus

lus  $NTO$  sive arcus  $NP$ , qui in milliaria potest converti.

**COROLLARIUM.** Licet itaque cognoscere, si alia atque alia assumatur quantitas semidiametri  $TN$ , vel  $TP$ , atque alia oculi  $O$  altitudo, quanta inde existat variatio Horizontis sensilis.

**PROPOSITIO III.**

*Datâ oculi altitudine in turri vel monte, invenire distantiam ultimi puncti, ad quod oculus se extendit, sive quod oculus videre potest.*

Sit  $PO$  data altitudo turris, in qua oculus constitutus circumspicit loca.

In Triangulo itaque  $NTO$  rectangulo data se habent eodem modo, ac in præced. problemate. Itaque angulus  $NTP$  & arcus  $NP$  invenientur eodem modo, quo in præcedentis solutione usi fuimus.

**PROPOSITIO IV:**

*Datâ semidiametro Horizontis sensilis, sive datâ distantia maximâ, ex qua oculus videre supponitur, invenire altitudinem oculi.*

Idem hoc est cum eo problemate. Datâ maximâ distantia, è qua montis vertex videtur, invenire altitudinem montis.

In Triangulo  $NTO$  datur angulus rectus  $TNO$ , & angulus  $NTO$  cognoscitur ex data semidiametro Horizontis sensilis  $PN$ : præterea datur semidiameter Telluris  $TN$ . Itaque invenietur  $TO$  juxta proportionem hanc:

Ut sinus totus ad secantem anguli  $NTO$ , ita  $TN$  ad  $TO$ . Ex qua si subtrahatur  $TP$ , residuus numerus indicabit altitudinem quæsitam oculi.

Possimus itaque, suppositâ certâ semidiametri Telluris quantitate, ex assignata à diversis autoribus Horizontis visibilis quantitate, invenire, quan-

quan  
autor

D  
magn  
dine,  
stanti.

Ex  
positi  
vel li  
punct  
tur S  
nea  
nim  
nullo  
sed d  
incide

Qu  
mus r

In  
datis  
gulo  
angul  
atque  
fura e

Cor  
ex qua  
fastigio  
mali n

In  
Triang  
arcus  
ta dif  
cus F

quantam altitudinem oculi assumerint singuli  
autores.

## PROPOSITIO V.

*Datâ oculi altitudine & visa alicujus erecta  
magnitudinis, turris, mali navis vel montis altitu-  
dine, invenire distantiam hujus ab oculo, hoc est, di-  
stantiam navis.*

Ex. gr. In Diagrammate præcedentium pro-  
positionum, sit  $PO$  oculi altitudo, in navi, turri  
vel littore.  $FS$  sit malus navis alterius. Et sit  $P$   
punctum &  $FS$  navis ita sita, ut in  $P$  primo videatur  
 $S$  fastigium mali. Erit itaque punctum  $S$  in li-  
nea  $ON$ , quæ ex oculo  $O$  ducitur tangens: Ete-  
nim quicquid infra hanc  $ONX$  situm est, illud  
nullos radios directos mittere potest in oculum  $O$ :  
sed debet adeo appropinquare ut vertex vel apex  
incidat in rectam  $OX$ .

Quæritur itaque distantia  $FP$ , nempe in qua pri-  
mus radius ex  $S$  potest ad oculum  $O$  pervenire.

In Triangulo  $NOT$  invenitur angulus  $NTO$  ex  
datis  $NT$ ,  $TO$ , & recto angulo  $TNO$ . Et in Triangulo  
itidem rectangulo  $NTS$  datur  $NT$ ,  $TS$ , &  
angulus rectus  $SNT$ : invenietur angulus  $NTS$ :  
atque ita habebitur totus angulus  $OTS$ , cujus men-  
sura est arcus  $PS$ , quæsitâ distantia.

## PROPOSITIO VI.

*Contra, si data sit oculi altitudo, & distantia,  
ex qua primo, appropinquanti navis mali, vel turri  
fastigium cernitur, invenire altitudinem turris vel  
mali navis.*

In Diagrammate præcedentis propositionis: in  
Triangulo  $NOT$  ex datis  $NT$ ,  $TO$ , invenitur  
arcus  $NP$ , qui subtractus è noto arcu  $PF$  (ex da-  
ta distantia in minuta conversa) relinquitur ar-  
cus  $FN$ , sive angulus  $NTS$ . Et in Triangulo



NTS rectangulo datur NT, & N est rectus, ideo invenietur hypotenusa TS, ex qua si auferatur TF, relinquitur FS altitudo turris quæ sita vel mali navis, vel montis alicujus.

## PROPOSITIO VII.

*Refractio radiorum in aëre auget apparentem Horizontis sensibilem semidiametrum.*

Etenim diversa est aëris in diversis locis refractionis; crassior, quo terræ magis propinquus. Ideo etsi radius à puncto ultra N sito, ex. gr. ex F, non possit directâ viâ ad oculum O pervenire, tamen ita refringi potest in aëre ejus radius, ut refractus sit NO sive tangens Telluris.

## CAPUT XXXV.

*De Artis Nautica tribus partibus; & in specie, de parte prima, nempe Navium structura.*

## PROPOSITIO I.

**A**rs sive Scientia Nautica dicitur, qua docet, quomodo navis ex uno loco ad alium per mare commodissime & tutissime possit adjuvantibus ventis deduci.

Quoniam itaque in hac disciplina loca Telluris inter se sive ad se invicem comparantur & eorum respectivus situs expenditur, ideo merito ad Respectivam Geographiæ partem refertur.

Cæterum Artis hujus nobilissimæ & humanæ societati utilissimæ partes tres constitui posse commode existimo. 1. *πῶν πλῶν*, sive artem fabricandarum navium, quæ simul motum navis in aquam considerat, vel notum præsupponit. 2. De onere navibus imponendo. 3. Directionem sive gubernationem navis, quæ dicitur Ars Naucleri sive gubernatio, & in genere dicitur Ars nautica per

per excellentiam : cui etiam definitio artis Nauticæ omnium maxime competit. Atque hæc pars majori jure ad Geographiam pertinet, quam duæ priores, quæ rectius ad Staticam & Mechanicam referuntur : Directionis autem Ars tota ex Geographia dependet.

## PROPOSITIO II.

*In fabrica navium attendendum est ad hæc.*

1. Ut materia sive ligna sumantur, quæ in mari durare possunt diutissime, de quo Vitruvius & alii autores consulantur. Huc etiam pertinet quomodo ligna sint præparanda, & eorum densitas augenda, humor inutilis absumendus (Belgæ vocant *kalfateren*) igne, pice illinendæ & defendendæ à corruptione. Hæc doctrina sumitur ex Physica, &c.

2. Ut talis figura tribuatur navi, quæ ad celerimum motum sit aptissima & à levi potentia moveatur : Belgæ hanc proprietatem ita effantur, *het Schip seylt wel, het is ras in 't seylen*; item *het is een kloeck Schip in 't seylen*.

Huc pertinet diversarum navium figurarum tam antiquarum quam modernarum explicatio, ubi plurima scitu dignissima tam ex antiquitate quam novis inventionibus afferenda essent : præterea ex Statica & Phoronomica de diversæ figuræ corporum motu proponenda, inprimis ea quæ divinus Archimedes scripserat reliquit ad motum corporum in aqua pertinentia. Verum enim vero, cum pauci fortasse harum rerum studiis delectentur, & nos hic tantum epitomen Geographiæ Generalis proponamus, ideo non putavi consultum fore, ista omnia hic explicare : sed sufficere judicavi, si tantum ipsa rerum capita & partes hujus disciplinæ enumerarem, quod idem etiam de sequentibus monitos volo lectores. Si tamen hunc nostrum la-

borem juventuti gratum fuisse cognoscemus, secunda in editione omnia ista plenissime explicata dabimus, sicut etiam plurima in præcedentibus hujus Geographiæ capitibus.

Cæterum, ut ad propositum revertamur, maximi momenti est hæc pars doctrinæ nauticæ de apta figura ad celerem & facilem motum, & præcipuam commendationem ab ista naves habent, (præcipue in pugnis navalibus) atque magna navium diversitas in hac proprietate deprehenditur. Pertinet, ut dixi, hæc pars, sive dependet ex Statica & Phoronomica.

3. In fabrica quoque hac & circa figuram ad illud attendendum est, ut navis facili negotio contra procellas & tempestates defendi possit, vel ne à procellis & ventis facile evertatur: sed de hoc pluribus in parte secunda, ubi de opere navibus imponendo agitur. Hæc quoque pars ex Statica, Phoronomica & spiritali scientia dependet.

4. Consideranda est magnitudo navium: ubi plurima ex antiquitate & ejus cum modernis comparatione. Alexandrinam Architecto Archimede ad jussu Hieronis Siciliae Regis factam, & ad Ptolomæum Ægypti regem dono missam, fuisse 12000 doliorum putant: Philopatoris vero navis à Calixeno scribitur habuisse longitudinem 280 cubitorum, latitudinem 38, altitudinem 48. Hodie maximæ sunt naves Hispanorum seu Lusitanorum, quas vocant Caracas, quæ vehunt mille circiter & plures vehes, (*last* vocant Germani, censetur autem vehes doliorum 12) Belgarum naves non ascendunt 700 vehes.

5. Pertinet imprimis ad navium fabricam, singularum partium navis constructio & cognitio, quæ sunt, Carina, gubernaculum, costæ, prora, puppis, mali, vela, rudentes, anchoræ, &c. quarum omnium non tantum materia, figura, coheren-

tia,

tia, s  
tudo.

6.  
cognit

stura  
missio

Cu  
faber

man.  
Hæ

troula

De

O

Do  
dolio.

Co

mergi

verum

ad fun

datum

Hu

rum d  
olei, v  
gravin

C  
ria in  
navis

tia, sed etiam pondera sunt explicanda & magnitudo.

6. Ad fabricam quoque navium referri potest cognitio, quomodo promte occurrendum sit fracturae vel aliis vitiis navium, ut nimix aquae admissionem, &c.

Cui usui & aliis in navigatione inter nautas est faber lignarius, quem vocant *Scheeps-timmerman*.

Hæc de prima Artis Nauticæ parte, nempe *πρωτην* sive fabrica dicta sunt in compendio.

### CAPUT XXXVI.

*De onere navibus imponendo, sive secundæ artis Nauticæ parte.*

#### PROPOSITIO I.

**O** Nus navibus imponendum exprimitur per vehes & dolia.

Dolium navis censetur 2000 librarum. Vehes doliorum XI I, atque adeo librarum 24000.

#### PROPOSITIO II.

*Corpus sive materia, quæ levior est quam aqua, non mergitur omnino in aqua, sed eminent aliqua sui parte: verum si majoris sit ponderis, quam aqua, demergetur ad fundum usque: si denique ejusdem ponderis, servat datum in aqua locum.*

Huc pertinet cognitio diversi ponderis diversorum corporum, plumbi, auri, ferri, tritici, arenæ, olei, vini, &c. quorum omnium gravitas ad aquæ gravitatem comparari debet.

**COROLL.** Ex hoc itaque patet, onus materiæ imponendæ navi, sumtum cum onere ipsius navis debere esse minus quam onus vel gravita-



tem aquæ, cujus moles æqualis sit soliditati vel capacitati totius navis.

PROPOSITIO III.

*Quò figura navis magis accedit ad ordinatam, hoc est cubicam æqualitatem longitudinis, latitudinis, & crassitiei, eo majus pondus sustinere potest in aqua.*

Demonstratio ex Statica peti debet.

PROPOSITIO IV.

*In onere navibus imponendo ad duo respiciendum est.*

1. Ne tantum imponatur onus, ut gravitas ejus cum ipsius navis gravitate sumpta fiat æqualis vel major mole aqua, quæ navis soliditati æqualis est: sed ut minor maneat, non tamen multo minor esse debet. Quod si materia navis imposita sit adeo levis, saburra onus augendum erit. 2. Consideranda est aqua, per quam ducenda est navis, profunditas.

Etenim etsi aquæ gravitas admittat hanc vel istam navis onerisque impositi gravitatem quando hæc minor est, quam aquæ mole navis æqualis gravitas, tamen si aqua habeat minorem profunditatem, quam pars navis infra superficiem aquæ immersa, non concedet fundus navi motum, sed illam detinebit. Hæc causa est, quod Hispanicæ naves majus onus vehunt, quam Belgarum, quia mare ad littus & in portibus habent profundius, sicut etiam capaciores naves appellantur ad Zeelandiam, quam ad Hollandiam.

PROPOSITIO V.

*Si navis ita onerata sit, ut gravitas seu pondus ejus sit fere æqualis gravitati aqueæ marinæ molis æqualis capacitati navis, non quidem in mari submergetur, at ubi in fluvios delata fuerit, fundum petet.*

Causa

Causa est, quoniam aqua fluviorum est levior quam aqua maris. Si itaque navis onerata gravitas sit fere æqualis aquæ marinæ molis gravitati, erit ea major, quam gravitas aquæ fluvialis, & propterea navis in fluvio submergetur, sive ad fundam feretur. Multæ propter hanc causam naves perierunt, quæ nautarum imperitorum culpâ nimis onerata fuerunt, vel non exonerata ante ostia fluviorum. Quanta autem debeat esse ea gravitas, cognoscitur ex proportionem gravitatis aquæ marinæ ad gravitatem aquæ fluvialis. Vide Propos. VIII.

## PROPOSITIO VI.

*Corpus quodvis aquæ innatans, eam habet gravitatem, quam aquæ moles, æqualis parti corporis istius demersæ.*

*Coroll.* Datâ parte navis, quæ in aqua mergitur, licet invenire gravitatem totius navis onerata. Et enim aquæ gravitas nota est vel facile est eam invenire: Ex. gr. pes aquæ Cubicus sit 70 librarum. Et sit pars navis demersæ 2000 pedum cubicorum. Erit itaque molis aquæ, quæ æqualis est parti navis immersæ, gravitas 1400000 librarum. Tanta quoque erit navis onerata gravitas.

## PROPOSITIO VII.

*In aquis diversa gravitatis si corpus aliquod constituitur, pars hujus demersæ in aqua leviori ad partem demersam in aqua graviore habet eam rationem, quam gravitas aquæ graviore ad gravitatem aquæ levioris.*

## PROPOSITIO VIII.

*Navis eam oneris quantitatem commode vehere plerunquæ censetur, cuius gravitas æqualis est gravitati*

vitati dimidia aquæ molis, quam navis continere potest.

Ex. gr. Si navis capax sit doliorum aquæ 500000 (quorum singula censentur 2000 libris) hoc est, si capiat aquam librarum 1000000000, poterit ei commode imponi onus 250000 doliorum sive 500000000 librarum. Hoc sensu intelligendum est, quando dicunt, naves esse tot doliorum vel tot vehere vehes.

Hispanicæ Caracæ sustinent ad 1200 vehes: Belgarum naves Indicæ maximæ non ascendunt 800 vehes.

### PROPOSITIO IX.

*Quo majus est pondus navis onerata, eo minus à procellis & tempestatibus exagitantur.*

Nimirum naves 2000 doliorum non timent eas tempestates, quæ navibus 300 vel etiam 700 doliorum molestæ sunt.

Multo plura hic addendâ essent de minuendo vel augendo pondere navium, item de æquilibrio, & variatione ponderis in puppi, prora, medio, & de navibus submersis elevandis, sed pauca ista proelementis sufficiunt.

### CAPUT XXXVII.

*De tertia & præcipua Artis Nautica parte, Limeneuretica, nempe Arte gubernanda navis vel dirigenda, & hujus subdivisione in quatuor partes.*

### PROPOSITIO I.

**A***Rs gubernanda vel dirigenda navis dicitur, quæ docet, in quas plagas navis dirigenda sit in quolibet ejus situ in mari, ut ad locum propositum perveniatur sine periculo.*

Ejus

Ejus artis partes facio quatuor.

1. Specialem Geographiam, hoc est Cognitionem spatii inter duo loca intercepti & ejus proprietatum. 2. Cognitionem plagarum in singulis locis. 3. Cognitionem lineæ, per quam ex uno loco ad alterum navis ducenda est. Sunt enim inter bina quævis loca infinitæ interceptæ lineæ; hæc pars dicitur Histriodromice. 4. Cognitionem situs singulorum locorum, ad quæ in navigando pervenitur, sive quomodo hæc loca sita sint ad eum locum, in quem navis dirigenda est.

Hæc præcipua est artis gubernandi pars.

PROPOSITIO II.

*Cognitio spatii intermediarii comprehendit hæc.*

1. Terrarum situs, angulorum procurentias, littorum flexus, promontiorum, montium, finium, pulvinozum, profunditatis aquæ, fretorum, insularum, certarum notarum cujuscumque littoris & partis maris, littoralium terrarum aspectum (Belgæ vocant, *de gedaente van't Landt*; item *see doot hem het Landt op*) aquationis locorum &c. notitiam, quæ omnia quidem ex speciali Geographia & mappis nauticis, sed omnium facillime & certissime ex observatione & frequentibus navigationibus per aliquem aquæ tractum cognoscuntur. Quæ sola causa est, quod naucleri quidam ad hunc locum, alii ad alium nave petendum sunt aptiores.

2. Ventorum generalium & specialium, priorum & statorum loci cujuscumque cognitionem, quæ imprimis necessaria est in navigationibus, quæ in Zona Torrida & vicinis locis instituuntur. Hic enim & ventus generalis & in plurimis locis venti anniversarii (quos vocari *Meussions*, motiones, diximus capite xx) regnant, qui navigationem vel promovent vel impediunt. Mare enim

Indicum



Indicum navigatur anniversariis istis ventis. De hisce multa attulimus cap. xx, sicut etiam de statis procellis & procellarum signis, quæ omnia nauclero nota esse debent. Exemplum damni ex ignorantia hac orti dedimus capite citato.

3. Motuum maris in singulis tractibus conditionem & plagam, in quam nempe plagam fluctus & mare ferantur: abducunt enim secum navem. Illorum motuum diversitatem in multis locis attulimus capite xvi i.

In primis requiritur notitia fluxus & refluxus maris & tempus sive horæ incrementi & decrementi ad singulos dies, cujus supputationem Belgæ vocant, *de tijdt-rekeningh*. Nisi enim horas istas nauclerus bene noverit, in maximum periculum adducitur sæpe navis, quando litoribus vel pulvinis vicina est, quorum plerique in summo incremento aquæ non impediunt navis transitum, at in decremento plerique. Item cum affluxu navigatio facilius est ad litora & in ostia fluviorum, contrarium in refluxu animadvertitur. De hujus temporis supputatione diximus pauca in propositione capituli xvi i. Sed multo hic accuratior requiritur cognitio in quibusdam casibus, de quibus hoc loco plura dicenda essent, & nautarum methodus explicanda, sed quia breves esse studemus, hac quidem vice omittentur.

## CAPUT XXXVIII.

### *De Cognitione plagarum in singulis locis.*

#### PROPOSITIO I.

**I**N singulis locis cognoscere plagas, nempe Septentrionem, Austrum, Orientem, Occidentem & plagas intermedias. Belgæ vocant, *een streeck*.

Est hujus cognitio omnium totius artis nauticæ pro-

prob  
gend  
poter  
fectu  
hac p  
dern  
bant  
Ocea  
Aust  
cean  
re : s  
plaga  
De  
mod  
plaga  
inve  
atqu  
est r  
noct  
trem  
tis a  
ptent  
quor  
riens  
rum  
Septe  
bus c  
in qu  
tum  
Septe  
naler  
gnosc  
Di  
inve  
xxvi  
2.  
plaga

problematum maxime necessaria, cum navis dirigenda sit in aliquam plagam, quæ si ignoretur, non potest fieri directio. Et hujus solius cognitionis defectus veterum navigationem impediēbat, atque in hac præcipua est discrepantia inter veterum & modernam navigationem. Etenim veteres non habebant methodum qua ad quodvis tempus in alto Oceano cognoscere possent, ubi Septentrio, ubi Austri & reliquæ plagæ essent: propterea vasto Oceano non audebant neque poterant se committere: sed tantum littora legebant, ut ita ex aliis signis plagas scirent.

Duplex erat veterum methodus, quæ etiam modernæ navigationi inserviunt, inveniendarum plagarum (est autem problema hoc idem cum eo, invenire lineam meridianam, & Septentrionis atque Austri plagam; ex hisce enim cognitis facile est reliquas cognoscere.) 1. Per stellas, nimirum nocte urse, sive helice & stella polaris dicta in extremitate caudæ urse minoris (magnæ celebritatis apud antiquitatem) monstrabat plagam Septentrionis, unde reliquæ omnes inveniuntur, quoniam facie ad Septentrionem conversâ, Oriens est ad dextram, Occidens ad sinistram, quarum plagarum lineæ ad angulos rectos secant lineam Septentrionis & Austri, & hisce plagis cardinalibus cognitis facile est invenire plagas intermedias: in quem usum, ne opus esset descriptione, paratum habebant circulum cum plagis: cujus lineam Septentrionali collocata super lineam Septentrionalem loci alicujus, reliquæ plagæ uno intuitu cognoscuntur.

Die vero per Orientem Solem vel Occidentem investigabant plagam sicut monstravimus capite XXVIII.

2. Altera veterum methodus cognoscendarum plagarum erat cognitio situs sive extensio litorum &

& unius promontorii ad alterum. Etenim cum hujus extensionis plaga vel ex mappis. vel ex observatione & experientia cognita ipsis esset, poterant in navigando illis visis cognoscere plagas reliquas (unâ enim plagâ cognitâ, omnes reliquæ inveniuntur.) Ideo veteres non longe recedebant à littoribus, nimirum ut cognita plagæ extensionis littorum beneficio scirent plagam, in quam navis dirigenda esset. Primâ enim methodo per stellas & Solem Orientem vel Occidentem non semper uti poterant.

3. Tertia veterum methodus cognitionis plagarum erat cursus navis observatus. Etenim è loco aliquo proficiscentes & navem in cognitam plagam dirigentes, poterant ex mutatione cursus navis vel flexu scire plagas.

4. Ex hisce patet, præcipuam causam periculosæ & imperfectæ veterum navigationis fuisse ignorantiam methodi, quâ ubique locorum & in medio atque vasto Oceano cognoscerent plagas, atque adeo illam plagam, in quam navis dirigenda esset. Etenim, ut dixi, methodus per stellas & Solem Orientem vel Occidentem non potest omnibus diebus neque horis singulorum dierum adhiberi: indicium vero ex littorum situ cessat in medio mari & nocte, neque de die satis tutum est.

Tertia methodus ex observato cursu navis non habet locum, ubi navis à furentibus ventis atque tempestatibus hinc inde in varias plagas circumagitur. Atqui in hoc casu præcipua difficultas est.

Hæc de veterum modis inveniendæ lineæ meridiane & Septentrionis atque Austri monenda fuerunt, quia horum imperfectio causa est periculosæ & exiguæ navigationis veterum, cum nunquam vasto Oceano se committere possent, adeoque illas regiones, quas inter medius est Oceanus (quarum præcipua tota America) nunquam cognoverint.

Ho-  
rum i  
nis Sc  
randa  
(qu  
magn  
parati  
re de  
omni  
loco p  
Eteni  
quor  
Sept  
alteru  
que  
singul  
confic  
dixi a  
quæ p  
reus  
mirac  
cujusv  
riâ na  
næ ve  
reum  
trion  
extrem  
non a  
Dicu  
ne in  
tam f  
est. E  
beat M  
omne  
ferri p  
hit:  
in om

Hodie vero methodus cognoscendarum plagarum in omnibus sive inveniendæ lineæ Septentrionis & Austris, facilis est & plana, beneficio admirandæ proprietatis quam Magnes & omnia ferrea, (quæ magneti per aliquot tempus conjuncta vel magnetis polis fricata fuerunt; vel etiam in præparatione situm lineæ meridianæ habuerint) habere deprehensa sunt, nimirum quod Magnetica omnia non impedita vel detenta ab aliis in quovis loco puncta sua dirigant ad easdem circiter plagas. Etenim duo in Magnete puncta opposita sunt, quorum unum semper & in omnibus locis ad Septentrionem vel vicinam plagam se convertit, alterum ad Austrum, & propterea reliqua quoque Magnetis puncta, reliquas plagas nempe singula singulas respiciunt: verum non omnia considerantur, sed tantum puncta illa duo, quæ dixi ad Septentrionem se convertere & Austrum, quæ propterea dicuntur poli Magnetis, unus boreus, austrinus alter. Atque eadem virtus magno miraculo communicatur laminæ ferreæ (massæ cujusvis figuræ) vel acui, sed inversâ & contrariâ naturæ operatione. Etenim extremitas laminæ vel acus, quæ fricatur ad polum Magnetis boreum, vel saltem admovetur, illa non ad Septentrionem sed ad Austrum se convertit, atque illa extremitas, quæ polo australi magnetis fricatur, non ad Austrum, sed ad Septentrionem respicit. Dicuntur hæc acus puncta etiam poli. Quam sane insignem Magnetis virtutem veteribus ignotam fuisse etsi mirum videatur, certum tamen est. Etenim etsi plurimas egregias proprietates habeat Magnes & ferrea Magnete affricata, tamen omnes ad duas quasi species vel ad duo capita referri possunt: una est virtus illa, qua ferrum attrahit: altera, quâ ad Septentrionem & austrum in omni loco disigit duo superficiæ suæ puncta;

prio-



priorem facultatem non ignorarunt Veteres, sed hanc posteriorem.

Quoniam itaque Magnes hanc proprietatem habet, ideo ejus beneficio facile est invenire in quovis loco terræ, vel maris, ubi sit Septentrio, vel ubi Auster (unde reliquæ plagæ statim innotescunt). Etenim si in aliquo Magnete notata sint puncta illa Septentrionis & Austri, sive polus Boreus & Austrinus, atque Magnetem hunc habeamus in navi, ubi in mari versamur, quando plagas scire cupimus, magnes suspensus è fune ut libere movere se ipsum possit, polos suos ad plagam Septentrionis & Austri diriget, atque ita plagas quæsitus indicabit. Sed facilior ad usum est acus ferrea, cujus extremitas sit fricata ad polum Austrinum Magnetis. Etenim hujus acus medium si collocetur supra acutum paxillum perpendicularem, ita ut libere possit se circumvolvere in gyrum, indicabit acus quiescens extremitate suâ unâ plagam Septentrionalem, & alterâ plagam Australem.

Ex hisce facilis est constructio instrumenti nautici.

## PROPOSITIO II.

*Compassum nauticum componere.*

In charta aliqua descriptus circulus dividatur in gradus vel plagas 32, & uno ex istis gradibus vel unâ plagâ assumptâ pro plaga Septentrionali, ascribantur appellationes, Nord / (cum peculiari signo, lilio nempe) & inventis punctis pro reliquis plagis, Syd / Ost / West / Nord ten Osten / Nord Ost / &c. (sicut capite xx eas proposuimus in Diagrammate.) Chartam hanc nauticam vocant *de Roose*.

Deinde acus Magnetica ita affigatur subtus chartam, ut medium acus sit infra ipsum centrum, & polus acûs Septentrionalis subjiciatur  
lineæ

lineæ c  
psimu  
latente  
liberan  
prient  
strabit  
di & T  
eodem  
est fab  
Comp  
instru  
indici  
motiss  
lam pl  
ista co  
ca resp  
locis v

Pla  
vis per  
16 in p  
bus : s  
institut

De  
sumi p  
plagas  
Sireeck  
buanu  
nomi  
inter  
part Z  
lick, &

Ac  
pauciss

lineæ chartæ, cui plagam Septentrionalem affici-  
psimus. porro confecta ita charta cum acu subrus  
latente imponatur paxillo æneo acuminato, ue  
liberam habeat circumrotationem. Ita Index Se-  
pentrionis, nempe lilium in quolibet loco mon-  
strabit vel respiciet plagam Septentrionalem mun-  
di & Telluris, atque indices reliquarum plagarum  
eodem modo plagas mundi reliquas. Atque hæc  
est fabrica illius instrumenti, quod nautæ vocant  
Compassum, alii pyxidem nauticam, nempe ipsum  
instrumentum cum arcula, in qua asservatur, cujus  
indiciis freti vasto se committunt Oceano atque re-  
motissimas petunt terras, dirigendæ navem in il-  
lam plagam, quam magnes iusserit: Constructio  
ista compassi est pro locis, in quibus acus magneti-  
ca respicit ipsam Septentrionalem plagam. de aliis  
locis vide propos. VI.

## PROPOSITIO III.

*Plagæ totidem sunt, quot puncta in Horizontis cujus-  
vis periphæria; hoc est infinita: nautæ autem numerant  
16 in parvis navigationibus, triginta duas in mediocri-  
bus: sexaginta quatuor in magnis per vastum Oceanum  
instituti itineribus.*

De hac Propositione diximus cap. xx. unde de-  
sumi potest accurata hujus explicatio. Lusitani  
plagas vocant *Rumbos*, Belgæ, *de Cours*, item *een  
Sreecck*, etsi hæc nomina quoque loxodromiæ tri-  
buantur. Quando autem intermedias plagas de-  
nominare volunt, faciunt id per divisionem spatii  
inter duas plagas interjacentis, ex. gr. *een derde-  
part Zuydelicker*: Vel hoc modo, *wel soo Zuyde-  
lick*, &c.

## PROPOSITIO IV.

*Acus magnetica, (sicut ipsius magnetis poli) in  
paucissimis locis respicit ipsam Septentrionis & Austri  
pla-*

plagam, in plerisque locis & fere omnibus declinat aliquantum ab ea versus ortum vel occasum, & quidem in aequali declinatione, & prepterea non indicat veras omnino plagas. Declinatio illa dicitur Chalybeclisis.

Etenim ad insularum Azorum sive Flandricarum unam el Corvo dictam, nulla est declinatio, sed ipsam plagam Septentrionalem acus monstrat. Idem in ejus meridiani quibusdam sed non omnibus partibus observatur. In locis ab hac insula versus Orientem sitis usque ad promontorium procurrentis Africae dictum Cabo das agulhas (non procul à promontorio Bonæ spei) declinat acus à Septentrione versus Orientem in æquali declinatione, nimirum usque ad insulas Tristan de eunha, & 70 gradibus remotiorem partem accrescit declinatio, ita ut ibi sit 13 graduum circiter, inde rursus decrescit usque ad loca vicina promontorio das agulhas, ubi nulla est iterum declinatio. Ab eo vero loco versus Indiam incipit declinatio acus à Septentrione versus Occidentem Hamburgi chalybeclisis est graduum 9, Amstelodami 5 circiter hodie: nam olim major erat.

Observationes autem testantur declinationem hanc non manere eandem, sed progressu temporis mutari. Londini enim anno 1580 fuit observata 11 gr. 15. min. sed anno 1622 fuit 6 gr. 13 min. atque anno 1634 fuit 4 gr. 6 min. & fuerunt institutæ observationes non tantum novis sed etiam veteribus acubus. Parisiis anno 1640 observata fuit declinatio 3 grad. quæ anno 1610 fuit reperta 8 gr. Idem in aliis locis observatum fuit.

#### PROPOSITIO V.

*Declinationem acus Magnetica à vera Septentrionali plaga invenire in loco quovis.*

Inveniatur linea meridiana de cœlo, sicut capite xx docuimus variis modis, & innotescet statim decli-

declin  
thodu  
nautic

Ter  
signan  
tici si  
ad de  
plicare

Belg  
der Co  
voca  
Occid  
tem  
rhomb  
streeck

In c  
ca cor  
seu del  
in loco  
bet ac  
chattæ  
esse de  
vel lili  
ta hab  
casus  
trion  
declin

Pro  
niam  
apari  
cumdu  
pra acu  
straveri  
omnib  
cupia

declinatio acus Magneticæ. Sed faciliorem methodum monstrabit sequens Propositio pro usu nautico.

## PROPOSITIO VI.

*Terminos nauticos, quibus in hac declinatione designanda utuntur, & correctionem compassi Magnetici sive nautici, modumque quem nauta usurpant ad declinationem istam in mari invenendam, explicare.*

Belgæ declinationem istam vocant, *de miswijzing der Compassen*: declinationem versus Orientem vocant *Noord-Oestering*: declinationem versus Occidentem vocant *Noord-Westering*. Quantitatem declinationis denominant per rhombos, & rhomborum partes, *een sireeck, een derdendeel van een sireeck, &c.*

In compositione compassi sive pyxidis magneticæ corrigitur vel emendatur declinationis vitium seu defectus. Nimirum cognitâ declinatione acus in loco, pro quo paratur instrumentum, non debet acus illa sive lingula Magnetica affigi ei lineæ chartæ, quæ lilium habet & Septentrionis index esse debet, sed sub ea lineâ, quæ à Septentrionis vel lilii lineâ tot gradibus removetur, quot inventa habet declinatio Magnetis, versus ortus vel occasus lineam. Sic enim lilium & lineâ Septentrionis monstrabit verum Septentrionem, etsi acus declinet.

Pro usu autem nautico vel peregrinationis quoniam in diversis locis diversa est declinatio, ita aptari debet acus ad chartam, ut hæc possit circumduci acu immotâ, atque ejus plagæ lineâ supra acumen adduci, quam observata declinatio monstraverit. Sic idem instrumentum inserviet pro omnibus locis.



Ad inveniendam autem declinationem acūs magneticæ à vera linea Septentrionis & Austri, ita agunt plerique naucleri. Observant plagam compassi, in qua Sol oritur: & vesperi plagam in qua Sol occidit (etsi enim tunc in alio loco sint, tamen parvo à priori absunt intervallo in quo non variatur declinatio.)

Si plagæ hæ compassi æqualiter distant à plaga compassi Septentrionali, tunc indicium est, quod acus in eo loco non habeat declinationem, atque ideo nullâ opus esse correctione, sed acum sub linea Septentrionis debere manere: Si vero plaga Orientis Solis longius quam plaga Occidentis Solis distet à plaga Septentrionis, indicio est acum declinare in illo loco à vera linea Septentrionis versus Occidentem: Si denique plaga Orientis Solis minus, quam Occidentis Solis distet à plaga Septentrionis chartæ, indicio est acum declinare versus Orientem. Quantitas declinationis cognoscitur ita: Sumantur arcus intercepti inter plagam compassi septentrionalem & plagas Orientis Occidentisque Solis, minor arcus à majori auferatur: residui dimidium est declinatio quæsitæ, & tot gradibus linea Septentrionis chartæ removenda est, ab acu vel lingula magnetica.

Methodus hæc duo habet incommoda. 1. Sol oriri videtur, cum adhuc 34 minutis infra Horizontem est, ex qua discrepantia apparentis & veri ortus, sicut etiam occasus, redundat error in declinationis quantitatem, qui etsi in locis Æquatori vicinis exiguus sit, tamen in locis ab Æquatore aliquantum remotioribus ad duos gradus ascendere potest. 2. Sol sæpe nubibus tectus oritur, quod perpetuum fere est in Zona Torrida.

Aliâ itaque methodo, quæ minus errori obnoxia est, utuntur interdum naucleri, nimirum observant plagam compassi, in qua Sol conspicitur aliquo

aliquo  
pus  
ridic  
deve  
obs  
spici  
Sept  
natio  
dictu  
T  
do a  
metr  
do n  
quir  
gas.  
Sol  
Sole  
hen  
vel p  
qua  
vel a  
serva

E  
ojus  
ut n  
P  
ob  
ria a  
char  
4.  
pedi

aliquo tempore post ortum, atque ad illud tempus observant altitudinem Solis. Deinde post meridiem expectant, donec ad eandem altitudinem devenisse Solem deprehendant, quo deprehenso observant plagam compassi, in qua Sol tunc conspicitur. Ex hisce plagis sive arcibus inter illas & Septentrionis plagam interceptis invenitur declinatio acus eodem modo quo in priori methodo dictum est.

Tertiam etiam & quartam methodum aliquando adhibent naucleri periti supputationis Trigonometricæ vel Planisphærii Catholici beneficio, quando nimirum per unam observationem statim inquirenda est declinatio acus ad cognoscendas plagas. Etenim vel observant plagam compassi in qua Sol oritur aut occidit, vel observant plagam, in qua Solem ad observatam aliquam altitudinem deprehendunt. Deinde per calculum Trigonometricum vel per Catholicon planisphæricum inveniunt, in qua plaga Sol revera hæreat ad istud tempus ortus vel altitudinis. Differentia hujus plagæ & plagæ observatæ in compasso est ipsa declinatio acus.

#### PROPOSITIO VII.

*Exponere illa, qua acum magneticam à naturali ejus situ in quovis loco abducunt, adeoque causa sunt, ut non monstret plagas sicut debebat.*

Præcipua sunt hæc. 1. paxilli, cui incumbit acus, obtusa extremitas sive minus acuminata. 2. materia aliqua in foramine, quod recipit paxillum. 3. Si charta sive rosa jaceat extra Horizontalem situm. 4. Aëris aliqua admixtio. 5. Ferri vicinia. Hæc impedimenta veræ ostensionis cavenda sunt.

## CAPIT XXXIX.

*De Histiodromia sive linea cursus navis.*

**D**ifficillima est hæc pars totius Geographiæ, de qua autores ita obscure, plurimi etiam falsa scripserunt, ut lectores præter confusam aliquam imaginationem nihil ex illis scriptis haurire neque ipsam rem intelligere potuerint. Nos, quantum fieri potest, claram & distinctam explicationem afferre conabimur. Requiritur autem in lectore atenta consideratio.

## PROPOSITIO I.

*Si duo qualibet loca sint sita in uno Meridiano, sive, si ab uno aliquo loco alter locus situs sit versus plagam Septentrionis vel Austri, erit idem locus ab omnibus locis vel punctis qua interjecta sunt inter duo illa primo assumpta, situs versus eandem plagam Septentrionis aut Austri. Sive, Duorum locorum in uno Meridiano jacentium unus ab altero & ab omnibus intermediis punctis situs est versus eandem plagam Septentrionis vel Austri.*

Manifesta est Propositionis veritas, si modo animo recte concipiatur. Per loca interjecta inter duo puncta vel loca intelliguntur omnia puncta, quæ sunt in arcu intercepto circuli maximi per duo primo assumpta puncta ducti, sive puncta illius arcus qui distantiam brevissimam indicat. Dicatur autem locus is, ad quem alterius loci situs expenditur, locus primus; & alter ille, cujus situs expenditur, dicatur secundus. Atque ad faciliorem intelligentiam, locus primus concipiendus est ita, ut quasi in medio sit totius Telluris sive in medio circumjacentium regionum, & quod in meridiano Globi æneo situs sit, & per illum infiniti vertica-

les

les du  
rizon  
quoru  
diano  
diano  
Ca  
tum  
angul  
veruc  
cum.  
inter  
sunt,  
Septe  
singul  
à sing  
tur,  
num  
la int  
trion

Si  
ad q  
secun  
plaga  
omni  
dinal  
centi  
punct  
Occid  
A  
bet l  
rizon  
Tellu  
secu  
plag  
est,

les ducti transeant per circumjacentia loca ad Horizontem, atque ita ad illum expendatur situs reliquorum locorum omnium, sive distantia à meridiano ejus, vel anguli, quos verticales cum meridiano faciunt.

Causa sive ratio Propositionis est, quoniam situm secundi loci ad primum sive plagam denotat angulus quem meridianus primi loci facit cum verticali primi loci ducto per secundum illum locum. Si jam concipiamus omnia puncta interjecta inter duo unius meridiani loca assumpta (hæc enim sunt, quorum unus ad alterum jacet versus plagam Septentrionis vel Austri) manifestum est, quod singulorum meridianus sit idem cum verticali, qui à singulis per alterutrum locum assumptum ducitur, hoc est nullum esse angulum inter meridianum & verticales. Quare locus assumptus ad singula interjecta puncta situs est versus plagam Septentrionis & Austri.

**PROPOSITIO II.**

*Si duo loca quælibet assumantur in Equatore, ad quorum unum sive primum situs alterius sive secundi expendatur, erit secundus à primo situs in plaga cardinali ortus vel occasus. Et secundus ad omnia interjecta loca situs erit in eadem plaga cardinali: Sive, Duorum locorum in Equatore jacentium unus ab altero & ab omnibus intermediis punctis situs est versus eandem plagam Orientis vel Occidentis.*

Ad faciliorem intelligentiam assumatur quilibet locus in Equatore, & ita constitutur, ut Horizon ligneus fiat illius Horizon, hoc est ut poli Telluris sint in ipso Horizonte. Deinde assumatur secundus locus in Equatore, cujus situm sive plagam ad primum consideramus. Manifestum est, quod plaga sit cardinalis Orientalis vel Occi-



dentalis. Est enim *Æquator* ipse verticalis, qui à primo loco ducitur per secundum locum perpendicularis in Horizontem, & lineam meridianam ad angulos rectos secat. Idem autem verum est de omnibus interjectis punctis, quæ si adducantur ad meridianum æneum, erit *Horizon* ligneus ipsorum *Horizon*, & *Æquator* erit verticalis eorum primarius, qui meridianam lineam ad angulos rectos secat, & per secundum locum transit. Erit itaque hic secundus ad omnia illa interjecta puncta situs in una eademque plaga cardinali *Orientis* vel *Occidentis*.

### PROPOSITIO III.

*Si secundus locus cum primo non sit situs in uno eademque meridiano, neque ambo sint in Æquatore, non erit secundus locus ad primum & omnia puncta intermedia, situs in una eademque plaga, sed in diversis plagis ad diversa puncta.*

Ex hac propositione dependet *Originis* linearum, quam navis describit, cognitio, ideo operanda lectoribus, ut eam bene intelligant & capiant.

Assumantur in globo quælibet duo loca, quæ neque ambo in æquatore neque in uno meridiano jaceant (in hisce enim duabus situs speciebus non variatur loci secundi plaga ad loca intermedia) ex. gr. *Amstelodamum* pro primo assumatur sive unde iter instituentium vel navigatio, & *Pernambucco* *Brasilie* pro secundo, sive ad quem navigatio instituitur. Adducatur itaque *Amstelodamum* ad æneum meridianum, & polus elevetur pro illius latitudine (sic enim *Horizon* ligneus representat illius Horizontem), quadrans affigatur verticali & applicetur ad *Pernambuccum*, monstrabit in Horizonte plagam, in qua *Pernambuccum* jacet ab *Amstelodamo*. Et arcus inter duo hæc loca inter-

terjed  
stend  
bucc  
dem  
inte  
unan

Ad  
teced  
uno  
jus at  
rum  
ceptu  
plaga  
gulu  
(qui

Ad  
afflu  
cum  
& pe  
stat a  
eunt  
niam  
ipsum  
senta  
quo  
quos  
sunt  
bus  
lis lo  
les,  
que  
sunt  
pate  
circi  
arcu  
lem  
mus

terjectus exhibet in globo puncta intermedia. Ostendendum est, quod plagæ, in quibus Pernambuco jacet à singulis hisce punctis, non sint eadem sed diversæ omnes, sive quod à singulis hisce intermediis locis Pernambuco non jaceat versus unam eandemque plagam.

Ad hujus intelligentiam repetendum est ex antecedenti doctrina quod plagam alterius loci ab uno aliquo assumpto indicet angulus quem facit hujus assumpti loci meridianus cum verticali per alterum locum transeunte, sive arcus Horizontis interceptus inter meridianum & verticalem hunc sicut plagam Pernambuco ab Amstelodamo indicat angulus, quem facit quadrans cum meridiano arco (qui est ipsius Amstelodami).

Ad probandam itaque propositionis veritatem assumantur inter Amstelodamum & Pernambuco in arcu quadranti subiecto puncta quotvis, & per ea concipiantur transeuntes meridiani; præstat assumere illa puncta, per quæ in Globo transeunt meridiani (sive circuli longitudinum). Quoniam itaque quadrans per singula hæc loca & ipsum Pernambuco transit, denotabit vel representabit singulorum locorum verticalem eum, in quo Pernambuco jacet ab illis, ideoque anguli, quos facit cum singulorum locorum meridianis, sunt anguli positionis, & indicant plagas, in quibus, vel versus quas Pernambuco jacet à singulis locis intermediis. Isti vero anguli sunt inæquales, sive diversæ magnitudinis. Itaque plagæ quoque, versus quas à locis illis Pernambuco jacet, sunt diversæ. Quod vero anguli isti sint inæquales, patet ex ipso aspectu, vel manifestius, si intervallo circini quovis describas arcus è punctis singulis, & arcus hosce inter meridianos singulos & verticalem interceptos metiaris: vel si confectum habeamus eorundem portionem curvam quæ aptari possit

superficie Globi: Vel si ipsa loca adducantur ad æneum meridianum & polus pro eorum latitudine elevetur, quadrans vertici applicetur & ad Pernambuccum, atque in eo situ numerentur arcus Horizontis gradus.

*Corollarium.* Magno itaque vitio laborant Mapæ sive chartæ rectilineæ & nauticæ, quæ loca ita representant, ut si assumantur duo loca quælibet, ad quorum unum situs seu plaga alterius expendatur, alter hic à locis intermediis in una eademque plaga esse videatur, quod tamen falsum est. Causa vitii est, quod meridianos exhibent parallelos, qui tamen in polis coeunt: Verum nautæ non curant hoc vitium, si modo loxodromiam vel plagam quam in navigatione ab uno loco ad alterum observare debent, referant.

#### PROPOSITIO IV.

*Si ex uno loco Telluris in alium ( quæ duo loca non sint in uno meridiano, neque ambo in Æquatore ) instituendum sit iter vel navis dirigenda & ducenda per viam brevissimam, sive hoc pacto, ut nunquam recedatur ab arcu verticalis interjecto, in tali itinere vel via singulis momentis mutatur plaga vel alia atque alia sit plaga, in quam iter vel navis dirigitur vel dirigenda est.*

Hæc propositio manifesta est ex precedenti. Sit enim ab Amstelodamo ad Pernambuccum iter instituendum per viam brevissimam, hoc est per arcum quadrantis affixi ad Amstelodamum & transeuntis per Pernambuccum. Quoniam itaque in toto itinere ubique sive in singulis punctis dirigitur iter vel navis versus Pernambuccum, & vero in precedenti ostensum est, quod diversæ sint plagæ, versus quas ab illis mediis punctis jacet Pernambuccum, ideo manifestum est, quod alia atque alia singulis momentis vel in singulis punctis  
fiat

fiat p  
ut Pe  
Si  
amb  
ma  
ftri:  
dent

N  
sing  
per a  
eand  
co ad  
vel li  
punct  
hæc b

Et  
mni  
men  
dum  
cam  
naut  
totie  
stum  
gatic  
que  
navis  
dirc  
iraqu  
stat p  
sint i  
Si in  
illa,  
vero  
linea  
dem

fiat plaga, in quas iter dirigitur, vel dirigendum est ut Pernambuccum respiciat.

Si vero loca sita sint in uno meridiano, vel si ambo sint in *Æquatore*, alia est ratio. In illis enim manet eadem itineris plaga Septentrionis vel Austri: in hisce plaga cardinalis Orientis vel Occidentis.

PROPOSITIO V.

*Non potest infiniti navigatio vel navis ita dirigi, ut singulis momentis in alias atque alias plagas tendat, sed per aliquod ad minimum tempus dum movetur, in unam eandemque specie plagam tenat. Itaque dum ab uno loco ad alium navigandum est, talis via (ex infinitis) vel linea via commodissima est, cujus bina vicina quaque puncta sita sunt in una eademque specie plaga, etsi via hac brevissima non sit.*

Etenim in momento nullus fit motus, sed omnis in tempore: itaque neque navis singulis momentis ex una plaga in aliam tendere potest, sed dum movetur, per aliquod saltem tempus versus eam tendit. Præterea nullo modo fieri posset, ut nautæ sciant plagas, in quas dirigenda esset navis, si toties plaga alia esset assumenda. Itaque manifestum est, illam viam inter duo loca esse pro navigatione commodissimam, cujus bina vicina quaque puncta sita sunt in una eademque plaga, ut ita navis continue in unam plagam dirigi possit, & tali directione ad locum destinatum pervenire: Hoc itaque supposito, inquiramus, qualis via inde existat pro navis motu, quæ quidem via, si loca sita sint in uno meridiano, erit ipsius meridiani pars: Si in *Æquatore*, erit ipsius *Æquatoris* portio via illa, si in uno parallelo, hujus paralleli portio, si vero in alio circulo præter hosce, erit via illa alia linea, non ille circulus, ut in sequentibus ostendemus.



## PROPOSITIO VI.

*Si navigatio instituaturs, vel navis continue dirigatur ad plagam Septentrionalem vel Australem (hoc est, si locus à quo & locus ad quem sint in uso Meridiano), erit linea motus navis ipsius meridiani portio.*

Probaturs ex propositione prima hujus capituli. Etenim locus, qui petiturs, ad omnia intermedia loca, hoc est ad puncta arcus meridiani, situs est in una & eadem Septentrionis vel Austri plaga, ut ibi dictum. Atqui, per præcedentem propositionem, talis via à loco ad locum pro navigatione commoda est & eligenda, cujus bina vicina quæque puncta sita sunt in una eademque plaga. Quare, cum arcus Meridiani talis via sit, erit ille via sive linea motus navis, quam nempe navis motu suo describet, dum continue dirigatur ad Septentrionem vel Austrum.

## PROPOSITIO VII.

*Si navigatio ab aliquo loco in Equatore sita instituaturs versus plagam Orientalem vel Occidentalem (hoc est, si navis à loco in Equatore mota continue dirigatur versus cardinem Orientalem vel Occidentalem), erit linea motus, portio ipsius Equatoris.*

Ostendimus in secunda propositione, si assumanturs duo loca in æquatere, primus, à quo, secundus ad quem iter instituiturs, quod secundus ab omnibus interjectis punctis, hoc est, punctis arcus ipsius Equatoris, situs sit in una eademque plaga Orientali vel Occidentali. Quoniam itaque in hæc plagas navis continue dirigatur, erit arcus Equatoris interjectus inter duo loca via motus navis. Et quoniam in v propositione supposuimus, talem viam inter duo loca pro navigatione eli-

eligendam esse & commodam, cujus nempe bina quaque vicina puncta sint sita in una eademque plaga, erit talis portio illa *Æquatoris* pro via motus navis eligenda.

PROPOSITIO VIII.

*Si navigatio ab aliquo loco extra *Æquatorem* fito instituatut versus plagam Orientalem vel Occidentalem, ita ut navis continue dirigatur in alterutrum ex istis cardinibus, erit linea motus navis non peripheria verticali circuli, sed parallelus *Æquatoris* nempe circuli latitudinis loci, à quo navigatio instituitur.*

Quoniam enim navis, dum ab uno meridiano tendit ad vicinum, supponitur eandem respicere plagam, non manebit in verticali, sed statim in vicini meridiani punctum aliud, quod nempe sit punctum paralleli *Æquatoris* sive circuli latitudinis loci, unde discessum est. Hujus enim circuli singula puncta talia sunt, ut ducta ad ea tangentes circuli istius respiciant cardinem ortus atque occasus singulorum istorum punctorum. Propterea carina navis, quoniam continue supponitur dirigi versus istos cardines, tanget continue parallelum hunc in aliquo puncto. Vel, quoniam hujus paralleli bina quaque vicina puncta talia sunt, ut unum ab altero sit situm versus unam eandemque plagam ortus vel occasus, atque navis in hanc plagam dirigi supponitur continue, neque est alia linea in Globo, cujus puncta ita se habeant, ideo sequitur, quod via navis motus sit parallelus iste latitudinis loci.

**COROLLARIUM.** Ex tribus precedentibus propositionibus colligimus, si navigatio à quovis Telluris loco instituatut, vel navis continue dirigatur versus plagam aliquam cardinalem, viam navis fore circularem.

## PROPOSITIO IX.

*Si navigatio instituenda sit ab uno loco ad alterum in eodem parallelo vel circulo latitudinis situm, erit via navis portio paralleli istius, et si hac non sit brevissima.*

Etenim illa linea pro navigationis via eligitur, per quam ad locum destinatum pervenitur dirigendo continue navem versus unam eandemque plagam, sive cujus lineæ bina vicina quæque puncta sita sint in una eademque plaga. Atqui paralleli circuli bina vicina quæque puncta talia sunt. Quare portio paralleli erit via motus navis.

**COROLLARIUM.** Triplex itaque situs est locorum, à quorum uno ad alterum cum instituitur navigatio, via navigationis est peripheria circuli, nimirum. 1. Si ambo loca in uno meridiano fuerint. 2. Si ambo in Æquatore. 3. Si ambo in uno parallelo vel circulo latitudinis. In duobus prioribus situs speciebus eadem est via vel linea navigationis cum distantia vel via brevissima: Sed in tertio situ via navigationis diversa est à via brevissima. Hæc enim est arcus circuli maximi inter duo loca interjectus. In alio quovis locorum situ via navigationis non potest esse peripheria circuli, ut dicemus in propositione sequenti.

## PROPOSITIO X.

*Si navigatio instituatur à quovis Telluris loco versus plagam quamlibet non Cardinalem, ita ut navis continue in illam plagam dirigatur, via motus hujus navis non est circularis, neque alia curva in seipsam recurrent, sed linea curva solida helici similis & Tellurem infinitis gyris atque flexibus ambiens.*

Concipiamus navem ex aliquo loco solvere. Postquam illa in vicinum meridianum punctum pervenit, dirigitur versus sequentis sive proximi  
me-

mer  
in ca  
cun  
ridi  
mu  
van  
plic  
mul  
D  
mor  
Tell  
non  
F  
huj  
prie  
heli  
qua  
dici  
neq  
par  
para  
do f  
etia  
Lox  
sup  
cun  
edu  
exp  
ta  
que  
line  
van  
pe  
pos  
bus  
me  
Me

meridiani punctum illud, quod ad prius punctum in eadem situm est plaga, in qua prius hoc ad locum primum, atque ita porro in sequentibus meridianis. Hæc autem puncta meridianorum omnium non faciunt peripheriam circuli, sed curvam solidam helicoidem. Distincta hujus rei explicatio facilius ex ostensione in Globo facta, quam multis verbis haberi potest.

Definitio. Loxodromia dicitur via sive linea motus, quam navis describit, dum à loco aliquo Telluris movetur continue versus plagam unam non cardinalem.

Hæc est nominalis definitio: essentialis vero hujus lineæ definitio, hoc est ipsius naturæ & proprietatum cognitio difficillima est. Neque enim helix est, ut multi putant, neque à magnetis aliqua proprietate dependet, qui illam existere inde dicunt, quod navis sequatur ductum Magnetis, neque composita est ex multarum peripheriarum particulis minutis, ut Nonnius ponit (quod vel ex parallelis circulis manifestum est, qui eodem modo fiunt à motu navis, sicut Loxodromiæ) neque etiam Snelli explicatio plana est, qui dicit quod Loxodromia sit linea *ἡλικοειδής*, in terreni Globi superficie, quam ubique contingens recta linea cum omnibus meridianis per contactus ea puncta eductis æquales angulos comprehendit. Non enim explicat Snellius, quomodo concipi debeat talis tangens vel quomodo ducenda sit: & proprie loquendo Loxodromia non habet tangentes rectas lineas, quia est linea solida, cum tangentes ad curvum planas lineas tantum ducantur: in lineis quippe solidis ad qualibet puncta infinitæ tangentes possunt duci. Præterea aliis quoque linearum ductibus convenit ea definitio, cum ad quodvis cujusvis meridiani punctum talis tangens & ducta à vicino Meridiano linea curva concipi possit.

Nostra



Nostra definitio etiam ita potest proponi : *Loxodromia dicitur linea curva Tellurem multo gyrus ambiens, cujus quodlibet punctum ab omnibus aliis ejus punctis jacet in una eademque specie plagæ : sive, in quâ si sumantur duo puncta, unum punctum ab altero & omnibus intermediis punctis in una plagæ jacet : sive à cujus quovis puncto si ducantur circulares arcus ad omnia reliqua puncta, hi arcus faciunt angulos æquales cum Meridianis, qui per singula puncta hæc transeunt. Hæc definitio est essentialis.*

PROPOSITIO XI.

*Si navigatio insituatur à loco aliquo versus alium, qui non in eodem meridiano nec Equatore, nec parallelo cum priori sit situs, & in tota navigatione dirigatur navis continue in eam plagam, in qua locus designatus situs est à loco discessus, nunquam per istam navigationem pervenietur ad locum designatum sed continue magis magisque ab eo navis removebitur.*

Hæc insignis proprietas navigationis magno fuit miraculo nautis, cum primo animadvertita esset, quod priori seculo ætate Petri Nonnii Lusitani Mathematici contigit. Ad hunc enim accessit peritus quidam nauclerus, qui cum in Oceano navigasset, & aliquoties, ea loca aditurus, quæ versus ortum vel occalum jacebant, eam navem direxisset continue in talem plagam, nunquam tamen ad destinatum locum pervenerat, sed in eodem parallelo vel etiam aliâ viâ motum navis factum fuisse observaverat. Petiit itaque à Nonnio, ut causam hujus mirabilis phænomeni explicaret. Hæc fuit prima occasio & origo hujus contemplationis. Nonnius enim non multo post duos de hac materia libros edidit : deinde plurimi Mathematici in hoc negotio sive in hac curvâ linea explicanda laborarunt : denique nauta eam ad

ad usum nauticum necessariam deprehenderunt: inde Tabulæ constructæ, de quibus postea.

Cæterum causa hujus phænomeni est, quod navis continue directâ in eam plagam, in qua locus secundus à primo situs est, non manet in periphæria inter hæc loca intercepta, sed dum ad unum punctum pervenit, quia hic novus est Horizon & alia plaga assumti cursus extensio, atque hoc continue in sequentibus punctis fit, inde existit linea curva helicoides, in qua dum movetur navis, continue magis magisque alicubi remouetur à loco destinato, alicubi propius accedit.

PROPOSITIO XII.

1. Quando navigatio instituenda est ab uno loco ad alterum in eodem meridiano situm vel versus plagam Septentrionis & Austri, dirigenda est navis continue in hanc plagam Septentrionis vel Austri, sive, eligendus est meridianus pro via navis, & pervenietur ad locum alterum.

2. Quando navigatio instituenda est ab uno loco ad alterum, & sint ambo in Æquatore, dirigenda erit navis in eam plagam, in qua alter à primo jacet, hoc est in plagam Orientis vel Occidentis, sive Æquatoris linea assumenda est pro via navis.

3. Quando navigatio instituenda est ab uno loco in alterum, & sint ambo in uno parallelo Æquatoris sita, non est dirigenda navis in eam plagam, in qua alter hic à primo jacet, sive quæ à primo ad alterum extenditur, nunquam enim ad alterum locum perveniret navis, sed infinitis gyris circa Tellurem versus polos circumiret: verum directio continue facienda est in plagam Orientis vel Occidentis: In hanc enim dum tendit navis, describit motu suo parallelum Æquatoris, & sic ad locum alterum pervenit.

4. Quan-

4. Quando navigatio instituenda est ab uno loco in alterum, quæ neque in uno meridiano, neque ambo in Æquatore, neque in uno parallelo Æquatoris sint, non est dirigenda navis in eam plagam, in qua alter locus à primo jacet, nunquam enim ad locum alterum perveniretur, sed motus navis describeret Loxodromiam quæ non transiret per alterum locum: verum directio instituenda est in eam plagam, in quam dum movetur navis, describit Loxodromiam, quæ per alterum locum transeat, sive in eam plagam, cujus angulus cum meridiano æqualis est inclinationi Loxodromiæ, quæ per duo illa loca transit.

Hæc omnia ex præcedentibus Propositionibus sequuntur.

#### PROPOSITIO XIII.

*Loxodromia à quolibet Telluris loco infinita procedunt sive concipi possunt, sicut infiniti verticales, sed numerantur tantum viginti octo circumcirca quemlibet locum, nimirum septem in quadrante inter loci meridianum & loci parallelum, ita ut angulum illum rectum dividant in octo æquales partes atque æquali angulo vicini bini distent. Ipse tamen parallelus dicitur octava Loxodromia.*

Appellantur autem eisdem nominibus quibus venti seu plagæ. In globis ex centro compassorum, vel etiam aliis meridianorum punctis, prodire & circa Tellurem circumvolvi conspiciuntur.

Cæterum in usu nautico Loxodromiæ intermediæ denominantur per distantiam à vicinis Loxodromiis, ex. gr. tertiâ parte vel unâ quartâ magis borealis, magis orientalis, &c.

#### PROPOSITIO XIV.

*Loxodromia inter duo loca intercepta est fere vel ad sensum æqualis hypotenusæ Trianguli plani re-*  
*ctanguli.*

*anguli, cujus una cathetus aequalis est differentia latitudinis duorum illorum locorum, altera cathetus aequalis est differentia longitudinis locorum sumta in parallelo, qui medius est inter parallelos locorum illorum.*

Vocantur talia Triangula Loxodromica. Sumenda autem sunt pro accurato calculo loca admodum vicina, ut exigua portio interjaceat, nimirum loca, quorum differentia latitudinis est tantum unius scrupuli.

**COROLLARIUM.** Licet itaque viam Loxodromicam supputare ab uno loco ad alterum, & quidem beneficio sequentis Propositionis.

**PROPOSITIO XV.**

*Partes Loxodromiae unius interceptae inter parallelos aequali intervallo distantes, sunt aequales.*

Triangula itaque Loxodromica parva, plurima concipiuntur singulis in Loxodromiis, quorum unius Loxodromia si supputetur, habetur quantitas Loxodromiae ab uno loco in alium, cujus latitudo nota sit.

**PROPOSITIO XVI.**

*Data duorum locorum latitudine & longitudinis differentia invenire Loxodromiam, quae ab uno loco ad alterum navigatur. Vel, Datis in globo vel Mappa nautica duobus locis invenire plagam, in quam navis dirigenda est, ut ex uno loco ad alterum deducatur.*

Hoc est praecipuum vel unicum potius problema totius artis Nauticae, ad quod omnia reliqua referuntur. Si nulla sit differentia latitudinis, non erit via navis Loxodromia, sed parallelus istorum locorum, qui tamen communiter dicitur octava Loxodromia, quoniam eodem modo, ac reliquae Loxodromiae, generatur per motum navis, quae ad ear-



cardinem Orientalem vel Occidentalem dirigitur. Si itaque nulla sit differentia latitudinis, dicunt quod octava Loxodromia assumi debeat, & navem dirigendam esse ad cardinem Orientalem vel Occidentalem in tota navigatione. Et si enim non dirigatur ad locum destinatum, tamen per istam falsam directionem ad locum deducetur navis.

Si nulla est differentia longitudinis, non erit via navis Loxodromica sed portio Meridiani, in quo loca ambo jacent, & assumitur plaga Septentrionis vel Austri pro directione navis.

Si vero loca data sint differentis latitudinis & longitudinis, & per globum operari placeat, notentur in meridiano æneo data latitudines, & si quidem unius latitudinis parallelus habeat in se centrum alicujus compassi, sive ex quo eductæ sunt Loxodromicæ, in globo adducatur hoc ad meridianum sub notato latitudinis gradu: deinde volvatur globus, donec tot gradus Æquatoris transeant per meridianum, quot sunt in longitudinis differentia; & observetur tunc, cujus loxodromicæ ex centro illo eductæ punctum aliquod sit sub altero meridiani notato puncto. Ea loxodromia est quaesita, & indicat in quam plagam dirigenda sit navis ut ex dato loco in datum locum perveniatur: Si nullius loxodromicæ punctum sit sub notato meridiani puncto, loxodromia inter duas vicinas illi puncto intermedia est assumenda.

Si vero in neutro latitudinis parallelo inveniantur centrum alicujus compassi, è quo loxodromicæ sint eductæ, eligatur aliqua loxodromia, quæ quaesitæ propinqua esse videatur, atque adducatur ad unum notatæ latitudinis sive meridiani punctum, & volvatur globus, ut prius, donec longitudinis differentia transeat per meridianum. Hoc facto, si assumptæ loxodromicæ punctum aliquod sit sub altero

terio  
drom  
depr  
atqu  
cuj  
to al  
ab il  
deno  
conc

In  
uniu  
in m  
est,  
nis  
gam  
F  
ciler  
guli  
sed  
voca  
pite

De

N

nisi  
tut a

tero notato meridiani puncto, erit assumpta loxodromia ea, quæ quæritur. Si non tale punctum deprehendatur, alia loxodromia est assumenda, atque ut prius agendum, donec talis inveniatur, cujus aliquod punctum deprehendatur, sub notato altero meridiani puncto, vel saltem non longo ab illo removeatur intervallo, eritque loxodromia denominanda à vicinis, inter quas quasi media concipienda est.

In mappis nauticis fit illud hoc modo, sicut unius loci plaga ab alio invenitur, quæ methodus in mappis æqualium latitudinis graduum vitiosa est, in mappis vero inæqualium graduum latitudinis monstrat satis accurate loxodromiam sive plagam in quam navis dirigenda est.

Habent etiam nautæ aliam methodum satis facilem, quâ per solutionem Trianguli plani rectanguli invenitur loxodromia sive navigationis plaga: sed ad illam methodum utuntur Tabulâ, quam vocant crescentis latitudinis, de qua diximus capite xxxi.

## CAPUT XL.

*De præcipuo Artis Nauticæ problemate, nempe de inveniendo loco in Mappis, ad quem in navigatione facta per aliquod tempus perventum est, sive de invenienda loci istius longitudine & latitudine.*

## PROPOSITIO I.

**N**on potest cognosci plaga, in quam navis dirigenda sit, ut ad destinatum locum perveniat, nisi notus sit locus, in quo navis ad illud tempus constituta est.

Dixi-

Diximus in præcedenti capite, quod præcipuum artis nauticæ problema sit de invenienda plaga, in quam navis dirigenda est. Illam vero inveniri non posse, nisi sciatur locus, ex quo navis dirigenda est, manifestum est. Ideo problematis de loco illo inveniendi solutio est necessaria, imo problema de invenienda plaga reducitur ad hoc.

### PROPOSITIO II.

*Locum, ad quem navis ad quodvis navigationis tempus pervenit, invenire in mappis.*

Hoc est illud opus, quod Belgæ vocant, *het bestek in de Pas-kaert*. Singulis enim diebus locum mappæ, ad quem existimant navem pervenisse, notant acicula, ut hac ratione sciant, in quo Telluris loco versentur, & quam in plagam sit navis dirigenda. Utuntur autem triplici methodo ad hoc negotium, prout hoc vel illud rectius observatum esse supponunt.

1. Observatio Rhombo in quo navis directa fuit à loco prioris diei vel loco in mappis dato, sive Rhombo, in quo mota fuit navis & observata quantitate confecti interea itineris. Hisce duobus cognitis invenitur locus navis in mappa ita: Sumatur norma, & unum ejus crus applicetur ad locum prioris diei vel unde discessit navis, alterum crus applicetur lineæ vicinæ, quæ plagam observatam vel cursum repræsentat: notetur cretâ punctum cruris, quod loco discessus imminet. Deinde intervallo circini sumantur ex opposita scala confecti itineris milliaria, & pes unus circini imponatur loco discessus, norma vero moveatur in linea plagæ donec alter pes circini attingat notatum normæ punctum. Locus mappæ, qui subiectus est illi puncto in eo situ normæ est quaesitus, in quo nempe navis tunc versatur.

Nau-

Nautæ sine norma duobus circinis problema expediunt.

Cæterum, si punctum in mappa accuratius per calculum invenire vel ipsum navis locum in Tellure determinare velis, problema erit hoc: Data unius loci longitudine & latitudine, & datâ plagâ, in qua ad alterum locum navigatum est, cum confecto itinere, invenire hujus alterius loci longitudinem & latitudinem. Hisce enim inventis, licet accuratius in mappa notare locum navis.

2. Observatâ plagâ, in qua ab uno loco noto ad alterum ignotum navigatum est, & observatâ hujus alterius latitudine sive elevatione poli, invenire hujus alterius situm in mappa.

Applicetur rursus unum crus normæ ad plagam observatam loco vicinam, & alterum crus imponatur loco noto (sive unde instituta est navigatio) fiatque ibi in crure signum creta. Deinde moveatur crus plagæ applicatum, donec notatum alterius cruris punctum incidat in parallelum observatæ latitudinis. Punctum enim incidentiæ est locus quæsitus, nempe locus navis. Si in mappa non sit parallelus latitudinis observatæ, sumantur intervallo circini in laterali linea gradus inter hanc latitudinem & vicinum parallelum intercepti, atque simul norma in linea plagæ, & circini pes unus in parallelo isto moveatur, donec alter circini pes & notatum cruris punctum conveniant. Punctum congressus indicat locum navis. Nautæ utuntur duobus circinis.

Si accuratius determinare velis per calculum quæsitum loci in mappa vel Tellure ipsa, problema est hoc: Datâ unius loci longitudine & latitudine, & plagâ, in qua ad alterum est instituta navigatio, atque hujus alterius datâ latitudine, invenire hujus longitudinem. Etenim longitudine & latitudine datâ, datur ipse locus.



3. Observatâ quantitate confecti itineris ab uno loco noto ad alterum ignotum, & observatâ hujus alterius latitudine, invenire hunc alterum in mappis.

Sumatur circini intervallo quantitas confecti itineris ex apposita scala. Deinde si per latitudinis observatæ gradum in mappa transeat parallelus, ponatur unus pes circini in locum notum, alter pes in istum parallelum. Punctum hoc erit locus quæsitus. Si vero per latitudinis gradum non transeat parallelus, applicetur normæ crux unum vicino parallelo, in altero crure notetur gradus latitudinis, & moveatur norma, donec pes alter circini attingat notatum normæ punctum. Locus mappæ subjectus puncto illi in hoc situ erit quæsitus locus navis.

Si accuratam magis per calculum inventionem cupias, problema erit hoc: Datâ unius loci longitudine & latitudine, & alterius distantia in linea navigationis, atque hujus latitudine, invenire hujus alterius longitudinem. Cognita enim hac, cum latitudo observata sit, habetur ipsius loci situs in mappis & Tellure.

Quarta etiam methodus & quinta inveniendi istius loci datur, nempe in quibus alterius sive quæsitii loci longitudo observata esse supponitur, ignota autem latitudo. Verum, quoniam raro licet in mari observare longitudinem, ideo methodus hæc tanquam inutilis omittitur. Qui plura hac de re cupit, legat Snellium, Stevinum, Metium & alios, qui prolixè hæc tractarunt.

### PROPOSITIO III.

*In quam plagam navis moveatur, & in quo Rhombo, conicere, etsi fallacia sint indicia.*

In solutionibus prioris Propositionis pro inveniendò loco navis assumpta fuerunt tanquam nota

nota v  
fuit,  
tudo l  
cendu  
tur,  
enim  
ipse l  
plaga  
Co  
feu m  
bus co  
vis, ear  
rhomb  
ga app  
supput  
Pos  
ut fall  
ta sit a  
ideo c  
mare i  
Abrip  
eander  
freque  
Torrid  
plurim  
procell  
in eade  
aliqua  
5. No  
plagam  
fieri, c  
Hæc  
eo rho  
tum au  
mentia  
dum et

nota vel observata. 1. Plaga, in quam navis mota fuit, & rhombus, in quo. 2. Confecta via. 3. Latitudo loci, in quem perventum est. Jam itaque docendum est, quomodo hæc tria in mari observentur, ut ad inventionem loci adhiberi possint. Si enim hæc non recte observata vel nota sint, neque ipse locus verus invenietur, sed falsus. Primo de plaga cursus navis videamus & rhombo.

Cognoscunt illam naucleri ex compassio nautico seu magnetico. Quæ enim compassi plaga seu rhombus congruit cum linea conceptæ longitudinis navis, eam in plagam navis moveri ponitur, atque ejus rhombum describere. Rarius utuntur indicio à plaga apparentis ortus vel occasus Solis desumpto, quem supputant.

Possunt indicia hæc à variis causis corrumpi, ita ut fallant in indicando rhombo & plaga. 1. Si incerta sit acus magneticæ declinatio in illo loco, atque ideo compassi plagæ non indicent veras plagas. 2. Si mare in illo loco fluxum habeat in certam plagam. Abripiet enim navem è rhombo vero, etsi navis in eandem plagam dirigatur. Fluxus & refluxus est frequens causâ hujus erroris, & in multis Zonæ Torridæ locis viget motus generalis & perpetuus, in plurimis locis status à ventis statis. 3. Venti, in primis procellæ, navem è rhombo itineris removeant, etsi in eadem plaga tendat. 4. Fluctus maris, qui versus aliquam plagam feruntur, & navem secum ducunt. 5. Non potest gubernaculum, quo navis dirigitur in plagam quamlibet, moveri à nauclero sicut debebat fieri, obstantibus & renitentibus fluctibus maris.

Hæc omnia faciunt ut navis non removeatur in eo rhombo, cujus plagas indicat compassus; Quantum autem seducatur ab illo, conjecturâ ex vehementia fluxus maris & plagæ ejus, &c. addiscendum est, sed imperfecta admodum est methodus.

## PROPOSITIO IV.

*Confectum iter navis in Rhombo conſpicere, metiri vel addiſcere ad datum tempus à dato loco.*

Illud naucleri conſpiciunt vel conſecturâ colligunt. 1. Quando obſervant vel experienciâ ſciunt, quantum iter navis tali vento & celeritate conſpicere ſoleat. 2. Si in eodem meridiano vel linea vicina navigaverint cum vento aliquo, & obſervaverint latitudinem loci initio hujus motus & latitudinem loci in ſequenti tempore. Differentia enim latitudinum in milliaria converſa indicat conſectum iter pro tanto tempore & tali vento. Unde pro dato quovis tempore & tali vento manente colligitur conſectum iter. 3. Majori induſtriâ conſectum iter meſurant vel colligunt per naviculam & filum: cujus una extremitas alligata eſt naviculæ, altera cum globo eſt in navi ipla. Etenim immotâ navi conceditur naviculæ navigatio, donec decem vel duodecim ſili orgyis remota ſit, & obſervatur tempus interea elapſum. Ex hoc pro quovis tempore invenitur navis conſectum iter.

Hæc indicia conſecti itineris multis quoque à cauſis corrumpuntur vel incerta redduntur, imo ex ſeipſis incerta ſunt, cum meræ ſint conſecturæ. 1. Sæpe navis minorem vel majorem viam conſecit, quam conſectura præbet, nempe quia in plerisque maris locis fluxus eſt in certam plagam, vel ſuctus volvuntur in aliquam plagam. Si itaque navis in eandem plagam dirigatur, major erit conſecta via, quam conſectura præbet; ſi in contrarium, minor. 2. quia navis ab aliis cauſis in alias plagas abripitur, & ſic per ambages pervenit ad alium locum. 3. Venti variis modis mutantur. 4. Quo navis majorem altitudinem habet, eo tardior videtur ejus motus, eſtâ tardior non ſit.

## PROPOSITIO V.

*Latitudinem loci, ad quem perventum est, observare.*

Observant illam naucleri de cælo per Solem die, & stellas nocte, sicut capite XXIII monstravimus. Instrumentis utuntur tribus, Astrolabio, Radio, & Triangulo.

Hujus observatio etsi minus errori obnoxia sit & minus conjecturalis, quam priorum duarum, nempe rhombi motæ navis & confecti itineris, tamen non raro vitiosa invenitur. 1. quia agitatio navis impedit observationem. 2. quia oculus non recte applicatur instrumentis. 3. quia refractio negligitur.

## PROPOSITIO VI.

*Ex hisce constat, methodos quibus nauta utuntur ad inveniendum locum in mappa, ad quem pervenerunt, esse fallaces, quoniam neque de rhombo & plaga itineris, neque de quantitate confecti itineris, neque de observata latitudine loci possunt esse certi: latitudinis tamen loci, ad quem perventum est, observatio, quia conjecturalis non est & minus errori obnoxia, præsertim aère & mari tranquillo, potest ab illa fallacia eximi.*

Ex illa vero sola non invenitur locus ipse in mappa vel tellure, sed ( ut satis superque dictum est capite xxx ) requiritur secundum, nempe vel distantia ab altero dato loco ( confectum iter ), vel plaga aut rhombus, quo ex dato loco ad illum navigatur, vel denique longitudo loci illius ab hoc. Incertam esse diximus confecti itineris sive distantie observationem, sicut etiam plagarum & rhomborum. Ideo ad inveniendam longitudinem loci illius recurritur. Cognita enim loci longitudine & latitudine ( cujus inventionem do-



euimus) invenitur ipse locus in mappis & determinatur in Telluris globo.

Ex quo manifestum est, Artem nauticam ad perfectionem suam requirere solutionem illius Problematis: *Invenire loci, in quo versamur, longitudinem ad quodvis tempus vel quolibet die.* Palma in medio posita est; rapiat, qui potest.

F I N I S.



mi-  
ber-  
ro-  
nem  
dio

