



29.a.4-4-



2 400 40



MADE IN SPAIN

17648337

52-4650

ATHANASII KIRCHERI  
 FULDENSIS BVCHONII BB.  
 E SOC. IESV PRESBYTERI;

Olim in Herbipolenfi, & Auenionenfi Societatis IESV Gymnafijs  
 Orientalium linguarum, & Mathefeos, nunc huius  
 in Romano Collegio Profefforis ordinarij.


ARS MAGNA  
 LVCIS ET VMBRAE

In decem Libros digefta.

*Del. M. de la Com. QVIBVS & Jhu & Jnanade*

ADMIRANDAE LVCIS ET VMBRAE  
 in mundo, atque adeò vniuerfa natura, vires effectufq.  
 vti noua, ita varia nouorum reconditorumq.  
 fpeciminum exhibitione, ad varios mor-  
 talium vfus, panduntur.

*Cum Priuilegio Sacr. Caefar. Maieftatis.*

|                      |                                                                                       |                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| כאורה                |  | כחשיכה                              |
| ὡς τὸ σκότος αὐτῆς   |                                                                                       | ὡς τὸ φῶς αὐτῆς                     |
| Sicuti tenebrae eius |                                                                                       | ita & lumen eius. <i>Pfal. 138.</i> |



ROMAE, Sumptibus Hermanni Scheus. MDCXLVI.

*Ex Typographia Ludouici Grignani.*


SVPERIORVM PERMISSV.



*HARMONIA DECACHORDI,  
Sive Idea Operis decupartiti.*

- I. Physiologia Lucis, Sciafophia, Ars Chromatica.
- II. Actinobolismus Naturæ; Echoiophia, Optica.
- III. Apparatus ad Gnomonicam Curiosam, Doctrina Conotomica.
- IV. Horographia varia, in datis planis instituenda.
- V. Astrolabiographia, & Geographia Gnomonica.
- VI. Proteus Sciathericus, Gnomonica Physico-astrologica.
- VII. Ars Anacamptica, siue Astronomia reflexa.
- VIII. Ars Anaclastica, siue Astronomia refracta.
- IX. Cosmometria Gnomonica, hoc est mundi luc-umbris dimensio.
- X. Magia Lucis & Umbræ, Horographica, Parastatica, Catoptrica, Epilogus, siue Metaphysica Lucis & Umbræ.

*In decachordo psalterio psallam tibi. Psal. 143. v. 9.*



**FERDINANDO  
ARCHIDVCI  
FERDINANDI III. CAESARIS  
FILIO PRIMOGENITO  
VBEREM AETERNAE LVCIS  
affusionem precatur**

*ATHANASIVS KIRCHERVS  
è Societate Iesu.*



**A**RS MAGNA LVCIS ET VM-  
BRÆ cadit ad genua Orien-  
tis Solis. Tibi diei cursum  
auspicaturo, FERDI-  
NANDE ARCHI-  
DVX, sese vectigalem fa-  
cit ac tributariam; & optat in quadrigæ, qua  
vehendus es orbita, radius apparere, ad obse-  
quium adolescentis in Te splendoris. Præuo-  
lauit pueritiæ aurora purpurea, TVÆ nun-  
cia SERENITATIS. Aetati secutura  
quadriga struitur, maiestate luminis augusta;  
qua

qua cum imperio diem vehas. Rotæ, axes, temo, folium ipsum, animi sunt decora. Hæc sunt enimvero, quæ Principem euehant; quæ conspicuum & clarum reddunt; quæ regnis aptant, & imperijs; quæ mundo exhibent Solem. Tibi prætextam in paludamentum mutaturo **GENITOR AVGVSTISSIMVS** familiam cõstituit; ad speciem, vt nobilium comitatu pro maiestate cingereris; reapse, vt pro institutionis decoro, & honestate Aulam aperires virtutibus, atque disciplinis, quæ certant Tuæ nomen dare familiæ, hoc est, Tibi familiares esse. Tam prodigiosum est Principem sine virtutibus, quàm Solem mundo apparere sine radijs. Gestiunt ad ornatus Tui claritatem conferre splendida capita, quæ dicuntur sapientiæ lumina, scientiæ: & cæteras inter, audet **ARS MAGNA LVCIS ET VMBRÆ** in partem venire obsequij, quia Cæsar iubet. Poterat suo etiam lucis nomine, imò & vmbra, quæ serenitati esse solet in delicijs, comparere; vt ausim dicere **ARTEM LVCIS ET VMBRÆ** suo quodam iure singulariter ad **SERENISSIMVM ARCHIDVCEM** pertinere. Gemma nisi accipiat in se Solem, non reddit: Nec refe-

ret

ret Solem Princeps, nisi concipiat; neque concipiet, nisi perspiciat quid **LUX**, quid **VMBRA** possit in signandis horarum spacijs; in fingendis ad veritatis inuidiam, coloribus; in calore corporibus insinuando, distribuendoque. Emblemata sanè & parerga luminis, quibus Mundi pulchritudo mirum in modum ornatur, spectacula sunt digna Principe. Sunt enim, quæ radiorum proiectu, & repercussu à Sole formantur, mira; quæ Ars super hæc adinuenit, per **MAGIAM HOROGRAPHICAM PARASTATICAM CATOPTRICAM**, miracula. Quin & ipsæ videntur ad illustrandam naturam vmbrae proiecti, stupendo prodigio: nec exprimi facile potest, quantum luminis accipiant ab vmbra, scientiarum clarissimæ. Videbit hinc Princeps, opinor, se Solem induere: si radios induit; si quadriga virtutum vehitur; si passiones animi, equos igniuomos, frænat; si vitalem Reipublicæ calorem inspirat; si omnium horarum est; si quicquid aspicit, illustrat; denique si ita lucet, vt populi subiecti, se accipere videant serenum diem. Possem ad hominum nubes transferre sermonem. Quæ in his præstigiæ! quæ irides! quot colores & fallaciæ! Principis est **LUCEM** hic, ab

ab VMBRA discernere: & hæc prudentia dici profectò potest, ARS MAXIMA LVCIS ET VMBRÆ. Sed ego, ARCHIDVX SERENISSIME, sub radijs tuis aliter vmbra accipio. Aetas hæc, si quæ vnquam, ferax est virorum eruditione clarissimorum. Difficile est in tanta claritudine scribentem emicare, multoque difficilius in tanto scripturientium calore, æstum euadere. Ut igitur LVCEM, simul & VMBRAM accipiat ARS MAGNA LVCIS ET VMBRÆ, cadit ad genua ORIENTIS SOLIS.

*E Collegio Romano Kalendis Novembribus Anno 1645.*



FER-

# FERDINANDVS III.

Diuina fauente clementia,  
ELECTVS ROMANORVM IMPERATOR  
SEMPER AVGVSTVS.

Ac Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ,  
Croatia, Sclauoniæ Rex, Archidux Austriae,  
Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ,  
Carniolæ, & V Vittenbergæ,  
Comes Tyrolis, &c.



GNOSCIMVS, & notum facimus renore præsentium, vniuersis, quòd cum nobis humiliter exponendum curauerit Religiosus deuotus nobis dilectus Athanasius Kircherus Societatis I E S V Presbyter, se Librum quendam ingenij sui industria confectum, vocabulo: *Ars Magna, siue admiranda Lucis & Vmbra in decem Libros digesta, qua intima cælorum terræque miracula exhibentur*: indigitatum, communi rei literariæ bono, præli beneficio per Hermannum Scheus Typographum Romanum, in lucem edere decreuisse; vereri autem ne æmuli forte aliqui priuato quæstui intenti, ipsum vel vitiosa imitatione, vel alijs sinistris artibus, sperato laborum, & impensarum suarum fructu, & emolumento priuaturi sint; demisse proinde supplicando, vt suæ hoc loci indemnitati, priuilegio nostro Cæsareo consulere dignaremur. Nos sanè pro benigna nostra in rem literariam iuuandam affectione, humilibus eiusdem precibus deesse nolentes, omnibus, & singulis Typographis, Bibliopolis, ac alijs quacunque librariam negotiationem exercentibus, firmiter inhihemus & vetamus, ne quis supramemoratum Athanasij Kircheri opus per decem annorum spacium, à prima editionis die computandum, intra Sacri Romani Imperij, Regnorumque, & dominiorum nostrorum hæreditariorum fines, simili, aut alio quopiam caractere, vel forma, siue in toto, siue in parte, recudere, aut alio recudendum dare, vel alibi etiam impressum adducere, vendere, distrahere, apertè, vel occultè citra voluntatem, & consensum præfati Athanasij Kircheri Authoris, siue dicti eius Typographi, Hermanni Scheus, eiusue hæredum, præsumat. Si quis verò secus faciendo, priuilegium hoc nostrum Cæsareum spernere, negligere, violare,

††

lare, aut transgredi conatus fuerit; non solum huiusmodi libris, perperam quippe recusis & adductis: quos quidem supradictus Athanasius Kircherus, siue eius Typographus, hæredesue ipsius, vbicunque deprehensos, vel propria authoritate, vel Magistratus loci illius auxilio sibi vindicare poterunt; de facto priuandum, sed & pœna insuper decem marcarum auri puri Fisco nostro Cæsareo fraudis vindici, & iniuriam passi, seu passorum vsibus ex æquo pendenda, decernimus irremissibiliter plectendum. Volumus autem, quod dictus Typographus quaterna ad minus exemplaria proprijs suis sumptibus quamprimum ad Cancellariam nostram, Imperialem Aulicam transmittere debeat. Mandantes insuper vniuersis, ac singulis nostris, & Sacri Imperij, Regnorum, ac ditionum nostrarum hæreditariarum subditis, cuiuscunque status, gradus, ordinis, conditionis, aut dignitatis existant, tam Ecclesiasticis, quàm Sæcularibus, præsertim verò ijs, qui in Magistratu constituti, vel proprio, vel superiorum nomine, & loco ius, & Iustitiæ administrationem exercent, ne quenquam priuilegium hoc nostrum Cæsareum temere & impune transgredi, aut violare patiantur; quin potius contumaces, si quos forte compererint, præscripta pœna mulctari, alijsque modis idoneis coerceri curent, quatenus & ipsi eandem mulctam euitare voluerint, harum testimonio literarum, quas manus nostræ subscriptione, & sigilli nostri Cæsarei appressione munitas dabamus in Ciuitate nostra Viennæ, prima Iunij, Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto, Regnorum nostrorum Romani Octauo, Hungarici decimo nono, Bohemici verò decimo septimo.

FERDINANDVS.

Locus sigilli.


Vidit Ferdinandus Comes Curtius

Ad mandatum Sac. Cæs. Maiestatis proprium

Ioannes VValderade manu prop.

LECTO.

LECTORI PHILOMAOEI  
AVTHOR S. P. D.



**D**EM mihi Lector *φιλολογία*, hoc in opere decuparito accidisse videtur, quod Adolecenti illi, quem commemorat Crassus apud Ciceronem de Claris Orationibus, in litore obambulantem forte fortuna scalmum offendisse; quem intuitus, ne inuutilis sibi foret, remum comparauit; scalmum autem remò adaptatum conspiciens, opere delectatus, malum quoque concupiuit, deinde antennas, quibus malum decussaret; malum verò antennis decussatum opus imperfectum ratus, vela rudentesque cœmit, nauimque tandem edificatam armamentis instruxit, maria tranauit, ingentes diuitias acquisiuit. Quid hac protulione velim, paucis explico.

Sacra Cæsarea Maiestas, cum triennio ferè præterlapso pro incredibili erga recõditiora studia affectu, quædam mihi circa Lucis *☉* Vmbræ naturam dubia soluenda committere placuisset: ego immortalibus alijs obstrictus beneficijs, ut tanto Sapientiæ Gemo quouis modo satisfacerem; summo studio propositarum solutioni questionum, ut par erat, incumbendum duxi: *☉* dum nil minus quàm libri compositionem cogito, in amplissimos tamen Lucis campos penitus intronissus, tam uberem *☉* copiosam lucida supellectilis segetem reperi, ut decem paginae, quas non nisi in diatribis normanz primò concinnaram, successu temporis in ingentem decem librorum molem excreserent. Scalmum igitur inueni, adaptaui remum, malum antennasque disposui, nauim omni armamentorum genere instructam edificauim: per immensum coelæ stium spaciorem Oceanum diuagatus, quantum humanæ mentis fragilitati licuit, maximos Lucis fulgores translustri umbræ machinationis velo sustinens; tanquam per rapidum medium tandem inexhaustas eiusdem diuitias propius contemplatus, maxima hæsi admiratione attonitus, admiratio curiosum æstuantemque animum, veluti admonis facibus ita potenter inflammauit, ut exinde quietis incapax nihil non molirer; ut inaccessos Lucis thesauros erutos, mundo

Ad Lectorem.

exponerem. Quod quidem hoc decupartito Opere, veluti Nati quaedam decirem, quam & *Artem Magnam Lucis* & *Vmbrae* arrogantiore forsitan, quam par erat titulo, inscripsimus.

Verum ne cum fastuoso illo Bombilio, ut apud Plautum est, aliquam mihi immodestia, ac iactantiae labem impensissimè aspergerem; Cur *Artem*? cur *Magnam*? cur *Lucis* & *Vmbrae* appellarerim? explicandum duxi.

*Artem* itaque dicimus, ut quod diuturno *Lucis* & *Vmbrae* scrutinio perunax inuenit contemplatio; id ars per regulas variè combinatas, seu fructus longè uberrimos, in usus derivaret humanos.

*Magnam* dicimus, ob occultam quandam ad *Magnetem* allusionem. *Magnetem* enim, *Magnæ* rerum omnium attractrix lux, haud incongruè sequitur, *Magnetem*, inquam, quem aliquot abhinc annis pro ingenij mei modulo mundo patefeci, lux *magnæ* sequitur à cœlesti nescio, qua *Heracleotica* catena potenter attractus. *Magnam* dicimus ob earum rerum, in quas dominium suum exercet, immensam amplitudinem; cum nihil in hoc sensibili rerum ambitu excogitari possit, quod *Arts* nostra non sibi vendicet.

Cum verò rerum antiquissima sit *Vmbra*, imò ante omnem rerum existentiam in nihilo illo præluferit, solo *Creatore* posterior; necessario eandem *Luci* tanquam perpetuam, atque individuam comitem coniunximus. Atque adeo opus totum decupartitum inscripsimus, iuxta decem diuinorum radiorum quos *Zephiroth Hebraei*, *Emanationes Latini* nominant, quandam analogiam. Nam quemadmodum decem diuinitatis radijs mundum conditum *Hebraeorum Sapientes* asserunt; ita & nos decem diuersis thematis, seu libris, veluti decem decupartitis radijs *Mundum Lucis* & *Vmbrae*, id est, *Artem* nostram absoluimus. Quorum ideam hoc loco veluti in *Eptome* quadam ob oculos ponimus curiosi *Lectoris*.

Cum itaque carpento longè sublimiori, quam quo olim *Triptolemum* ferunt, per singulos rerum naturalium ordines, classeque delatus, admirabile illud mundi sideri cum terrestri connubium, paranympba luce, attentius considerarem, adeoque nihil in intimo mundanae molis recessu, quod ex *Luce* & *Vmbra*, sua compositionis principia & elementa non haberet, reperirem; varia lucis combinatione nouam quandam *condidi*, quæ pro ingenita sibi fecunditate foeta binas mox filias peperit, unam *Sciagnomicen*,

Ad Lectorem.

*micen*, *Chromaticen* alteram: hæc luci denuò nupti tradita foetæque, quam portentosos partus fuderint, fusè primus *Liber* explicat.

Cum iterum lucis longè lateque extensum dominium, spherica quadam virium suarum diffusionem, omnia attingere, imò singulas virium naturalium in unoquoque corpore elucescentes spheras, ad lucis exemplar conditas conspicerem; *Artem* condidi de rerum naturalium *Actinobolismis*, siue *Radiationibus*, quæ nouo Conceptu foeta, mox aliam atque aliam enixa sobolem, mundo tulit *Echocampicem*, *Osmeticem*, *Opticem*, aliasque, quas doctrina curiosa rarisque experimentis *Liber Secundus* prosequitur.

Porro cum *Vmbra* in omnibus constanti molimine, *Lucis* motum affectantem intuerer; motus autem lucis totius *Astronomiæ* basis quaedam sit & fundamentum: continuo mecum cogitare cepti; qui singulos *Solis*, *Lunæ*, *Stellarumque* motus, & *Periodos* cœlo deductas in terrestribus hisce angustijs exhibere possem. Quod quidem vii facile conceptum animo; ita proinus executioni mandatum fuit. Nam *Gnomone* mox sese pro calamo; plano quolibet assumpto, pro papyro; pro atramento: *umbra* se substituente; manus *Opifex*, *Sol*, inquam, motu suo omnes arcanas cœlorum semitas viasque adeo dextrè mox obuijs superficiebus inscripsit; ut in uniuersa *Astronomia* nil adeo abstrusum & reconditum sit, quod non exhibuerit. Atque in *Tertio* quidem *Libro* naturam calami, chartæ & atramenti, id est *Gnomonis*, planorum, *umbrarumque* varias affectiones prosequimur. In *Quarto* *Horographiam* variam artificio longè maximo, & methode prorsus catholica exhibemus. In *Quinto* *Ouranographiam* adornamus, id est, de primi mobilis doctrina, cuiuslibet plano inscribenda innumeras tradimus methodos. In *Sexto* *Proteum* monstramus, dum corpus siue figuram quamlibet apotheosi quadam *gnomonica* in cœlum translata diuino veneramur honore. *Gnomonicam* quoque *Physico-astrologicam* fundamus, qua totius naturæ arcana, atque adeo *Planetarum* difficiles implexosque motus, solo *gnomone* referimus, artificio prorsus admirando, & à nemine hucusque (absit iactantia verbo) attentato.

Egit hucusque *Lucis* *Simiam* *Vmbra*: modo *Vmbrae* *Simia* *Lux* reflexa agit: hæc enim *Promethæa* quadam instructa astutia, igne cœlitus subducto, immensa cœlorum volumina intra obscura domorum latibula, aureo illo *Lucis* penicillo ea delineat industria, ut intra

intra conclusarum ædium gurgustia constitutus spectator, in ipsæ spaciosis cœlorum cæpis constitutus, uniuersas ætherei mundi seminias per agrare, atque inaccessa sacramenta præses intueri videatur.

Estque hæc Ars nostra Anacampica, siue Astronomia reflexa, quam Septimus Liber ample describit. Rursus cum Lux Vmbrae mediæ densioris penetrabilia subiēs, se fallaciter subducat, moresque affectet prorsus exóticos, nunc se dilatet in longum, modo in nescio quid cyclicum se recuruet; iam in Echini se morem contrahat: huius occasione Artem condidi Anaclasticam, siue Astronomiam refractam, qua inaccessas cœlorum diuitias infra aquam astronomici retis textura, arificio uti hucusque inuiso, ita prorsus singulari, venamur. Quæ omnia Liber Octauus declarat.

Cum præterea Lucem & Vmbrae absolutissimum in omnibus Geometram attendere, ingeniosamq; Conicarum sectionum doctrinam, non aliunde, quam ex huius Schola prodisse, imò ex proportione Vmbrae ad inumbratum, prima totius practicæ Geometriæ fundamenta emeruisse notare, in eam deueni cogitationem, ut nihil in hoc sensibili mundi Theatro adeò esse inaccessum crederem, ad quod Lux & Vmbra nobis aditum non præberent. Horum itaque ductu deuectus altissimorum montium, nubiumq; vertices penetraui; Cœlorum transcendendi tentoria, singulorum cœlestium corporum quantitates, distantias, profunditates noua industria dimensus sum. Quæ omnia fuse sub nomine Cosmometriæ Gnomoniæ Liber Nonus deducit.

Ex his denique, Lucis & Vmbrae recensita supellectile, ceu cornu copiae longe uberrimo, rarioribus quibusuis reconditiisq; selectis per abditam quandam ætiorum cum passiuæ applicationem, Magiam Lucis & Vmbrae condidimus: qua tripartita methodo prodigiosa producimus herolabia, inuisas rerum parastases, seu representationes exhibemus; paradoxas metamorphoses, speculorum adminiculo exponimus. Quæ uti noua & rara, ita non immeritò, veluti Librorum omnium complementum, ultimo Libro, seu Decimo reseruauimus.

Porro quemadmodum in Arbore Sephirothico decem diuinarum virtutum ramis illustri, superiori loco Hebræorū Theologi ponunt Ensoph, hoc est Numen infinitum, inexplicabile, omniumq; moderationem; ita & nos decem Artis nostræ radijs decupariis tandem

ea-

eadem coronidis loco imponimus Orensoph, id est, Lucem infinitam & interminam, seu quod idem est, Lucis aeternæ, & supramundanae miros in spiritali mundo effectus & operationes: quem & Epilogum, seu Metaphysicam Lucis & Vmbrae nuncupauimus; ut mens nostra ex corporeæ Lucis inuitu, ceu per gradus quosdam agitata, tandem in abyssu Luminis absorpta, eidem, à quo existentia sua originem sumpsit, integrè tandem uniat. Ecce operis nostri ideam. In qua quidem, quo modo versati simus, æqui Lectoris iudicium esto. Hoc certum est, nihil me hoc in opere, siue experimentorum, siue  $\mu\omicron\lambda\upsilon\tau\epsilon\chi\nu\alpha\sigma\mu\sigma\tau\omicron\nu$  exhibuisse, cuius summa diligentia non prius periculum fecerimus. Imò, ut multa paucis complectar, in toto hoc opere id passim spectauimus, ne vulgata tritaue, sed è nostræ Artis penu deprompta, nouarum inuentionum sobole Rempublicam Lucariam ditaremus; vel ab obscurius tradita ad maximam facilitatem simul, claritatemq; breuitati iunctam deduceremus. Nonnulla aliquanto fusius pertractauimus, mathematica physicis ita permiscens, ut te quodam modo de via fessum amoenus deuerticulis recrearemus, & ad alacriter pergendum roboraremus. Nouos terminos in Arte noua adhibuimus, ne in inuentis nostris, Lectori auido fusioribus descriptionibus fastidio essemus. Operis filum ita direximus, ut quilibet facile ex ordine & methodo omnibus numeris absoluta, totius operis molera memoria comprehendere possit. Quare quicumque profectum aliquem ex hac Arte nostra haurire cupiet; ei consulam, ut eo illam ordine, quo disposita est, peruoluat. Sunt enim omnia ita connexa, & harmonico quodam ordine digesta, ut posteriora sine prioribus, nulla ratione aut rectè intelligi, aut facile in opus deduci possint. Atque ut hæc Ars nostra cum sperato fructu perlegi posset, diuersis artium professoribus, pro diuersa uniuscuiusque inclinatione, ita nos accommodauimus; ut neminem futurum sperem, qui non ex hoc uberrimo Lucis fonte, emolumentum aliquod in propriam instituti sui areolam sit deriuaturus. Inuenient hic reconditiis Geometriæ Alumni, quæ speculentur: Logistæ vastum sibi nouarum calculationum Campum apertum reperient. Optici, quibus applaudant intuebuntur: Cosmographi, Astronomi, Geographi, circa quæ occupentur, habebunt. Mechanici, instructissimam machinarum omnis generis officinam intrabunt. Secretioris Physicæ, Medicinæ, Magiæ

Can-



Candidatis, rerum quas exhibeant, mirandarum adyta patebunt. Quin & ipsi Ethici, Metaphysici, Theologi, aliarumque abstractiorum facultatum studiosi, quibus afficiantur, recondita reperient.

Verum ne in opere difficillimo Theorica tantum evidentia procederemus; utque experimentorum tam illustrium partus suam fortiiretur certitudinem: Viri sanè illustres non defuerunt, qui opus quò consilio, quò nummario subsidio, veluti obstetricante manu, in lucem munificè sanè, & liberalitate maxima sategerunt.

Quos inter Illustrissimus, & Generosissimus Dominus S. R. I. Liber Baro de Monte S. Georgij principem locum obtinet. Hic enim pro ingenita sibi nobilitate, postquam uniuersam Europam peragrasset, omniumq. Literatorum animos insigni sanè magnificentia conciliasset; tandem & Romam appulit, ut operi nostro lucem præstaret, & gloriam: de cuius viri in Remp. Lit. meritis, & in Literatos affectu prorsus incredibili, silere consultius iudico, quam ea parcius attingere. Hic non omittendum duxi Illustrissimum Equitem Cassianum à Puteo, qui iam à decennio penè pro suo interem literariam zelo, opera mea, quò auxilio, quò consilio, nunquam promouere omisit. Hic se accedit insignis ille & verè πολυδιδυκτος Io. Marcus Marci, Medicus Pragensis; Cui innatum esse videtur sui similibus, id est literatis, ea qua fieri potest, beneficentia assistere. Quibus merito nos æternum obligatos fatemur. Verum ne fusioribus verborum ambagibus aures obtundam Lectoris ad alia anhelantis; sisto calamum. Quicquid igitur, Lector beneuolè, laboris nostri est, totum ad emolumentum tuum directum scias tibi facta hæc sementis, tute tibi segetem merito. Deum τὸν σοφὸν ἄπειρον ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὴν ἀλήθειαν venerans precare, ut reliqua imposterum mea ad eius honorem feliciter eant. Si qui verò hanc operam meam ægrius ferant, Momi, certè insigne illud Clemētis Alexandrini apophthegma vnica consolationi futurum est: Nullum, videlicet, Scriptorem ita fortunatum esse, si iudicis aures, cui nullus contradicat. Cum Plinio idem quoque sentio, peculiarem in studijs causam eorum esse, qui difficultatibus victis prætulerunt vilitatem, gratiæ placendi; ut proinde aliorum vellicationes mihi magnopere curandæ non sint, dummodo Cæsaris Imperio, aliorumq. Orbis Principum, pro modulo meo satisfaciám. Quorū splendor, ut me ad scribendū accendit, ita eorundè umbrā ab omni luidorū æstu facile me defensurā confido. Vale.

SE-

# SERIES, ET ORDO TOTIVS OPERIS. LIBER PRIMVS.

Physiologia Lucis & Vmbræ.

## PARS PRIMA.

Photosophia, siue de lucidis mundi corporibus, luminisque ab ijs  
profluentis natura, & affectione.

- CAPVT 1 De luce primigenia, siue de Sole, omnium lucidorum corporum primo. fol. 5
- 2 De triplici Solis actione, directæ, reflexæ, & refractæ. 10
- 3 De Solis opificio mirabili, & effectu macularum, facularumque Solarium. 12
- 4 De Luna, siue lumine Lunari, aliorumque Planetarum. 14
- 5 De Igne, & noctilucis corporibus, productioneque calor in mundo. 18
- 6 De Photismo Animalium, siue de lumine Animalibus concreata. 22
- 7 De Photismo Aquatiliū, siue de luce Aquatilibus cōcreata. 25
- 8 De Photismo lapidum, & mineralium. Item de lapide phosphoro, eiusque mirabilibus. 26
- 9 De Lucis proprietatibus in genere. 29
- 10 De natura, & efficientia Luminis in mundo sublunari, scholastica disquisitio. 31
- 11 De admirandis luminis facultatibus in producendis natura sublunaris prodigijs. 34
- 12 Quomodo lumen generet colorum visibiles species in medio. 37
- 13 Quomodo per lumen calor generetur in terra, & aere, siue atmosphaera. ibid.
- 14 Quomodo calor frigiditatem, siccitatem, humiditatemque in sublunari mundo producat. ibid.
- 15 Mira vis Solaris, Lunarique luminis in plantas, & animalia. 41
- 16 Quomodo lux cælestis, per calorem suum naturalem disponat de vite animantium diuturnitate; aperiturque in hoc verum Astrologiæ iudiciariæ circa vitam hominis fundamentū. 43

†††

17. Sol

- 17 *Sol & Luna lumine, & calore suo, rerum omnium generationes perficiunt.* 47  
 18 *An ex predictis fundamentum aliquod genethliaca Astrologia constitui possit,* 49

## PARS SECUNDA.

Sciafophia, siue de Vmbra Lucis sobole, eiusque miris in natura rerum facultatibus.

- CAPVT 1 *De origine etymo, & definitione Vmbrae.* 53  
 2 *Quomodo concurrat lumen ad producendam vmbra.* 55  
 3 *De remissione, & intensione vmbrae.* 56  
 4 *De physica vmbrae efficientia.* 57  
 5 *De Arte Sciagnomica, vmbraeque mira natura, comparata ad plantas, & arbores, cum regulis octo in Sciagnomia seruandis.* 59

## PARS TERTIA.

Chromocritica.

Dererum naturalium Chromatiformis, siue de colorum natura, & affectione.

- CAPVT 1 *Quid sit color?* 66  
 2 *De varietate colorum multiplici.* 67  
 3 *Chromatiformis aereus, siue de coloribus in aere, & nubibus apparentibus.* 69  
 4 *Chromatiformis Anaclasticus, siue de coloribus in vitris polyedris.* 73  
 5 *Chromatiformis metallicus, siue de colorum varietate in mineralibus.* 78  
 6 *Chromatiformis Botanicus, siue de coloribus in herbis elucescentibus.* 82  
 7 *Chromatiformis Zoographus, siue de coloribus in Animantibus.* 85  
 8 *Ars Chromocritica, siue de colorum iudicio, & diuinatione.* 88  
*Regula decem in colorum iudicio seruanda.*

## LIBER SECVNDVS.

De Actinobolismis, siue radiationibus.

## PARS PRIMA.

Actinobolismus Lucis.

- CAPVT 1 *Omnes naturalium rerum virtutes diffusa lucis orbitam emulantur.* 107  
 2 *De radiatione lucis, & specierum visibilibus.* 108  
 3 *De radiorum entitate; an accidentia sint? an corpus?* 110  
 4 *Omnia obiecta ad lucis exemplar radiant in orbem.* 111  
 5 *Actinobolismus coloris, siue de representatione specierum in obscuro.* 126  
 6 *Actinobolismus, siue radiatio Soni.* 131  
 7 *Ars Phonocamptrica, siue Echologia.* 134  
 8 *Phonognomia, siue de diuinatione soni ex sono cuiusuis corporis instituenda.* 141  
 9 *Actinobolismus reliquorum sensuum odoratus, tactus, gustusque.* 147  
 10 *Actinobolismus virtutis plasticae, siue formatricis in spermate.* 149  
 11 *De radiatione animi ad extra.* 155  
 12 *Actinobolismus elementorum, & mineralium.* 156  
 13 *Actinobolismus Sympathicus, & Antipathicus rerum medicinalium.* 157

## PARS SECUNDA.

Actinobolismus opticus, siue de radiatione visuali, fundamento totius Opticae.

- CAPVT 1 *De Oculi structura, & visione, ubi per aliquot propositiones totius Opticae natura explicatur.* 161  
 2 *Ars Sciagraphica, siue de naturali rerum adumbratione.* 171  
 3 *De Projectionibus scenographicis geometricè expediendis.* 177  
 4 *De Arte Scenographica.* 187  
*Regulae de Arte Pictoria.* 193

## LIBER TERTIVS.

Gnomonicae curiosae Apparatum continet.

## PARS PRIMA.

Theorumena.


|            |   |                                                                                 |       |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Protheoria | 1 | <i>De requisitis ad Astronomiam Sciathericam.</i>                               | 208   |
| CAPVT      | 1 | <i>Definitio circulorum caelestium, eorumque in horographia varia officijs.</i> | ibid. |
|            | 2 | <i>De quadruplici horolaborum genere.</i>                                       | 213   |
|            | 3 | <i>De Planorum, siue Superficierum horographicarum varietate.</i>               | 218   |
|            | 4 | <i>De compositione Libella.</i>                                                 | 224   |
|            | 5 | <i>De varijs Horolaborum passionibus, Horologijque Cosmocentricis.</i>          | 230   |
| Protheoria | 2 | <i>Conicarum sectionum doctrina decem propositionibus enucleata.</i>            | 233   |

## PARS SECVNDA.

Progymnastica.

In qua omnia ea, quae ad Artem Magnam quouis modo describere possunt, inuestigantur, & ad praxim ordinantur.

|             |   |                                                                                                                  |       |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Progymnasma | 1 | <i>De calcula Astronomico, ad Gnomonicam directo, una cum decem tabulis Gnomonicis.</i>                          | 258   |
|             | 2 | <i>De conicis sectionibus, circulo, ellipsi, hyperbola, parabola, in plana sciatherica prouiciendis.</i>         | 304   |
|             | 3 | <i>De superficierum corporum circularium in planum projectione.</i>                                              | 316   |
| CAPVT       | 1 | <i>De vera &amp; certa metodo geometrica, qua dato cuilibet arcui circuli rectam aequalem assignare docemus.</i> | ibid. |



LIBER

## LIBER QVARTVS.

Horographia varia.

## PARS PRIMA.

De Horologijs Astronomicis, siue à meridie, &amp; media nocte.

|       |   |                                                                           |     |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPVT | 1 | <i>De requisitis ad gnomonicam, siue ad horographiam.</i>                 | 335 |
|       | 2 | <i>Horographia Analemmatico-geometrica.</i>                               | 345 |
|       | 3 | <i>De horolabijs declinantibus à meridie, seu verticali primaria.</i>     | 355 |
|       | 4 | <i>Sphaera gnomonica, eiusque in horographia usus, &amp; praexis.</i>     | 362 |
|       | 5 | <i>De horologijs omnis generis per observationem facile construendis.</i> | 367 |
|       | 6 | <i>De Regula Sciatherica, eiusque in horographia varia, usu mirifico.</i> | 372 |

## PARS SECVNDA.

De Horologijs Italicis, &amp; Babylonicis.

|       |   |                                                                              |     |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPVT | 1 | <i>De Horologijs ab Ortū, &amp; Occasu construendis.</i>                     | 377 |
|       | 2 | <i>De horarum inaequalium, seu Planetariarum in dato plano inscriptione.</i> | 384 |
|       |   | <i>Cui adnectitur mirificum artificium terminandarū horarū.</i>              | 396 |

## LIBER QVINTVS.

Ouranographia Gnomonica.

|             |   |                                                                           |     |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Præexercit. | 1 | <i>Trianguli radiosi Zodiaci descriptio.</i>                              | 409 |
|             | 2 | <i>Triangulum radiosum quantitatis dierum, &amp; noctium describitur.</i> | 411 |
|             | 3 | <i>Analemma, pro conicis sectionibus describendis, construere. ibid.</i>  | 411 |
|             | 4 | <i>Rece, siue Instrumentum Almucātara-azymuthicum describere.</i>         | 412 |
|             | 5 | <i>Almucātara, &amp; Azymutha in plano verticali describere.</i>          | 413 |

Pro-

|            |                                                                                                                                                                      |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Problema 1 | Arcus Zodiaci, siue Zodiacum gnomonicum varijs modis in dato plano inscribere.                                                                                       | 415                 |
| 2          | In plano polari.                                                                                                                                                     | 417                 |
| 3          | Zodiaci gnomonici in plano meridiano delineatio.                                                                                                                     | 420                 |
| 4          | Eiusdem in plano horizontali.                                                                                                                                        | ibid.               |
| 5          | Eiusdem in plano verticali.                                                                                                                                          | 428                 |
| 6          | In planis declinantibus.                                                                                                                                             | 431                 |
| 7          | In planis inclinantibus ad horizontem.                                                                                                                               | 432                 |
| 8          | In planis declinantibus ab horizonte.                                                                                                                                | ibid.               |
| 9          | Anacephaloticum, siue methodus vniuersalis, arcus datis planis inscribendi, quatuor Canonibus explicata.                                                             | 433                 |
| 10         | Mechanica arcuum signorum Zodiaci inscriptio, hoc est, ope nouorum instrumentorum ab Authore inuentorum.                                                             | 436                 |
| 11         | Almucantaras, & Azymutha datis planis inscribere. Ac primo quidem in plano horizontali, & verticali. In plano equinoctiali.                                          | 439<br>ibid.<br>440 |
| 12         | In plano polari.                                                                                                                                                     | 442                 |
| 13         | In plano meridiano, alijsque omnibus declinantibus à vertice planis.                                                                                                 | 443                 |
| 14         | De Positionum circulis, siue de duodecim domorum caelestium in dato plano delineatione, quinque Pragmatijs declarata.                                                | 444                 |
| 15         | In quolibet plano irregulari dato domus caelestes describere instrumento trectico.                                                                                   | 448                 |
| 16         | Horoscopia Signorum, siue, Quod signum Zodiaci quolibet momento temporis oriatur, vel occidat, vel in medio, aut imo caeli sit, umbra in quolibet plano determinare. | ibid.               |
| 17         | In plano horizontali stellarum fixarum particulares ortus describere.                                                                                                | 456                 |
| 18         | Totum systema stellarum fixarum ita in plano describere, ut ortus occasusque earundem perpetuo demonstrantur.                                                        | 457                 |

## Geographia Gnomonica.

|    |                                                                                                                                                            |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19 | Circulos ascensionum rectorum, siue circulos meridianos in plano horizontali describere.                                                                   | 458 |
| 20 | Mecographiam, siue longitudes locorum in plano horizontali ita describere; ut data qualibet hora, quota hora in toto orbe terrarum sit, cognoscere possis. | 459 |
| 21 | Spacium $\nu\delta\iota\sigma\theta\omicron\mu\omicron\nu$ , siue zonam torridam in quolibet plano dato gnomonica projectione delineare.                   | 460 |
| 22 | Parallelos arcuum diurnorum in quolibet plano dato delineare.                                                                                              | 461 |

|    |                                                                         |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23 | Climata totius orbis gnomonicè describere.                              | 465 |
| 24 | Singulos declinationis Solaris parallelos plano horizontali inscribere. | 468 |

## LIBER SEXTVS.

## Proteus Sciathericus, siue Astrolabiographia figurata;

Qua nullam figuram siue planam, siue solidam, dari posse docetur, quæ Astrolabij, aut horologij capax esse non possit.

## P A R S P R I M A.

## De Horologijs catholicis.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAPVT 1    | Definitio horologium catholicorum.                                                                                                                                                                                                                                                  | 472   |
| Problema 1 | Horolabium catholicum, idemque simplex, & multiplex; id est, in una, & eadem superficie, horolabium horizontale, & verticale vniuersale construere, quorum singulorum vsus toto orbe esse possit. 472. Vnà cum noua, & hucusque ignota ratione horaria sine prauo magnete situandi. | 474   |
| 2          | Horolabium concauum cylindraceum vniuersale.                                                                                                                                                                                                                                        | 475   |
| 3          | Alia horoscopij vniuersalis descriptio.                                                                                                                                                                                                                                             | 376   |
| 4          | Horolabia spherica vniuersalia describere.                                                                                                                                                                                                                                          | 477   |
| 5          | De portatilibus horolabijs particularibus, & primo de hemicycli horologi descriptio.                                                                                                                                                                                                | ibid. |
| CAPVT 2    | De noua omnis generis horarum, circularumque caelestium in quorumcunque corporum concauas, extremaeque superficies proijciendi ratione.                                                                                                                                             | 480   |
| Problema 6 | Scaphium construere.                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid. |
| 7          | Cubum horologum construere.                                                                                                                                                                                                                                                         | 481   |
| 8          | Irregularia quacunq; polyedra horologa.                                                                                                                                                                                                                                             | 482   |
| 9          | In cylindro concauo astrolabium delineare.                                                                                                                                                                                                                                          | 483   |
| 10         | In cono concauo eiusdem delineatio.                                                                                                                                                                                                                                                 | 489   |
| 11         | Intra cubum idem describere.                                                                                                                                                                                                                                                        | 490   |
| 12         | Intra pyramidem concauam idem prestare.                                                                                                                                                                                                                                             | 491   |
| 13         | In dato quolibet laterum prismate astrolabium describere.                                                                                                                                                                                                                           | 492   |
| 14         | Instrumento trectico in quibuscunque irregulariam corporum                                                                                                                                                                                                                          |       |

Series, & Ordo

*concauis delineare.* 493  
 15 *In columna tetracycla idem describere.* *ibid.*

PARS SECVNDA.

De Horologijs æquinoctialibus cuilibet plano inscribendis.

|          |    |                                                                                                                                                                    |              |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAPVT    | 1  | <i>De Horoscopijs catholicis, siue vniuersalibus.</i>                                                                                                              | 495          |
| Problema | 1  | <i>Horoscopium tetracyclum æquinoctiale describere.</i>                                                                                                            | <i>ibid.</i> |
|          | 2  | <i>Crucis horologæ descriptio.</i>                                                                                                                                 | 496          |
|          | 3  | <i>Nomen I E S V horologum describere.</i>                                                                                                                         | <i>ibid.</i> |
|          | 4  | <i>Aquila horologæ descriptio.</i>                                                                                                                                 | 497          |
|          | 5  | <i>De horoscopijs catholicis supra planum polare.</i>                                                                                                              | 498          |
|          | 6  | <i>Annulus horologus vniuersalis.</i>                                                                                                                              | <i>ibid.</i> |
| CAPVT    | 2  | <i>De horologijs particularibus loco mobilibus.</i>                                                                                                                | 499          |
|          | 7  | <i>Globum gnomonicum preparare, in quo Stylus totius primi mobilis doctrinam ostendat.</i>                                                                         | <i>ibid.</i> |
|          | 8  | <i>Globum alium mirabilem construere, in quo nullus quidem stylus, omnia tamen prædicta sola luce ostendantur.</i>                                                 | 502          |
|          | 9  | <i>Problema paradoxum, omnibus Mathematicis propositum.</i>                                                                                                        | 503          |
|          | 10 | <i>In quouis simulacro, instrumento tetrico astrolabia describere.</i>                                                                                             | 504          |
| CAPVT    | 3  | <i>De portatilibus pantamorphis.</i>                                                                                                                               | <i>ibid.</i> |
|          | 11 | <i>Astrolabia in forma quadrantis, cum cum Columba horologæ.</i>                                                                                                   | 505          |
|          | 12 | <i>Stylo immobili eadem in plano horizontali, in figuram datam transformare, cui: spectabiturque ibidem Testudo horologæ, apis, aranea, aliaque res, horologæ.</i> | 509          |
|          | 13 | <i>Cylindrum artificiosum describere, quod hora sit ubiuis locorum demonstrantem.</i>                                                                              | 512          |
|          | 14 | <i>Qua noua methodo Astrolabia in plano horizontali, stylo è centro normaliter erecto, describi possint.</i>                                                       | 515          |

PARS TERTIA.

Coniugium Gnomonicæ, & Physicæ, siue Gnomonica physico-astrologica.

|          |   |                                                                                                       |     |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPVT    | 1 | <i>De anno gnomonico, eiusque partibus.</i>                                                           | 518 |
| Problema | 1 | <i>Hemerologium Ecclesiasticum in forma Aquila Imperialis.</i>                                        | 519 |
| CAPVT    | 2 | <i>De varijs effectibus ☉ &amp; ☽ in Zodiaco, item de electionibus rerum gnomonicè demonstrandis.</i> | 525 |

Pro-

Totius Operis.

|          |   |                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Problema | 2 | <i>Sciathericon Iatro-georgico-æconomicum electionum opportunè instituendarum in forma Columbe volantis.</i>                                                                                     | 526 |
| CAPVT    | 3 | <i>Sciathericum Botanologicum, siue de plantarum, aliorumque medicamentorum vtriusque gnomonicè cognoscendis.</i>                                                                                | 532 |
|          | 4 | <i>Horologium physicum regiminis planetarum, in quo, quale quifque humani corporis membrum in duodecim signis constitutus respiciat, umbra Solis ostenditur.</i>                                 | 536 |
|          | 5 | <i>De Sciathericis secundorum mobilium ☽ ☿ ♀ ♂ ♃ ♄ ♅ ☿ siue de motibus Planetarum umbra Solis monstradis.</i>                                                                                    | 540 |
|          | 6 | <i>De Horoscopo ascendentium, descendentiumque signorum.</i>                                                                                                                                     | 549 |
|          | 7 | <i>De longitudine locorum, siue de Horoscopo geographico in formam arboris adaptato, quo quot a hora sit in omnibus, &amp; singulis Collegijs totius Societatis I E S V, umbra demonstratur.</i> | 552 |
|          | 8 | <i>Astroscopia, siue Sciatherica Seleniaca, vel nocturna, quibus partim per Lunæ radiantis umbram, partim per stellarum fixarum radios, hora noctis demonstratur.</i>                            | 554 |

LIBER SEPTIMVS.

Ars Anacamptica, siue Astronomia reflexa.

PARS PRIMA.

De reflexi luminis natura.

|       |   |                                                                                  |     |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPVT | 1 | <i>De mundi opificio, eiusque mira constitutione.</i>                            | 568 |
|       | 2 | <i>De radij reflexi necessitate, eiusque in mundo inferiori effectibus.</i>      | 567 |
|       | 3 | <i>De radio reflexo sub zona torrida, eiusque effectibus.</i>                    | 568 |
|       | 4 | <i>De reflexis effectibus sub zona temperata.</i>                                | 570 |
|       | 5 | <i>De reflexi radij effectibus sub zona frigida.</i>                             | 571 |
|       | 6 | <i>De reflexi luminis efficientia circa mutationem aeris, plantas, animalia.</i> | 573 |
|       | 7 | <i>De causis mutationis rerum sub diuersis climatis.</i>                         | 575 |
|       | 8 | <i>De linea actionis luminosa, eiusque termino, &amp; quantitate caloris.</i>    | 576 |
|       | 9 | <i>De multiplicatione caloris luminis reflexi cum incidente mixtura.</i>         | 578 |

++++

PARS

Series, & Ordo

PARS SECVNDA.

Theorematica.

Qua reflexi radij natura per decem Problemata ostenditur.

PARS TERTIA.

De Speculorum cylindracei, & conici in reflexionis negotio mira vi.

PARS QVARTA.

Problematica.

Qua in prædictis inuenta ad praxim reducuntur.

- CAPVT 1 De horographia reflexa in planis regularibus. 606  
 2 Astrolabiographia Anacamptica, in quibuscunque datis corporibus restituenda. 611  
 3 Astrolabiographia Anacamptica in portatilibus corporibus insituenda. 633

PARS QVINTA.

De reflexione lineari, siue de astrolabijs anacampticis, quibus ipsa luce reflexa integræ primi mobilis lineæ, circuli que in quoduis planum datum, noua hucusque, & insolita ratione projiciuntur.



LIBER

Totius Operis.

LIBER OCTAVVS.

Ars Anaclastica, siue Astronomia refracta.

Qua Astronomiæ Gnomoniæ arcana per lineas, circulosque vmbrales, Anaclastica descriptione, id est refractionum noua scientia, in quibuscunque interiorum valorum superficies projectos curiosè docentur.

PARS PRIMA.

Physiologica naturam, effectus, necessitatem, vtilitatem, mediorumque varietatem explicans.

- CAPVT 1 De Etymo, & natura refractionis. 652  
 2 De diuersitate mediorum refractionis capacium. 653

Protheorumena.

De Natura refractionis, & radij refracti.

- Quibus per decem Theoremata, quicquid ad essentiam refractionum pertinet, exactè demonstratur. 658  
 CAPVT 2 De computo Tabularum Anaclasticarum. 670  
 Problema 1 Tabulas refractionum computare. 672  
 Canones calculi quatuor. 673  
 Tabula I. Anaclastica ex aere in aquam ad singulos gradus incidentiæ ad radium perpendicularem, una cum differentijs inter duas quaslibet refractiones proximas. 675  
 Tabula II. Anaclastica singulas refractionum calculandarum operationes continens. 679  
 Tabula III. Anaclastica ex aere in aquam. 680  
 2 Instrumentum Mesopicum anaclasticum construere. 681  
 Tabula Anaclastica radiorum incidentium in Vinum, Oleum, Vitrum, ex obseruatione Authoris. 682  
 De Refractionibus Atmosphære. 683. Una cum Tabula refractionis syderum. 684  
 3 Quadrantem anaclasticum in negotio refractionum vtiliter construere. 685  
 De Retis horizontalis anaclastici structura. 686  
 4 Astrolabium anaclasticum horizontale construere. ibid.

++++ 2 5 Astro-

|   |                                                       |     |
|---|-------------------------------------------------------|-----|
| 8 | <i>Astrolabium verticale anaclasticum construere.</i> | 687 |
|   | <i>Retis anaclastici verticalis fabrica.</i>          | 688 |

## P A R S S E C V N D A .

|            |                                                                                                                                                                                      |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAPVT 1    | <i>Gnomonica Anaclastica in quibuscunque corporum interioribus superficiebus, partim geometrica, partim arithmetica ratione exercenda.</i>                                           | 689   |
| Problema 6 | <i>Horologium Achaz, siue in hemicyclo, seu hemisphario concauo Astrolabium construere. Quod nihil monstret, nisi ubi liquore prius repletum fuerit, sex Problematibus traditum.</i> | ibid. |
| 7          | <i>Cylindrus concauus anaclasticus horologus.</i>                                                                                                                                    | 695   |
| 8          | <i>Conus concauus anaclasticus horologus.</i>                                                                                                                                        | 696   |
| 9          | <i>In vase tetraedro, seu pyramidali anaclastica descriptio. ibid.</i>                                                                                                               |       |
| 10         | <i>Columna triangulari, seu prismati, aut etiam paralleloipedo, cuius denique quocunque laterum columna perficienda caelestium circulorum anaclastica inscriptio.</i>                | 697   |
| CAPVT 3    | <i>De horologijs anaclasticis quibuscunque corporum concauis superficiebus facillima methodo per obseruationem inscribendis.</i>                                                     | 698   |
| 11         | <i>Dato horario anaclastico, complura alia in quantumuis irregularibus planis, dicto citius delineare.</i>                                                                           | ibid. |
| 12         | <i>Apice gnomonis extra aquam posito, ad eum horologium sciathericum infra aquam describere.</i>                                                                                     | 699   |
| CAPVT 4    | <i>De horoscopijs Anacampico-anaclasticis, siue reflexo-refractis.</i>                                                                                                               | 701   |
| 13         | <i>Horoscopium anacampico-anaclasticum construere.</i>                                                                                                                               | ibid. |
| 14         | <i>Eiusdem alia constructio paradoxa.</i>                                                                                                                                            | ibid. |
| 15         | <i>Horoscopium directo-reflexo-refractum construere.</i>                                                                                                                             | 702   |



## L I B E R N O N V S .

Cosmometria Gnomonica, siue de mundanorum partium situ, magnitudine, quantitate, altitudine, luc-umbri ratiocinio inuestiganda.

## P A R S P R I M A .

Geometria Sciatherica, qua noua methodo datarum rerum distantia, longitudines, latitudines, profunditates, umbra lucis directa, reflexa, refracta, indagantur.

|            |                                                                                                                               |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prolusio 1 | <i>De umbra in Cosmometria Gnomonica utilitate.</i>                                                                           | 704   |
| 2          | <i>De umbra recta, &amp; uersa.</i>                                                                                           | 705   |
| 3          | <i>De umbra Solis, &amp; Luna paradoxum.</i>                                                                                  | ibid. |
| 4          | <i>Quantas umbrarum differentias semidiameter Solis constituat.</i>                                                           | 706   |
| 5          | <i>Radios ab uno, uel diuersis Solis partibus, ad diuersas terre partes productos, esse parallelos.</i>                       | 707   |
| CAPVT 1    | <i>De quantitate rerum accessarum, luc-umbri ratiocinio inuestiganda.</i>                                                     | 708   |
| Problema 1 | <i>Sciathericum geometricum construere, altitudines rerum omnium umbra styli in 12. partes diuisi, demonstrans. ibid.</i>     |       |
|            | <i>Aliud instrumentum photosciathericum.</i>                                                                                  | 710   |
| CAPVT 2    | <i>Geometria Catoptrica, siue de umbra reflexa, &amp; refracta.</i>                                                           | 712   |
| Problema 2 | <i>Altitudines, distantias, profunditates rerum, Speculo metiri per umbram rerum in speculis ad oculos mensuris reflexam.</i> | 713   |
|            | <i>Instrumentum Pantometrico-catoptricum construere.</i>                                                                      | ibid. |
| 3          | <i>Per lucem Solis reflexam quantitates rerum inuenire.</i>                                                                   | 716   |
| 4          | <i>Per radium anaclasticum res sub aqua metiri.</i>                                                                           | 718   |

## P A R S S E C V N D A .

Cosmometria Gnomonica, siue de quantitate mundanorum corporum, eorumque a terra distantia per Lucem & Vmbram inuestiganda.

|            |                                                                                                                                            |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Praelusio. | <i>De difficultate Operis.</i>                                                                                                             | 719 |
| Problema 1 | <i>Quantitatem terrestri globi sola umbra, uel luce reperire.</i>                                                                          | 720 |
| 2          | <i>Magnitudinem Atmosphaerae, id est, maximam aeris, quae a Sole illuminari potest, a terra distantiam inuestigare per lucem reflexam.</i> | 723 |
| 3          | <i>Qua</i>                                                                                                                                 |     |

Series, & Ordo

|             |                                                                                                                                                                     |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3           | Qua ratione nubes, aut trabes, aliaque meteororum signa in aere mensurari queant.                                                                                   | 725   |
| 4           | Trabis, nocturno potissimum tempore, caelo subter se altitudinem metiri.                                                                                            | 726   |
| 5           | Altitudines montium per lucumbrem obseruationem inuestigare.                                                                                                        | 727   |
| 6           | Quantam partem terreni globi Sol illuminare possit.                                                                                                                 | 729   |
| 7           | Crassitiem caelorum, distantiamque à terra, secundum doctrinam Ptolemaei expendere.                                                                                 | 731   |
| 8           | Per parallaxin $\Delta$ à terra distantiam inuenire.                                                                                                                | 734   |
| 9           | Latitudinem, siue crassitiem umbræ terræ inuenire.                                                                                                                  | 735   |
| 10          | Diametrum apparentem Solis, & Luna, & ex his denique magnitudinem corporum, & utriusque umbram inuenire.                                                            | 737   |
| 11          | Solis à terra distantiam in semidiametris inuenire.                                                                                                                 | 739   |
| 12          | Quanta diameter Solis sit, in semidiametro terræ inuenire.                                                                                                          | 740   |
| 13          | Alia ratio per specierum Solis, & Luna in obscurum traiectionem.                                                                                                    | 741   |
|             | Artificium verum eclipsion Luna-solarium, summa facilitate mensurandarum.                                                                                           | 742   |
| 14          | Instrumentum Cosmometricum, quo caelestium corporum distantia, magnitudines, umbræ, latitudines, adinuicem operum ad unum determinantur, & propè verum mensurantur. | 750   |
| Canon 1     | Solis, & Terra distantiam inuenire.                                                                                                                                 | 751   |
| 2           | Data diametro Solis, & distantia Solis à terra, inuenire diametrum Solis in semidiametris terræ.                                                                    | 752   |
| 3           | Distantiam Luna à terra per instrumentum Uranometricum inuenire.                                                                                                    | ibid. |
| 4           | Altitudinis Solis à terra per prædictum instrumentum inuestigatio.                                                                                                  | 754   |
| Problema 15 | Proportiones diametrorum omnium Planetarum ad Solem, & ex his demum umbrarum longitudes describere.                                                                 | 754   |
| Canon 1     | Quantitas diametri Solis, & terræ, eiusque umbræ.                                                                                                                   | ibid. |
| 2           | Distantiam $\zeta$ à centro terræ, eiusque magnitudinem, & umbram inuestigare.                                                                                      | 755   |
| 3           | Distantiam $\eta$ à terra, & Sole, eius umbram, & magnitudinem, aliasque proportiones per umbram, & lucem inuenire.                                                 | 755   |
| 4           | Umbram, & magnitudinem $\theta$ inuestigare.                                                                                                                        | 75P   |
| 5           | Umbram, & magnitudinem $\rho$ inuestigare per ipsam Iouis umbram.                                                                                                   | 758   |
| 6           | Um-                                                                                                                                                                 |       |

Totius Operis.

|             |                                                                                                                 |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6           | Umbram, & magnitudinem $\delta$ distantiamque eius à terra inuestigare.                                         | 760   |
| 7           | Stellarum fixarum à terra distantias per umbram inuestigare.                                                    | 761   |
| 8           | Cometarum à terra altitudines, & magnitudines inuestigare.                                                      | 762   |
|             | Pinax Ouranometricus proportiones corporum caelestium adinuicem exhibens.                                       | 764   |
|             | Organum Sciatherico-cosmometricum.                                                                              | ibid. |
| Machinam. 1 | Data proportione Solis, & reliquorum planetarum, & à cum distantijs, longitudinum umbram mechanicè determinare. | ibid. |
| 2           | Adaptare corpora planetarum ad corpus Solis, & terræ, iuxta proportiones in pinace exhibitas.                   | 765   |
| 3           | Sphæram Cosmometricam construere.                                                                               | 766   |

LIBER DECIMVS.

Magia Lucis & Umbræ.

In qua de reconditionibus Lucis & Umbræ effectibus ad varios vsus applicatis, agitur.

Præfatio. De Magia, & scopo huius Libri.

769

PARS PRIMA.

Magia Horographica, sine de horologijs prodigijs.

|            |                                                                                                       |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAPVT 1    | De arcana horographia, radio partim directo, partim reflexo refractoue instituenda.                   | 771  |
| Problema 1 | Paralceusticum. Ouum horodicticum describere.                                                         | 772  |
| 2          | Umbram figuræ Mortis horodictam describere.                                                           | 773  |
| 3          | Septem Planetarum figuras horodictas describere.                                                      | 774  |
| 4          | Anacampticum horologium, arcana artificio conscriptum.                                                | 775  |
| 5          | Statuam Anacampticam construere, quæ annulo suo in obscuro totius primi mobilis doctrinam demonstret. | 777. |
| 6          | Horologium sine stylo, & umbræ anacampticum sub forma globi Imperialis.                               | 778  |
| 7          | Horologium phantasticum.                                                                              | 779  |
| 8          | Hor-                                                                                                  |      |



|       |    |                                                                                                                |       |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | 8  | <i>Horologium in medutallo crystalli descriptum.</i>                                                           | 781   |
|       | 9  | <i>Aliud horologium anemoscopum.</i>                                                                           | 783   |
| CAPVT | 2  | <i>De Sciathericis prodigijs Anaclasticis.</i>                                                                 | 784   |
|       | 10 | <i>Horologium anaclasticum in vitrea sphaera ad natura exemplar exhibere.</i>                                  | ibid. |
|       | 11 | <i>Statua sub aqua horologa.</i>                                                                               | 785   |
|       | 12 | <i>Syren cum speculo horas sub aqua reflexo-refractè demonstrans.</i>                                          | ibid. |
| CAPVT | 3  | <i>Horoscopium mirabile confuso-ordinatum.</i>                                                                 | 786   |
|       | 3  | <i>De horologijs Catoptricis.</i>                                                                              | 787   |
|       | 14 | <i>Horologium magicè in speculo exhibere.</i>                                                                  | ibid. |
|       | 15 | <i>Alius modus arcanissimus, &amp; impenetrabilis.</i>                                                         | ibid. |
|       | 16 | <i>Aliud horologium Catoptricum.</i>                                                                           | 788   |
|       | 17 | <i>Aeolus supra columnam sciathericam, horologus simul, &amp; anemoscopus.</i>                                 | 789   |
| CAPVT | 4  | <i>De Horologijs Heliocausticis.</i>                                                                           | 790   |
|       | 18 | <i>Horologium heliocausticum, siue Solare-ustorium construere.</i>                                             | ibid. |
| CAPVT | 5  | <i>De Horologijs Magneticis.</i>                                                                               | 792   |
|       | 19 | <i>Totius primi mobilis doctrinam unica acu magnetica demonstrare.</i>                                         | ibid. |
|       | 20 | <i>Idem in plano verticali praestare.</i>                                                                      | 793   |
|       | 21 | <i>Machinamentum magneticum regiminis septem Planetarum.</i>                                                   | 794   |
|       | 22 | <i>Horologium magneticum, in quo Lacertula sursum &amp; deorsum cursitans, motu naturali horas demonstrat.</i> | 795   |
|       | 23 | <i>Vt Columba per aerem volitans horas demonstrat.</i>                                                         | 796   |
|       | 24 | <i>De horologijs Sympathicis, Botanicis, Zoologis.</i>                                                         | 797   |
|       | 25 | <i>De horologijs rotatilibus.</i>                                                                              | 798   |

## PARS SECVNDA.

Magia Parastatica, siue de representationibus rerum prodigijs;  
per Lucem & Vmbra.

|            |   |                                                                                                                      |       |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAPVT      | 1 | <i>De Representationibus aeris.</i>                                                                                  | 800   |
| Parastasis | 1 | <i>Natura, siue de Morgana Reginorum in Fretis Mamertini.</i>                                                        | ibid. |
|            | 2 | <i>Artificiosa spectrorum aereorum exhibitio.</i>                                                                    | 804   |
| CAPVT      | 2 | <i>De picturis Naturae industria, qua in fetibus humanis, animalibusque, plantis, lapidibus, nihil non efformat.</i> | 805   |
|            |   | <i>Natura picturis in lapidibus, plantisque miracula.</i>                                                            | 806   |

CA-

|             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |       |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAPVT       | 3               | <i>De representatione rerum fortuita &amp; casuali, &amp; quomodo ea arte rebus induci possit?</i>                                             | 807                                                                                                           |       |
| Parastasis  | 1               | <i>Optica. Rupes hortosque in quamvis figuram transformare.</i>                                                                                | 809                                                                                                           |       |
|             | 2               | <i>Scenographica. Vi imago una reddatur quintuplex.</i>                                                                                        | 811                                                                                                           |       |
| CAPVT       | 4               | <i>Parastasis per specierum in obscurum locum immisionem.</i>                                                                                  | ibid.                                                                                                         |       |
|             | 3               | <i>Luc-umbris, qua in obscuro varia rerum simulacra exhibentur.</i>                                                                            | ibid.                                                                                                         |       |
|             | 4               | <i>Scenica, siue de Scenarum apparatu, &amp; luminibus arte confectis.</i>                                                                     | 813                                                                                                           |       |
|             | 5               | <i>De varijs colorum artificijs, ac prodigijs mixtura.</i>                                                                                     | 814                                                                                                           |       |
|             |                 | <i>Charta Turcico more pingenda ratio.</i>                                                                                                     | ibid.                                                                                                         |       |
|             |                 | <i>Alius modus priori multo arcanior.</i>                                                                                                      | 815                                                                                                           |       |
| CAPVT       | 5               | <i>De Parastasi Anaclastica, siue de rerum per radios refractos in aquis, &amp; vitreis corporibus exhibitione.</i>                            | 816                                                                                                           |       |
|             | 6               | <i>Qua sub aquis, per sphaeras vitreas, vitra polygona, admiranda rerum spectacula exhibentur.</i>                                             | ibid.                                                                                                         |       |
| Experiment. | 1               | <i>Imaginem ea arte disponere, ut ex eodem puncto visa, paulatim in nihilum abeat, &amp; ex nihilo iterum in perfectam imaginem crescat.</i>   | ibid.                                                                                                         |       |
|             | 2               | <i>Vt imagines de repente compareant, &amp; dispareant.</i>                                                                                    | 817                                                                                                           |       |
|             | 3               | <i>Per vitreas sphaeras, siue vitreas phialas, rerum species exhibere.</i>                                                                     | ibid.                                                                                                         |       |
|             | 4               | <i>Per prismata vitrea, mira spectacula exhibere.</i>                                                                                          | 818                                                                                                           |       |
|             | 5               | <i>Vt cubiculum omni peripetasmatu genere ornatu videas.</i>                                                                                   | 819                                                                                                           |       |
|             |                 | <i>Diacrisis Authoris. Vtrum iuxta Anaxilaum, Albertum, &amp; Portam, domus plena serpentibus, ceterisque animalibus representari possint.</i> | ibid.                                                                                                         |       |
|             | 6               | <i>Cubiculum plenum figuris vararum, fructuum, animalium, serpentium exhibere.</i>                                                             | 822                                                                                                           |       |
| CAPVT       | 7               | <i>De Pyroparastasi, siue de Igneorum spectaculorum exhibitione.</i>                                                                           | ibid.                                                                                                         |       |
| Experiment. | 1               | <i>De attritu ignis.</i>                                                                                                                       | 823                                                                                                           |       |
|             |                 | <i>Vtrum lapis fieri possit, qui solo sputo flammam excitet, &amp; infra aquam ardeat?</i>                                                     | ibid.                                                                                                         |       |
|             |                 | <i>Vtrum ignis dari possit inextinguibilis?</i>                                                                                                | 824                                                                                                           |       |
| Experimenta | Pyroparastatica | 1                                                                                                                                              | <i>Lumen infra aquam portare.</i>                                                                             | ibid. |
|             |                 | 2                                                                                                                                              | <i>Filum lineum, &amp; charta incombustibilis.</i>                                                            | 825   |
|             |                 | 3                                                                                                                                              | <i>De Camphora mira virtute.</i>                                                                              | ibid. |
|             |                 | 4                                                                                                                                              | <i>In aere Draconem volantem exhibere. 826. Vbi una quoque de Aquila Regiomontani, &amp; Columba Archita.</i> | 827   |

+++++

5. Plu-

- 5 *Pluuiam igneam, siue fontem igneum exhibere.* 828  
**CAPVT** 8 *De Dioptrica, siue de vitris Pantoscopis, Telescopijs, eorumque varia forma, & effectibus.* 829. *Ibidem de Materia, & forma vitri, de Lentibus, eorumque collocatione, & effectibus.* *ibid.*  
**Pragmatia** 1 *Quomodo species rerum in obscurum locum transmissarum in erectum situm cogi possint?* 833  
 2 *De mira rerum naturalium constitutione per Smicroscopium inuestiganda.* 834  
 3 *De Telescopijs, eorumque effectibus.* 836  
**Parastasis** 1 *Montes, flumina, maria, immensas camporum planities, voragine immensas, lacus, sylvas, & in ijs animalia omnis generis tubo optico noua arte ita representare, ut extra id nihil prorsus visarum rerum compareat.* 837  
 2 *Qua ratione cum dicta in aere, tum irides, nubes, Sol, Luna, Stelle representari possint?* 839

## P A R S T E R T I A

Magia Catoptrica, siue de prodigiosa rerum exhibitione per specula.

- CAPVT** 1 *De Speculorum confectione.* 841  
 2 *De varijs speculorum affectionibus, per sex propositiones agitur.* 847  
 3 *De Speculis sphaericis conuexis.* 852  
 4 *De Speculis sphaericis conuexis, eorumque prodigiosis operationibus, per quatuor propositiones agitur.* 853  
 5 *De Speculis cylindraceutis, eorumque affectionibus.* 857  
 6 *De Conicis speculis, eorumque proprietatibus.* 859  
 7 *De Speculis parabolico, hyperbolico, elliptico, eorumque affectionibus.* 860  
*De descriptione forma parabolica, hyperbolica, elliptica, per octo Problemata.* *ibid.*  
**CAPVT** 1 *De Speculis causticis, siue vstorijs, eorumque effectibus, & usu.* 874  
 § 1 *Virum Archimedes, & Proculus in tantam, quantam Authores describunt, distantiam naues accenderint? ibid. Et utrum speculum causticum fieri possit in infinitam usiuum? ibid.*  
*De Speculis causticis, planis, & sphaericis.* 884  
**Problema** 1 *Alembicum ea arte construere, ut sola vstoriorum speculorum ope maiorem in distillando efficaciam obtineat, quam ignis validus.* 886

2. Ma-

- 2 *Machinam construere, quae ad datam quamlibet horam ignem in ara suscitet, candelas accendat, peractoque sacrificio fontem efficiat, qui ignem succensum extinguat.* *ibid.*  
 3 *Lucernam artificiosam construere, quae in remota distantia scripta legenda exhibeat.* 887  
 4 *Machinam ex speculis planis construere, ad centum pedes, & ultra vrentem.* *ibid.*  
 5 *Statuam construere, quae ad ortum Solis, & singulis consequentibus horis Sole percussa prodigiosum sonum excitet.* 889  
**CAPVT** 2 *De Speculi plani polydixi, specierumque multiplicatione.* 890  
**Parastasis** 1 *Specula plana multiplicatiua sunt specierum cuius rei.* *ibid.*  
 2 *Duobus speculis exhibere draconem quotlibet capitum.* 891  
*Candelabrum Polylychnium: Statuam Polycephalam.* *ibid.*  
 3 *De miris spectaculis speculorum in prisma isopleurum dispositis.* 892  
 4 *Theatrum Catoptricum Polydiecticum construere, in quo quaecunque volueris ad exemplar naturae exhibeantur.* *ibid.*  
**CAPVT** 3 *De egressu Idoli extra speculum, siue de representatione rerum in aere extra speculum.* 896  
**Technasma** 1 *Catoptricum. Obiectu idoli in medio aeris representare.* 898  
 2 *In speculo cylindraceuto species rerum in aere exhibere.* 899  
 3 *In aere quasuis figuras representare.* 900  
 4 *Magnetis ope una cum speculo rerum formae in aere exhibentur.* *ibid.*  
**CAPVT** 4 *De Metamorphosi, seu transformatione Catoptrica.* 901  
**Metamorphosis** 1 *Speculi ope hominem in quamcunque figuram transformare.* *ibid.*  
 2 *Varia rerum spectacula in medijs tenebris exhibere.* 902  
 3 *Transformatio per specula conuexa cylindraceuta, & conica.* 903  
 4 *Faciem in varios colores transmutare.* 904  
 5 *Faciem hominis mille modis transformare.* 905  
 6 *Monstrosa facies hominis in varia animalia transmutatur.* *ibid.*  
 7 *Duobus speculis planis faciem hominis variam ostendere.* *ibid.*  
 8 *Per specula concauo-conuexa idem representare.* 906  
 9 *Naturalibus rebus hominem transmutare.* *ibid.*



# C R Y P T O L O G I A N O V A.

Qua Catoptrica arte duo amici non tantum occultos animi conceptus  
absentes nullo negotio sibi manifestare; sed & absentes seipfos  
noua quadam Catoptrica replicatione amicis sistere  
possunt; innumeraque alia exhibere.

## P A R S P R I M A.

De Projectione figurarum in quamlibet distantiam per Solem.

- CAPVT 1 *Vtrum in Lunari disco aliquid legendum exhiberi possit.* 908  
2 *De Speculis ad Steganographiam Catoptricam necessarijs.* 910  
3 *De distantia, quæ ad proyiciendas formas rerum requiritur.* 911  
4 *De praxi Steganographica.* 912  
5 *De projectione umbrarum, siue figurarum qualiumcunque.* 913  
6 *De Umbris, seu imaginibus coloratis.* *ibid.*  
7 *De Scenica, seu historica representatione rerum.* 914  
8 *Horologium Steganographicum describere.* *ibid.*

## P A R S S E C V N D A.

De Steganographia Catoptrica per lucem candelæ.

Epilogus, siue Metaphysica Lucis & Vmbræ.

- Epichirema 1 *Lux Tri-una.* 917  
2 *De descensu aterni Luminis.* 919  
3 *Lux aterna quomodo in creaturis sit, & quomodo creatura lu-  
men in lumine cognoscant. Effectus Solis & Luna, omnis  
creata sapientia symbola sunt.* 922  
4 *Omnis cognitio lux est, à luce primigenia insuita procedens.* 923  
5 *Deus fons lucis est, & Angelus primæ lucis speculum; secun-  
dum speculum, homo.* 924  
6 *De lumine intellectuæli.* 925  
7 *Lux Rationalis, & Phantastica.* 927  
8 *Quomodo lumine creatura Creatori perfectè uniatur.* 929

Sphæra Mystica, siue Tropologia Lucis & Vmbræ.

Regulæ Tropologicae.

- Quibus Anima ex umbra in lumen emergens, perfectè aeterno  
Lumini, à quo profuxit, coniungatur.* 932  
Regula 1 *Mundi sensibilis contemplatio.* *ibid.*  
2 *Lucis proprietates ad imitandum proponenda.* 933

Finis Seriei, & Ordinis totius Operis.



IN ARTEM MAGNAM LVCIS ET VMBRAE  
R. P. ATHANASII KIRCHERI

E SOCIETATE IESV,  
Philosophi, & Mathematici nobilissimi.

O D E.

**Q**uicquid per omnē *Delius* ambitū  
Cæliq̄, terræq̄, & maris, & Stygis,  
Fulgente configat sagitta,  
Purpureum iaculatus ignem;  
Et, quæ beatissimis exultat arcibus,  
Regina noctis, quantum *Hecate* triceps  
Cum plebe stellarum, soporis  
Possit equis, piceoq̄, curru;  
Tum quid Lycæum, doctaq̄, Pergama,  
Vel Tuscanus augur, vel Babylonius,  
Colchiuē messorum veneni  
Elicitant facibus gemellis;  
Mirè diferti prodigus eloquij  
KIRCHERĒ narras, atquē scientiam  
Expertus, incendis per orbem  
*Siderea* fabricator *Artis*.  
Non Archimedi notior ætheris  
CrySTALLUS olim: nec radio globum  
Terræ Phalantæus redemptor  
Scripserat imperiofiore.

Posthæc nefas depromere fabulam  
Gibbi sub axes Amphitryonidis;  
Comparq̄, sublatis columna  
Risibus excipietur Afer.  
Tu quippè celsæ pegmata curiæ  
Fers irretorto vertice sanius,  
Rodente *successoris* ambos  
Invidia Telamonas atra.  
Fraterna summi regna etiam Iouis,  
Ac Magna mater, quæ patet vndiquè,  
Carcerq̄, ventorum infremētum, &  
Præcipites Phaëtonis oræ,  
Quandoquē mandas, se tibi cardine  
Toro recludunt. Dædala conscium  
Natura te confessâ rerum,  
Exiguum penetrare culpâ.  
Ergo fauenti luceat alite  
ARS MAGNA mûdo, nec speciē pigra  
Affectet *Vmbra*, ni magistris  
Instituat populos tenebris.

IACOBVS GIBBESIVS ANGLVVS,

MED: DOCT.



ATHA-

ATHANASIO KIRCHERO

VIRO CELEBERRIMO

Magni de Natura Lucis & Vmbrae operis  
Auctori.

EPIGRAMMA.

**A**tingis Solem propius? dum Lucis & Vmbrae  
Naturam spondes hoc retulisse Libro.  
Vix licet hoc superis: est haud mortale\* quod audes?  
Audet enim Phaëton, & sua fata videt.  
Desine mirari! KIRCHERVS conscius artis  
Non est mortalis: dicitur ΑΘΑΝΑΤΟΣ.  
Vrania radijs Solem KIRCHERIVS Heros  
Attingit: hinc vivet nescia fama mori.

\* Ouid. Me-  
tam. l. 2. fab. 1.


Aliud in idem.

**A**lta petis referens Naturam Lucis & Vmbrae:  
Altius ipsa Aquila, sed tua fama volat.

Aliud in idem.

**D**um Sol nocte, dieque micat te Authore; resulget  
Nominis ipsa tui clarior Vmbra die.

ANT. FRANC. PAYENVS I. V. DOCTOR,  
& in Academia Auenionen. Regens, & Prof. Publ.



CARO-

CAROLVS SANGRIVS SOCIETATIS IESV  
Vicarius Generalis.

Cum Opus, cui titulus Ars Magna Lucis & Vmbræ, P. Athanasij Kircheri nostræ Societatis Sacerdotis, tres eiusdem Societatis Theologi recognouerint, & in lucem edi posse probauerint, facultatem concedimus, vt typis mandetur si ijs, ad quos pertinet videbitur. Dat. Romæ 18. Decembris 1644.

Carolus Sangrius, &c.

Imprimatur, Si videbitur Reuerendiss. P. Mag. Sacri Palatij Apostolici.

A. Sacratu Episcopus Comacl. Vicegerens.

Adm. R. P. Athanasij Kircheri è Societate Iesu, librum, in quo Ars verè Magna Lucis & Vmbræ continetur, recensui, ac diligenter examinaui, vt Reuerendissimi Patris Sacri Palatij Apostolici Magistri iussa implem; Et, quod attinet ad sanctam Fidem Catholicam, ad bonos mores, ad communem vsum, tantum abest, vt quidquam censura, expunctione, vel correctione dignum in illo animaduertim, quin potius nihil me reperisse fatear, quod summam, & solitam pietatem, doctrinam, eruditionem, ingenij subtilitatem Authoris non sit perpetuò commendatum: nam recondita hucusque, ac penitus ignota ex Naturæ Theauris, primus, prompsit, ac detexit, atque ita eleganter enucleauit, vt hac doctrina lucidissima, nihil aliud fategerit, nisi quæ, & quanta pedibus hominum Deus Optimus Maximus subiecerit, miris, ac iucundissimis experimentis, quamque in tota Natura Magna sit Ars Lucis & Vmbræ, demonstrare. Huiusmodi fructus, ac emolumenta ex libri vulgatione, in publicum emanatura, existimo. Dic 29. Decembris 1644.

Io. Bapt. Rinaldus I. V. D. Pisauenfis.


REVERENDISSIME PATER.

Liber hic P. Athanasij Kircheri è Societate IESV, & titulo Artis Magnæ, & Authoris in tractandis pro more raris argumentis ingeniosæ felicitati responderet. Ita Lucis & Vmbræ reconditos hæcenus in vniuersa Natura effectus, ad vsum humanos pandit, vt in meridie sine vmbra exsplendeant, quæ densis hucusque tenebris sepulta, vel prima artis tentamenta fugiebant; Debebit ei hoc sui rudimentum Natura; debebunt & qui rerum arcana scrutantur, docilem eruditionem. Quare, si Reuerendissima P. T. cuius autoritate eum censui, videatur; dignè Iuri publico dabitur, & non minori cum voluptate, quam utilitate legentium in luce Nomen suum tuebitur. Romæ 21. Decembris 1644.

Melchior Inchofer S. G. I. C.

Imprimatur. Fr. Hyacinthus Serronus Magister, & Socius Reuerendiss. P. Fr. Michaelis Mazarini Sac. Pal. Apost. Magist. Ord. Præd.

ARTIS



ARTIS MAGNÆ  
LVCIS ET VMBRAE

Liber Primus.

PHYSIOLOGIA  
LVCIS ET VMBRÆ;

In qua vniuersa Lucis & Vmbræ natura, essentia, admirandique effectus, & opera vtriusque apprimè delineantur.

PRAEFATIO.



ANTAE semper lucidissima illa Lucis essentia apud acutissimos quosque Philosophos fuit obscuritatis, vt coniectis in eius inaccessible fulgorem oculis, mox illisa oculorum acie vnumquemque instar cecutientes in medio luminis constituti, omni se lumine destitutos deprehenderint. Plato, Marsilio teste, certè non semel caliginosum huiusmodi Lucis fulgorem expertus videtur: cum eum nunc lucidas tenebras, mirabiliumque omnium in sensibilibus rerum ambitu maximè admirandam essentiam, occultum Vniuersi symbolum, quo summa imis, ima medijs, media denique imis, summisq. mira quadam ratione connectuntur, appellat. Plotinus abditum mundani spiritus vehiculum, Diuinitatis simiam, risum cæli, gaudiumque; actum ad hac quendam, ac conspicuam diuina intelligentia imaginem, nulla sublimitate inuestigabilem; vim denique quamdam caelestem omnia in omnibus operantem denominat; nec incongruè. Quid enim aliud Lux à Deo, nisi immensa bonitatis suæ, veritatisq. exuberantia? Quid in Angelis, nisi intelligentia quadam, vt cum Dionysio loquar, certitudo à Deo manans, profusumque voluntatis gaudium? Quid in caelestibus illa aliud est, nisi vitæ copia ab Angelis facta, virtutisq. explicatio, quam Platonicis risum caelorum


A nomi-

nominant? Quid in igne, nisi vitalis quidam vigor à superioribus agentibus insitus, & efficax propagatio? In ijs denique, quæ sensu carent, nil nisi cælestis quedam diffusa gratia, ubique diuina bonitatis, veritatisq. typus, & imago. Videmus enim, simul ac vis illa cælestis radijs suis ad nos per cristallina illa cælorum spacia, veluti per vitreos quosdam oculos descenderit, omnibus rebus suam dari perfectionem, sensum, vitam, motum; adeo quidem, ut ipsæ plantule adhuc in seminum matrice sepultæ, ridens lucis aspectu veluti prosilientes, gaudioq. dilatata, mox in folia, flores, fructus protuberent. Animalia cuncta cæli gaudio, lucis inquam fecundo radio, veluti risu quodam incitata, spirituq. dilatata, in voluptates fecundo motu stimulentur. Mineralia ipsa ab omni lucis consortio ceteroquin remotissima, inuisibili quadam radiorum virtute attracta turgescere, & dilatatione sua in obuios veluti amplexus ruere (verbo) omnia cum cælestibus spheris choreas agere videantur. Dum hæc sese per omnia fundit, omnia permeat, omnia permeando format, & efficit, omnia viuificat; sustinet, congregat, unit, disgregat omnia. Omnia, quæ vel sunt, vel illuminantur, vel calescunt, vel viuunt, vel gignuntur, vel nutriuntur, vel auferuntur, vel perficiuntur, vel mouentur; ad se conuertit: Conuersa purgat; omnia perficit, omnia renouat, omnia conseruat, & ne in nihilum abeant, efficit: Omnium rerum & numerus est, & mensura, Magnæ cælestis omnia ad se trahens. Lux rerum omnium purissima; alterari, misceri, domari nescia; nullius indiga; diues omnium, attrahens omnia, ab omnibus attracta; cælorum ornamentum, corporum gloria, mundi decor, & pulchritudo, gaudium, risusq. omnium, mundi denique totius consistentia; qua nihil aspectu iucundius, nil animo letius, nil vite commodius, nil cognitu præstantius, nil ad agendum utilius; sine qua inertia sibi ipsis omnia, incognita, tenebris sepulta æternis squalescerent. Hanc igitur Lucem modò explicare conabimur: ad cuius admirabilem indolem, & absconditam vim motus, effectusq. prorsus & dædæus, Animus stupet, obrutusq. hæret defixus in vno, inscius quo primo seuertat, quid annuat, quid renuat. In tanto tamen mundi miraculo, rerumq. ignorantia maxima, audendum est aliquid, & quid nostri valeant hūmeri, quid ferre recusent, periclitandum; ut quam admiranda eius ope fieri possint, mundo innotescat. Cum verò scopus noster sit, hanc materiam in artis normam supradictæ redigere; Artis quoque seriem, & requisita principia hanc habere necesse est. A definitionibus igitur, & pronuntiatis, siue axiomatibus exordium ducamus.

## DEFINITIONES.

- I. **A**rs Lucis & Vmbræ, facultas est, qua luminis & vmbre beneficio mira in natura rerum præstamus, atque exhibemus.
- II. Ars Scioognomica est; qua de locis alicuius vmbrosi salubritate, aut insalubritate ex vmbra rei locum inumbrantis iudicamus.
- III. Ars Chromocritica est, qua ex coloris extrinseci cuiuslibet rei apparentia de intrinseca eiusdem indole iudicamus. Phonocritice verò, qua ex voce sonoq. de latente alicuius rei indole practicum iudicium formamus.
- IV. Corpus luminosum id esse dicimus, à quo vtrumque lumen profunditur.
- V. Diaphanum corpus est lumini peruium, vmbre tamen & lucis æquè receptiuum.
- VI. Opacum corpus est ἀδιόπτου, hoc est lumini imperuium.
- VII. Lux qualitas est fulgenti corpori congenita, vti sunt, sol, ignis, & cætera noctiluca.
- VIII. Lumen est aspectabilis qualitas à luce prognata, & per diaphanum medium longè lateq. diffusa; estq. omnis vitæ, actiuitatisq. principium, origo & fons.
- IX. Splendor est lumen à tergo politoq. corpore repercussum; estq. vera & genuina luminis soboles; & vt hic tenuioris essentia est, quam lumen, ita lumen tenuioris essentia est, quam lux.
- X. Lumen primum dicitur, quod immediatè à corpore lucido proficiscitur: Lumen secundum, quod à lumine primo est: tertium, quod à secundo: atque eodem ordine cætera.
- XI. Radius luminosus recta est luminis profluentia; vnde & consequenter Lumen non à centro tantum, sed & ab omni parte extimæ superficiæ corporis luminosi emicat rectis lineis, & in spheræ modum momento temporis diffunditur.
- XII. Vmbra lumen imminutum est, maiori, quod circumstat luminis comparatione.
- XIII. Vmbra prima est absentia primi luminis, secunda secundi, & sic deinceps.
- XIV. Vmbra plena, & perfecta dicitur, ad quam nullus radius corporis luminosi pertingit; imperfecta verò, ad quam pertingit aliquis radius.
- XV. Vmbra Physica est medium vmbrosum, obumbrantis corporis qualitate imbutum.
- XVI. Opacum corpus est, quod multis superficiebus confragosum est, multaq. densitatis.
- XVII. Color est lux opacata.

Lumen est ignis  
 quidam efflu-  
 us, ex ipso sol  
 corpore propa-  
 gatus, atque adeo  
 eiusdem cum for-  
 unde profluxi  
 nature; quod si  
 docet lens vitæ  
 dum cogit in un-  
 num diffusam a  
 diorum vim et  
 na aduersit, plus  
 bum liquefacit



PRONNCIATA,  
atque Axiomata.

- I. **L**ux compressa fortior est, quam disgregata, & consequenter illuminat vehementius, longiusq. diffunditur.
- II. Natura nihil agit frustra, nec deficit in necessarijs, neque redundat in superfluis.
- III. Natura non agit inordinatè, neque in operationibus suis facit saltum: vnde Causa ordinis, & rerum ipsarum, quæ ratione constant, & ordine. Aristoteles lib. 8. Physicor. tex. 15.
- IV. Omnia, quæ natura, vel arte fiunt, ratione aliqua fiunt: vnde opus naturæ, opus intelligentiæ.
- V. Natura non temerè, sed propter finem agit, res singulas ordinat, illis tribuens æquitatem.
- VI. Natura quod alibi tollit, alibi restituit.
- VII. Naturæ miracula cuiuslibet enti sunt indita.
- VIII. Natura effectum suum attingit lineis rectis, ijsq. brevissimis.
- IX. Lux naturæ primogenia qualitas omnia in actum deducens.
- X. Lumen qualitatum omnium prima, & nobilissima.
- XI. Umbra non potest agere sine lumine.
- XII. Umbra assumit naturam medij.
- XIII. Lux afficitur à superficiebus occurrentium quorumcunque corporum; quæ enim sub eodem sunt genere, apta sunt ad se mutuo afficienda: lux cum corporibus ob superficies, quibus terminatur, sub eodem sunt genere, ergo. Terminari enim affici est: linea à suo puncto terminatur, quare ab eo afficitur. Motus est recta, cuius terminus, quatenus punctum, est in superficie occurrente: & infinitorum lucis radiorum termini sunt infinita puncta, id est superficies, quæ ex illis quasi constat.
- XIV. Lux per colorata transiens vndique afficitur, & in superficie, & in soliditate, in quantum illa colorata est: quia color, & lux sub eodem sunt genere; ergo apta sunt in se agere.
- XV. Lucis proprium est color, eiusq. perpetuus comes; cui cum nulla sit materia, neque colori erit.
- XVI. Lux opaca corpori illapso reflectitur, in medio verò densiori diaphano refringitur ad perpendicularem.
- XVII. Lux colores illustrans vndique repercutitur, & colores illustrati radiant in orbem, vt lux ipsa, vtpotè correlatiua.
- XVIII. Omnis reflexio luminis est secundum lineas sensibiles, latitudinem habentes.



PARS

PARS PRIMA,  
PHOTOSOPHIA

Sive

DE LUCIDIS CORPORIBVS,  
ET LUMINIS AB IIS PROFLVENTIS  
NATVRA, ET EFFECTIBVS.

CAPVT I.

*De luce primigenia, siue de Sole, omnium lucidorum  
corporum primo.*



**M**NIS rerum cognitio à mente primam originem, à sensibus exordium habet primum: inter sensus, & naturæ sibi innata nobilitate, & virium præstantia, actionumq. dignitate, Visus principem locum obtinet, visui prima, & primò cognita, Lux sunt, & Lumen. Horum ope, & opera, rerum omnium in abdito naturæ sinu delitescentium innotescunt differentiæ: vnde lux, & lumen prima sunt, quæ primò natis sese offerunt; quorum subsidio veteres sagacis ingenij homines sublunaria summa, media, & imà conspexerunt, conspecta sunt admirati, admirando sunt contemplati, contemplando sunt philosophati. Photosophia igitur lucis, luminis, admirationis, contemplationis genuina soboles est; vnde & ab hac veluti forma omnium, instituti nostri ducamus exordia.

Tria in hoc Vniuerso Natura rerum disposuit corporum genera, Lucida, Diaphana, Opaca. Primi generis sunt Sol, Stellæ, Ignis: secundi Aether, Aër, Aqua: tertij generis sunt Luna Terra, Nubes. Lucida nullo vnquam tenebrarum horrore infestantur; Diaphana neque lucem habent, neque opacitatem, vtramque tamen in se recipiunt, etsi neutram retineant. Lucida, & opaca corpora contraria sunt, diaphana inter vtraque media: illa vti lucem innatam, ita hæc tenebras innatas habent: diffundunt vtraque extra sese veluti germina quædam, naturarumq. suarum testimonia: lucida lumen, opaca tenebras, diaphanis corporibus, ab vtroque diffusa virtutis veluti quibusdam vehiculis, se substituentibus, atque vtriusque extremi germina per vices lucem æque, atque tenebras recipientibus. At hæc καὶ δλου nunc singula eo ordine, & serie, qua lux ipsa in Mundo omnia ordinat, & disponit, prolequamur.

Sapientissimus ille mundi Architectus Deus Opt. Maximus mundanam hanc machinam fabricare constituens, cum sine instrumento primario illam nec consistere, nec ad generationes rerum aptam esse posse conspiceret; illi hoc, quod omnes viuimus, mouemur, & sumus, præfixit: Vas nempè illud admirabile, quoddam veluti suæ Diuinitatis produxit simulacrū, opus verè Excelsum; Solem, inquam veluti cor quoddam, & animum, seu mentem quamdam, ac principale naturæ, vt ita dicam, regimen, & Numen, vt eo mundus gubernaretur, occultaq. sapientiæ Dei sacramenta ex chao, abyffoq. tenebrarum eruta, manifestarentur; atque

Solis latus. & terra.

*Motus Solis mirabilis.*

atque ex visibili hoc, ac materiali numine, inuisibilis illius, & supra-mundani Numinis maiestas mortalibus innotesceret, condidit. Huic autem varios motus indens, *uens agit molem, & magno se corpore miscens*, neque circulis id astringere voluit, sed perpetua spiraliū voluminum agglomeratione à tropico ad tropicum moueri, vt mundum vniuersum foecundo motu imprægnatum, suæ virtutis redderet participem. Quo quidem opere in rerum natura diuinam prouidentiam nihil magis indigitat; neque respectu terreni mundi dumtaxat motus suos variare Sol, sed & respectu sui ipsius hincce vltimis temporibus motus variare, & versare vices deprehensus est: quæ omnia ad aliquos in terreno mundo effectus producendos, vt postea videbitur, sapientissime ordiata sunt. Si enim Deus, & Natura, nihil frustra faciunt, etiam in hincce inferioribus minimis rebus, quæ vilissimæ alioquin, & inter fortuita vulgò adnumerantur, tantæ subindè vires elucet, vt ea non nisi cœlestes quid sapiant; certè huic visibili (vt cum Platone loquar) Dei simulacro tam sublimi, tam constanti, tam regulari præceteris, causas altissimas, & omnino cœlestes subesse putandum est; quarum diuinissimam, & primam appellare non dubitem, intentionem, & finem, propter quem vniuersi Conditor Deus ipsum iam tum ab auro condito sic ordinavit, vt videlicet humana mens ad huiusmodi admirabiles diuinæ sapientiæ effectus eleuata, rerum Conditorum, omniumq; tam insignium, & incomprehensibili quadam bonitate communicatarum rerum finem vltimum cognosceret, amaret, eaque aeternum tandem gauderet. De hoc igitur lucis fonte, eiusque mira constitutione, ac facultatibus, primò antequam ad lucis miracula procedamus, dicere constituimus.

*Quid sit Sol.*

Quæritur itaque primò, quid sit lucida illa substantia, quam quotidie quidem intuemur, & ad incomprehensam eius pulchritudinem attoniti hæremus, etfi ad quidditatem substantiæ eius pertingere nemini adhuc datum sit.


Dico igitur, Solem esse corpus igneum ex fluore æthereo concretum, mundana primigeniaq; lucis spheram materialem panspermia quadam refertum; ex qua veluti ex fonte quodam lucis ignisq; inexhausto, caloris lucisq; seminaria derinantur in omnia, id est, luminis vehiculo qualitates singulorum conseruationi aptas influens in singula, quæ deindè feminibus proprijs cuique rei congenitis mittæ, tandem admirabilem illam rerum, quam quotidie in hoc mundo intuemur, varietatem progenerent. Est igitur Sol corpus sphericum non mathematicè, sed physicè, sua asperitate, & inæqualitate constans: quod mirum non immeritò cuiuspiam videri possit, nisi euidentissima huius non semel per telescopia excellentissima obseruatio facta nos reddidisset certiores. Esse autem corpus igneum, asperum, & inæquale, sequenti experimento hincce vltimis sæculis innotuit.

### *Phænomeni solaris experimentum.*

**S**I helioscopio istius generis, quæ maximæ virtutis in astrorum contemplandorum vsu fabricata sunt, more Dioptricis consueto, diuersis temporibus in Solem directo speciem eius intra conclaue clausum, obscuratumq; transmissam candido plano exceperis, non sine admiratione primò videbis subindè totam solaris hemispherij apparentis superficiem heterogeneam ex vmbri, & luculis cōflatam; eundemq; Solem tamquam mare fluctibus asperum, & fluctuantibus vndique crispum, neque id eodem modo, sed tempore diuerso, diuersas versare vices, hodie aliter quàm heri, & cras aliter quàm hodie, & sic nunquam eodem schemate, eodem vultus habitu, summo stupore defixus intueberis vt figura docet. Quæ omnia non ego tantum, sed & multorum annorum, Herculeo sanè labore clarif-

clarissimus ille noster Scheinerus opere integro Rosæ Vrsinæ subtilissimo, & pleno reconditissimis obseruationibus, indagata demonstravit. In hoc eodem corpore subindè maculæ quoque ingentes veluti vmbrae, & contra-positæ lucēs, summa admiratione spectantur; quarum aliquæ decrefcendo mole attenuantur simul in vmbra subtilissimam, ita vt tandem ipsam à reliqua Solis superficie, nisi aptatione instrumenti, vix possis discernere: & tale quandoq; vmbatile vestigium durat per vnum aut plures dies, quandoque citò euanescit penitus, & ali-

*Mira solaris corporis phænomena.*



Quædam etiam maculæ quando sunt, in tenuem, & æquabilem vmbra attenuatæ, hanc ipsam deinde resoluunt in maculas minutas discontinuas punctorū inflar, ita vt inter ipsas reliqua solaris superficiæ spacia eluceant; & quædo ista in paruulas maculas discretio facta est, progrediuntur nihilominus ordine suo per vnum, aut plures dies, idque diuersimodè, nonnullis in communem Solis superficiem euanescentibus, quibusdam in vnam continuam vmbra redeuntibus, vtrisque veluti penitudine quadã ductis se à se inuicem separantibus, vt deinde euanescant, ex euandis denique veluti ex substantia Solis ebullientes reualescant, & in nouam facularum vmbraumq; sobolem excrecant. Imò eadem aliquando post vnius, vel alterius diei disparitionem, iterum comparet. Verùm ne quispiam huius-



huiusmodi *Κυρτομετρον* vitio oculi, aut vitri accidisse putet; is sciat hoc in ipsa solari disci superficie, semper, & quouis diei momento in quavis Solis parte indifferenter fieri, irrefragabilem experientiam hucusque indubitanter docuisse. Qui vnquam in fornacibus fusorijs in ingentibus cuppis liquefactum *æs* vidit, is genuinas phænomeni solaris rationes aliquo modo comprehendere poterit. Sicuti enim in huiusmodi cuppis fusorijs vndantis materiei feruor tales subinde æstus voluit, vt mari cuidam igneis fluctibus agitato, vndarumq; vorticibus curuato haud abfimile videatur, vbi fuligines atræ flammis lucidissimis iunctæ, miram quamdam facularum, vmbraarumq; vicissitudinem exhibent, in quorum euanescentium locum aliæ identidem succenturiuntur; *æs* verò liquefactum, quod actu funditur, splendorem habet ita splendori Solis similem, vt nulla alia res in natura rerum splendorem Solis melius exhibeat. Hoc amictu deturpatum primo anno 1625. iv. Aprilis Moguntia, & deinde varijs alijs temporibus hic Romæ cū Scheinero non sine stupore me obseruasse memini, figurâ phænomeni hic apponendam duxi. Hæc autem vmbraarum, lucularumq; phænomena nulla ratione, extra discum solarem, sed ex ipsa corporis superficie quasi ebullire, hisce rationibus comprobatur.

Similitudo Solis cum fornacibus fusorijs.

Rationes phænomeni Solaris.

Primò, quia Sol siue vmbrae variegatus, siue luculis coruscus, siue vtroque carens, sicuti vni loco comparet, ita toti mundo apparere compertum est. Item quando nouæ oriuntur, aut illæ certum in solari superficie locum obtinent; sit hoc vbique, tempore & loco Solis eodem: imò annorum diuerforum, dum modo temporibus similibus, & in isdem parallelis obseruentur, quemadmodum ex constanti, & concordi Galilæi, Scheineri, Malapertij, aliorumq; in India, quos apud citatos vide, obseruatorū traditione nobis innotuit. Secundò, siue interualla vmbraarū, & macularum sumantur in longum siue in latum, siue mixtim; semper illæ superficiei solari inesse reperientur: quod nequaquam, vti ex opticis patet, fieret; si alteri extra Solem sphaeræ inhærent.

Dixi in definitione (panspermia quadam refertum) eo quòd Sol non simpliciter tantum lucis qualitate præditus sit, sed & luci admixtas habeat omnium seminalium rerum virtutes, vt qui ab Opifice Mundano, mundi anima, & pater omnium est constitutus, omnium in se virtute seminalium rationum potestates contineret; quæ vnus cuiusque rei seminibus coniunctæ, rerum omnium in mundo generationem efficiunt. Nam, vt rectè Aristoteles, Sol & homo generat hominem: per lucem autem, & motum solum non generat: ergo per aliquid aliud; scilicet per lumen tamquam per vehiculum delatum, singulisq; mistum, hunc effectum præstat. Calorem verò præcipuum Solis instrumentum nemo facile negarit, nisi qui sensu omni priuatus fuerit; Etsi quidam perperam velint, calorem, lumenq; in aëre ab astrorum latatione attrito generari. At si hoc, cum latio hæc perpetua sit, cur noctu etiam lumen in aëre non generatur, cur noctes sunt frigidiores diebus? Albertus quoque docuit, lumen per se non posse calere, sed dum à Sole diffunditur, ab eo ad terram vsque pertingit, quæ ea fit, quæ calorem cum lumine nobis affert. Attamen si latio astrorum ignis particulam deorsum trudit, cum latio semper fiat; cur semper eam particulam ignis non trudit? cur non noctu, æstate? cur hyeme, non die? cur sub Septentrione nunquã, vt ibi faciat calorem? Sed hæc figmenta, quia rebus ipsis non consentiunt, acutulorum sunt deliramenta. Calorem verò non esse ex aëre à latatione astrorum attrito, hinc patet; Attritio propriè ex duorum corporum solidorum se contingentium, collidentiumq; vehementia fit: cum ergo Sol, Luna, & aër ab inuicem remotissimi sint, aër quoque mollissimus sit; patet propositum. Est igitur calor perpetuus luminis comes, neque lumen vnquam sine calore est, etiam si calor aliquando sine lumine sit, cum videlicet re aliqua à lumine contacta, ipso abeunte ibi calor remanet. Id autem fit, quia lumen omne, sed sensibilibus

Calor nō fit ab attritione aëris.

Quid sit attritio?

bilius lumen Solis, non aliud est, quàm ignis, corporeorum ignium ignis primus, imago empyrei, primæiq; & luminis, & caloris, lux compactissima, ignisq; feruentissimus, atque ardentissimus. Radij verò eius sunt ab eo ignes secundi, recti, acuti, penetrantes, vrentes, quasi à densa Solis mole æstuant. Vnde multi insignes Philosophi moderni sentiunt Solis corpus ex materia consistere omnium totius mundi densissima, vt intra cuius augustissimum orbem tantum sit materiæ conclusum, quantum tota aura ætherea per infinitam fere solidæ mundanæ sphaeræ amplitudinem est dispersum. Esse autem densitatem huius corporis in summo gradu, ex eius calorifica vi tam acri, atque adeò longè porrecta colligunt. Ignitorum enim eiusdem quantitatis tantò quodlibet violentius vrit, & longius, quantò est densius: vnde plus carbo, quàm flamma, plus ferrum candens, quàm carbo; vt non inconuenienter plerique veterum Orientalium, Hebræi, Arabes, Aegyptij, Persæ, vt in nostra Astronomia Hieroglyphica fusiùs demonstrabitur, Solem nihil aliud, quam *υυσφδρ*, id est, candefactum lapidem, symbolicè, vt eiusdem molis densitatem inuenient, asseruerint.

Sententia Kepleri Solem ex materia omnium rotius mundi soltissima.

Quòd autem certam materiæ in corpore Solis quantitatem definimus, æquiparantes eam residuo materiæ, qua, secundum Mosen, extensio, seu insufflatio facta est inter aquas, & aquas; id videtur sanè requirere proportionis concinnitas; vt cuius vis immensum illud spacium permeare debuit, idem tantum receperit corporis, quantum in vniuerso illo spacio inest. Rem nonnulli elegantissima sanè similitudine mundani opificijdem apprimè explicantis ostendunt: Deum videlicet sapientissimum Architectum totum mundum condidisse, ea ferè ratione, quæ pueri bullas ex aqua, & smegmate per aëris exsufflationem excitant; ita tamen, vt Deus in circumferentia limbi bullæ inferioris guttam aquæ retinuerit. Comparatio sanè pulcherrima, ad quam vel ipse Sapiens respexisse videtur dum ait 1. cap. 11. *Quoniam tamquam momentum statera, sic est ante te orbis terrarum, & tamquam gutta roris antelucani, quæ descendit in terram.*

Diximus in definitione Solis supra data, corpus Solis asperum (physicè non mathematicè rotundum, vt multi volunt.) Quemadmodum enim Terra Atmosphaera sua constans, inæquali vaporum exhalationumq; amictu cingitur, variaq; habet partium dispositiones; alibi enim densam, alibi subtilem & tenuem, vbiq; varia virium qualitatumq; miscella imbutam experimur; in alijs quoque, & alijs locis alia, atque alia pro partis euaporantis natura, & conditione producitur: ita prorsus existimandum est Solem pyrosphaera sua consistere inæquali, vt ex perpetuo macularum, fumorum, nebularum, lucularumq; in eiusdem superficie nunc ebullientium, nunc iterum euanescentium vicissitudine, irrefragabilis experientia docuit. Atque adeò Solare corpus ad instar Oceani cuiusdam ignei in perpetuo motu, & agitatione versari, quod quidem sic agitur pro euaporantis Solaris regionis varia natura, varios quoque in Natura rerum effectus causare, nemo dubitabit, qui prædicta penitus fuerit contemplatus. Est enim omnium mundanorum corporum eadem ratio; vt quod de Terra dicimus, de Sole, Luna, cæterisq; planetis dicendum sit: diuersitas in eo solum reperitur: quòd vnumquodque horum corporum, vt diuersam naturam sortitum est; ita diuersam quoque exspiratæ virtutis suæ sphaeram fundet. Nil amplius dico: qui hæc Solis miracula penitus fuerit contemplatus, is haud dubie facile Cometarum in superiori Aetheris regione nascentium originem videbit. Multi quoque Philosophi, dum effectuum quorundam insolentium abditas causas Cælo empyreo in pluribus temerè adscribunt, plenius sibi, si Solis haec pyrosphaeram, eiusq; varios effectus considerauerint, satisficient.

Solis pyrosphaera.

Sunt porò Solis vires lumen, & calor, & rerum semina à lumine suo vecta, & in corpora hæc deuenta, & à calore inuenta, fotaque in causa rerum; & generationis rerum omnium miscella. Lumen enim suum sicuti delator est seminum re-

rum; sic eorumdem est mensura, & numerus, & fomes. Dum enim illuminat, totius uniuersi corpora subiens, & ea permeans, calore comite tum separat, tum congregat, purgat, & mouet, ea penetrat, nutrit, augmentat, perficit, renouat, viuificat, continens omnia, contentum ab omnibus, ita vt cuncta corpora illum, vti generatorem, vti motorem, vti calefactorem, vti illuminatorem, vti denique vitæ datorem, eiusq. conseruatorem expetant. Omnia enim hæc corporibus influit, inditq. cum manifestis luminis viribus, tum occultis, incorporeisq. actionibus; vt vel ad hæc admirabiles Solis qualitates Sapiens respexisse videatur, dum dicit: *τὸ δὲ τὸ πῦρ μὴ φθινέμενον ἀπὸ τοῦ βραχέως ἀπὸ τοῦ ἡλίου διαμαρτυροῦμαι ἐπιχειροῦ.*

*Quod enim ab igne non poterat exterminari, statim ab exiguo Solis radio calefactum tabescebat.* Vera igitur Solis instrumenta sunt lumen, calor, semina ad ea omnia, quæ in mundo sunt, efficienda. Aristoteles cum lumen Soli negare non posset, negauit calorem, & pro eo motum substituit, dixitq. Solem lumine, & motu agere in hæc inferiora; Nos verò etiam motum Soli damus, non quod ad aërem, aut aquam, aut terram motus pertingat, sed quod Solis sit veluti quartum instrumentum quoddam, quo tria illa lumen, calor, & semina, quocumque it, secum circumferat, & Hyælæos mundos totos ijs impleat, diaphana quidem corpora lumine, & calore; opaca verò calore, & seminibus, calore in intimis opacorum corporum vmbri veluti imprægnationis teste relicto.

sup. 16. nu. 27.

Instrumenta Solis, quæ.

Novum phænomenum.

Vt autem Sol hæc vires suas sane mirabiles toti corpori solari congenitas mundi corporibus æquius rectiusq. communicare posset; hinc Opifex naturæ sapientissimus eum circa proprium axem, diurno anuuoq. spacio ad motus diurni annuiq. exemplar ordinato, moueri voluit (quod portentum sane *ἠγασθη* vltimis hæc temporibus Lyncæis Astronomis tandem innotuit) vt sic nulla pars esset, quæ tam necessaria; lucis fecunda administratione destitueretur. Cum præterea Solis radiosa species, efficacissima sit, ne continuata caloris intensio terræ officeret; Athmosphæram ex halitibus terrestribus, & vaporibus aqueis actione Solis excitatam condere voluit, vt in eo nimius æstus veluti retusus proportionali quadam caloris intensio mundum uniuersum replet. Quæ omnia, vt melius intelligantur, sic

### CAPVT II.


#### De triplici Solis actione, directa, reflexa, & refracta.



**M** conset è quolibet Solis puncto versus terram conuerso pro manare vnum aliquem indiuiduum radium perpendicularem, qui semper recto fertur incessu tam per Athmosphæram, quam per aërem, vt in arte nostra Anaclastica docemus: Atque hanc dicimus causam esse diuersitatis caloris in diuersis climatis: si enim rectus superficiæ terrenæ incubuerit, actionem haud dubie fortissimam exercebit; si in vertice iuclinauerit, tantò efficaciorẽ efficiet calorem, quantò angulus, quem cum superficiæ constituit, angulo recto fuerit vicinior. Cum verò Solis orientis, aut meridiani radius incidens, in obiecta superficiæ terrestri corpora normaliter erecta eadem prorsus ratione cadat, qua sub sphæra recta in medio cœli constitutus vertice; merito quis mirari posset, cur Solis radij in huiusmodi montium, turrium, templorum, domorumq. parietes, nec non pyramidum, columnarumq. normaliter erectas superficies radios suos immittens, non eundem effe-

effectum, quem sub sphæra recta efficiat? Respondeo; huius effectus causam esse radios Solis in vapidã regione, seu Athmosphæra, refractos, quæ terram veluti indumento delicato amictam à phœbæis iaculis ita protegit, vt vehentiorẽ eorum impetum variè pro varia radorum obliquitate, aut dictæ Athmosphæra raritate, densitateq. retundat, atque adeo refractionis quantitatem causetur raritas, vel densitas diaphani; hebetationem verò radorum diaphani causetur opacitas. Cum igitur in Athmosphæra vtrumque reperitur, mirum non est, si ipsa tantum in radiosam Solis sphæram iuris exercent. Vnde consequenter patet, quòd si nulla esset Athmosphæra, normales montium crepidines, vti & omnes normaliter erectas superficies, eundem prorsus calorem reflexuras, quem sub æquinoctiali Sol meridiano, & verticalis, è terra reflectit. Situs igitur obliquus facit, vt Solis radius horizonti vicinus in ista Athmosphæra longum iter infistat; ideoq. dum humidum vapidã sphæra medium transit, plurimum & lucis, & vigoris, ardorisq. veluti obtusus, hebetatusq. deperdat. Secus si fieret, terra æstu Solis haud dubie foret inhabitabilis; vt vel ex hoc admirabilem Dei Optimi Maximi sapientiam in administratione, conseruationeq. mundi videas, & admireris. Verum de huiusmodi naturæ prodigio, atque de Athmosphæra vtilitatibus, vide plura in Arte nostra Anaclastica. Ex quibus, ni fallor, patet refracti Solaris radij in terræ conseruatione vtilitas.

Ratio, & vtilitatis Athmosphæra.



Porrò cum Sol umbra terræ ex opposito densissimas semperaliqui telluris parti obfundat tenebras, & consequenter non parum tam necessarij luminis assistentiam terræ sentiat, ne & in hoc diuinam prouidentiam defuisse quispiam cauillari possit, omnem hunc luminis defectum radio veluti quodam Solis reflexo rependere voluit. Dum enim luce suâ immensa opposita Lunæ, stellarumq. corpora illuminat, illa lucem communicatam, veluti ex speculo quodam, in quersam atque noctis caligine inuolutâ terræ faciem vibrantiâ, quid aliud nisi vicariâ quandam Solis operam cum lumine, tum calore reflexo, ita inuitabili necessitate natura exigente impendunt? Vide figuram hic appositam in qua radiosa lux C B A tum terram, tum Lunam, & reliqua astra percutit, quæ in telluris oppositâ partem ymbrosam repercussa, ibi temperato calore & lumine absentis Solis vices agit, ibiq. pro varia communicatæ virtutis miscella, varios effectus producit.

Reflexa lûs solaris ex caelo, sibus corporibus vilius.

### CAPVT III.

#### De miro Solis opificio: item de causis, & effectibus Macularum Facularumq. solarium.



VM Solis in mundo incredibilis, & prope diuina vis sit; à Sole enim omnis motus, & vita, & conseruatio, & cœlestium, terrestriumq. ornatus; adeo vt, quod propius contempletis, hoc plura in illo inuenias miracula, decere philosophum arbitror, omnes naturæ thesauros rimari ad dogmata tanto miraculo congrua proferenda.

Fixum igitur, ratumq. sit, Sole staturo mundi huius terreni gubernationem longe aliam, scilicet statum turbulentiſſimum futurum, neque terræ globum vbiq. habitabilem, neque Athmosphæræ dispositionem, prout nunc experimur eandem; propter benefici Solis, & omnia vegetantis, & conseruantis absentiam. Quibus ex rebus munificæ diuinæ prouidentiae bonitas elucet, quod huic sideri motum cum longitudinis diurnum, tum latitudinis annum, eumque excentricum indiderit, vt eiusmodi motus diuersitate athmosphæra ad æquabilem mediocritatem, & humanis vsibus accommodatam temperiem digeretur: hoc enim temporum hyemis, æstatis, autumnii, ac veris vicissitudines habemus; hoc curricula annorum, mensium, hebdomadam, nec non dierum transigimus, quorum diuersitatem vnus idemq. Sol sua præsentia, & absentia efficit. Virtus igitur Solis terreno globo à diuina prouidentia datur per motum localem diurnum, & annum, ipsius virium, facultatumq. abditarum delatorem. Ne verò ipsidem semper radijs solaribus terra feriretur, neue altera solaris corporis ad Stellas conuersa, pars otiosi videretur; diuina sapientia ipsi Solis corpori proprios, & ab omnibus alijs distinctos motus indidit; queis singulis (quemadmodum ex irrefragabilibus experimentis constat) vicenis septenis diebus circiter vnâ circa centrum proprium reuolutionem conficeret, & huius conuersionis beneficio quicquid lucis, quicquid virtutis continet, successiue tam in terram, quam vniuersum Cœlum, adeoque sidera singula, abundantissime effunderet. Et hanc quidem Solis circulationem in terræ gratiam à Conditoris esse inditam, ex eo patet, quod ipsa non simplici, sed annua circumductione axis mobilis, circa quem prior motus describitur, voluatur; quo fit, vt Sol circa summitatem borealem, & depressionem Australem, versus terram vergat, nutetque sex mensium tempore, & ab eadem vicissitudi-

Vilius ex motu Solis.

Admiranda de motu Solis.

naria

varis posouunt; axiuraq. mobiliuro apparitione supra horizontem solarem; & occultatione infra eundem deurgat: quam vertiginosam librationem ad vtilitatem quoque telluris factam nulla ratione dubitari debet, hinc enim fit vt per 13. lustrationes, quibus totum Vniuersum perlustrat, terra vti alia, & alia semper luce solari, ita alia quoque, atque alia virtute solari haud dubie imbuatur; quæ varietas influxuum mirum quantum promouetur perpetua illa macularum, facularumque mutua coniunctione, separatione, abitu & reditu. Si enim umbra Lunæ in eclipsi solari tantopere alteret tellurem, quantam alterationem in sublimioribus effecturum Solem credimus, qui 50. aut 60. subinde macularum, vmbraumq. tantæ subinde magnitudinis, vt Lunæ terræque superficiem aquare videantur, eclipses patitur. Cum igitur Sol nunc veluti quodam maculoso vmbraum tractu lugens, procedat; nunc excusso luctuoso velamine totus serenus, lucidus, placidus, & ridibundus, modò flammæ, mox fuligines atras euomere videatur; certè ista in terram diuersimodè agere, effectus dissimiles producere, ratio docet; cum hac vicissitudine, ipsam Solis lucem varient, impediunt, promoueant, augeant, minuuntque; qua mutata, solarem consequenter in terras, & sublunaria influxum mutari necesse est. Hæc autem ita sese habere, omnium pæne sæculorum acta probant astronomica. Hinc sæpe annos quosdam alijs magis exoticis experimur, quos Astrologi varijs planetarum aspectibus, nos verius huius solaris phænomeni varietati adscribimus. Cum enim ingens ebullientium solarium, euaporationum copia congeritur, fieri non potest, quin lucem & calorem quominus efficaciter in hæc inferiora agere possit, vehementer impediunt. Certè Suetonius eo tempore, quo Iulius Cæsar trucidabatur, circa Solem longo tempore visam veluti materiam quandam crassam, & fuliginosam tradit. Tempore quoque Iustiniani Imperatoris anno integro Sol ceu velamento quodam obseptus adeo parum lucebat, & ita obscure, vt in Lunam conuersus videretur. Vide Aldouandum lib. de prodigijs. Obseruauerunt haud absimile Solis prodigium Arabes anno Hegiræ 64. quemadmodum in Astrologia sua tradit Haël: quod & magnarum desolatio secuta est. Apud Paulum Diaconum legitur anno 790. Solem 17. dierum spacio Cælo maxime sereno, & defæcato ita obscure luxisse, vt pæne tenebras Mundo offunderet. Quam obscuritatem ingens quoque Cometa secutus est. Cornelius Gemma in sua Cosmocritica tradit anno 1569. Solis discum veluti sanguineo colore offusum toti Europæ multorum dierum spacio comparuisse: quod phænomenon, & Cometa & ciuiles commotiones secuta sunt. Anno denique 1625. paulo ante bellum Suecicum, totius anni decursu, discus solaris ingenti macularum ebullitione coopertus, tum à me in Germania, tum à nostro Scheinero Romæ fuit obseruatus. Quæ omnia si Astronomi diligenter notarent, forsitan ex huiusmodi phænomenis ad effectus sublunares comparatis, noua astrologia, multò vulgari illa planetaria certior, condi posset. In Luna Cylatus noster Athmosphæram quoque siue vaporum exhalationem, in eclipsi Solis anni 1628. ipso natalis Dominici die notauit. Non dubito idem in reliquis planetarum globis contingere, qui vti centum à centro vnuerſi diuersa, ita & diuersas exhalationum sphaeras constituunt. Ex quibus quidem ni fallor, Cometarum cum supra tum infra Lunam accensorum, nouarumq. Stellarum genesis manifestè patet. Multa hoc loco circa modum, quo Sol cæterique planetæ suarum exhalationum sphaeras fundant, & quomodo inde Cometa nasci possint; adducere possem. Verum cum non semper prudentis sit, omnia ea quæ circa particulares tam insolentium effectuum rationes infinitis modis variabiles contingere possunt, temere effutire, hinc dictorum phænomenorum causam hic duntaxat *αδ' βλου* insinuare volui, alijs commenta relicurus; sed & alibi forsitan de hisce fusius nostram opinionem aperiemus, vbi hosce nostros discursus non displicuisse intellexerimus.

De maculis Solaris vaticinium.

Historia vicia.

Cometarum origo.

Vides

Vides igitur quanta ex hoc nouo, & nouissimis temporibus inuento phænomeno, arcanorum in Philofophia seges, quam vber campus pateat. Verum ne hæc tantum obiter dixisse videamur, naturam, & efficientiam, qua ratione hæc omnia per calorem fiant, iam restat vt dicamus.

## CAPVT IV.

### De lumine lunari, aliarumque Stellarum.



**M**aior in hoc mundano opificio rerum, effectuumque varietas elucesceret, voluit diuina prouidentia complura in hoc mundo corpora, singula varijs, diuersisq. qualitibus imbuta constiture, vt hæc fœcundis Solis radijs imprægnata, seminumq. mistura per lucis solaris veluti reflexum radium in terram delata, ibidem nouas generandarum rerum combinationes molirentur. Vt verò hoc commodius fieret, Lunam circa terram, & planetas circa Solem tanquam centrum conuerti voluit; vt acceptos à Sole radios in terram commodius funderent. Quoniam verò dicta corpora Solis fulgores non duntaxat superficie tenus, sed & medullitus in se hauriunt, & natiua sua proprietate tingunt; fit, vt feminales Soli concreatæ virtutes per lucidos radios in dicta corpora propagatæ, ibi cum planetarum, cæterorumq. siderum virtute feminali cuique peculiari mistæ, tum per radium reflexum in terram, tum per directum refractumq. in atmosphæram diuersimodè agentes, diuersos quoque, eosque innumerabiles effectus iuxta terræ, similiter *παρασκευάζει* quadam refertæ, dispositionem, capacitatemque producant. Quòd autem tinctura ista ita sese habeat, ex ipsorum diuersissimis coloratis lucibus, vt Saturni plumbea, Martis ignea, Veneris argentea, Iouis clara, & serena patet: quam colorum varietatem à luce Solis non esse, ex eo conficitur. Si enim à Sole prouenirent, eodem tempore, simili colore omnes planetæ imbuerentur, & vno mutato omnes mutarentur. Neque ex medio prouenire inde patet, quòd singuli suas tincturas in omni loco, situ, & tempore seruant: vnde ex insitis ipsorum coloribus aduenientem Solis lucem infici, atque inde in terram, vt dictum est, vnà cum suis qualitibus, iuxta Pronunciatum 3. reuerberari, & sic tandem diuersimodè infici eadem (non secus ac radij solares in vitra diuersimodè coloratâ diuersas in planis, in quæ incidunt, lucces causant) omnino fatendum est. Hæc autem in terras influentia variatur ex accessu ipsorum, & recessu tam ad Solem, quàm ad terram, nec non vario situ cum respectu Cœli, tum horizontis terreni, supra quem refractione radiorum illapforum in medio humido proportionaliter procedentium, varias quoque qualitatum modificationes causari, nemo dubitare debet. Hinc ne nimia radiorum solarium æstus vehementia Terra dissolueretur, Terram quandam Aetheream vt cum Plutarcho loquar, Lunam, inquam, veluti aquosum quoddam corpus innumeris virtutibus præditum Soli contra posuit, cuius refrigerio radij fracti, attemperati, proprijsque fœcundi seminibus telluri communicati, ibi nouam sobolem, fœtumq. auspiciarentur. Habent autem hæc duo corpora, tellus nostras, & ætherea illa lunaris terra, magnam ad se similitudinem, qua altera alteram fouet, & sibi inuicem fauent, & influxus, quibus ipsæ, & vtriusque partes tum viuunt, tum conferuentur, tum alterentur; quin & maria nostra ad Lunæ aspectus variè commoueri, non indiget testimonio, vtpotè, quo nihil tritius. Hæc autem omnia

Stellarum colores diuersitatem qualitatum ostendunt.


Terra ætherea qua?

nia minime fieri possent, nisi maxima inter eam, & nostratia intercederet sympathia. Hæc autem sympathia non nisi in magna consistit tum virium, tum actionum conuenientia; virium autem conuenientia, non nisi in essentiæ similitudine consistit, cum pro ratione essentiæ rei vires insint, & ab ea proueniant, & pro ratione virium actiones quoque edantur necesse sit. Cum enim Luna corpus sit asperum, & telluri nostræ prorsus simile, densum & opacum; illud solares radios non solum perfectè imbibit, sed & mutua virium communicatione imbitos, ad nos reflectit: ne verò idem semper influxus esset, sapientissimus Architectus illam ea arte fabricatus est, vt inæquali aspectu terram menstruo spacio respiceret, & pro diuerso situ alia quoque atque alia actionis suæ intensione eandem feriret, atque inde pro naturæ indigentia generationes rerum promoueret. Diximus Lunam esse corpus asperum, & prorsus simile telluri; quia ex obseruationibus varijs à Lynceis Philofophis factis notatum est, in Luna nescio quid montosum, vaporosumque; quemadmodum te sequens experientia docebit.

Quale sit corpus Luna.

### Experimentum Phænomeni Lunaris.

**L**una plena melioris notæ tubum Astronomicum accipe, quem serena nocte, & aëre vaporibus vacuo in Lunam plenam primo, deinde in *διόπτρον*, aut *αμφικερρον* Lunam, alijs temporibus diriges; &, mirum dictu? inuenies miram, quandam Lunæ, ex umbris, & luculis conflatam faciem, non secus ac de Sole in præcedentibus diximus: hoc solum discrimine, quod faculæ, & maculæ in Sole sunt perpetuò inconstantes; in Luna verò perpetuò sibi ipsi similes, & immotæ: diceres te mare quoddam immensos terrarum tractus allambens intueri. Videas hic



Luna *παρασκευάζει* facies.


in medio lucido, veluti in Oceano quodam longè lateq. circumfusas insulas: videas alicubi etiam veluti lacunas quasdam umbras, ex quarum centro fulgentissimi radij diffundantur: notabis quoque in extremo Lunaris disci limbo nescio quid, tremulam, fumosam diceres exhalationem, quam & inde multi Lyncei

Luna facies nota.

coele-

coelestis terræ Athmosphæram vocant. In eodem limbo non sine admiratione intueberis, in dichotoma præsertim Luna, veluti præruptos quosdam scopulos, & cõcatenatorum montium ordines. Quæ omnia quemadmodum Neapolitanus quidam Artifex, & nos hic Romæ, excellentissimis tubis non semel obseruauimus hac figura exhibemus. Ex quibus obseruationibus inter se ritè collatis, nihil aliud inferre possumus, nisi Lunã telluri nostræ prorsus simillẽ, corpus videlicet ex aqua, & terra coelesti cõstitutũ, innumeris latentũ feminum præditum facultatibus, quæ Solis radijs mistæ, in terrã eam rerum multitudinem producant, quam quotidie quidem miramur; nemo tamen missionis rationem facillè animo concipiat.

Luna à uidi-  
uere facies





Lucem autem illam vehementem in radios diffusam, nihil aliud putamus esse, quam politissimam eminentioris lunaris partis superficiem; radios Solis præ cæteris partibus vehementius reflectentem. Si nos effemus in Lunari corpore, dicerem profecto, altissimorum montium cuiusmodi sunt Alpium, Pyrenæorum, Andium, Caucafi inaccessa iuga, perpetua niue glaciq. tecta, similem ad nos in Lunari globo constitutos lucem reflexura. Dicit enim vix potest quam intensam huiusmodi lucem ex se reflectant, quemadmodum anno 1638. dum Aethnam lustrare in Calabria montibus vicinisq. circumfusis insulis non sine voluptate me obseruasse memini. Esse autem eminentiorem Lunaris corporis partem, umbra circumfusa satis declarat. Sed hæc sunt nostræ coniecturæ, quibus si quispiã aliquid melius attulerit, ei haud grauatè nos subscripturos pollicemur. Verum, cum de hisce, & similibus in nostro Mundo Magnetico de huiusmodi Magnetismo Solis, Lunæ, & terræ tractauerimus, & in nostro Mundo subterraneo ex professo tractemus; cõcuriosum lectorem remittimus.

Porrò Planetæ reliqui acceptos quoque Solis radios pro suæ naturæ conditione modificant, eisq. refusis corpori terreno suas virtutes impertiunt. Nam omne panè lumen Soli acceptum referunt, quod in terras remittunt, non vt specula terfa, & polita, sed vt Luna, vt Venus, Iuppiter, Saturnus, & alia lacunosa corpora à Sole illustrata. Dixi, lacunosa corpora, quia experientia Lynceorum docuit,


cuit, planetarum corpora minimè polita; sed maximè aspera, diuisa, confragosa; varijs maculis & vmbri deturpata, & consequenter heterogenæ naturæ esse; quam effectuum necessariò maxima consequitur diuersitas. Iouis sidus sub sequenti figura Bononiæ anno 1643. deprehensum ad me transmiserunt Lyncei. Saturnus quoque multis in locis *Trisopos* siue tricorporis figuræ visus est, vt figura docet: quæ omnia variam astrorum compositionis miscellam docent. Figuras memoratorum planetarum hic apponendas duxi.

Talis est visus Iuppiter Bononiæ anno 1643. die 19. 16. 17. 18. 19. hora serè 4. ciuili ab occasu.

Talis vero die 28. 29. 31. Octob. & 5. 10. 11. 13. Nouemb. eodem hora:



Saturnus verò hac figurã visus est.



Ex quo phænomeno luculenter apparet, stellarum corpora non perfectè spherica, nec lucida ex se, sed aspera, inæqualia, confragosa; & veluti alteræ quædam terræ coelestes; quæ dum lucem Solis imbibunt, eandem varijs virtutibus imbutam; ad nos transferberant in fines certos ab Authore naturæ intentos. Et sic liquet omnem coelestem lucem ex tota vniuersitate orbi terreno quocumque tandem modo impertitam; esse Solarem, siue immediatam ab ipso Sole, siue per radium rectum, & refractum; siue mediatam per stellas, per radium scilicet reflexum. Hanc quidem in ratione luminis multò esse imbecillioem illa, in ratione tamen virtutis actiue aliquid peculiare ex proprietate stellæ secũ deuehere, quasi certo constat; vt vel hinc coelestium influentiarum scaturiginem aliquam agnoscas. Nam diuturna experientia compertum est, Solem orientem cum Arcturo tempestates, cum Aquila niues, cum Andromeda tempus turbidum, cum Asellis subitas aëris perturbationes, imbres, tonitrua, cum Cane ferenitatem, & calorem, cum Hercule ventos, cum Hyadibus pluuias, cum alijs alias qualitates aëri impressas mouere: quod cum semper statutis anni temporibus contingere videamus, certè in planetas vagabundos, & aliam aliamque virium suarum modificationem in alio & alio loco obtinentes, sola causa conijci non debet. Ergo in Solem, & quidem in eam Solis partem, seu superficiem, quæ annuo motu circa proprium globi sui axem circumducta, stellæ cuidam similitudine quadam naturæ

Certò quorundam effectuum causa unica est Sol circa axem proprium motus.

C cum

cum parte illa solari illi obuersa opponitur. Vnde mirum non est infinitam influ-  
xiuum varietatem; quæ ingenio humano comprehendere nulla ratione possit, in  
hæc inferiora deduci, vti partes stellarum cum partibus alia & alia virtute imbu-  
tis combinanti patebit. Vnde aliam virtutem in perigæis, aliam in apogæis, aliam  
in medijs longitudinibus, in alijs Zodiaci locis constitutos planetas obtinere, ne-  
mo dubitare debet, & nos id fusius in nostra Astrologia hierophyfica declarabimus.

CAPVT V.


De Igne, & noctilucis corporibus, & productione  
caloris in mundo.

**I**UCE coelesti perpenſa iam ad lucem terrenam, Ignem inquam,  
deſcendamus, vid eamſq, quid is ſit? Ariſtoteles 5. Topicor. tres  
eius ſpecies conſtituit, his verbis: ε γὰρ ἔστιν ἐν αἰθέρι τῷ πνεύματι τρεῖς ἔτερον  
γὰρ ἔστι τὸ ἀπὸ αἰθέρος, καὶ φλόξ, καὶ φῶς, ἢ καὶ σὺν αὐτῷ πῦρ ἐν. Non eſt  
vna ſpecies ignis; aliud enim ſpecie eſt anthrax (carbo) & flam-  
ma, & lux, vnumquodque eorum ignis exiſſens. Tres has ſpecies  
ignis ante Ariſtotelem Plato in Timæo, & poſt eum eius diſcipulus Theophrastus  
conſirmauit; quæ tamen ſpecies igni ſublunari nulla ratione conuenire poſſunt.  
Si enim ignis Anthrax ſit, erit accenſus; ſi accenſus, lucebit; ſi luceat, inferiora  
ſimul, & ſuperiora illuminabit; atque vnà cum hac illuminatione aërem ſemper  
calefaciet: quæ omnia experientia reclamant, Patet ergo ignem ſublunarem  
non eſſe carbonem. Neque flamma eſſe poteſt ſi enim flamma ſit elementum ignis,  
calefacit; ſi calefacit, incipit; ſi incipit, comburit, ac deſtruit; ſed hæc omnia  
noſtro elementari igni nequaquam conueniunt, ergo non eſt flamma. Neque lux  
dici poteſt; ſi enim luceret, lumen ederet, & nos illuminaret, imò noctu, abſente  
Sole maxime iſe ſeſe monſtraret; ſed hæc omnia ſenſibus repugnant; ergo ſub  
concauo Lunæ nullus ignis eſt huius, quem Ariſtoteles deſcripſit, conditionis, ſed  
ex conſuetudine tantum, cum, ignem appellare videtur, ſcilicet, ſubtiliſſimam  
aëris partem. De hoc igitur igne, cum non ſit corpus lucidum, nequaquam tracta-  
mus, ſed de igne noſtro culinari, quem Ariſtoteles, πῦρ μὲν τοῦ ἀπὸ τοῦ αἵματος, venti ſi-  
ci accenſionem, alij ſumus ardentem vocant: ſi igitur ſumus eſt; ergo ex humido;  
ſi ex humido, & calido; ergo miſtum; ergo minime ſimplex, neque conſequenter  
elementum eſſe poteſt. Alius ergo in natura rerum ignis deſignari debet, quem  
nos in præcedentibus inuimus, eumq, in Mundo noſtro ſubterraneo fuſius de-  
clarabimus. Ignis igitur noſter vſualis nihil aliud eſt, quam aër ex vehemēti  
duorum corporum collisione accenſus, cuius ardore combuſtibilis materia ſomes  
arreptus in flammam abit, flamma luce ſua omnia vnde quaque illuſtrat, atque hoc  
eſt lucidum illud corpus, ignem ſublunare in tenebris commorantibus vnicum  
ſolatum, Sol domeſticus, noctium, atque tenebrarum illuminator, Solis, & Lu-  
næ vicarius non minus quam cæteri ignes enarrari neceſſarius, cuius lumen vti  
coeleſti lumini homogeneum, ita iſdem quoque qualitatibus pollet.

Quomodo autem iſ in natura exiſtat, quomodo producat, & intereat, iam  
dicendum eſt.

Dicendum eſt igitur primò, aërem in maximam raritatem deductum tandem  
ignefcere: rareſcit autem motu, motus autem ſit collisione duorum corporum,  
vel luſta contrariorum, quam antiperiſtaſim vocant. Priori modo ignis eſt ſilici-  
bus

bus elicitur, rotarum vehemēti, continuoq, motu caleſcentium axes accenſi com-  
buruntur. Hac arte quidam Americae populi è duo-  
bus lignis calidis, & ſiccis, quorum vnum intra al-  
terius ſiſſuram tamdiu circumagitur, donec flam-  
mam concipiat, & præter hanc, nullam aliam ignis  
eliciendi norunt rationem, experimento, ni fallor,  
à diſta rotarum confragatione docti. Idem ignis at-  
tritione ligni lauri, & hederæ excitatur teſte Plinio:  
antiperiſtaſi verò etiam accenditur, & ſic pleraq,  
igneas in aëre impreſſiones fieri videmus. Hinc  
ignis ſarui portenta, capræ ſaltantes, ſidera cadentia,  
Caſtor & Pollux, ſimiliaque, de quibus vide Me-  
teorologos. Tandò autem aër facilius inflammat, ut  
quandò ſubtilior. Hinc in Andium Peruvia & Chi-  
les montibus toto terrarum orbe altiffimis, aër adeò  
ſubtilis eſt, vt nemo ferè illos impunè, & ſine ſpiri-  
tus defectu tranſeat: tantum quoque aër ibi ad in-  
flammationem diſpoſitione habet, vt vel tenui mo-  
tu, & halitu inflammetur. Videas non infrequenter  
viatores in hiſce montibus totos igneos, equos quo-  
que & iumenta ore naribus, flammam vomentes:  
quæ paradoxa merito alicui videri poſſent, niſi à  
R. P. Alphonſo Ditalle Procuratore Prouinciæ Chi-  
lenſis Societatis Jeſu oculato teſte, vt pote qui illud iter per Andes aliquoties con-  
fecerat, id oretenus dum hæc ſcribo præſente, confirmata haberem. Quorum qui-  
dem alia ratio non eſt, niſi quòd ex pingui, & viſcoſo tam hominum, quam iumen-  
torum halitu, ſudoreq, ſubtiliſſimo aëri conuato, & per motum attrito ſubtilia-  
toq, facillimè ſequatur accenſio, atque inflammatio, non ſecus ac in ſuprema re-  
gione aëris, ventorum vi agitati impulſu, igneas impreſſiones fieri videmus. Ve-  
rum de admirabili horum montium natura & proprietate, ex profeſſo in Mundo  
noſtro ſubterraneo tractamus. Verum vna hic difficultas maxime nos torquet:  
qua ratione videlicet calor producat, attritione lignorum, aut lapidum. Qui-  
dam volant eum produci calore virtuali in mixto latente; ſed hoc dici nequit, cum  
aliquando ex mixto ſumme frigido producat, calor quoque ille virtualis ignem,  
accidens videlicet ſubſtantiam attingere nequeat. Nonnulli volunt ſolam rarita-  
tem, quam motus cauſet in corpore attrito; videmus enim corpora quo ſolidiora,  
ſunt cæteris partibus calorem maiorem edere, vt Chalybs magis quam ligna; &  
lapides quòd duriores, eo ad ignem produendum aptiores; nullaq, alia de cauſa  
hoc contingit, niſi quòd inter hæc aër magis attritus & rarior ſit. quod non acci-  
dit per ſolam compreſſionem, qua ſolum ſubtilior redditur, condenſaturque, ſed  
& per vehemētem impulſum, quo vna pars vehemēter propellitur & alteri con-  
denſatur, vnde deinde pars propulſa, ob vacui fugam tanto impetu aliam partem,  
vt illam calefaciat, attrahit. Porro facilius elicitur ignis in angulis, quam in medio  
lapidis, quia nempe certior eſt ictus, & magis determinatus; vel quia facilius rare-  
ſcit, vel quia minor pars interponitur. Quia tamen difficile eſt concipere quò-  
modo attritio, quæ eſt motus localis, poſitiuè calorem producat, & rarietas ad ca-  
lorem ſequens effectiuè calorem cauſet: non enim ſufficit dicere calorem habere  
connexionè & proportionem cum raritate, cum ille ſecundò quòſdā inueniatur in  
coelis ſine raritate, & in ſublunariis ſit caloris effectus: atq, ad eò hæc ſententia non  
ſufficere videtur. Non deſunt qui velint, inde motum localem cauſare calorem,  
quòd eo medio partes minus calidæ & ſiccæ diſtrahuntur, relictis calidioribus &



Mira de meteoris in montibus Peruvia & Chiles.

Quomodo calor ignis attritione lignorum producat.

siccioribus, in quibus proinde intensior calor deprehenditur, produciaturque, & per quas in corpus contiguum transmittitur; Quoties enim duo corpora solida sibi invicem occurrunt media latione, quo magis approximantur, eo magis atteritur aer intercepitus, hoc est, magis segregantur & expellantur partes illius crassiores & advenientia; terra nêpe & aqua, & peregrina impressiones utpote magis densa, magis impediunt occursum illorum corporum, & fortius ab illis impelluntur, & detruduntur, relictis interim purioribus & defæcatis partibus aeris, in quibus viget calor; & prope summus natura sua; & si aliquid caloris ab extrinsecis impressionibus sublatum fuerit, illis remotis, in statum pristinum à propria forma per naturalem emanationem se reducunt, & sic ablatis impedimentis intense percipietur calor in his partibus purioribus. At in corporibus ipsis localiter motis similis calor, & nonnunquam ignis, producitur; Verum nos relictis hisce sententijs, dicimus primo, ignem non produci ex partibus aeris, sed ex lapidis, seu ligni siccis substantia, & consequenter causam efficientem aeris non esse naturam, sed vel immediate Authorem naturæ, vel lumen cœlestis, motu locali, attritione partium, elongatione & raritate dispositibile concurrentibus. Videmus enim ex vna parte, media attritione lapidis duri ad tenuissimas partes ipsius substantia redacta ignem generari; ex alia parte nullam esse sufficientem, proximam, & principalem talis generationis causam; non enim aer, ut ex dictis patet, non corpus attritum, alioquin appeteret sui destructionem, & substantialiter produceret aliquod sibi dissimile, quod causæ sublimarij determinatæ repugnat; non tandem motus localis, raritas, densitas; cum paulò antè ostensum sit eas dispositivè tantum concurrere. Ergo per lumen cœlestis. Fit autem dispositio tali modo primo motu locali, & impulsu attritionis corporum illorum attenuatur substantia. Deindè attenuatiõis forma, vel omnino consumpitur, eo quod cum tam parva tenui, & subtili materia conservari nequeat, vel ita debilitatur, ut proprias qualitates in seipso esse amplius conservare non valeat. Tandem materia illa, vel spoliata forma, vel cum forma iam debilitate siccitatis, & caloris ex ignis prædominio remanentis, maiorem habet dispositionem ad ignem, quam ad quodcunque aliud, idè in tali dispositione posita à cœlestium corporum luminibus forma ignis introducitur. Quamvis etiã dici possit attritionem causare calorem per distantiam maiorem inter partes vel aeris, vel alterius corporis, per negationem indistantiæ partibus corporis continentis magis inter se distantibus, & ad illius exigentiam vel à Deo, vel à cœlestium corporum lumine in eodem aere immediate raritatem; & mediante illo raritatem, aliquando tamen etiã ab ipso aere produci; quando scilicet aer primo rarefcit; & calorem primo concipit; ut dum sagitta projecta calorem concipit; & ignescit ab aere scilicet instrumentali concurrente. Patet igitur, attritionem non alio modo calorem producere, quam quia ex naturali connexionè cum calore & siccitate, movet ad illius exigentiam vel causam proximam naturalem, si invenitur, vel lumen raritatem autem, posito quod sit qualitas, non posse per se producere calorem. Secundam quoque qualitas ex primarum qualitatum mixtione resultans, primas producere nequit, sed ad calorem productum naturaliter sequitur. Sed hæc suffi forsan quam par erat discussimus. Quare ad ignem nostrum revertamur quem si paulò antè ritis consideremus, plura sanè in eo maxima admiratione digna reperiemus. Primo enim in flammam abiens Solis vicariam operam nobis præstat, omnes tenebras luce sua dispellendò. Secundò, flamma nihil permanens, sed merè successivum ens est, penè singulis momentis in sublunaris mundi vnum, ut pereat in nouatur, ut innovetur perit, & non secus ac fluvius, teste Aristotele, semper idem & diversus perpetuò nascitur, & interit. Unde & lux quoque cum in fieri, & conservari à partibus flammæ dependeat, successiva est, & perpetuò evanescit. Atque hoc ita esse ipse fumus, v. g. cereorum ostendit, qui cum ex flamma originem suam

Modus productionis caloris.

Ignis proprietates.

Flamma perpetuo successiva.

ha-

habeat, fumo auolante, & materia flammæ quoque auolabit. Cum ergo flamma eiusdem semper ferè magnitudinis permâneat, si allunde aliquid ex illa auolet, aliunde resolui debet: succedit ergo perpetuò.

Corollaria de Flamma.

Patet ex dictis, ad flammæ productionem solum calorem sufficere; nihil autè in flammam resolui posse, quod in vapores, & exhalationes non sit resolvable ipsa experientia docet. Cum enim partes flammæ sibi perpetuò succedant, debet id, quod in flammam resoluitur, esse tale, ut partes ipsius semper possint alijs aliæ succedere, & perditas flammæ partes restaurare. Quod autem non potest in vapores, & exhalationes resolui; eius utique partes neque possunt sursum euolare, neque locum percuntium flammæ partium occupare; unde aurum, & metalla reliqua, flammæ productioni ob siccitatem non seruiunt. Igitur humiditatem res, ut inflammantur, habeant oportet, neque quamvis humiditatem, sed pinguem, & oleosam; viscidam, qualis in oleis quibusdam, & quinis essentia. Calor quoque ad flammæ productionem necessarius est; cum sine illo nulla rarefactio, sine rarefactione nulla leuitas corporis, sine leuitate nulla flamma, in superna ascensio possibilis sit; unde ridendi sunt, qui flammam frigidam dari posse ridiculè asserunt.

Non datur flamma frigida.

Patet secundo, conuersionem rei in flammam non substantialem, sed accidentalem tantum mutationem esse; cum hæc materia se prorsus eodem modo ad flammam habeat, ut aqua ad glaciem, quæ etsi diuersa videantur, non tamen nisi vna aquæ essentia est accidentaliter diuersa. Idem dicendum est de oleo, sulfure, cera, fauos, aliisque combustibilibus. Sed dices disparem esse rationem; si quidem glaciem in aquam resolui, non verò flammam in materiam inflammabilem. Sed nego assumptum; posse enim flammam in ceram, & simile quid tale denudè reduci, irrefragabilis Chemicorum experientia docent, quæ Tutium in metallum, unde prodijit, Mercurium auolantem, cerussam, & minium in plumbum, unde prodijit, reducat. Noui & ego secretum admirabile, quo ex inflammata rei combustione relictus cinis sibi restituitur; ita ex vegetabilium cineribus vegetabilia restaurari arte chimica possunt; cuius mentionem in arte Magnetica facimus, & multis experimentis, tum in Magia lucis & umbræ, tum in Mundo nostro subterraneo, salem ex plantis erutam, leminatamque, plantam ex qua sal productus est, ratione eiusdem reproduci demonstramus. Liquet ergo argumentum.

Flamma accidentalis tantam mutationem est.

Flamma.

Auctores secretum.

Patet tertio extinctionem flammæ (quæ vel contraria sibi aqua, supereffusio, ne; vel flatu, ventorumque impetu, vel suffocatione, aliisque modis fit) nihil aliud esse, quam cessationem à productione ignis per medium; est enim lux veluti caloris quedam species, quæ pro diuersitate complexionum rerum mille modis oculis occupare potest. Quod nisi concedatur, nulla ratio confingi potest, cur lux mutet colores, si saturatio affulgeat; cur colores lucem mutant; si confundantur, cur vitra colorata tingant. Vt horum ratio assignetur, sub eodem genere proximo ponenda sunt lux & calor, de quibus susus in sequentibus; Sed iam ad Animalium luminosorum naturam nos conferamus.

Flamma perpetuo successiva.



CAPVT VI.

De Photismo Animalium;

Seu

De lumine Animalibus concreato.

§. I. De Lumine Cincindelarum.



Cincindela Græci πυρολαμπη, λαμπηρης ζωον πηδον, cu... hoc est animal volatile in tenebris lucens. Ab Hesychio Cantharis dicitur...

ciolam vocant; insectum est, noctu lucens, estque duplicis generis... penatum, & u... sine pennis. Caput a suprema parte ceu cucullo quodam... elypei inuersi, & incumbentis formam habente totum contegitur...

De... Cincindela.

Natura... in huiusmodi cincindelis.

His tandem studiis hyemem transigimus illam, Ver redijt, iam silua viuet, iam vinea frondet,

Iam

Iam spicata Ceres, iam cogitat hordea messor; Splendidulis iam nocte volitant Lampyrides alis.

Præterea cum a multis animalibus in escam quærat, nullo alio inermi animalculum munimine, nisi hac luce natura instruxisse videtur; hac enim ignea facula, quibusdam inimica, veluti clypeo quodam obiecto, dum ignem putant, hostes absterret, & a venando abstinere cogit...

Cur lumine prædita sint.

Tantula nocte volans volucris micat aere tantum Ardenti similis scintilla; quam puer olim AEquales inter metuebam tangere, ne me Vreret, infirma est atas cum nescia rerum...

Quæritur igitur, quis sit ille splendor, quænam lux, quomodo animalculis hinc sit induta? Aristoteles in Opusculo de feris, ut scribit Philarchus, polita, tersaque apta ex aere & aqua concreta corpora esse ad producendum fulgorem, sed non ad mittendam lucem asserit; ideo animalia noctiluca perpolitata...

Quid sit lux cincindela.

Cur pisces motu lucant.

Offrencia lux.

quæ



*Erucæ noctilucæ  
Americana.*

quæ huius lucis beneficio fieri possunt; consule Magiam lucis & umbræ, vbi ex professo ex hisce mira deducimus. Scribit Herrera, in noua Hispania in montibus Guatimalensibus quoddam Erucæ genus reperiri; quod nemo impunè ob veneni virulentiam contrectet; vnde, luce ventri eius innata veluti lampade quadam, viatores monet, omnibus remis velisque deuitandum, quod tam exitiali luce coruscat.

### *Experientia liquoris Cincindelarum.*

*Liquor lucidus*

**S**ED hoc loco omittere non possum ea, quæ multi sibi spondent de liquoribus Cincindelarum miracula. Sunt, qui hunc liquorem alijs mistum in scribendis litteris adhibent, quæ nemo, nisi nocte legere possit, & in tenebris; imagines quoque in parietibus depingunt, quas ortu solis abscondi; occidente verò apparere volunt. Quidam ita præparant noctilucum humorem: accipiunt lignum salicis putrefactum, & Noctilucam, quæ omnia simul commiscunt cum ouorum albumine, ac ea mistura vtuntur: alij *uulgo* liquorem fieri putant ex omnibus putrescentibus candore, luce ac perspicuitate summa constantibus. Porta materiam Nitedulæ lucidam separatam in porphyretico lapide tritam quindecim dierum sub equino fimo vitro inclusam condit, deinde addito nonnihil hydrangyri per alembicum destillat essentiam, quam ipse putat vitrea phiala inclusam totam domum illustrare. Nugæ nugarum. Quomodo enim humor ille toties mutatus, coagulatus, fixatus, circulatus, putrefactus, distillatus, & edacissimo illo Mercurio mistus in pristina sua puritate conseruari possit, non video. Sunt hæ inanium Agyrtarum & Circumforaneorum iactationes. Ego vt veritatem rei detegerem, certe summa diligentia omnium periculum faciens singula probaui, sed ne quidem vnam guttulam humoris vel ex 50. exprimere potui, imò hunc pauxillum humorem mox ab animalculo separatam, vna cum eodem interire, ac vix vllum lucis sui vestigium relinquere comperi: humorem quoque non nisi eo in loco in quo eum natura ob certos fines abdidit lucis vestigia, præbere obseruaui, extra vero locum sibi connaturalem penitus interire. Si igitur simplex humor ille separatus vix effectum alicuius lucis præstet, quomodo minorem effectum credemus præstiturum tot missionibus deprauatum, & à primigenia natura sua tot alterationibus detortum? Falsa igitur sunt omnia, quæ de piscibus noctu capiendis lucentis humoris beneficio nugatur VVecherus; falsa quæ de illuminandis domibus fingit contra naturæ principia Porta. Cum enim lux huiusmodi, quemadmodum experientia nos docuit, à voluntario animalis motu dependeat, certe deficiente animali, humorem quoque deficere necessarium est. Aliter tamen iudicamus de piscium squammis, & fragmentis cancrorum, ostreorumque putridis; hæc enim ad mira producenda aptam sese materiam præbere possunt, vt in Magia lucis & umbræ videbitur.



## CAPVT VII.

### *De Photismo Aquatilium,*

Seu

### *De luce mirifica quorundam, quæ in aquis natales habent.*



Holades, & Solenes, marinæ sobolis germina è testaceorū genere, quos quidam Dactylos, nonnulli Cappas longas, alij Canales vocant, faxis inclusi topheceis, vitam humore falluginoso merent. Hisce natura humorem adeò lucetem indidit vt, quemadmodum sæpe experientia cōperi, in tenebris non secus ac ignis fulgeant. Meminit horum Plinius hisce verbis: *Solenibus natura in tenebris remoto lumine, alio fulgore clarere dedit, & hoc humore incitato lucere in ore mandentium, lucere in manibus, atque in solo, atque in veste decidentibus guttis; vt procul dubio pateat succi illam naturam esse, quam miremur etiam in corpore.* Certè qui rem non vidit ægrè induci poterit, vt quæ narrantur, vera esse. credat: ego experimentum verissimum comperi: humor siquidem aspergillo in tenebroso aërem dispersus, mox igneam quasi pluuiam ostendit, manus, vestesque, & quicquid lucentis humoris glutine inficitur, non minus ac scintillis, flammisque coruscum reddit. Si quis laridi accensi guttas cadentes vnquam viderit, hæc luculas facile sibi imaginari poterit, Huius portò splendoris causam glutinoso Solenis succo ascribit Rondeletius; nos verius dicimus causam huius luminis esse humorem glutinosum diaphanum ex natura sua lucidum, ob certos fines à natura hisce animalibus inditum, ea ferè ratione qua tenacia pleraque, & veluti glutine compacta, lauia, æqualia, & perpolita, atque ob id relucentia videmus, vt de Cincindelid diximus. Nam hic humor ijs non alia de causa, nisi ad vitæ necessaria conquirenda, inditus videtur, vt in sequenti §. videbitur.

*Mirum experimentum lucentis humoris.*

### *§. I. De Photismo Pulmonis marini.*

**A**Liod maris portentum hic occurrit, quod etsi omnium exanguium ferè vilissimum, & despiciatissimum sit, luce tamen sibi innata non parum nobilitatis acquirit. Vocant id alij Pulmonem marinum, quidam Vrticam, quod verenda manusque vredine quadam occulta mirum in modum afficiat. Huius animalis, siue Zoophyti humorem humori Dactylis inexistenti adeò similem reperi, vt nullus ferè effectus illo, qui non hoc quoque exhiberi possit. Mirum tamen est, quod humor huius Pulmonis virgis nigris, vel quibuscumque alijs rebus illitus, eas non secus ac ignem coruscas in tenebris exhibeat: cuius experimentum primum ad Aquas Martias iuxta Marsiliam vulgo Martegue comperi, & deinde idem quoque Bellonium obseruasse memini, ait enim virgas, baculosque inunctos noctu facium accensarum more lucem vibrare. Vnde collegi in omnibus ferè piscibus huius humoris congenita sibi luce corulci vestigia esse, ac potissimum in mollibus crustaceis, testaceis. Cur verò natura hæc animalia illo lumine imbucere voluerit, hanc causam esse arbitror, quod cum vt plurimum ea in fundo maris hæreant, faxisque adhæreant, fundus autem maris maxime sit tenebrosus, ita vt Vrinatores eum ra-

*Cur natura marina animalia luce diantur.*

dijis solaribus in multis locis nulla ratione attingi posse affirmant, ne animalia in perpetuis tenebris hærentia frustra à natura de ulis instructa viderentur; hunc ipsis viscosum humorẽ mentita luce imbutum natura tribuit, vt eius beneficio, ceu lampade quadam ijs connata, & pabulum quærerent, & lucis tenebrarumque emissionem voluntaria hostium infidias facilius eludentias; ac sic in necessarijs sine suo non destituerentur.

## CAPVT VIII.

### De Photismo Lapidum.

#### De Lapide Phengite seu Phosphoro minerali.



**L**ucentium non ita pridem in agro Bononiensi fossile quoddam, quod certa ratione præparatum, lucique expositum, eam ita imbibit ita tenaciter eam sibi incorporat, vt si loco tenebroso ex theca de promptum exponatur, concepram lucem conseruatamque non secus ac viuos carbones non sine inuentium admiratione diffundat. Et quamuis insignis ille Fortunius Licetus in suo de Lithosphoro libello; eum in solo agro Bononiensi reperiri dicat, ego tamen huius quoque mira apud Tolpham, & in loco, vbi lapides aluminis, vulgo Alum di Kocca, fodere solent; hæud obscura indicia reperi; quæ Bononiensi qualitatibus prorsus similis est. Est enim huiusmodi fossile massa quædam Gypso sulphureo selenitica multum Arsenici, Antimonij, Chalcanti admistum habens, & gypsum quidem calx, in quam facillimè resoluitur; graueolentia sulphur; diaphaneitas selenitim; vis caustica; & pilotrica, seu pilorum defersua, arsenicum; antimonium ad vomitus coneratiua facultas; chalcantum denique mordacitas flatis superque demonstrent; qui effectus in Bononiensi quoque in esse reperiuntur. Ita autem ad lucem imbibendam præparatur. Lapis, vel integer, si purus sit & melioris notæ, in furnulo ad id constructo calcinatur, vel si impuriore partes admittas habeat, in pollinem tenuissimum redactus, ouorum albumine, vel etiam aqua communi, à quibusdam etiam oleo lini in vnam massam redigitur, quæ, si post primam calcinationem, lucem non conceperit; toties huiusmodi calcinatio repetenda est, donec optatum effectum consequaris, quem efflorescentiæ quædam minutissimi roris grana referentes, quas ad superficiem sudare videtur, & in quibus maximè virtus lucis conceptiua, sine alterius rei permissione residet, significant. Hæc igitur ratione præparatus lapis, scrinijs quibusdam, siue arculis ad id præparatis imponitur: si itaque suffuratum lucis splendorem Amicis ostendere desideres, lapidem cum theca Solis diurno splendore, vel si Sol non fulgeat, diurnæ luci, aut etiam crepusculinæ, nec non si noctu, igni valido facibusque accensis expones (ex omnibus enim hiscẽ lucem attrahere, ac in se deriuare potest, etsi cum proportione quadam, ita vt quo lux fuerit eminentior, tanto copiosiori, efficaciorique lumine lapis quoque in tenebris coruscaturus sit) luci expositos lapides aliquantisper, puta quadrantem horæ, ad perfectius & intimius foeturam lucis in se concipiendam theca clausos, in obscurum mox deferres, apertoque scrinio, videbis illos, lucem non secus ac carbones accensos de se diffundere; quæ tamen

Signa lapidis luminati.

Præparatio eius ad lucem imbibendam.

Quomodo includendus.

Quanto tempore leui exponendi.

non perpetuò durat, sed pro bonitate lapidis, aut conceptæ lucis abundantia nunc plus, nunc minus durat, quæ tamen duratio horam nunquam, nisi denuò luci exponantur, excedere solet. Sed paulatim virtute flaccescente extinguitur; experientia tamen docet, ipsam clausa in tenebris pyxide diutius lumen conceptum conseruare. Nota quoque hanc vim lucis conceptiuam in lapide hoc non permanere; sed veluti effatam cum tempore non secus ac Magnetis intermori, vbi videlicet vis ipsa per halitus igneos subtilissimosque calci admistos exspirauerit.

Huius igitur lapidis prodigiosi spectacula, vt maximam apud Philosophos excitauerunt admirationem, ita animos quoque multorum illa luce sua mirabili, ad tam rari effectus causam omni studio inquirendam vehementer accenderunt; vnde quidem, vt in rebus nouis & raris fieri solet, variæ emerferunt variorum opiniones. Alij quidem, cum viderent hoc lumen inclusum pyxide ferri ad locum tenebrorum, & ibidem conseruari sine vlla à corpore lucido dependentia, lumen corpus esse existimauerunt; contra quam communis Philosophorum Scholæ sentiat, & lapidem trahere lucem ea ratione, qua Naphta ignem, & Magnes ferrum trahere solent. Quidam voluerunt, lumen in hoc lapide cœlestis & igneæ substantiæ qualitatem esse, & non secus ac omnia alia Noctiluca, in obscuro lucere. Nonnulli lapidem à lumine ambiente accendi, secundum particulas atomas, in quas affluere resolui volunt; alij alia comminiscuntur.

Sed omnes has adductas rationes & causas friuolas esse, fallaces, nulloque veritatis fundamento inniti ex sequentibus patebit. Et contra primam quidem sententiam ita concludo; si enim ideò hoc lumen corpus esset, quod separato loco à lucido corpore conseruari possit; non esset ratio, cur idem de lumine & calore in ferro candente dici non deberet, cum non secus ac lux in lapide nostro absente Sole, ita & calor lumenque in ferro candente, causa absente Sole, ita & calor lumenque in ferro candente, causa absente, id est igne extincto conseruari aliquandiu possit; sed nemo Philosophorum hucusque calorem & lumen in ferro ab igne productum corpora dixit; ergo falsa est sententia; ergo non est essentialis luminis præsertim secundarij, cuiusmodi hæc nostra lux est, à lucido corpore dependentia, ita vt remoto corpore luminoso, non aliquandiu remaneat lux secundaria; sed subito intermoriatur; hoc enim contra manifestam experientiam est: notamus enim ad niuium Solique aspectum ita lucem nos imbibere, vt locum vmbrosum ingressi cæci reddamur ob speciem luminis oculo impressas. Secundò sequeretur, etiam Magneticam vim corpus esse; siquidem transferri potest ex Magnete in ferrum & ibi remanere, etiam destructo Magnete causa qualitatis productrice; & consequenter omnes qualitates; quod quam absurdum sit, quis non videt? Ad alteram sententiæ partem nego, hunc lapidem ea ratione lucem trahere; qua Magnes ferrum, aut Naphta ignem; Cum nulla in hac operatione interueniat attractio. Magnes enim præterquam quod ferrum alteret producendo in ipso qualitatem, quæ se bono suo perfectiuo coniungere possit, etiam certa ratione id disponendo situat, quorum nihil in hac luminis communicatione contingit; neque enim lapis alteratione locomotiuæ; hac luminis susceptione incitatur; neque vllum etiam certum situm in ordine ad aliud acquirit; sed se merè passiuè ad lucem recipiendam habet; ergo neque vlla ratione dici debet, hunc lapidem lucem, quemadmodum naphta ignem trahere; cum diuersa vtriusque ratio sit; neque enim naphta, propriè ignem trahit; sed ignis dum vaporosam Sphæram, quam Naphta continua expiratione sua pingui & inflammabili fundat, attingit, totum istum bituminosum vaporem tanquam medium inflammationi aptissimum, quasi in momento accendit, & sic ignem trahere videtur. Naphta igitur ignem non trahit, nec ignis Naphtam, vt vulgus putat; sed ignis ad Naphtam, tanquam pabulum longè gratissimum, quantum potest se propagando, accurrit. Non secus ac si post extinctam candelam fumo exhalan-

Lumen conceptum in tenebris fundum.

Varia variorum opinionum de hac luce.

Non vultis lucem, vt naphta ignem.

Quomodo naphta ignem trahere dicatur.

si, quantumvis ab elychnio remoto, candelam aliam accensam admoveamus, statim fumum istum accensum se paulatim propagando, candelam extinctam denuo accendere videmus: hac ratione fulgura quoque & pleraque meteora ignita, ut virgæ, quas stellas cadentes vulgus nominat, quæ tamen Magnetismo carent, accendi solent: verum hanc operationem pulchrè quoque demonstrat experimentum; quod alibi de fulgure per vaporem quintæ essentiæ vini accensum exhibendo, propòsitum: Patet igitur nullam in lucis conceptione lapidi nostro propriam actionem Magneticam interuenire: Quomodo igitur lux in hoc lapide imbibita, conseruetur, aut quænam huius prodigij vera sit ratio, iam restat ut videamus: Ac primò quidem nego hanc lucem esse qualitatem à celesti quadam substantia in lapidem deriuatam; cum quomodo hæc qualitas ex se incorruptibilis descendens, lucem in lapide nostro; non nisi exiguo tempore durantem producat? aut quomodo accensus in atomas particulas continuo sine maxima inconuenientia, & naturalium virium repugnantia resolui possit, dispicere nulla ratione valeam; quæ omnia libenter hic fusijs ostenderem, nisi id egregiè, ac perquam erudite in suo Lithosphoro præstitisset, quem supra citauit, Fortunius Licerus. Dico itaque lumen in lapide nostro productum; non eiusdem esse rationis cum lumine in Noctilucis, ut in quercu putrida, cincindelis, oculis felium, capitibus piscium quòcumq; am, ostreis putribus, mucore nauium, similibusque, non à corpore luminoso producitur, sed omnia dicta lucem propriam, non secus ac ipsi carbunculi propriam, cæterique lapides pretiosi, ad certos fines à natura insitam, qua in tenebris fulgant, habent; quod de lumine lapidis nostri non nisi ab extrinseco sibi communicato dici neutiquam potest, iterum lumen in noctilucis cum subiecto, cui inhæret, perennat; secus dicendum de lumine nostri lapidis, quod simul ac acquisitum est; non multo post tempore paulatim extinctum, in chaos suum relabatur. Ut igitur genuina ratio huius luminis detur; Suppono Primò, aërem à Sole illuminatum, vapore quodam subtilissimo & luci concipiendæ aptissimo refertissimum esse. Secundò, lapidem nostrum per calcinationem, excoctionemque ab terrestrium sordium miscella ita purificari, ut attenuata rarefactaque ipsius substantia crassiori densiorique, per pororum apertionem aptissimum corpus concipiendis vaporibus lumine qualicunq; perfusus, quibus aër præsentem lucido corpore, vel igne, aut Sole plenissimo scateat, reddatur. His igitur ita suppositis, cum poris per calcinationem apertis, lapis noster siccitate sua bibula vapidum illud lucis foetura grauidum, naturaliter appetat, atque non secus ac spongia vicinum humorem, Magnes albus, Spodium, similiaque gypseæ naturæ corpora, labia madefacta, carnes, aliaque humidioris substantiæ res attrahat; sit, ut vapidum illud, luce iam informatum à lapide sitibundo attractum; inibi intra poros recipiatur, ibique actuali frigiditate lapidis cogatur, arteque cum proprijs partibus tenuioribus, & ob salintri copiam translustribus, magisque perspicuis copulatum, in vnum corpus lucidum coalescat. Cum verò vapidum illud illuminatum lapidi adiunctum, à calore, cui permixtum, est facile consumatur, lumen quoque, cuius dictum vapidum veluti vehiculum quoddam est, vna cum vapido destrui, necesse est. Et ne quisquam, omnem calorem hanc proprietatem habere existimet, illè sciat, misturam huius lapidis eiusmodi esse; ut cum vapido ex sua quoque parte ad lucem concipiendam concurrat, ob Antimonij & Salintri misturam, quæ in alijs locum non habent atque hæc quidem mea circa dicti lapidis naturam opinio.

*Lucis lapidis & Noctilucis differt*

## Confectarium.

EX dictis sequitur, qua ratione multa eaque admiratione dignissima spectacula, huius fossilis ope, quæ ob raritatem suam non minimum inter Magiæ naturalis sacramenta locum obtineant, in tenebris exhiberi possint; v. g. Christum Dominum plagis fulgentem, Paradisi gloriam, calce iuxta Sciographicas regulas disposita; oculos animalium fulgentes: ut statim in tenebris inuisibilia, mox visibilia reddantur, atque innumera alia, quæ quibus pro ingenij sui sagacitate excogitare poterit, vide de vtu huius lapidis Magiam lucis & vmbre.

*Mirabilia que huius luminis lapidis ope exhiberi possunt.*

## CAPVT IX.

## De lucis proprietatibus &amp; vtu.



AM obstrusam, & reconditam lucis naturam inuenio, ut quo plus in ea prouehi sentio, tanto me maioribus tenebris inuolui videam: Nycti coracis tamen instar oculos aperio, ut quantum fragili ingenio competit, aliquem saltem lucis radium sustineam. Notandum igitur lucem variè considerari posse, vel prout est in corpore lucido prius, deinde prout ab eo diffunditur, mox prout in medio recipitur. Denique ut in passo, seu vltimo terminare spectatur.

Prima itaque lucis proprietates est, quod sit intima corpori lucido, ita ut ei nihil coniunctius esse possit, cumque sit eius proprietates, & illius forma, subiectum, gratum, pulchrum, vtile, commendatione, imò & admiratione dignissimum efficit, idque tanta virtute instruit, ut cætera quoque illuminare possit: vnde omnium qualitarum purissima, efficacissima, nulla corporum seditate polluta; omnium diues, nulliusque indiga, cum omnes colores, odores, sapores, imò & quatuor primas qualitates virtute contineat, inuincibilis, & indomita, cum nulla caligo sit, quam non dissipet, nec tanta distantia, quam non sui diffusionis superet, neque vllum agens creatum, quod eam destruere possit, neque contrarium habet propriè sumptum: quapropter facillimè quaquaersum diaphanis dominatur corporibus, per vniuersas mundi plagas suum exercens imperium.

*Mira via luminis.*

Prout autem consideratur ad extra lux, se ipsam absque vlla sui diminutione rebus communicat, in momento se diffundens radio non tortuoso, vel sinuoso, sed recta, & breuissima linea, ad effectum breuius attingendum à natura instituta: quam quidem agendi rationem omnia agentia naturalia æmulari videntur, ut postea videbitur. Quando autem descendit inferius, tantò plures emittit radios, cuius conus sit in ipsa luce veluti fronte, basis autem in medio, vel obiecto illustrato, adeoque, ut quaquaersum radij diffundantur, sicuti centrum, seu punctum, aut centrum circuli in totam circumferentiam innumeris lineis vniformiter difformi illuminatione diffunditur, ut postea de clarabitur.

Prout verò lux recipitur in medio, constat eam omnes medij particulas illustrare, ac veluti informes animare. In medio quoque subinde aut reflectitur, aut refringitur, de quibus fusè in Arte Anacamptica, & Anaclastica tractatum reperies: prout verò in suo termino spectatur, hanc proprietatem habet, ut corpora quantumvis opaca, aut etiam ex parte diaphana, perspicua reddat, à tenebris discussa cali-

caligine liberet, omnes colores manifestet, quos sine luce emitti nulla ratione posse experientia nos docet: imò non colores tantùm, sed & rerum magnitudinem, figuram, numerum, motum, quietem, vnitatem, asperitatem, læuitatem, acumen, æqualitatem, inæqualitatem, similitudinem, dissimilitudinem, extensionem, propinquitatem, distantiam, situm, diuisionem, pulchritudinem; turpitudinem, opacitatem, & diaphanitatem, tempus actionum, & passionum ostendit. Inter alias tamen proprietates diffusio illius per medium ad eò admirabilis est, vt sensu quodam prædita videatur: nam cum in corpora incidit diaphana, quasi per cognata, lætabundum sese insinuat, eaque & penetrat, & quaquaversum permeat, ea totali hilaritate sua, & fecunditate replens veluti animat. Opaca verò obiecta quasi naturæ suæ contraria, eeu indignatione quadam auersatur, & quasi ea tetigisse ipsum poeniteat, ab eis resilit illico, cognata repetit, & potius frangi eligit, quam hostili disparatoque coniungi confortio. Si verò aliquid occurrit alicubi in opaco foramen, per illud sese præcipitans elabatur, & veluti hac fuga gloriabundum latius, atque amplius, quam foramen contraria parte se ostentans, tenebrarum regno illudere videtur; verbo, tanto lumen sese amplificandi tenetur desiderio, vt quoquo modo potest, id faciat, imò in angustissima quæque foramina sese colligere non dedignatur, dummodo per illa in amplius se fundat; trans enim foramina quæcumque, quantacumque, & qualiacumque transire non indignatur, & trans ea maius quam in foramine, & latius sese ostendere; remanere tamen ibi dedignatur. Si quis obstructo foramine id carceri mancipare nitatur, rem omnis carceris, & repaguli impatientem hoc ipso lumen retineret. Si quis verò ingenuè agens transitum per quodcumque foramen præberit, tunc intra fissuram benignè se insinuando, in perfectissimam omnium orbicularem scilicet figuram magnificè se expandendo quanto perfectionis amore teneatur, palam ostendat. Neque tamen in vilo foraminum transitu constringitur, aut densatur, etsi lucidius ibidem, etsi multum à foramine semotum, dilatatumque rariùs, hoc ipso indicans vires suas fonti viciniore esse fortiores, dum quanto foramini propius, tanto illuminet viuacius, etsi angustius, maiori verò digressu latius quidem illuminat, sed languidiùs, quasi inter antiportus fissurarum foraminumque strictum, coarctatumque, vires, & robur assumat; dilatatum verò, seu in diuersa abiens, districta disunitaque virtute euadat imbecillius. Tanto autem rarefcit amplius, quãto remotius à fonte suo discesserit, ita vt tandem veluti nitoris proprii oblita cum vmbra coniugium ineat, & tandem contrarijs tenebrarum filijs locum cedat. Visa igitur *αυτὸ δὲ λου* lucis natura, & mirificis in rerum vniuerso lufibus, nunc ad particulares eiusdem dotes explicandas calamum conuertamus.

*Mira lucis facultas in corporibus diaphanis*



## CAPVT X.

*De natura, & efficientia Luminis in mundo sublunari, eiusque casualitatibus, scholastica disquisitio.*

## §. I. De necessitate Luminis.

**L**UMEN necessariò existere, supposita rerum natura, neque esse ex eorum genere entium, quæ contingentem habent existentiam, communis sapientum opinio est, atque hinc inductionibus probatur. Inter visibilia maximè locum habent corpora colorata, quæ videri nequeunt, nisi per genesim suarum imaginum in medio, earumdemque ad oculos transmissionem; sunt enim hæc species in medio, sicuti actus in subiecto, & forma quædam in materia sua; cum verò actus actiuorum non fiant, nisi in subiecto disposito, & formæ non nisi in materia determinatè ad eas appropriata producantur, ac proinde colorum coloratorumque, imagines in medio proximam quædam dispositionem subiecti, in quo fiunt, & insunt, requirant; erit hæc vltima forma, & dispositio in actum visibilium imaginum species, formaque educens, nihil aliud, nisi lumen. Lumen igitur mundo ita necessarium est, vt sine eo consistere nequeat: præsertim quod sidera in hæc inferiora non agant, nisi lumine calorifico, omnis autem generatio rerum calore fecundo, illa radiorum cœlestium profluuio inferioribus communicato perficiantur, patet mundum sine lumine consistere non posse. Necessarium igitur mundo Lumen est.

## §. II. De finali causa Luminis.

**F**inalis Luminis causa alia est communis, alia propria: communis triplex est, Deus, Mundus, Homo: Deus ad quem tamquam ad vltimum finem coordinata sunt omnia, cuiusque gratia quæcumque secundum naturam agunt, agunt omnia: Mundus, ad cuius ornatum, & perfectionem lumen à natura institutum est, sine quo nec *κόσμος* dici posset, nec debita sibi perfectione gaudere. Homo denique, qui cum finis sit, Philosopho teste, rerum omnium, finis quoque luminis dicendus est, cuius naturalis appetitus, est intelligere, & scire omnia. Cum hæc autem sine sensibus, potissimum sine visus ministerio non possideantur, ad multas rerum differentias, & ad res intime cognoscendas, necessarium prorsus illud lumen fuit. Propria causa finalis triplex quoque est, Calor, Color, Lux. Calor omnium generationum auctor, ad cuius genesim nil nisi lumen institutum videtur, vnde rectè Philosophus *ἡ λου ἀρχὴν γενεῶν*, Solem principium generatiuū vocat, genesesque rerum sublunarium non nisi à Solis calore ad nos accedentes calores fieri credit. Calor verò, ad cuius speciei actu visibilis productionem lumen solum à natura datum est, vt paulò ante demonstratum fuit: tum denique lux, seu corpus lucidum, cuius videndi gratia lumen est veluti species quædam representatiua, cuius lumen eeu instrumentum quoddam ad calorem in inferioribus producendum deseruit.

§. III. De causa materiali Luminis.

Plato causam luminis materialem voluit esse *τὸ φῶς τὸ ἐποικείμενον πᾶσι τοῖς κόσμοις, καὶ πάντα τὰ τοῦ κόσμου σώματα*, lucis subiectum esse totum mundum, & omnia eius corpora; Aristoteles verò *φῶς ἀπὸ ἀέρος ἢ ἀπὸ ἀέρος καὶ ὁ διαφανὸν καὶ ὁ διαφανὸν*, id est, luminis materialem causam esse perspicuum, vt perspicuum vtraque bona est. Quæ tamen vt intelligantur, notandum est: Perspicuorum duo genera esse, perspicuum indeterminate, vti omnia diaphana: & perspicuum terminatum, vt sunt omnia opaca, & colorata corpora; Illud perspicuitatem in omnibus partibus extremis, & intimis; hoc in extrema tantum superficie eorundem corporum admittit perspicuitatem, intimus, huius extremus actus; vtriusq; illius lumen est. Luminum ergo materia proxima est corpus perspicuum, in quo genere analogo præcipuum analogatum est perspicuum diaphanum, vt aër, aqua, vitrum, & id generis, quæ lumen intrinsecus admittunt; minus præcipuum analogatum est perspicuum *ἀδιάφανον*, vt Luna, terra, mistum, coloratum, & alia, quæ lumen accipiunt in sola superficie, in qua solam habent perspicuitatem ab externo diaphano genitam, si quidem omnis natura eius est essentia procreatrix, qualis ipsa est, quemadmodum sapienter lib. 3. physcor. tradit Aristoteles.

Duplex perspicuum.

Præcipuum analogatum quid sit.

§. IV. De causa formali Luminis.

Cum substantia præter alia in eo differant ab accidentibus, quod illæ quidditatiuè; hoc autem per additamentum subiecti definiantur; sit, vt genus, quod in definitione substantiarum designat materiam, in definitione accidentium designet formam. Cum verò accidentia sint actus, & forma subiecti sui, lumenq; speciale sit actus & forma perspicui corporis, ne quis obijciat formæ formam esse in eodem censu, præmittimus, accidentia, quæ omnia sunt formæ partium, erga suam materiam esse proprias formas totius à scholis appellatas, quæ sunt eorundem causæ genericæ; vt nihil aliud sit quærere formalem causam accidentis, quàm genus ad quod reducat veluti species, quia nimirum ex genere suo lumen est forma, nec aliam causam formalem physicam habet, quàm seipsam. Nam cum rerum omnium suprema genera ad substantiam, & accidens reuocentur, lumen non esse substantiam, sed accidens, ac proinde formam physicam, hisce argumentis manifestum faciemus.

I. Omne quod à luce, vel lucido formaliter oritur, sicut albedo, & album, id omne est accidens: At à luce formaliter producitur lumen; ergo lumen non est substantia; sed accidens: si enim à luce produceretur substantia, ageret vltra vires suas procreans quid se ipsa perfectius, quod est absurdum: ergo lumen accidens est, non substantia.

II. Quod adest, vel abest sine subiecti corruptione, est accidens; lumen aëri, perspicuoq; adest sine eiusdem corruptione: ergo lumen est imago lucis, speciesq; visibilis rei lucidæ; at imago facultati cognitrice repræsentans obiectum non est substantia; sed accidens: ergo.

III. Quod remitti, & intendi potest, accidens est; lumen intendi, ac remitti potest tum ad condensationem, rarefactionemq; subiecti perspicui, tum ad vicinitatem distantiamq; lucidi, à quo producitur, tum ad maiorem, minoremq; perfectionem opaci corporis cum perspicuo corpore: ergo.

IV. Quod aduenit enti in actu accidens est, non autem forma substantialis: lumen aduenit ætheri, aëri, alijsq; perspicuis corporibus, quæ sunt entia in actu: ergo.

V. Finis

V. Finis & terminus alterationis, quæ fit eodem manente subiecto, non est forma substantialis; sed accidens: lumen est finis illuminationis, quæ est alteratio facta inter tenebras, & lucem, eodem manente subiecto perspicuo; ergo. Cum verò lumen non sit quantitas, neque relatio, neque actio, necessario in categoriæ qualitatis album adscribetur, & quidem in tertio genere qualitatis constitutum; atque ex earum passibilium qualitatum censu est, quæ passionem efficiunt in sensu. Formalem igitur causam luminis assignauimus, quod ex genere suo ipsum sit accidens, & forma physica. Si de causa formali metaphysica ageretur, diceremus illam esse, quæ in definitione metaphysica luminis habet locum differentia.

§. V. De causa efficiente Luminis.

Causa itaque luminis princeps, totalis, & adæquata, & principium, quod lumen in perspicuo generat, est corpus lucidum absolutè, quod simplici sua præsentia de se fundit lumen, & ipsum generat per simplicem actionem in perspicuo, qualescumque id fuerit. Causa partialis effectrix luminis, & principium, quod primò lucidum corpus afficit lumen in perspicuo, est lux, forma videlicet constituens lucidum in esse lucidi, quam formam consequitur lumen in diaphano, sicuti colorum imago visibilis in medio, & umbra in lumine, corporis consequitur opacitatem. Non alia ratione ignis ardens in rogo calorem gignit in aëre, qui calor aëris consimilem generat in adstantibus, qui tamen non ab aëre, sed ab igne primo calefactionis principio calefieri dicuntur. Sicuti igitur calor speciem quidem sui in aëre gignit afficientem homines, ita corpus lucidum simulacrum & speciem lucis, visibile videlicet lumen in perspicuo producit, vti vultus hominis in speculo sui imaginem; ac veluti coloratum corpus coloris sui imaginem in diaphano illuminato. Sicut verò coloratum corpus imaginem sui fundit in medio non ab vno puncto tantum, sed à tota superficie; ita lumen lucidi corporis imago non ab vno puncto lucidi corporis; nec ab eiusdem tantum centro, sed à tota eius superficie lucida diffunditur. Causa igitur effectiua adæquata luminis est corpus lucidum, qua tale; primaria quidem illius lux est qualitas, cuius genuina imago, speciesque lumen est in medio perspicuo productum.

Quomodo corpus lucidum lumen in perspicuo producat.

Corollarium Primum.

EX quibus patet lumen in sui generatione à corpore lucido non educi de potentia materiae perfectæ diaphanæ, sed ex extrinsecus aduenire à perfecta luce: quod ita demonstro. Formam educi è potentia materiae subiectæ, nihil aliud est propriè quàm formam oriri à generante per transmutationem materiae substratæ habentis in se quoddam illius formæ rudimentum: at nulla ratione hoc lumini competere potest, sed diaphano extrinsecus id vt adueniat oportet, quia lumen è lucido producitur in Diaphano, sicut species producuntur in aëre; species autem sensibiles, vt obiectorum simulacra, ab obiectis in medio, & in organo sensuum gignuntur, non per earum educationem ex materiae patientis potestate, sed potius ab obiecto inducuntur in materiam: ergo lumen non educitur ex potestate materiae: quod & ratio conuincit, siquidem in eodem medio sicut sunt, & gignuntur ab obiectis contrarijs formæ contrariæ, vt nigrum, & album; ita subiectum idem nequit esse in vltima dispositione ad formas contrarias; formæ verò, quæ de potentia materiae educuntur, ad formas contrarias contrariæ sunt dispositiones: ergo. Iterum, formæ, quæ nascitur immediatè ad præsentiam sui efficientis, & ad absentiam immediatè

Lumen non educitur à potentia materiae.

Quid sit educi à potentia materiae.

denascitur, non educitur è potentia materiæ; talis forma lumen est, ergo. Sicut denique imago vultus nostri non educitur è potentia speculi, in quo formatur nobis præsentibus, ita & lumen: ergo lumen non educitur è potestate materiæ. Quod erat propositum. Et confirmari potest eo eo, quod species intentionales dicuntur spiritualiores quam cætera accidentia, minusq. materiales.

### Corollarium Secundum.

*Lumen non est  
simplex emana-  
tio, sed non pro-  
ductio.*

**H**inc sequitur quoque originem luminis non esse simplicem in diaphano emanationem, sed veram productionem nixam actione lucis, siquidem lumen non producitur, causa efficiente otiosa, siue nihil operante. Quemadmodum risibilitas in homine consequitur animæ rationalis essentiam nihil molientem, & magnitudo in corpore naturali naturam materiæ nihil agentis consequitur; sed à lucido corpore realiter operante, verè, & realiter producitur. Quæcumque enim, per emanationem ab aliquo profluunt, ab eo dependent, vt affectiones, passionesq. à causa formali, vel materiali: sed in præcedentibus demonstratum est, lucidum corpus non formalem, nec materialem, sed efficientem causam esse; ergo per simplicem emanationem oriri non potest; sed per productionem realem agentis operationi reali innixam. Iterum, quæ per simplicem emanationem ab aliquo fiunt, ea vt plurimum heterogenea sunt; sed lumen est imago lucis, & illi simile, & homogeneum; ergo id veram, & realem productionem oritur à luce tanquam à causa efficiente.

### Corollarium Tertium.

*Definitio lumi-  
nis.*

**P**atet igitur lumen nihil aliud esse, nisi sensibilem qualitatem physicè productam à corpore lucido præsentem in corpore perspicuo, cui assistit procreatiua caloris, detectiua colorum, & repræsentatiua sensui lucidorum, à quibus diù conseruari potest in diaphano. Quæ quidem definitio causas omnes luminis attingit; formalem, dum eam dicit qualitatem sensibilem; materialem, dum corpori diaphano id assistere; effectricem, dum eam reali efficientia à corpore lucido conseruari; finalem denique, dum productiuum caloris, detectiuum coloris dicit.

## CAPVT XI.

### De admirandis luminis facultatibus in producendis naturæ sublunaris prodigijs.



**M**IRAM luminis fertilitatem agendique efficaciam esse, non aliunde melius patet, quam ex mirandis, quæ pingit, & fingit in aëre, miraculis. Quæritur igitur, qua efficientia ea præstet. Quod vt fiat; notandum est, lumen nisi semper in omnibus sibi simile procreare, atque in hoc assimilari agentis vniuoco sibi simile in specie producere affectanti; lumen autem reuera passim à lumine generari experientia luculenter docet: primò enim lumen radiorum generat lumen aliud extra radios in aëre con-

ter-

termino; quod si quis neget, eadem opera aërem tenebrosum negauerit: quod cum absurdum sit, & experientia reclamet, necessario lumen sibi consimile aliud generare dicendum est. Deinde notum est, lumen, cum ex corpore opaco, terfoq. re-percussum, tum in medio densiori refractum, lumen producere, quod pro varietate materiæ, & pro diuersitate primi efficientis varias nanciscitur appellationes; de quibus accipe sequentia experimenta.


### Experimentum Primum.

#### De colore diuersarum Flammarum.

**S**i in scutella quapiam ærugineum colorem aqua vitæ, siue stillatitio liquore commiscueris, & deinde præparatum humorem accenderis; videbis non sine admiratione flammam intenso colore virentem: si verò cinnabarim dicto liquore commiscueris, accensus liquor intensissimi ruboris flammam tibi exhibebit. Si præterea sulphur eidem admiscueris, caruleam flammam habebis, eandem quidem flammam, sed pro diuersitate materiæ, à qua nutrimentum acquirit, diuersimodè tinctam.

### Experimentum Secundum.

#### De colore apparente.



**A**ccipe spheram vitream aqua limpidissima repletam, eamque ita exponito, vt ex ipsa lumen Solis incidens in oculum tuum reflecti possit; Sit sphaera B C D, oculus E, A F, radij Solis terminantes, & videbis in D, puncto intensissimum ruborem; mutato vero angulo, videbis colorem illum manifestè variatum; ex rubro in puniceum fluo mistum. In K, quoque idem simulacrum coloris rubei apparebit; etsi multò, quam in D, debilius; cuius quidem alia ratio non est, nisi varia in medio densiori refractione, veluti per diuersos gradus deficiens in diuersos colores abit, cum color diuersus in huiusmodi rubeis corporibus apparens nihil aliud sit, nisi lux per varias refractiones variè affecta: ita lumen Solis incidens in B, punctum sphaeræ in medio refractum densiori incidit in C, & hinc reflexum reper-

E 2 cuti-

cutitur in D; & deinde ex D, refractum denuò, tandem oculum E, petit. Cum igitur hic lumen bis refringatur, semel in homogeneo medio reflexum, tandem ad H, peruenit; necessariò illud varie debilitatum à nativa sua claritate quasi in umbratilem quandam lucem degeneratum, oculo tandem accidit; atque huiusmodi refractionem multiplicem causam esse colorum, inde patet, quod in K, rubor multo variat à rubore in D, utpotè qui ad puniceum vergat; qui color cum remotior sit à colore albo, quem lux refert in puncto D, plures quoque refractiones eam pati necesse est; radius enim Solis F, in G, incidens, refringitur in H, hinc in I, & ex I in K, ex hinc denique in oculum E. Vides igitur tantò umbrofiosem fieri colorem, quãtò plures admiserit refractiones in aliquo corpore circulari, siue polyedro diaphano. Verùm cum de hisce & similibus ex professo in Magia nostra Catoptrica agamus, eò lectorem remittimus. Sufficit nobis, colores omnes apparentes nihil aliud esse, quàm lumen Solis in medio densiori, quã reflexione, quã refractione, diuersimodè affectum, quòd tantò à nativo lucis colore discedit remotius, quantò per varias refractiones tanquam per multiplices superficies corporis, quod transig magis fuerit debilitatum umbrofiusq. redditum. Sed hæc in sequentibus fufius.

Coloris aurora.

Quoniam igitur lumen incidentiæ generat lumen, & repercussiones in superficie speculi, seu diaphani terminati, & refractiones etiam in secundo diaphano densiori; quod quidem secundum lumen vtrunque nuncupatur nomine fulgoris, atque splendoris; Deinceps quoniam ab hoc secundo lumine generatur tertium lumen extra punctum reflexionis, & extra materiam refractionis in diaphano, lumen, inquam reflexum, & refractum; sit ut inde lux variè modificata, varias colorum rationes adipiscatur. Ita à radijs Solis manè in vaporibus horizontium refractis, oritur rubedo quædam coeli intensa, quam auroræ principium dicimus; & nihil aliud est, quàm Solis lux variè, & profundiori in medio refracta; qui rubor tantò plus ad luminis essentiam accedit, quantò Soli horizonti magis magisq. approximaerit, quantòq. maior atmosphæræ pars fuerit illustrata. Idem dicendum est de Solis radijs in vapore partis horizontis occidui, crepusculumque vespertinum constituentibus refractis, vbi clarè videtur ex lucido, claro, & sereno, lumine Solis horizontem stringentis, in flauum, & croceum, hinc in rubeum, ex rubeo in cæruleum, & hinc in tenebrosam umbram definere: quæ quidem colorum diuersitas ex varia reflexione confinium lucis & umbræ in medio rariori originem trahit.

Color iridis.

Porro à radijs iisdem exceptis etiam vigente die refractis, in nube rosida Soli opposita generatur lumen coloratum & variegatum iridis, de quibus in Magia nostra Catoptrica. A radijs iisdem solaribus in nube Soli supposita fiunt *παράλλια*, seu lumen generatur geminati, aut triplicati Solis. Ab iisdem radijs refractis omnes nubium, virgarum, arearum, fouearum, aliarumque meteorologicarum impressio-num nascuntur colores; Cælorum quoque, Cometarumque phænomena originem trahunt. Ita ergo lumen ut agens vniuocum generat in perspicuo, seu diaphano nouum lumen, aut eiusdem speciei, ut lumen secundum repercussum, siue ab aère extra radios, seu à speculo extra rectitudinem lucidi, refractumque à secundo diaphano speciem radiorum non mutantem, aut diuersa quodammodo speciei & eiusdem generis proximi, ut lumen secundum refractum in nube, ac vapore sub specie vel iridis, vel virgarum, vel pæriorum, vel aliorum id generis.

CAPVT

## CAPVT XII.

*Quomodo Lumen genere colorum visibiles species in medio.*



VPPONO primò contra quosdam, qui existimarunt lumen efficienter quoque colores producere in corporibus coloratis; deinde lumen non esse causam instrumentalem, neque totalem producendarum specierum visibilium. Non prius, quia in tali productione lumen ageret ut habitus; habitus autem causa instrumentalis esse nequit. Non posterius, quoniam in ea productione colores maximè operantur, quibus lumen cooperatur: nam lumen de se nullas in perspicuo colorum imagines producere potest: cum enim lumen se habeat ad omnes diaphani partes indifferenter; non est ratio, cur in hac parte potius, quàm in ista, rubrum, album, aut alterum colorem generet. Tota igitur ac sola efficientia luminis hoc præstat, quòd attollat colores omnes, ut sine materiæ sibi subiectæ ministerio singuli imaginem sui visibilem in diaphano procreare valeant. Agit igitur lumen in efficientia colorum, ut principium quo, siue ut agens primarium partiale; non quidem ut forma coloris, cum color ex se verum habeat sui productionis simulacrum, sed ut agens colores supra subiectæ sibi materiæ conditionem ad immaterialem utcumque sui ipsorum similitudinem producendam eleuans: nam cum color sit forma materiæ immerfa, lumen verò ab omni materiæ contagione remota; forma verò materialis ad operandum sit inepta, neque se supra materiam eleuare possit; necessariò principio indiget immateriali, quod supra materiæ suæ conditionem ad aliquid à subiecta materia independens producendum eleuatur: quod quidem nihil aliud est, quàm lumen; hoc enim colori iunctum efficit ut color formet in diaphano speciem visibilem, ceu sui quoddam ab omni subiecta materia semotum simulacrum; in medio inquam producat imaginem ea prorsus ratione, quo intellectus agens efficit, ut phantasmata in organo materiali imaginationis stabulatia, sub conditionibus indiuiduatis, materialibusque, non cooperante ipsis phantasmatis organo materiali, nec vlla conditione indiuiduante, de se in mente possibili suam ipsorum imaginem penitus immaterialem producere possint. Quod igitur species coloris sit immaterialis, id habet à lumine immateriali: quod verò sit obiecti representatiui certi coloris, non habet à lumine ad omnes colores indifferente, sed à determinato colore, à quo producitur. Verum de hisce vide fufius in sequentibus.

## CAPVT XIII.

*Quomodo per lumen calor generetur in terra, in aere, siue atmosphæra.*



VPPONO primò, lumen ad productionem caloris esse agens æquiuocum: siquidem ignis noster si calefacit, formaliter & ut agens vniuocum calefacit, non autem in quantum lucidus est; ita enim agens æquiuocum est; est enim proprium vniuocorum agentium sibi similia, sicuti æquiuocorum dissimilia sibi producere. Si enim ignis calefaceret in quantum est lucidus, certè candelæ alicuius

ius

ius, aut siccissimarum stipularum flamma multò intensiorem calorem produceret, quam carbo seu ferrum candescens; quod experientia repugnat: ergo non vniuocè, sed æquiuocè ignis calefacit.

Suppono secundò, lumen non vbiq; calorem producere, sed in materia caloris appropriata: non in æthere ob expansi corporis tenuitatem: nec in aqua immediatè, vt postea videbitur; neque in abyssu telluris, propter opacitatem, & crassitiem molis impedièntem.

Restat igitur calorem produci per lumen in solis mundanorum corporum superficiebus. Quomodo autem id fiat; iam explicandum est. Notandum igitur aërem natura sua calidum, & humidum esse, atque vtrisque qualitates valde remissas habere, ac proinde aërem ob subtilitatem suam facile in ignem mutabilem. Cùm igitur experientia doceat caloris limam siccitatem esse, vt potè qui humiditate repleta illa valde acuat, & diminuatque. Cùm præterea humiditas sit veluti gluten quoddam, quo partes corporeæ ad inuicem connexæ continentur; certè partium continuitas tolli nequit, nisi priùs humiditas agglutinans fuerit sublata eius productrix, tum conseruatix; Humiditas verò illa tollitur, si partes aëris continuatæ incidantur, atque in minutissimas partes veluti diffindantur. Ad hanc autem partium incisionem peragendam, nihil aptius est subtili illa radiorum solarium in partes densiores propagatione, quæ quidem tantò efficacius agent, quanto radij illi in corpora opaca, crassaque rectius illabentur: tantò autem rectius illabentur, quanto *απο τοῦ ὀρθοῦ* in telluris; reliquorumque mundanorum corporum superficies normalius se insinuauerint: Radijs enim dicta ratione incidentibus, cum in opaco corpore vltior non detur transitus; radiorum in se reflexorum ex infinita quadam multiplicatione aërem *μακροῦ βουέων*, vt cum Philosopho loquar, vehemens quoque aëris sequatur incisio, minutissimaque veluti discissio; discissionem verò humiditatis per continui dissolutionem; diminutio; humiditatis verò diminutionem, exterminationemque necessariò consequetur vehemens aëris raritas; hanc calefactio excipit, & subinde quoque ignitio, seu in igneam substantiã mutatio; aëris autem continua radiorum solarium vibratione dissolui disgregarique, is solus nescire poterit, qui lumen ex vehementi disgregationis, dissolutionisque, qua pollet virtutè, in organo visuo dolorem efficere nescit. Vnde non sine ratione species sensibilibus excessiuas, exuperantijs sensus corrumpi Philosophus statuit: soluitur enim organa forma, & proinde vnitas, & integritas, partiumque corporearum continuitas à forma, & anima illis inexistens. Lumen igitur intensum potèst dolorem in oculis excitare, eorumque constitutionem dissoluere; estque commune omnium Opticorum dogma. Si igitur corporeas partes lumen dissoluere potèst, quantò facilius, meliusque corpulentiam aëris multò corporeo organo subtiliorem, tenuioremque? Certè antiqui ad hanc virtutis vim dissolutionis significandam, non incongruè simbolo sagittarum Apollinis manibus inferatarum, ad vehementiam in caloris productione, solariumque radiorum actiuitatem occultè indigitandam, vsi sunt. Verum de hisce vide Astronomiam nostram hieroglyphicam, vbi multa curiosa, & erudita ad hanc rem pertinentia reperies.

Ex dictis igitur patet, qui lumen causa caloris sit non ex motu, quo mouetur, sed potius ex motu, quo mouet, & dissoluit aëris leni, humidique pertinaciam, qua superata calorem sequi necesse est.

Confectarium.


**H**inc patet primò, cur loca æquinoctiali viciniore maiores calores, æstusque patiantur. Cùm enim solares radij in se reflexi vehementes cauant aëris discissio-

Quando calor producatur.

Caloris limitis siccitas qua.

Quomodo calor producat in incisione aeris per radios solares facta.

Sagitta symboli radiorum Solis.



discissiones, vehementem quoque calorem sequi necesse est, qui quidem tantò erit vehementior, quanto ad normalem reflexionem propius accesserit. Hinc Zona torrida Solis rectà incumbentis æstu Aristoteli prope reddebatur inaccessa. Sed rem demonstremus. Sit terra A, Sol B. quoniam igitur Sol radijs suis terram A. sub Zona torrida ferit normaliter, illi resiliens in seiplos ex maxima aëris discissione, calores efficacissimos mirifica quadã proportionem in loco angusto multiplicati causabunt: At sub sphaera obliqua cum radij solares incidat lateraliter, & obliquè ex L reflexi in O, iuxta angulorum acumen, vel obtusitatem, vim quoque caloris intendi remittiq; necesse est. Quanto enim maior & acutior fuerit triangulus sectionis radiorum LNO, tanto quoque maiorem in subiectis terræ locis calorem gigni necesse est. Sed sub sphaera frigida, seu parallela, cū radij solares in R obtusissimū angulum cum terra constituat necessario obtusior quoque calor nascitur, imò nullum penitus sectionis radiorum triangulum efficiunt. Hinc perpetuo damnata gelu rigeſcit Zona. Sed hæc clariora sunt, quam vt dici debeant.

Hinc patet quoque, quod sicut se habet annua Solis accedentis, recedentisque supra aliquem horizontem radiatio; ita sese quoque habeat diurna eiusdem supra horizontem radiatio. Quò enim annua sua conuersione vertici nostro fuerit propinquior, & quò singulis diebus meridiano fuerit vicinior, tanto quoque maiorem æstus intentionem acquireret, ita vt sol horizontalis hybernos, meridianus verò æstiuos nobis radios perfectè referat, sitque quatuor anni partium cum partibus diei mirifica quadam proportio, & exactissima dimensio, Verum de hisce vide plura in arte nostra Anaclastica.

Annua solaris motus in diurna comparatio.

CAPVT XIV.

Quomodo calor frigiditatem, siccitatem, humiditatem in sublanari mundo producat.



**N**OVVM sanè cuiuspiam videri potèst, quomodo ab eadem causa efficiente in eadem materia diuersi, contrariique effectus caloris, & frigoris, humiditatis, & siccitatis produci possint. Verum vt *απο τοῦ ὀρθοῦ* explicetur; Nota nos hic non agere de frigiditate illa, quæ telluri ob radiorum in eam illabentium obtusitatem contingit, cùm ille caloris defectus nequaquam sit ex parte Solis, sed ex parte telluris lucem Solis commodè non potentis excipere: neque agitur



agitur hic de frigore nocturno absentia Solis consequente, est enim hæc causa frigoris per accidens; sed de frigiditate illa, quã Sol, Luna, cæteraq; astra telluri inducunt ijs appropriata quadã virtute ab Authore naturæ ad Solis calorem temperandum indica. Præ cæteris autem sideribus Luna hac virtute frigiditatis pollet, quam ea quæ sequitur ratione terræ communicat. Cum enim Luna corpus frigidæ & humidæ complexionis habeat, ac veluti altera quædam terra ex humore, & terrestribus partibus constituta; sit, vt Solis radij frigiditati Lunæ mixti non iam calidi, sed virtute lunari imbuti in terram reuerberentur. Nam vt rectè magnus ille Albertus, *Lumen Solis receptum à Stellis in profundum Stellarum recipitur, & sic in corporatum stellis, Stellarum inducit virtutem, causaque diuersam qualitatum, secundum quod diuersificantur stelle, in quibus incorporatur, effectum.* Habet enim, vt rectè Auerroës quoque tradit, Luna lumen eiusdem Solis cum frigido temperato, & humido, vt ex lumine Solis habeat caliditatem mouentem, & ex frigido temperato recipiat temperamentum; & Philosophus: *Quemadmodum Sol totius anni decursu ex accessione, & recessione à nobis, æstatem, & hyemem efficit; ita & Luna menstruo suo spacio in luminis sui plenitudine tendens: in plenilunio verò in syzigiam Solis tendens lumine in dies dimittit, veluti hyemis cuiusdam rationem induit. Hyemem autem nulla ratione efficeret Luna, nisi Lunam frigiditatis apud nos procreatricem esse diceret. Quæ vt melius intelligantur;*

Luna frigida.

Lunaris vis virtute Solis mixta

Lunaris maris morus ad annum solæ vem comparatio

Cur tempore plenilunij maris frigus sentiamus quàm tempore nouilunij.

Cur plenilunio constante noctes gelida sentiantur.

Quomodo Luna siccitatem producat.

Nota secundò duplicem esse causam frigiditatis lunaris, priuatiam, & positiuam; priorem non incongruè dicere possumus caloris exilitatem, vel absentiam in fine mensis, quæ vt hyemem lunare diminuta lumine; ita lunare plena æstatem lunarem efficit. Cur verò plenilunio maius frigus vt plurimum sentiamus, quam interlunij tempore: hanc causam statuimus, quòd radij lunares attenuantes, rarefacientesque suo tempore prius à se genito crassiores vaporum roridorum materiam, cum aër iisdem incidatur, subtilietur, necessarò aliquis ex huiusmodi aëris incisione tepor oritur, quo laxatis poris frigus circumstantans ad internos humani corporis recessus penetrans molestiori frigore sensitiuas partes percellere incipit; vnde frigus positiuum respectu nostri: hoc autem non fit interlunij tempore, cum tunc vapores nullò penetrati lumine crassitiem sibi natiuam retinentes ad arctiores corporis poros penetrandos inepti sint. Natiua igitur frigiditate extimam partem superficiem tantum, negata vteriori transmutatione percellunt. Cur etiam plenilunio æstate, quàm hyeme, gelidiora sentiantur, causa est, quod medium colatum ad vnum extremorum rationem habeat alterius extremi: ita æstiuæ noctes plenilunij ad dierum canicularium æstium temperatæ gelidæ sunt, sicuti in balneo aqua tepida frigida sentitur ob maioris circumstantans caloris efficaciam. Accedit, quòd plenilunij noctibus tenuiores effecti vapores aquei in aère infimo suspensi penetrant facilius per cutis poros ad partes humani corporis interiores, quæ sensu pollentes exquisitiori minimum frigus eorum molestè ferunt. Luna igitur natura humida, & frigida, radijs Solis eadem qualitate imbutis atmospheram qualitatem consimili, id est, humida, & frigida imbut. Vnde consequenter aëris quidam lentor, & humiditas, partiumque constipatio, quæ sunt veluti latibula quædam frigoris, consequuntur. Quod itaque de Luna dicimus, de Saturno quoque eadem qualitate, quæ Luna pollente dictum sit.

Venio ad alteram qualitatem, videlicet humiditati contrariam, quæ siccitas est, quæ quomodo à Luna humida produci possit, iam explicandum est. Quemadmodum igitur consumptum radijs Solis humorem calor, calorem siccitas necessarò consequitur: Ita plane à lumine Lunæ humorem è corporibus educente siccitatem vtrumque fieri probabile est; etsi enim Luna plena lumine teporem adferat humiditatum amplificatorem: alijs tamen rationibus Luna siccitatem inducit: primo

mo enim siccitas, & solari destituta lumine aquarum, humorumque omnium defectus in mari, arboribus, ostreaceis, corporibus animalium, experientia docente, promotet, lunari verò lumine in dies auctior; & iam apogæum plenitudinis; vt maximam humorum congeriem in mundanis generauit corporibus: ita iisdem consequenter consumptis per euaporationem subtilioribus partibus humidi induta putredine siccitatem affert; quia putrescentia primò sunt humida, deinde sicca. Luna ergo lumine sibi à Sole mutuato carnes noctu expositas putredine maximè corrupens ex ijs natiuam humiditatem effluere facit, & sic siccitatem; vt diximus, per accidens adfert. Hinc tertiam quartam Lunæ Astrologi siccam, & frigidam dicunt; & Maniaci, seu Lunatici, ob melancholiam, seu atræ bilis prædominium humiditate cerebri in siccitatem vergente, suos maximè furores exere re consueverunt, iuxta illud Nonni in Dionysiæis, vbi Luna hæc de se profert.

Luna noctis carnes in putredinem ducit.

Sum verò Luna

Bacchias, non quod solum in æthere mensis voluo, Sed quod etiam insania impero, & rabiem excito.

CAPVT XV.

Mira Solaris, Lunarisque luminis in plantas, & animalia.



ERTVM est in Sole, Luna, Stellis, præter lucem, calorem, ceterasque qualitates primas, alias adhuc qualitates inesse, vt vari quidam, & prorsus paradoxici effectus demonstrant. Quæ certè nulli alteri, nisi latenti virtutis miraculo adscribi possunt. Si enim huiusmodi effectus primarum qualitatum ope perficeret, necessarò omnibus rebus dictis primis qualitibus pollentibus imprimi deberet: quòd tamen non compertum est: Verbi gratia, si Magnes trahit ferrum, quia id frigidum, & siccum est, & sibi consimile in temperamento, certè non est ratio; cur non simili ratione omnia sicca, & frigida trahat. Nulla igitur ratione effectus ille tractiuus Magnetis in primas qualitates conijciendus est, sed in vim, seu peculiarem quandam qualitatem ex Magneticæ essentia abyssos immedlatè fluentem à radij Solis, & Luna cum lapidibus, plantis, animalibus, certam quandam sympathiam haberent, quia ipsa sicca, calida, frigida, humida, certè in omnibus huiusmodi complexionis corporibus similes effectus producerent, quod tamen experientia repugnat; alia igitur qualitate id præstare dubium nullum esse debet: Constat enim certos esse lapides inde dictos seleniticos, qui Lunæ morum in omnibus expriment, cuiusmodi Proclus quoque lib. 1. de Sacrificio & Magia meminit se habuisse, qui omnes Lunæ mutationes, incrementa, decremētaque suberent. De huiusmodi quoque lapide ex Indijs asportato mira refert Mizaldus. Lapis erat sphericus magnitudinis ovi columbini, picei coloris, hic incrementa, decremētaque lunaris lucis exprimebat per maculam quandam lucidam, quæ cum Luna crescente crecebat, decrecebat cum decrecente, ita ut nouilunij tempore instar grani milij compareret, plena verò Luna pisi magnitudinem exprimeret; neque solum dictas Lunæ phases, sed & motus eiusdem affectabat. Et ne impostura subesse videretur; addit Mizaldus se huius rei in præsentia celebris illius Orontij Finçij Mathematici Regij, vnus integri mensis experimentum sumpsisse; & rem purè naturalem, & tanquam maximè naturæ miraculum ab omnibus

Lapis selenitis motu Lunæ sequitur.

Mira de lunari quodam lapide.

approbatum lapidem, tandem dono Angliæ Regi transmissum. Certè Mizaldo aliàs superstitioso, & simplici quadam credulitate in huiusmodi faciliè, & plenis velis moueri solito, fidem nulla ratione adhiberem, nisi huius rei experimenta in alijs quoque obseruassèm. Noui ego experientia propria, quemadmodum Lector in Mundo meo Magnetico videre poterit, rem quamdam, quæ se immobili constantia ad Solem vertat; noui & similia lunaria terræ miracula. Memini quoque me in Reconditorio antiquitatum Claudij Menedrij hic Romæ vidisse lapidem instar cristalli, in cuius medullio mira ratione incorruptibilis quidam à natura infusus liquor iuxta Solis ascensum, descensumque, hinc inde agitabatur: & doleo vehementer post mortem dicti Menedrij totum hunc raritatum thesaurum varijs diuenditum ita paulatim fuisse dissipatum, vt cum præter multa alia, tum potissimum hunc lapillum inquirerem, ne quidem vestigium eius amplius, vt potè in comploranda huiusmodi rerum dissipazione, vel perditum, vel reliquæ congeriei lapidum commistum reperire potuerim. Certum tamen est, quod loquor, cuius rationem naturalem in Mundo nostro Magnetico datam reperies fol. 756.

Refert Cardanus lib. de iudicijs astrologicis, Clementem VII. habuisse gemmam Solarem dictam Helitem, quæ auream habebat maculam, iuxta Solis motum singulis diebus cum eodem oriente, occidenteque circumactam. Similia leges de statua Solis à Boëtio Rauennæ fabricata, quæ se cum Sole perpetuo vertebat, vt est apud Hieronymum Rubium de Antiquit. Rauen. Quorum omnium veras rationes per experimenta irrefragabilia in Magia lucis & vmbra ostendemus, vbi & Lector multa præclara, & curiosa reperiet. Non dicam hic de experientijs auri, argenti, ferri, Mercurij, & cæterorumque mineralium effectibus, vt qui hanc materiam Mundo nostro subterraneo ex professo reseruauerimus, quæ cum Sole Luna, Stellis, miram quamdam concordiam tenere is solus nouit, quem de hisce effectibus ipsa experimenta certiore reddiderint. Sed venio ad plantas, in quibus maxima quoque lucidæ sobolis copia se offert: tantis amicitia vinculis cum Solis, Lunæ, Stellarumque lucibus coniuncta, vt nulla ratione ab ijs separari posse videantur. Vide quæ curiose tractauimus de hac materia in nostro Mundo Magnetico cap. de Magnetismo planetarum, siue de Heliotropiorum, & Selenotropiorum virtute mirabili. Neque in herbas, & plantas duntaxat, sed & in animalia miram quamdam vim obtinet secundum illud Solis & Lunæ semen variè affecti luminis. Plinius ait formiceas opéra sua ad lumen Lunæ disponere; si lumine vacua fuerit sessare, laborare tantò vehementius, quantò maius illa incrementum sumit; à plenilunio verò ceu torpescere, & nimio labore fatigatas ad cauernas veluti quietis quædam latibula se conferre. Addit idem Plinius filamenta hepatis glirium mira quadam ratione ad normam luminis Lunæ crescere, & decrescere. Certè ego propria experientia non semel comperi oculos ælurorum, seu felium, notabiliter lunaris luminis mutationes subire; obseruavi quoque oculos eorumdem multò hyeme maiores, quam æstate, ita vt hyeme videantur cum Luna veluti in quoddam sui incrementi apogæum tendere; neque absque ratione: cum enim noctes hybernæ longiores sint, natura eis quoque ad venandum plus luminis siue visui spiritus concessisse videtur. Manthoria, si Alberto credimus, maculam habet in pelle sua Lunæ phalæ exactè imitantè. Elephantis quoque iuxta obseruationem AEliani, Lunæ in operibus suis lucem obseruant. Physam, cuius in Mundo nostro Magnetico naturam fuscè descripsimus, præter alias virtutes sanè admirabiles hanc præterea vim possidere ab ipsis Aegyptijs piscatoribus comperi, quod cum Lunæ crescat, & decrescat, & motum, adionemque Lunæ in omnibus quasi gaudioduodam ad eius præsentiam dilatari sine cuius assistentiâ, viuere nequit, videatur. Omnia denique ostrea exanguia, mollia, crustacea pro luminis lunaris incremento, aut decremento, nunc macrescere, nunc pinguescere vulgò notum est.

Res Lunæ sequat.

Planta solaris lunares.

Formice Lunæ sequat.

Hepar glirium ad Lunam referat.

AEluræ oculi.

Manthoria vitæ Elephantis.

Physa.

est. Vide quæ de natura Scarabæi, Cynocephali, & AEluri lunaribus animalibus in nostra Physica Hieroglyphica secundum mentem Aegyptiorum veterum fuisse, & curiosissimè tradidimus. Quantum in prægnantes feminas Luna possit, quantum in ipsum foetum; notissimum est. Certè indubitata experientia huc vsque innouit, conceptionem hominis cum natiuitate eius maximum habere consensum ob aspectum ætatemque Lunæ, eiusdemque in Zodiaco eodem temporis momento constitutionem. Ita quidem, vt infantem tempore nouæ, aut plenæ Lunæ conceptum, eodem penè momento nouæ aut plenæ Lunæ eundem quoque foetum in lucem effundi videamus. Ex quo ratio quoque patet, cur septimestres, & nouimestres partus sint perfecti, octimestres verò vel molam, vel omnino monstrum, vel etiam quid imperfectum informe atque monstro simile, seu carneam quamdam massam producant grauidæ. Atque huc non immeritò aphorismus ille 50. apud Ptolemæum respicere videtur. *Signum Zodiaci, in quo morabitur Luna hora & momento conceptionis, erit idem quod ascendet supra horizontem hora & momento natiuitatis; & signum, in quo est Luna tempore natiuitatis, erit idem quod ascendeat tempore conceptionis.* Vnde vetus consuetudo inoleuit, vt famina parturientes ad partum faciendum Lucinam, & Dianam, id est, Lunam inuocare solerent; de qua vide Pantheon Hebræorum Oedipi nostri Aegyptiaci cap. de Lilit, vbi varia huius generis proferunt.

Luna agit in feminas grauidas. Rara obseruatio natiuitatis hominis, & conceptionis.

Aphorismus Ptolemæi de Luna motu.

### CAPVT XVI.

Quomodo lux cœlestis per calorem suum naturalem disponat de vita animalium diuturnitate, aperiturque in hoc verum

Astrologia iudicialis circa vitam hominis fundamentum



**L**X Aristotele in præcedentibus demonstratum est, quomodo adductio, & abductio corporis luminosi principium sit luminis apud nos geniti, & mediante lumine caloris generatiuum, & conseruatiuum animalium in vita; nunc verò videndum est, vtrum à circuitibus astrorum circuius vitæ nostræ dependeat? Plerique Philosophi id adstruxerunt: Albertus id expressè his verbis declarat: *Idèd omne tempus, quod est in re corporali, & omnis vita, quæ viuunt, habuit numerum in circuius cœlesti, & in ipso circulo cœlesti terminatur; quia ex ipso circulo consideratur, & sique ad quantum se extendit virtus generantis secundum quod affert esse rei, ante quàm afferat perfectam rei corruptionem; omnium enim inferiorum est ordo causarum pendens ex superiorum ordine; & omne tempus, quod est rei in tempore duratiuo, & omnis vita periodo mensuratur: neque tamen omnia eadem periodo mensurantur; sed quedam habent maiorem, quedam minorem, secundum quod magis suscipiant retinentque virtutes sibi ex circulo cœlesti defluxas.* Hæc Albertus. Quæ confirmat suo veluti calculus Philosophus 4. de Generat. Animal. cap. 10. Vbi expressè dicit, veteri ferendi tempora certa cuique animalium esse magna ex parte pro vitæ spacio, & tempora omnium grauiditatum, & generationum, & vitæ dimensionem circuitibus sibi exposcunt recipere. Quæ omnia vt intelligantur;

Notandum primò, quatuor esse tempora commorationis animalium in vtero;

*Tempora quatuor  
scilicet in utero.*

conceptionis; perfectæ informationis, seu organizationis, complexionis, quæ est proprij per effusionem parenchymatis inter fibras membrorum, temperamenti acquisitionis; & augmentationis ad congruam corporis magnitudinem: cui totidem respondet tempora durationis animalium extra uterum, quæ exactam proportionem seruant cum temporibus generationis in utero; ideo experientia docet, quanto animal quoddam fuerit viuacius, tanto maiorem in utero moram trahere, & maiorem generationem animalium diuturniorem esse generatione minorum. Cuius rei rationem ut demus;

*Temperamentum  
duplex.*

Notandum secundò, duplex animali esse temperamentum: vnum essenziale, quod acquirit, dum intra uterum constituitur, à causis eius naturam, seu generationem promouentibus; alterum autem est accidentale, quod acquirit animal ab ambiente aëre, dum partu extra uterum fertur in aërem. Cum igitur aër natura sua sit calidus, & humidus, nascentis animalis de se calidam, & humidam constitutionem alterare potest; at talem alterationem uti humano corpori ob eius mollitiem, & teneritudinem, cutisque tenuitatem, potestamque substantiam, ab aëre facile imprimi posse certum est: ita cæteris animantibus, quorum & substantia durior, & corium naturale corporis tegmen crassius, ab aëris calore, humoreque, blando, vel nulla, vel admodum exigua prouenit affectio. His accedit calor cœlestis aëri per lumen syderum communicatus, qui temperamentum foetui in utero constituto alterando, sanguinem, & semen duo generationis animantium principia, temperamentum essenziale adferre potest. Cum igitur ob teneritudinem & mollitiem ventris muliebris ab ambiente aëre calore cœlesti facilius alteretur, quam brutalis foetus; solus igitur humanus foetus ob dictas causas ab ambiente aëre calidam, vel humidam temperiem, in qua sola vitæ ratio consistit, tum accidentale, tum essenziale, & consequenter maximam viuacitatem acquirere potest: reliqua verò pro ratione moræ in utero suam dimensionem longitudinis, breuitatisque sibi possunt recipere circuitibus, id est, astrorum motibus potissimum errantium in Zodiaco: non quidem ratione motuum cœlestium orbium integrorum determinatè, cum motus illi sint vniformes, & proinde inepti ad promouendam maximam difformitatem, ac varietatem dimensionum secundum longitudinem, & circuitum in temporibus grauiditatum, & generationum, & vitarum omnium animantium; sed circuitibus ratione syderum applicantibus modò maius, modò minus lumen in Atmosphæra: à qua luminis varietate varij quoque caloris gradus oriuntur, varias generationes, & vitas penes longitudinem & breuitatem promouere nati, cuiusmodi sunt circuitus Solis, & Lunæ; est enim lunare lumen principium generationum, & mutationum in Atmosphæra, propter lumen à Sole acceptum, quod ipsa, ut supra quoque diximus, repercutit validum in hanc Atmosphæram; cuius luminis solaris receptione, reflexioneque Luna fit æmula Solis, illique sociæ, mutationes & ipsa promouens, modò ad generationem, modò ad interitum: nam ut rectè Aristoteles, *ἡ δὲ ἰσχυρὴ καὶ δυνάμει ἄλλοις μικροῖς ἡλιος*: Quoniam uti Sol ille magnus ad Boreale dominium accedens, telluris superficiem ad angulos acutos feriens aërem radiorum multiplicatione rarefacit, rarefactumque calefacit, calefactum disponit ad calorem vegetum omnium in vere animantium procreatorem, & in æstate conseruatorem: Australe verò repetens dominium hemisphærij, cum tellurem nostram ad angulos feriat obtusos, deficiente radiorum multiplicatione, minoris quoque imbecilliorisque caloris defectu, res ad interitum vergere necesse est: Ita Luna vicaria Solis, lucis suæ incremento 14. dierum spacio facta, veluti verno & æstiuo quadrante exacto, mirum quantum promouet generationes; deficiente verò lumine alijs quatuordecim diebus veluti per autumnalis, & hyberni quadrantis decursum in generationibus rerum promouendis deficit: nam ut rectè Philosophus ait, calores, & refrigerationes totius mensuræ anni circuitu rebus Luna super

*Luna æmula So-  
lis in produc-  
tis rebus.*


perinducit. Siquidem calor excessiuus totum natiuum humorem absorbens, viuentium naturam destruit; immodicum verò frigus natiuum calorem extinguens viuentia corrumpit. Hinc calidum, & humidum, in duobus luminaribus ita temperavit Conditor, ut calores frigore lunari humido moderatè temperati generationes (calore quidem moderato veluti causa primaria, frigore verò moderato ceu causa caloris excessum temperante) sine moderatione verò corruptiones efficerent.

Cum igitur omnia viuentia vel in aëre, vel in aqua primum generentur, deinde orta viuant ibidem (referunt enim omnia orta suorum principiorum naturam; & maximè retinent loci sui natalis conditiones, qui maximam vim habet in ea, quæ in ipso nascuntur, & degunt) omniaque mixta corpora in temperamento aëris, & aquæ, seu calidi, & humidi consistant; seminis quoque corpus principium viuentium spumofam habeat consistentiam ex aëre & aqua conflata, spiritibus turgentem: cum præterea aër, & aqua maximè afficiantur pro ratione Solis, Lunæ, syderum, consequens est, ut & animantium consimilis natura ipsdem periodis subiecta pari modo afficiatur. Quod enim est causa causæ, id necessariò est causa causati; imò ad mutationem rerum magis principalium consimiliter mutari eas minus præcipuas ab illis vtrumque dependentes, rationi consentaneum est. Ratio namque dicitur, ut periodi rerum minus principalium, rerum principalium periodos, à quibus illæ dependent, sequantur. Res enim minus principales in mundo gubernantur à magis principalibus; id est, cum cœlestium syderum motus omnia gubernent, & ad circuitus Solis, & Lunæ mutationes fiant in Atmosphæra nostra aëris videlicet & aquæ elementis præcipuis; iam ad easdem periodos Solis & Lunæ multò magis fieri necesse est mutationes similes, ac proportionales in animantibus mundi partibus minus principalibus & veluti fructibus quibusdam, euentibus, seu passionibus.

*Vnde dependens  
diuturnitas vi-  
æ hominis.*

### Corollarium.

Hinc patet, quòd quemadmodum annus Solaris binis Aequinoctijs, & Solstitijs in quatuor tempora; Vernum, quod calidum humidum; Aestiuum, quod calidum & siccum; Autumnale, quod frigidum siccum; Hybernium denique, quod frigidum humidum est, diuiditur: ita & mensis Lunaris in quatuor quartas, seu quadrantes, quadrantibus anni Solaris mira quadam ratione correspondentes, diuidatur; ita ut duo solstitia Solaria, coniunctio & oppositio Lunæ; Aequinoctia verò binas *διχομίας* eiusdem, tam crescentis, quam descendentis, exactè referant. Quæ omnia pulchrè in sequenti figura expressa cernuntur.



- ABCD, Circulus Solis, & Lunæ sub Zodiaco.  
 AB, Crescentis Lunæ quadrans primus, refert Ver Lunare.  
 BC, Crescentis Lunæ quadrans secundus, Aestatem Lunarem refert.  
 ABC, Semicirculus Lunæ crescentis sex signorum, qua generationes rerum promouentur.  
 CD, Quadrans tertius decrecentis Lunæ, Autumnum Lunarem refert.  
 DA, Vltimus decrecentis Lunæ quadrans Hyemem Lunarem refert.  
 CDA, Alter semicirculus Lunæ decrecentis, quo res ad interitum, & corruptionem vergunt.  
 Totus circulus annum Lunarem refert.  
 Extremus circulus Zodiacum refert, sub quo Sol & Luna perpetuò mouentur.  
 Refert præterea idem circulus vitæ diurnitatem cuiusque hominis, posita humanæ vitæ meta octuaginta annorum.



## CAPVT XVII.

Sol & Luna lumine suo dum calorem, & reliquas qualitates syderum veluti vehiculo quodam in terram deriuant, eæ seminibus cuique rei proprijs mixtis generationes rerum omnium sublunarium perficiunt.



PVS naturæ, opus intelligentiæ, Philosopho teste esse, tum in omnibus rerum naturalium classibus, tum potissimum verò in admiranda coelestium corporum, Solis & Lunæ, eorumque motuum dispositione elucescit, vt vel ipsi Ethnici huiusmodi mundanum opificium penitus contemplantes, summa quadam, & ineffabili Numinis prouidentia nequaquam id carere rati sint, quod tanto ordine, tam discordi concordia, tam consona dissonantia, tam absoluta, & omnibus numeris perfecta harmonia constare comperiebant. Agedum, videamus igitur, quenam sint tam insolentium effectuum, quos Sol radijs suis lunari virtute imbutis in sublunari mûdo præstat, causæ. Rectè Philosophus: ποσει ποσει τῆς γὰρ τῶν ἀτρελείας ἐν δὲ ἀστρογῶν καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἡσυχίας. Latio facit generationem incessanter, quia adducit, & abducit generatiuum principium. Experientia enim docet, quod aduenientem Solem generatio, recedentem verò manifesta sequatur corruptio. Dum enim Sol ad nos accedens lumine suo vegetiore calorem gignit vegetiorem, pullulant stirpes, nouellæ plantæ vtî & animalia cuiuscumque generis in nouæ sobolis procreatione in fecundos motus stimulantur; Autumnali verò tempore vicissim dum Sol à nobis recedens australia signa reuifit, tellus nostra ex remoto lumine vtî debili, ita & infœcundo radio oblique percussa defectu caloris rei genitæ destruantur, decidunt veluti senectâ quadam squallentia arborum folia; animalia antris, seclatibusque veluti lugentia condunt; terra ipsa omni ornamentorum suppellectile spoliata ægrè luminis maritantis absentiam ferens, veluti lugubri quodam amictu vestita squaler, & mœsta iacet. Hinc ne nimia Solis absentia mundus sublunaris functionum suarum detrimentum pateretur, Luna eo ab Authore naturæ artificio condita est, vt circulum, quem Sol annuo, illa menstruo conficeret spacio; sicque duodecies Soli veluti merito coniuncta noua conciperet rerum generandarum semina. Diuina quoque dispositione factum est, vt lumen, quod Sol in australibus signis humili loco cõstitutus terris Boreæ subiectis commodè communicare non posset, omnem huius luminis defectum Luna in oppositis signis constituta veluti paruus quidam Sol, seu Solis vicaria suppleret. Ita Sole in humili Capricorno constituto Luna sublimem Cancrũ obtinet in maximo luminis sui incremento. Sole verò sublimem Cancrũ punctum obtinente, Luna humilem Capricorni plagam subit in maximo suo incremento. Ita fit vt lumen Solis hybernum in Capricorno deficiens, per Lunare lumen æstiuum in Cancro suppleatur, & lumen Solis in Cancro caloris excessiui, per lumen Lunæ hybernum obtusi caloris in Capricorno temperetur; ac sic per totius anni decursum excessus, defectusque caloris Solaris reciprocis excessibus, defectibusque caloris Lunarum mira quadam proportione respondeant. Prima enim quarta, seu ætas, quæ pueritiæ respondet, humida est; deinde calido paulatim extrahente humidum, efficitur sicca, & calida, quæ secundæ ætati respondet. Tertio, cum humido egrediente deficit calidum, eo quod humor proprium erat obiectum caloris, & talis est tertia ætas, scilicet frigida, & sicca: hac enim constitutione Lunæ frigiditate inualecente inducitur humidum extremum non nutriens, vel augens; sed humectans extrinsecum, quod

Mirabilis mundi decor & ordo.

Miræ opificium Lunæ.

Cursus Luna respondet annis & moribus.

quod est humidum-phlegmaticum, & talis est vltima aetas, vt in figura præcedente patet. Inter æstatem igitur Solarem annuam, & Lunarem menstruam hæc est differentia, quod Sol in æstate sua radijs valentioribus humores consumens anni constitutionem calidam, & siccam promouet; Luna vero in summo incrementi sui vigore, id est in æstate sua, lumine mitiorem teporem inducit, quo concreta in humores defluunt, & humida vaporum multiplicatione plenilunij tempore tumescunt: mitis autem calor, seu tepor leniter agens in humida, ex ijs vapores humidos procreat, quos absorbere non potens, eos in eorum relinquunt materie, vnde humida crescunt, & veluti lumine maritante grauidata implentur. Ex quo vltius patet teporem Lunarem, qui ex humido sibi innato, communicata ei Solis virtute calefactiua per luminis misturam constituitur, generationis rerum causam esse, quæ omnia fusè in nostro mundo Magnetico Part. 3. de Magnetismo Solis & Lunæ tractata reperies. Eandem ob causam reliqui Planetæ varios ad terram, Solemque habitus, respectusque, variamque motuum anomaliam sortiti sunt; vt accessu, recessuque ad Solem, Lunam, & terram ex varia luminis, qualitatumque mixtura, varios quoque in inferioribus effectus causentur. Vide quæ fusius de hisce in Gnomonica physico-Astrologica, vti & in nostro Mundo subterraneo scribimus.

Vnde clarè patet huiusmodi syderum periodos, motusque in Zodiaco varios luminum aspectus inter se promouentes, causam esse mutationum tum aeris, aquarum, & ventorum, tum etiam generationis vitæ, & interitus animantium, ac perinde hoc vnicum esse iudiciorum Astrologicorum de euentibus tempestatum, & accidentium vitæ rerum in sublunari mundo fundamentum; adeoque inter ortus, & obitus interceptas animalium vitas numerari, mensurarique Solis & Lunæ periodorum numeris. Hinc patet quoque peritum Astronomum de natorum vitæ, & obitu optimè prædicere posse; imò numerare dies æui cuiusuis viuentium, quorum natalis momentum habuerint: quoniam omnia hæc pendent ex causa naturali, videlicet ex temperamento foetui ab ambiente indito. Cum enim pro varietate situs Planetarum in cælo, speciatimque Solis, & Lunæ, tempore conceptus, conformationis, & partus animantium vario lumine in aëre nos ambiente producantur varij gradus caloris frigore temperati, ab illis aër affectus, afficiet consimiliter tum semen, & menstrua duo principia constitutionis embryonis tempore conceptus, & organizationis, tum etiam molle nascentis animalis corpusculum eo temperamento, quo & animæ corpori copulata detinere valet viribus naturæ, vt que ad tantum tempus determinatum, & succumbere potest opposita sibi, ac valentiori ambientis temperiei, quem in aëre producere valebunt certis temporibus venturis tales & tales eorumdem astrorum constitutiones in cælo. Quæ venturæ siderum constitutiones ob magnum cælestium periodorum regularitatem, à peritis Astronomis, vt dictum est, præcognoscere queunt etiam tempore generationis, & ortus, & consequenter prædicere de cuiusque duratione, etiam si ob materiæ indefinitionem non exactè; siquidem materia viuentium suapte natura non est definita regi, & gubernari solum ab astris; eorumque lumine, caloreque, inde in ambiente genito, sed indefinita est: ad omnes mutationes subeundas, & ad patiendum à quibusuis causis: imò verò plerumque à morbofis parentibus diffuens; ita male disposita est; vt cælestium vires apta non sit exactè percipere, aut syderum auxilijs perfici. Nam aliter ab eodem syderum aspectu afficietur materia nascentis bene constituta, aliter morbosa; quia scilicet per accidentia multa, aliter disponitur materia, quam moueatur à circulo: & ideo diuersimodè moriuntur homines citius, aut tardius, quæ per naturam mortales sint; & similiter etiam alia animalia. Hoc etiam modo ætates sunt omnium rerum; quia planetæ in circulo periodico constituti, dum fortiores sunt, plus annos vitæ dant; debiliores verò pauciores. Vide, quæ de hisce fusius tradimus in Gnomonica physico-astrologica. Si quis igitur sciret

signo-

Luna generatio-  
nes veris promo-  
net tepore suo.

Anomalia mo-  
tus planetarum  
ad varietatem  
effectuum in mū-  
do inferiore mul-  
tum confert.

Fundamentum  
Astrologia indi-  
ciaria.

Astrologus non  
certo, & insal-  
libiliter, sed pro-  
babilius tantum  
prædicere potest.

signorum stellarumque, dum res aliqua nascitur, vires in circulo suo periodico, ipse de tota re generata vita probabiliter prædicere possit. Dixi probabiliter, quia vltimus ille naturalis vitæ terminus cuique à Deo constitutus, vt plurimum varijs accidentium, passionumque, iræ, amoris vindictæ, doloris, voluptatis, intemperantiæ excessibus interruptus, vitam breuiorem, quam à natura constituta fuerit, reddidit. Videas igitur, Lector, quomodo à luminum calore benefico omnia munda dependeant, & quomodo scientiam luminis callentem, nihil in natura rerum latere possit.

Concluditur igitur, mundum hunc nostratem tota participatione luminis & visibilem esse, & pulchrum; & corpora, quæ in mundo sunt tantò esse perfectiora, quanto plus luminis participant. Itaque lumen in mundo hoc vniuerso quasi in Dei Optimi Maximi templo, est quasi visibile quoddam Numen, Deique simulacrum. Nam & ipsum bonitate sua cunctis & facillimè, & felicissimè communicat; rebus omnibus sese largitur, & quaqua uersum per omnia sese diffundit, & causa est, vt omnia eo illustrentur, & incalescant, & formentur, & generentur, & nutriantur, & excitentur, & conferuentur. Dum enim omnia tepore suo penetrat, cuncta alit intus, & fecundat intus, & extra. Luminis igitur participatione omnia gignuntur, omnia suos circulos agunt. Et veluti mens quædam

mundi diffusa per artus,

Hanc agitat molem, & magno se corpore miscet.

## CAPVT XVIII.

An ex prædictis fundamentum aliquod Genethiacæ Astrologiæ  
constitui possit? & an potentiæ interiores, influentiarum  
subiectum esse possint.



NON loquimur hic de rebus necessariam cum corporibus cælestibus connexionem habentibus, cuiusmodi sunt humores animalium, & vegetabilium; item flumina, & maria: hæc enim proprium esse influentiarum cælestium subiectum, nemo sanæ philosophiæ negabit, & ex prædictis satis superque patuit. Sed loquimur de potentijs interioribus, vtrum ex, quemadmodum.

Astrologi omnes volunt, reuera influentiæ alicuius sint capaces; Quam litem vt dirimamus;

Notandum primò, influxum cælorum in liberum arbitrium duplicem considerari posse: directum, vel indirectum. Primus, quo immediatè vel ad perfectionem potentia, vel ad actiuam productionem concurrit; Secundus, quo immediatè in aliquod extrinsecum, vel corpus ipsum: vnde vterque duplex. Directus enim, vel tendit ad voluntatem, ibi imprimendo qualitatem aliquam, qua ad agendum moueat; vel simul cum ipsa voluntate agit: Indirectus, vel immutat obiectum aliquod intrinsecum, ad quod sequitur immutatio in voluntate; vel imprimat humano corpori qualitates quasdam, quibus ratione naturalis coniunctionis operationum spiritualium & materialium, voluntas allicitur ad agendum; quod etiam duobus modis contingit: Primò, quatuor humores vel intendendo, vel remittendo; aucta enim cholera homines ad iram prouocantur. Secundò, sanitatem & corporis dispositiones perturbando. Cum enim ex Galeno, anima temperamentum

G

cor-

corporis sequatur, mutato corporis statu, mutantur etiam animi affectiones; siue hæc mutatio lædat libertatis usum, siue auferat; vt videre est in Maniacis & Lunaticis. Deinde de influxu indirecto oritur difficultas. An ratione huius aliquo modo possit dici, Cœlum attingere, inclinare, allicere, mouere & trahere voluntatem.

His positis, dico primo, corpora cœlestia nullo mediato, vel immediato influxu directo voluntatem, vel intellectum rei attingere: quia materiale non attingit tanquam causa proxima principalis immateriale. Secundò, quia voluntas est causa libera, Cœlum ad vnum determinatum. Tertiò, quia ordo naturæ Vniuersi, & perfectionis, requirit vt nobiliora non subdantur ignobilioribus: anima autem rationalis est semper cœlo nobilior. Neque quicquam contra nos facit, Dæmones substantias spirituales subinde moueri corporalibus, vt herbis, ruta, hypericones, suffumigijsque; plusque eosdem posse in Lunaticis tempore plenilunij, quam quouis alio. Nam id minimè contingit ideo quod dæmones, aut cœli influxibus subsistent, aut materialibus moueantur: sed vel vt imponant hominibus, ac ad eos hac superstitione irretiendos: vel quia in cerebro humoribus oppresso meliores dispositiones inueniunt ad vim suam in hominibus exercendam. Quòd verò Magi certum tempus eligant, id fit ex pacto cum dæmone inito. Herbas quoque dæmonifugas reperiri, dæmoni contrarias; id non contingit, quod formaliter in dæmones agant, ijs imprimendo qualitatem naturæ eorū contrariam, sed quia habent qualitates oppositas principijs actiuis à dæmonibus applicatis; vnde & in exorcismis subinde huiusmodi ab Ecclesia Catholica licitè adhibentur.

Dico secundò, nulla ratione corpora cœlestia spirituales potentias, etiam mediata & indirectè, attingere, ita vt vel voluntas intrinsecè inclinatur, vel moueatur, ad talem actionem necessariò producendam. Est contra Astrologos, qui omnes sentiunt, voluntatem non cogi quidem, sed alliciendo trahi. Tum quia euidenter colligitur ex dictis: tum quia influxus cœlestium corporum sensituius assimilatur passionibus: at illæ neque intrinsecè inclinant; quia inclinatio intrinseca est tantum ab aliquo impresso rei: at passiones nihil intrinsecum imprimunt voluntati; ergo, posito quoque influxu quocunque, & quacunque obiecti propositione, voluntas potest agere & non agere. Ad summum igitur intellectus moueri potest, in quantum materiale phantasma intellectum agentem ad specierum intelligibilium productionem determinat; cum hoc tamen stare arbitrij voluntatem ad determinandum intellectum, vel non determinandum: quis enim impedit, vel ne suspendat assensum, vel ne iudicet, vel ad aliquod obiectum conuertatur? deinde posita intellectus motione, voluntas nihilominus in statu manet *ἀδύνατος*, siue indifferenti.

Dico tertiò, influxus cœlestes indirectè influere in voluntatem, in quantum vel perturbant humores, vel complexionem alterant, vel intrinsecè mutant. Probatur primò, quia eadem complexionis est ratio à Deo, vel natura acceptæ, & acceptæ mediantibus astris: at complexio naturalis indirectè mouet voluntatem: ergo. Secundò, quia modus operandi sequitur modum essendi, vt modus essendi animæ rationalis in homine, est tanquam modus formæ dantis esse materiæ, & dependentis non quidem in perfectione intrinseca, sed extrinseca, à materia tanquam à sua, qua perficiatur, com parte; ergo etiam à causis talium motionum, nempe à cœlesti corpore, talem complexionem, vel qualitatem occultam communicante.

*§. An Astrologus inclinationes naturales sensitivas certo diuinari possit ex sola astrorum inspectione, & caloris lucisque abundantia.*

**C**um sydera parti sensitivæ prædominentur, & tale dominiū pro syderum conjunctione & aspectu varietur, Astrologi aliquid hæud dubiè ex posito syderum diuinari poterunt sine peccato, de temperamento infantis, etsi huiusmodi ex sola syderum inspectione facta diuinatio vt plurimum incertissima sit, ob alias complures causas ad temperamentum tale & tale constituendum concurrentes: Quia inclinationes eo modo cognoscuntur, quo illarum causæ; at causæ difficilimè & maximè imperfectè cognoscuntur ab Astrologis, ergo & inclinationes. Malor, si stemus in cognitione naturali; & à dæmoniaca vel diuina præscindamus, est euidentis: minor probatur; quia talium inclinationum secundū eos causæ sunt syderum aspectus, qui tam incerti & indeterminati semper habentur, vt in centum natiuitatibus vix semel certè colligatur. Accedit, quod huiusmodi aspectus vel sumantur in puncto natiuitatis, vel in instanti conceptionis: at in vtroque semper contingit error, cum enim cœli motus rapidissimus sit, quis non videt interim schema cœli variari? Præterea conceptio ipsa Astrologo occultatur, & parum illi auxiliij confert mora infantis in utero matris, vel qualiscunque alius huiusmodi conceptionis inuestigandæ modus; cum à varijs accidentibus hæc infantis mora perturbetur; puta vel à labore matris, vel à cibis, vel à seminis temperie, vel ab infirmitatibus, vel ab alijs de die in diem accidentibus. Accedit Astrologum nescire quæ stella infanti dominetur.

Nisi igitur omnibus causis concurrentibus cognitis, effectus à pluribus causis dependens certo cognosci nequit: cum igitur infantis temperies inclinationesque naturales à pluribus causis dependeant, rectè sequitur nihil illum certi diuinari posse; vna siquidem causa absente & ignota totum iudicium adulterari necesse est. Sic falso Astrologus iudicaret, diuersum frumentum in diuersis agris eiusdem oppidi sub eodem sydere seminatū, æqualem prouentum habiturum; Nam licet eadem sit causa cœlestis, & consequenter respectu illius idem sit secururus effectus; quia tamen aliæ causæ concurrentes sunt diuersæ, puta frumenti, & seminis bonitas, agri fertilitas, agricolæ diligentia, stercoreatioq; diuersus cōtinget effectus. Haud secus in natiuitate infantis accidere censendum est: Cum enim corporis temperies à virtute formatricè seminis, calidiore vel frigidiore parentum complexionem, à cibis quibus nutritur mater, aëris bonitate, imaginatione vehementer coniugum, tempore conceptionis, dependeant; frustra per astra, nisi hisce cognitis, de natura infantis diuinabitur. Demus enim eodem temporis puncto duos concipi infantes, quorum vnus à patre nobili, bene nutrito, naturæ fortis & matre optimæ complexionis, & delicatis cibis educata; alter verò à rustico, infirmo, frigido, & matre infirmæ valetudinis cibis grossis enutritus; certè maximè diuersa erit vtriusque infantis temperies, & consequenter diuersa quoq; morum habitudo. Quòd igitur hic vel ille maiori ingenij bonitate polleat, id non tam Mercurio dominati, aut alijs planetis, quam alijs causis partialibus, quemadmodum in sequenti libro dicitur, prouenit: videlicet à complexione parentum, ab imaginatione & dispositione patris tempore conceptionis, à cibis quibus pater ostiduo ante generationem nutritur. Cum enim maior vel minor ingenij bonitas à sola maiori vel minori organorum dispositione dependeat, dispositio verò organorum à primarum qualitatum temperie; temperies primario à sanguine & semine, secundario ab elementis: seminis qualitas à cibis, quibus vititur generans tempore conceptionis, vt dictum est; necessario se-

*Astrologia incertitudo.*

quitur non ab astris tantum, sed à dictis bonitatem ingenij prouenire. Vnde non incongruè monet Galenus parentes, qui volunt ingeniosos filios procreare, per imaginationem, & ciborum ad id electorum, vna cum temporis electione, ad votum pertinere posse; nihil obstantibus quantumuis infauis, ingenijque infestis syderum aspectibus. Præterea, quod Astrologi tantum tribuant Mercurio, vt penes ipsum solum ingenij communicandi potestatem esse putent; mera vanitas est. Quicumque vnquam & vllibi Mercurij sydus obseruarunt, periti Astronomi, mecum vna omnes sentient, Mercurij vires cum ob nimium suum, ac maximè puffillum corpus, quadragies terreno minores; tum ob radios Solares quibus perpetuo ferè tegitur, ita obtundi & debilitari, vt vix quicquam virtutis in hæc inferiora obtineat; imò ad radios Solis se habere eodem modo, quo gutta vini in dolium aquæ plenum sparsa. Amplius quid dicam, ne quidem illa, quæ ad Medicinam, Agriculturam, Navigationem pertinent, & quorum diuination licita est, ex sola inspectione astrorum sine comparatione ad terram facta, prædici posse. Imò tam variam esse diuerforum horizontum constitutionem, vt penè à diuina putem, eundem syderum positum cum æquali etiam influentia æqualem & similem in diuersis horizontibus effectum producere posse. Videmus alias partes etiam vnus climatis proniores ad pluuiam, ad serenitatem alias; In quibusdam rarè pluit, in alijs frequenter, & ferè semper. In nonnullis etiam vicinis perpetui venti sæuiunt, in alijs infesta corporibus humiditas. Quæ omnia locorum symptomata, non à Cælo, sed à particulari locorum natura, montiumque dispositione originem suam habent. Ita Auenione olim frequentiores pluuiæ, hodie ob lacus vicini vltra Rhodanum exsiccationem, omnis fere pluuiæ proscripta videtur. Hisce accedit lucem in Thematice cœlesti, respectu diuerforum horizontum, diuersimodè se habere; adeò vt ausim dicere vix nos 15. leucas conficere posse, quibus non lux cœlestis variata, effectus quoque dispares producat in domibus cœlestibus. Ac primo quidem sub sphaera recta domus cœlestes, sine quibus nihil in Astrologia iudiciaria efficias; longè alios lucis effectus fortiuntur, quam sub sphaera obliqua: sub sphaera obliqua alios toto cœlo diuersos, quam sub sphaera parallela, vbi præterquam quod omnes domus cœlestes euanescent, & Sol perpetuo supra, vel infra horizontem moretur, influxus ibi ratione cardinum, angulorum, cuspidum, nullam prorsus vim habere potest. Verùm de hisce & similibus alibi fusiùs. Nugæ igitur sunt, quæ de terminis Aegyptiorum, de gradibus lucidis, tenebrosis, putealibus, nugantur Aegyptij & Arabes Astrologi: neque est quod se Astrologi nostri conforment ad Aphorismos Ptolemæi, & Arabum præcepta: hæc enim cum ad Alexandrini, aliorumque horizontum Zonæ torridæ vicinorum naturam & qualitatem cõdita sint, nostris partibus nulla ratione quadrare possunt; vt potè luce, situ, & dispositione ab ijs toto cœlo diuersa. Ignoscant mihi Astrologi, quòd ipsorum opinionibus hoc loco subscribere non possim. Cùm enim ita mihi comparatum sit, vt non facillè nisi rebus fundamento solido nixis figar; in Astrologico verò studio exactissima inquisitione multorum annorum spacio verlatus, nihil non tentauerim, quo veritatis salutem aliquod vestigium cõperirem; illud tamen cùm necdum illuxerit; ne mirentur, si relicta Astrologia illa moderna ad alia solidiora me conuertam: nisi enim Astrologi cœlum terræ iunxerint, & naturas tum supernorum, tum infernorum corporum, per continua experimenta, obseruationumque frequentiam, indagare studuerint; in aëre piscabuntur; cùm sola experientia dicta veram Astrologiam condere possit. Verùm de hisce in Mundo nostro subterraneo, vt & in Astrologia hieroglyphica fusiùs, Deo volente, tractabitur. Nunc hisce relicis, ad alteram Libri partem nos conuertamus.

# PARS SECVNDA S C I A S O P H I A

Siue

## DE VMBRA LVCIS SOBOLE ET INDIVIDVO COMITE

EIVSQUE MIRIS IN RERVM NATVRA

FACVLTATIBVS.

### C A P V T I.

*De origine & definitione Vmbrae.*



MBRA lucis comes, altera Solis, & Lunæ simia, inferioris mundi Domina,

*Æmula Dis, Diuisque prior, Diua ipsa futura,*

*Hanc nisi perpetuam tenebris damnasset opacis.*

*Lux & vmbrae  
descriptio.*

Hoc admirabile lucis opus explicandum aggredimur, vmbra inquam, cuius antiquitatem si spectes, nobilissima est; si ingenium acutissima; si virtutem, fortissima; si gloriam, honoratissima. Antiquitate tanta pollet, vt vni Creatori posterior esse videatur; ante primam enim rerum omnium existentiam: in nihilo illo prælusit; deinde in Chao illo, & mundani corporis, Tohu & Bohu, quadam velti essentia suæ rudimenta iecit; ac denique in ipso parturientis naturæ sinu edita, non per quosdam infantia & pueritia gradus ad maturitatem peruenit, sed statim totum hoc Vniuersum complexa ferrugineo suo pallio operuit.

*Quaque die partu est edita, magna fuit.*

Manebitque quamdiu mundi consistet machina, perpetuò sibi constans, & similis, ab omni corruptionis contagione semota; caloris mundani retinaculum, mundanæ speculum pulchritudinis, vnica rerum temperies, sine qua nec mundus foret sensibilis, nec debitam sibi temperiem rerum sortiretur compositio.

De hac igitur modò quæritur, quid sit? Vitellio in 3. & 4. Postulato, in absentia luminis vmbra fieri postulat; Et contra in allatione luminis vmbra deficere. Et alibi, vmbra esse priuationem cuiusdam lucis existente, actu præsentia lucis alterius in loco tenebroso. Alij dicunt esse priuationem lucis primariæ, & imminutionem secundariæ, iuxta illud Lucretij;

*Nam nihil esse potest aliud nisi lumine cassus*

*Aer, id quod nos vmbra perhibere solemus.*

Quicquid sit, lumini contrarias esse tenebras, oppositamque propriè dici obscuritatem, & Aristoteles testatur, omnibusque est euentissimum. At quænam huiusmodi sit oppositio inter lumen, & tenebras, purè ne priuatiua, an quouis pacto positiua: repugnantiæ, & vtrum lumini præter tenebras aliquid aliud opponatur discutiendum est. Lumen tenebris opponi, vt habitui propriam priuationem, ex Aristotele constat. Et si verò in tenebrarum entitate,

maxi-

*Quid propriè  
vmbra sit.  
Vmbra non est  
ens purè priua-  
tiuum.*

maximam luminis priuationem reperias, vt tamen obscuritatem, tenebrasque puram putamque luminis ab omni positua entitate segregatam priuationem credam, induci non possum. Primò enim tenebræ ita visum congregant, vt præter dolorem, quem oculis, etiam subinde nitris diurnæ cæcitatem adferant; at congregatio, & exæccatio reales, & posituæ operationes, à nuda, & mera priuatione veluti causa efficiente (nisi dicere velimus priuationem ultra suas vires effectum producere posituum) prouenire nequeunt. Iterum contraria, quæ sese mutuo refringunt, retundendo, hebetandoque, naturam habent vt cumque posituum; tale est lumen, & tenebræ; Sicut igitur flamma non est ignis, sed corpus mixtum cum multo prædominio ignis: ita tenebræ quoque non sunt pura priuatio, sed naturam habent visibilem ex priuatiua, & entitate positua coniunctam: si igitur tenebræ, & obscuritas non est pura priuatio, certè minimè vmbra erit; quomuis etiam à liquo modo luminis oppositi dici possit. Potest itaque duplex hoc loco obscuritas considerari: prior natura constans priuatiua, luminis opponitur, vt habitus; & nomine tenebrarum appellatur: altera posituam magis essentiam obtinens, luminis, vt qualitati contrariæ repugnat; & hæc vocatur vmbra, quæ est entitas maximè positua, eò quod maximè visum moueat.

Duplex obscuritas.

Definitio vmbre.

Nos igitur, ommissis aliorum definitionibus, dicimus vmbra nihil aliud esse, quam radiorum Solis principalium absentiam, opaci corporis immediatè illustrati interpositione causatam. Dixi, radiorum Solis principalium, ad excludendos radios reflexos, qui nihil aliud quam vmbra quædam soboles sunt, immediatè à Solè illustrati interpositione, ad excludendam obscuritatem, ac tenebras cauernarum subterranearum, aliorumque locorum Soli imperuorum,

Radis, lumen, splendor, nitor, quid sint.

His itaque positis dicimus corpora lucida corporibus opacis contraria quidem, at non omnino priuatiua, sed positua: illa enim lumen emittunt, hæc tenebras. A lumine, & tenebris, proles quædam nascuntur, quæ vt & matres earum in medio diaphano diffunduntur. A corpore quidem lucido radij primò emicant; à radijs lumen; à lumine splendor; à splendore nitor. Splendor quidem lumen est: diaphani crassitie immanutum; nitor verò lumen quoddam est, sed vmbra illi mixtura deprauatum. A corpore verò è contra opaco aliam profert propagationis suæ sobolè: primò quidem ab eo emicat tenebræ, quæ lucis opponuntur radijs; à tenebris obscuratio luminis contrapposita; ab obscuratione vmbra opposita splendori; ab vmbra vmbra nitori contrapposita ortum habet; ex nitore vero, & vmbra ipse adumbratio. Quæ omnes in diaphanum actionem manifestam habent; Id enim ipsi replent non minus, quam lucis illa paulò antè numerosa soboles, perque ipsum sese longius propagant; inque breuius se contrahunt, obscurius & clarius faciunt; lumen inde pellunt, indeque à lumine pelluntur, visum multis adiungunt animalibus; hæc autem omnia actiones opacitatis esse, nemo visu ac mente præditus negabit. Actio enim & passio à viribus agendi & patiendi prouenit: vires autem omnes ab essentia sibi propria procreantur, & in essentia sunt; in ea fundantur, ex eaque funduntur. Non sunt ergo obscuritas, vmbra, vmbraque simplices lucis, & luminis priuationes, sed vera sunt entia, qualia dicuntur positua. Differunt autem & vmbra & fulgores, maiore & minore vel candore, & nigrore, prout vel fonti lucis, aut tenebrarum propiores fuerint, vel à fonte longius recesserint, in quo luce, & obscuritate summa sunt vtraque. Vnde patet, quantò fulgores à luce magis recesserint, tantò plus nigredinis, & quantò à tenebris magis recesserint vmbra, diminuto nigrore, tantò plus albedinis acquirere, quæ omnia visus iudicare potest. Nam opacum nullam lucem, nullumque admittit candorem; lux verò nullum nigrorem admittit. Vnde per tenebras non nisi lux, & albedo fulgida sine vllis coloribus; per obscurum verò & lux, & albedo & quadantenus colores perficiuntur, sed exiliores omnes. In vmbra verò & præ-

Processus lucis ad tenebras à tenebrosa in lumen.

sentia & distantia cernuntur, ea quæ sunt colorata; vmbra verò seu *obscuritas* clariùs omnia representat. In adumbratione verò nitore vmbra non misto, medio quodammodo conspiciuntur omnia: hæc autem differentia non aliunde proueniunt, nisi à lucis, atque opacitatis, & eorum, quæ ab eis procreantur, mixtione. Ex quibus fusè ostensis patet imaginem opaci, vt est visibile quoddam tertium à colorato, & à lucido corpore formaliter contradistinctum, nihil aliud esse, quàm vmbra, quàm propriam speciem visibilem, & imaginem corporis opaci, secundum quod opacum est: quod hisce rationibus confirmandum duximus. Primò enim lumen vmbra efficit ultra corpus opacum in visibilem genere, teste Philosopho: est eodem Authore, lumen non efficit nisi species representatiuas obiectorum visibilibus; ergo vmbra est imago alicuius obiecti visibilis; cum obiectum visibile non sit, vmbra quoque non est imago lucidi; neque corporis colorati lucis viuidissimæ indigi, sed imago opaci a lucido corpore uersa in lumine secundo imbecillo & remisso spectari nata: ergo vmbra est imago corporis opaci. Iterum, corpus opacum est visibile proprium in lumine solum de se vmbra emittere natum in diaphano, medium: at visibilia obiecta in medio diaphano illuminato de se formaliter emittere nequeunt, nisi suam imaginem, speciemque visibilem eorum representatiuas: ergo vmbra nihil aliud est, quam simulacrum visui representatiuum corporis opaci, à quo defluit in perspicuo. Tertio, corpus opacum suam habet speciem visibilem distinctam à specie visibili corporis lucidi, & corporis colorati in diaphano, propter lumen, quod est imago lucis, seu lucidi corporis, à quo prouenit, & præter coloratorum species ab se permanentes nulla tertia prouenit à corpore opaco, nisi vmbra; ergo vmbra est imago speciei que visus representare nata corpus opacum.

Vmbra est imago opaci à lucido corpore uersa.

## CAPVT II.

### Quomodo concurrat lumen ad producendam vmbra.



VONIAM species cuiuscumque obiecti infra lucidum collocati generatur ab obiecto suo gubernato à præsentis lumine, fit vt lumen in ortu vmbra concurrat veluti causa partialis cooperans corpori opaco. Cum enim corpus opacum sit sua specie visibili, atque adeo vmbra quid materialius, nihil quoque ultra suas vires agere valeat, de se procreans aliud se ipso præstantius; proinde materiale agens, nisi ab immateriali gubernetur, ac supra materiæ suæ conditionem eleuetur, effectum immaterialiorem se producere nunquam poterit. Corpus igitur opacum de se nequit vmbra producere, quæ est ipso minus materialis; vnde in tenebris opacum nullam vmbra emittit: indiget ergo opacum luminis beneficio, scilicet forma immateriali, ad producendam vmbra veluti sui speciem visibilem. Et cum idem plerumque sit corpus opacum, & corpus coloratum, vt corpus cindela idem est lucidum, & coloratum; fit, vt in tenebris id videatur sub ratione lucidi non colorati, de die verò sub ratione colorati, non sub ratione lucidi; non secus opacum corpus, & opacum, & coloratum est, à parte quidem qua illuminatur, sub ratione colorati mouet visum; à parte verò Soli auersa, videlicet minori, imbecilli, ac languido lumine illustrata, sub ratione opaci mouet visum.

Corolla-



## Corollarium.

**A** tque ex his patet tenebras à lumine in visionis munere non differre, vt vel huc respexisse videatur Psalmista, dum dixit, *Vt tenebræ eius, ita & lumen eius.* Quid? ergo tenebræ quoque lumen erunt? vel certè non sine luminis mixtione, ita sane est. Nam & lumen illæ admistum semper habent, & si non habeant, ipsæ lumen sunt, sed minimum. Confessum enim est in natura rerum, si vnum contrariorum reperiatur, necessario & alterum reperiri. Esse in natura calorem sentiunt omnes homines, & humidum, & molle, & rarum: Sentiunt iisdem esse quoque in natura hisce contraria, frigus, siccum, durum, densum: contraria autem ea esse dicuntur, quæ sunt eiusdem generis extrema. In genere ergo visibilibus quoque duo erunt extrema, eaque inter se contraria, maximum, & minimum; quæ in cunctis rerum generibus existunt: in genere visibilibus quoque reperiuntur maximum visibile, & est lux Solis; minimum visibile luci contrarium, & est terræ nigror, seu opacitas: lucis itaque maximæ contraria lux minima. Cum ergo de lucium genere tenebræ etiam sint; & lumen, & tenebræ vniuersum terrarum globum & intus, & extra teneant; verum fuit asserere omnia in lumine iacere, quamuis minimo vel maximo. Sed & hoc ipsum alia ratione manifestum fit; omnia enim corpora opaca colore aliquo sunt imbuta: Color autem omnis, vt postea videbitur, est lux opacata. Cum igitur color omnia vestiat, color autem omnis sit lucis & luminis soboles, omnia quæ in coloribus iacent, in lumine quoque iacebunt.

*Tenebræ aliquid luminis semper habent.*

*Omnia aliquid luminis participant.*

## CAPVT III.

*De remissione, & intensione vmbrae.*

**C**um vmbra sit luminis absentia, erit maior vmbra maioris luminis, & minor minoris luminis, & maxima omnis ferè luminis absentia. Videmus enim densissimas tenebras exiguo luminari non statim depelli, sed maximo ad id opus esse: est ergo non in lumine tantum, sed & in ipsis vmbis latitudo quædam intensio, & remissionis capax. Hinc obscuriores tenebras non impropiè densas appellamus; nam in eodem subiecto partes incrementum suscipientes, quantitatis accessione augentur, & non secus ac plura corpora in angustum locum arctata densantur. Ex hac augmenti, & decrementi varietate diuersi existunt obscuritatis gradus: nam vmbra & tenebræ sola intensio, & remissionis inæqualitate distinguuntur; siquidem vmbra minima omnium obscurissima est, omnium verò maximæ sunt tenebræ, quæ si solaris luminis comparatione spectentur, vmbra minoris luminis est absentia, tenebræ autem eam significant obscuritatem, quæ externa hominum opificia interrumpit, aspectusque vstram tollit. Tenebras inter ac Solis vmbra media illa est crepera lux, Solis ortum proximè antecedens, & occasum subsequitur, quæ sitne vmbra, an tenebræ dubium est; nos inter vmbas eam recipimus, vt in Cosmographia nostra Photoscia-therica docemus, & paulò post apparebit.

*Vmbrae gradus.* Rursus singulæ istæ obscuritatis differentia: varios gradus secundum magis & minus sortiuntur; vmbra enim secunda obscurior est quàm prima, & tertia quàm

secunda; ac deinceps, ita vt Sole in horizonte constituto lux sit sine vmbra; occumbens verò Sol vmbra facit minimè omnium obscuram; ac deinde, tantò tamen semper obscuriorem, quantò is profundius infra terram abierit, ita vt media nocte densissimæ certis temporibus tenebræ dici possint. Ex quibus primò patet, quod sicut lumen alterius luminis accessione augetur, ita & vmbra alterius vmbrae additione obscurior euadit: nam si duo luminaria exponantur, hisque opacum corpus obijciatur, non in eadem recta linea cum illis constitutum; patet totidem vmbas, quot luminaria sunt, opacum profundere. Docet quoque experientia obscuriorem vmbra in iuxta corpus opacum existere non aliam ob causam, quàm quia hic locus vtriusque luminis fulgore destituitur, reliquus autem alterius tantum; quod profectò nihil aliud est, quam locum illum corpori opaco proximè duplicata vmbra obscurari. Patet secundò ex hisce, lumen à primo suo exortu longius prolapsum continuò languescere; docentque ingentium pyramidum illuminationes, quarum vmbra ita successiue languescit, vt extremam, & tenuiorem portionem vix à cætera luce distinguas; circa radices verò arctissimam vmbra reperias ob dictas rationes. Sicut igitur lux diffunditur à lucido corpore in medium vniiformiter difformiter, ita & opacis corporibus vmbrae. Patet tertio corpus opacum, quò plures radios luminosi intercipit; eò ampliorem vmbra proijcere. Cum enim vmbra lumini quodammodo aduerfetur, necesse est eadem quæ lumini ipsi, etià vmbrae euenire. Sicuti igitur lumen tantò maius est, quantò plures radios continet, obiectumque corpus intensius illustratur; ita vmbra hoc tanto maior est, quò plures continet radios vmbrosos, at tot continet radios vmbrosos, quot luminosos opacum prohibet. Ergo.

*Varij vmbrae gradus.*

*Experientia.*

## CAPVT IV.

*De physica vmbrae efficiencia, ac primò de vmbrae terrena vilitatibus.*

**I**CVT lumen, vt supra visum est, innumeras in natura rerum vtilitates exhibet, ita & vmbra: quæ quidem Conditor sapientissimus ita connexuit, vt si alterutrum destruas, mundum perire necesse sit; Mundus enim sublunaris, vt sine lumine consistere non potest, ita nec sine vmbra. Vt verò vmbra haberi posset in varios mundi vsus concessa, corpora opaca veluti ex ipsis frequentibus vmbis constipata ordinavit, vt inhiherent ambientem lucem; & in inhibitione vmbrae efficerent. Hinc opaca omnia & in se sunt tenebrosa, & alijs vmbrae, obscuritates, & tenebras offundunt. Terram quoque tenebrarum matrem, & opacorum omnium sublunarium maximum, & tenebrosissimum, rotundam esse voluit, vt lucis, vmbraeque vicissitudines melius excipere posset. Hinc telluris superficiem Solis lumine illustrari, eandem quoque tenebris per vices non sæculorum, non annorum, non mensium, sed dierum, atque horarum obduci videmus. Dum enim Sol ab ortu per occasum vigintiquatuor horarum spatio in ortum iterum circumuoluitur, vniuersam in superficie terram suis radijs luminosis simul & vmbrosis lustrat; radijs enim ad eius partem aliquam accedentibus tenebræ inde pelluntur, & qua tenebræ succedunt, pellitur lumen, ita vt semper, & perpetua quadam vicissitudine, sese & fugiant, & fugent: & cum in lumine sumus, diem appellamus; & dum in tenebris, noctem. Et diem quidem Auctor naturæ laboribus

*Vtilitas vmbrae*

*Motum telluris opacum quo ad vmbrae & lucem.*

*Umbrae omnia  
bra Terrarum  
globe.*

bus, occupationibusque hominum, noctem verò eorumdem quieti attribuit. Sapientissimè igitur umbra ordinata est. Primò, vt partes telluris radijs luminis efficacissimè percussæ, calefactæque umbra nocturna temperarentur. Secundò, vt aër nimia luminis raritate dissipatus, nocturnæ umbræ frigore denuò condensatus exsiccatam terram humoris sui benigna aspergine recrearet. Tertio, vt hæc lucumbres radiationes essent horarum, dierum, & noctium, annorumque veluti discrimina quædam, & metæ inceptionis, definitionisque temporum. Quarto, vt magnificentia Conditoris in maximo illo syderum, Lunæ, Planetarum, fixarumque stellarum ornatu (quæ omnia sine umbra in lumine ipso Solis veluti perpetuis tenebris obsita iacerent) ostenderetur. Quis enim vnquam, nisi Deus hanc umbram obsidisset, in tot arcanorum naturæ notitiam, quot iam eius ope singulis noctibus summo stupore obseruamus, dum admirabilem illâ luminum, astrorumque pulchritudinem, efficaciam, varietatemque contemplantur, peruenire potuisset? Vides igitur, quanta nobis ex vnica terreni corporis umbra commoda emanent. Quæ sanè tanta sunt, si vt lumen ne, an umbra nobis plus proficit? nesciam. Ne verò terreni globi incolæ de Conditoris prouidentia conqueri possent, dies & noctes ita sunt circa terram toto anni tempore, & locis omnibus ita aptè distributæ, vt nec lumen tenebras, nec tenebræ lumen vllò temporis momento vllibi superent. Si enim omnes horæ tum luminis, tum tenebrarum, in vnum simul tempus colligantur, nullus in terris locus reperiretur, qui ex æquo per sex menses ad amussim integros tenebras, per sex verò alios lumen non aspexerit. Quia tamen lumen ex ingenta sibi nobilitate principalis qualitas, omnium; quæ in inferiori mundo sunt, conseruatrix est; naturæ quoque necessitas voluit, vt terrenum corpus plus lucis, quam tenebrarum obtineret, ne umbra, quæ tantoboni veluti quædam priuatio est, damnum rebus inferret; ideo atmosphæram primo constituit, naturæ auctor, vt in ea refracti Solis radij citius Solem supra horizontem, quam reuera esset, exhiberent. Accessit hæc admirabilis illa crepusculorum varietas, quæ tenebrarum nociua densitas atque temperata, ingentia commoda mundo affert: sub polo siquidem constitutis perpetuam quasi creperam seu dubiam lucem tenebris excussis adfert. Vicinos quoque Solis constituit Lunam, & astra, vt in eius absentia tenebrarum mitigarent horrorem. Hinc factum est, vt Luna noctis Domina tantò efficacius suo munere fungeretur, quantò Sol diutius abesset: experientia siquidem docet eo tempore, videlicet hyberno, quò maiores sunt tenebræ, eò Lunam & diutius & efficacius illucere telluri; & sub polo constitutis Lunam semestri sua illuminatione, id est per sex integra signa continuo præsentem, recompensare semestrem Solis absentiam. Ne verò perpetua illa Lunæ præsentia nimia sua humiditate noceret terræ, natura umbram umbra defendere statuit, dum umbrosa lunaris corporis parte ad nos conuersa, lumen Lunæ tantisper diuertit, & sic ex æquo & lumine, & umbra terræ seruiret. Quæ omnia maxima diuinæ sapientiæ argumenta sunt.

*Omnes regiones  
mundi ex æquo  
lumen & tenebras  
participant.*

*Cur tellus se-  
per plus lucis  
quam tenebrarum  
habeat.*



## CAPVT V.

## De Arte Sciognomica.

*De umbrarum mira natura, comparata ad arbores, plantas,  
& loca metallica, eorumque Sciognomia.*



I natura umbram non alia de causa, quam ad temperandum calorem Solis ordinasset, hoc ipsum sufficere potuisset. Quis nescit quàm grata, quàm amœna, quàm vtilia non hominibus dumtaxat, sed & ipsis Brutis, accidant umbrarum diuerticula, dum corporibus æstu solutis nihil gatius sit, quàm ad restaurandas vires in umbrosis locis commorari?

*Umbra arborum  
in refrigerium  
concessit.*

*Fraxinus æstiuas ubi spargere cœperit umbras,  
Et graciles nutant præcelso vertice pinus,  
Laurus Baccigeris distendit brachia ramis  
Etesiaque lenes, & somno mollior aura  
Arguto resonas perstringunt murmure sylvas.*

Quæ subinde adeo integris exercitiis grata extiterunt, vt diuinis honoribus umbrosas platanos à Xerxe, & Alexandro affectas tradant Auctores. Verùm vt umbrarum commoda fusius prosequamur, primò de qualitate earum, quæ eas vt plurimum frigidiusculas, interdum salutiferas, nonnunquam etiam noxias hominibus, animantibusque fuisse obseruamus. Et sanè mirum alicui videri posset quomodo umbra priuatiua quadam natura constans tam varios alterationis effectus in corporibus humanis, brutorumque producere possit;

*Umbra platanis  
integrè est oxar-  
cium tenuit.*

*Vsq; adeo capitis faciunt vt sæpe dolores  
Si quis eas subter iacuit prostratus in herbis.*

Huiusmodi paradoxa vt explicentur; Notandum est aërem hanc naturam sortitum esse, vt simul ac lumine solari percussus fuerit veluti dissipatus in rarissimam abeat substantiam: & iterum simul ac radijs illis se rarefacientibus per opaci corporis interpositionem fuerit priuatus, ex raritate in densius corpus coalescat: sicut enim luminis rarefacere, diducere, dilatare, ita frigoris condensare, constringere proprium est. Hinc fit vt in umbris, vt plurimum aura illa frigidiuscula fessis, æstuque solutis corporibus gratissima perfruamur. Cum enim umbram necessariò aëris dissipati sequatur condensatio; & in angustiorem locum coarctatio; fit vt aër constipatus, ne locus alicubi vacuus relinquatur, aliam successiuè aërem vndequaquæ extra umbram constitutum violenter attrahat, ex qua violenta attractione aëris agitationem; ex agitatione autem aëris auram frigidiusculam consequi necesse est. Atque hæc est genuina ratio, cur vt plurimum tenuissimus, gratissimusque hominibus ventus aërem umbrorum occupet. Iam verò explicandum quoque est, qua ratione umbra nunc salutifera; nunc nociuas qualitates à se diffundat.

*Cur semper au-  
ra mollis & fri-  
gidiuscula in  
umbrosis locis.*

*Umbrae nunc salutiferae, nunc noxiae dicuntur.*

Quemadmodum inter plebeios Philosophos perperam sentiunt, qui umbram rem aliquam purè positiuam esse arbitrantur, eò quòd varijs qualitatibus imbutæ nunc prodesse, nunc obesse comperiantur; ita inter Doctiores non parum hallucinantur, qui umbram puram putam luminis priuationem esse absolute pronunciant. Cum enim umbra vtriusque entitatis confortio gaudeat, id est

& entitate priuatiua iuxta, atque positiua constet, vt in præcedentibus ostendimus; sit vt & vmbra veluti causa particularis ad qualitatum in vmbri impressarum productionem concurrat. Quomodo autem id fieri possit aperio.

Duplex vmbra  
necessa inaccessi-  
sa.

Sciendum igitur vmbra dupliciter considerari posse; saliam inter loca Soli inaccessa, cuiusmodi sunt vmbra intra domesticos parietes, vt potè cubiculorum, conclauium. Aliam esse in medio luminis opaci aliquis interpositione causatam. Opacorum verò vmbra causantium, iterum infinita pene multitudo & varietas, vt parietum, mœniorum, domorum, templorum, arborum diuersissimarum vmbra.

Nos hîc tantummodo de arborum vmbri loquemur: nam sub hisce maximè prædictarum qualitatum congeries comperitur. Sunt autem arbores diuersæ diuersis qualitibus præditæ, vt notum est, quas vmbra participant, ea, quæ sequitur ratione.

### Sciognomica artis fundamentum.

**A**rbores dum feruidissimis Solis radijs percussæ æstuant, sit, vt hoc æstu humor in subtilioribus arborum partibus, puta folijs, existens hoc æstu dilatatus in subtiliores vapores expiret; vnde æstiuo tempore arborum folia, vt plurimum flaccida, & veluti exsiccata intuemur; vapor autem hic qualitate arborum naturali imbutus ærem sibi consimilem, eadem inficit; hic mixtus æri vmbroso vt potè subiecto crassiori, quem veluti frigidum ad sui conseruationem, ne nimio Solis æstu dissipatus euanescat, suapte sponte petit; qui cum hominū animantiumq; æstu laxatos corporū poros subit, propria substantia contagione, ijs vel emolumentum, vel nocumentum pro diffusæ qualitatis ratione adfert. Atque hoc est fundamentum, quo nixi reliquas Artis Sciognomica regulas hic in gratiam Physicorum, vt quarum arborum vmbra tenendæ, quæ vitandæ innotescat, subiungemus.

### Regula Prima.

**O**mnia illarum arborum ærea quadam natura constantium vmbra humano corpori salutifera sunt, Pyri, Pomi, Cydoniæ, Amygdali, omnia Auranci-orum, Citriorumque genera, & tantò quidem saniores, quantò fructus homini plus conferunt. Siquidem hæ vapores expirant vaporibus naturæ, id est, spiritibus valde consimiles. vnde & ijs spiritus æstuans temperatur, confortatur, & humana membra mirificè instaurantur. Hinc Egyptiorum mos fuit, vt omnes illos morbos, quorum vis esset in perturbatione spirituum, cuiusmodi sunt phrenesis, melancholia, scoromia, vertigo, tristitia; arborum dissipatiua quadam facultate pollentium amœnis vmbri musica adhibita curare soliti sint. Ex ijs verò arboribus quas *Arboribus* Græci vocant Tillam, Platanum, Populum, Ulmum, Fraxinum ipsa natura non alio sine, nisi ad voluptatem vnicamq; mentium relaxationem vmbra sua promouendam produxisse videtur. Quarum quidem singularum vmbra eadem ipsa corpora afficiunt qualitatè, qua ipsæ constant. Hinc vmbra citriarum æstuanti cordi mirificè conferre scribit Albucahis Arabs. Melapiorum quoque vmbra Tabidis ob gratam pulmonibus humiditatem, quam expirant præscribi, tradit Columella, & sic de alijs.

### Regula Secunda.

**L**oca vmbrosa salutiferis herbis, Rosæ, Thymo, Origano, Hyssopo, Mentha, Nardo, aliisque plantarum salutiferarum speciebus consita, dum æstu resolu-

Vmbra arbori  
salutiferarum  
salutifera est.

Aegyptii nota-  
ret.

æ salutiferis suis vapidisque halitibus vmbrosam ærem inficiunt, iisdem corpus humanum mirificè confortare comperitum est, & singula quidem membra, ea qualitate qua imbui naturaliter appetunt, ita in vmbra Cardiacorū, halitus cordi, pulmonariorum pulmonibus, & pectori; hepaticorum iecinori, Aphrodisiorum Veneri, aliorum alijs mēbris in vmbroso ære vapidòq; medio impressi mirificè conferunt. Hinc ipsa animalia circa ipsum crepusculi tempus, quo herbae maximè vires suas euaporare solent, vti & in vmbri maximè prætorum fragrantia lætari videmus. Confirmat hæc eadem exemplum cuiusdam adolescentis, quod oretenus & tanquam testis rei *admirabilis* mihi retulit Henricus Coruinus celebris Romæ Botanicus; nam dictus adolescens quoties in horto suo locum quendam non viriditate minus, quàm vmbrae amœnitate conspicuum vistoraret, toties adò vehementibus libidinis stimulis agitabatur, vt insolita quadam prurientis corporis affectione agitatus satyriasmum contraxisse videretur. Contigit autem vt cum dicto Coruino nobili Seplario quodam tempore amicus tractans, ei passionem suam reuelaret. Is quod erat suspicans, locum sibi monstrari postulat; quo facto rotum locum Satyrii quodam genere, cuius nomen consultò tacemus, repletum inuenit, quo inuento nihil facilius perito Botanico fuit, quam causam tam vehementis symptomatis assignare. Retulit quoque hanc herbam tam potenter ad venereos motus excitare, vt vel manu detenta quis sese manifesto satyriæ commotionis periculo exponat: vt proinde mirum non sit, Venerem tam potenter fuisse agitatam, qui herbam eiusdem genuinam sobolem tam frequenter terendo mole- stauerat.

Plante quæ sub  
arboribus con-  
sita, vim ha-  
bent medicam

Exemplum  
mirabile de  
quodam adole-  
sente.

### Regula Tertia.

**O**mnia arborum graueolentem odorem spirantium vmbra capiti noxia sunt, vt omnes species picæarum, Pinus, Larix, Abies, Terebinthus, Cypressus, Sambucus: nimia enim vapidæ exhalationis vehementia caput, cerebrumque offendit capitisque dolores causat, vt ipsi, qui vmbra earum inconsultò diutius captant, norunt; & exemplis patebit. Hinc qui sub huiusmodi arborum vmbri dormierunt, vel diutius commorati fuerunt, hos plerumque maximam capitis grauedinem, doloresque contrahere videmus. Spiritus enim bituminosi arborum huiusmodi in vmbroso medio condensati poros laxatos, os, naresque subingredientes dum in caput eleuantur, maxima ibi symptomata pariunt. Vidi aliquos, qui sub larice, pinibus, & abietibus dormientes, ita fuerunt hoc grauari odore, vt febri inde contracta multis mensibus lecto affixi hæserint. Carolus Clusius quoque in suis Exoticis, in America Laricis genus esse tradit, sub cuius vmbra dormientes, tã potente delirio inuadantur, vt expergiscentes extra se facti inde miros mores assumant; alios Prophetas agere, quosdam milites, nonnullos mercatores, vnumquemque id tunc temporis agere, ad quod eum naturalis incitat propensio, sola potenti illa virtutis bituminosæ expirantis & in vmbra se potentius exerentis efficacia. In loco vmbroso Mandragoris, Solano, Stramonio, cæteri que soporiferis herbis consito, sopore profundissimo corripit, à quo non nisi efficacissimis remedijs excitentur. Porta tradit. Et in Stramonio sumpto, exemplum in milite vidimus, qui viatores ad bibendum inuitatos, succo dictæ herbæ, vino misto, haustoque ita dementare solebat; vt quidam lethargo contracto simul & vita & bonis cederent latroni; nonnulli non nisi multo tempore ad se redirent, at omnibus rebus spoliati.

Arbores graueo-  
lentes capitis  
dolores causant.

Varia exempla  
sorum qui sub  
arboribus dor-  
mierunt, varios  
morbos incur-  
rerunt.

Mira proprietas  
Laricis Americæ.

## Regula Quarta.

Venenosarum  
arborum um-  
bra lethifera.

**O**Mnium arborum venenosam qualitatem diffundentium vmbrae tamquam lethiferae, & exitiales vitandae sunt, cuiusmodi sunt Napellus, racemosus, Stramonium, quoddam Tytimali genus, caeteraque Aconitorum species: in vmbra enim harum nullus impunè requiescit. Nam veneno diffuso, porisque animalium aestu laxatis illato, si non subitanam, saltem ijs adeo vehementia adfert symptomata; vt nisi maturè occurratur, aegrè vt plurimum euadant. Taxi quoque vmbra Plinio teste adeo est exitialis, vt vel cibum sub ea captantes interimat, vnde non incongruè forsan Toxicum à Taxo nomen meruit. Huius exempla Botanici nobis praebent ferè innumera; ex multis pauca delibabimus. Est hic mons quidam omnium eorum, qui campos Romanos cingunt, longè eminentissimus, Tyburtino agro incumbens, nomine Ianuarius vulgò *Mòte Gennaro*. In huius summitate montis duo non ita pridem pastores caprarum sub arbore quadam intra exiguum tempus extincti reperti sunt. Quos dum Medici ad examinandam mortis causam inspiciunt, omnique plaga; & vulnere carentes reperiunt; liuor vultuum nescio cuius veneni latentis mani festum tandem praebuit inditium. Sed dum nemo veneni qualitatem cognosceret, admiratione defixi causam follicitius inuestigant; Consultis tandem rusticis, qui montis naturam probè norant, reppererunt mortis causam fuisse Napellum racemosum virulentissimi veneni fruticem, in hac montis solitudine non infrequentem, sub cuius vmbra aestuantes sese prostrauerant virulentaque euaporatione oppleti dormierant simul & aeternum obdormierant. Quo exemplo reliqui pastores moniti vmbra huiusmodi fruticum veluti lernam fugere coeperunt. Similia exempla refert Herrera de noua Hispania, in qua arbor adeo virulenta reperiri ait, vt nemo impunè, & sine manifesto vitæ periculo vmbra earum adire possit; quin ipsa animalia naturæ instinctu ab eisdem quantum possunt, recedere. Herbas quoque sub eis crescentes omnes venenosas, & deleteriae facultatis esse; Mathiolus quoque in Historia sua de Aconitis, plures in locis vmbrosis, in quibus magna vis Aconiti proueniebari extinctos esse. Narrat Herrera in Historia Americae in nouo regno Granatensi arborem Aquapun dictam esse tam potentis virulentiae, vt Hispani primum exitialis facultatis ignari sub vmbra eius dormientes, hydropicorum instar immodico omnium membrorum tumore distenderentur. Barbaros quoque nudos; aut ebrietate sopitos, sub ipsa diutius commorantes, rupta nimio tumore pelle omnibus fuis intestinis, miserando quodam mortis genere passim interire asserit. Cuius quidem rationes in virulentam arboris vaporem pestiferumque halitum tumefactiua vi pollentem conijciendam esse nemo, qui nostrum fundamentum Sciognomicum penitus rimatus fuerit, dubitare debet.

Exemplè de  
Napelli um-  
bra lethifera.

Mons Ianua-  
rius.

Animalia ipsa  
vmbrae lethiferae  
fugiuunt.

Mira vis arbo-  
ris Aquapun.

## Regula Quinta.

Metallis euapo-  
rationibus um-  
brosa loca ve-  
nerata, noxia.

**V**allès quoque vmbrosas metallica expiratione foetas diuersis in locis, diuersa in hominibus ibidem commorantibus symptomata inducere, notissimum est. Hinc in campis quoque Arsenico & spiritibus mercurialibus turgentibus; aestiuis noctibus nemo sine vitæ periculo commoratur. Expirationes verò ex Antimonio & sulphure, in nocturno aëre exceptae, dum poros humani corporis subeunt hominem sine vlla salutis spe è medio tollunt: Vt vel hinc causa pateat, cur quaedam loca hominum sanitati ita sint infesta; & cur multi in campis, & montibus sub dio dormientes paralyti, tremore totius corporis, omniumque membrorum conuulsione non alia de causa, nisi ob spiritus metallicos ibi latentes inuadantur.

In Andibus Peruuiae plerisque vomitus, aliaque exotica symptomata eueniunt, non nisi ob Antimonij & Salnitri, cerebrum & stomachum infestantis copiam; & cur potissimum in Campis Romanis dormientibus adeo sit periculosus aestiuo praesertim tempore nocturnus aër; quia videlicet Sol aestiuus magnam ex terræ cauernosae visceribus malignis qualitatibus imbutae copiam extrahit, quae nocturno aëre frigidiusculo condensata; & ad naturalem statum in vmbroso aëre reducta, dum poros dormientium intrant; propria substantiae contagione sanguinem inficiunt corrumpuntque, quam sanguinis corruptionem febres malignae, atque has caloris natui dissolutio, & tandem mors consequitur.

Cur Rame  
nocturnus & esti-  
uus aer ita no-  
xii sit.

## De Sympathia, &amp; Antipathia Vmbrarum.

**P**RO sympathia, vel antipathia rerum vmbrae quoque variari certum est. Sunt vmbrae quibusdam animalibus amicae, quibusdam inimicae. Fraxini vmbra ouillo generi amica, ita verò serpentibus, teste Plinio, inimica est, vt per ignem potius, quam per vmbrae eius transeant; & prius quidem certum, vltimum tamen experimento facto falsum cognouimus. Nouerunt hanc vim serpentibus inimicam tum Quadrupedia, tum Volucra, quae omnia sub huius arboris vmbra impunè degunt. Luscina quoque hanc ob causam eam maximè amat: cum enim summa illi sit cum Serpentibus antipathia, intra huius vmbrosos ramos veluti in arce munitissima contra hostem tuta viuit & secunda. Hinc nulla vmbra est, quae non ab aliquibus animalibus appetatur, ab aliquibus verò fugiatur. Vmbra enim Fraxini, Plinio teste, vt omnibus animalibus amica, ita venenosus omnibus ferè inimica est. Taxus autem, quem & Arabes Napellum muris perperam vocant, dum in Theophrasto differentiam inter *uis* & *uis* non capiunt, quorum primum murem, alterum muscam significat. Nos restituiumus Napellum muscae: nam in hanc diem muscas ex radicibus huius fruticis adnascentes in pollinem reductas, antidotum veneno insectis secretioris medicinae candidati praebent. Huius vmbra amica est Serpentibus, Bufonibus, insectisque virulentis, vt potè quorum venenum sibi roboretur, omnibus verò caeteris animantibus inimica.


Luscina cur a-  
mat Fraxinum.

Napellus muris

Cocao Nouae Hispaniae frutex est, ex cuius fructibus celeberrimus ille potus vulgò *Chocolate* dicitur conficitur: haec herba ita deperit Ebani vmbra, vt sine hac veluti indignabunda pereat, nec nisi sub vmbra eius adulescere possit. Hinc nullus ferè huius herbae frutex (teste Fr. Ximenes Herrera, Læto) & reperitur qui non sibi adiunctum habeat Ebani fruticem se inumbrantem, & contra Solis arbores defendentem.

Cocao.

Arum herbae ge-  
nna.



Mira de luglan-  
dis contrarietas  
cum tilia.

Mira de morfu  
canis rabiosi.

Tora & Anto-  
ra umbra.

Regula vniuers-  
alis artis Scio-  
gnomicæ.

Dicitur Auctores memorant quo-  
que de certa Ari specie, cuius fru-  
ctus in formam Cylindri protube-  
rans, dum Solem ferre non potest,  
natura ipsum folio prælongo & su-  
perius incuruato veluti umbraculo  
ita vestiuit, vt Solis radijs sit inac-  
cessus: nam Soli ortiuo, meridia-  
no, occiduo ita obrenditur, vt ex  
nulla parte radij solares illud at-  
tingere possint; versus Boream  
verò liberam auram capit aperto  
folio; videtur Arum nostrum  
simile quid habere, vt rem  
examinanti patebit. Herbae quo-  
que sunt, quæ vehementer amant  
certam arborum umbram; ita Po-  
lypodium, Scolopendria Quercui  
indiuina sunt; Adiantum, & Cym-  
bellaria umbrifis fontium parie-  
ribus; picearum arborum umbris  
Thapsia, Herba Cuculi, Coryletti;  
Taxorum verò umbris Acconita  
omnis generis amica sunt. Sunt  
quoque umbræ umbris contrariæ;  
ita dolorem capitis, quem in um-  
bra luglandis quis contraxit; mira  
quodam ratione mitigari mox ubi  
umbram Tiliæ attigerit, experimē-

to est comprobatum à Schenckio, alijsque. Experientia quoque docuit, quod qui  
ex morfu canis rabidi Hydrophobiam contraxit, sanatusque umbram Corni subierit  
is in eadem irremediabiliter reincidat. Obseruata fuit hæc mira vis primùm in  
quodam Lugdunensi anno 1636. vt Auctor Pentagoni Medici-Philosophici nar-  
rat. Iterum quicumque sub umbra, ubi copiosa Tora prouenit, dormiens veneno-  
sum halitum exceperit, sub umbra in qua Antora prouenit, pulso venenoso ha-  
litu confestim sanabitur. Vnde talis regula formari potest.

Herbarum, quæ sub umbra alicuius arboris prouenerint, nociua qualitas, pellitur,  
dissipaturque alterius herbae antidotæ umbra. Sicut enim se habet vis herbae  
vnius intus sumptæ ad vim alterius, quam profligat, ita & vapor, seu halitus  
vnius, alterius vapore vt pote eidem antipathico profligatur.

Atque hæc sunt, quæ de umbrarum physica efficientia dicenda putauimus, vt  
quanti cuiusque rei umbra momenti sit, ex recensitis historijs appareat; quamque  
ingentia naturæ mysteria sub umbratili naturæ tegumento lateant, omnes videant.  
Quæ omnia si exactè obseruarentur, magnam ea physiologis nouarum obseruatio-  
num ante hac inuisarum occasionem præbere posse, neminem qui hæc rectè per-  
penderit, dubitare posse arbitror. Sed iam de umbrarum physica dissertatione ad  
colores diuertamur.

PARS

# PARS TERTIA DE RERVM NATVRALIVM CHROMATISMIS,

Siue

## DE COLORE LVCIS ET VMBRAE SOBOLIS QVÆ ET ARS CHROMATICA DICITVR.

### P R A E F A T I O.



**E**RVTVM est nullum in hoc sublunaris mundi am-  
bitu corpus adeò diaphanum, quod non quamdam sibi  
adiunctam habeat opacitatem, reperiri: unde conse-  
quenter si nullum foret in hoc mundo corpus opacum,  
neque luminis reflexio, aut in diuersis medijs eiusdem  
refractio, nullum quoque in mundo colorem præterquam  
primigenium illum luci concreatum, conspicuum futu-  
rum certum est. Sublato verò colore omnem in mundo visionem interire ne-  
cesse est; cum omne visibile non nisi per superficiem coloratam spectetur; imò  
ne lucidum quidem Solis corpus videri posset, nisi id opacum esset, & visum  
nostrum sisteret. Vnde consequenter patet, nec lumen sine umbra, nec sine lumi-  
ne umbram vlla ratione esse posse, totiusque mundi ornatum ex luce & umbra  
ita constitutum, vt si ab illo alterutrum subduxeris, nec mundus rē nos dici,  
nec admiranda illa natura pulchritudo sub visum vlla ratione cadere possit.  
Quicquid igitur spectabile est in hoc mundo, id non nisi per lucem umbrifam,  
vel umbram lucidam spectabile est. Cum igitur color quaedam opaci corpa-  
ris affectio, seu, vt cum quibusdam dicam, opacata quaedam lux sit, lucis &  
umbræ genuina soboles; de eo hoc loco tractandum duximus, vt & sum-  
mum mundana pulchritudinis ornamentum, & quam admiranda eius ope  
feri in natura possint, curioso Lectori innotescat. Cum verò in omni bona  
Philosophia subiecti alicuius notitiam exquisitam habere debeat, quicumque  
de eo, eiusque affectionibus solidè ratiocinaturus est; ideò nos Philosophi prae-  
ptum complentes, de definitione coloris Chromatologiam nostram auspicabimur.

I CAPVT

CAPVT I.

Quid sit color?



Pythagorici colorem nihil aliud, quam εἰρηόνομα, id est, superficiem esse crediderunt: quam sententiam ita tuebantur; Color & superficies se habent vt vnum & ens: sed hæc cum idem sunt, vti vna generatione oriuntur, ita eadem corruptione abolentur: quæ omnia & coloris, & superficiem conueniunt, dempto siquidem colore, demitur superficies, & è contra, Ergo, Plato verò certum quoddam coloris genus absolutè lumen esse voluit, dum eum veluti

flammulam quamdam fulgoremque è singulis corporibus emicantem, partes habentem visui ad sentiendum accommodatas, definiuit. Albertus putauit sublato lumine qualitatem quamdam remanere in corporibus ex primis qualitatibus orisdam, quæ sit veluti quædam coloris materies, eius verò forma, actusque lux sit. Confirmat autem opinionem suam his argumentis. Quia colores, cum in nubibus auroræ ascensu, in plumis Pauonum notantur, præter lumen, aliam causam, non habent; ergo à lumine non differunt, & certè bene dixissent, si hi colores illos minimè veros, & reales, sed purè apparentes, ac phantasticos esse, ac nullas proprias causas habere, demonstrare potuissent. Iterum absente lumine vniuersa corpora delitescunt: ergo nullus color ante luminis appulsu conspicuus existit: Ergo color idem, quod lumen est. Huic respondemus, absente lumine colores quidem oblitescere, & oculis eripi, non verò rebus ipsis, sunt enim ex se, & sua natura visibiles, etiam si lumine non persandantur. Melior igitur est definitio Aristotelica, qua colorem nihil aliud esse dicit, quam κίνησις τῆ κατ' ὀφθαλμοῦ ἀφ' ἑαυτοῦ, καὶ τῆς ὄψεως ἢ φώτος, id est, motiuum eius, quod est perspicuum actu, & id est ipsius natura.

Color igitur mouet medium diaphanum, quod iam actu lumine illustratur: distinguiturq. color à lumine, quòd lumen dum medium diaphanum mouet, facit ipsum perspicuum; at color supponit actu illuminatum, vt illud moueat; neque supponitur medium priùs tempore illuminatū, quàm à colore moueatur; sed vno eodemq. tempore, quo inficitur colore, etiā lumine collustratur, illo, inquam lumine, quod à corpore colore conspicuo ad visum remittitur, secumq. coloris imaginem, ac formam defert. Alibi quoq. citatus Philosophus colorem dicit πρὸ χρώμα ὁ ἀριστος τῆς διαφανῆς ἐν τῷ σώματι διαφανῆς terminū diaphani in corpore definito, seu terminato: qui terminus, seu superficies sumi debet nõ absolutè, vt Pythagorici eā sumebant, sed in quātum visibilis est; Solus siquidem visibilis color in termino corporis inhabitat; et si enim colores mistorum totam rei substantiam peruadant intimè, non tamen illi sub sensum cadere possunt, nisi in extrema superficie radiantes. Quòd si subinde colores in profunditate quoque gemmarum, aliarumque concretionum massis, vt in succino in clusæ muscæ, culices, formicæ, aliaque similia perpetuè sepultura mandata spectentur: sit hoc idèd, quod huiusmodi corpora non omnino opaca sint; sed ex parte aliqua diaphana. Vnde mirum non est ex profunditate colores eorum quoque emergere, & spectabiles fieri. Et si igitur color proprie lumen non sit, magnam tamen cum eo cognationem in omnibus habere comperitur: quemadmodum enim lumen, ita & color sui similem progignit, ac per transparentem medium circum-

circa latè diffundit, vt postea videbitur. Quæ vis nulli alteri competit. Sola igitur differentia luminis & coloris est, quòd illud per sese, at hoc non nisi luminis beneficio per suæ virtutis spheram feratur: illud per sese, & actu semper visibile; hoc non nisi remota potentia, actu verò non nisi lucis appulsu.

CAPVT


CAPVT II.

De multiplici varietate colorum.



Philosophi omnes colores passim in veros, & apparentes diuidere consueuerunt: Verorum duos extremos, medios tres, tres item ex his compositos; reliquorum verò colorum sobolem omnem ex his ortum habuisse reperio. Prioris generis sunt albus, & niger, contrarij sibi, atque adèd tota, vt aiunt, diametro distiti: ex his candor vt potè luci simillimus, nobilior est nigro tenebris viciniore. Hinc quantò res quæpiam

candidior est, tantò luci sit propinquior; & quantò nigrior, tantò tenebris sit similior. Medij colores tres sunt, flauus, rubeus, & caruleus. Atque ex hisce duobus extremis vnà cum tribus medijs, omnes reliquæ colorum quorumcunque mixturæ emanant. Ex tribus verò medijs, flauo quidem & rubeo aureus: ex rubeo, & caruleo, purpureus; ex flauo denique & caruleo, viridis componitur, qui vti perfectissimam omnium mixturam continet, ita omnibus meritò gratissimus censendus est; idemque in oculis, quod in auribus diapason iucundissima, gratissimaque omnium consonantia causare videtur.



Analogia rerum cum coloribus.

|             |                  |                |             |            |
|-------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| Albus       | Flauus           | Rubeus         | Caruleus    | Niger      |
| Lux pura    | Lux tincta       | Lux colorata   | Vmbra       | Tenebræ    |
| Lux         | Vmbra tenuissima | Vmbra moderata | Vmbra densa | Tenebræ    |
| Dulce       | Dulce temperatum | Γλυκύπικρον    | Acidum      | Amarum     |
| Ignis       | Aër vel ather    | Auroræ medium  | Aqua        | Terra      |
| Pueritia    | Adolescentia     | Iuuentus       | Virilitas   | Senectus   |
| Intellectus | Opinio           | Error          | Pertinacia  | Ignorantiæ |
| Deus        | Angelus          | Homo           | Brutum      | Planta     |
| Nete        | Parinete         | Mese           | Paramese    | Hypathe!   |

Porò præter hosce medios ipso Philosopho teste, nulla alia colorum species iucunda

Coloris variegationes.

Aristotelian definitio.

Differentia coloris, & luminis

Diuisio colorum.

Extremi colores.

Medij colores.

da per se datur: quotquot reliquæ sunt, ex hisce octo, quorumcunque simplices, tres compositos diximus, resultant. Duo extremi cum medijs faciliè patiuntur commissionem, quos non tam immutant, quam intendunt, & remittunt. Albus cæteros eleuat; niger obfuscando deprimit: vnde ad album se habet, vt tenebræ ad lucem. Flauus vero, rubeus, & cæruleus se habent ad album, vt vmbra ad lucem maiori, vel minori luminis priuatam.

Albus color.

Flauus.

Colores viridi.

Varia colorum genera.

Rubeus.

Cæruleus.

Ad aureum colorè, qui colores pertinent.

Ad viride qui, Purpureus.

Colores apparentes.

Colores apparentes ij vocantur, vt plurimum, qui non ex opacorum, mistorumque corporum superficiebus profluunt; sed ex diuersis diaphanorum corporum medijs visui diuersimodè occurrunt; suntque variaz huiusmodi colorum species. Vocant autem quidam Philosophi eos apparentes, siue φανερούς, eo quòd veri colores non putentur, sed tantum ex diuersa lucis mistura, aliter atque aliter coruscant. Nos tamen nullum colorem purè apparentem sentimus, sed omnes veros colores, veras misturae suæ causas, & rationes obtinentes, vt postea dicitur. Suntque primò ij colores, qui sub auroram Solisque occasum in nubibus apparent, quos interdum rutilos, subinde flauos, hõnnunquam cæruleos, interdum obscuros, ac veluti opacos, alios alio colore imbutos videre licet. Huc pertinent quoque colores in iride, & halonibus apparentes, atque colores varij in superficie maris elucescentes. Deinde fulgidus ille color in auium plumis per Solis radiationem spectatur. Tertio color, quem Sol per vitra diuersicoloria transiens in muro pro diuersitate colorum vitri efficit. Quarto colores in vitris polyedris ex varia lucis refractione resultantes; de quibus omnibus, & singulis dicendum est, vt admirandi lucis & vmbrae effectus luculentius patefiant.



CAPVT III.

Chromatismus aereus,

Seu

De coloribus apparentibus in aere & aqua, eorumque causis, effectibus, vsuque in Arte nostra Luc-umbri.



INTER apparentes colores, seu phantasticos numerantur colores in nubibus, & sub auroram in aere collucescentes, quos non ita phantasticos esse putandum est, vt non veras apparentiae suæ causas, & rationes obtineant. Cum enim proprio corpori insint, nempe exhalationi, quæ permixta vaporì vnà cum lumine transparet, non phantasticè, sed verè, & realiter pro densitate medijs, nunc aliter & aliter apparent. Si enim exhalatio subtilis fuerit, & tenuissimæ substantiæ, nubes flavescent; si pinguis & καυκακη, rubescet. Si aquea, cæruleo velo induta se spectandam præbebit; si terrea denique, lugubri pallio squalebit. Vides igitur secundum qualitatem nubis, colorem lumini mistum variari. Cum enim nubes corpus sit, necessariò id coloratum quoque erit: non phantasticè; ergò realiter. Colores verò sub auroram elucescentes ex varia lucis & vmbrae mistura in aere veluti medio densiore per refractionem fieri infra docebimus: Sole enim infra terminum auroræ constituto, aër tenebrosus conspicietur: dum verò 18 gradibus ab horizonte aberit, ob profundiores aëris vmbrae prima lucis vestigia prodeit, cæruleum nescio quid referens; circa medium auroræ ob æquam lucis & vmbrae participationem rubescet: circa finem verò crepusculi ob tenuem vmbrae aëris lumini admixtam flavescet, quem paulò post lux sequitur, de quibus in sequentibus fusius. Accidit igitur nubibus idem quod aquarum infectionibus: Si enim aqua modico croco tinxeris, flauum produces; si tinctura fuerit vberior, rubeum; si verò terra modica aqua inspergatur, cinereum; si plurima, iam tenebrosam faciem acquirat; aëri verò diaphano eadem accidunt, quæ vitreae pilæ aqua repletae.

Colores nubis.

Que sit causa coloris tam diuersi in nubibus

Colores aurora.

Experientia, Similitudo.

Maris colores.

Colores maris eorumque causa.

De colore aeris cæruleo.

Rursum mare Sole incidente quandoque canum, quandoque cæruleum, quandoque subviride spectatur: Cuius quidem rei ratio varia est: & primò quidem diuersa maris profunditas, fundique color: ita mare viridi fundo constans totum viridescit, sicuti varij maris Mediterranei tractus, quos vulgò le Praterie vocant: mare quod rubro fundo constat, vndas rubeas refert, vt Erythræum: mare verò profundissimum atro colore imbutum spectatur, vt mare Euxinum, idè Nigrum vocatum. Pro colore igitur fundi mare suum acquirat colorem, qui tamen non immediatè in ipsa aqua, sed in fundo subiectatur.

Atque hæc est vna ratio, cur mare diuersis coloribus imbutum videatur. Altera ratio est ipsa lux per aërem illata, quæ variè refracta varios colores refert. Accidit subinde mare tales colores ad nos reuerberare, qualibus ipsæ nubes ei incumbentes sunt imbutæ. Varia igitur causa colorum maris est. Hinc cum ex aduerso Solis radio eminus mare conspiciatur, purpurascit; tum enim cæruleo rubeus miscetur, qui ab exhalatione aëri permixta translucet. Quare mare occiduo potissimum tempore hoc colore rutilat, cum plurima exhalatio diurno calore eleuata nubes occupauit. Cur verò aër, & loca remotissima, ad quæ visiuus radius pertingere non potest, cærulea vt plurimum videantur; etsi huius varij varias causas assignarint, nullus tamen genuinam attigisse videtur. Quidam in fundum Retinæ cæruleo imbutæ colo-

colo-

colore: nonnulli in voluntatem Creatoris; alij in aëris naturam causam coniecerunt. Nos quid sentiamus paucis manifestamus.

### Cur Cœlum cœruleum appareat?

Authoris de Cœli colore sententia.

SCIEDUM igitur visum nostrum nihil nisi colore imbutum videre posse. Cùm vero is non semper in corpora opaca, & superficiebus coloratis terminata, sed in infiniti spatij aërei, sycdereique diaphana opacitate carentia feratur, vt cum cœlum serenum, aut remotissima altissimorum montium iuga aspiciamus; ne, vt dici solet debito sibi sine frustraretur sine termino aërio, immenso illi diaphano spatio à natura certus color debeatur, quò visio, ne in tenebras, & nihilum abiret, terminaretur; at hic color neque albus, flauus, rubeus, esse poterat, cum hi colores luci viciniore præsentiam obiecti, vt videantur, requirant (sicuti enim quæ vicina sunt, luci; ita quæ remotissima, tenebris assimilantur. Vnde colores lucidi, cùm non nisi determinato spacio percipiuntur, tantò ad vmbas, & tenebras plus accedunt, quantò à luce, siue visua potentia fuerint remotiores.) Cùm igitur visus in immensa illa ætherea spatia delatus, ibi terminari deberet, ibi tamen, cùm ob infinitam distantiam, tum ob superficieum aëris infinitam multiplicationem, nisi tenebris terminari non poterat. Verumtamen cum hic color tum oculis, tum mundo esset inconueniens, sapientissimo naturæ consilio factum est, vt inter lucidos album, flauum, rubeum, & tenebrosum, medio quodam colore, qualis cœruleus est, ex inæquali lucis, & tenebrarum mixtura constans, veluti in vmbra quadam gratissima visus terminaretur, ne nimis disgregaretur lucidis, aut tenebrosis constringeretur, aut rubeo incenderetur. Medium igitur inter vtrumque cœruleum proximum videlicet à nigro, seu tenebroso; colorem ad iucundissima illa cœlorum spatia inoffenso visu contemplanda natura prouidissima Mundo contulit; Porro hunc cœruleum aëris colorem, aquæ color proximè æmulatur. Sicuti igitur centrali Terræ color niger, ita iuxta extimam telluris superficiem luteus ei color, qualis est argilla, qualisque ferè se sub terra altius fodientibus vbique locorum purior ostendit. Hinc enim crassiores aquæ ex flauis, cœruleique mixtura virent; cùm scilicet partes non fortuitò, sed naturali quadam societate coniunguntur. Hinc herbæ quoque initio quidem virides, post verò cùm maturitatem prætergrediuntur, humore absumpto, rursus terræ instar flavescent, in terram, vnde sumptæ, reuersæ. Imò humor aqueus concoctione coagulatus, vt plurimum in herbas erumpit, etiam sub ipsis aquis, vt in Alga patet, ita vt solum humidum sine vlla alia seminis mixtura ad plantulas producendas aptum esse possit. Eius rei veritatem admirando quodam naturæ miraculo confirmo, quod Andreas Libavius Tomo 4. Chemicorum, tamquam rem proprijs oculis lustratam, examinatumq. refert.

Cur cœlum cœruleum videatur.

Aqua color cœruleus.

### Experimentum admirandum naturæ vegetabilis in humido destillato.

NARRAT Andreas Libavius loco supra citato de mirabili quadam planta, quæ in aqua destillata ab omni seminalis fecis miscella depuratissima, vt verisimile est, creuit folius humoris fecunditate nata. Verum cùm res digna sit, quæ à Philosphis examinetur, ipsam Epistolam Ieremiæ Cornerij Archiatri Brandeburgici ad Libavium datam, in qua hinc verbis naturæ describit miraculum; Accipe

Accipe Plantula in aqua Trisulphatica (quæ est in Misnia, ad tres abietes non procul à Cygnæa Vrbe) destillata mihi nata picturam. Iam habes, inquam, sed picturam viuam vtiuiam habuisses, quæ profectò longè iucundior extitit, longè amabilior, quàm vides, & pictor effingendo vix adumbravit, ne dicam de colore (erat enim pictura sua coloribus suis illuminata) quæ & pagina attritione ferè euauit. Nunquam sanè sine magna admiratione vidi illam quoties vitrum aspexi, vt etiam alij. Vitrum per se omnino tale est, vt pictura exhibet, vel etiam paulò maioris capacitatis. Qui color sub viridis in fundo inspersus est (pictor sic vitri vmbra reddiderat) is à vitro est, neuti quàm ab aqua, vel sedimento aliquo fundo adhaerente. Nam purissima aqua adhuc est, & planè phlegmatis omnis experta. In plantula ipsa non conspicis stipitem, basim, aut radicem, cui inmitatur, notabilem, nisi exiguam sultem; fundo enim vitri acuminato, seu paulatim eleuato, vti consari solent vitra, vel slo adhaerere videbarur, & sic ad latera spargebat ramusculos plenos foliolis pro totius magnitudine non latis, sed oblongis, etiam suauiter virentibus instar primula teneræ que plantula rosamarinii foliolis oblongis tenellis, vt in gramine acuto, teneroque coloris ex viridi citrini non satis virentis. Non dubito, quin potuisset alius surgere, & crescere; cùm concusso non nihil vitro firma, & erecta persisteret sine ullo motu tremulo. Sed quod dole-



dum, frigori inexpectato in ferijs Natiuitatis Dominice noctu aqua, vt & cætera, in frigido Museo tunc temporis non calefacto congelauit, vnde plantula post aquam de nouo calore resolutam deprehensa est frigoris et lasa; & à fundo auulsa; innaiat itaque iam aqua quamquam colore integro, saltem diminuta mole apparet, quoddam viscositate circa ipsam sese colligente. Contigerat hoc anno 1608. Aqua destillata mensè Iunio à Martino Gallo Pharmacopœo pictura facta 12. Decembris, herba primum obseruata in Nouembri. Hæc Cornerius apud Libavium.

Ex quibus manifestè patet aquam, cùm aliqua quantumuis insensibili fecis seminalis portione, quæ semper aquæ post plurimam etiam distillationem superest vegetable corpus crescere posse, primumq. humorem ex potentia in actum egressum in viridem quamdam substantiam degenerare. Vide quæ de hisce plantis portentosis mira tradimus in Mundo subterraneo. Sed vt ad aëris colorem reuertamur,

Cœlum igitur cœruleum videtur ob multarum aëris partium interiectionem, ac mutuam penetrationem, quæ opacitatis aliquas sumunt vices. Hoc enim proprii muneris habet aër, vt longo sui interuallo res etiam coloratas, & optimè visibiles, & in claro lumine, obtegat sano etiam, atque acuto visui, vt illæ nempe minimè cernantur, & ipse appareat vmbrosior, videlicet cœruleus. Hæc vtraque opaci corporis sunt propria, non autem diaphani. Partes ergo aëris multæ, quamuis omnes lumine æquè illustrentur, inter obiectum, & visum interpositæ ex multitudine interiectionum superficieum aëris veluti densitatem quamdam induunt. Atque ideo in perspicuo corpore contra sui naturam opacitatem aliquam efficientes cœruleum illum, & cinereum colorem referunt, videlicet proximum tenebrosò. Confirmant hæc omnia diaphana: nam si quis duo, vel vitra, vel cristalla, vel selenitem vnum alteri superponat, opaciora efficiuntur ambo; luminis enim penetrationi plus officium duplicata, quàm simplicia, & plus triplicata, quàm duplicata, & sic in infinitum. Quæ omnia penè ad oculum demonstrat Selenites, qui quando è terra etui-

Aerem aliquam opacitatem habere.

Selenites opacius.



eruitur, nil nisi saxum, vel terram opacam refert, sola superficie coruscus & specularis; at cum eum in minutissimas laminas diffideris, nihil eo magis diaphanum repereris. Ex huiusmodi massa lapis specularis, cuius longitudo palmum, latitudo palmum dimidium, crassities duorum granorum hordei latitudinem æquabat, 120. laminas quandoque me excidisse memini, quarum vnaquæque ita limpida, & diaphana, vt nullum vitrum, aut cristallus ei comparari potuerit, aëri exposita ob nimiam substantiæ suæ exilitatem penè reddebatur inuisibilis, nec vmbra faciebat Soli exposita. Quæ tamen omnes laminæ simul coniunctæ ita ex additione partium vmbra multiplicarunt, vt corpus penè opacum dixisses in vmbra tenebris proximam terminatum; aded vt hoc vnicum experimentum cœlestis coloris, carulei inquam causam, ἀποδείξω, assignarit. Partes enim corporis diaphani diaphanis adiunctæ, quantò plures superposueris tantò effeceris opacioris, ita vt tandem & lumini negent transitum, & visui, & colori. Quod igitur in vitreis diaphanis, in fluidis quoque fieri credendum est. Ita maria, quemadmodum ab eximijs vrinatoribus Turcicis Mancipijs Melitæ audiui, qui in mari Erithræo vnionibus, coralloq. inueniendo multis annis operam impenderant; Solis radios non nisi ad certam profunditatem fundum illustrare; vbi altius fuerit mare, in perpetuis tenebris sine vilo lucis vestigio relinqui fundū; cuius quidem rei ratio aliā non est, nisi superficie-rum maris cōstipatio. Quæ omnia vel quotidiana experientia constant. Aqua siquidem in vitreo vase parua lumini multò liberio rem transitum, quàm si maius vas fuerit, quod omnimodā vmbra inducit. In lacubus quoque, & fluminibus, etiam si limpidissima sint, profunda nigricant, non item fundus vadofus. Sed obijcies; aër igitur erit visibilis per se; at nullum corpus diaphanum est visibile per se. Respondeo nullum corpus diaphanum in quantum diaphanum, esse visibile per se: sed in quantum aliquod opacitatis adiunctum habet. Ita aër cum infinita illa superficie-rum constipatione aliquam induat opacitatis rationem, visibilis est non per se, sed per accidens, scilicet ratione partium constipatarum. Vitrea vero omnia visibilia sunt per se ratione soliditatis, quæ cum è terra sint, opacitatem aliquam necessariò induunt; aqua autem diaphana inter inuisibilia numeratur. Secundum igitur gradus quosdam opacescunt diaphana: æther minimè, minus aër, aqua magis, & adhuc magis cristallina, maximè lapides pretiosi; atque hac opacitatis diuersitate colores, & species in lumine edunt, atque ostendunt, vt iam dicemus.

### Experimentum.

#### De vario Aquarum Chromatismo.

Colores, quibus aquæ tinguntur, aut crassi sunt, aut sæculenti, minimèque perlucidi, aut vitri in modum perspicui ac transparentes. Si primi generis sit color, qui aquæ in speculum innatat; palam est eum ex aduerso luminis spectatum, atrum atque obscurum videri, eo quod corporis crassities luminis radium interceptat, ac versus originem repellat. Quod hoc experimento innotescet, si vitream ampullam aqua tincta plenam luminis radio obijcias. Idem verò color, si vitrum ea parte spectetur, qua luminis radium suscipit; propriam speciem formamque exhibet, quam nempe repercussus luminis radius ad oculos intuentis refert. At si apprimè perspicuus sit aquæ insitus color, ex aduerso quidem luminis spectatus, propriam repræsentat imaginem, tantò viuacius, quantò lumen est excellentius. Ex eadem verò parte spectatus, qua lumen procidit, obscurus apparet; ac tantò etiam atrior, quantò est saturatior; tantòque clarior, quantò dilutior est. Cum enim luminosus radius per aquæ simul ac coloris substantiam directò penetret,

ret, nullo obsistente, nullaque parte ad intuitum repulsa; Certè nec aqua nec color videbitur: sed atræ opacitatis speciem exhibebit. Nam quod non videtur, similitudinem quandam tenebrarum præ se fert. Patet igitur, aquas perspicuo colore infectas, cum ex loco spectantur, vnde lumen procidit, obscuras videri.

Simile quoddam in mari videre licet, dum positus fluctibus planum ostendit æquor, nempe sub Solis occasum: si ad orientem conuersi aquam maris intuemur, opacam quandam profunditatem in ea cernimus; siquidem Solis claritas in summam aquæ planitiem obliquè incidens, vmbra subtus auget, inde verò in oppositam partem, orientem scilicet, reiecta; maiorem aspectui concedit penetratiorem; sic ergo fit, vt obcurior aqua ea parte appareat. At contra si ex aduerso Sole mare aspiciamus, ipsius fulgor aquarum planitiem ita perfundit, vt nullus aspectui pateat in profunditatem aditus; idemque ab aquæ læuore refliciens, oculorum aciem ita perstringit, vt quamuis velit, nihil tamen perfectè videre possit.

## CAPVT IV.

### Chromatismus Anaclasticus.

Siue

#### De coloribus in vitris polyedris.



Philosophus quidam cum colorum abditam naturam attentius considerasset, non sine causa in hæc verba prorupisse legitur: Sicuti vespertilionum oculi se habent ad lumen diei; ita intellectus animæ nostræ ad ea quæ omnium sunt manifestissima. Nil meo iudicio verius: quotquot enim huc versus circa colores præsertim Iridis, lego, aliquas quidem rationes adferunt tam multiplicis colorum sobolis; ita tamen in omnibus fluctuant, vt æstu quodam abrepti, cum omnia dicere videantur, nihil dicant. Ego cum hanc calamitatem intuitus essem, experientijs quantum humanæ industriæ possibile foret, rem tentandam putavi; vnde molientis ingenij æstu abreptus nihil non attentavi, vt veras tam rari effectus in vitris elucescentis causas inuenirem. Quo quidem id consecutus videor, vt generales quasdam rationes singulorum colorum inuenirem. Quo verò mensuræ modo singuli singulis miscantur, etiam si quis nouerit, narrare prudentis non est, præsertim cum neque necessariam, neque verisimilem de his rationem adferre vilo modo possit, adeoque profundiora sint, quàm vt humani ingenij imbecillitas illa vilo modo attingere possit, vt potè in Eliæ tempora, vt cum Rabbinis loquar, referuata. Rideo hic Metaphysicorum quorundam inutiles speculationum conatus, qui cum rem omnium manifestissimam, ac cui nulla magis obuia, nulla in vsum humanum magis venit, lucem, inquam, & colores comprehendere non possunt, altissimorum, & ab omni corporeæ contagionis inquinamento longè semotorum entium, naturas, entitates, proprietates, affectiones se assequi posse præsumant. Errant, errant: si namque ingenij laude commendari velint, in hac omnium manifestissima caligine elucidanda laborent, huius nobis aliquam rationem, quæ conclamato Philosophorum molimini aliquo modo satisfaciatur, assignent, & libenter ijs subscribemus; non rebus illis extra omnem ingenij nostri metam positis, de quibus

Coloris natura  
imperferuabilis

Experimentum  
de scientie  
sum.

Radii Solis non  
penetrat ad fun-  
dum maris pro-  
fundioris.

Obiectio.

bus tantum nobiscire datur, ac si rerum natura nunquam fuissent, vitam, vires, tam frustra consumant. Sed hisce per transeantem dictis, nos ad institutum reuertamur. *Quæritur igitur quid sint isti colores? quo modo intra vitri Diaphanum generentur? quarum rerum mixtura consent.* Hoc enim si declarauerimus, de causa colorum in Iride, nulla amplius supererit difficultas, cum eadem sit ijs, ac hisce ratio. Verum cum ea sine experimento comprehendere non possint, prius nostra experimenta prodemus, vt ijs examinatis, in causarum scrutinio tutius procedamus.

*Experimenta varia circa Colorum mixturam.*

**P**rimò præparari nobis curauimus vitra omni colorum genere tincta, Alba, Flaua, Rubra, Cærulea, Nigra; obseruauimusque quod eadem sit mixtura luminis in hisce vitis, quæ in colorum materialium miscella. Triplici autem id modo innotescere potest. Primò directo, deinde refracto, & reflexo radio. Ponantur itaque duo vitra flauum & rubrum, vnum supra alterum, & videbis ea transpiciens obiecta illic aureo quodam colore splendescere. Idem eueniet, si radium reflexum, vitra directè transeuntem in alba charta excipias: vterque enim medium diaphanum tinget ea coloris mixtura, quam ipsa vitra componunt. Si iterum flauum, & cæruleum coniunxeris, & iuxta triplicem radium examinaris; deprehendes medium ijs tinctum, obiectamque chartam totam amoenissimo quodam virore luxuriare. Si denique rubeo & cæruleo rem tentaueris, nascetur tibi medium, superficiisque superba purpura fulgens. Album verò & nigrum nescio quid cinereum refert. Album cum flauo subrubrum, & alio simili superposito, intensè rubrum efficiet; cæruleum cum viridi pauonaceum colorem generabit. Sic non sine maxima animi voluptate videbis ex combinatione vitrorum coloratorum alios atque alios colores nasci. Vbi maxima admiratione dignum est, radium etiam reflexum vitra non transeuntem, mixturam tamen coloris assumere, eamque tinctam in murum repercutere. Iterum si quis intensius Solem in vitris fuerit, & deinde se diuerterit in obiecta tenebrosa, is primo omnia alba, deinde rubra, postea viridia, denique cærulea, donec visus proprio statui fuerit restitutus, visu proportionem naturalem ex luce nimirum per colores dictos, in nigrum degenerante intuebitur.

Secundò accipe vitrum triangulare, seu in prismatis formam conflatum, aut quodcumque corpus vitreum angulare, per quod siue radio visuo, siue reflexo, aut directo, Solis obiecta obseruaueris: certè eodem quadruplici colorum genere tincta reperies. Iterum in omnibus phialis circa confinium aquæ, & aëris, eosdem colores notabis. His itaque positis experimentis;

Dico primò colores hosce nihil aliud esse, quam lucem imminutam, foedatamque, atque aded esse tenebras inter, atque lucem medios. Quæ vt intelligantur; Notandum est lucem integram, & perfectam fieri non posse, nisi maximo calore robore in maxima tenuitate, seu raritate. Si itaque lumen calore fuerit imminutum vel in non pura tenuitate, à perfectione sua naturali tãto plus recedit, quãto magis fuerit imminutus calor, quãtòue medium fuerit densius rariisque: vnde consequenter lux imminuta, languidaque ratione insufficientis caloris, impura, foedatamque, ratione densioris diaphani dicenda est. Est enim superius probatum, hanc lucem esse efficacioram, visiuamque potentiam vehementius ferire, quæ maiorem habuerit radiorum constipationem, & consequenter ex vnitione partium maiorem colorem; tunc verò imbecillius agere in oculos, cum maiorem habuerit radiorum dissipationem, & consequenter dissoluta vnione, minorem colorem. Hinc cum tenebras inter, & lucem, calorem, & frigus, infiniti penè gradus sint, diuersas


*Pulchra experimenta.*

*Reflexus radii coloris speculi, ex quo reflectitur, imgitur.*

*Quid sint colores illi in vitris apparentes.*

uersas quoque flammæ, seu luces fieri iuxta diuersam tenuitatem, raritatemque in medio occurrentem. Albæ, flauæ, rubræ, cæruleæ, aureæ, purpureæ, virides, & proprius quidem lucis color albus est, qui conspici solet in Sole aëre defecatisimo, & in flamma camphurea: hic diaphano densiori mistus foedatur, & ad nigrum, obscurumque agitur. Si igitur color fuerit intensus in medio tenuissimo lucidorum corporum, color erit lucidissimus; si minimo colore constat in medio crassissimo, color erit vmbrosissimus, & vicinis tenebris vix visibilis; quæ pulchra docent supra declarata experimenta. Reliqui intermedij colores secundum gradum caloris, ac densitatis, tenuitatisque medij, nunc luci, nunc tenebris magis accedunt. Hinc colores, qui minus ab opaco patiuntur, albo propiores, remotiores verò, quando à medij opacitate plus patiuntur. Cum igitur in vitro angulari varia sit medij diaphani constitutio, & aliam atque aliam habeat partium constipationem, lux ei illapsa, refractaque, necessario pro maiori partium constipatione, ipsum tingi foedarique necesse est. Oriuntur igitur colores ex diaphano densioris medij, non quouis, sed illo quod tenuitate naturali caret, vt sunt rosca, nè nubes, & omnia cristallina, in qua radius sola refractionis virtute dissipatur; nam radios solares recta, atque normaliter vitrum permeantes, nulla ratione foedari intuemur. At si per inæquale densioris aëris diaphanum ferantur, quãto intimius penetrarint, tantò obscuriore colore inficiuntur, quãto vero minus, tantò clariori. Lux ergo per cristallinum prisma permeans minus densum diaphanum passa, dilucidior habet, meraciore verò colore languet. Verum vt hæc oculari demonstratione proponantur;

*Origo colorum in vitris polyedris.*



Si prisma R T S V X Y; sitque Sol C e. l. n. oculus D H M K. In hoc duplex situs rerum videtur, vnus per radium reflexum qui res non mutat nec in figura nec

nec colore; sed inuersas exhibet, sitque, quando res normaliter vitrum penetrant Alter per radium refractum, & hic res quidem, nec naturali situ, nec colore exhibet, sed nunc curuas; nunc circulares, omni colorum genere adornatas. Refractio igitur sola causat in hoc varia ista colorum discrimina, non autem reflexio, quia reflexio vitrum normaliter transiens non aliter res exhibet ac sunt, sed vti domus, edificia, arbores, in ripa fluminum inuersas: At radius Solis, vbi oblique in larus aliquod prismatis inciderit, bis refractus ad oculum reuertitur, atque hac refractione multum a pristino vigore recedit, cum medium quoque inæqualis sit densitatis. Hinc lumen refractum, & in varia profunditate diaphani varia refractione debilitatum, foedatumque, colores reddit nunc magis, ac minus ad album, & nigrum accedentes. Notantur autem in prismatico tres præcipui colores, ruber, flauus, & cœruleus; flauus vt plurimum mediat inter vtrumque rubrum, & cœruleum terminantes; viridis autem, croceus, & puniceus è vicinis coloribus componuntur. Ita autem in vitro per refractionem oriuntur: Sit primò radius C, qui in vitrum in puncto b incidit, & quoniam per medium densius trauesendum est, ex b refringitur in a; atque ex a in D; quoniam verò in a b breuis transitus est, hoc loco quidem colorem produceret omnium minimè foedatum, albeo que siue luci simillimè quoniam tamen S Y angulus solidus vmbra sua radium transeuntem non parum obfuscat; hinc non albus, seu flauus, sed rubore intensissimo rubet. Iterum quoniam radius Solis n in vitrum incidit in O, refrangeretur in medio profundissimo O R vbi videlicet vitrum maximè latum est, ex O in R; & hinc in K. Inde fit, vt per medium diaphani profundissimi, radius tum vi refractionis bis factæ, tum multiplicationis superficialium, à genuina sua puritate multum degenerans, in colorem abeat vmbrosus nigro vicinum, videlicet cœruleum confinem luci & tenebris. Iterum quoniam e radius in vitrum incidit, in e refringitur is ex e in g, & hinc in visum H occurrat, media videlicet vitri profunditate, vbi refractione nec à vicinis vtriusque vmbrae angulorum solidorum T X, V R, S Y, obfuscatur nimium, neque etiã habet profunditatem; hinc croceo lasciuit amictu, qui vti reliquis est purior, ita colore quoque vestitur albo, seu luci vicinior; reliqui duo colore viridis, & pauonaceus, primi non sunt, sed ex sibi confinis nascuntur; viridis quidem ex flauo, & cœruleo; pauonaceus verò quem passim splendidissimum in collis Pauonum intemur, ex viridis & cœrulei mistura originem suam habet. porò medijs latitudinem exiguam, median maximam ostendit supra posita figura per lineas a. b. G. e. P. o. V. X. Atque hæc omnes colorum differentia pro ratione luminis variantur, vti experienti innotescet. Causa igitur colorum in prismatico, sicut in omni alio corpore cristallino anguloso, alia non est, nisi primò anguli solidi vmbrae proiectiones, quibus lux Solis per medijs diuersimodè densu diuersimodè refracta, ac per vmbrae variè modificata, tinctaque varijs illis, quæ cum admiratione inueniuntur, colorum discriminiibus se vestitam exhibet.

### Corollarium I.

Primò hinc patet Iridis colores aliam, ac de prismatico vitreo, diximus colorum originem non habere. Colores enim omnes ab eodem radiorum ordine, sed ex diuersa nubis profunditate reflectati generantur. Vbi ergo radij nubem primum ingrediuntur, color nitidissimus, & puniceus, & simili tinctura tota nubis, & vaporis superficie, quo radijs pyramidis illuminationis veniunt, perfunditur. Sed non videntur, quòd radij reflexio aliò diuertatur, quam ad spectantis oculum. Vbi radius paulò altius penetrauerit, debilitatur, & per anteriorem nubis superficiem multa opacitate, & vmbrae guttarum implicitis redit versus oculum. Tertio longius iterum adactus in profundum tenuiori adhuc & fusca luce pauonaceus,

Causa colorum  
in vitris refrig.  
nis.

Causa colorum  
in nubis.

& cœruleus emergit; per anteriorem ac infimam arcus curuaturam. Vbi videbis radio Solis recto penetrante medium diaphani aquis rosicidis arcum albo simillimum producere; versus terram verò regnum tenebrarum colorem producere cœruleum tenebris vicinum ob profunditatem medijs, & debilitatem lucis à recto radio declinantis; versus cœlum verò lucis confinium rubicundum producere, colorem ex confinio atræ nubis plus medio foedatū, minus tamè quam infimus arcus.

### Corollarium II.

Hinc patet, quod vbi cumque lumen in diaphana corpora angulosa incidens refractionem causat; ibi colores Iridis omnes apparere, vt fuisse ostenditur in Magia nostra, Catoptrica, vbi innumera huius generis specacula, & Irides representabimus, quò lectorem remittimus. Hinc aqua in rorem inter oculos, & Solè dispersa, ex tempore Iridem cum omni colorum differentia refert, vt notum est.

Angulosa diaphana corpora, colores causant

### Corollarium III.

Hinc patet quoque, ad hosce colores representandos solam lucem solarem sufficere esse, alias verò luces non nisi subobicure eos referre; neque Lunæ lux ad coloratum inde efformandum sufficit, vti diligentissimè me obseruasse memini in Iride lunari, quam mihi hic Romæ anno 1640. Pridie Kal. Octobris tempore plenilunij summa cum admiratione videre contigit; quæ tamen nullo prorsus colore imbuta erat, sed instar fasciæ, & zonæ candidæ, dimidium cœli (mirum visu) frangebat. Ex quo vel vnico mihi postea innotuit ad colores nubium, auroræ, Iridis producendos, robustissima luce opus esse, videlicet solari.

Iris lunaris.

### Experimentum

De ligno quodam admirabili aquam in omne genus colorum tingente.

Hoc loco nequiquam omittendum duximus quoddam ligni candidi Mexicani genus; quod Indigenæ Coatli & Tlapatzatl vocant, quod etsi experientia huc vsque non nisi cœruleo aquam colore tingere docuerit, nos tamen continua experientia inuenimus id aquam in omne colorum genus transformare; quod merito cuiuspiam paradoxum videri posset. Ligni frutex grandis, vt aiunt, non raro in molem arboris excreuit; truncus illius est crassus, enodis, instar pyri arboris, folia ciceris folijs aut rutæ haud absimilia; flores exigui, oblongi, lutei, & spicatum digesti: est frigida, & humida planta, licet parum recedat à medio temperamento. Huius itaque descriptæ arboris lignum in poculum efformatum, aquam eidem infusam primò in aquam intensè cœruleam colore floris Buglosæ tingit; & quo diutius in eo steterit, tantò intensiorem colorem acquirit. Hanc igitur aquam, si vitreæ sphaeræ infuderis, lucique exposueris, ne vllum quidem cœrulei coloris vestigium apparebit, sed instar aquæ puræ puræ fontanæ, limpida; claraque aspicientibus se præbebit. Porro si hanc phialam vitream versus locum magis vmbrosam direxeris, totus humor gratissimum virorem referet; si adhuc vmbrosioribus locis, subrubrum, & sic pro rerum obiectarum conditione, mirum dictu, colorem mutabit. In tenebris verò, vel in vase opaco posita cœruleum suum colorem resumet. Notauit ego primus, quòd sciam, hoc Chamæleon-

Descriptio arboris.

tinæ

Vinæ naturæ portentum in poculo ex dicto ligno elaboratum, atque à Mexicanò Societatis nostræ Procuratore dono mihi concessum, quod & postmodum Sacræ Casaræ Maiestati tamquam rem exoticam & paucis notam, dono transmissi. Porrò in rei adeo exoticæ causâ indaganda, etsi primò & animus, & intellectus defecerit; cum huiusmodi colorem nec inter apparentes, nec veros, seu materiales numerari posse viderem; non prius; cum verus, & realis color sit ex natura ligni, non à luce variè affecta, vt in apparentibus fieri solet, proueniens; neque etiam realis color videri debeat, cum luci exposita nulla in extinguitura videatur, eaque tantum sese diuersis objectis exposita, in diuerso colorum genere exerat; varia tamen experientia doctus tandem causam huius reperi, quâ & in sequentibus aperiemus. Vocatur autem hoc lignum Nephriticum, eò quòd ad renum, vesicæque vitia profectissimum medium sit. Ita autem Barbari præparant: lignum assulatum, & minutum, concisum in optima, & simplicissima aqua fontana macerant; hac aqua assiduo vtuntur, eoque vinum diluunt; & mirabiles experiuntur effectus sine vlla humorum commotione, neque vlla alia est victus ratione opus, quam temperata. Siquidem aquæ sapor non magis mutatur ligni iniectione, quam si nihil in ea maceratum fuisset. Calida & sicca dicitur in primo gradu. Observatum verò fuit, lignum postquam quindecim diebus aqua maceratum fuerit, virtutem illius penitus exhauriri, neque amplius aquam colore tingere.

Quomodo diaphanum, ac coloratum idem sit.

CAPVT V.

Chromatissimus Metallicus, sive Mineralis.



**C**OLOR duplici modo in gemmis visitur, vel diaphanus, vel opacus; opacus color est, qui lucem excipit, non transmittit; diaphanus qui transmittit; vterque vel actu etiam absente luce est, vel absente luce non est; sed ex lucis & vmbre compositione producitur, vt in præcedentibus dictum est. Quomodo autem idem coloratum, & diaphanum esse possit, inuestigatu difficile videtur; siquidem in diaphano visus, vel lux terminari non debet; color autem omnis terminat; atque is est in diaphano; & per totam ipsius materiam diffusus etiam sensu deprehenditur; quod videtur absurdum. Dicendum igitur colorem terminare propriè visum in corporibus opacis, cum inest continuus, & in fluore; cum verò est vnitus, & illius partes materiales superficiem non habent, non terminare absolute ipsum diaphanum; sed tantum ex parte, & imperfectè, quatenus aliquo modo opacum est. Manet igitur diaphanum nonobstante colore tali, sed imperfectè, ab opacitate aliqua colore lumen afficitur, & alteratur, & nõ proprio colore, sed alieno in opaco terminatur. Perfectum, & absolutum diaphanum, id est, quod omni colore caret, & lucis colorem, vt recepit, eodem profus modo rectis lineis transmittit. Dico, rectis lineis, ne excludam iridem, gemmam, aut cristallum hexagonum; quæ absolute diaphana etsi sint; eò quòd rectis lineis recipiant lucem, & eodem transmittant; ex luminis tamen refractione in superficies multiplices possunt varios colores, & quos neque habent, neque receperunt, vel in vicinum corpus transmittere, vel in se conspicuos, ex diuerso oculorum situ etiam diuersos reddere. Imperfectum diaphanum est duplici differentia; vel enim est colore tinctum, quo lux transiens terminatur, vel in parte aliqua colore perspicuo tinctum eundem colorem (accedente lumine per plures superficies refracto) variat, vt in Opa-

Quomodo diaphanum, ac coloratum idem sit.

lo gemma contingit: In hac enim color verè est perspicuus, ac idem per luminis refractionem alteratur, mutatur, ac ex diuerso aspectu, vel oculi situ, eodem in puncto se alium visui offert. Relictis igitur coloribus in diaphanis apparentibus, ad colorum realium in gemmis causas calamus conuertamus. Quidam putant ab exhalationibus, vel spiritibus metallicis, & mineralibus, varios istos colores gemmis induci, eò quòd metallica, & mineralia varia colorum genera in se potentia habere videantur, quæ à mouente aliquo in actum deducantur. Videmus siquidem ex plumbo summam albedinem solo aceto fieri, nigredinem summam oleo; ex eadem vsitione flauus, miniatus, hyacinthinus viridis, & ruber elicitur. Ex vitriolo quoque ruber, albus, viridis, niger, cæruleus, & flauus, ita vt nullum ferè sit minerale, quod non innumeros colores in se potentia habeat, ac tandem proferat. Alij proximiorum causam coloris quarunt; voluntque Salem Ammoniacum, naturæ cuius maxima copia in mineralibus, ac metallis, ac terra inuenitur, colores istos varios producere non solum in illis, sed in plantis, eorumque floribus, ac omni animalis parte, propterea etiam in gemmis, & lapidibus, ac cæteris rebus omnibus colores e genere. Salem autem Ammoniacum naturæ vocant, Sal quoddam spirituale viuificum, quod vino sublimato iunctum illo prius ascendit. Id ab illis putatur esse primum mouens in rei alicuius generationem, nec minus balsami instar conseruans, varijsque coloribus quæuis ornans. Causa illius opinionis est, quod in omnibus rebus inuenitur, & ex ijs elici possit. Deinde quòd collectum, distillatumque omne colorum genus per se proferat, eo quòd ignea sit natura; & quasi incorruptibile, minimoque calore in auras solutum exhalationis instar, quæ ad quæuis tingenda aprissima sit, vitæ varijs coloribus tingat. Ita Iosephus Quercetanus apud Anselmum Boetium. Nonnulli colores ab elementorum varia mistione, eorumque concoctione produci arbitrantur. Plerique à primis qualitibus in materiam deriuant. Nos relictis varijs hisce opinionibus, ad vnam certam nos astringamus.

Variæ experientie.

Sal Ammoniacum cum omnium colorum genera in se continet.

Non negamus primò colores subinde ex primis qualitibus originem suam habere posse; quemadmodum enim in corpore humano varij succi sunt, qui omnes in Microcosmica Republica sua munia habent; sunt fluores albi, sunt nigri, sunt flauj, sunt rubei; ita in terra natura varios fluores constituit, qui vniuersos terræ Meandros penetrantes, terram quam incidunt, tingunt; hic deinde succo perrifico coagulata, saxa diuersi coloris pro misturæ varietate producit: Talia saxa sunt Marmor, Alabastra, Iaspides, quæ ex fluore terris concreato originem sum habent vti striæ variæ, varijsque, atque irregulares ductus, nunc albi, nunc nigri, vt in Alabastris; nunc albi, & nigri, vt in Iaspide; nunc viridis cum fusco flauoque satis demonstrant: de quibus nos ex professo in nostro Mundo subterraneo tractauimus. Præterea sunt quædam seminaria in singulis rebus à prouida natura constituta, ex quibus singulis suis naturalis color, quo ab alio quouis distinguerentur, attribuitur. Sicuti enim vis plastica in semine latens vnicuique suam largitur formam, & figuram naturalibus operationibus conuenientem: ita in semine quoque vniuscuiusque rei vis quoque chromatica, seu colorifica latet, qua vnumquodque conueniente colore ornaretur: nisi enim natura hanc in rebus diuersitatem colorum produxisset, nulla in rerum natura quo ad visum fuisset indiuiduationis discretio. Rem enim, quamuis ex colorata eius superficie, vt plurimum dignoscimus; & potissimum elucet in gemmis & lapidibus. Hinc lapides, & gemmæ, quæ peculiarem, & propriam figuram, vt glossopetra, asteria, corallus, lapis Iudaicus, Aeluropthalmus, siue oculus felis, seminarium, & principium coloris in natura, ex quo formantur, plerumque habent. Qui verò nullam determinatam figuram habent, plerumque ab exhalatione tamquam remotiore, seu à spiritu metallico, & Sale Ammoniaco tamquam propinquiore causa tinguntur; omnes autem colo-

Causa diuersi coloris in lapidibus.

Cuius colores rebus debent, in plastica vis continentur.

Coloris certis rebus debent, in plastica vis continentur.

res vel à luce & à tenebris, vel à calore & frigore, vel denique à perspicuitate & opacitate originem suam trahunt, ut paulò ante dictum est. Vbi & hoc notandum, omnes intermedios colores posse esse diaphanos; album & nigrum omnis transparentie incapaces esse; hinc nullas gemmas esse perfecte albas aut nigras non albas, quia superficierum, ex quibus mate ia, cui inhaeret, constat, multitudine impedit quominus visum terminare possit: sicuti cristallus in pulverem trita albecit, quæ prius unitis partibus translucida erat; ita nix albissima in aquas resoluta primordiali suæ diaphaneitati restituitur, tantumque semper diaphaneitati in corporibus albis decedit, quantum albedinis accedit, & contra; ita ut cum diaphana nullo proprio colore consent, trita non alium assumere, quam album, ut potè vicinè luci natura voluerit. Quòd si quispiam obijciat, Rubinum, Saphyrum, Smaragdum esse diaphanas gemmas, & tamen tritas non candescere? Respondeo tantum his gemmis tritis albedinis accedere, quantum ijs inest diaphaneitatis: Hinc fit, ut gemmæ coloratæ in pulverem redactæ nõ amplius integrum illum colorem ostendant, sed subalbescentem, cum exigua illa coloris portio lucis beneficio intra diaphanum multo sit fulgentior quam in pollinis disjunctis partibus suffocata. Nigræ verò gemmæ esse non possunt diaphanæ, cum nigrum maximè visum terminet, ut potè propria opacorum corporum affectio sit. Medij verò omnes diaphani esse possunt, unde & cuiusvis coloris capaces. Cristallus quoque supposito colore, cum ex aduerso spectatur, tota infecta videtur. Color enim per cristalli densitatem fractis radijs transmissus in ipsa tantisper hæret, ac fluitantis in morem ludere videtur quousque ad optatum proueniat. Deinde ea cristalli planities, quæ subiecto colori è diametro opponitur, radios coloris sursum elatos ab interna, seu caua sui parte suscipit, eosdemque ad infimam cristalli superficiem remittit, qui dum hinc rursus ad oculos redeunt, primis radijs permixti saturatiorem colorem cristalli densitate, quam in circumfuso aëre ostendunt: quo fit, ut cristallus vniuersa tincta videatur.

### Experimentum.

#### Fallacia in tinctura gemmarum.

Cristalli fragmenta naturæ gemmæ forma celatur, substrataque argentea bractea insigniter læuigata, ac colore proprio infecta suo loculamento committitur quam fieri potest arctissimè, ne temerè excidat; ita cristalli gemma naturalis videtur: Quò verò propius ad gemmarum verarum imitationem accedant, bina cristalli frustula ex figura celant, ut simul iuncta vnius gemmæ formam referant. Oportet autem superficies illas, quibus committuntur, exactè planas esse: has porò inter se coniungunt expressa è puriori lacryma, cui intritus est, perfecteque mixtus appropriatus color. Mastiche namque liquefcens igne aut frigore obdurescens tanquam ferrumen partes cristalli in vnum corpus cogit; color autem ex aduerso spectatus per cristalli densitatem, profunditatemque transparet, ipsam longè viciniorè tinctura imbuet ob varias vndique repercussiones, quam si sola supposita sit infecta argentea bractea. Alij quoque vitream tessellam simili colore tinctam inter vtrumque cristalli, ut selenitis, fragmentum inserunt, pura mastiche perlitam. Verum de ficitijs gemmis in Mundo subterraneo, & in Magia nostra horographica cap. 5. plura vide.

Expe-

### Experimenta

#### De mirifico Mineralium Chromatismo ab Authore comprobata.

Triples Chromatismus nobis hinc explicandus est. Primus fit per tincturam totius massæ per proiectiones, & imbibitiones. Secundus fit per gradus ignis, & per frigora. Tertius per ablationes, elutiones, coctiones.

Primò, si argenteum viuum vapore plumbi congelatum cochleari æneo impostum carbonibus accensis calefeceris, ecce mox tibi in liquefacta materia tanta comparebit colorum varietas, ut nulla maior in mundo concipi possit, ita lucidorum, ut nulli eorum, quos apparentes vocant, ijs comparari possint: ex quo experimento haud infrequenter à me obseruato luculenter innotuit, argentum viuum omnium metallorum semen esse, quorum omnium in se potentia, & virtute continet colores, calore in actum deductos.

Secundò, æs album si facere velis, id non tantum talco calcinato, stannoque assequeris, aut argento per colliquationem, & coctionem; verum etiam proiectione pulueris, qui fit ex alba calce Mercurij sublimati nutrita oleo Tartari. Alia via, hanc dealbationem institues; puluerem ex calce Tartari, Alumine, & Arsenico albo calcis lixiuio dilutis, resiccatisque in æs liquefactum conijcies, & habebis quæsitum. Aliquando lustrum aqua facta ex argento viuo sublimato cum Sale Ammoniaco per deliquium; in hac æs, ferrumque resinctum, argenteo colore donatur. Si quis laborem insumere velit, & sublimationem identidem repetere, sublimata deinde aqua regia solucere, solutamque digerere; habebit is magnum in natura secretum, ouum videlicet physicum, cuius vitellus in medio rubet, aqua circumstans pro albumine est, quæ tingitur illo, sicut vitellus rubro.

Tertiò, Plumbum nigrum in candidum hac arte conuerteres. Ex arsenico albo calce Tartari, Sale gemma, & Ammoniaco fiat puluis, quem aceto perfusum septem dierum spatio macerabis, maceratamque ad siccum coques, cuius pollen supra liquefactum plumbum proiectus dabit magnum in tingendis argenteis vasis subdium.

Quartò, Borax Aurificum cæcidus, cæruleus reddatur, si tritus, vrinaque subactus Glasto tingatur: vel purpureus fit, si intensius tinctus fuerit. Simili arte saccharum cristallinum tinges coloribus minimè noxijs. Sales quoque omnis generis promiscuè. Vitriarij quoque in tingendis vitris eo uti solent. Succij verò tingentes sunt vuarum nigrarum, Amaranthi sanguinei, Balaustiorum, Polygoni coccigeri, seminis Heliotropij tricocci, quod primò affricu suo virorem reddit, mox cæruleum, & purpureum chartis tingendis aptissimum. Folia quoque Cyperi, seu Alcanax, quorum succo Arabes equorum iubas, caudas, pennasque Struhionum tingere solent in rubrum, & flauum. Coccinilla quoque Americana, Coccus Baphicus, Chermes nostras purpuram tingit. Alni folia, Rubea, Isatis, seu glastum variè tingunt, de quibus in Mundo subterraneo.

Secundus modus per gradus ignis, ea ratione, qua in præcedentibus ex argento viuo infinitam colorum varietatem excitauimus, quam & alij ex Bismutho quoque, siue plumbo Indico excitare solent perfectissimos varietate ineffabili, & proinde non sine ratione Chimici eam Caudam Pauonum & Iridem dixerunt: Ignis igitur virtute ex Ochra fit rubrica in ollis nouis luto circumlitis exusta, eademque candefacta acetoque restrincta purpureum colorem dabit. Cerussa verò ex plumbum, & aceto fit, hac iterum exusta Minium fit: æs cum sulphure crematum in Cinabarinum degenerat. Spiritus vitrioli tingit ferrum in æs: Sal Ammoniacum plumbum

Mira colorum varietas in argento viuo.

Quomodo æs album fiat.

Ouum physicè magnum in natura secretum.

Plumbi nigri in candidum conuersio.

Borax ut cæruleus fit.

Quinæ sunt succi tingentes.

Alii. modus tingendi res.

Alia experientia de coloribus metallicis.

Varia experi-  
menta.

bum in stannum. Colores figulorum, si cum alia specie illinantur, alium vultum coctione, uti & genera calcanthi acquirunt. Calor enim materiem colorum inficit: nam obscuros illius colores illustres reddere potest. Ficilia si æris squama super porphyrite læuigatæ admiscueris aquam, infecta rufo colore aris instar apparent; ad ignem fornacis exposita viridia efficiuntur: color qui ex ferri squama paratur, Melinus. Zaffara cruda tingit ficilia, subnigro igne percocta in cœruleum præstantissimum mutatur. Cæsálpinus ait esse lapidem, qui vitrum tingat cœruleo, & si plusculum addatur, nigredine; ex cinereo tendere ad purpureum, densissimum, friabilem, qui per se solus non fundatur, sed addito nitro fluat aquæ modo. Cuius tamen praxim, cum experimentum necdum sumpserim; eam neque affirmare velim.

Per elutiones  
& coctiones.

Tertius modus per elutiones, & coctiones; hac industria; metallica, quæ dilui, soluique aquis possunt, ut sales & alumina, à sordibus repurgantur ea soluendo aquis puris, filtrando coagulandoque, ita ut hæc opera tandiu & toties repetatur, quousque color purus, & splendidus placeat: ita sales, tum fossiles, tum excoctitij, quique per artem ex cineribus extrahuntur, sunt candidi ex niueo splendore fulgentes; quidam etiam diaphani, ut salnitrum, alumen. Litargyrium non tantum attenuatur abluitionibus, verum eum niueum redditur. Innumera hoc loco experimenta tradere possum, verum cum ea Mundo nostro subterraneo referuauerimus, superuacaneum esse ratus sum, hic eadem repetere, Ex quibus quidem omnibus luculenter patet diuersam esse omnino compositionis colorum causam, & rationem, neque ad vnam causam adstringi posse, Quæ tamen omnes, à præceptis paulò ante traditis dependent.

## CAPVT VI.

### Chromatismus Botanicus.

Siue

#### De coloribus in herbis elucescentibus.



**N** herbis, floribus, fructibus insigni colorum varietate naturam ludere, Tuliparum, Liliorum, Anemonum varia discrimina satis superque testantur. Quod enim Iridum flores tam concinna colorum serie, quod Tulipæ ex nigro nunc in flauum rubescant, nunc ex albo in cœruleum purpurascant, modo ex fundo diuersi colore in omne genus colorum luxurient; id sanè minimè solis primis qualitibus concedendum est; sed ut in præcedentibus dictum est, chromaticæ virtuti in spermatica facultate contentæ; quæ sicut ex virtute, quam continet plastica vnamquamque plantam propria, & congrua foliorum, florum, fructuum figura ditat; ita & ex chromatica singulis plantis, floribus, fructibus, famulantibus sibi primis qualitibus, & sale ammoniaco singulis rebus inexistente tanquam colorum vehiculo, conuenientem, siue ad ornatum, siue ad interioris indolis veluti virtutum suarum interpretis notitiam, colorem tribuit. Quomodo verò in tam diuersa colorum productione se gerat natura, explicandum est.

Color in floribus ex unde?

Cur plura sint virides.

Quæritur igitur primò, cur singulæ plantæ mox ac extra terram emergunt, sint virides, deinde terreo, ac demum flores alio atque alio, uti & fructus, colore imbuantur.

buantur. Respondeo, cum omnis colorum in herbis varietas à concoctione proueniat, quæ nihil aliud est, quam perfectio à naturali calore emanans; erit humidum terreum veluti plantarum materia, simulque earum cum natæ fuerint, nutrimentum. Sol autem est veluti pater, & cocus; ita ut similis sit ratio plantarum, cum aquis stagnantibus viridi croceoque concretis: sicuti igitur in aqua gignuntur colores actione Solis, ita eiusdem, & natui coloris in humidum creantur colores in plantis. Quantò autem humor plus exsiccat, tãto ad flauedinem & viridè magis accedit. Hinc in Autumno pleraque arbores flauescere intuemur. Cur verò radix plerumque alba sit, causa est, quod terræ insita neque à radijs solaribus attingi possit, neque consequenter exsiccari, unde in primigenio suo statu permanet; at simul ac calore excitatum semen è terra exiuerit, humor à Sole, & ambientis aëris efficientia concoqui incipit & consequenter à naturali humido ad siccitatem tendere; non secus ac de aqua virescente, cui humor plantarum in omnibus assimilatur, diximus. Omnis igitur humor per actionem Solis viridem sortitur naturam: cum verò caulis prorsus exsiccatus fuerit ab humoris abundantia, is terrestrem naturam inducere videtur; humore in folia erumpente; folijs verò non amplius adolescentibus, natura ex spermatica vi insita flores primum reliquo succo depingit, iuxta feminales cuiusque plantæ rationes. In florum verò medio concentrato humido Solis actione materia paulatim in fructum iuxta naturæ requisitionem decoquitur, cui Sal ammoniacum inuisibiliter ipsi admistum, colorem tribuit seminali rationi proportionatum. Humor igitur radicalis plantæ, est materialis causa colorum in potentia se habens ad omnia colorum genera, quorum planta quæuis capax est: Efficiens est Solis, mediante aëris ambientis caliditate concoctio & maturatio; qui, colores singulis plantis debiti à potentia in actum deducuntur. Quæ omnia in Ceraso elucescunt: primò enim ex viridi producit flores candidos intus capillamento fuluo decoros, in quorum medium prior humor adhuc indigestus in viridem globum, hinc in subrubrum, deinde in puniceum, denique in nigrum fructum comestibilem, secundum gradus quoddam concoctionis, & maturationis, prout natura requirit, degenerat, donec suam perfectionem consequatur, & in hominum, cuius causa productus est, necessitatem cedat. Ex quibus patet, cur germina viridia flores nunc albo, ut plerisque Pomis, Pyris, Cerasis, nunc carneo colore subrebelescunt, ut in Amigdalibus nascatur: fructus verò nunc virides, ut Persicis, nunc crocei, ut Peponibus. subinde rubicundi, ut Pomis; nonnunquam punicei, ut Prunis; multis gri sint, ut Moris; quia gradus concoctionis, & maturationis colores assumunt iuxta temperamentum naturale plantæ, & feminales rationes, quemadmodum sæpe inculgatum est. Patet quoque, cur rarò dentur flores nigri, & virides; quia primum in vegetatiua gradu obtinent folia: secundum flores: cum verò primo gradu producto viror competat; is sanè floribus competere non potest, nisi valde rarò, & arte introductus, ut postea videbitur: neque nigri esse possunt, quia niger color perfectam concoctionem, ac maturationem, exsiccationemque, & ultimæ perfectionis gradum denotat, qui in flores cadere non potest. Sed dices multos flores habere maculas, sicuti Papaueris. Respondeo istas maculas non esse signum maturationis, sed spermaticæ facultatis opus ad ornamentum quoddam floris à natura intentum, ut in Fabis, Pæonia, alia omnia, striata florum discrimina & sat docet.

Cur radix plerumque alba.

Quomodo colores mutantur in plantis.

Cur non dentur flores nigri & virides.

### Experimenta.

Qua arte, & ratione in flores dati colores induci queant.

**M**ultum ij sanè Pæologi hallucinantur, qui metallicis succis colorem floribus induci posse putant. Cum enim metallici succi ut plurimum edaces sint,

*Flores non colorantur metallicis succis.*

& rodendi quadam facultate præditi, tantum abest, ut floribus quicquam profint; ut potius penitus eos destruant, utpote heterogenea quadam natura constantes; unde errat Porta, qui Cinnabaris succo radices plantarum irrigatas in flores intense rubicundos luxuriare opinatur: falluntur quotquot Ochra, Sandaraca, Auripigmento insuccatos flores in fulvum seu flavescentem colorem degenerare credunt. Errant, qui bulbos prius aceto per aliquot dies miserè tortos, deinde succo quopiam minerali, intensum colorem se educere posse sperant. Variæ hæ sunt hominum inexpertorum persuasiones: appetit natura homogenea, omnis heterogeneæ, seu dissimularis naturæ impatiens. Quicumque igitur noua florum monstra producere desiderat, homogeneis id succis, id est herbaceis, & non quibusvis herbaceis, sed flori tingendo naturæ quadam similitudine sympathicis præstare necesse est. Sciendum quoque colorem omnem, quem natura sponte fugit, eidem arte nulla indere posse, cuiusmodi est color niger. Errant igitur vehementer illi, qui radices plantarum Loliginis succo irrigatas subnigro habitu lugentes flores prodire velint: frustra dat quod natura negat. Naturæ amissum obseruare debet omnis, cui naturæ miracula patrare gestit animus; secus si fecerit, prius Aethyopem laubit, quam sui iuris naturam esse coget. Imò dico amplius longa experientia ductus doctusque, nullum succum, etiam plantis connatum, propriè, & connaturaliter flores tingere posse, tum quia omnis tinctura ab ipso humido plantæ radicali procedit: tum quia calor externus nulla ratione colorem naturalem internum in spermatica massa latentem sine essentiali sui mutatione superare potest, sed se tandem naturæ propriæ radicali tributaria subdere cogetur, & consequenter omnem extrinsecus aduenientem colorem victum in sui naturam transmutare sataget vis chromatica, non secus ac vinum, quod bibitur rubicundum, tenes, & vesica in colorem membræ naturalem tingere solet: Secus enim in rubricosis locis, omnes plantæ in flores rubicundos erumpent, sicuti in cretaceis in albos, & candidos erumpere deberent, quod tamen experientia contrarium demonstrat. Nemo igitur confidat Portæ, Alexij, VVeckeri imposturis, nemo modis quibusvis, tincturisque, florū, quos Ferrarius noster in sua Cultura florū recitat à Fabro Lynceo Philosopho ita doctus; quem ferè Lynceum in re manifesta hoc vidisse desiderarem. Alium igitur natura hos modum, quo flores tingere possumus, docuit, sitque ante emphyteutica, siue insititia. Experientia docet, Persicum Moro insitutum fructus proferre, ac mora ipsa prorsus sanguineo colore rubentia; de quo nullum est dubium, ut pote vulgare poenè. Amygdalum quoque Pyro insitutum, colores florum pyri, dum floret, assumere, similiter notum est. Hæc igitur arte semina diuersarum plantarum ita committi possunt, ut communem quandam uti naturæ, ita coloris reciproci usum obtineant. Ita rubræ Pastinacæ siue Rapo Hematiti candidi floris bulbis insertus, non candido amplius, sed sanguineo fulgebis sobole: si verò eandem plantam radici Anchusæ inserueris, insitione callida conciliatrice ex albo in Anchusæ colorè degenera puniceo colore fulgebit. Si verò plantæ sobolem bicolori desideres, ita Rosa candida insita rubicundæ produceret rosam utriusque coloris participem. Ita Charyophyllon flores varijs bulbis insiti, eam misturam coloris dabunt, cuius fuerint flores. Quidam etiam Betonicæ Rosas, & Gelsimianum in flores deducunt aurea pulchritudine conspicuos insitione in Genistam facta. Atque hæc est vera illa tingendorum florum ratio naturæ conformis, quam quicumque seruarit, eum intenta in transmutatione florum miracula patraturum nihil dubito. Verum qui plura de huiusmodi scire desiderat, adeat Mundum nostrum Magneticum, ubi de huiusmodi phytomagnetismo fusè disceptauimus. Admirandum verò arcanum naturæ, quæ in plantis, floribusque ipsi figuræ rerum quarumcumque magico quodam & huiusque inaudito artificio induci possint; cum huius fori non sit; Mundo subterraneo

CAPVT

*Colore nigra flores imbuere non possunt arte.*

*Insitione plantæ acquirunt colores alios ex alio.*

*Variæ exempla insitionis.*

## CAPVT VII.

## Chromatistis Zoographis.

Id est

## De coloribus in Animalibus.



RIPLEX animalium genus in hoc capite cōsideramus, Quadrupedum, Volatilium, Insectorum, omittis Aquatilibus, utpote colore elementi, in quo degunt, à natura ditatis. Inter hæc sicuti maxima colorū varietate conspicua obseruantur Volatilia, ita & dispares quoque colorum causas nanciscuntur. Quadrupedum genus minorem colorum varietatem, insignem tamen præ cæteris Equus admittit. Colores maximè communes ei sunt albus, niger, rufus, ex quorum mixture flauus, castaneus, cinereus oriuntur; quorum singuli diuersas causas habent. Quidam ex naturali complexione & temperamento sibi certum colorem vendicant. Nonnulla locorum situ, & Cœli beneficio à specie declinantia, colorem alium acquirunt, ut in supolaribus plagis Vrsi, & Corui nigri albescunt. Non desunt, quæ ex imaginatione in conceptu foetus certas colorum formas sibi acquirant. Magna pars ex Chromatica in semine latente facultate suæ colorationis originem habent. Cur tamen nulli quadrupedi colorem viridem, halurgum, aureumque ineffe videamus, prius hoc loco explicandum est, antequam nostram de coloribus animalium sententiam proferamus. Diximus in præcedentibus, primigenium naturæ vegetabilis colorem esse viridem, utpote aquæ origini suæ proximum humorem, Solis prima confectione in hunc colorem deductum; ac proinde huic naturæ gradui apprimè competentè. Verum cum animalia quadrupedia terrestri quadam natura consent, ac primigenium illud humidum multa terrestri fuligine sit oppletum; hinc fit, ut ab aquea natura recedens terrenum quoddam temperamentum assumat; temperamentum autem istiusmodi sequuntur colores, albus, niger, rufus, fulvus, ex hisce vicinis, qui colores propriè terrestribus, & opacis corporibus, ut in mineralium Chromatistis visum est, conueniunt. Fit igitur albus ex humido terrestri moderatè sicco: nigrum ex humido adusto; reliqui verò colores ex humido partim sicco, partim adusto secundum gradus quosdam oriuntur. In Homine ut plurimum color pilorum ab origine subalbidus, à quo deinde successu temporis in colorem temperamentum conuenientem degenerat. Nequit igitur Quadrupes colorem viridem, aureum, caruleum, admittere, utpote colores naturali temperamento repugnantes, cum prædicti colores aqueæ naturæ opus sint, & consequenter vegetabilium proprii. Cum vero aer vicinior sit aquæ, quam terra, utpote quæ & originem suam ex aquis habeat: Volucres autem originem suam partim ex aqua, partim ex aere trahant; hinc omnium colorum, quibus herbæ, plantæque, capaces quoque sunt volucres. Insecta verò; utpote ex terra, aëre, & aqua promiscua quadam natura constantia, omnibus quoque gaudent, non certis quidem à natura intentis, sed pro dispositione putrium, ex quibus ut plurimum nascuntur; aut imaginationis; quibus in varios colores transformantur; aut denique naturali metamorphosi, quam diuersitas colorum necessariò sequitur. Animalia igitur quadrupedia, quæ humido terreo præ cæteris terrestribus abundat, viridis coloris incapacia sunt, tum ob dictam rationem, tum etiam ob lentorem mucosum, excremen-

*Colorum in Equis varietas.*

*Cur Equi non videantur virides, carulei.*


*Cur Volucres amari colorum genera capaces sint.*

*Cur insecta omnia colorum genera recipiunt.*

excrementumque, unde nutritur cutis; excrementa verò, quæ nutriunt cutem, aut sanguis sunt, aut pituita, quorum neutrius excrementa viridia sunt, aut herbacea, porracea, purpurea; sed hosce colores assumunt sibi ea, quæ à bile nascuntur, quæ alere non potest. Cur præterea Quadrupedia, quemadmodum Volucris, fulgidis illis, aureo, cyaneo, purpureo coloribus sint incapacia; huius rationem hanc assigno. Cum enim pilus animalium sit tenuissimus, nec alter alteri adhæreat, Solis lumen colori mistum consequenter reflectere non poterit; at in pennis id non fit, cum ex ita sibi adhæreant, ut vnum quasi continuum efficiant, & proinde refringendo radios fulgidos, huiusmodi colores referre melius possunt. Causa igitur prima coloris in animalibus, in quantum à temperamento dependet, est humidum, à calore variè affectum; quod verò maculata nunc ex albo, nigroque, aut albo; & rufopleraque conspiciantur, huius mutationis causam dicimus esse opus ex imaginatione animalium in coitu resultans, ut postea dicemus. Quod iterum ex volucris quædam miro quodam colorum ordine, & dispositione fulgeant, id Chromaticæ similitudinis in semine latentis opus asserimus, ad ornatum tum animantis, tum visus humani voluptatem finaliter intentam. Huiusmodi sunt Pavones, Halcyones, Vpura, aliaque innumeræ, quæ in Nouo Orbe innotuerunt volucres, in quarum pennis Architecti pictoris voluntas, & delectus luculenter apprehenditur. Cum enim vna plumula Pavonis, quam speculum appellamus, tanto artificio, tantaque colorum varietate cum exquisitissimo ordine coccinata sit; certè huius operis, nullam aliam, nisi rationem, & intellectum architecnicum assignare possumus. Qualitates enim agunt in materiam cæco modo, nullamque figuram obseruant; In Pavonum speculis figura in coloribus obseruatur, & terminus, quousque talis & talis color esse debeat, non secus quam natura facere solet, dum hominem fabricat; figuram enim in omnibus obseruat, terminumque plasticæ facultatis beneficio, quousque progredi debeat, materiæ constituit.

### De Chromatismo Chamæleontis.

**A** Nno 1639. appulit huc Romam ex Palæstina Religiosus quidam ex familia Diui Francisci, qui inter alia rara, secum quoque portabat Chamæleontem viuum, quem curiosis naturæ rimatoribus conspiciendum præbebat. Hanc occa-



sionem nactus singulari studio dicti animaliusculi naturales affectiones indagandas duxi. Varij de eo varia tradunt, multa quoque reperi animali falsò afficta. Quod verò in eo circa colorum mutationem obseruavi, hic breuiter lectori communicandum duxi. Figura animalis hæc est ad viuũ. Si caput primò meditemur, à medio capite retrorsum ossæ pars triquetra eminet, reliqua pars antrorsũ colligitur caua, & quasi cuniculata eminentibus vtrinque ossis marginibus asperis, & leuiter ferratis. Oculi

Cur quadrupedia perfecta non aureo colore imbuuntur.

Causa colorum in animalibus.

si in caua recessu prægrandes & corpori concolores conduntur, cuius pupilla non mouetur, sed animal totius oculi motu circumspicit, ore semper hiant. Linguam habet longam, & terrestri lumbico similem, in cuius extremitate spongiosus quidam, & glutinosus nodus existit, quo muscas, culices, cyniphesque, quibus viuit, veluti visco quodam inescatas ad se trahit. Cuius rei experimentum ego ipse sumpsi; porrectam enim muscam palmari lingua apprehensam mox sine villo labiorum motu in ventrem submisit; ut proinde mirum in modum ij, qui hoc animal solo aëre, aut rore victitare asserunt, hallucinentur: ad quid enim natura illi ventrem, & linguam tribuisset, si manducandi facultate fuisset priuatum? Pedes anteriores valdè erant à posterioribus discrepantes; primi, ter nos digitos intra binos extra; postremi ternos extra, binos intra habebant. Animal temperamenti frigidissimi, quemadmodum ex pigro quem subit motu colligitur. Figura igitur descripta iam restat, ut in quos colores se vertat, videamus. Plerique Authores in omnes, præter candidum, & rubrum se vertere tradunt. Verum aliter me docuit experientia. Nam hic Chamæleon viridi panno impositus, ita virefcebat, ut vix à subiecto panno; strophiole verò candidissimo inuolutus ita candescebat, ut ne quidem ab ipso strophiole dignosci potuerit: imò quidam etiam dum animal in albedinem panni transformatum vix dignoscerent, id se perdidisse putarint: ita

*Proximus assimilatur teigit quoscunque colores.*

Cuius quidem rei causas varij varias assignant. Solinus ait colores reddere o quos cutis instar, pellis cornæ reuerberatione. Alij in timiditatem, & cibum animalis, quem solum aërem putant; conijciunt causam. Nos quid sentiamus aperiamus. Sciendum igitur primò, hoc animal vti frigidissimum, ita timidissimum esse: tardissimum quoque ad incedendum, ita vti nulla ratione periculum ei insidiantium euadere possit, nisi hoc vnica naturæ dote, qua in colorem rei, cui insidet, ita se transmutet, ut nulla ratione discerni possit; & sic oculos eludat insidiantium. Contulit igitur ei natura pellem, quemadmodum summa curiositate obseruavi, quæ aliquantulum dilatata humore constat pellustri, & coloribus assumendis aptissimo. Dum igitur imponitur folio viridi, animalis phantasia obiecto sibi gratissimo veluti tripudians, dilatando se pellem aptam reddit coloribus imbibendis; hæc dilatata intra humorem cutis pellustrem species coloris non aliter recipit, ac lumen recipitur in lapide nostro Phengite, seu Phosphoro, lumini exposito. Cum verò humor pellis sit vniformis, & continuus, fit ut totum corpus subiecti sibi folij virorem in se deriuatum in oculos intuentium refundat. Hoc idem continget, si panno candido, aut chartæ imponatur. Est itaque principium effectuum coloris, ut quod, in Chamæleonte pellis animalis humore translustri interfluo; principium vero, ut quo, est ipsa phantasia animalis, quod obiecto sibi colorato corpore pellem dilatando aptam reddit colori imbibendo: mortuus enim Chamæleon nullo colore mouetur: quod manifestum signum est, internum quoddam principium esse, quo voluntario motu se in obiectum colorem transmutet; non secus ac in homine pudore affecto faciem rubere, metu verò percusso pallefcere videmus. Simili ratione Polypum pro colore saxi, cui inhæret, compertum est. Atque hæc est mea quidem de Chamæleontis Chromatismo sententia; si quis verò meliorem me docuerit, haud ignitus ei me subscripturum polliceor.

Causa colorum.

Quod sit principium effectuum coloris in Chamæleonte.

### Experientia

#### Chromatismi Animalium.

**D**E hoc Chromatismo fusè in Arte nostra actum est. Quare hic breuiter sum repetendum duxi. Notandum igitur, maximam colorum varietatem in ani-



animalibus clucentem originem suam habere ab imaginatione, vel animalium coeuntium, aut volucrum ouis incubantium; qualem enim tunc colorem imaginata fuerint, eundem & in foetum deriuabunt. Docet hanc Chromaticam Magiam ipsa sacra Scriptura Genes. 27. Vbi Iacob ex variegatis, maculosisque virgibus pecoribus coeuntibus obiectis educit sobolem variegatam. Hac arte Canes, & Equi eius coloris producent foetus, cuius fuerint velamina, intra quæ clausa coiuerint. Quæ si maculosæ Tigrides si cædido & rufo maculatæ fuerint, alba, rufa animalia generabuntur. Ita aues excludent pullos eius coloris, cuius fuerint cortinæ, intra quas clausæ ouis incubuerint. Tantæ phantasticæ facultati sunt vires. Hinc Corui, Vrsi in partibus Arcto subiectis, ob perpetuum niuium aspectum, imaginatrice facultate in niueum mutantur colorem. Hinc domesticæ aues obiectorum varietate in omnigenos colores transformantur. Ex quibus breuiter insinuat, ratio patet, quæ Magus Luc-umbris mira in animalium Chromatismo lucis & vmbre beneficio peragere possit. Sed de hisce, vt dixi, qui plura voluerit, consulat Mundum Magneticum de huiusmodi fusiùs tractantem.

## CAPVT VIII.

### Ars Chromocritica,

Siue

De colorum iudicio, & diuinatione.



VM naturalium rerum colores interni luminis vel vmbre, caloris vel frigoris, humidi vel sicci, luculentissima præbeant iudicia; calidum autem & frigidum, humidum & siccum, prima omnium mixtorum sint elementa; certè sagacem physiologum ex huiusmodi colorum externa, qua vnunquodque imbuitur tinctura, de vniuscuiusque indole, seu de probabilitate iudicij multa producere posse, neminem dubitare posse existimo. Cùm igitur in præcedentibus singularum rerum colores, colorumque causas, & origines pro ingenij nostri modulo disquisuerimus; restat, vt & hanc Chromatosophiam Arti nostræ lucis & vmbre applicemus, earundemque speculationem in aliquem humanum vsum conuertamus. Vbi tamèn secundum vniuersales tantum rationes procedemus, noui enim, innumeras causas ad complexionem hominũ concurrere; non secus ac infinita colorum mixtura constitui possunt, vt tot diuersæ inclinationes homini cõstituendæ sint, quot diuersæ facies & vultus hominũ, aut proinde nihil apodicticè, ac certò in hoc negotio determinari possit, quod etiam hic nos non intendimus, sed vniuersales tantum colorum in homine rationes in ordine ad aliquas coniecturas sumendas inquirimus.

### §. I. Chromocritice temporum.

NVllis verioribus signis, quàm diuersis nubium cœlique tincturis, tempestatum mutationes deprehendi, non Nautis tantum, & Agricolis, verum & nemini non temporis aliquam rationem habenti compertum est; cùm ea plerumque ex vario lucis nubibus mixtæ colore lucumbri se manifestent; nubium verò pluri-

farum

farum productio, vt plurimum ab ortu, & occasu cùm Solis & Lunæ, tum syderum fixorum dependeat, eorum occultatio, manifestatioque Chronica, Cosmica, & Heliaca imprimis obseruandæ sunt. Signa itaque maximè propria primò à Solis, & Lunæ variè affecta luce sumuntur tempestatum: cùm enim Luna noctu sit veluti alter Sol, eademque de causa ob luminis defectum mensium initia vsque ad Schematicum Lunæ *διχοτομον* frigidiora sint; deinde sensim præualecente lumine calor intendatur, maximè puncta Lunæ *διχοτόμα* attendenda sunt, eorumque ratione annus, dies, menses, consideranda. Annum *διχοτομωσ* patiuntur Pleiades, tum ortu, tum occasu suo: Solstitia quoque, & æquinoctia. Qualis enim Pleiadum occasu, aut Solstitij, æquinoctijque puncto aëris fuerit status, eundem retinet vt plurimum ipse aër ad Solstitium, aut æquinoctium vsque; & si mutatio futura est, post Solstitium efficitur. Quòd si nulla mutatio contingit aër, in suo vsque ad æquinoctium statu permanebit, atque inde pariter ad Pleiadum ortum, quem admodum irrefragabilis experientia docuit, parallelo quodam photismo Luna Solis simia in hæc inferiora agit, & plenæ siquidem ac mediæ Lunæ radij mensiem ab interlunio initium ducentes bifecant, ita vt quarta plerumque, sin minus septima; & si per id tempus non sit mutatio, certè fiet plenilunio. Item à plenilunio ad septimam mensis decrefcentis, à septima ad quartam; inde ad Neomeniam, & silentem Lunam redeundum est. Idemque mutationis modus in die naturali vt plurimum locum habet; etenim ortus mane, meridies, vespere, occasus, veluti diuersi luminis gradus, totidem noctis partibus veluti parallelis vmbre gradibus respondentes parem tenent in tempestatum mutationibus facultatem. Verum hæc omnia in præcedentibus fusiùs tractata consulas. Quare signis catholicis neglectis ad particularia descendamus. Sit igitur

Pleiadum Ortus.

### Regula prima.

QVotiescunque cœlum ante Solis exortum intra nigrores nubium coaceruationes purpurascit, certe id portendit vel eadem die futuras pluias, vel temporis mutationem. Si vesperi, serenitatem iuxta illud vulgare:

*Mane rubens cœlum venturos indicat imbres:*

*Serò rubens cœlum cras indicat esse serenum.*

Sed meritò quispiam hoc loco mirari posset, cur eadem apparentia rubri in matutino, & vespertino Sole diuersos temporis effectus inducat? Respondeo nubes purpureas mane portendere pluiam, eò quòd eleuatum nocturnum vaporem, foetisque humore nubes, cùm proximam ad pluiam dispositionem habeant, Sol exortus calore suo vehemente dissolutas in aquas mox distillet; vapores verò vespertinos à Sole diurno non dissolutos, nocturnum frigus coagulet, condenserque: vnde insitæ sibi gravitatis pondere pressi, terræ à qua prodire postliminio restituuntur, aëris statu ab omni halituum sæce purgatissimo relicto. Præterea, si Sol oriens nigro procedat velamine, æque & pluias & ventos portendet: nubium enim nigricans color & vaporum consipationem, & consequenter aptissimam ventis materiam notat; ventos si nubium ex arcto in latum dissipatio, pluiam; si Solis vi eorundem in aqueas partes fiat, dissolutio. Quis nescit puniceam, & roseam cœli lucem Sole horizontem subeunte, vel supra eundem emergente, communiter ab omnibus esse receptum lætantis, ridentisque cœli indicium? Irides circa lucernarum flammulas, pluiarum, imbrumque australium vt plurimum sunt. Nos hanc rationem damus, quòd aura circa lucernam plerumque crassa, & humida lumen lampadis nubeculæ tenuis & subtilis instar recipiat, reflectatque. Cùm verò lux vniformiter difformiterque radios suos diffundat in spheram, sit, vt aër vicinus luci croceum quid, qui deinde ex subobscurò flauo in cæruleam tandem lucidæ spheræ

Cur cœli mane rubens pluias, vesperi serenum portendat?

Iris circa lampadem unde?

M

vm-

umbra deficiens, nescio quod Iridis rudimentum effingat. Hoc quotiescunque contigerit, austrinos imbres instare certo diuinaberis. Hinc pareliorum, coronarumque phænomena communi iudicio eadem de causa densas promittunt imbres. Colores itaque luminarium ad umbrosas tincturas proximi pluuias, ad rubedinem ventos, ad album, aureum, roseumque accedentes risum cœli ut plurimum promittunt.

*Pallida Luna pluit, rubicunda flat, alba serenat.*

Verum hisce omiffis tanquam vulgò notis, ad alia Chromocritices nostræ arcana nos conferamus.

## §. II. Chromocritice Lapidum, Plantarum, Animalium.

### §. 1. De colorum in plantis opinione quorundam.

**L** Vbricum negotium hoc loco tractamus, & non dubito quibusdam iuxta extimam tantum superficiem res æstimantibus temerarium. Non ignoro vni & eidem plantæ diuersos esse colores. Quædam enim in radice alba thyrsum viridem, in hoc flores *malva* ostendunt. Color autem albus, niger, ruber, flauus, cæruleus, diuersas habent suarum missionum causas, ut dictum est. Hinc in duobus plantis natura diuersissimis, eundem tamen colorem reperimus. Ita Pardalianches Aconiti genus florem prorsus aureum producit, eundem & Sonchum producere videmus, at illum sumentibus lethalem, hunc maximè salubrem manducantibus experientia docuit: vnde præter colores aliud quiddam, ut latentè sub colore plantæ indolem perfectè cognoscamus, requiritur. Quod ut innotescat, primò vnde color plantis, & ex quibus constet, disquirendum est. Sunt igitur in plantis colores varij, albus, flauus, ruber, aureus, puniceus, cæruleus, & ad nigredinem vergens ater. Ex quorum missione innumerij oriuntur, veluti intermedij. De albo initium nostræ sit inquisitionis. Aristoteles albedinem ex imbecillitate provenire ait; & idè in puerorum oculis conspicitur: proles enim nuper natæ imbecilles sunt; postea vero in suos colores à natura infitos mutantur. Cui sententiæ tantò libentius subscribimus, quantò maiora veritati argumenta ipsi subesse videmus. Nam video cunctos ferè animantes, siue imbecillitatis causa, siue cæco naturæ vitio procreentur, candidos esse. Suffragatur huic opinioni Theophrastus. Infirmiora, fragilioraque prius alba sunt omnia, quàm nigra, tum in animalibus, tum in plantis. Cùm enim ex humiditate superflua proveniant, non ad eò firmam substantiam habent: imbecillia igitur esse: argumento sunt rosæ, folia & fructus mali punici, quæ initio alba sunt, postremo ex succis concoctione mutantur in puniceum, & halurgum colorem. Frondium partes radici vicinæ, cum ibi ex alimenti suggestione abundet humiditas, semper albescunt; è contra extrema foliorum, cum ibi minus humiditas, & plus concoctionis sit, ut plurimum coloratiora sunt. Fit igitur albedo in plantis ex admitione aquearum partium cum terrestribus, & significat complexionem humidam, & frigidam; in homine verò candor ex terrestrium partium cum aère miscella coloris notat temperiem. Notandum quoque & hoc, quòd quando cum albedine perspicuitas adest in aquæ humido, parum terræ eidem inesse notat, nisi quantum ad terminationem humidij perspicui sufficiat: ubi verò diuersitas, plus terræ. Hinc Cucurbita, Alsine, Nymphæa, Polygonum, flores pyrorum candidi, Rosæ albæ, frigidi, & humidij temperamenti sunt. Candida quoque sequuntur animalia, Anter, Cygnus Struthiocamelus, Cuniculus albus, similiaque, quæ humidis, frigidisque excrementis plena sunt. Niger è contra, seu ad nigrum

*Ex istem coloris planta non eiusdem semper nature sunt, sed differentes quantitates habent.*

*Cui oculi puerorum albi.*

*Albedo in plantis quando fit.*

*Niger color in plantis.*

grum declinans in plantis color, provenit ex terrestri, fumoso, adusto, obscura plantæ fuligine, cui adstipulatur Abensina, qui ait ex adustis humoribus nigricantem vaporem consurgere. Aristoteles quoque: Color agens in humidum colorem nigrum causatur; vnde omnè quòd vritur, nigrum efficitur; quæ tamen nos strictius in præcedentibus sumimus: dicimus enim nigrum adusta quidem notare, at priuatè caliditate, & humiditate: calor enim humiditatem consumit: quæ remanent ergo, sicca sunt. Ita Hyacinthus coloris ad nigredinem vergentis frigidus, & siccus est. Cyanus flos, Viola sublutea, omnia uti frigida sunt, & sicca, ita inter refrigerantia & adstringentia numerantur à Medicis. Rubeum colorem in plantis Abenois caliditatem dicit notare ob ignem in eo cluescentem. Nos dicimus hunc colorem constare ex aqua lucida, & terra multa subtili, incensa, fumosa supernatante, quæ aquam & terram in rubeam conuertit. Dixi, multa terra qui color rubeus, inter umbrosos ponitur, ob terreas, quibus constat, partes: Hinc omnes colores rubri stiptici sunt, ut in rubro vino experientia docet: fructus quoque, quos vltima maturitas nigro imbuat colore, maturescetes rubescunt, & acerbi sunt, vltimam verò perfectionem, concoctionemque consecuti nigrescunt, ut in Cerasis, Moris, Puniceis, Oleis, Vuis, Myrthis, Baccisque vidè est. Rosæ, Leucoiæ, & Chariophilli flores neglecti, vel in aridis locis siccitate rubescunt, in cultis humescentes nigrescunt. Rosæ rubra, Lychnis, Nerium, Aspalathus, siue Santalum rubrum, Papauer Rhæas, humidij, & calidi temperamenti sunt. Citrinus, seu croceus color in plantis, uti medius est inter album, & rubrum, ita quoque inter dictos colores mediam temperiem nanciscitur; observando semper naturam loci, quo gaudent: sicuti enim flos flauus Ranunculi aquis gaudens, primo gradu calidus est, ita Hypericonis, flos montibus gaudens tertio gradu calidus est, & flavior Ranunculo; habent enim & flores suos in coloribus gradus intensiois, & remissionis, quos observare debet, cui Phytomantam agere animus est: sicut enim colores lucidi albus, & flauus ad umbrosos, rubrum, cæruleum atrumque se habent, ita temperamentum quoque plantarum, quod colores indicant, ad temperamentum: Cum enim temperamentum omne sit vel ex calido, frigido, humido, & sicco; hæc verò qualitates originaliter à lucis varia mistura proveniunt: certè facilè in notitiam plantarum hac parallela comparatione veniet, qui omnium ritè combinare norit. Sed iam hisce obiter prælibatis regulas aliquas firmemus, quarum beneficio in discernenda plantarum natura facilius adiuuemur.

*Ruber color in plantis.*

## §. III. Regulæ Chromocritices Lapidum, Plantarum, & Animalium.

**N**otandum primò, nobis hic nequaquam de abditis, siue specificis plantarum virtutibus; sed ijs, quæ ex primis qualitatibus emanent, loqui institutum esse: siquidem abditæ rerum vires nulla ratione à temperamento naturali dependent; sed suas habent origines, quas is solus assignare aptus est, qui occulta illa naturalium rerum odij, & amoris, concordia, discordiaque semina sagaci animo penetraverit. Certè ut huiusmodi plantarum vires intimius rimarer, vndique comparatas rarioris facultatis plantas domestico nostro horto plantavi; ut ex combinatione colorum, succorum, florum, fructuum, foliorum, in veram notitiam qualitatum devenirem; vnde nihil tum dicendum duxi, cuius non me ipsa experientia certiore fecerit.

Notandum secundò triplicem virtutem in plantis considerari posse: vel manifestam ex primis qualitatibus emanantem; vel specificam, seu occultam à forma rei profluentem; vel mediam ex vtraque resultantem; quæ iterum vel plantam aptam

*Varia vis in plantis.*

esui, salutiferamque, vel venenosam, aut mediæ qualitatis Alexiteriam constituit: de quibus singulis hæ regulæ formentur.

Regula prima.

Quotiescunque igitur herbæ concolores, quæ diuersos tamen effectus produunt, occurrerint; tunc manifestum larèntis alicuius abditæ virtutis nullum cum primis qualitibus commerciū habentis, id iudiciū esse tibi persuadeas.

Regula secunda.

Omnes aliæ herbæ, quæ floribus, vel succo, vnum ex quatuor humoribus, videlicet sanguinem, bilem flauam, phlegma, & bilem atram referunt, eisdem humori vel augendo, vel expellendo vt plurimum conferre.

Regula tertia

Rocci plantarum edulium colores, & qui fuluo, aureoque succo turgent, bilem continuo vsu sumptas tunc augmentare, cum ex primis qualitibus originem suam habent. Huius generis sunt Atriplex, quæ Pythagora testis morbum regium causat, & pallorem: Melepepones, mel, & crocus, rapi fului. Indicæ nucis succus, & omnes plantæ, quæ præter colorem dulci sapore imbutæ sunt, bilem flauam mirum in modum augent. Quædam etiam non manducata Ictericos efficiunt, vt de Rana flaua refert Philes, quæ intensius se aspicientes icterico colore perfundit. Idem de Stellione croceo referunt Auctores. Herbæ verò crocæ vel flore, vel succo, quæ inter edules & deleterias, seu venenosas mediam sortitæ sunt, ex vtrisque participant, bilem vehementer attrahunt, attractumque subducunt: huius generis sunt Aloës, Centauriæ, Tithymalli, Colocynthidis, siue Cucumeris syluestris succus croceus; Cassuta; Myrabalanus, Empetron, Cassia flaua, flauam bilem attractam subducunt. Præ cæteris verò admirandæ virtutis Chelidonæ herbæ succus est, cuius radix vino albo imposito in croceum diluitur colorem, quod potum ad Ictericos sanandos infallibile medium esse, à me comperitum est. Reubarbari quoque succus croceus, quantum ad bilem purgandam valeat, nemini non manifestum est. Illa verò crocæ, quæ occulta vis cholericos, seu flaua bile offusos sanare dicuntur, sunt Icterus seu Galgalus fuluo colore conspicuus, qui similitudine quadam naturæ ictericum humorem trahere, & sic morbo illo inuasos liberare dicitur. Erythrodanum, quam nos Rubiam vocamus, aureo succo tumens, Chrysanthemum, Anthemis, Chamæpythis, omnia Genistæ, Absynthij, & Osiridis genera, vel succo, vel flore flauentia, ictericis, biliosisque mirum in modum prodesse tradunt Botanici. Inter lapides Icterias Gemma, abditæ vi ictericis appensa eos sanat. Inter animalia Charadrius, & pleraque volucris flauo colore conspicua idem præstare Porta Auctor est. In hoc tamen plantarum iudicio, magnam locorum, & temporum, quibus proueniunt rationem habebis; siquidem Betonica, verbi gratia, aliam in montibus, aliam in vallibus, aliam hyeme, aliam æstate indolem præ se fert. In montibus enim omnes herbæ luci magis expositæ ira sicciozem complexionem, vt in vallibus, & locis aquosis humidiozem contrahent, & consequenter illæ billem, hæ pituitam magis mouebunt; quæ breuiter indicanda duxi, ne quidpiam in negotio difficili καθολικώτερον asseruisse videremur.

Regula.

Herba bilem refoventes bili cōdicunt augenda vel expellenda.

Herba Cholæga quænam

Lapides Cholæga

Regula Quarta.

Quæcunque plantæ atro colore squalent, atræ se bilis alumnas hoc ipso lugubri indumento monstrabunt. Quare ex similitudine quadam nonnullæ atram bilem, seu humorem melancholicum augmentabunt, nonnullæ verò etiam autum euacuabunt. Quæcunque igitur herbæ atro colore tristes, aut luteo, seu subfusco, maculosoque amictu se truces exhibent; eas certò scias humanæ naturæ contrarium quid & deleterium portendere. Pythagoræ præcepto, qui atræ coloris res ad mortem pertinere aiebat, Macrobius Veranij testimonium afferens lib. de Verbis Pontificalibus, nigras arbores infelices, felices albas esse pronuntiabat; vnde tutelæ inferorum Numinum committebantur, de quibus vide nos fuscè in Oedipo nostro Hieroglyphico tractantes. Oniromantæ quoque, vt est apud Artemidorum per atræ somnia bilis atræ commotionē, omniaque infausta significant. Atri verò cinerei que coloris, siue alij ad atrum decliues herbæ, sunt Hyosciamus, cuius somnia deuorata non homines duntaxat, sed & omnia animalia vertigine percussa dementat: Smilax, Mandragora, Apij, Solani, & Papaueris plura genera partim atris, partim luteis, cinereisque, aut maculosis pallore interfusis floribus constantes herbæ, somnia tetra & formidanda, in bilis atræ augmento, scotomiam, vertiginem, epilepsiam non solum excitant, sed etiam lethargo subinde homines conficiunt. Napellus quàm formidandus sit, ipso flore mortui hominis cranium experimente satis demonstrat. A Fabâ quoque pallidæ indolis herba Pythagoras non sine ratione suos discipulos abstinere voluit, quod sumentibus frequenter errorem, stuporemque animi cum insigni perturbatione afferat; flatulento verò vaporis halitu, satyricisque effectibus suis ita eundem conuellat, vt sapientia studiosos incapaces reddat, ad inuentis actiones cum dignitate obeundas; idque abdito quodam à natura ipsi impresso characterismo satis demonstrat: siquidem macerata in aqua postriduum apertam vuluam hiatu suo demostret; humor autem ipse, quo macerata fuit, atræ quadam fuligine tinctus, quid in humore virali machinetur, veluti in τὸ τὸνωρ satis declaret: vnde apud Aegyptios, & Flamines Diales Romanos in tanta abominatione erat; vt non dicam illis manducare; sed ne quidem inter florescentes versari, quiescere, dormire, tutum arbitrantur. Porro hæc atræ bilis alumnis omnia quoque ea animalia nigra accenseri solent, quorum carnes frequenti vsu melancholicum humorem mouere, quartanas inducere, carcinomata causare plerique Medici sentiunt. Hanc ob causam bubalus nigra cute, & pilo tetroque aspectu formidabilis in cibo vetatur. Feles quoque nigri coloris, cum venenata quadam & lethifera qualitate cerebri meatus obstruant, epilepsia aliorumque symptomatum lethiferorum causa sunt; Pili eiusdem phthirim efficiunt. Hanc eandem ob causam, à nocturnæ, hirundinis nigra, aliarumque nocturnarum auium esu abstinendum censent, & Columella hæc versibus explicat.

Atri coloris herba.

Hyosciami vir noxia.

Napellus mortui caput flore refert.

Faba proprietates

Animalia nigra atræ bilem mouent.

Hinc Anythaonius docuit, quæ plurima Chiron. Nocturnas crucibus volucribus suspendit, & atris. Culminibus, & quæ feralia carmina flere.

Inter hæc tamen quædam eam naturam sortitæ sunt, vt ex similitudine quadam à tota substantia præmanante atros bilis humores non tantum moueant, sed motos ad se attrahant, attractos quæ data porta subducant: huius generis sunt Veratrum, Elleborus, Mandragora; nil dicam hic de carniū nigrarum esu: Lupina, Bubalina, Pauonina, Anatina, aliorumque animantium, cum pessimi succi sint, à Medicis damnantur. Atque ex hisce pauculis satis, ni fallor, atri coloris in rebus naturalibus indoles apparet, & quid portendat, constat. Sed obijciat forsitan hoc loco aliquis, Piper, Bezoar, Balsamum, Iuniperi Baccæ, aliaque innumera similia

*Cui aromatica  
nigra salutaris,  
animalia nigra  
noxia.*

lia nigra quoque sunt; quæ tamen tantum abest, vt obsint, vt potius aromatica sua vi cor, spiritusque vitales quam maximè roborent. Respondeo illarum rerum nigredinem ex multo differenti temperamèto esse: constant enim ignea quadam, & solari virtute, temperamèti que calidi, & sicci, adusti, cuius dicta nigredo veluti quidam index est. Præter hæc specifica quadam dote, qua sicuti & omnia ferè aromata cor vitæ fontem roborant, a natura donantur. Illa verò, quæ dixi feralis aspectus plantæ & animalia, cum ex frigido humido, vel frigido sicco temperamento, crassoque; & fuliginoso succo consistant, malignam præterea indolem ipse grauis eorundem odor, cum nescio quid virulentum oleant, manifestet; certè in hisce, & similibus non oculorum duntaxat, sed & odoris quoque iudicio standum esse existimem. Sed hisce sit breuiter indicatis, iam ad reliqua properemus,

### Regula Quinta

*Alba phlegma-  
goga.*

**O**Mnes illæ plantæ albis floribus; vel succo, crassiore præditæ, quæ & naturales suos in vliginosis locis plerumque habent: similitudine, & proportionè quadam, quam ad phlegma, seu pituitam habent, humorem, quem referunt, augent. Aliæ verò siccoris temperamenti eundem emendant, & purgant. Lactæ verò plantæ, vt Tiry mallus, Polygala, Sonchus, Beitalzar Aegyptica Plantæ, lac in nutritibus multiplicat; & sic de reliquis.

### Regula Sexta

*Rubra plantæ  
hemagoga san-  
guinem augent.*

**R**ubri verò coloris nonnullæ plantæ sanguinem augent; & ex similitudine naturæ facile coeunt, vt Rapum rubrum, Vinum rubrum, Mori succus totus in sanguinem abire creditur. Nonnullæ eundem virtutum emendant; purgantque, vt Rosæ, Centaureum minus, & hisce similia. Quædam etiam hemorrhoidibus, & dissentericis affectibus profunt ex similitudine coloris: ita Papauer Rhæas, Balsamifera, Rosæ sicæ, Mala Punica, Rhus, Præonia, Amaranthus, Corallus, ex herbarum sanguinea sobole: ex mineralibus Minis, Cinnabaris puluis: ex animalibus sanguis hircinus maximam cum ad sistendum sanguinem qualemcunque; tum ad vulnerum consolidationem vim suo, quem præferunt characterissimo, obtinent.

### Regula Septima

*Misti coloris her-  
ba mistam vim  
habent.*

**M**isti plantarum colores, cum ex diuerso constant temperamento, diuersos quoque effectus sortiuntur; siquidem color ex diuersis gradibus concoctionis resultat. Dico itaque plantas *dyxerimus* seu bicolores, bina vi constare: ita flores albi, croceique pituitam simul; & bilem purgant, vt Anthemis ex Galenod. Parthenium, Sambucus; Ebulus, ex Aelio. Pari ratione radices Leucomelanæ ex atro candidoque pituitam, & melancholiam purgare compertæ sunt. Hac ratione diuersi colores diuersos curant in humano corpore humores: ita Tripolium, Panacæa, Triphera, cunctis humoribus profunt, Serpentæ quoque πολύχρῆμου multus & varijs distinctum maculis, tot nocendi species habere, quod distinctos colores Arnaldus asserit: & prouerbio, Salamandræ morsus tot Medicis habet opus; quot maculis distinguitur. Opalum quoque tot virtutes habere; quot colores, vulgò dicitur.

*Serpentes multi  
color es diuersi  
sunt nocendi pol-  
lenti.*

## §. IV. Chromocritice circa complexionem, & varios hominum mores instituenda.

**N**unc ad hominum mores coloris beneficio perscrutandos progredimur: negotium prorsus difficile & forsitan temerarium. Cum enim maxima humana complexio sit varietas, vt pote quæ ex infinita causarum concatenatione, vt plurimum oritur; certe demens habèdus foret, qui non nihil apodictice se asserturum in negotio ita vario polliceretur. Sicut enim vix vllus homo est, qui cum altero in omnibus prorsus quo ad vultum, incessum, vocem, cæteraque corporis lineamenta conueniat; ita & inclinatione naturali quoque dissidet vnus ab altero: qui tamen omnes aliquo prædominante humore ex quatuor tantum humoribus constant; isque maximè in colore elucescat; de colorum indicijs aliquid, probabiliter & non nisi secundum vniuersales quasdam rationes differemus. Quod dum facimus, primò quid color, & quotuplex sit in homine, & vnde originem suam adipiscatur, quomodo alij virorum, alij mulierum. Quinam denique sint vniuscuiusque Regionis peculiare. Color itaque nihil aliud in corpore humano est, quam extrema corporis diaphani actu existentis in corpore determinato superficies; & colorata dicitur, in qua reperitur terminatum perspicuum, & videtur, cum ab externo lumine receperit actum; vnumquodque enim compositum vel diaphanum est, vel ex diaphano conflatum, siquidem ex quatuor elementis constat; quorum tria sunt diaphana: cum ergò in superficie actuatur à lumine externo ad diaphanum, quod ibi adest, talis dicitur color; & superficies huiusmodi colorata appellatur. Cum ergò colores sint extremitates compositi corporis, & corpus sit vario modo compositum, inde varij etiam oriuntur colores. Cum autem nos de coloribus hominum agamus; qui ex quatuor humoribus constant varijs coloribus præditis, necesse est pro eorum mistura varios etiam in cute hominis à causa interna colores reperiri. Qualis igitur est quatuor humorum mistio à principio formante in vtero matris facta, talem etiam esse hominis colorem existimamus. Qui in homine secundum naturam simpliciter reperiuntur colores, tres sunt, duo extremi, albus; & ater, hic propriè Aethiopicus, & Zonæ torridæ; alter frigidæ intermediae Zonæ populis conueniunt, estque mistus ex albo & rubro, quorum quisque suam iterum latitudinem habet; ad album pallidus, flauus, & squalidus; ad atrum fuscus, & luridus; ad roseum verò & puniceus, & ruber, & purpureus. In regionibus, in quibus homines naturaliter sunt albi, vel rosei, candidior vt plurimum est fæmina, viro; vbi atrus, lucidior est nigredo mulieris, quam viri: naturaliter enim plus humoris aquei, & minus melancholici in fæmina, quam in viro solet reperiri; quare vir fæmina quoque robustior, & ad agendum promptior est. Sub diuersis itaque climatibus diuersi producuntur coloris homines. Sub Zona torrida vti rerum omnium maxima est varietas; ita & insignis quoque, cum ob Solis perpetuò ei incumbens efficaciam, tum ob telluris naturalem constitutionem, montium, mariumque dispositionem, plantarum, animalium, hominumque est. Quorum plerique ita etiam exiguo coeli tractu dissident morum, inclinationumque diuersitate, vt eos planè toto cælo diuerso climate natos putes. Et sicuti temperamentum eorum varium est; ita & historia eos præ cæteris gentibus vitiosos tradunt. Omnibus tamen color inest fere aut ater, cuiusmodi Aethiopicus, aut eum proximè accedens subfuscus castaneus, ex nigro subflauescens, cuiusmodi Abyssinis, Aegyptijs, Indis, & Nouæ Hispaniæ, Granatæ, Peruuicæ populis. Quorum tamen mores ex colore difficillimè conijcias, cum cælum, virtus terræ, naturalisq; constitutio, parentum mores, viuendique consuetudo potissimum in indole barbararum

*Quid sit color  
in corpore hu-  
mano.*

*Diuersa clima-  
ta diuersi colo-  
ris homines pa-  
riunt.*

*Zona temperata  
omnium præstati-  
ssima.*

*Europa mores.*

*Physiognomicæ  
principium.*

*Omnis natio  
suos habet il-  
lustres viros.*

gentium indaganda consideranda sunt. De his igitur toto cœlo diffitis, cum vix nobis quicquam refcet, ad mores hominum Zonæ temperatæ subiacentium disquirendos nos accingamus; potissimum eorum, qui à 30. gradu latitudinis ad 55. gradum extenduntur. Sub hac enim terrarum Zona ob eximiam temperiem aëris in corpora quoque redundantem, omnia Imperia initium suum habuisse comperimus: sub hac omnes tum Imperij & Dominatus splendore insignes etiamnum, tum scientia & cognitione variarum rerum inuentione admirabiles, & totius mundi maximos homines provenire videmus. In Europa itaque diuersæ admodum sunt hominum figuræ, diuersaque corpora; quidam colorem habent candidum, & roseum, pilos fuluos, aut rutilos, procera corpora, carnosâ, & robusta, animos feroces, suspiciosos, frigoris, & laborum patientes. Alij eodem colore plerunque præditi, sed capillo subfuluo, membris mobilibus; hisque videtur animus inquietus, vehemens, litibus deditus, iracundus, irrisor, ludibundus. Nonnulli alij cum magis ad atræ bilis temperamentum accedant, sunt colore fusci, pilo nigro, corpore mediocri, animo robusto, constanti, audaci, superbo, in fortuna prospera toleratu difficiles, in aduersa humiles. Non desunt, qui nigros capillos habeant, faciem adultam: vti vultus colore diuersus, ita diuersi quoque mores indicantur. Vnde vtpurimum falsum illud principium physiognomicum, & nulla ratione admitendum est: Omni illi homini, cui insunt secundum corpus qualitates, quæ in corporibus hominum talis & talis regionis plerumque existunt; illi insunt etiam mores, & habitus, ac inclinationes animæ illarum regionum propriæ. Hinc enim sequeretur omnibus Italis iuxta Climatis rationem eandem, Germanis, Gallis, Hispanis vnicuique iuxta climasuum eandem, & à cæteris diuersam complexionem esse, quod falsum esse ipsa experientia docet. Inueniuntur enim in singulis hisce regionibus homines docti, prudentes, sancti, ac sapientiam amantes: inueniuntur & omnibus istis vitiosi, luxuriosi, hæretici, peruersi, discoli, deprauius moribus præditi. Protulit Italia homines subtilitate conspicuos, illustriumque Ordinum Fundatores, Sanctum Benedictum, & Franciscum: Protulit & Hispania Sanctum Dominicum, & Ignarium; Gallia quoque suos habet Bernardum, Guiljelmum; Norbertum, Brunonem Germania; Affrica Augustinum; Antonium Aegyptus; Græcia denique omnium Patrum, & Magistrum Basilium, ex quibus veluti quibusdam Ordinum Seminarijs nullo non tempore, homines sanctitate illustres prodierunt. Habet Italia insignes Theologos, habet & Hispania: iactat & Francia suos Hilarios, Irenæos; triumphat & Germania Alberto suo ingeniorum vertice, sicuti gelida illa Scotia suo subtilissimo Scoto; Cypriano Affrica, Aegyptus Athanasio, suis denique Gregorijs Græcia. Idem sentiendum est de reliquis gratiæ, & naturæ valentis vnicuique nationi concessis; de vitijs quoque vnicuique genti proprijs. Stolidus igitur, & insanus omnium opinione foret, qui ita argumentaretur: Germanus est, ergo ebrius: Italus est, ergo libidinosus: Gallus, ergo leuis, vanus, & præcipitati animi: Hispanus, ergo superbus, crudelis. Inueniuntur in Germania vitia Italarum, Hispanorum, & Gallorum; In Gallia Italia, Hispania, Germanorum. In omnibus & singulis omnium vitia, & virtutes promiscuè. Quod nonnullæ verò nationes ad hoc, vel illud vitium procliuiores videantur, illud non tam naturæ, quam consuetudini patriæ dandum est, quæ consuetudo nescio quid naturale in suos obrineat. Induunt Germani vitia Italarum, & Itali Germanorum, vtrique Gallorum & Germanorum, si hi in Germania, illi in Italia, & hi in Gallia, aut Hispania vitiosam gentis consuetudinem laxatis habent sequantur. Sed vt ad institutum nostrum redeamus;

Varie itaque colorum in humano corpore elucescentium causæ sunt, remotissimæ omnes à luce & tenebris. Prima, & principalis est humorum varia temperies potissimum albi, & atræ, puta pituitæ, & melancholiæ: cum enim colores causentur

tur ob mutuam primarum qualitatum habitudinem, seu corporum, quoniam in hac habitudine sicci & humidus inter se, ratio colorum posita est; sunt enim hæ qualitates introductæ per passionem; hoc est, à reciproca passione, quam inter se faciebant primæ qualitates; adeo vt color nihil aliud dici possit, quam qualitas corporis mixti ex mutua habitudine primarum qualitatum cum luce diaphano corpori exorients. Sed & experientia nos hæc docet; si enim tela sicca humectetur, colorem mutat; si pannus purpureus aqua diluatur, colorem perdit; idem exsicceatur, aut reuertitur, aut aliam acquirit colorem. Quod in hominibus ac cæteris viuentibus quoque patet, vt secundum quod magis minusque siccescunt, aut humescunt, varias colorum differentias suscipiant: Diximus ex habitudine, quam habent inter se principia passiuæ; à luce siquidem ignis, qui in rebus est, duas rationes sustinet, vel vt principium caloris, vel lucis; secundum quod est caloris principium, & fons, facit odores, & saporis: vt secundum quod est aptum ex se producere lumen, causat colores. Hanc humorum variam affectionem plurimum promouet lumen, & calor Solis, secundum diuersa climata; Vbi enim vehemens calor est, radijque Solares terram continuo normaliter feriunt, vt sub Zona torrida, humores adusti colorem hominum constituunt nigrum, capillos crispas, corpora maciæ confecta, quam humorum constitutionem necessariò sequuntur affectus mentis, vt paulò post videbitur. Qui verò Solis calorem, radiosque minus participant, vt potè obliqua incidentia terram ferientes; illorum humores, minus quoque ab æstu Solis aduruntur: hinc ex sicco & humido, calido & frigido humores temperati meliorem in corporibus complexionem constituunt; vnde à flauedine, fuscèdineque semper tantò ad album, roseumque magis accedunt, quanto à torrida Zona fuerint remotiores: complexionem autem meliorem melius ingenium, meliorque indoles sequitur: tales sunt, qui Zonam temperatam inhabitant Europei, & magna pars Asia. Qui verò obliquissimè Solis radios excipiunt, vti Zonæ frigida subiecti populi, perpetuo gelu damnati, contrariam defectu caloris sortiuntur torridæ Zonæ subiectis naturam; siquidem humore tumentes nimio; ingenij quoque vis, quæ in calore moderato consistit, ita obtunditur, vt vix rationis compotes esse videantur; vnde colore quoque perpetuo pallido, plumbeo, & squalent, ad studia, & magna perpetranda inepti, vt quibus anima, vt ille dicebat; pro sale data videatur. Hanc vniuersalem Solaris influxus rationem sequitur annuus influxus. Quem admodum enim Sol pro luminis sui in terram abundantia vel penuria, in corporibus diuersorum populorum siccam; aut humidam constituit complexionem; ita Sol annuo suomotoru præstat idem in locis particularibus, dum æstate altior calore, radijsque humorem siccitate inducta extenuat; vnde color quoque variationem subire cogitur, hunc verò defectu caloris corpora humore replentur: vnde & color vegetior, & ad album magis accedens. Corpus igitur, secundum quod à maiori, vel minori calore & luce patitur, & humor à sicco separatur, & aduritur, magis humidum, siccumque, calidum, & frigidum euadit. Porò regionum quoque natura & qualitas potissimum ad diuersas inclinationes cauendas confert: nam vna regio ab altera diuersitate habitudinis, quam Sol, stellæque cum terra obtinent, diuersificatur; quarum vna catholica, de qua diximus, altera particularis ex natura terræ, & loci nata: nam sub eodem parallelo contingit quosdam habitare loca campestria vndique aperta; alios summa montium cacumina, saxosa, sterilia, humore destituta; alios autem incolere lacus, paludes, arboribus constas, & à ventis penitus immunes terras: vnde & his vt varij colores, ita varia quoque temperamenta sunt, variæque inclinationes. Quæ omnia notiora sunt, quam vt dici debeant. Cum igitur varia loca varium aërem pariant, varius aër inspiratus cum euadat, seu pars materialis ad generationem spirituum, fit, vt is in cor penetrans eisdem temperiem remittat, intendat, & variet. Quoniam etiam varia loca varios fructus

*Color sub torrida  
Zona.*

*Zona temperata  
mores.*

*Zona frigida  
mores.*

*Regionum natura,  
& qualitas  
colorem mutat.*

producent, varias aquas habent, quibus populi uti solent: varios autem cibos sanguinem variare, & alterare certum est, patet, quod cibus, porusque cum aere maxime possint corpus nostrum afficere. Patet igitur diuersitas inclinationum. Est igitur Sol principium actiuum colorum; passiuum, humores; formale, lux Solis caesefactiua pro diuersitate dispositionis terrae eam recipientis, humores diuersimode afficiens; ex qua diuersimoda affectione varium temperamentum populorum, varisusque color nascitur. Hinc diuersi populi diuersa nascuntur colorum discrimina. Hinc alias habet inclinationes, qui temperamentum biliosum nactus est cum subdominio sanguinis; alias, qui pituitosum cum subdominio melancholiam; hic ad parendum humilis; ille ad imperandum superbus existit. Altera causa diuersitatis morum in populis adscribi potest educationi, consuetudini, & institutioni: aded enim à teneris adfuescere multum est, ut temperamentum temperanti- que inclinationes corrigere, superare, mutare, & in oppositum trahere possit consuetudo, & educatio, multumque roboris praesertim in homine nactum est; nam homo potissimum ad temperamentum perfectum accedit, quod cum in aequilibrio sit, facile in oppositas partes vertitur; Et hinc patet quomodo etiam ab hominis temperamento deduci possit, hominem in manu sui consilij positum esse, suarumque operationum esse dominum, ut facere, & non facere possit, quae à temperamento, aut ab affectu, aut ab alia causa ipsi suppeditantur. Tertia causa ad societatem, sicut haec ad educationem referenda est. Nam certum est tales nos esse, quales sunt illi; quibuscum familiariter consuescimus, seu quibuscum magna nobis necessitudo intercedit. Quarta ratio aetas est, varijs enim affectibus varias aetates teneri experientia docet: aetatem sequuntur studia, quae tantum possunt, ut iuxta vulgare dictum, omnia tandem in mores abeant. Studium vocamus vitae genus, exercitium, & operationem, quam quisque exercet sua electione, siue casu, siue suorum placito susceperit, Militiae, Doctrinae, Medicinae, aut Theologiae. Hinc militaris vitae genus sectantes, mores militares induunt, religionem amplexantes continua meditatione, carnisque maceratione ita temperamentum ut plurimum mutare solent, ut penè alios dixeris. Hinc certae regiones certo doctrinae genere occupatae vsu & consuetudine alios ad similia tractanda alliciunt. Hinc quidam populi Imperijs assueti, ambitione dignitatum, dominandi appetitum ut plurimum tenentur. Verbo, tantum potest vsus, & consuetudo, animique moderatio, ut nihil vna nationis possit, quod altera, si efficaciter velit, non possit, neque vllum sit vitium vnius nationis, quod ad idem alias gentes, vsu & consuetudine trahere non possit.

Possedit praeposterus quidam affectus ita quorundam Scriptorum animos, ut sine villo iudicio, aut ratione in eam tantum nationem, in quam eos affectio propria, amorque particularis incitat, nunquam satis laudandam ferantur; de ceteris verò ex inconsulto quodam, praecipitanti, & praepostero iudicio omnia alia, quam quod ad laudem dignas actiones spectat, temerè effutiant. Pessimus Scriptorum genus, & odiosum omnibus ijs, qui iuxta prudentiae & discretionis amissim exactius singula scrutari solent, sed haec magis est. Sed ad institutum nostrum reuertamur, artemque nostram ad prima principia resoluamus. Dicimus igitur omne corpus mixtum, siue diaphanum sit, siue adiaphanum, hoc est, ex vtriusque participans, ex quatuor constare elementis. Elementa secundum se corpora simplicia sunt; simplicium corporum alia diaphana, alia adiaphana, seu terminantia diaphana. Haec Terra dicitur, illa Aqua, Aer, Ignis; horum quatuor duo principia passiuia, & duo actiuia: terra sicca est, quare terminata; aqua humida, ergo terminabilis, secundum se autem interminata, & haec duo passiuia sunt. Quare & secundum molem, in rebus dominantur, in perfectioribus terra, in imperfectioribus aqua; amplius, actiuia duo Aer, & Ignis, quorum hic calidior, ille minus, vtraque lucida; sed magis

gis diaphanus aer; lucidus magis ignis, quae vtraque elementa secundum virtutem in animalibus dominantur; album igitur à sicco, alba igitur vel subflaua terra est; huic si miscetur aqua, oritur niger color, ut in glebis madefactis patet; & saepe ostensum est dum de colore elementorum disseruimus: omnis enim nigroris materialis causa aqua est, sicuti frigus est causa efficiens. Si modicus aer accedat, & tantum caloris, ut probe haec duo elementa misceantur simul, fiet viror; siquidem in vegetabilibus prima humoris coactio virorem efficit, qui si ampliori aeri nectatur ignis, efficitur color rubeus, quoniam in hoc maior est lux quam in viridi; si plurimum ignis in mixturem venerit, purpureus nascetur: at maior ignis magis exsiccans id quod ex sicco, & humido constat, obscurat lucem; ut videmus in lignis, quae vruntur. Succedit igitur color caeruleus, hunc sequitur niger qui soboles est terrei aquosi à multo calore exulsi: hi igitur sunt simplices colores, qui ex mixture elementarium qualitatum, elementorumque nascuntur. Hinc siccum & humidum videntur afficere materiam, secundum quod in elementis passiuis siccum, & humidum reperiuntur; calidum, & frigidum secundum quod actiuia existunt, dant formam: ut autem passiuia forment colores, vel ad eos constitutos veniant, non quatenus sunt sicca, vel humida; sed quatenus diaphana sunt, vel non diaphana; ita actiuia non secundum quod calida, sed secundum quod lucida, vel non lucida existunt. Quod si quisquam non lucentem diceret aerem, & terram non albam, sciendum est elementa, & principia esse talia non actu, nam si actu talia forent, iam in esse perfecto, & non in principio, & principia essent, sed principiatia forent, & composita: sunt igitur talia in esse inchoato, & potentia, non autem actu, & in esse completo, & perfecto. Porro humores, ex quibus animal perfectum constitutum est, licet quatuor elementis mundi respondeant, hi tamen omnes ad rubedinem, & colorem purpureum accedunt, cum secundum naturam dispositi sint; hunc enim perfectorum animalium colorem diximus esse eorum humorum, qui in vasis existunt, sicuti virorem, plantarum; nam ex omni ferè planta quae ex terra educitur suum virorem habet, viridia folia, viridesq; ramis sunt & quamuis aliqua plantae lacteae, flauum, rubeum succum prima ruptura emittant, vitimus tamen humor semper in viridem definit. Cum omni similiter animali perfecto, & ex coitu nato, non solo viuiparo, sed etiam ouiparo, si respiciet earumque pulmonem habeat, eductus naturalis succus purpureus est, & ad colorem rubeum accedens, qui tamen simplex non est. Nam diluta purpura piritam docet, purpura sanguinem, splendida, & rutilans flauam bilem, & saturata ad puniceum accedens colorem, & fusior effusa melancholiam naturalem nobis exprimit. Quod si praeter naturam vnus aut alter sigillatim disponatur à calore, aut frigore; nigredinem, liuorem, pallorem, flauedinem, albedinem producent, & quamplures alios colores, quos vide apud Medicos. In humani verò corporis superficie in vniuersum plures duobus, ut plurimum secundum naturam non reperiuntur colores, nempe albus, & ater, sub quibus tanquam generibus quodammodo alij possunt teneri, qui in hominis facie, ac cute solent apparere. Sed ad particularia Chromocritices nostrae praeccepta veniamus.

## Regula I.

De Atri, seu subfusci coloris in facie hominis signis.

Qui itaque valde nigri sunt, quales sunt Aethiopes, timidi sunt, imbecilles, praecipitis consilij, inconstantes, quia cum ab externo calore multo interior euocetur, interna frigent naturali calore destituta, & accidentali subinde incallescunt

Educatio, & mores.

Societas.

Aetas.

Inuestina in quosdam Aethiopes.

Omne animal perfectum ex coitu nato succo sanguineo poller.

Aethiopes nigri timidi sunt.

calescunt; externo verò euocato humore ad cutem, eoque adusto nigrescunt: inde factum est, vt nigri fiant; cui igitur exteriora nigra sunt, illis euocatus est humor cum calore ad partes exteriores, ibique ab externo ambiente aduritur: cuius cumque igitur hoc accidit, illi interiora frigent; cui autem frigent interiora, illi contingit metus. Cui igitur facies nigra, siue fusca est, oculi parui, & capilli crispi, nigrique; consequenter timidus est, malitiosus, dolosus, & cui nunquam fidere possis; maximam etiam & vehementissimam iram, & quandiu latenter seruet, locum & tempus nocendi expectans: quia cum omnia tuta timeant huiusmodi homines, & omnia suspecta habeant, ex timore nascitur dissidentia, ex dissidentia dolosa machinatio; ex hac denique immania facinora, qualia sunt eorum, quæ Leo Africanus describit. Nigritarum, qui Numidiam, Libyam, & Guineam incolunt. Verum hic color cum Europæis minimè conueniat, parum quoque de eo differendum existimauimus. Si verò quispiam huius constitutionis in Europa nascetur, id vitio vel matris imaginantis, vel seminis paterni, vel vteri materni, qui cum iusto calidior sit, euocet ad partes exteriores naturalem humorem, & calorem embryonis, eoque in loco, qui circa cutem est, humorem adurat, & sic foetum tingat, fuscumque efficiat; vnde postea interioribus frigidis, illa ad metum feruilem propensio suboritur.

## Regula II.

*De albi subflauo, seu cinerei coloris in humana facie signis.*

**C**um color albus iuxta præcedentia, mulierum proprius sit, mulieres autem maximè timidae sint, eo quod parum circa cor, multum circa vterum sanguinis habeant; sequitur omnes albos natura quoque timidos esse, ob maximam pituitæ redundantiam, quæ pituita cum humida, & frigida sit, timor eam necessario consequitur, siquidem omnia humida, & frigida timida sunt, vt in piscibus, & in insectis maximè apparet. Sed contra hoc obijcere quispiam posset: Angli, Galli, Germani candidi, & albi sunt, ergo timida natura. At hæc Nationes nulli aliteri audacia, & magnanimitate cedere, heroica bellis gesta fati declinant: audacia autem, fortitudo, & magnanimitas nasci non potest, nisi ex multo calore cordis, quibus abundant, quo albos naturaliter destitui dicimus; falsa igitur est regula. Respondet quod sicut multa nigredo non est causa timoris, secundum quod excessus est nigredinis, sed est signum dispositionis naturalis, quæ virum posset constitueret: ita multa albedo est signum alterius extremi; omnia autem extrema, secundum quod talsa, vitiosa sunt; quare qui nomen viri tueri vult, neque albus, vt femina; neque ater, vt Aethiops esse debet. Cum igitur de albedine loquamur, non nisi de intentione albedine loquimur, cuiusmodi Zona frigida incolæ imbuti sunt. Germani autem, Galli, Angli, vt plurimum non candorem solum, sed & roseo quodam colore, aut flauo, & mellino cum purpura mixto præditi sunt; qui color cum multi sanguinis, calorisque argumentum sit, inter timidos quoque adnumerari non debent.

Quotiescunque igitur color apparet, qualis est, cineris, cum hic effectus sit melancholice cum pituita subdominio, & melancholia cum calida non sit, potest tamen mediocriter incallescere; hunc non dices fortem, sed humanum quidem, & temperatum; neque aliena appetentem: qui verò propriè mellinus est, colorem mellis refert; nimium bilis flauæ in se habet; qui cydonitem colorem comparauit, & ad fuscum magis accedit; leoninum scilicet; squaloremque præ se fert, cum factus

Aut sit à multa melancholia incalescente, & multa flaua bile cum pituita, & sanguinis partibus æqualibus. Homines isto colore imbuti, vt plurimum fortes sunt, & magnanimi, quoniam ex atra, & flaua bile constant, quarum altera cum terræ referat constantiam, ac robur, seu soliditatem, altera cum igni sit similis, vehementiam, celeritatemque, atque in actionibus promptitudinem ministrat.

## Regula III.

*De colore rufo, seu vulpino in homine, & significatione eius in pilis & facie corporis humani.*

**D**vplex rubor est, alter splendore carens saturatus, & ad nigrum cum pallore paucò inclinans, qualem ferè in ære rubro deprehendimus; alter autem est splendidus, purpureusque, aut roseus, oculos maximè exhilarans. Rubicundus autem, seu rubor splendescens duplex est, vnus incarnatus, alter coccineus, quem in Cinnabari spectamus; hic autem cum homini naturalis non sit; de primo nobis sermo est. Hic itaque color rubeus subflauescens, cum ex multa bile atra adusta, cum flaua coniuncta constet, vt hi duo humores, si calore corrupto adurantur, ad nihil nobile, nihil magno animo, & pectore dignum hominem inclinent, sed partim propter qualitatem terream quæ frigida est, continuo timore, & suspitionibus illum agitabit; quo ad sicca verò, difficile ipsum alijs coherere faciet, vnde *ματαιδωγνια*; quod suscepit, diu retinet, quod reiecit, non facile recipit. At bilis calorem ignis referens inquietam agitationem, inquisitionemque molitur, vnde fit astutia; multò autem maior est portio nigræ, quàm flauæ bilis; vnde & dominatur timor, qui nisi dominaretur, iam audax, non autem timidus esset animal, vt vulpes. Cum igitur a stutorum temperies sit ex multa bile, atra iuncta cum flaua bile, illique naturali quidem vtraque, at calefacta mediocriter consent; ex quarum mistura qualitatem cutis, vt & pili ipsorum deuenient coloris vulpini. Cretenses dicuntur plerique huius esse coloris, vnde astuti, & iuxta vulgare Græcorum proverbium *Τεία κίτρινα κίτρινα*. Vitia autem, quæ ex astutia oriuntur facile quibus colligit.

## Signa subflauo coloris.

**S**ubflauus color, qualis in Melle spectatur, cum ex pituita, & flaua bile constet, qui multo phlegmate & bile flaua cum melancholia temperata abundant, illi iudicio etiam Aristotelis pipidi, pigri, tardi, & consequenter ad magnas actiones irresoluti, & inepti ob diminutam concoctionem euadunt: & quoniam frigidus est appetere plus quàm concoquere possit, tales etiam voracitatis, intemperantiæque signa præstabunt: flaua verò bile excitati ad iracundiam eos quoque mouebit, quam tamen timor ob admixtum frigus, inefficacem reddet: in absentibus tamen blasphemis, minisque se conuertent; vnde & murmurationibus, & detractionibus dediti.

## Regula IV.

*De signis rubri seu purpurei coloris in facie hominis.*

**V**ocamus hoc loco rubrum colorem, qui constat ex multo sanguine subtili iuncto cum flaua bile naturali, & tenui phlegmate, quem referunt adolescentes

Natura hominis nigri & adustæ, Aethiops.

Melancholia

Vulpini coloris signa in homine

Candor in homine quid significet.

Galli, Germani rosei coloris quid portentent.

tes vehemēti motu calefacti, ac propriè purpureus est. Qui enim eo imbuti sunt temperamento biliōsi, & sanguinei naturali calore abundant, & consequenter spiritibus subtilibus turgebunt; spirituum subtilium abundantia tumētibus; acumen ingenij deesse non potest; acuti igitur sunt; acumen autem ingenij ad studia liberalia tractanda habiles quidem reddit, etiam si cholera; sanguinisque nimius feror, eos plus æquo mobiles, atque adeo instabiles reddat. Quæ hanc complexionem vitia sequuntur, lectori examinandum relinquo. Flammeus verò color, cum nescio quam inflammationem internam arguat, ad maniam, & phrenesin hoc colore imbutos inclinabit, naturarū omnium & pessima, & periculosissima: Videbis oculos eorum flammeos, & ignem quasi perpetuò exsufflantes, semper ad nocendum, lædendumque paratos; nulla talibus in verbis moderatio; nulla in oculis humanitas; nulla in moribus comitas; nulla in tractandis negotijs gratia; rixis, & contentionibus viuunt, sibi & alijs intolerabiles, ad quævis enim verba in choleram exardescunt, & dum sibi ipsis solis placent, sibi solis applaudunt, se solos præ omnibus æstimant, ab alijs plerisque tanquam insolentibus despiciuntur, à quibus sibi vnusquisque caueat, nemo cum hisce disputet, aut quacunq̃ etiam leui de causa contendat. Quoniam si in contentione paulò plus spiritus incaluerit, facile in maniam, & phrenesin acti ita efferantur, vt spumantis æstus vehementia, non solum in conuicia erumpant, sed manus etiam subinde inferre violentas non verecūdentur.

## Regula V.

### De signis colorum in oculis.

Colorem oculorum subinde corpora sequuntur; hinc videmus corpora alba vt plurimum cæcios oculos habere, nigra nigros; de quibus vide Simonem Portium de colore oculorum. Hoc tantum loco differendum est, cur solus homo tantam varietatem oculorum habeat. Nam vt rectè Aristoteles professus est, vnaquæque species animalium habet proprium quendam oculorum colorem, vt Boues, vnum habent; Capræ; & Asini vnum, & sic de cæteris speciebus: quod in homine non reperitur; quia inter homines alij oculis cæsijs; alij nigris, alij subuiscentibus, alij alio colore oculorum præditi sunt. Huius igitur varietatis causa queritur. Quidam lumini, & luci: nonnulli paucitati, & multitudini humoris aquei: Astrologi cam diuersis aspectibus planetarum solita temeritate adscribunt, alij aliam comminiscuntur. Nos dicimus, quòd qui causam nouerit, cur homines inter se adeò diuersi sint, vt vix vllus reperiri possit, qui non ab altero varietate vultus diffideat, is certè varietatis oculorum causam quoque assignaturus sit, quæ vt in humorum misturam cadere non potest, ita altioris considerationis est, & soli plasticæ seminis vi adscribendum. Nos igitur eam varietatem contingere asserimus, quòd vir, & mulier dum se cognoscunt, vago sint animò, & prout phantasmata vtriusque varia & diuersa sunt, ita quoque conceptus sub illis imaginationibus varijs & diuersi figurantur: Etsi enim subinde ex mistura humorum contingat, vt plurimum tamen ab imaginatione parentum tempore coitus, & ex plastica vi originem suam habet: de quo fusius tractatum reperies in arte nostra Magnetica, capite de Magnetismo imaginationis. Accedit, quòd nullum membrum ita placeat amantibus, vt oculi: nullum cognoscere volentibus personam aliquam ita obuiam se præbeat, ac dicti oculi ex varia imaginatione cum coniugum, tum maximè prægnantium, cum illi oculos vifos variè voluunt, animoque coquunt, variam quoque temperiem ijs induci hæc fixa, & intenta imaginatione nemo dubitabit. Plastica autem virtute colores oculis induci iuxta naturalis humoris constitutionem, vel mu-

Flammeus color in facie hominis.

Cur solus homo diuersis oculorum coloribus gaudeat.

Cur homines adeò diuersi vultibus sint.

Oculi incitantur & amantium.

mulieris prægnantis imaginationem; ex hoc patet, quòd pupilla, irisque oculorum colores non ex sola humorum temperie; sed ad hanc figuram circulorum determinandam opus sit virtute chromatica plastica subordinata, quæ vt oculum format, ita etiam vna cum debita figura, debitos illis colores iungit. Vnde, difficile de oculorum colore in diuinationis negotio datur iudicium, cum plerumque non ex solo quatuor humorum temperamento nascantur, sed vt dictum est, proprias originis suæ causas fortiantur.

Difficile coloris oculorum iudicium.

## Regula VI.

### De colore Capillorum.

Vbricum item negotium est de colorum in pilis, elucescentium varietate, ob varias, quæ habent causas, iudicium ferre; siquidem illi subinde ob copiam, vel defectum alimentis, vt in pueris; vel ob coctionem, vel cruditatem alimenti, quo nutriuntur; ita calor rariius concoctionis primarius artifex, vel per morbum, vel per ætatem immutatus pilos variat; alius enim est pilorum color in infantia; alius in adolescentia, alius in senectute: quod & in plantis, videmus contingere. Pili quoque subinde colorem assument ab humoribus, superfluis per modum tincturæ; hoc est, halitus humorum biliōsi, pituitosi, melancholici cum pilorum materia permisti suam colorem pilis impertiunt, hoc pacto, niger pilus ex sæculo atræ bilis excremento; ex bile flaua flauus; albus ex pituita, rufus ex permixtione bilis, & pituitæ; atque sic accepta signa esse, possunt interioris inclinationis, & temperamentis cerebri. Externus quoque aer plurimam ad imprimendum pilis colorem potest: nam certum est in diuersis Regionibus mutari capillos; non tam pro diuersa cerebri temperie, quam pro aëris ambientis conditione: siquidem color externus in regionibus torridis album corpus subiens, pilorum alimentum adurendo, consequenter nigrum colorem ipsis inducit; contra verò eorum, qui sub Aquilone degunt, molles, lasciuque funduntur pilij, quia his sanguis, dulcisque sapor & gratiam conciliant, fortitudinemque; vnde color quoque hilarior est. Hoc item in animalium pilis patet, quæ & pro diuersa cœli conditione colorum experiri mutationes frequens docet experientia. Refert Scaliger in Vozkam Sarmatix regione quæcunque animalia vel commigrantia, vel aliunde translata albescere. In Canada quoque, siue Noua Francia animalia, singulis annis bis mutant colorem; quæ sanè magnam in pilis immutandis vim aëris demonstrant: Ea quoque aquarum quarundam proprietates est, vt animalia varijs tingant coloribus: alibi enim candida sunt, alibi nigra, sola aquæ potæ virtute, de quibus vide Mundum nostrum subterraneum de varia natura aquarum; vt proinde ex hisce, & similibus difficile de interiori indole iudicium constitui possit.

Diuersa regiones diuersos pilorum colores efficiunt.

Aqua certe mutant colorum pilorum.

## §. V. Regulæ

### De colore Vrinæ, eiusque signis.

Rectè, & sapienter Hippocrates, nihil in morbis acutis adeò statum ægri declarare, quam colores Vrinæ, quæ cum innumera quadam varietate consistunt, grauissima oritur inter Medicos quæstio, quænam huius in Vrina diuersitatis chromatica causa sit. Quidam arbitrati sunt Vrinam, cum ex humido, quòd sumitur, generetur, ac purè aqueum, tenuisque primæ concoctionis excrementum sit,



ea ratione ad colores se habere; ut aqua ad tinturas: sicut enim aqua ex se, & sua natura nullum habet colorem, sed eum ex rebus ab extrinseco aduenientibus seu tingentibus acquirit; ita & vrina colores ex substantiæ alicuius eam tingentis permissione causari. Alij volunt reddi coloratam, eod quod iuxta diuersam flauæ bilis misturam diuersos recipiat colores. Neutra sententia subsistere potest; non prior; cum in homine sano huius misturæ vestigia apparere deberent; quod tamen experientia non docet: neque posterior; cum in multis morbis vrina sit nigra, vel intensè rubea, quæ tinctura à bile flaua fieri nulla ratione potest. Dicimus igitur vrinam non reddi coloratam ex mistura alicuius humoris; sed à naturali calore per solam alterationem, & concoctionem; non secus ac aqua feruore incallescens à naturali suo coloris temperamento recedit, ita vrina à calore calefacta, & adusta. Nam ignis, seu caloris proprium est mistam varias coloris species transmutare, vt in mineralibus experimentis docuimus. Habet enim sese vrina eadem ratione ad calorem naturalem, sicut aqua naturalis ad lucem; sed aqua à luce, & calore variè alteratur; stagnantem enim aquam subinde ex naturali statu in viridem, & hinc in luteam, denique in nigram degenerare experimur. Ita & calor naturalis, dum in statu temperatissimo est, vrinam reddit citrinam, vel colore paleæ; quod optimæ, & perfectissimæ vrinæ signum est; at calor natiui intensior præter naturam, colorem quoque intendit vrinæ: hinc in febribus tertianis intensissimè rubram videmus vrinam: Calorè verò naturali debilitato nimium; vrina ob concoctionis defectum apparebit vel alba, vel cinerea, & ubi maxima indigestionis vis est, vt in lientericis, vrina clara, limpida, & prorsus aquea reddetur. In maniacis verò, & phreneticis effectibus vrinæ ob vehementem caloris excessum adusta nigra redditur. Est itaque calor naturalis remota causa coloris vrinæ, bilis tamen mistura proxima causa est. Calor enim immedicatus in bilem; hoc demum mediante in vrinam agit. Experientia rem docet. Si enim quamcunque coloratam aquam igni superpositam ebullire facias, producet eam pro diuersitate gradus caloris diuersos colores: vt aqua croco tincta, quæ ex flauo in intensè rubrum, & deinde in purpureum, tandem in nigrum degenerabit colorem. Idem in omnibus coloratis aquis videre est. Non nego tamen alias quoque causas esse posse vrinæ coloratiuas, quemadmodum paulò post videbitur. Potest enim verbi gratia albus calor in vrina causari vel ex natiui caloris defectu, crudidatis latentis vitio, vel mala qualitate sanguinis, videlicet aquosi, ferosi, parum colorati, vel obstructione, vel oppilatione partium vitalium per humores crassos, & melancholicos facta; vel etiam ob potus abundantiam, vt fit in ebrijs; vel denique per admisionem alicuius substantiæ eam tingentis in albumi, quemadmodum in pituitosis purulentis, ac gonorrhoeicis passionibus patet. Ita dico, vrina rubea, varias tincturæ suæ causas habere potest; primo ex vi & efficacia caloris: si enim calor fuerit in statu suo naturali, vrina citrina reddetur; si intendatur, reddetur rubea; si intensissimus fuerit, nigra ob nimiam sanguinis adustionem euadet: si fuerit calor intensissimus cum humore virulento, viridis reddetur; si extinctioni proximus, cærulea euadet. Qua tamen per accidens subinde in rubrum, & sanguineum colorem tingi potest nullo excessu aut defectu caloris natiui, vt fit in renum, & vesicæ exulceratione, vel pro ratione coloris, qui vrinæ accidentaliter affunditur, vel etiam ex rebus vrinam esu; vel potu tingentibus. Innumera igitur causæ esse possunt coloris vrinæ non in ægris tantum, sed in sanitate præpollentibus. Est vrinæ color alius ante, alius post sumptum cibum, alius vesperi, alius manè; alius in pueris, alius in adolescentibus, alius in senibus, alius in cholericis, alius in phlegmaticis, in sanguineis alius, alius denique in melancholicis. In sanis tamen cuiuscunque ætatis hominibus, ac quocunque tempore vrinæ semper ad flauedinem inclinant, atque intensione, vel remissione duntaxat flauedinis differentia facile indicant,

Scilicet vera de  
Chromatismo  
vrina.

Crisis vrina.

Experie.

Vrina rubra.

indicari potest de sanorum colore in vrina elucescente; in morbidis verò, vt plurimum omnes colores vrinæ sunt præternaturales. Quæ quid significant, iam tempus est vt breuiter declaremus. Et quoniam non ita pridem in Arabum Medicorum monumenta incidens, subtile de coloribus vrinæ iudicium inuenirem, visum fuit id hic in gratiam Medicinæ studiosorū ex Arabico translata adiungere, ne quidquā, quod ad hanc artem nostram quouis modo pertinere videtur, omittamus.

## §. VI. Regulæ Chromocriticæ.

*De statu ægri ex coloribus vrinæ, ex Arabum monumentis deprompta, atque in Latinum ab Auctore translata.*

*Signa coloris albi in vrina.*

**C**um color albus in vrina sit; vel ex obstructione, vt in senibus, vel ob caloris natiui debilitatem, defectumque virium, vel ob humiditatis dissolutionem; has inde sex regulas formabis.

I. Limpidissima vrina significat obstructionem lienis, pallorem vultus, grauem totius corporis constitutionem.

II. Alba vrina cum plumbeo circulo opillationem cerebri, & comitalis morbi principia denotat.

III. Alba & fæculenta, crassi & indigesti humoris abundantiam.

IV. Cinerea plumbea, vlcus renum, & vterum.

V. Alba ex plumbeo mixta calculum renum, & vesicæ.

VI. Alba, crassa, & pinguis, phtisim significat.

*Signa coloris nigri.*

**C**um niger color in vrina oriatur, vel propter natiui caloris combustionem, vel ob atræ materiæ misturam, vel denique ob caloris totalem extinctionem; hasce regulas formabis.

I. Nigra vrina vna cum sedimento materiæ eiusdem coloris in febrī, dolores capitis, mentisque turbationem notat.

II. Nigra graueolens, peripneumoniam, seu vehementem pulmonis inflammationem notat, & plerumque mortem vicinam.

III. Vrina primò viridis, deinde nigra, mortem denotat, quia monstrat excessum frigoris calorem natiuum suffocantis.

IV. Nigra vrina stillatim egesta mortem denotat; si tamen permanferit ad septimum diem, spem salutis præbet.

V. Nigra in febrī quartana, sanitatis signum est.

VI. Nigra vrina cum febrī ardenti, & sudore frontis, mortē vicinam designat.

*Pallidi coloris in vrina signa.*

**C**um lior vrinæ vltimam in frigidationem, vt Medici loquuntur, significet; hasce inde regulas formabis.

I. Vrina plumbei coloris, mortis signum est.

II. Vrina pallida in superiore parte, pessimam capitis constitutionem ostendit.

III. Plumbeus color in vrina continuò permanente, hydropisim denotat, & caloris natiui suffocationem.

O

IV. Pal-

IV. Pallidus, seu plumbeus color cum granulis, & bullulis in fundo, vicus pulmonis, & phtisim significat.

V. Plumbeus color tenuis cum pinguedine instar olei, destitutionem naturalis humiditatis portendit.

VI. Plumbeus color in phreneticis mortem notat.

*Viridis coloris signa.*

Cum viror in vrina vt plurimum virus oleat in humorum corruptela absconditum, has inde regulas formabis.

I. Viridis color in magna febris denuntiat mortem.

II. Viridis color in puero spasmus, frigidorumque humorum in neruis abundantiam designat.

III. Viridis color cum nubecula in fundo, & cum dolore stomachi, veneni sumpti indicium est.

IV. Viridis color cum circulo viridi in phreneticis, mortem denuntiat.

*Rubri coloris signa.*

Cum denique rubedo vrinae oriatur, vel ex oppilatione inter cistam fellis, & intestinorum facta, vel ex inflammatione praeter naturam, vt in omnibus febribus; ex tinctura has regulas seruabis.

I. Vrina rubra vt plurimum caloris denotat excessum.

II. Rubra in nephriticis latentis vlcis indicium est.

III. Rubra & turbida vlcus hepatis notat.


IV. Oleacei coloris vrina pauca cum fatore, mortem denuntiat, quia fator ebullitionem, humorumque corruptionem, paucitas virtutis debilitatem, oleaceum partium significat dissolutionem.

V. Color rubeus in plumbeum degenerans, vlcera pectoris & phtisim notat.

VI. Rubra nigro mista hepatis inflammationem notat.

VII. Rubra siue ignei coloris, febrim ephimeram.

VIII. Vrina ignei coloris densa croceo mista, icteritiam notat.



ATHA-

ATHANASII KIRCHERI  
E SOC. IESV PRESBYTERI  
ARTIS MAGNAE  
LVCIS ET VMBRAE

Liber Secundus.

DE ACTINOBOLISMIS;

S E V

RADIATIONIBVS

Pars Prima,

ACTINOBOLISMVS LVCIS;


S I V E

DE RADIATIONE LVMINIS,

ad quam ceu principalem Ideam, totius naturae  
operationes instituuntur.

C A P V T I.

*Omnes naturalium rerum virtutes diffusae lucis  
orbitam emulantur.*



VM. Natura rerum Deum Conditorum, quantum quaeque suae essentiae conditione potuit, representare debuerit, Conditorque nihil se ipso melius, ornatus, praestantiusque reperit; factum est, vt dum corporeum hunc mundum ageretur animo, formam ei destinauerit sibi ipsi quam simillimam. Hinc ortum totum quantitatum genus, & in eo curui, rectique discrimina, praestantissimaque omnium sphaerica superficies. In ea siquidem lustr Conditor Sapientissimus sacrae suae Triadis imaginem. Hinc centri punctum est sphaerici quaedam quasi

*Omnia Condi-  
toris emulantur.*

O 2 ima-

imago, superficies puncti intimi imago, & via ad id inueniendum, quæque infinito puncti egressu ex se ipso vsque ad quandam omnium egressuum æqualitatem gigni intelligitur, puncto se in hanc amplitudinem communicante; sit, vt punctum & superficies densitatis cum amplitudine communicata proportione sint æqualia. Hinc est vndique punctum inter & superficiem absolutissima æqualitas, arctissima vnio, pulcherrima conspiratio, connexus, relatio, proportio, commensus. Cùmque tria sint planè centrum, superficies, & interuallum, ita tamen vnum sunt, vt nullum, nè cogitatu quidem abesse possit, quin totum destruat.

Hæc igitur genuina aptissima corporei mundi imago, quam vel simpliciter, vel eum respectu quodam suscipit quicquid ad summam perfectionem inter corporeas creaturas adspirat. Ideo corpora ipsa cum per sese suarum superficierum finibus conrinerentur, neque se ipsa multiplicare possent in orbem, varijs fuere prædita virtutibus, quæ nidulantes quidem in corporibus, se ipsis verò paulò liberiores & materia carentes corporea, sed sua quadam constantes materia, quæ dimensiones suscipiat Geometricas, egredierentur, orbemque adfectarent. Quid mirum igitur, si principium illud omnis in mundo ornatus, lux, inquam, res in toto corporeo mundo præstantissima, facultatum omnium mater, corporei spiritalisque mundi vinculum in eadem leges, quibus mundus erat exornandus, transferit: videlicet, radijs virtutum in sphaeram diffusis mundum ipsum, atque ad eod omnes alias naturalium rerum actiones ad sui similitudinem, vt operarentur, animauerit. De quibus singulis ordine sic præscribente, in huius libri decursu tractare visum est, vt ingeniosa naturæ industria, ratioque singulorum in finem suum operantium luculenter patefiant.

Lux omnia  
animatur.

## CAPVT II.

### De radiatione lucis & visibilium specierum.



**V**M lux singulis corporibus communicari debuerit, eius effluxus eiactio, seu radiatio ipsi ob suam originem in locum debuit competere distantem; at cum lux legum Geometricarum sit capax, communicatio illa neutiquam sine dimensionum coniunctione fieri potuit. Communicabitur igitur vel per accessum fontis sui ad res; quod absurdum est, cum nulla substantia esse possit, Philosopho teste, immediatum suarum operationum prin-

cipium, nisi actionem in distans, & sine medio admittere velimus, quod æque absurdum, nec per aliam abditam vim; ergo per nihil aliud, quam per radiosam hanc luminis præluentiam, quæ est veluti egressio quædam localis, effluxusque à corpore suo, mundanis corporibus communicari debuit. Atque hæc est ἀκτινοβολία, seu radiatio, de qua dicere præsentis instituti est; cuius vera Geometrica genesis cum in æqualitate intercapedinum, per quas punctum medium in superficiem dicitur, consistat; certè sphaeræ eolutio fieri non potuit, nisi lineis rectis, iuxta pronunciatum tertium præcedentis: Si enim curuis vteretur lineis in se ipsas recurrentibus, nec in didendo fieret æqualitas, nec in virtutis propagatione diffusio. Quæ vt melius intelligantur; Notandum naturam, dum in operibus suis affectat aut unitatem partium, vel separationem earundem, vtranque fieri per motum sub linea recta: nam quò breuius quæque distant, hoc magis vnita intelliguntur, at rectæ sunt omnium linearum inter eadem puncta breuissima: ergo omnis motus rerum vnitiuus vt ponderum ad terræ motus, chalybis ad magnetem, in linea recta fieri necesse.

Motus rerum.

necessum est; secus enim si fieret, natura contra Pronunciatum sextum nullo compendio studeret; si quidem non omnes partes motus ad eundem finem tenderent, sed in medio itinere alicubi, quod erat vniendum alteri, ab hac vnionis affectatione deflecteret. Eadem de continuo separationis motu, qui in rebus naturalibus violentus dicitur, intelligenda sunt; rectus autem motus non nisi recto contrarius. Inter omnia verò mundana corpora vti primum Sol est, ita ab actione sua, seu actinobolismo cæteris omnibus præluet. Atque hæc mirifica lucis propago à fonte suo quidem oritur, ab eo tamen non diuellitur; inde quidem diffusa, nunquam tamen effusa: radici namque suæ, ac matri semper adhæret, germina, ramosque à radice propagat, qui ab ea & ortum habent, & propagantur, & nutriuntur, augentur, conseruantur: prima illa lux vnica est, & vna & in orbem acta: secunda, hæc multiplex in ramos quasi, & lineas innumerabiles diffusas, & illas quidem non longas tantum, sed & latiusculas, & in acutum abeuntes, & in conum desinentes, easque non nisi ortu iunctas, in progressu verò interuallo distantes, minore quidem primò, deinde maiore. Atque hæc causa fuit, cur Optici radium definiuerint lineam luminosam, vel illuminationem per lineam rectam: radios namque Latini inuenerunt, quos Græci dixerunt ἀκτινας, & radiationem linearum talium extensionem, & projectionem ἀκτινοβολίαν. Vnde & nos distinguimus lumen à radio tanquam lumen tertium à secundo: siquidem radius est lux secunda à prima exiliens in rectum, & acutum, neque in lineam tantum, sed & in conum prominens. Luminis autem propagatio non cõcipitur fieri lineis rectis circa radios, siquidem circumuoluitur, & inter radios semper plus distantes omnem implet locum; & lumen quidem esse potest sine radijs actu præsentibus, vt in aurora patet; non tamen radij sine lumine, vt pote à quibus emanat.

Natura lucis.

Definitio radij.

Via igitur profluentia, iam quomodo profluat; num à singulis lucidi corporis punctis, num à tota Solis superficie videamus. Quod vt fiat, sciendum primò nos lucidas hæc lineas nulla ratione vel vti Mathematicas, sed vti Physicas, & latitudine præditas considerare, & consequenter inferre radiosam luminis profluentiam ab omnibus & singulis physicis punctis, & etiam à tota Solis latitudine contingere, non successiua quidem lucis, sed perpetua durante emanatione, quæ solum opacorum corporum obstaculis interrumpatur; quibus sublatis radij spacia momento penetrant, nullam in partem magis, quam in aliam inclinant, in nullam torquentur, sed rectissimarum ad instar linearum, recta à fonte suo per immensa cœlorum spacia & elementarem atmosphæram in ipsam vsque terram vniformiter quidem difformi effluxu, at perpetuo eodem loco immobili eiactantur; à quo loco nulla, vel propria, vel aliena vi depelluntur, nec loco opus habent vllò, neque ipsi res inde pellunt, aut loco dimouentur; mota verò luce, ipsi vel eam sequuntur, vel ab ea trahuntur; abeunte luce, abeunt & ipsi: moto diaphano, quod permeauerant, non sequuntur; moto etiam opaco illuminato in loco perstant. In quodcunque diaphanum inciderint, siue tenue, vt aer, siue fluidum vt aqua, siue solidum vt cristallus, momento eodem id penetrant, illuminant, implent: idque varijs modis, si in ætherem, & in ætherem, recta penetrant; si in diaphanum densius, vt aquam, & vapores, fracto, reflexoque tanto fieri vmbrosiores, quanto medium fuerit densius; ita vt hosce radios luminosos omnis coloris in nubibus, aquis, astris apparentis causas esse dicere possimus, quemadmodum in præcedenti libro dictum est, & in sequentibus fusius dicetur.

Modus profluentis  
luminis.

## CAPVT III.

De entitate radiorum, utrum accidentia sint, num  
substantia, seu corpora?

**M**IRIFICAE radiorum paulò antè enarratorum vires aded om-  
nibus Philosophis hucusque obscuræ visæ sunt, vt vix  
fuerit, qui aliquid circa tam abditam naturam certò asserere au-  
sus sit: substantiæne igitur erunt, an species tantum, & imagines  
primæ lucis, resque, vt vocant, intentionales? Certè cum radij per  
se luceant, lumen emittant, & calefaciant, in realium entium al-  
bum potius, quàm intentionalium conscribendi sunt, neque videntur esse posse  
iuxta quosdam accidentia, cum accidentium proprium sit subiecto adesse, vel abesse  
sine eiusdem corruptione; & radij nulli alienæ rei videntur accidere, neque à  
fonte abesse, aut ei iterum adesse; à Sole siquidem, & luce nunquam discedunt, sed  
eidem semper adsunt: ergo respectu Solis accidentia dici non possunt. Cum ve-  
rò ijdem radij, æthereo siue cælesti mundo illum perpetuo illustrando adsint, neque  
ab eo, vnquam abesse possint; ergo neque ei accidere possunt, & consequenter æthe-  
ris accidentia nulla ratione dici debent: sed forsàn æri accidere possunt: notum  
enim est ærem sine radijs obscurum, ijs accedentibus luminosum fieri: ergo radij  
æri possunt adesse, & abesse sine eiusdem corruptione; ergo illi erunt accidentia,  
quod & in omnibus diaphanis hylæis contingere videmus. At explicare quænam  
illa sint accidentia, hic Rhodus, hic saltus: forsàn vt qualitates? vt calores? Ita,  
Aristoteles. Sed neque sic sibi hæc conciliari possunt: Colores enim mixtorum, vt  
& qualitates propriæ, ita insunt subiectis, vt sine subiecti corruptione auferri nõ  
possint; at iam visum est radios nunc abesse, nunc adesse æri, subiecto manente in-  
noxio & incorrupto: ergo radij non habent in entitate sua colorum, & qualitatum  
rebus propriarum rationem. Radij quoque ab ære, aqua, cæterisque diaphanis mi-  
nimè patiuntur, aut corrumpuntur ab ijs absentes præsentibus; neque ipsos aquâ,  
& ærem corrumpere videmus, cum non sint propria radiorum subiecta; ergo ne-  
que diaphanorum corporum qualitas, aut color dici possunt. At neque sunt eorum  
qualitas, neque relatio, neque actio, neque passio, neque tempus, neque locus, ne-  
que situs, neque ea habent ipsa, neque ab eis habentur: nullo ergo de genere radij  
sunt diaphanis accidentia. Loquimur verò hic non de quolibet accidentium gene-  
re, sed de eo, quod alicui obiecto proprium, & naturale est, vtrum videlicet radius  
ad sui existentiam sustentaculo & fulcramento indigeat, quo sublato & ipse pe-  
reat. Certè si res penitus consideremus, radios nullo huiusmodi ad existendum  
fulcramento indigere videtur: nam, si vilo egerent, cognato sibi potius, quàm alic-  
no egerent. Et si hoc, egerent æreo, aqueoque non egerent. Cur ergo & in ærem  
descendunt, & in aquam, in non scilicet propria subiecta, si in æthere solo non su-  
stinentur, & in his tamen quotidie sunt, nulla eorum ope in eis sunt; sed per se sunt  
in eis, & suis viribus in eis consistunt? Ergo ær, aqua, aquea radiorum non sunt  
obiecta: ergo subiecto carent; ergo per se procul à Sole & luce existunt: ergo in-  
substantia. Certè ratiocinium nostrum certò id demonstrare videtur; at cuius ge-  
neris substantia, materiæ, an formæ? an ex vtrisque composita? non prius, cum in-  
ferius radios immateriales dixerimus; neque forma, cum radij vt pote longi, lati, pro-  
fundi, & semper conicum quid affectantes, trinam dimensionem suscipiant, fra-  
ctionis quoque flexionisque capaces sint, potius corpora, quàm forma videantur,  
non quidem qualia qualia, vt elementaria; non antitypa, quale spatium est; sed eo  
den-

Radij solares &  
sunt accidentia


Quale accidens  
sit radius.

denfiora, rariora rarissimis, omnibusque in natura rerum subtilissimis subtiliora. At  
quomodo corpora, si omnia etiam durissima cristallina corpora penetrant, cum  
corporum penetrationem hucusque dari negatum sit? At dices, forsàn corporeos  
esse, in quantum trinæ dimensionis sunt capaces; in corporeos, in quantum densa  
quævis in momento penetrant: non quidem formæ, quales physicæ ad existendum  
materia indigentes, neque quales diuinæ ab omni corporis contagione semotæ; sed  
medias inter vtraque. Sed si hoc iam tertium quoddam entium genus hucusque  
omnibus Philosophis ignotum assignabitur, radiosamque luminis profluentiam non  
iam in qualitarum, sed primæ Categoriæ album referentes radios ipsos à se, & in  
se subsistentes, & se ipsis subsistentes, à fonte tamen nunquam separatas formas sim-  
plices, & substantias sine corpore corporeas dicere cogemur. Quod qui asserere  
voluerit, per me licet; ego sanè vi luminis raptus continuæ ratiocinationis impe-  
tu hucusque deuolutus, quid in tam perplexo negotio dici debeat nescio: vnde &  
in re adeo ardua ego nihil facilè quidquā determinauerim, ne nouā Philosophiam  
mundo obtrudètes, in priorilibro assertis contradicere videamur. Ab obscurissima  
igitur huius luminis caligine recedentes, ad ea nos conferamus, quæ & notiora no-  
bis, & maius nobis ad secutura lumen conferre possint.

## CAPVT IV.

Omnia obiecta visibilia ad lucis exemplar radiant in orbem.

**H**IC propositiōni ipsum experimentum fidem facit. Cum enim  
vnum & idem visibile, vno & eodem tempore simul à pluribus  
videatur, consequens est, vt à quolibet visibilis puncto, quodlibet  
medij punctum, inter quæ recta duci possit, irradietur. Ex quo effi-  
citur, vt omnia visibilis puncta, totaque eius species in quolibet  
puncti medio, quæ rectis connecti possint, confluat, atque termi-  
netur, totumque medium speciebus visibilibus repletum sit, con-  
fertumque. Tot igitur visus in medio, quot medij puncta, & quilibet, certa, & propria  
visibilis radiatione vnâ eandemque speciem videbit. Vnde fit vt ad lucis normam  
visibile radijs tum parallelis, tum concurrentibus, multifariamque sese inteseantibus  
radiet: quæ omnia fusè Vitellio ex Alhazeno demonstrat, videlicet cuiuslibet  
puncti visibilis speciem, eiusque superficiem complere, atque occupare, & in quoli-  
bet puncto superficiei visus totam visibilis speciem congregari; pari ratione quodli-  
bet punctum speculi radiare, totamque visibilis speciem in quolibet esse puncto spe-  
culi, & speciem cuiuscunque puncti visibilis in tota speculi superficie. Ita punctum  
visibile in medio aère constitutum radiatione in integrâ spheram euolueretur, cui-  
usmodi omnia fere sidera efficiunt; in opacis verò corporibus, siue superficibus, in  
hemisphaerium; neque tamen ab eodem visibilis puncto in quodlibet obiecti pun-  
ctum recta connecti potest, etiam si intermedium opacum aliud nullum intercedat;  
neque idcirco quodlibet visibilis punctum radiare potest. Sit enim visibilis Sphæra  
AB, cuius puncto A, obiecta sit caua sui parte periphæria H C F L D, dico à pun-  
cto A, non posse duci rectas ad quodlibet punctum periphæriæ L D H, recta enim  
L H, tangens periphæriam Sphære AB, in puncto A, secat obiectam periphæriam  
in Punctis H, & L. Patet igitur à puncto A, nullam rectam duci posse ad puncta pe-  
riphæriæ HDL, atque idcirco eandem ob causam punctum A, in nullam dictarum  
arcus partium radiare, sed in sola parte arcus H C E L: quæ clarè quoque patet in



figuris Sphærica A, & plana B, & in Sphæra quidem ex C, puncto lucidum punctum vltra tangentem Sphæra, radiare non potest, vti neque vltra planum B.

Si verò punctum A, in caua aliqua vitrea Sphæra fundo poneretur, vti in figura B, prioris figure patet, radiare id posset in totam circumferentiam: Verbo, omne punctum, siue lucidum, siue visibile, ad omnia illa medij puncta radiant, ad quæ linea recta duci potest. Quam radiationem elegantet sanè more suo describit Lucretius, dum canit.

*Hanc agere incipiam tibi quæ vehementer ad has res Atinet, esse ex qua rerum simulachra vocamus: Quæ quasi membrana summo de corpore rerum Decerpta volitant vltro citroque per auras.*

Et alibi: *Nunc ea, quæ dico rerum simulachra feruntur Vndique, & in cunctas faciuntur didita partes Vsqûe adeo omnibus à rebus res quoque fluenter Fertur, & in cunctas dimittitur vndique partes.*


Fieri autem hanc radiationem secundum opticam figuram, vulgò notum est. Cum enim quodlibet punctum visibile radiet, consequenter latitudo tota visibilis in quolibet visibilis medij puncto pyramidè efficit tot laterum, quot basis fuerit angulorû. Si itaque radias visibile fuerit circulus, & punctum medij fuerit in radio ex centro circuli normaliter profuente, constituet tota radiatio conum perfectum; si verò punctum fuerit in linea centrali obliqua, conum obliquum formabit; si verò visibile fuerit quadratum radiatio constituet pyramidè tetraedram: si pentagonum, pyramidè pentaedram, &

sic in infinitum. Nam vt rectè Vitellio demonstrat, optica figuræ, siue pyramides illuminatis mutuis basibus, & verticibus innumerabiles figurantur inter radians, & radiatum. Verum, vt solidius in hac materia progrediamur, quæ circa actinobolism suæ radiationem dicta sunt, illa eadem breuibus facillimisq; propositionibus confirmanda duximus.

**Propositio. I.**

*Quandocumque Sol foramen circulare ingressum in parallelum foramini planum incidit, in eo lucem projicit circularem.*

Si lucidum corpus A, foramen BC, quod traiciat radiosâ lucis profuentia in planum sibi parallelum, quod sit DE, dico hanc lucidam projectionem circulum




esse

esse: cum enim, si vti in conicis dicitur, conus plano basi parallelo secetur, sectio sit circulus: ergo cum circulus sit BC, etiam ipsam DE, sectionem ipsi CB, parallelam circulum esse necesse est. Idem de vmbra dicendum: si enim BC, circulus solidus foret, projectio vmbrae in planum DE, circulus foret.

**Propositio II.**

*Quandocumque verò lucidum corpus per foramen trilaterum transit in plano sibi parallelo, lucem projiciet maiorem quidem, sed figurae foraminis prorsus similem.*

Si lucidum corpus A; BCD, foramen triangulare; FEG planum; dico lucem projectam EFG, similem esse ipsi foraminis figuræ BCD, et si maior eadem; productis enim tribus radijs ABF; ACE, & ADG, patebit. per 16. 11. & 2. 6. elementorum Euclid: verum esse quod proponitur: si verò BCD, opacum fuerit, erit vmbra FEH, similis figuræ opaci BCD.



**Consectarium I.**

Hinc patet fieri posse, vt lux per foramen ingrediens non æquilaterum, æquilateram tamen in opposito pariete lucem effigiet. Sit pyramis, radiosâ, ABCD, in præcedente figura, cuius basis sit BCD, seceturque ipsa pyramis plano ad basim obliquo, quod sit EFG, eritque iam triangulum non æquilaterum; si ergo intelligatur per triangulum EFG, lucidum corpus A, radiare, erit actinobolismi basis BCD, triangulum videlicet æquilaterum. Idem de vmbra dicendum.

**Consectarium II.**

Hinc patet quoque fieri posse, per quamlibet aliam non æquilateram figuram lucem projici posse æquilateram.


**Consectarium III.**

Hinc patet quoque quomodo dato foramine elliptico circulus in plano opposito projici, vel dato opaco elliptico vmbra circularis projici possit.

Propositio III.

Quò duorum circularum, figurarumque similium similiterque positarum peripheriæ inter se minus remouentur, eò magis ad vnus circuli vnusque figuræ similitudinem coeunt.

Sint duo circuli ABCE, & AFCA, sese in punctis AC, interfecantes: dico, quò quo minus peripheriæ ABC, & AFC, inter se distiterint, eò magis ipsâ ABCA,




ex peripheria vtriusque circuli compactâ figurâ ad circuli vnus similitudinē accessurâ; vel si, quod idem de triangulis DEF, & FBC, alijsque quibuslibet polygonis dicendum est: quantò enim latera DE, & BF, dictorum triangulorum minus à se inuicem distiterint, tantò ad similitudinē vnus trianguli magis accedent: at duorum circularum similitium, similiterque positarum peripheriæ ita sibi appropinquare possunt, vt differentia vix sit perceptibilis, adeoque vterque vnus circulus, & vtraque vna

reputetur esse figura: quod cum ad oculum pateat vteriori demonstratione non indiget. Ergo, quò duorum circularum, &c. quò erat ostendendum.

Propositio IV.

Radij, qui ab extremitatibus corporis lucidi per oppositas extremitates foraminis prociidunt, inter foramen corpusque lucidum se mutuo secant.

Sit luminosum AB, expositum foramini CD, per cuius opposita extrema C, & D, ab extremitatibus luminosi corporis A, & B, decussati prociidunt radij



A C, & B D: dico horum communem intersectionem E, inter foramen, corpusque lucidum incidere: nam radij A C, & B D, cum vtraque dimetiente foraminis scilicet D C, lucentisque corporis A B, duo triangula constituunt mutuo sese aduersis micronibus respectantia A E B, & C E D, quorum bases A B, & C D, cum maxime distent, necesse est ipsos vertices inter vtranque medios existere. Est porro radiorum A C, & B D, intersectio E, communis vtriusque trianguli vertex: illa igitur inter foramen corpusque luminosum cadit, quò erat demonstrandum.


Corol-

Corollarium Primum.

EX quo patet, quò si corporis luminosi, atque foraminis dimetientes AB, & CD, æquales fuerint, erit E, vertex triangulorum inter vtranque exactè medius. Si igitur Solares radij per foramen traiectione in tantum abirent spaciū, quanta est distantia Solis à foramine proiectam ex opposito lucem equatum iri magnitudini superficiæ Solaris; si verò vltra foramen lux proiecta æqualitatem excederit, maiorem. Si infra medietatem, tantò semper maiorem, quantò foramini propius accesserit, futuram.

Corollarium Secundum.

Patet quoque, si luminosum corpus æquale fuerit foramini, lucem in planum oppositum traiectione corpori lucido æqualem fore: si verò maius fuerit, lucem



traiectione maiorem: si minus, maiorem. Qui omnia in figura clarè patent, in tribus circulus ST, CD, CN, vbi lucidum CD, æquale foramini B, circulum lucidum prociit EF, æqualem CD, lucidum corpus ST, maius foramine B, prociit HO, lucidum circulum maiorem lucido corpore CN; vero lucidum corpus minus foramine B, prociit lucidum circulum IK, maiorem lucido corpore CN.

Corollarium Tertium.

Patet quoque formas per foramen transparentes inuersas videri, & rebus subinde æquales alias maiores, & minores existere.


Propositio V.

Sol per multilatera profuens non reëtis lineis figuram describit, sed circulum propius emulatur.

Huius rei luculentissimum experimentum in cratibus videre licet, per quorum angulos radij Solis in obiectum parietem prolapsi circulum veriùs, quam triangulum describunt. Res iam olim ab ipso Philosopho eiusque affectis agitata, à Neotericis quoque plurimum ventilata; sed à paucis penetrata. Philosophus in conum radiofum luminis, & orbicularem Solis figuram causam conijcit: in quo qui-

dem tangit causam huius phænomeni; sed non totalem; cum radij à puncto corporis lucidi quæqua versus porrecti, non ad circulem tantum, sed ad cuiuslibet figuræ corpus sese adiungant. Non itaque quocunque radij incurrerint, in orbem sese colligunt; sed nunc quidem eo modo, aliâ alio. Cum verò à toto luminoso corpore in vnum quodpiam punctum incidit lumen, nec sic quoque turbinis figuram perpetuò lumen adsciscit, sed eam, quam luminosum corpus variam suggerit: Neque in posteriori problematis parte rationem assignat: non enim satis est Solis figuram circulem esse, lumenque rectis lineis efferri, nisi etiam ostendatur, quo pacto per quadrangularia foramina prolapsum lumen hebetetur; atque ab angulorum processibus sese subtrahat, sicque corporis potius luminosi, quam foraminis schema affectet cratium figura repugnante. Verum ut tam insigne phænomenon fusius explicaretur; raritas effectus veluti iure sibi vendicare videbatur.

Sit igitur Solare corpus AB, foramen verò qualicunque figuræ veluti rimulæ CD, per quam Solis splendor illapsus oppositum planum FE, collustrat; iam ex



infinitis punctis rimulæ CD, satis erit duo C. & D, considerare. Per punctum igitur D, ducantur radij ADE, BDK: per punctum verò C, ducantur alij ACH, BCF, qui cum ab extremitatibus Solis profluant, reliquos omnes radios intra se continebunt. Cum igitur, ut in præcedentibus demonstratum est, lumen Solis per foramen instar puncti transmissi figuram Solis rotundam, quamuis conuersam referat; per punctum autem C, rimæ dicta ακτινολία causetur, erit eius diameter KE, & pariter ex omnibus alijs rimulæ punctis rotundi splendores in superficiem, vbi FE, transmittentur. Iam dicimus has duas illuminationes iuxta Propositionem tertiam; quanto longius planum FE, à foramine distiterit, ut si esset in LM, ad vnus rotunditatem circuli magis accedere, ut apparet in LM, vbi maiores factæ sunt illuminationes, & ideo magis ad vnâ circulationem accedunt. Patet igitur, quò longius radij CE, CH, producti fuerint, eo maiorem fore diametrum illuminationis FH,

euadet enim MN: & similiter ex productione radiorum DK, DE, diameter alterius illuminationis KE, augebitur, & fiet LO; & consequenter duæ ipsorum peripheriæ simul maiores sunt; ac proinde ad vnus circuli similitudinem propius iuxta Propositionem tertiam accedent. Et quamuis ex radiorum productione augeantur, non solum prædictæ diametri illuminationum, sed etiam earum differentiæ FK, & HE, eæ tamen differentiæ respectu illarum, nullo sensibili incremento; augentur; quod inde oritur, quia angulus FCH, maior est angulo FBK, per 16. 1. Elem. atque ideo crura FC, HC, magis diuariantur, quàm crura FB, KB, & ideo si producantur multò magis crescit FH, dum euadit MN, quàm FK; dum euadit MO: eodem modo magis crescit KE, dum fit OL, quàm HE, dum fit NL. Vnde & earum peripheriæ ad vnus

vnus orbis figuram tandem concurrere videbuntur; multò autem euidentius ad rotunditatem euadent, si ex alijs præterquam A, & B, punctis per foramina CD, alij circuli projicerentur, & consequenter cum circuli lucidi ambitus sit ex infinitis punctis lucidis, & omnia suos circulos describant, ex infinitis circulis actinobolismo causatis vnus tandem visum iri, luculenter patet.

Corollarium Primum.


Hinc sequitur, Sole per quocunque foramen radiante, quo longius à foramine recesserit, eo magis in planum circulo, qui terminus est radiantis superficiæ parallelum, proiectam lucem ad eiusdem circuli formam propius accedere, ac tandem sensu decepto, perfectè circulem apparere; cum omne foramen, quod Solaris radio transitum præbere solet, tam respectu Solaris magnitudinis, quàm distantie, insensibilis sit quantitatis.

Corollarium Secundum.

Vides denique quomodo illuminationum pyramides, seu coni, quæ à singulis punctis Solaris corporis per quadrilatera, aut quæuis polygonæ foramina procedunt, in orbem disponantur: nam earum axes iuxta foramina decussati hinc vertices, illinc centra basium attingunt; quapropter circulum ex vtraque parte complent, quarum alter orbem Solarem, alter eum plani locum occupat, ad quem soli axes pyramidum pertinent. Hunc porro circulum extantes circumcircâ basium portiones ambiunt: ex quo nimirum fit, ut totum lumen, quod plano excipitur, circulum æmulari videatur. Verum hæc omnia tandem, ut veritas manifestius appareat, experimentis comprobemus.

Corollarium Tertium.

SI denique lucidum corpus fuerit cuiusvis polygonæ figuræ per quoduis foramen multilaterum traiectum, id eam figuram exprimit cuius est ipsum lucidum corpus ακτινολιον, ut in hac apposita figura apparet, & paulò post melius deducetur.




Experimentum I.

Flant igitur in fenestra quapiam duo, vel tria minima foramina inuicem proxima, per quæ totidem illuminationes ad obiectam chartam transferantur; hæc, admota foramini charta, parua, ac sibi mutuo parum incumbentes apparebunt, & proinde vnicum circulum non præ se ferent. Quò autem longius charta remouebitur, eo maiores fient, ac sibi mutuo magis incumbentes, ac idcirco in vnum ferè circulum coalescent, nunquam tamen ad Geometricam rotunditatem peruenient, quamuis illam sensui obijciant. Cuius rei ratio est, quòd ut supra dictum est radij non sint lineæ mathematicæ, sed aliqua latitudine præditæ, & consequenter puncta ex quibus constant, non mathematica, sed physica sint, quorum etiam infinita, nunquam circulum mathematicum, seu geometricum efficiunt.

Experimentum II.

**A**lteram huic ex Keplero adscribemus. Si enim loco lucidi corporis accipias, verbi gratia tabulam quadratam, seu librum, foramen autem fuerit triangulare; deinde singulis angulorum punctis tabulæ quadrangulæ filum annexum in appositam post foramen tabulam, ita vt latera foraminis radat, filum duxeris, & deinde incidetia puncta creta notaueris; non sine admiratione videbis, ex multis triangularibus figuris foraminis in pariete expressis vnum quadrangulum delineari, videlicet simile tabulæ, seu quadrangulari libro. Si verò lignum, seu tabulam triangularem statueris, & foramen quadrangulare, & deinde dicta ratione processeris; dabit tibi fili singulis angulorum punctis admoti & per foramen traducti ductus in pariete opposito plura quadrangula ita sibi inserta, vt tandem in figuram quandam triangularem ligno similem desinant, vt ex figuris clarè patet.



Atque ex hoc experimento luculenter patet, cur Sol per fenestras polygonas ingrediens in remotiori distantia in parallelis sibi parietibus circulum efficiat. Cum enim ex singulis Solaris disci punctis pyramis effigiatur, cuius basis similis sit foramini triangulo, quadrangulo, pentagono, aut alterius irregularis figuræ, infinita illa triangularum projectorum series ita disponetur, vt cuspidibus suis, siue angulis *κεφαλῶν* dispositis tandem circulum constituent; quæ triangula semper perfectius circulum imitabuntur, quanto à foramine fuerint remotiora; tantò imperfectius, quanto eidem foramini viciniora. Cuius experientiæ fidem dabit, si, vt prius, loco lucidi corporis orbem acceperis, & filo ex compluribus circumferentiæ punctis, per foramen in subiectum parietem duxeris; ex multis enim figuris foraminis proiectis tandem circulum effici deprehendes.

Corollarium.

**H**inc patent omnia obseruationum ferè phænomena in loco obscuro: quod enim de Sole, de alio quoque lucido corpore dici potest; ita Sol eclipsatus, yti & Luna pariter efficiunt illuminationem eclipsatam, inuersamque: Cur etiam species rerum ea ratione, vt forinsecus apparent, intus exhibeantur; de quibus omnibus in sequentibus tractabimus. Docuit enim hoc vnicum experimentum Astronomos Solarium eclipsion quantitates, diametrorum Solis, & Lunæ proportionales, & circulum per centra luminarium traiectionem ad verticalem inclinationes citra oculorum damnum, citraque errorem, quæ solet nudæ æstimationi committi, circino dimititi. At hic omittere non possumus, quin insignem quandam fallaciam hoc loco detegamus; atque hæc est, quod omnes eclipses hac arte detectæ multò maiores in cælo euenerint, quàm apparuerint in radio, omnes diametrum Lunæ in cælo multò maiorem exhibentes, quàm in radio. Quam rem dum non præiudit Tycho Brahe non sine admiratione, eo deductus fuit, vt diametrum Lunæ quinta semper parte minorem esse pronunciarit in coniunctionibus, quam appareret in oppositionibus, quamuis vtrunque æque à nobis absit. Sunt & aliæ huius diminutionis causæ, quas alibi, si Numini placuerit, aperiemus. Verum hæc omnia sequenti experimento melius addiscentur.

Insignis experientia.

Alia experientia.

Experientia huius utilitas.


Fallacia in obseruationibus à Tychone Brahe factis.

Expe-

Experimentum III.

Lux remota corpus lucidum angulare in sphericum conuertit.

**C**ontingit vtpurimum, vt remoti existentes à lucido corpore cuiuscunque figuræ, illud tamen rotundum videamus. Ita in hic appposito schemate oculus



A, sub radijs AB, & AC, intuetur Venere BC, sphericam: quæ tamen perigæa cornuta est instar Lunæ, vti Lynceæ Academia hæc vltimis temporibus innotuit; ita ascendente parte cornu Lunæ sextilis CD, supra horizontem, ita rotunda apparet, vt nonnunquam nouæ stellæ exortæ suspicionem mouerit imperitis: lucidum quoque sextilis Lunæ limbum IG, umbrosæ eminentiorem indicat. Idem dicendum est de flamma T, quam sub pyramidis figura præsentem intuemur, remoti rotunda figura præditam arbitramur. Ita lampades conicæ figuræ flammæ in vicino illis locis referentes, in remotis locis, vti longis ambulacris sphericulæ lucidæ, & maiores solito cõspiciuntur; quæ omnia nihil aliud sunt; quàm ludibria oculorum: neque enim quicquam vel in ipsis lucidis corporibus, vel in diaphano medio, quod hunc effectum causare possit, concipi potest; ergo in solo oculo existunt. Quod inde quoque patet; si enim cornu Lunæ, vel quodcunque corpus luminosum angulosum manu contegas, semper eadem rotunda species manebit.

Variæ fallaciæ oculorum.

Patet ex his stellis scintillantes, reuera non tam grandes esse, quàm eas vulgus Astronomorum putat, cum luce ambiente; dilateretur diameter earum; & conuenienter nec aliquid certi de magnitudine stellarum definiti possit.

Stelle minores sunt, quàm videntur.

Experimentum IV.

De scintillatione syderum.

**F**requens experimentum est scintillatio syderum, etsi pauci eius genuinam causam attigerint: Experimur enim omnes stellas scintillare quidem, sed diuersimodè, magis stellæ fixæ scintillant, minus errantes, plus horizonti vicinæ, minus, eleuatiore supra eundem, plus arcticæ, quàm antarcticæ; plus pluuio, quàm cælo sereno; plus hodie, quàm heri; plus debili, minus intenso lumine præditæ, Saturnus minus Ioue; Venus apogæa, & perigæa minus Mercurio. Quorum quidem omnium causam, assignamus non propriam stellarum conuolutionem; non febrilem paroxysmum, vt quidam ridiculè asseruerunt; non radiorum solarium, quos in præcedentibus immotos diximus, non è motibus primis, & secundis tremulam eibrationem; non radiorum è stellis inquietam eiaculationem; non visus tremorem; non potentia ob nisum videndi effectam trepidationem: sed asserimus stellarum scintillationem nihil aliud esse, quàm vnicam & solam specierum ab ipsis

Quid sit stellarum scintillatio.



in oculum delapsarum intercisionem factam ab irrequieta vaporum variè affecto-  
rū intercurfatione. Hi enim partium suo intercurfu exceptâ speciè refractione lueu-  
lētiorē reddūt; & sic solito efficacius lumen quodā momēto trāsitus sui offerūt, par-  
tim discreta sua intercurfatione, quæ aſtri radiū pænè suffocauerat, per interualla me-  
rè diaphana liberum cono optico iter ad oculum citatis vicibus perdunt. Vaporibus enim turbulentis diuifis, arque temerè alius alio dilapſis, & diuerſimodè confi-  
guratis radijs, alij quidem omnino occultantur, debilitantur alij, alij infringuntur,  
vnde fit, vt vna alia ſyderis pars ſuſſū, alia deorſum cōuelli, & in diuerſa torqueri vī-  
deatur; quæ quidem iniqueta vaporū agitatio potiffimū in ſtellis iuxta horizon-  
tem, & in vaporofa Auſtri regione ſitis comperitū. Experimenti veritatē id quod  
ſequitur docet: nam ſi in campo libero inauratū alicuius turris glōbum va-  
poribus pacatis à Sole illuſtratam conſpicias, ſine agitatione illum intueberis; aſt  
vbi vapores ſolaribus radijs eleuati interceſſerint in omnem partem globi ſpeciem  
in oculum delatam diſſerre videbis, vſque adeo vt globus in omnem partem ſaltatē  
videatur. Quod igitur in globum, hoc idem faciunt & poſſunt vapores in aſtra.  
Quicumque verno tempore Sole ſeruētiore agrorum ſulcus intuitus fuerit, dictam  
vaporum agitationem, aerisque mirificum quendam tremorem inſigni ſanè ex-  
perimento comperiet; vaporum autem agitatio aliunde originem ſuam non ducit,  
niſi à condensatione, & rarefactione, & continua alteratione aquæ & aëris.

Obſeruatione pul-  
chra.

### Propoſitio VI.


*Radij Solis, & quorumcumque lucidorum corporum non  
permifcentur.*

**E**ſt mira quædam & hæc radiatorum natura, & proprietas, quod in ætinoboliſmo  
radij radijs nulla ratione permifcentur, neque frangantur, neque in diuerſa  
abeant; ſed vnusquisque recto ſibi tramite fundatur, cuius hoc cape experimentum.

Mira proprietas  
radiatorum.

#### Experimentum I.

**S**int tria luminofa corpora A, B, C, quæ lumen per foramen D, in oppoſitam ta-  
bulam E, tranſfundant; concurrent quidem omnia ſimul lumina in ore fora-




minis D, ita tamen, vt, ſicuti experientia comprobatum eſt, ea nequaquam per-  
miſcean-

miſceantur, ſed ſingula proprio tramite, ac linea recta pergant, ex A, quidem in  
F, ex B, in G, & ex C, denique in H, non ſecus, ac Angelici ſpiritus, dum in com-  
munem aliquem locum conueniunt: quare ſublato luminari A, ceſſat lumen F, &  
obdueto B, tollitur ipſius lumen G, prohibito verò C, id quod in H, fuerat lumen  
abſque vlla reliquorum luminum noxa ac diminutione extinguitur. Si autem loco  
D, poſitum fuerit corpus opacum: erit F, vmbra luminariſ A, & G, vmbra lumi-  
nariſ B, & H, vmbra corporis C. Igitur tria lumina, cū in D, conueniunt, neque  
tumtuariè, ac ſine ordine confunduntur: ſed vnumquodque propria integritate  
ſeruata, ſuam carpit viam, ac recto pergit tramite; quod ſi conſuſa per rectas lineas  
non tranſfunderentur; ergo vel radius corporis luminofi A, ferretur in H, vel in G.  
Sed hoc eſt abſurdum in opticis, cū impoſſibile ſit luminofum corpus radio ſuo  
directo aliquid illuminare, niſi, per lineam rectam, vt fuſè Alazen lib. 1. Opticor.  
cum Vitellione demonſtrat: vel tres radij in vnico puncto C, conueniant, quod eſt  
contra experientiam, & optica axiomata. Accedunt porò huic experimento vali-  
diſſimæ rationes. Ac primò quidem: cū rectis lineis ferantur lumina, impoſſibile  
eſt ea cōmiſceri: nam vt cōmiſceantur, neceſſe eſt vt ſe mutuò inuadāt; id autē fieri  
nequit, niſi à recto tramite deſſectant; alias enim vnumquodque ſuo loco remane-  
ret, nec poſſet alterius ſedem occupare; quare nec permifceri. Deinde radij qui à  
ſingulis partibus luminofi corporis circū circa proſiliunt, neſtquam permifcen-  
tur, ſed diſtincti quiſque ſuum rectum tenet iter, vt ex præcedentibus experimen-  
tis colligi poteſt: ergo nec lumina, quæ à diſtinctis luminibus procedunt inter ſe  
commiſcentur; ſed vnumquodque propria pergit via eò, quò vis luminariſ impel-  
lit. Nec obſtat, quòd eodem in medio plura lumina conueniant, vt aliqui obijciunt;  
ſūt enim plura lumina in eodē loco, verbi gratia in G, ea quaſi ratione, qua duo An-  
geli ſe penetrantes, vel ſicut color, & calor, dum in eodem ſubiecto ſunt, conue-  
niunt. Nec obſtat iterum, non poſſe, vt alqui obijciunt, in eodem medio lumina,  
hic vnum assignari, illic alterum: hoc enim verum eſt in ijs luminibus, quæ non  
per idem medium feruntur; in luminum verò plurium concurſu falſum eſt.

#### Conſectaria parabratica ex diſtis reſultantia.

**E**X his ſequitur, qua ratione quis omnia ea, quæ in præcedentibus experimen-  
tis fieri poſſe diximus, hic faciliùs, & diſtinctiùs, ac quod magis eſt, ſecun-  
dum rectam ſpeciem, noctu ſolo candelarum vſu in obſcuro repræſentare queat, eo



qui ſequitur modo. Imaginem quamcumque, aut quocumque colore ſubtiliter in  
charta

Representatio  
tum in obscuro.

charta tenui depictam immergas oleo, hanc siccata[m] includes lateribus fenestra  
MONL. Dico, quod, si candelas quorlibet posteris in locis L, O, ante imaginem,  
per foramen S, quod fieri debet in pariete interiacente inter cubiculum illumina-  
tum & obscurum, species imaginis, quam ostendere volueris in parietibus, aut in  
papyro cãdida ei obiecta cũ omni adũbratione sua representabũtur; inuerfas quidẽ  
si imaginem M, N, L, O, rectam posueris; rectas si inuerfas. Nam cum quodlibet  
punctum imaginis suam speciem transmittat in oppositum obscuri cubiculi parie-  
tem iuxta ea, quæ in præcedentibus dicta sunt; cumque iuxta lineas rectas luminis  
radios diffundi monstrauerimus; sit primò vt ea quæ inferiora sunt imaginis depi-  
ctæ, superiora fiant in imaginis simulacro, & contra; Secundò, vt imago perfectè à  
candelis ante eam positis illuminata vniformiter suam speciem, & cum omnibus  
vmbis in oppositam obscuri cubiculi partem trajiciat, vt in exemplo posito patet.

Oculos animi  
conceptus mani-  
festant in oculis  
solum.

Ex hoc sequitur etiam, qua ratione quispiam occultos animi sui conceptus alte-  
ri in obscuro loco degenti manifestare possit, & omnia quæcunque voluerit in pa-  
riete describere solum specierum transmissarum subsidio. Simulacrum etiam eo vide-  
bitur imbutum colore, quo imago depicta; si flauo flauum; si viridi viride, & sic de  
cæteris; nam lumen materiæ alicui commixtum, eum assumit colorem, quo ipsa  
materia fuerit imbuta, vt fusè in antecedentibus demonstratum est, quod & suble-  
quenti experimento manifestius fiet.

Experimentum  
aliud.

Sit vitrea lampas pellucida, & viridis, cuius oleum vna cum elychnio viridi quo-  
que imbuatur colore; hæc si accensa fuerit, omne viride, & intuentium vultus ostẽ-  
tat; si nigra omnia videre desideres, id perficies immisso è sæpijs atramẽto; nã lucer-  
nis admotum, si accendatur atram desẽ projiciet flammã. Sic Anaxilaus, teste Phi-  
lostrato, lussisse fertur, dum ex sæpiæ atramento adstantes, Aethiopes reddebat. Por-  
rò flaua videbis omnia, si auripigmentum, crocum, lupinorum cortices & oleo per-  
misceris, & accendes in eo flauũ funiculũ flaua læpade. Simeon quoq; Sethi tradit,  
quod si quis Thryallidã, id est lucernã stupã in sæpiæ atramento, & æris erugine in-  
tinxerit, homines circumstantes partim cereos, partim nigros ob mixtarum rerũ in-  
spersionẽ videri. Quòd verò Io. Bapt. de Porta præsumit facere, vt adstantium capita  
equina, vel afinina videantur, id plus iactantiæ, quàm veritatis habere existimo: ef-  
fere autem vt conclaue plenum videatur visus, id verum esse veluti oculatus testis  
affirmare auisim. Verum de hisce vide fusius tractatum in Magia lucis & vmbre.

Representatio  
per radium re-  
flexum.

Atque hætenus de directa specierum projectione. Restat, vt etiam aliquid de ea-  
rundem reflexa projectione dicamus. Quemadmodum igitur corporum politorum  
superficies à quolibet suorum punctorum lucis, colores, & formas suas radio direc-  
to in opposito obscuro loco immittas, vt dictum est, describunt: sic lumen vna  
cum colore in muro receptum, secundum linearum rectitudinem reflecti potest;  
nam per r. huius forma lucis à corpore luminoso semper secundum lineam rectã  
defunditur in omne corpus ei oppositum, & similiter forma colorata habens acum  
luminis. Cum itaque hæc speculo incidunt, vel alteri tertio corpori, ob huiusmo-  
di corporis opacitatem semper fit luminis, & coloris, & formarum reflexio, quod  
probatur sequenti experimento.

## Experimentum. II.

*Quomodo species rerum intra domum aliquam representanda.*

**D**escendat intra domum aliquam per foramen in obiectum coloratum radius  
Solis, & in oppositione contra ipsum ponatur speculum, & iterum contra  
speculum ponatur vas concauum ad modum Scyphi interius album, quod ita apte-  
tur,

ut, vt lux reflexa super illud corpus album incidat: apparebit itaque super faciem  
albi corporis color illius corporis, in quod primo fit descensus lucis. Color itaque  
mixtim cum luce reflectitur: ergo etiam mixtim cum lumine incidit corpori poli-  
to, quod si densum fuerit, & durũ, color cum luce totaliter ab ipso reflectitur, ita vt  
coloret corpus politum. Si verò corpus politum fuerit rarum & lucidum actu, vt  
sunt aqua, vitrum, & similia; tunc reflectentur ab ipso colores, & lucis penetrant  
illud: quod patet per hoc, quod forma reflexionis ab his corporibus est debilioris  
lucis & coloris, quam ab alijs corporibus densioribus. Superest iam, vt doceamus,  
qua ratione species illæ, quæ in obscuro loco inuerse videntur, rectæ appareant:  
quod duabus modis fieri potest, vel inuersione rerum externarum, siquidem earum  
conditio id requirat: vel vitri lenticularis; aut speculi subsidio: illud sine difficul-  
tate fieri potest; hoc eo quo sequitur modo. In loco obscuro è regione foraminis  
speculum apponito, non quod disgregando dissipet, sed quod colligendo vniat,  
cedendo, remouendoque, quoad vique suam verã imaginis quantitatem debi-  
ta centri appropinquatione cognoris: & si attentius perpenderis, vestes ho-  
minum coloratas, vultus, nutus, motus hominum; cælum nubibus dispersum,  
cyaneo colore & volantes volucres, & quod mirum est, ea, quæ centro speculi vi-  
cina fuerint, omnia obuersa; si verò extra centrum elongaueris, maiora, erecta, vt  
sunt aspicias. Sed de hisce fusius in Magia nostra Catoptrica.

Experimenta de  
radio reflexo.

Quomodo spe-  
cies eversa recte  
compreans huius  
modi.

### Corollarium I.

**P**atet hinc Philosophis, & Medicis, quo in loco fiat in oculis visio; intromit-  
tatur enim idolum per pupillam fenestrã instar, vicemq; obtinet speculi par-  
ua magnæ Sphæræ portio vltima locata oculi.

### Corollarium II.

**P**atet, quod omnis reflexio debilitat lucem, & colores, & vniuersaliter omnes  
formas: quoniam enim, cum lux continua fortior sit luce disgregata per r. Pe-  
titionem; cumque lucem tanto debiliorem esse videamus, quanto ab ortu suo fue-  
rit remotior; patet lucem secundum punctum alicuius corporis luminosi ad super-  
ficiem corporis politi, seu speculi in modum pyramidis procedentem, tantò maio-  
rem, cum propter lucis à fonte suo elongationem, tum propter disgregationem,  
habere debilitationem, quanto à puncto illo fuerit magis remota. Lucem verò re-  
flexã à speculo maiorem; tum propter eã, quã habet à loco reflexionis; remotionem;  
tum propter disgregationem, & ipsam denique reflexionem. Colores verò,  
cũ sint similes lucis, quò similiter remotiores remigio lucis, seu directo, seu reflexo fue-  
rint, debili, & semper conspici debiliores, & insensibiliores, vt in præcedentibus ex-  
perimentis periculum facienti luculenter apparebit, & ex sequenti experimento  
constat.

## Experimentum III.

*De Lucis reflexæ debilitate.*

**S**i in radio incidentiæ ipsius speculi corpus aliquod coloratum diaphanum po-  
natur, per quod transiens radius in speculum incidat, deprehendes luce in  
speculum incidente, & ab hoc in parietem album reflexa luce, hanc illo multo debi-  
liorẽ. Et eodem modo color reflexus est debiliore colore, à quo fit reflexio. Patet  
ita-

Radius reflexus  
semper directio  
debiliores for-  
mas ostendit.

itaque omnem reflexionem, lucem; & colores debilitare; sed colores magis, quam lucem; quia illi debiliore modo incidunt, quam lucem; unde etiam in reflexione, facilius debilitantur. Color enim debilis, cum ad speculum pervenerit, coloris speculi miscetur, & propter illius commixtionem veluti immutatur, & foedatur; atque ideo color reflexus apparet debilis, subobscurus, & tenebrosus; accedit distantia reflexæ formæ à loco reflexionis, quæ omnia eius augmentant debilitatem. Patet ergo quod est propositum.

Corollarium.

Patet, quod lux, & color reflexi sint debiliores luce & colore primis; fortiores autem secundis, cum quibus ab eodem ortu æqualiter distant. Posset hic forsitan quispiam objicere, formarum in reflexione debilitatem non esse, nisi ex earum à sua origine elongatione; sed hoc falsum esse ex sequenti patebit experimento; nam etsi lux directa & reflexa æqualiter ab ortu suo remoueantur, reflexa tamen semper deprehendetur debilior.

Experimentum IV.

De lucis reflexæ debilitate.

Incidat radius Solis in obscurum conclave per foramen; foramini verò speculum chalybeum (quod tamen foramine sit minus) opponatur; ita ut residua foraminis lux incidat in terram super mundum papyrum; & reflexa lux è speculo in aliud corpus album eleuatum repercutiatur, obseruata tamen eadem cum corporis eleuati, tum in terra iacentis à foramine distantia. His factis deprehendes lucem in eleuati corporis superficiem repercussam multo debiliorem illa, quæ apparet in humi iacentis alba corporis superficie. Huius autem minoritatis ratio nulla assignari potest, nisi sola reflexio; nam vt in præcedente Corollario dictum est, lux directa colori speculi mista foedatur, à prima sua perfectione deficiens: qua proinde foeditate, imbuta defertur ad illud: si autem speculum aliquod dari posset eiusdem cum luce claritatis, reflexam lucem, vt pote sine coloris obscuri mixture, eiusdem rationis esset haud dubie futura cum luce directa. Sic etiam diceretur de luce reflexa, & secundaria. Item de coloribus veris & intentionalibus, seu secundarijs: luce enim reflexa cadente in corpus eiusdem ab origine sua distantia extra reflexionis locum positum, lucem hanc secundariam multò deprehendes debiliorem luce reflexa: ratio eadem est, quæ præcedentium: ergo patet id quod ab initio propositum fuit.


Alia representatio qua lucis reflexa debilitatio ostenditur.



Expe-

Experimentum V.

De Sole.




Uc idum Solis corpus AB, per foramina C, D, E, in obscuro receptaculo GHKP, mittit tres conos radiosos CKL, DNM, EOP, æqualis potentia ob æqualia foramina C, D, E. Dico in communi concursu conorum lucem notabiliter augeri. Vnde segmentum OQL, omnibus tribus commune est lucidissimum; & splendore sesquialterum ad segmentum QRMO, & sese habet ad segmentum dictum, sicuti 2. ad 3. cum hoc ex duobus tantum radijs constet, alterum verò è tribus: triplicem verò ad segmentum KCRM, quod est subduplum MOQR. vnde deduco, segmentum semper se habere ad radij simplicis splendorem, vti se numerus habet conorum, quorum est segmentum commune, ad vnitatem.

Proportio in conis sicuti lucis.

Experimentum VI.

De Igne.



Accipe cylindrum cauum, in cuius connexa superficie sint tria foramina A, B, C, è quorum regione statuantur tres faces accensæ quæ lumine suo traiecto in vnum locum interioris superficiei ED, colluceant, eritque lux ED, tripla lucis, quam cono radijs DIA, IBK, EKC, quisque per se habet: nam sicuti se habet 3. ad 1. ita lux DLE, ex tribus cono radijs composita, ad conum KEC, vel DIA, & sicuti 2. ad 1. ita lux LKE, vel DLI ad DIA, vel EKC, simplex cono segmentum. Iterum vt 3. ad 2. ita lux DLE, ad segmenta DLI, vel ELK, at prior proportio est tripla, altera dupla, tertia sesquialtera: ergo lux intenditur iuxta multitudinem facum, posito, quod singula æqualem habeant à foraminibus distantiam, positisque æqualium intensionum conis, communis concursus omnium in luce se habebit ad quamlibet illorum vt numerus omnium conorum ad vnitatem. Si verò communis concursus perforetur, & paulatim à se iterum cono diuergant, & suo lumine quisque allabatur in oppositum parietem MN, eritque MOP, & QNR, lunula ad segmentum PO, QR, vtrinque conuexum subdupla; horum autem vnum quodque ad commune omnibus segmentum PR, subsequalterum.

Mira proportio in istis luminis.

Corol-

## Corollarium Primum.

Species formales  
sunt, non virtuales.

**E**X quo luculenter patet rerū imagines non virtuales, sed formales esse. Si enim virtuales essent, post vñtionem in omnem æque partem sese diffunderent.

## Corollarium Secundum.

Virtus species sine  
diuisibiles.

**P**atet igitur ex hoc, sicuti obiectum, ita & conus radiosos diuisibiles esse, cum radius quiuis à quouis, sicuti & conus à cono re ipsa differat. Non con-  
cesserim tamen facile conuersam propositionem partem, sicuti species, ita & obiectum diuisibile esse; nam quod obijcitur in concursu omnium radorum alicuius coni, non speciem, sed verticem specierum esse asserimus. Sunt enim species visibiles quantæ, non indiuisibiles, vt sunt, cum in vnum punctum confluunt, quod est vertex radiosi coni. Quod si quispiam in puncto concursus species esse pertinacius assereret, ei responderemus ibi quidem esse, non tamen vt aptæ visum mouere, cum sub puncto nihil moueatur; virtute igitur ibi latent sua potentia, vt arbor in semine, quæ per *ἀκτινοβολισμόν* tandem in actum ducatur. Cum enim illud punctum ad radios sparsos, & ad se collectos se habeat, vt centrum in circulo ad radios; cumque omnes illos radios fundet; erit non actus, sed virtute tantum diuisibile, eritque non in se quidem, sed in radijs suis diuisibile: vel etiam dici posset illud gradu, non quantitate diuidi. Quanta porro ex huiusmodi experimentis admiranda resultent, patebit in Magia lucis, & vmbrae, vbi vsus horum experimentorum latius describemus.

## CAPVT V.

## De ἀκτινοβολισμόν, seu radiatione coloris.

**L**VCEM colores illustrantem vnde quaque repercuti, & colores illustratos radiare in orbem, non secus ac ipsa lux, etsi aliquantulum debilius; corporum quoque cuiuscunque figuræ superficies à quolibet suorum punctorum lucis, colores, & formas rerum oppositarum secundum linearum rectitudinem in obscurum locum trajicere, experientia pænè vulgare fecit. Verum, vt propositio paucis declaretur:

Nota primò duplicem esse huius factæ propositionis partem. Prima considerat mixturam lucis, & colorum; altera modum reflexionis formarum iuxta suas lineas. Ad primum quod attinet: Nota secundò non iam purum, sed affectum per medium diaphanum longè, lateque diffusum propagetur: nam cum omne corpus, quod vel proprio nitet fulgore, vel quod colore aliquo imbutum est, opacum necessariò sit, vt doctè demonstratur ab Aquilonio lib. 1. optico. prop. 3. 1. neque vllum in Sublunariis extet perfectè diaphanum; nec vllum *ἀδιαφανόν* adiaphanum, seu opacum, quod non luce, vel colore conspicuum sit, lucidi, coloratique cum opaco quadam veluti reciprocatione facta; sit, vt color lumini permisceatur, ceu quædam eius affectio, ex ea proinde mixtura plurimis luminum exorientibus differentijs: nisi enim vnumquodque lumen colore aliquo affectum sit, nil superest, quo vnum ab altero distin-

Natura luminis.

distingui possit, cum lumen qualitas sit, præter quam nihil in rebus aspectabile sit: necessum igitur est, quod propositum erat, demonstrare, natiuum coloris colorem cum lumine in vnam speciem vnumque aspectum coalescere; ex qua quidem concretione, ac contemperatione pro colorum diuersitate, diuersa quoque luminis procreatur differentia: hinc Solis lux aurea, Lunæ argentea, Martis rubicunda, sulphureæ flammæ cærulea, accensæ æruginis viridis passim obseruatur: Nec obstat, quòd lib. de Colorib. cap. 1. Aristot. inquit, Lux ignis color est, nullus enim alius, præter hunc ignis color inuenitur, & ob id solus hic visibilis existit, cum cætera visibilia huius euadant beneficio; nullique alteri possumus ignis aspectum fere acceptum, nisi luci. Hæc enim rectè ab Aristotele dicuntur, cum nec color ignis sine lumine, nec lumen nisi colore affectum videri possit. Vnde Marsilius Ficinus in lib. 1. Ennead. 2. Plotini. omnem colorum varietatem, quam in diuersis luminibus cernimus, in materia raritatem, & densitatem reponit. Scimus (ait citato loco) lumen, quòd purius est, eò esse nitidius, contra verò rubet in materia, crassa, pallet in media, sed in tenuissima nitet: atque hanc cælestibus quoque astris accommodauit, quæ proinde dixit eadem de causa variè fulgere, qua croci color congregatus quidem rubet, diffusus verò pallet, diffusissimus denique nitet. Verum materia maior, minorue diductio, hoc solum præstare potest, vt color dilutior sit, non verò, vt speciem immutet; quare nunquam fiet, vt croci color cæruleus euadat, quantumuis materia deducatur, aut constipetur. Vnde igitur quarundam rerum flammæ aureæ, aliarum rubicundæ, aliarum purpureæ, aliarum cæruleæ, aliarum denique virides? Sanè ex proprio materiae inflammabilis colore, qui lumini permixtus vna fulget, nitetque. Lux itaque, quæ primò inest corpori lucido, eiusdem colore imbutur; quæ verò à corpore lucido emanat, etsi longè debilior sit, tenuiorisque essentia, ipsum tamen colorem, quem à fonte accepit, perpetuò retinet, nisi, quòd hic quoque attenuetur, & pari gradu, vt lumen paulatim languescat, eò semper magis; quo longius, ab origine recedit; & sanè nisi ita colore lumen affici dicamus, nulla extabit probabilis ratio, qua lumen, à lumine, vt dictum est, discrepare ostendamus, cum tamen certò constet; vnum album, aliud flauum, aliud rubicundum, aut alio colore affectum esse. Vti igitur per lumen, quod à corpore deceditur, ipsum corpus lucidum; ita per colorem luminis, color proprius corporis lucidi per propriam imaginem conspicitur. Præterea non à propria solummodo materia, vnde profluit, lumen colores mutuatur; sed etiam ab ipsis corporibus, in quæ impingit: à quocunque enim repulsum fuerit, eius colore scædatur; sic vt decedens color per medium diaphanum cum lumine deportetur, eodemque peruadat, quòd ipsum lumen; suntque hæc colorum exordia multò tenuioris essentia, quàm colores ipsi, nec minus differunt à veris, quàm lumen directum à reflexo, hoc est primum à secundo. Verum huius rei luculentissimum experimentum lubet adscribere, ex quo etiam spectator non mediocrem capiet voluptatem.

Cur planetarū  
lucis diuersi-  
lores.

Cur flammæ di-  
uersi colores.

## Experimentum I.

## DE RERVM REPRESENTATIONE.

*Hoc experimentum est vulgare sit, hic tamen ad dictorum confirmationem melioremque explicationem assumpsimus.*

**C**onclauē, seu Cameram quampiam ita occludes, vt præter foramen exiguum, quæ fenestra pertusa est, nullum omnino admittat lumen; foramini vitrum lenticulare adaptetur, quod in medio paululum protuberet conuexum, quales sunt vul-

Cur colores non  
sine lumini be-  
neficio sūdatur.

Colores inten-  
tionales.

vulgares dioptræ, quæ ad res augendas conficiuntur; qualia item vitra, quibus ignis excitari solet radorum Solarium transmissio. His ita ritè præparatis charta candida intus vitro obijciatur, ea distantia, qua radij Solares nati sunt in vnum locum coire. Hic enim quæcunque foris sunt proprijs veluti coloribus depicta in charta conspiciuntur non sine aspectus illecebra, animique oblectatione, nihilque à re ipsa imago discrepabit, nisi sola magnitudine & situ. Hic enim ex necessitate inuersus erit; illa verò eo semper minor, quò res à vitro fuerit remotior. Sed quæret hic quispiam, qui sint colores isti, & cur non profundantur sine luminis præsidio, & cur denique non nisi in tenebris repræsententur. Ad primum respondeo hos colores alios non esse, quàm illos, qui à veris resecti vna cum lumine per medium diaphanum deferuntur: hi enim vitri ipsius densitate refracti, tanquam per angustum foramen in obiectam chartam dilabuntur, in qua proinde conspicui apparent, qui aliàs in medio peruo nullo modo perspicui poterant propter essentia tenuitatem; sunt enim hi colores tantùm intentionales, non corporci, eiusdem omnino naturæ cum ijs, qui à rebus coloratis cum lumine in vicinos parietes reflectuntur. Cùm verò colores hi nequaquam diffundantur sine luminis subsidio, causa est, quia lumen est veluti colorum forma, & anima, sine qua sub obscura potestate illi delitescunt; ea verò accedente, ad actum, aspectumque educuntur, ac veluti animati viuas rerum, à quibus emanarunt, imagines repræsentant. Cur porò, nisi in tenebris repræsententur, causa hæc est, quia lumen, quo veluti hypostasi sustentantur, vti est pertenuè, ita à maiore lumine facile deuincitur, quo separato ipsæ colorum intentiones pariter delitescunt; non enim eadem vis inest coloribus, quæ Solari astro; hoc etenim luminis affatim ex se suadit, ita vt etiam secundum, & tertium, & quartum ad ciendum aspectum nostrum efficax sit; at colores adeo sunt imbecilles, vt prima intentio, hoc est ea, quæ proxime à primo colore præciditur, minimo lumine obruatur, nec aliud lumen maius patiatur, quàm illud, quod repulsum à corporibus eam ad aspectum nostrum mittunt: Vti enim se habet secundaria lux, seu radius reflexus in obscuro ad primam lucem essentia suæ originem, ita colores secundarij, seu intentionales ad proximos, verosque colores, à quibus profluxerunt: est enim color quasi Simia quædam lucis, quæ in omnibus lucem affectat, quamuis eius perfectionem attingere nunquam possit; atque hinc est, quòd nunquam, nisi secundo tantum lumine; idque in obscuro, commixtas species repræsentare valeat, vti dictum est. Cur denique species videantur inuersæ, ostendetur inferius.


### Corollarium Primum.

#### De parasitafi, sive repræsentatione rerum.

EX prædictis colligitur, quo artificio in quouis obscuro loco ludicræ repræsentationes, vt sunt venationes, certamina, terribilium quoque formarum apparitiones demonstrari queant. Ego sanè nemini me ea methodo Christi Domini nostri crucifixionem exactè in obscuro loco repræsentatam aliquando vidisse. Hac methodo Rudolpho II. Imperatori ab insigni Mathematico, omnes prædecessores Romanos Cæsares à Iulio Cæsare ad Mauritium vsque recta specie repræsentatos esse, ita ad viuum, vt quotquot præsentès fuerint, id magica arte, aut necromantica adiuratione fieri putauerint, à magni nominis viro huic spectaculo præsentate accipi. Ita plebem imperitam vani quidem præstigiatores, Aquilonio teste, circumuenire solent, qui vt se Necromanticarum coniurationum peritos ostendant, iactentque se Dæmonum spectra ab inferis reuocata oculis spectantium posse

Repræsentatio  
facta Rudolpho  
Imperatori.

se sistere; Introductis enim secretiorum rerum curiosis in obscurum conclaue, silentioque seuerè indicto, simulatisque rerum, & verborum mysterijs, atque adeo expectatione ipsa, dæmonem mox affuturum ea, qua ipsi forma desiderarint, denunciant. Interea clauculum de eorum sodalibus vnus dæmonis personam induit, qua is vulgò pingi solet, vultu horrido, & monstroso, cornibus è fronte surgentibus, lupina pelle, vel cauda, manicis, calceisque vngularis; tum is foris meditantibus eo obambulat loco, ex quo suus & color, & figura per vitreum orbem in conclaue transfundi potest. Rebus ita callide comparatis, silentium seuerius indicitur, quasi quispiam proditurus sit è machina Deus. Hic pallere alij, alij sudare metu rei euenturæ. Profertur chartacea tabula, qua opposita lumini, mox Dæmonis obambulantis species simulacrum cernunt timidi, intuentur, contemplantur. Ita rudes illi



Repræsentatio  
Iudicra.

homines, aie citatus Author, vt ymbra videant Histrionis, operam perdunt, & pecuniam, nihilo profecto infantibus doctiores, qui credunt signa omnia aliena. Lucr. Satyr. lib. 20.

Viuere, & esse homines.

### Corollarium Secundum.

EX his patet, quòd quæcunque de luminis huc vsque actinobolismo dicta sunt, de colorum quoque radiatione sint intelligenda: Sicuti enim in lucis profusione radij in obscurum locum impermissi traiciuntur, ita & colorum species, ita vt etiam si omnium colorum species in communi puncto concursus confluant, ibi tamen neutiquam confundantur; sed quodlibet punctum superficie radians in obscurum murum sine vlla mistura, aut specierum confusione in puncto concursus facta, recto tramite propagatur.


R

Corol-

Corollarium Tertium.

Medium semper plenum est innumerabilium rerum speciebus.

Hinc patet quoque diaphanum quoduis plenum esse infinitis speciebus rerum visibilium, coloratarumque, se tamen sine vlla confusione penetrantibus. Hinc turrium, domorum, fenestrarum, hominum, animaliumque species in orbem radiantia, infinitam specierum multitudinem producant, quas tamen ille solus videre poterit, qui illas argute intra obscurum concluderit. Sit, verbi gratia, crux quadam, vt in figura præsentè apparet, cuius species per medium radiet, per foramen intra obscurum receptalia, & consequenter pyramidalem radiatione sua figuram, per aërem efformet vsque ad foramen C; deinde inuersa pyramide priori sicuti in-



uersam radiantem crucis speciem ad murum exhibeat: dico dictam crucis speciem infinities intra pyramidem CB, multiplicari, ita vt tot species crucis intra C, & B, vel CA, concipi possint, quot sectiones pyramides dictæ admittunt: sed illæ esse possunt infinitæ: ergo & species crucis infinitæ.

Corollarium Quartum.

Patet hinc totum aërem esse plenum infinitis diuersissimarum rerum Solis, Lunæ, syderum, omnimodarumque rerum sub aspectum cadentium speciebus, quæ tamen ita sunt inconfusæ, vt vnaquæque suas species sine commistione cum altera per medium in quemlibet obscurum locum transferat. Quam admirabilem lucis naturam, specierumque proprietatem, qui altius penetrauerit, is non multum tantum naturæ arcana, sed & complura circa metaphysica principia abdita sacramenta se penetraturum nouerit. Verùm de hisce pluribus in Magia lucis & vmbrae.

CAPVT

CAPVT VI.

De Actinobolismo, siue radiatione soni, eiusque ad lucem comparatione parallela: item de natura, medio, & subiecto soni.



IXIMVS in præcedentibus omnia lucis naturam in radiatione affectare; viso igitur Actinobolismo lucis; & coloris, obiecto videlicet visus; nunc qua radiatione obiectum auditus suas operationes percipiat, videamus. Certum enim est, experientia quotidiana docente, sonum virtutis sphaeram, intra quam solam is percipiatur, efficere, extra verò eam neutiquam: sed hæc sphaera fieri non potest, nisi per rectas lineas à subiecto sonoro per medium veluti, ex centro vndique diffusas, constituatur: radiatio igitur soni luminosam profluentiam proximè æmulatur, neque ἀκτινοβολίας alia differentia est, nisi quod illa instantaneo, hæc successiuo motu per aërem propagetur.

Sonus imitatur lucem.

Certè eandem quodammodo rem esse lumen, & sonum ipse Virgilius videtur innuere, dum dicit

—Tùm clamor ignis auditur.

Sicuti & lib. 6. Visæque canes latrare per vmbra.

Siquidem nihil oculis occurrere potest; quod sub eadem ratione auribus sese sistere non possit. Sicuti igitur luminis proprium est repræsentare differentes colores corporum iuxta differentes radiorum nunc incidentium, nunc reflexorū directiones in superficies, & hinc ad oculos factas; ita sonorum proprium est repræsentare differentes corporum qualitates ope moti aëris eorum superficies impingentis ferientisque; ita vt haud incongruè dicere possimus colores nihil aliud esse, quàm differentem immersionem, & reflexionem radiorum in medio; quemadmodum, soni nihil aliud sunt, quàm differentes aëris motiones: si enim quispiam subtilissimas aëris motiones, dum aliquod instrumentum musicum resonat, cerneret; certè is nihil aliud, quàm picturam aliquam insigni colorum varietate adumbratam videret, qua oculis sese diuersæ sonantium corporum qualitates, vt dictum est, sifterent. Præterea, vt lumen per se consideratum inuisibile est ita & sonus: neque enim in hoc mundo quicquam, nisi superficies coloratas repræsentantes quantum possunt Solem, cæteraque corpora luminosa, spectare possumus: lumen autem inuisibile esse satis superque ostendunt specula concaua, quæ nullum radiorum vestigium relinquunt, nisi in puncto concursus radiorum adhibito opaco reflectente corpore; imò, vt strictius loquamur, dico nullum accidens per se sensibile esse, nisi per corpora, à quibus sustinetur, siue per quantitatem, quæ ipsis dat extensionem, sine qua in punctum, nihilum abiret. Vti igitur lumen inuisibile est, ita & sonus, quidum aërem reddit sensibilem nobis, quamplures corporum qualitates, quas nisi ope sonorum, cognoscere nescimus, manifestat: et si quis paulò penitius naturam luminis introspexerit, is inueniet id nihil aliud esse, quàm quendam veluti aëris motum, qui secum imaginem deuehat primi motoris, corporis scilicet luminosi ad eam oculis sistendam sub nomine, & apparentia coloris, vel luminis. Ita sonus nihil aliud est, quàm eiusdem aëris motus, qui secum portat differentes causæ suæ qualitates, videlicet corporum eum mouentium: vnde hic nobis imaginem sub nomine, & apparentia soni obijcit: forma enim sensibilis, verbi gratia campanæ alicuius sonantis, sub eadem prorsus ratione oculis surdi alicuius sese sistit, sub qua eadem auribus alicuius cæci eadem accidit. Porro sicuti lumen sine corporis,

Parallela comparatio luminis ad sonum.

Nulli acciens per se sensibile.

R 2

à quo

Lumen eadem  
ratione oculis,  
ac sonus auri-  
bus allabitur.

à quo profluit, actuali influxu conseruari non potest, ita & sonus sine motione aëris. Ridēdi igitur sunt quotquot sonum canali inclusum multo tempore conseruari posse putant, vt fusius dicetur in Magia nostra Caroptrica; imò experientia docet meliūs nos, & maiori cum voluptate affici, dum historiam quandam, siue descriptionem viam alicuius rei legimus; aut ab insigni oratore varijs verborum, sententiarumque figuris, veluti coloribus quibusdam adumbratam audimus, quam si oculis aspiceremus. Sicut præterea obiectarum rerum species occulta quadam ratione afficiunt oculum & neruum opticum ad producendam opē spirituum similem imaginem; ita & sonori corporis imago aëre deuecta afficit aërem implantatū acustico neruoque auriculari ad imaginem sonori corporis repræsentandam. Ex quibus, nisi fallor, aperte ostenditur, ingens opticorum acusticorumque corporum, in agendo, atque producendo in hominibus tum visum, tum auditum, similitudo.

Reflectio est  
specie soni.

Denique sicuti in medio densiori refringitur visus, ita & sonus; vti postea fusè ostendetur. Quid enim aliud est sonus in corpore valde poroso, & molli receptus; nisi vmbra quædam soni obicem, ne vltius protendatur, obijciens?

### Consectarium.

**H**inc sequitur methodus quædam determinandi, quantum sonus intra aquam, ad eiusdem corporis sonum extra aquam factus sit grauior, & consequenter, quantum aër aqua rarior sit. Experientia enim ab insigni Mathematico non ita pridem compertum est; sonum alicuius campanæ duorum graduum, vbi gratia extra aquam, intra aquam quinque graduum fuisse, & consequenter vna harmonica decima minore grauiorem fuisse, cuius quidem rei causa alia non est nisi raritas, & densitas diuersorum mediorum. Aqua enim sonori corporis speciei intra aquam plus resistit, quam extra aquam; ex qua resistentia nascitur tarditas motus mediij, quam tarditatem sonus sequitur grauior; sicuti enim sese habet medium ad medium; ita vibrationes in vno medio factæ ad vibrationes factas in altero; & sicuti vibrationes ad vibrationes, ita sonus ad sonum. Si igitur, vt in proposito exemplo fuerit, vt 5. ad 2. & motus aëris ad motum aquæ, in eadem se proportione habebunt; vnde aëris raritas ad densitatem aquæ se habebit, vt 125. ad 8. Verum de hisce consule Musicam nostram cūrriosa, vbi de hisce, & similibus ex professo tractamus. His igitur ita consideratis nūc ad vltiore soni inquisitionē progrediamur. Verū vt eò vnde disgressi redeamus.

Quomodo sonus  
intra aquam gra-  
uior eadem ex-

Quid sit sonus.

Sonus igitur nihil aliud est, quam qualitas sensibilis, quæ auditu percipi potest, neque est motus, vt quidam opinantur, corporum se collidentium: consequitur tamen motum corporum se collidentium sonus, non quidem immediatè, sed mediante fractione aëris intermediij; vnde corpora, quæ plus habuerint aëris, & læuoris, maximā sonandi vim sortiunt, quia aer magis in læuibus, & aëris corporibus frāgitur, quam in nō aëris & crassis; vnde non sēper quoque ad sonū necessaria sūt duo corpora solida se collidentia; sed aëris, & aquæ impulsus sono producendo: nāximè aptus, vt fistulæ, & fremitus maris, tonitruaque luculenter edocent; fracto igitur ex collisione quorumcunque corporum aëre, sonus fit, qui à puncto collisionis non secus, ac colorum species in sphaeram radians diffunditur; sicuti enim colores species suas, ceu vicarias obiecti per radiationem emittunt vndique, ita & sonus speciem suam. Porrò medium soni, quo eius species ad auditum deferuntur; non sunt subiectum sonorum; sed aër, & aqua; & de aëre quidem nullum dubium est, de aqua experientia quoque nos certiores reddit: siquidem pisces certo sonitu congregari solitos Plinius refert. Pisces quoque nomine tenus vocari solitos comparuisse, idem Plinius refert; quin & tonitrua vehementer formidant; quod nō fieret, nisi sub aquis audirent. Vrinatores quoque sub aquis vehementiores soni-

Ad sonū collis-  
so duorum cor-  
porum solidorū.  
Non semper est  
necessaria.

Aqua subiectū  
soni est.

fuc-

tus se percipere affuerant, & tantò facilius, quantò minùs ab aquæ superficie abfuerint: quod manifestum signum est, sonum per aërem porosis corporibus, cuiusmodi aqua, ligna, muri sunt, ad potentiam auditiuam penetrare. Aqua igitur medium soni est: etsi multò liquidius, faciliusque soni per aërem, quam per aquam, traducantur; Sicut enim se habet lucis radius ad medium densius, in quo refringitur, hebetaturque, ita radius sonorus in medio densiori quoque refringitur. Hebetantur igitur, obtundunturque sonoræ species aquæ crassitudine, vt species visibiles medio densiore. Hinc tempore pluuiò, & aëre vaporoso minus, quam eo defæcato audimus. In aulis quoque peripetasmatis stratis vox obrusa, absorptaque; difficilius percipitur, quam cum nudatur tapetibus muri. Hinc quoque ratio deducitur, cur in pleno hominibus loco musica languescat, quia absorpta intra humanorū corporum caua ora vim perdit. Ita aula lana, vel paleis strata, ita obtundit sonum, vt vix percipiatur. De quibus pluribus in sequentibus.

Verū hoc loco restat explicadū qua ratione sonus per mediū propagatur, vtrū per esse reale, an per esse intentionale, siue species? Certè per species eū propagari rationi magis cōsuetaneū videtur, eū in omnibus agat sicuti species visibiles; sed species visibiles nulla alia de causa à natura institutæ sūt, nisi, vt obiectū materiale potētiae aliàs improporcionatū, per seipsa tanquā per vicariā obiecti sistat. Sed eadē ratione sonus transfert obiectum sonorum ad potentiam auditiuam per esse intentionale seu species obiecti sonori vicariæ. Etsi non dubitem aliquo vsque sonum quoque secundum esse suum realiter, & physice propagari, cum sonus ex continua aëris agitatione maximas vires sumat, vt potè sine quo nec secundum esse reale, neque intentionale propagari vllatenus possit. Neque vlla ratio dari potest, quæ conuincat huiusmodi qualitatem sonoræ totam se diffundere realiter in omnem partem; cū ad earum perceptionē sufficiat emitti ab eis species ad sensuum officinas, ne frustra fiat, Philosopho teste, per plura, quod fieri potest per pauciora.

Sed argues contra. Lux secundū esse reale se diffundit in mediū, ergo & sonus Respondeo non esse in omnibus sonis eandem cum luce rationem, vt ex sequentibus patet: nam lucis diffusio primò instantanea, soni successiua; deinde radij luminosi essentialiter dependent ab eo, à quo profunduntur corpore luminoso; non idem sonus; potest enim soni species independentè à subiecto, à quo fluit, per aërem, propagari, vt in Echo patet, in qua reflexa vocis imago existere potest, non existente subiecto, à quo originem traxit. Non idem dicendum de speciebus visus, quæ vtpote lumini vicinæ, magis immateriales sunt, quam species soni, in radiatione quoque differunt; nam sicuti vnda trudit vndam, & proiectus in piscinam lapillus circulos infinitos ex proportionali vndarum trusione causatur; ita & sonus per infinitos aeris proportionaliter agitati circulos propagatur: nam vt rectè Vitruuius; Mouetur, inquit, vox circulorum flexibus infinitis: vti stante aqua lapide immisso nascuntur innumerabiles vndarum circuli à centro crescentes, & quàm latissimè possunt vagantes, nisi loci interpolat angustia; ea tamen differentia, quòd in aqua circuli æqua planitie in latum mouentur, vox etiam in lōgitudinem progreditur, & altitudinem gradatim ascendit. Si enim aeris motum, quem obiectum sonorum efficit, intueri possemus, formaturus is esset veluti systema quoddā cælorum in orbem maiores semper & maiores protuberās. Sed his ita obiter perlustratis nunc quid vox reflexa, seu Echo sit, & quomodo fiat, videamus.

Similitudo ve-  
dit directi est  
reflexi ad sonū  
in aëre est in sa-  
qua.

Cur in aula  
tapetibus orna-  
ta, sonus non ita  
sincerus sit.

Quomodo sonus  
per mediū pro-  
pagatur, an per  
esse reale aut  
intentionale?

Comparatio spe-  
ciorum visibi-  
liū est audibi-  
lium.

CAPVT VII.

Ars Phonocamptica. siue Echologia.

Definitiones.

I. Φωνοκάμπτis nihil aliud est quam reflexio vocis, quam vulgo Echo vocant; unde Artem Phonocampticam siue Echologiam eam vocamus facultatem, quæ multiformis Echo construendæ rationes edocet. De qua arte in hoc capitulo pro ingenij nostro modulo ad lucis amissionem tractare visum est.

II. Linea sonora est, per quam vox it & redit.

III. Linea sonora recta est ea linea, quæ eadē via, qua iuit redit ad sonorum.

IV. Linea sonora obliqua est, quæ obliquè in oppositam partem reflectit.

Φωνοκαμπτικόν.

V. Medium Phonocampticum dicimus aerem vel aquam, per quæ propagantur soni species.

VI. Obiectum Phonocampticum dicimus illud, in quod vox impingendo reflectitur.

VII. Actionis linea dicitur, tota sonora lineæ longitudo, intra quam sonus perceptibilis est.

Φωνοκλαστικόν.

VIII. Phonoclasticum corpus dicimus illud, intra quod sonus refringitur.



Quemadmodum igitur lucis in corpus læue & politum incidenti species visibilis in speculo sub eodem angulo, sub quo videtur, reuerberatur ad potentiam visuam; ita sonora species sub eodem angulo, sub quo sonus fluit, ad audituam potentiam repercutitur: quod ex mirifica illa vocis in duriora corpora illapsa repercussione, quam Echo vocant, patet: adeo quidem, vt Echo nihil aliud sit, nisi vox articulata, aut modulatus sonus reflexus, motu aeris quaqua uersum radians, obiecto directè corpori plano, cauoque, ac satis læuigato occurrens, inde pilæ in star ad sonorum, & vocale reuertitur. Linea uero rectam, secundum quam vox in directum propagatur, sonoram dicimus, sicuti eam, quæ à luce propagatur, luminosam: secundum hanc enim, lineam in aere aperto, & libero, recta quaqua uersum diffunditur non secus ac lumen, natura semper compendio, quod per lineas rectissimas fit, studeat. Dixi, in aere libero, & aperto; siquidem vox obstaculum reperiens iuxta id se propagat: vt si ædificium fuerit concauum & circulare, iuxta hanc superficiem quoque fluxu circulari feratur, quemadmodum in fornibus, & arcubus fit, vt in sequentibus aperitur, ubi causas singulorum enodabimus. Sicuti porrò in lucis radiatione alius radius rectus, alius obliquus datur, ita in sonorum etiam propagatione, quorum anguli incidentiæ semper, quemadmodum & in luce æquales sunt angulis reflexionis, uti in Arte Anacamptica demonstramus. Verùm hæc omnia paucis propositionibus expediemus.

Quid sit Echo.




Pro-

Propositio I.

Vox radians in orbem, ubi corpus Φωνοκλαστικόν, siue corpus durum reflectens repererit, quasi in amœno occurssu perterrita reflexa radiat in orbem.

Si vox radians A, cuius species deferantur in obiecta seu saxosa loca BCEDI, normaliter, Dico reflexam vocem in punctis B, C, E, imò putei, E, recursum in A, punctum per lineas IA, BA, CA, EA, DA. Quoniam enim ex hypothese vox in dicta puncta solidorum corporum incidens reflectit ad angulos rectos, radius autem rectus in se ipsum reflectatur, certum est omnes radios sonoros in A, tardius, aut citius iuxta proportionem distantie corporis sonori, & corporis vocem reflectentis siue Phonocamptici reuerberatum iri.



Corollarium


Ex quibus patet, & aperte constat, cur subinde stantibus in montibus vox ex imo vallis reuerberetur ad nos: quia videlicet radius sonorus ad rupem C, normalis reuertitur in A. Cur in fontibus quoque & in puteis profundioribus Echo subinde quoque percipitur, causa est, quod vox A, in superficie aquæ D, reflexa vnde profecta erat, remeat. Patet quoque cur Echo in angulis præruptarum vallium non reddatur, quia vox radians ex F, in G, illinc sursum repercutitur in A. Si aliquis igitur in opposito loco A, existeret, is haud dubie vocem reflexam perciperet.

Propositio II.

Vox obliquè in murum incidens obliquè reuerberatur.

Si verò murus A, vox B, incidat in eum obliquè in puncto C, in quæ reuerberabitur in D. Cum enim angulus BCE incidentiæ æqualis sit angulo FCD, re-





reflexionis, in C. igitur illæsa vox redi-  
bit in D. ergo si ibi construatur auris  
vocem ex B radiantem in D, percipiet:  
reuertatur autem vox nõ in D, sed in S,  
per impossibile: quoniam igitur angu-  
lus FCS, continet angulum FCD, erit  
vtique illo maior; ergo & maior angulo  
incidentiæ ECB, quæ æqualem angulo  
ECD, reflexionis supponimus. Erit  
ergo angulus incidentiæ æqualis angulo  
reflexionis, & non erit: vox quoque  
audietur in S, & non audietur, quæ sunt  
absurda; non igitur reuerberabitur in S,  
sed in D, sub eodem angulo, sub quo  
profuxerat ex B, quod erat demon-  
strandum.

Confectarium.


Patet ex hoc vocem radiantem obliquè non reflecti ad radiantem, sed alior-  
sum diueri; Quia eodem modo se habet sonus obliquus ad reflexas suas spe-  
cies, sicuti obiectum visibile ad species ex speculo obliquè inspecto reflexas; sed  
hæc non videntur, nisi sub angulo, sub quo inciderunt, videlicet obliquo: ergo &  
sonus. Sonus igitur ex B, in C, reflexus audietur in D. Ex hoc patet, qua ratione  
sonus aliquis ita constitui possit, vt vnde proueniat, nulla ratione cognoscatur. De  
quibus fallacijs postea.

Propositio III.

Quo intervallo reflexio polysyllaba contingat.

Cum sonoræ lineæ non sint Mathematicæ, sed Physicæ, & latitudine aliqua  
præditæ, fieri non potest, vt ita exactè determinetur distantia reflexionis  
monosyllabæ. Blancanus in sua Echometria ponit hanc distantiam 24. pedes; ergo  
subinde 30. nonnunquam 36. aut etiam 40. inueni eadem intensione vocis; quam  
diuersitatem adscribo primò corpori phonocamptico; inueni enim quòd du-  
rius est corpus phonocampticum, eò celerius, & longius deferrì species: sicuti pi-  
la plano durissimo illisa. Secundò medium, quod subinde crassius, subinde tenuius  
est, quæ omnia multum retardant vctionem vocis; vnde differentibus quoque  
temporibus differentes vires Echo obliner. Nam aère nebuloso impuro, ac varijs  
motibus agitato debilius responder, quàm eo puro, defæcato ac quieto. vnde æsti-  
mo æstiuua tempora hybernjs meliora, vt noctes serenæ, ac quietæ diurno tempo-  
re phonocampsi aptiores sunt; diligenti tamen obseruatione monosyllaba reflexio  
contingit intra 24. & 40. passus ab obiecto phonocamptico; infra enim 24. pas-  
sum vix quicquam à prima voce diuersum percipias; à 40. vero passu clarè, & di-  
stinctè redditur vocis prima syllaba. Maximam distantiam verò dicimus tantam  
esse, quanta est dimidia actionis lineæ; vocamus autem actionis lineam, intra quam  
sonus perceptibilis est, cuiusmodi est linea BV. Dico lineam CS, esse maximam  
distantiam, intra quam sonus ex C, reflexus audiri possit; & hæc distantia æqualis  
est BC, dimidiæ BV. Ratio est, quia sonus à puncto C, in V, sine reflexione conti-  
nuat.

Quid sit linea actionis.




nuatus tanta intensione propagatur, quanta  
cum obstaculo in C, reperto in S, reflectitur,  
quia vox nihil ob reflexionem mutat in in-  
tensione speciei; si enim C, foramen esset,  
vox eodem prorsus momento, & eisdem

syllabis audiretur in diuersis locis V, & S. Determinata igitur distantia minima  
& maxima, certum est inter eam totam Echo polysyllabam cõpleri. Sit enim maxi-  
ma distantia sonori ab obiecto phonocamptico 46. passuum, minima verò sit 24. pas-  
suum, experientia docuit monosyllabam Echo distantia 36. trisyllabam 42. tetra-  
syllabam 45. passuum distantia reddi, & tandem in nihilum abire: quæ quidem  
intelligenda sunt, quando spacium inter φωνοκαμπτικόν & sonorum corpus est me-  
dium lineæ actionis. Potest enim aliàs contingere, vt linea reflexa vocis longior sit,  
quàm linea sonora recta, cum videlicet sonans propior est muro alicui, & vox in-  
tensior, tunc enim retro sonantem repercussa vox auditur, de quibus hæc regulas  
damus. Vel enim anacampticum corpus dimidium est lineæ actionis, & tunc linea  
directa, & reflexa sunt æquales: vel linea recta sonora minor est dimidio lineæ actio-  
nis, & sic maior erit linea reflexionis: vel denique linea recta maior erit dimidio,  
& sic reflexa minor erit, siue φωνοποιία; id est vocis cursus fuerit rectus, siue obli-  
quus. Vides igitur, quod, quemadmodum datur linea actionis lucis, semper rectæ  
& reflexæ simul sumptæ æqualis, ita & in sono: vt proinde naturam soni, vel ex ipsa  
natura lucis cognoscere facilè possimus.

Regule Echus mensuranda.

Confectarium.

Ex his patet, qua ratione, quis Echo polyphonam construere possit: si vide-  
licet secundum datam proportionem distantia corpora diuersa φωνοκαμπτικῶν  
quomodo consti-  
tuatur.



disponantur: ita Romæ ad Hippodromum Echo octies syllabam reperit; eandem  
memini ad muros Auenionensis vrbis vocem ex sustentaculis murorum, quæ  
Alas quidam vocant, proportionaliter reflexam octies reddi: figuram hîc apposui-  
mus. Verùm de Echo artificiosa, vide Magiam lucis & vmbra.

Experimenta varia circa reflexæ vocis naturam, & mirificas operationes.

Si quis offenderit oblongas trabes ligneas, etiam si longitudinis 100. pedum  
fuerint, poterit is cum alio in altero trabis extremo constituto submissa voce  
S quæ-


Qua ratione occultè, quis cum altero loqui possit.

quæcunque voluerit communicare, non obstante hominum circumstantium strepitu, & tumultu: si loquens videlicet os ad hoc, ad illud verò trabis extremum alter aures applicauerit: nam per corpus ligni aëreum, & porosum vocales species ita clarè deferuntur, ac si vicinæ auribus sisterentur. Idem experimentum succedit in arcibus pontium, applicato ore, aureque in locis diametraliter oppositis. In cochleis quoque scalaribus applicata aure basi columnæ cochleæ, & ore superiori extremo: loquens enim cum amico absente quæcunque voluerit, etiam submissa voce, & tantò quidem faciliùs, quantò ligna fuerint porosiora, & læuiora, arcus verò, fornices, & scapus cochleæ politiores. Expertus ego sum id in Cupula Sancti Petri, in cuius coronide duo diametraliter oppositi 100. ferè cubitis distantes quæcunque voluerint, sibi mutuo, non obstante Musicorum strepitu loquentur. Cuius rei rationem in Arte nostra Magnetica l. 3. cap. de Magnetismo Musicæ, vbi & alia huius generis reperies iucundissima simul & vtilissima.

Hinc quidam Architecti occultis canalibus ita Principum palatia instruunt, vt Princeps nullo negotio sermocinationes in locis hominum multitudini deputatis cognoscere possit, ac de rebus moneri clandestinis: de quibus omnibus fufus in nostra Magia Catoptrica. Vtrum autem quis canali vocem includere possit, vt realiter ibi permaneat; quemadmodum Ioannes Baptista Porta tradidit; in Magia lucis & vmbre decidetur.

### Experimentum I.

#### De Speculo Acustico, seu Auditorio.



SI quis speculum parabolicum habuerit, poterit quispiam cum alio subsidio huius speculi quæcunque voluerit submissa voce conferre. Sit speculum parabolicum AB, focus parabolæ E, vbi videlicet commune omnium radiorum concursus punctum est. Sit sonans, seu vocale C, auris amici applicata in puncto E. Dico voces quantumuis submissè prolatas ex C, in rectâ sibi oppositum speculum translatas, inde omnes reuerberatum iri in E, vnde & consequenter species vocis mirificè ibi intensæ voluntatem loquentis in C, manifestabunt. Speculum autem oportet esse amplum, & spaciosum. Videnos

de huius speculi mysterio fufus tractantes citato loco.

#### Corollarium.

Hinc patet rupem ingentem parabolicè excavatam ad 50. passus submissam, vocem reddere posse, qualem P. Ioannes Paës in sua Abyssinorum Historia describit in montibus Goyarra reperiri; est hæc in montibus rupes ingens ea naturæ industria excavata, vt speculum à remotè aspicientibus appareat. Huic ait aliam rupem, oppositam, in cuius cacumine nihil adeò submissè à quantumuis remotis dici possit, quod non audiatur. Clamantibus verò in dicto loco sonum adeò

Natura miracula in speculo acustico, seu auditorio.

inten-

intendi, vt vox exercitus alicuius videatur; norunt occultam resonantis naturæ vim sacrificuli istius loci, qui vt se diuinos demonstrent, homines in cacumine montis positos occultis huiusmodi vocibus de rebus futuris admonent, ij verò se Numinis voce afflatos arbitrati, non rarò in maximas calamitates deuoluuntur, dum iussa exequi inconsultius properant. Quæ si vera sunt, id alia ratione non fieri crediderim, nisi per *Φωνογραφία* obiectum parabolica figura à natura præditum, quo in vnum è regione positæ rupis punctum sonoræ species confluant. Hinc multa, soluuntur ab Historicis relata, quæ à plerisque pro fabulis, & superstitionibus passim habeantur. Narrat Herbersteinus in Prouincia Candora vltima Septemtrionis terra fluuium esse, quem ob spectra frequentia ibidem comparere, & voces hominum animaliumq; ibidem in opposita ripa exaudiri solitas, nemo adhuc transierit; ait quoque vix diem, aut septimanam labi, æstiuo præsertim tempore, qua huiusmodi prodigiosa voces non audiantur. Certò ego arbitror nulla alia hæc portenta esse, quam hominum, animaliumque voces veras in ceterioribus fluminis campis exortas, & ex cauis transimarû rupium speculis reflexas, quæ in ripis constitutos simplices, & inexpertos homines vano hoc metu, & panico quodam timore percutiant, cum nihil hominibus faciliùs imponere possit quàm ludibunda huiusmodi natura loquacitas. Cardanus lib. 18. de subtilitate similem narrat de quodam sibi familiari deceptionem. Quidam, ait, amicus noster, cum iter ageret iuxta flumen, nec vadum sciret, exclamare cœpit, Oh? cui latens Echo respondit, Oh? ille existimans hominem esse, interrogat Italicè: *Onde deuo passar? passa?* respondetur: *tum ille qui? qui?* replicatur. At ibi profundo gurgite aquæ admodum præstrepebant; vnde ille territus iterum interrogat, *Deuo passar qui?* Echo respondet, *passa qui?* Cui sæpiùs idem interroganti, idem respondebat. Quare cum amicus inter metum & necessitatem natandi esset, noxque obicura, & intempesta vigeret, Dæmonem aliquem sibi persuadere velle, vt se in torrentem illum præcipitaret existimauit: quare inde reuersus rem totam narrauit Cardano, qui non Dæmonis insidias, non phantasmatis illusionem, sed iocantis naturæ lusum fuisse ipso facto demonstrauit. Huiusmodi naturæ portentum sentias quoque Syraculis in rudibus Palatij Dionysiani, vbi in quodam recepraculo natura sonos ita apè reflectit, vt nihil admirabilius in simili materia me audiuisse recordari possim. Multa igitur per specula forma parabolica constructa effici possunt omne in capacitate excedètia.

Harborstenij in Historia Ruthenica.


Casus extrinsecus.

### Experimentum III.

#### De Speculo Elliptico Acustico.

SI quis verò ellipticum organum extrueret, ita vt puncta ex comparatione facta duos focos referrent, erit hoc instrumentum optimum ad sermocinandum cum furdastris: ex nimia enim specierum vocalium multiplicatione ita vox intenditur, vt spiritus auditiuos tympani penè stupefactos facillè suscitet. Verùm de hæc vide eruditissimi Patris nostri Bettinij Apiaria de Musica, vbi hanc machinam fusè acquè ac doctè descripsit. Et nos in Magia Catoptrica curiosè circa id versamur. Alexandrum quoque Magnum certum cornu habuisse tam intensi soni, vt illo totum exercitum quantumuis dispersum conuocatum ita præsentem stiterit, ac si singulis præfens loqueretur. Formam cornu in antiquissimo Codice Vaticano libri de Secretis Aristotelis ad Alexandrum tractantem cum reperissem, hic publicè illam iuris facere volui; cornu diameter fuit quinque cubitorum, eiusque sonus ad centum stadia percipiebatur. Quomodo autem cornu tam vehemènti sono animari potuerit, diceret alibi: figura sequitur.


Figura Cornu Alexandri Magni quo exercitum cogere solebat.



Hæc porro dum penitus inuestigo, certè videtur naturæ prouidentia similia organa auditiva concessisse omnibus animalibus timidioribus, vt auditu simul, pedumque velocitate hostium insidias euitarent: vnde Leporum, Cuniculorum, Ceruorumq. aures proflus παραβολοειδῆς, seu ἑλλειψοειδῆς in paraboliformem, seu oui-formem figuram adaptatæ iunt, quas & sono ita accommodare possunt, vt receptus ceu intra concaua elliptica, aut parabolica, multiplex reflexione tandem tympano maxima intensione se sistat.

§. III.

Φωνολαίσις, sive de fractione vocis in medio densiori.



QVemadmodum lux in medio densiori incidens refringitur ad perpendicularem, ita & Similia lucis sonus: quod ita ostendimus. Sit sonus vehemens in A; EB superficies marina; B, punctum in quod radius sonorus incidit: DF, maris fundus. Sonus igitur ex A radians in B, cum ibi inueniat obstans sibi medium densius, non rectè ex A per B in F, sed in C, fertur: Vnde si consequenter auris esset constituta in F, fundo maris, dico eam non percepturam vocem, sed aurem positam in C. Est enim eadem ratio profusionis specie: um soni, ac luminis; sed oculus in F, ob refractionem non videret obiectum A, sed in C, constitutus; ergo eadem est ratio de sono. Verùm de hîc & similibus vide fufissimè tractatum in Arte nostra Anaclastica.

Conse-

Confectarium.

EX his sequitur, quòd quò densius fuerit medium, tanto vocem debiliorem fore. Quantò verò clarius, & subtilius, tanto fortiorem Integrioremque; vti de luce quoque dictum est, vnde aère vaporoso, nubiloso, crassoque, minùs sentimus quàm in limpido, sereno, & tenui. In paludosis quoque locis minùs quàm in montanis, & præaltis regionibus: minùs iterum in pratis & herbosis locis, quàm in alpibus, quia in hîc vox variè fracta non absorbetur, vt ibi. In Ecclesijs quoque plenis hominibus minùs, quàm vacuis; sub aqua denique species soni valdè debiliter percipimus, & tantò quidem debiliùs, quantò profundius audierimus. Narrat Georgius Buchananus in Historia sua Scotica, in Prouincia, quam Fissam appellant, saxum reperiri ingens, Surdum ab incolis passim dictum, eò quòd ex aduersa saxi parte quolibet strepitu excitato, imò tormento bellico exploso, sub ea tamen latentes ita obsurdescant, vt ne soni quidem vestigium percipiant. Quod si verum est, certè huius rei causa esse potest, primò soliditas maxima lapidis, quam nullus radius sonorus penetret: secundò situs, & dispositio saxi, quæ nullum sonoræ speciei radium ad aures permittat; quibus datis ad quemuis etiam vehemētissimum sonitum necessariò sub eo latentes obsurdescant. Atque hæc sunt, quæ de radiatione sonorum breuiter dicenda existimauimus. Qui verò plura circa naturam soni, & de effectibus in animis hominum cocitandis plura voluerit, is adeat Mundum nostrum magneticum cap. de Magnetismo Musica; Magiam Catoptricam, & Musicam nostram curiosam; vbi omnia exactè ad hoc negotium spectantia tractata reperiet. Sequitur iam vt de Phonocritica sive de Phonognomia aliquid dicamus.

Saxum surdum in Scotia.

CAPVT VIII.

PHONOGNOMIA.

Sive

De diuinatione circa cuiusuis corporis. propositi temperamentum ex sono, & voce eiusdem perficienda.



QVemadmodum in præcedentibus ex colorum vniciue rei inditorum inspectione, Chromocriticam artem instituimus, ita hoc loco parallela quadam ratione Phonocriticam, seu Phonognomiam instituendam duximus, vt Lectori curioso immensæ lucis, & vmbra diuinitæ clarius paterent.

Notandum igitur duplicem hoc loco nos cõsiderare posse sonum, animatum, & inanimatum: Animatus iterum vel rationalis, vel irrationalis est. Sonus rationalis nihil aliud est, quàm vox opè asperæ arteriæ laringis, & epiglottidis ab animali prolata, cū intentione aliquid significandi: qua vltima particula distinguimus vocem humanam à brutorum, & inanimatis sonis, istæque, quæ præter intentionem fiunt. Animatus sonus irrationalis est vox brutorum ad passiones animæ significandas instituta. Inanimatus verò sonus corporum quorumcunque non animatorum collisio est, cuiusmodi sunt tonitrua, tormentorum explosiones, lignorum, metallorum, aliorum-

Duplex sonus.

rumque corporum compofiones. Cum itaque fonus vnus corporis fuerit acutior alterius corporis fibi æqualis fonus, tum neceffariò concludetur, acutioris fonus corpus rariori fubftantia conftare, prædominiumque æreum, vel igneum portare. Verùm, vt in arte fecutus prodeas, hoc cape experimentum.

### Experimentum Phonocriticum.

#### De natura diuerfi generis liquorum, offium, mineralium per fonum indaganda.

**F**iant ex omni liquorum prius ritè exficccatorum genere parallelopæda, vel cylindri omnes æquales magnitudine, eaque filo fufpenfa plefro percute, & fenties difparatiffimas fonorum fpecies; alia enim femitonum, alia tonum, ditonum, aut tritonum, alia diateffaron, diapente, aut etiam diapafon, ad alia fonare reperies; habitifque confonantiarum proportionibus, facilè de corporum naturali conftitutione, quantò nimirum vnum altero fit compactius, quantumue rarius, & porofius altero, iudicabis. Cum enim denfitas alicuius corporis ex maxima terreftrium, aquearumque partium conftipatione oriatur, tantò vnum altero erit denfius, quantò partes habuerit conftipatiores: & quantò corpus fuerit conftipatius, tantò erit grauius; quantò grauius, tantò tardius mouebitur; quantò denique tardius mouebitur, tantò grauius fonabit. Est autem grauitas foni corporum duplex: quædam enim fonum grauem habent vehementem: alia grauem, & obtufum: ille terreftris, & ficci temperamenti indicia præbet: hic aquei, & humidi, & malè compacti. Raritas verò cum ex maximè porofa fubftantia originem habeat, mul- tique æris capax fit, tantò corpora erunt rariora, quantò porofiora, & quantò læuiora, tantò celerius mouebuntur, & confequenter altiùs, acutiùsque fonabunt. Nota tamen hic nos non loqui de corporibus mollibus, & liquidis, cuiufmodi funt lana, pluma, liquores, fimiliaque non compacta, neque folida fubftantia conftantia, de quibus poftea; fed de corporibus folidis, durifque; quorum alia fonum quoque habebunt acutum, vehementem, & penetrantem; alia acutum quidem, fed obtufum, & debilem: vti ille porofitatis læuitatifque; ita hic porofitatis quidem, at flaccidioris fubftantiæ argumentum præbet. Idem de offibus metallicifque corporibus aureis, argenteis, cupreis, ferreis, plumbeis dicèdū. Quæ omnia in noftro Mufurgia noua & curiofa fuiffimè explicata reperies. Vnde ex hisce ita ritè conftideratis formamus fequentes Canones Phonocricos.

#### Canon 1. phonocriticus corporum folidorum.

**S**i corporis alicuius folidi fonus ad alterius corporis æqualis fonum grauis fuerit, & obtufus, is manifefta aquei prædominij argumenta dabit, vt in plumbo ob mercurialis humiditatis copiam; fi verò fonum habuerit grauem quidem, fed vehementem, tunc certo de terreftris, læuis, ac benè compacti corporis temperamento pronuntiabis, vt in ferro, chalybe videre eft. Si porò fonus alicuius corporis folidi acutus fuerit, & tenuis, æreis is temperamenti indititia dabit, & porofæ quidem, at flaccidioris fubftantiæ, vt in ftanno videre eft. Si denique fuerit fonus acutus, & vehemens, & penetratius, tunc certè concludes corpus eſſe ignei temperamenti, fide tenuis, & maximè leuis fubftantiæ, vt in æreis videre eft.

Quæ cognofci  
poffint prædomi-  
nia qualitatum  
in corporibus  
per fonum.

Grauitas fonus  
duplex eſt.  
Vnde grauitas  
eſt acumen vici-  
us.

### Experimentum Phonocriticum II.

#### De temperamento liquorum.

**A**ccipe tres, quatuor, aut quinque calices vitreos, omnes forma, & magnitudine æquales, quos omnes diuerfis liquoribus, aqua, vino, aliifque stillaticijs replebis, ita tamen, vt omnes æqualem habeant plenitudinis fuæ terminum: Hoc peracto limbum, feu oram calicis digito madefacto tam diu perfricabis, donec fonum perceperis, qui quidem fonus pro diuerfitate liquorum, diuerfus quoque erit. Quò enim subtilior fuerit liquor aliquis, tantò acutiùs fonabit, & quantò icraffior, tantò grauiùs. Hinc oleum, cum compactius fit, & lentiùs, tantò grauiùs quoque fonabit; aqua grauius fonabit aqua vitæ, & hæc grauius fpiritibus, fide quintis eſſentijs. Notando interim, quòd oleaginei liquores, etfi aqua elementari ſint quoad fubftantiã multo subtiliores, vt pote æreæ naturæ, lentorem tamè, & viſcidam fubftantiã aliquantulū maiorem foni grauitatem cauſare. In reliquis verò liquoribus hoc lentore carentibus, de prædominio elementari facile iudicabis, cuius hæc ſint regulæ

Diuerſi liquo-  
res diuerſos ſo-  
nos habent.

#### Canon 2. Phonocriticus liquorum.

**S**i fonus calicis fuerit grauis, & obtufus; aqueum temperamentum liquoris in- fuſi inde concludes, vt in aqua fontana, quæ tamèn ad aquam paludofam, vt potè terrei, fæculentique temperamenti acutiùs fonat. Si fonus fuerit acutus, & tenuis, ærei temperamenti indicium habebis, vt in omnibus aquis stillaticijs, quæ femper acutiorem fonum habent aqua elementari quacunque. Si denique fonus fuerit acutiſſimus, & subtilis penetrans, ignei temperamenti id tibi argumentum præbet, vti in fpiritibus, & quintis eſſentijs apparet, quæ eadè quantitate in vitreis calicibus æqualibus acutiorem fonum cauſat reliquis liquoribus. Quòd verò quifque liquorum altero subtilior fit, ipſe fonus indicabit. Si enim quiſpiam illorum ad alterum fonuerit diapafon, certum eſt illum duplo altero subtiliorem eſſe. Verùm de hisce conſule Mufurgiam noſtram curioſam fuiffimè omnia pertraçantem.

Quomodo per ſo-  
num, liquorum  
temperamentum  
diſtingui poſſit.

#### Canon 3. Phonocriticus vocis animalium.

**V**ox animalibus brutis hoc ſine à natura indita eſt, vt per eam paſſiones ſuas ſignificent, aut hominibus, aut ſui ſimilibus. Experientia enim conſtat aues, canes, feles, boues aliam formate vocem dum cholera mouentur, aliam dum melancholia, aut phlegmate, aliam dum amant, & blandiuntur, aliam dum coitum appetunt & timent, aut aliquid vehementer appetunt; Dum enim cholera mouentur, certum eſt acutiorem fonum ea edere, quàm fame ſtimulantur; cholera igitur rara, subtilis, & tenuis vocem acuit, illam quam melancholia, & phlegma, ob tarditatem humoris remittit; ſanguinis verò ebullitio reddit temperatam. Si igitur paſſio fuerit cholericæ, vox concitior eſt, & acutior, vt in canibus, & felibus rabie agitatis videre eſt; dum coitum appetunt, vocem emittunt acutam, & gemebundam, ſanguinis feruentis indicium: alio igitur, & alio humore agitata, aliam & aliam vocem edunt; ex qua notitia ſcientia formari poſſet, qua vocem & linguam animalium quis intelligere poſſet, quemadmodum de Apollonio Thyaneo legitur; & nos horum animalium linguam fuiffimè explicamus in opere noſtro, quod Turrim Babel inſcribimus, vbi ſuo tempore multa rara, & noua huc vſque inuiſa Leſtor curioſus reperiet.

Quomodo ex ſo-  
no ex voce, ani-  
malium tempera-  
mentum co-  
gnofcatur.

Liber dictus  
Turris Babel.

## Canon 4. Phonocriticus vocis humanae.

**Q**uamuis in hominibus vocum varietas, & multitudo non sit minor varietate humanorum vultuum; affectus tamen interioris hominis facilius forsitan, & certius per vocem, quam colorem indagari possunt. Hinc Platonem indolem alicuius cogniturum dicere solitum legimus; Loquere, vt videam te: quo quidem nihil aliud, nisi modum quo per vocem interioris animi indolem cognoscere posset, innuere videbatur Isaacum quoque non tactu, sed voce differentiam fratrum, cognouisse sacræ paginæ testantur. Cognouit & Galenus capacitatem thoracis per vocem, cum dixit, eos qui vocem fortem habent, quam sine interruptione possint continuare, magnum habere thoracem. Verum hic Galenus tantum loquitur de voce forti, cuius causa est thorax amplus, & vastus cum pulmone grandi, & amplo, & musculis validis laryngis, & epiglottidis. Sunt tamen alia vocum differentia, quæ non tam à thorace, pulmone, epiglottide, quam à temperamento originem suam fortiuntur: Cuiusmodi est vox tarda, & velox, dulcis, aspera, distincta, confusa, stridula, acuta, grauis, & bassa, mediocris, & temperata, ridicula: quæ omnes vocum differentia diuersorum temperamentorum indicia sunt; & facile cum coloribus componi possunt, vt sequitur.

## §. I.

## De voce intensa, &amp; graui, quæ correspondet colori nigro.

**Q**ui igitur voce magna vociferantur grauius, teste Aristotele, referuntur ad Asinos, & consequenter sunt iniuriosi, contumeliosi, & petulantes, conuiciatores: asinos autem conuiciatores esse, & contumeliosos, natura eorum petulans, iniuriosa, & contumeliosa, dum bene pascitur, satis docet. Vnde Aristoteles ita concludit: Asinus admodum magnam vocem habet, & grauem, & asinus indiscretus est, petulans, & contumeliosus: ergo, quorum magna, & grauis vox est, illi sunt petulantes, indiscreti, contumeliosi. Sed rationes huius vt videamus, restat. Vocem magnam ijs animalibus inesse videmus, quæ magnam habent asperam arteriam, multumque inde aëris emittunt: grauem habent, quæ tardè aërem multum extra arteriam pellunt. Magnam igitur vocem habent, quæ magna sunt animalia, quoniam & his magna ad sunt instrumenta. Sunt igitur necessariò etiam homines tales. Qui magnam habent vocem, & amplo pectore sunt, & magna arteria, & collo crasso; id docet in ijs dominari terram secundum molem. Si autem cum magna voce iunctam grauitatem, quam tarditas frigoris soboles fabricat, percipimus; temperamentum id frigidum, & siccum, hoc est terrestre indicat; cui tale temperamentum, ille auarus, ac timidus quidem est, cæterum indiscretus, vilis; qui in prosperis insolentia sunt intolerabiles, in aduersis lepusculis timidiore: quam naturam in Caligula notauit Cornelius Tacitus.

## §. II.

## De voce graui in principio, &amp; in acutum deficiente, quæ caruleo colori respondet.

**E**os, qui initio graui voce incipientes in acutum desinunt, nos querulos, iracundos, & mæstos adnumeramus Bobus, quorum hæc natura est: Nos

verò

verò rationem huius rei paucis explicemus. Certum est mæstis & dolore suppressis calorem à circumferentia ad centrum circa cor vnà cum spiritibus colligi, superioribus consequenter membris calore destitutis in frigore relictis; propter frigus igitur eo in loco prædominans tarda vox est, grauisque, vt copiosus circa cor calor copioso eget aërea: vnde mæsti multum attrahunt aëris, qui rediens tarde, multum aëris externi mouet: vnde consequenter initio crassa, grauisque vox emergit; & quoniam loquendo, conquerendoque, vt cum Poëta dicam,

*Egeritur lachrymis, egeriturque dolor;*

Fit, vt ex querula garrulitate calor circa cor motus solutusque egrediens magna celeritate moueat aërem, quem motum necessariò acutus quoque sonus sequitur.

## §. III.

## De voce acuta, molli, &amp; rupta, quæ &amp; colori albo respondet.

**Q**uicunque, dum loquuntur, vocem quandam acutam, mollem, & fractam emittunt, illos dicimus homines esse molles, & effæminatos. Vocamus autem hic vocem mollem, quæ tum tarda est, tum remissa, paucumque aërem mouet, qualem audimus in mulieribus, & pueris blandientibus, dum loquentes in medio verborum deficiunt, quod magnæ circa cor existentis motionis signum esse testatur Poëta hoc versu:

*Incipit effari, mediaque in voce resistit.*

Causam huius rei crederem caloris esse defectum, humorisque excrementi excessum: huius enim calor deficit, ita molliter, & interruptè mouet; deficit autem, si comparatur cum nimio humore, à quo penè obruitur. Ita ergo ratiocinemur; Vox acuta, mollis, & interrupta docet humidi supra calorem dominium; at temperies, in qua hoc accidit, effæminata est; ac mollis, & propensionis ad molliem, & ad abiectiorem animi docet: Ergo vox huiusmodi non facit, sed indicat animi molliem, & naturam muliebrem.

## §. IV.

## De voce graui, &amp; perplexa, quæ &amp; rubro, seu igneo colori respondet.

**Q**uicunque, dum loquuntur, vocem habent grauem magnam, & perplexam, illi, Philosopho teste, audaces sunt, fortes, & manu prompti. Dicimus autem perplexam vocem; quando videlicet dictiones præ nimia loquentis celeritate inter se confusæ sunt, & inarticulatæ, & aded ex ore loquentis eduntur raptim, vt altera alteram superueniens syllaba audientem confundat; quomodo loqui solent, vt plurimum, qui cum naturaliter audaces sint, magna animi commotione percussi sonare potius, quam loqui videntur. Causam huius rei hanc damus; Cum enim fortis temperamentum habeat vehementer calidum, & siccum; terrestre, & siccum grauem fundat vocem; calidum plurimum mouet aëris, vnde vox magna, & perplexa: dum enim calor vehemens mouet, quoniam eius potentia, & vigori quodammodo improporionatum est mobile, vehementius, quam deceat, illud impellit, vehementer propulsa posterior vox priori superuenit; & cum illa pænè, & quodammodo miscetur, & sic vox perplexa redditur. Quicunque igitur ha-

T

buerit

Hominum temperamentum, qui per vocem cognosci possit.

Coniectura ab Asini voce.

Ratio asserionis

Coniectura à bo- uina voce.

Ratio cur ho- mines grauis, & perplexa vocis audacis sunt.

buerit huiusmodi vocem, illum audacem, præcipientem, & vehementem, corporei roboris non parum consecutum dicemus.

## §. V.

De voce molli, & sine contentione, quæ colori subflauo respondet.

Ratio vocis molli.

**H**I qui voce pollent molli, & sine contentione, oppositi sunt præcedentibus, mansueti enim sunt, & referuntur ad oves; teste Philosopho: hanc in pueris, & virginibus dum hilares sunt sine perturbatione, & secundum naturam dispositi, percipies: vnde hoc formamus ratiocinium, Quicumque dum loquuntur naturaliter, & sine affectu, habent vocem parvam, mollem, & remissam, mansueti sunt, & timidiusculæ naturæ, sicuti oves, quæ huiusmodi vocem habent, eademque sunt mansuetæ, & timidæ: sed qui naturaliter patiuntur iniurias, mediocriter irascuntur, neque ad vindictam insurgunt; huiusmodi ut plurimum ouina voce gaudent: ergo; Sunt enim temperamenti humidi, & frigidi, ad quod se, & habitus animi vnâ cum voce accommodat.

## §. VI.

De voce acuta, & intentâ, quæ colori intense rubro respondet.

Ratio vocis acutæ.

**Q**uicumque, dum vocem emittunt acutam, & intensam, iracundi sunt petulant, libidinosi, & Typhoni, Caprisque comparantur. Est enim Capra animal temperamenti calidi ad siccitatem vergentis, melancholiamque pituita mixtam habet; quæ cum non bene concordent, nescio quid corruptionis humidi in sicco indicant, & graueolens, quem expirant, odor, id satis declarat. Vnde quicumque hanc habuerint naturam; & vocem habebunt capris similem, & inclinationis imperus eosdem. Verum nemo nos hoc loco inclinationem ita violentam accipere putet, ut non oppositis virtutum actibus domari possit; cum nemo adeo malitiosus, & peruersus sit, qui virtutis capax esse non possit. Concludo igitur cum Poëta:

*Inuidus, iracundus, iners, vinosus, amator,  
Nemo adeo ferus est, qui non miscere possit,  
Si modo cultura patientem accommodat aurem.*

Sed nos hisce relictis ad reliquarum rerum actinobolismos disquirendos, calamus conuertamus.



## CAPVT IX.

De actinobolismis reliquorum sensuum odoratus, tactus, gustusque.

De radiatione Osmetica siue odoratiua.



**VM** odor sit qualitas ex primarum commistione qualitatum resultans dominante sicco & calido, obfactus motiua; certè illa nulla ratione sensorio sibi potest, nisi per *actinobolismum* osmeticum, seu radiationem à subiecto sphericè per mediū diffusam: si enim, ut rem experimèto doceamus, globus ex muscho confectus filo argenteo è laqueari suspendatur, experientia docet ex omni parte medijs odorem muschi percipi; quod non fieret, nisi ad imitationem lucis sese à corpore odorato transfunderet per medium; differt tamen à radiatione lucis, quod odoris translatio per medium sit successiua, lucis sit instantanea, odoris Sphæra, virtutis sit materialis, lucis verò ab omni materiâ sciuncta confortio. Dubiū tandè hic exoritur, quomodo hæc radiatio osmetica per medium deferatur: num per esse suum reale, vtrum per esse intentionale. Priorem quæstionis partem omnes ij tuentur, qui halitum fumosum, seu fumidam euaporationem, & consequenter substantiam, non qualitatem odorem existimant. Alteram multi in dubio relinquunt; de vtroque quid sentiamus, iam aperiendum est. Nos dicimus odorem, quem ipsæ res per medium emittunt, non esse halitum formaliter, sed subiectiue; id est odor ille, quem percipimus, nequaquam existimandus est esse fumida illa exhalatio ex corpore odorifero euaporatiue in medium diffusa, sed in halitu illo inest subiectiue, & ab eo per medium veluti vehiculo quodam defertur; & sic intelligimus eos, qui fumosam exhalationem odorem vocant: qui quidem, ut dictum est, in mistis corporibus ex primarum qualitatum concretionem resultat; sicco dominante, calore verò humidum decoquente, & excitante. Quod autem siccum, & calidum prædominentur in odore argumento est, quod res odorifera plus æquus macerata odore perdant: deinde res odorifera non proueniūt, nisi in regionibus feruentissimo Soli subiectis. Ratione quoque organi osmetici fieri conuincitur in odore prædominatio sicci, quod humore, & plegmate oppletum organum vim olfactiuam perdit, ut in nobis catharro frigido suffusus experimur: calorem quoque in odore requiri saltem temperatum, experientia docet: plantas enim, floresque locis paludosis, & viginosis prouenientes nullum, vel saltem admodum obtusum spirant non alia de causa nisi defectu caloris nimia humiditate suppressi. Aquæ quoque odorifera, Balsamumque exsiccatum, intensissimum odorem exhibent. Dixi saltem temperatum, quia odorifera si igne in cinerem redigantur, non tantum non olent, sed & omnem vim perdunt. Fit igitur, ut ad institutum nostrum redeamus, radiatio per medium aliquovsq; quidem per esse suum reale, per esse tamen intentionale etiam in loca remotiora, non secus ac de specierum soni transmissione docuimus. Prioris ratio est; cum enim medium patiat a sono, & odore teste Philosopho; medium autem pati ab odore nihil aliud sit, quam aërem ita pati à re odorata, ut redoleat: at cum redolere nihil possit nisi odore secundum esse reale effecto, vti necesse candidum, nisi candorem habeat; rectè dicimus in aëre odorem realem recipi, & consequenter per aërem deferri secundum esse suum reale vniiformiter difformiter. Non tamen existimandum est spargi odorem secundum esse reale ad totam substantiam, in qua percipitur, cum non sit verisimile tantam illi inesse vim, ut tori sphæra se perfectè communicare possit: ergo indiget vi-

Odor sphericè qualitate sua multis.

Experimentum.

Radiatio osmetica quomodo per medium feratur.

Odor in fumida exhalatione inest subiectum non formaliter.

Vnde odor.

Vtrum per esse reale deferatur species osmetica.

cario obiecti, quæ nihil aliud quam odoris specis est; non igitur secundum esse tantum reale aliquotusque, sed etiam ad remotiora loca, secundum esse intentionale fertur odor. Exposito campis caduere, statim tetro odore eius excitatis Aquilas, & Coruos e remotissimis etiam locis aduolantes videbis; at verisimile est non excitatos ab odore reali morticini, cum concipi non possit, qui fumidus ille halitus ad plurium etiam milliarium distantiam radiare possit; ergo ab intentionali odore singulari providentia animalibus, ne in necessarijs deficerent, à natura ordinato. Aër igitur, & aqua subiectum sunt sicuti luminis, & soni, ita & odoris. Et de aère quidem nullum dubium est. De aqua multi dubitant: at ego multiplici experientia comperi etiam in aquis odorifera radiare. Pisces enim rebus grauiori odore imbutis allici nullum dubium esse debet. Obijcient tamen hoc loco nonnulli, pisces rei visæ obiecto, aut occulta qualitate excitatos ad escam currere. Perperam: si enim sola res visæ mouet pisces; ergo noctu nullus piscis capiatur: at experientia docet nullum tempus piscibus capiendis aptius nocturno: odore igitur excitantur escarum; quod hoc experimento didici.

An spiritus  
virtutis subiecti  
aqua esse possit?

## Experimentum.

### De radiatione odoris in medio aqua.

**A**ccipe lumbricos terrestres igne tostos, hamoque infixos, in gurgitem dimittes, & statim tostorū vermiū odore excitati pisces agminatim cum maximo piscatoris lucro accurrent. At si eandem vermium massam succo Asæ fetidæ infeceris, non tantum non allicies pisces, sed & omnes tetro huius herbæ odore fugabis. Simile experimentum Centumcellis sumpsit anno 1639. Cum enim nauis illo tempore in portu ingētem saxo cuidam affixum Polypum deprehenderēt, nec modus esset eum tot cirris implexum inde auellendi; consului, vt Pulicariæ succo eum perfricarent, cuius odorem herbæ eidem esse quàm maximè contrariam cognoueram. Dictum factum; vix enim dicta herba Polypum tetigerant, cum ecce dissolutis cirris, fuga ob inimicum odorem sibi consulens, tandem in nassas incidens captiuum se præbuit. Adde, pisces alios sibi pisces siue amicos, siue inimicos non aliunde, quam per odorem cognoscere. Ad sobolis quoque propagandæ studium, libidinemque, non nisi odore, vti & terrestria animalia excitari adeò certum est, vt qui id neget, experientiæ irrefragabili vim facere videatur. Quis nescit Lucium odore larrinarū maximè allici, musco aromatico Balenas, alga, Apuias; lente palustri Barbiones, et sic de cæteris, quæ longum esse recitare. Quamuis non negarim odoratum obtusiores esse aquatilibus, quàm terrestribus animalibus, seque habere radiationem in aquis ad radiationem odoris extra aquam, sicut radiatio refracta ad directam: vti enim luminis radius in medio densiori frangitur, obrunditurque, ita & radius odoris. Sed hæc de odore sufficiant. Reliqui sensus Gustus, & Tactus, cum non moueantur nisi obiecto præsentē, illis cōsequenter radiationem quoque non ita propriam, vt odoriferæ res sibi venditant: habent tamen aliquam in ipso sensorio. Quæ tamen cum ab analogia lucis maximè recedent, omittenda duximus.

Experimentum  
in polypo sum-  
ptum.

### Confectarium.

**E**X hac rerum odoriferarum *αἰθροβολία* clarè patet nullum lapidem, plantam, arborem, animal esse, quod non materiali suo effluuio odoris veluti vehiculo quodam in orbem radiet, cum nullum corpus mixtum assignari possit, quod om-

ni

ni prorsus odore careat: si igitur omnia odore aliquo polleant; ergo radiabunt; cum verò radient vniformiter; ergo necessariò terminus actiuitatis radiationis eam dabit figuram, cuius fuerit radians corpus, vt si muschum fuerit rotundum, sphaera virtutis profusæ terminus erit circulus: si quadratum erit, erit terminus quadratus, & sic de alijs ratiocinaberis. Atque hæc de sensibili radiatione sufficiant; de alia porò radiatione virtutis sympathicæ rebus inditæ in sequentibus dicendum est.

## CAPVT X.

### De αἰθροβολία, seu radiatione virtutis plastica, seu formatricis in spermate.



**R**EM difficilem, & plenum alex opus aggredimur, dum totius naturæ nucleum rimamur; est hæc virtus illa plastica, quæ ex semine cuiusvis tum plantæ, tum animalis corpus fabricat: dici vix potest quantum hæc plerorumque Medicorum, Philosophorumque exercuerit ingenia, quam in desperationem multos, in admirationem omnes adegerit. Latet enim in ea diuinus Opifex, qui in imo corporis recessu operatur absque omni instrumento, & sine tumultu, opusque producit admiratione dignum, tanta rerum dissimilium varietate, & elegantia refertum, idque ex rudi, & informi materia, in qua nulla dissimilitudo, nulla varietas, nulla denique partium distinctio sensibus occurrit. Videmus enim in semine, sine vilo tamen vestigio, totam latere arborem cum radice, trunco, ramis, folijs, fructibus: Ex grano hordei procedit radix, culmus, spica, grana: In ouo semine volucris latet volucris cum omnibus, & singulis membris, cum omnibus colorum differentijs. In semine animalium corpus cum vniuersis membris, corde, cerebro, pulmone, hepate, splene, vesica, stomacho, renibus, neruis, venis, tendinibus, musculis, quorum singula certa sua figura, colore, & proprietatibus prædita sunt. Quis porò res adeò varias, & disparatas in homogeneo corpore latenter segregat? quis materiam vniformem nunc in ossa solidat, nunc in liquorem spargit, nunc in mollem carnem protrudit, modo in neruos & cartilagineas extendit? Certè nulla alia, nisi plastica illa virtus, formaque opifex omnipotentis Dei virtute singulis rebus, quæ generatione propagatur, indita. Hæc vnique membro debitum situm, colorem, figuram, proportionem, qualitatem assignat: huius opificio sanè mirifico corpus in tot fistulas, canales, meatus, tubulosque cauatur. Qua ratione hæc faciat, nemo, quod sciam, rectè tradidit. Nos pro modulo ingenij nostri aliquid conabimur. Vt igitur breuiter singula præstringamus; Supponimus hanc plasticam vim se æqualiter diffundere in totam seminis massam, id est esse totam in toto, ac totam in qualibet seminis parte: cuius ratio est, quod ex vno interdum singuli, interdum plures foetus cooriantur, & non minus ex vna aliqua parte, quàm ex toto, foetus integrè perficiatur: & demum, quod nulla partium confusio, nulla perturbatio, nisi rarissimè, cōtingat; quod tamen fieri oporteret, si difformiter se haberet ad subiectum; parte enim seminis decisa, necessariò deperiret portio foetus subiecta illi virtuti, quæ cum seminis portione deficit, & sic confusio figuræ ex partium transpositione introduceretur. Etsi autem semen in ordine ad sensum non habeat partes heterogeneas, in se tamen consideratum habet, cum non sit omnino simplex, sed compositum ex multis: siquidem illa virtutis portio, quæ cerebrum conformauit, nequaquam cor, aut hepar est effectura; & quæ of-

Mira feminis.


Mira vis seminis tota in toto & ex tota in qualibet parte.

fibus

sibus dedit figuram, nequaquam membranas extenderet aut intestinorum spiras conuoluet, vt doctissimè insignis ille ac *πολύτροπος* Doctor Marcus Marci in ingenioso opere Idearum operatricum demonstrat. Difficultas solummodò, qui virtus in tantùm confusa, confusè tamen non agat, sed maximè *εὐτάκτως*, & ordinatè: quod vt explicetur, experimentum prius cap. primo huius allatum hic repetendum est.

Experimentum.

Depingatur in obiecto quopiam Solis radijs exposito figura hominis cum omnibus, & singulis membris. Hoc peractò in obsecrato conclauì, iuxta experimentum huius libri de Photismo Chromatico exhibitum, per minutissimum & punctuale foramen species imaginis hominis paulo ante effigiatà intromittatur in chartam in obsecrata camera expositam; atque experientia discas species imaginis vna cum colore cuiusvis membri intus repræsentari. Si verò chartam foramini applicaueris, tota specierum diffusio conturbabitur, nihilque, nisi circulus lucidus apparebit: quanto verò plus à foramine semoueris tabulam, tantò species imaginis euoluentur amplius, vsque dum naturalem suam perfectionem natà fuerint. Hic certum est radios ex singulis punctis membrorum imaginis per medium radiare & in foramine punctuali inconfusè vniri vbi etiam ad sensum simplex lucis radiati videatur; euoluta tamen aliquantulum, non simplicem speciem, sed infinita quadam varietate colorum insignitam distinctis singulis partibus & sine vlla confusione *ιὺπτάως* distinctis reperies; videbis cum admiratione singula membra in singula corradare, atque vna cum speciebus colores singulorum quoque differre membrorum. Si vlla res in rerum natura incòprehensibilem illam plasticam virtutis simplicè varietatè explicet, hæc sanè explicat. Dico igitur eadem profusatione in spermate contineri plasticam vim, siue formæ cōpificem, sicuti species colorum in aëre. Semen enim ab omnibus, & singulis partibus aphrodisio motu, & *ἀκτινοβολισμῶ* spermatico deciduum in vterum mulieris, ceu locum radiationi prolificæ naturalem profusum; ibi materiam quidem simplex ac homogena secundum sensum inuolutum, naturali tamen vasis calore promouente radiatione sua paulatim incipit euolui; atque per huiusmodi Ideas, & rationes spermaticas, partes incipiunt differre, mox & membra distingui, & à se distare. Sicuti igitur in vno foraminis puncto omnes species visibiles virtute continentur, euolutæ tamen figuram, situm, colores singulorum membrorum distinguunt; ita prorsus se habet plastica in spermate virtus: radij enim alij, quia longiores, & extimam superficiem pertingunt, alij subito ab exortu finiunt, alij superficie sphærica, alij plana, alij aliter terminantur; ex quo omnis varietas in fetum redundat, vt in figura patet. Vbi vides species ex omnibus membris hominis BC, ad singula seminis in A, locum vteri proiecti puncta collectas, conuolutaque à puncto A, in quo in determinatæ sunt, & non nisi potentia & virtute, hinc paulatim calore vteri excitatas, primum in membra principalia, deinde relinquæ membra inæquali & tēpore & motu discriminari. Ordinis autem ratio postulare videtur, nobiliores, & à quibus reliquæ quasi dependent, partes radiatione prius euolui. Itaque videmus cor ante aliorum exortum sanguineis fibris etiam tum manifestè ceu instrumentum vitale, spiritus pulsare: deinde cerebrum, post hoc iecur, deinde pulmo, & stomachus sua paulatim lineamenta ostendunt, cuius rei accipias sequens experimentum.



Experimentum.

## Experimentum mirabile.

Accipe ouum tertio ab incubatu die pertusum, & ea qua parest industria aperitur, sinicroscopio diligenter inspice vitellum, & comparebit in eo manifesta cordis effigies ad instar guttæ sanguinis concretæ viua, & mirifica quadam ratione se agitans fibris cruentis, ex eo vndique tanquam è luce radijs, atque è fonte riuus, deductis; & quamvis statim post triduum appareat vitalis motus cordis, & arteriarum, nihil tamen reliquorum membrorum adhuc comparere reperies, nisi post quatuor alios dies spina dorsalis à cerebro deducta veluti quoddam rudimentum, ac nebulosa substantia comparet. Deinde successiuè reliqua membra iuxta perfectionem cuiusvis, in quibus singula organa operibus congrua sculpuntur, coloresque cuique proprii in singulis pinguntur, sapore, odoreque vnicuique naturæ suæ proprio dotatur, donec in perfectam fabricæ molem excrescant. Quòd si quispiam singulis diebus vnum ex ouis à primo incubitu ruptum obseruaret, is haud dubiè dicta ratione membrorum ordinem, processumque in generatione cuiusvis facillè cognoscere posset; vti & in homine, cum eadem sit ratio membrorum in animali, quæ in homine. Patet igitur ex his specierum euolutionem ad singula membra minimè esse *σὺγχρονον*, siue simultaneam; sed iuxta partium perfectiorem euolutionem, nunc tardius, nunc serius contingere; quæ omnia patent quoque ex specierum coloratarum exhibitione, quam, nisi præcisà à foramine distantia exhibeas; vltra citràque, nihil aliud, nisi specierum rudem effigiationem deprehendes. Quemadmodum etiam species ex centro in orbem radiant singulæ radijs suis inconfusè, ita, & species plastica virtutis ex centro in circumferentiam; non secus ac mens mundani opificis ex centro terræ euoluit vniuersas mundanæ machinæ species in disparatissima membra, in elementa, & globos celestes: primò quidem Solem veluti in cor quoddam, megacosmi cōglobauit: Firmamentum in cerebrum, Saturnum in Iyem mundi, Martem in hepar, in pulmonem Mercurium, in spiritus, & sanguinem Iouem, Venerem in semen cœli, in Hypochondria denique Lunam, omnia in magnum hominem foederè bono effinxit; ita & in paruo homine specierum vnà cum colore sapore, cæterarumque proprietatum euolutione fieri nullum dubium esse debet.

Sola difficultas hinc oritur, si plastica vis euolueret species membrorum in spermate latentes, infallibili proportione, sequeretur omnes homines in delineatione corporum, cæterisque affectionibus similes fore: quod tamen tantùm abest, vt sint, vt ne inter millena millia inueniantur duo per omnia similes. In homine quis non miratur vultuum varietatem, quis incessum, gestuumque discrimina in singulis, cum tanta inclinationum naturalium diuersitate, non obstupescat? Dico igitur; non in solam plasticam vim hanc tantam rerum varietatem conijciendâ esse; sed imaginationes, & affectus, ac versatilis ingenij humani perpetuum motum in parentibus dum se cognoscunt, vigentem, quæ veluti radiatione sua dispositam attingentes materiam, eidem imprimunt eam, quam diximus varietatem; qui vagus animi morus cum in animantibus cesset, mirum non est, adeò similia vt plurimum indiuidua reperiri, vt vix dignosci possint, & non nisi maculis colorum distinguui. Modum autem, quo parentes filijs imprimant rerum vehementer animo agitararum species, fuse diximus in Arte Magnetica cap. de Magnetismo imaginationis, ad quod Lectorem remittimus.

Euolutio partium in homine nō est simultanea.

Analogia membrorum hominis est partibus mundi.

Vultum in hominibus varietas.



## Confectarium.

## De radiatione Imaginationis.

**O**Mnia in mundo mutua corradatione fieri, satis superque imaginationis potestas declarat, cuius radij tantam vim habent, vt hominem in eam rem, quam animo vehementer agit, conuertere videantur. Quid magis ridiculum, quam homines radiantis imaginationis vi illusos eò deuenire, vt alius quidem in testam, vitrumque conuersus, ne collideretur obuijs cessasse; alius gallorum cantu excitatus in eum conuersus, brachiorum agitatione, voceque ridicula, alarum ad hæc succussione concurratum, aliaque Gallis propria æmulatus legatur. Non nemo capite se priuatum putauit. Quosdam in diuersa animalia, vt Lupos, Vrsos, Canes, Cervos ramosis cornibus conspicuos conuersos lege apud Schenchium in obseruationibus Medicis. Vnde verò mira hæc vis? Respondeo causam efficientem esse radiationem phantasie materialem res extrinsecas vehementi imaginatione apprehendentem: formalem, & exemplarem esse humorem melancholicum cellulis cerebri receptum, qui propter dispositionem prauam, & præternaturalem, tenacitatemque immobilis, species extrinsecè apprehensas, mediante phantasia, seu agente principali, vectore spiritu in disposito humore veluti speculo quodam imprimit, quæ deinde reflexæ mouent phantasiam, & ad id determinant, quod ipsæ referunt, non secus ac colorum species per medium radiantes, tunc primum comparant, cum in obscuro loco, seu speculo quodam recollectæ fuerint. Sicuti igitur colores extrinseci, per punctuale verò foramen in obscurum transmissi; non nisi esse intentionale acquirunt; ita & extrinsecæ res per sortem, & vehementem apprehensionem per phantasiam, seu sensorium quoddam in nebulosum, vaporosumque cerebri medium transmissæ, illis reflexis radijs phantasiam ad id mouent, quod referunt. Idem sentiendum est de somniantium speciebus; neque enim vlla differentia inter somniantes, & melancholicos, nisi quòd illis in naturali vaporis speculo dormientibus, his in præternaturali vigilantibus species rerum phantasie ope exhibeantur, qui quidem humor subinde ex stomachi vaporibus, vt in somniantibus, interdum ex hepate, nonnunquam ex hypochondrijs & splene, vt in hypochondriacis, vt & ex fumosis exhalationibus in feminis menstruatis originem trahit; & hunc diximus ad repræsentationes specierum aptissimum esse: qui humor vehmentissimi alicuius obiecti apprehensione, aut ex violenta aliqua animi passione, ac in cerebrum subleuatus, ibi pertinaciter hærens, seu speculo quodam deuectas ad phantasiam (intellectu, rationisque dominio interim spirituum turbulentia, & crassitie ligato) veluti reflexo quodam radio reuerberat. Hoc autem ita se habere experientia docet: nam mutata phantasia cessat infania. Sic ceruinis cornibus, quæ sibi non nemo imaginabatur ex creuisse, quidam Medicus vera ceruina cornua in capite infani resecta, ac deinde ipso spectante, proiecta tantum potuere, vt ab infania statim liberarent hominem. Tali medio liberatus fuit alius quidam, qui proboicidis instar nasum se gerere imaginabatur. Secto enim farcimine oblongo naso infani alligato, quem verum nasum suum arbitrabatur, vnà cum phantasia etiam infania illa euauit. Sic ille, qui capite se priuatum arbitrabatur, pilei plumbei impositione, cuius pondere se caput tandem recuperasse sibi persuadebat, ab infana imaginatione liberatus fuit. Liberantur autem sola apprehensione, hæc, quæ sequitur ratione. Cum enim hi vnà omnes ingenti formidine afficiantur ex rei quam apprehendunt molestia maxima, certum est hunc humorem melancholicum

Vis mirifica imaginationis in qui busdam exemplis visis declaratur.

Causa tam mirabilem efficiunt.

Somniantium & melancholicorum eadem causa.

Cura Melancholicorum.

Ridicula imaginationis cura.

Cura phantasiorum.

cum moerore mentis plurimum augeri, ac proinde tetra hæc cerebri fuligine dissipata hominem ad pristinum statum propediem redire: at hæc fuligo in melancholicis dissipari non potest, nisi ingenti gaudio, cuiusmodi foret, si hoc tam illis abominando obiecto amoto, quod formidant, liberarentur. Si igitur Medicus peritus, singulari industria vanam illam cornuum, verbi gratia, ceruinorum apprehensionem ita fictè amputaret, vt phantasia verè illa amputata crederet; fieret haud dubiè, vt hoc immenso gaudio cor spirituum suppressorum ope dilatatum, spiritusque mæstitudine congelati rarecentes in cerebrum diffusi, humorem illum mollirent, & in raritatem ducerent; raritate introducta vanæ species & vmbra phantastica per illam consequenter dissiparentur, quibus dissipatis pristina tandem serenæ mentis luci proculdubio restituerentur. Rem exemplo declaro. Si quispiam in speculari superficie cornua cerui, caput elephantis, hominem sine capite, aut simile quid diaphanis coloribus, id est, salium vatorum tincturis, de quibus in nostra Magia lucis, & vmbra, depingeret; deinde in loco obscuro Solis radios in dictum speculum immitteret; certum est in oppositam muri partem lucem vnà cum coloribus reflexam ibi figuram, quam in speculo depinxeramus, exhibituram, videbuntur igitur cornua ceruina in muro depicta tandiù, tandiù pictura manserit in speculo. Si verò opacantem speculi materiem abraferis, iam omnis vnà cessabit specierum apparentia. Ita profus in melancholicis affectibus euenire putandum est, in quibus specularem superficiem refert fuligo & vapor densus recipiendis imaginibus aptissimus in cerebri receptaculis collectus, qui si in spiram agatur, hominem mira vertigine agitabit; si spirituum agitatione in vndas fluentes crispetur, ridicula sane, & æuòvera variarum specierum in homine simulacra effinget; si verò glutinosus fuerit & tenax immobilisque tanquam in speculo quodam extrinsecum, obiectum fortè imaginationi eidem impressum ad phantasiam reflectet, quæ tandiù reflexo hoc simulachro, tandiù simul etiam rei conceptæ infania agitabitur; discussa autem nube speculi, vanam quoque conceptæ rei formidinem euanescente necesse est. Sed mirum & hoc alicui videri posset, cur in reliquis sapiens, circa vnum tantum aliquod obiectum deliret melancholicus? Respondeo hoc fieri propter continuam rei ex vapore simulachri immoto in phantasiam reflexionem, non aliter ac si in caroptricis imago rei non nisi sub determinato angulo videatur; infinitis alijs obiectis visibilibus extra radium constitutis visum fugientibus. Vnde verò mira hæc rerum harmonia proueniat, paulò fusiùs explicandum censeo.

Nemo huc vsque Philosophorum fuit, qui humores multum, vt in corpus, ita & in animum posse negauerit, experientiaque rerum magistra clarè docet; sequuntur enim Galeno teste animi mores temperamentum corporis; cum enim simul iuncta sint, adinuicem compati necessum est; in his autem quæ sunt ad aliquid secundum esse, facta mutatione in vno, necesse est, & alterum mutari, vt dicitur 8. Physicor. Nam vt in præcedentibus quoque dictum est, phantasia, & melancholia mentem aberrare faciunt; humor verò melancholico dissipato, mens serenitati restituitur: amores quoque, timores, dolores, siue tristitia, & voluptas, sunt passionibus animæ; secundum animam enim timemus, & amamus tanquam principium; in his autem corpus pati videmus, & immutari; timentes enim pallent, liuidi contabescunt; zelotypi vanis suspicionum vmbis delirant; suspirant amantes; alij alijs passionibus agitantur, quæ subinde tantis inuadunt corpus symptomatis vt nisi opportunè ijs succurratur, in aperta mortis discrimina præcipitentur: Cum enim materia & forma, corpus & anima, vt diximus, sint secundum esse suum correlatiua, vno mutato, & alterum mutari necessum est, quale igitur corpus, talis & anima: ridiculum corpus Simiæ, ridiculam quoque animam fortitum est. Atque hoc est, primum mirificarum, quæ in anima contingunt, operationum fundamentum.

Exemplum declarans vim imaginationis.

Cur quidam circa vnà aliquam rem delirant ceterum sapientes.

Humores multum in animum possunt.

Varij passionibus effectus.

Ridiculum corpus Simiæ, ridiculam animam fortitum est.

Alimentorum  
qualitas multâ  
potest in anima  
ad phantasticos  
motus concitan-  
dos.

Fundamentum  
Magia transme-  
tazoria.

Alterum est alimentorum qualitas, quæ tantum subinde potest, vt hominem prorsus in alium conuertat; ita mansueti in iracundos mutari possunt rebus bilem acuentibus, Vrsorum, Leonum, Tygridum, similibumque præferocium belluarum epoto sanguine, vt Albertus testatur. Latet enim in sanguine dictorum animalium nefcio quis fomes ferociæ, & crudelitatis, qui assumptus ab homine easdem qualitates, eidem imprimit, & in eisdem motus affectionesque stimulat. Contra truculenti, feroces, in mansuetos, rebus, quæ bilem extinguant, pituitam verò augeant, degenerari posse, Galenus docet lib. de Alimento; ita esus agni casti, ac frequens Nenufharis vsus ex luxuriosis efficit continentis; è continentibus verò Satyriorum, Scincorum, salaciumque animalium esitatio Salaces reddit, & sic de cæteris; ita vt omnes phantasticæ operationes originem suam trahere videantur à vaporibus, vapores à praua membrorum lienis, hepatis, cordis, cerebri dispositione; hæc ab alimentorum qualitate; qualitas verò species in vapore cerebri impressas ea qualitate, qua ipsa vnâ cum obiectis representatis est, afficit; quæ denique reflexione sua phantasia, phantasia vltius totam animam alterat.

### Confectarium Primum.

Fundamentum  
omnium.

EX his omnibus clarè patet, qua ratione in infirmis æquè ac infans somnia, fiant, & quomodo quis de constitutione corporum ex ijs diuinari possit. Item qua ratione homo sola illusionè phantasiæ in quamcunque rem vi naturali ab alia, transmutari possit. Verùm quicumque de hac Magia plura desiderat, is legat Oedipi nostri Aegyptiaci tractatum de Magia, & Sacrifitijs veterum Aegyptiorum; vbi multa inaudita de hac materia ex hieroglyphica disciplina producimus.

### Confectarium Secundum.


SEquitur ex his quoque, qua ratione grauidæ fæminæ ratione imaginationis desideratarum rerum signa in foetibus imprimant. Verùm cum de hisce fusè & exactè in Arte nostra Magnetica lib. 3. cap. de Magnetismo imaginationis tractauerimus, eò Lectorem remittimus. Sufficiat igitur hisce paucis omnia ad lucis & vmbre rationem efficta, demonstrasse. Porro elucet maxima hæc imaginationis vis in ipsis quoque animalibus. Certè Gallinas tam forti phantasiæ vi pollentes reperio, vt vel ad folius chordæ aspectum immobiles, & veluti stupore quodam percussæ maneat, Cuius veritatem sequens te docebit experientia.

## Experimentum mirabile.

### De Imaginatione Gallinæ.

GAllinam pedibus vincam in pavementum quodpiam deponere; quæ primò quidem se captiuam sentiens, alarum succussatione rotiusque corporis motu vincula sibi iniecta excutere omnibus modis laborabit; sed irritò tandem conatu, de euasione veluti desperabunda ad quietem se componens, victoris se arbitrio sistet; Quicquid igitur sic manente Gallina, ab oculo eiusdem in ipso pavemento lineam rectam creta, vel alio quouis coloris genere, quæ chordæ figuram referat, duces; deinde eam compedibus solutam relinques; dico quod Gallina quantumuis vinculis soluta, minimè tamen auolatura sit, etiam si eam ad auolandum instimulaueris. Cuius quidem rei ratio alia non est, nisi vehemēs animalis imaginatio, quæ lineam illam

### Aetimobolismus virtutis plasticæ.



illam in pavemento ductam vincula sua, quibus ligatur, apprehendat. Experimentum hoc sæpius non sine astantium admiratione exhibui, non dubito quin idem in alijs animalibus locum habeat. Verùm de his videat Lector curiosior.

## CAPVT XI.

### De radiatione animæ ad extra.

VERVNT hisce vltimis temporibus quidam, qui damnatam olim opinionem de radijs animæ extra corpus transmissis, ab inferis reuocatam, publicis libris in lucem editis defendendam suscipere conati sunt. Opinantur autem animam radios quosdam ex se in res intensè desideratas vibrare, quibus amici, & cognati consimilis naturæ in quavis etiam distantia affecti, magnam sentiant alterationem; ita (aiunt) experientia docet mortem filiorum in remotissimis regionibus constitutorum præsentiri à parentibus; narrantque varias historias, seu potiùs fabulas de egressu animæ extra corpus dormientis; quæ omnia fieri nequaquam posse asserunt sine radiatione animæ in loca distantia. Nos verò hanc opinionem tanquam à Fide Orthodoxa absonam damnamus; neque enim illam præsentionem parentum filijs in magnis calamitatibus, vitæque periculis constitutis, si quandoque contingat, ab anima parentum; sed à Genio bono, vel inspiratione diuina immediatè proficisci, cum omnibus Orthodoxis sentimus; neque astipulamur ijs, qui phantasiam in extrinseca obiecta agere, illa immutare, & quouis modo illa sui iuris facere posse autumant: quæ omnia hoc loco fusius ostenderemur, nisi vtrunque partim in Mundo nostro Magnetico, capitibus de phantasiæ, amoris, & fascino Magnetismis, partim in nostra Theologia Hieroglyphica ex professo, & fusè tractauissemus; Vnde ne tractata tractemus, Lectorem curiosum eò remittimus.

De Sympathicis  
radijs in distâs  
agentibus.

CAPVT XII.

De αἰνολογίᾳ seu radiatione elementorum, & mineralium.



NON loquimur hic de elementarium, seu manifestarum qualitatum radijs, sed de sympathicis, siue specificis ab esse cuiusvis rei emanantibus. Notandum igitur nullam rem in mundo esse, quæ cum aliquo naturaliter non concordet, & cum aliquo alio discordet: similitudo substantiæ parit concordiam, ac vnitatem, dissimilitudo vero discordiam: illa ad conseruationem sui aliud prosequitur tanquam bonum, hæc aliud ceu sibi malum omnibus modis vitat. Cum verò res inmediate suppositi, vt scholæ loquuntur, suum effectum præstare nequeant: prouida natura in necessarijs benigna opitulatrix hæc αἰνολογίᾳ idè instituit, vt substantiæ quæ seipsis in distans agere non possunt, finem suum virium suarum vicaria transmissione attingerent. Hinc omnibus, & singulis rebus, quæ mundi machina continentur, huiusmodi actinobolismus concessus est. Quid aliud est mirifica hæc atmosphæra totius generationis sublunaris basis, nisi radiosa quædam exspiratio in sphaeram, diffusa? quam si videre liceret sub alia, quam ovali non videretur, eò quòd atmosphæra, siue sphaera recta ob exspirationis raritatem à terræ altiori sub obliquissima verò ob densitatem exspirationis vicinior sit. Quid grauium & leuium motus aliud, nisi perennis quædam radiatio, dum exhalationes in altum diffusæ, illinc accensæ versus nos perpetuò radiant? De quibus lege in Arte nostra Meteorologica Magnetica. Quid calor ignis, nisi radiatio ab igneo corpore in adstantes sphaericè diffusus? in mineralibus quis actinobolismus magneticos, eorumque mirificas vires, & proprietates sufficiente eloquio exprimat? de quibus cum integro opere variè, & fusè in Arte nostra Magnetica tractauerimus, superuacaneum esse ratus sum de ijs hoc loco amplioem mentionem facere. Inter metalla & hoc admiratione minimè carentes, eas non radiatione duxat virtutis sphaeras fudare, sed & materialibus suis effluuijs, seu efflorescentijs nescio quid radiosum effingere: ita varlæ vitriolorum, salium, nitrique efflorescentiæ, niuis quoque flocci in quasdam veluti stellulas efformantur, quæ omnia experimentis comprobanda duximus.

Atmosphæra nil aliud est quam exspiratus sphaerica facta.

Leuium & grauium motus.

Experimentum.


EX vrtica in cinerem redacta lixiuium conficias, lixiuium hoc caelo noctu exponas in tantum, donec glaciale cutim contrahat, & videbis, mirum dictu, in ipsa glaciè expressam totam, & perfectam vrticæ figuram, eo fibrarū ductu, foliorumque laciniolorum serratura, quam in veris deprehenderes.

Mirum experimentum.

In cineribus verum omnium semen, & omnium colores.

Si porrò microscopium adhibueris, videbis: cum admiratione totam figuram vrticæ, ex minimis, & quasi infinitis stellulis concreuisse. Idè in quacunq; alia planta vsu euenire crediderim, vt vel hinc appareat in cineribus rerū semè quoddam latere radiatione sua simile speciei affectas. Ita manna, nitrū, vitriolū, alumē microscopio inspectū nihil aliud sunt, quàm stellata diuersissimæ figuræ corpora. Cur autem nix præsertim stellata corpuscula exprimat, varij variè explicari conati sunt. Quidam Democritum secuti omnia in atomos conferunt; nonnulli in plasticam niuis vim: alij desperatione acti rei tam occultæ causam minimè definiri posse censuere. Nos dicimus plasma hoc niuis stellatum, hoc aliunde prouenire quàm à spiritu calido intra niueos floccos cōcentratos, qui dum vndique frigidis corpusculis circundetur, tandem qua data porta ruens corpus niueum terebrando in stellatam seu radiosam effor-

Nix stellata cur?



efformant figuram, quod & manifestè demonstrat multitudo, & varietas radiorū: aliqui enim figurā habent vt in B, alij vt in C, nonnulli vt in D. Non desunt qui figuram quoque habeant qualem in E, posuimus: quæ tanè à plastica virtute niuis minime sunt; cū hæc constantem, & perpetuò determinatam figuram det rebus. Ergo à spiritu calido concentrato intra floccos niueos, illos pro raritate aut cōdenstatione materiæ in figuras nunc alias & alias, omnes tamè stellatas discescentem. Quæ omnia hæc experientia discas, si enim in subtili folio glaciè, cuiusmodi, vt plurimū sub initium hyemis mane super aquas cōcreuisse reperimus, in huiusmodi folij medio ponatur carbo accesus, vel globus ferreus cādēs, mox & videbis calore è cetro diffuso glaciè efformari in crustam stellatam. Idem igitur in molli niue fieri censendum est. Quomodo autem & cristallina, & à luminosa corpora in prismata stellata degenerent, dicetur in Mundo nostro subterraneo.

CAPVT XIII.

De Actinobolismo Sympathico, & Antipathico rerum medicinalium.



NON nulla re actinobolismus rerum naturalium ita elucet, ac in rebus medicinalibus: est enim hic duplex, vel ad vitam, vel ad interitum tendens. Quod vt intelligas; Notandum est: Sicuti propter hominem omnia creata sunt, ita etiam singulis particulares vires, quibus hominem conseruare possint, concessas esse: qui enim intendit finem, intendit etiam media ad eundem consequendum, quales sunt virtutes rerum naturalium. Cum igitur nullum in corpore humano membrum sit, quod non suas infirmitates patiat, benignissimus Conditor singulis de opportunis remedijs prospexit. Cum etiam membra in imo corporis recessu herbis, plantisque inaccessa conderentur, ijs virtutes quasdam ad exemplar lucis radios in orbem spargentis, quæ totum corpus permeantes membrum proportionem sibi correspondens actinobolismo penetrarent, concreare voluit. Hinc fit, vt medicamenta virtutis suæ radijs explicatis illud membrum, quod illi proportionem quadam naturæ correspondet roborent, confortētque. Ita Cardiaca omnia, actinobolismo non hepar, non cerebrum, non splenem, sed cor petunt; hepatica non cor, non renes, pulmonem, sed hepar actinobolismo confortant; Sic diuretica non cor, hepar, cerebrum, sed renes & venas emulgentes, vesicæq; appetunt. Ita actinobolismus diaphoreticorum bilem toto corpore latentem, cogit in viscera, hinc ceu noxium fecernit.

Secretarij medicina fundamentum.

Confectarium.


Hinc patet qua ratione composita medicamenta diuersis qualitibus imbuta in corpus æqualiter, nullo impediēte alterum, non secus ac diuersæ lucis radij inconfusè agant. Cum enim singulæ specierum ingredientium virtutes specificæ peregrinitibus primis qualitibus in composito maneant, fit, vt huiusmodi susceptis intra stomachum medicinis tanquam in loco naturali, singulæ species sine vlla mistura, & confusione radiorum, quemadmodum de lucis radijs ostendimus; singulæ in membra proportionem quadam naturali sibi correspondentia corradient, eaque hoc actinobolismo effecta mirificè confortent; hinc omnibus membris con-

Compositorum medicamentorum vir.

fortatis, & calorem naturalem venam vitæ confortari necesse est, qui quantum præualebit, tantum morbifica vis magis magisque deficiet, adeo vt in medicina tot diuersa virtutis centra imaginari possimus, quot species sunt quæ eam ingrediuntur; & si multa quidem cordiaca omnia in vnum cor confortandum radiabunt, pulmonaria species in vnum pulmonem, hepaticæ in vnum hepar conseruandum radiabunt; & sic congestis veluti virtutibus totus homo confortatus, mortiferæ qualitatis vt præualeat necesse est. Antipathicus verò rerum actinobolismus deletioris, siue venenosorum ita contingit: quarundam rerum venenum mox vbi in stomachum pertienerit, actinobolismo suo confestim cor tanquam primariam arcem sibi expugnandam aggreditur: ita venena mineralia, Arsenicum, Ochra, Auripigmentum, venenum morsu serpētis inditum radiatione sanguinis vicinū subtercutaneū inficit, hoc radiatione sua pestifera sepe vicinū & vicinū sanguinē, donec ad vitalia ad resperit, vbi nisi antactinobolismo reprimatur, vltimum tandem homini exitium machinatur. Habent etiam singula membra sua venena; Quædam enim assumpta non cor immediatè, sed pulmonem petunt, vt pulmo marinus deuoratus, ex quo vlcerato, corruptoque pulmonē hominem lenra tabe perire necesse est. Apium Sardonicum vti & Tarantulæ, morsus veneni sui radiatione spirituum officinas, arterias, & musculos inuadens in risum, & saltus vertit hominem. Dypsalidis morsus simul ac radiare incēperit, hepar in putredinem ducit. Venenum canis rabidi radiatione sua in caninos mores efformat, hinc perpetuò latrat, mordet, aquamque timet. Cerebrum Felis cæstro peciti felinos mores conciliat. Schenkiius narrat de puella, quæ ex esu cerebri Felis, ita transmutata fuit, vt felium gestus omnes imitaretur, vocem exactè exprimeret, mures digitis in morem unguium fulcatis infectaretur. Venenum Aspidis nervis inimicum radiatione sua hominem stupore omnibus membris inducto fiderat. Ira Actinobolismus rousius Mercurij sublimati omnium vitalium terebratione hominem tandem conficit. Vides igitur diuersa membra, partesque diuersa venena habere, quæ omnia in dicta membra non substantia propria, sed virtutis radiantis diffusionem agunt: cui tamē venenosa radiationi occurrere nō possunt, nisi contrariæ ipsi substantiæ radiofa qualitate, quibus venenosa qualitas obtuditur, atque nō secus ac vmbra, tenebrarūq; radiatio lucis radiatione destruitur. Sed de hisce vide fufius tractantē Mundū Magneticū cap. de Magnetismo venenorum. Atque ex his omnibus breuiter adductis luculenter patet nihil in rerum natura esse; quod non radiofa quadam virtute ob certos & ab Authore naturæ in hominis institutos fines præditum sit, hancque radiationem ad exemplar lucis in omnibus constitutam; adeo vt sagax Lector vti ex magnetismis, ita & rerum naturalium actinobolismis, quibus indiuiduis veluti duabus naturæ alis faciliè in altissima rerum naturalium penetralia pertingere possit. Sed iam hisce relictis ad alia calamum conuertamus.

Quis sit Actinobolismus Antipathicus?

Mira vis venenorum.



PARS

# PARS SECUNDA DE ACTINOBOLISMO OPTICO.

Seu

## DE RADIATIONE VISUALI, QUAE TOTIVS OPTICÆ DISCIPLINÆ RADIX ET FVNDAMENTVM EST.

### P R A E F A T I O.



*V*M in præcedentibus de lucis, vmbra, aliarumque rerum radiofa actione vires suas in distans propagantium actinobolismis satis superque dixerimus, nil restat, nisi, vt de Actinobolismo optico aliquid dicamus. Etsi non ignorem, innumeros penè Auctores de hoc Lippis penè & Tonforibus nota arte volumina integra tradidisse, atque adeo meritò, me de temporis in arte tradenda omnium notissima, perditione insimulare me possint eruditores. Veruntamen obmurmurare desinent, vbi nostrum in hisce tradendis scopum, propositumque finem rectè intellexerint. Non enim hic opticam tradere intendimus, sed tantum illa, quæ radiosam rerum projectionem concernunt, artem, illamque non præcisè per se, sed in ordine ad Magiam nostram lucis & vmbra, in qua hisce veluti fundamentis quibusdam vtentes exotics rerum effectus producemus. Relictis igitur ijs, quæ communiter tradi solent ab opticis, ea quæ instituti nostri propria sunt, videlicet actinoboliam opticam prosequemur.

### DEFINITIONES.

- I. **A**ctinobolia optica, siue radiatio visiva, nihil aliud est, quam simulacrorum, specierumque obiectarum ad visivæ potentia organum sub forma conij, aut pyramidis appulsus.
- II. Radius *opticus* est radius visivus rectè in obiectum tendens, idque normaliter secans: vocatur etiam subinde axis conij radiosi recti.

III. Ra-

- III. Radius *ἀνοπίσιος*, est radius visivus sursum vergens, qualis est dum altitudinem montium, turrium, &c. intuemur.
- IV. Radius *καταπίσιος* radius est priori oppositus, quo ex alto obiecta deflectamus.
- V. Radius *λοξοπίσιος* radius visivus est oblique, seu lateraliter in obiecta incidens.
- VI. Pyramis, vel conus opticus, est figura solida, quam radiatio visiva ab obiecto in organum producta effigiat, cuius basis res visa, vertex ipsum organum oculi est.
- VII. Sectio pyramidis vocatur interpositio corporis alicuius intermedij diaphani, inter oculum, & obiectum, siue inter verticem, & basim, qua conus, seu pyramis visiva secatur.
- VIII. Planum verò mesophanum vocatur illud diaphanum inter oculum, & rem visam interpositum planum, in quo fit sectio.
- IX. Sectio *ὀρθογωνία* est quando sectio ad axim est isogona, siue quando axis visivæ pyramidis ad angulos rectos secatur in plano mesophano.
- X. Sectio *λοξογωνία* est, quando sectio ad axim est obliquangula, seu quando axis plano mesophano ad acutos, vel obtusos angulos secatur.
- XI. Obiectum *ὀρθόγωνον* est basis pyramidis ad axem recta.
- XII. Obiectum *λοξόγωνον* est basis pyramidis obliqua, siue in plano obliquo fundata.
- XIII. Obiectum *ἀνώγειον* est basis pyramidis radiosæ in altioris loci plano effigiata.
- XIV. Obiectum *κατώγειον* prorsus contrarium præcedenti, basin in pavimento aliquo fundat.

## HYPOTHESES.


- I. Visio distincta non nisi sub angulo acuto perficitur; figura verò radijs visualibus comprehensa conus est, seu pyramis, cuius summitas in oculis, basisque extremo rei visæ innititur, unde illæ res propriè videntur, quarum species irradiant in oculum. Euclid. I. I. Opt.
- II. Maiora sub maiori, sub minori minora, sub æquali angulo, æqualia comparant. Eucl. & Persp. communis. Vnde propinqua quoque, sub maiori, remota sub minori angulo videntur: templorumque pavimenta ingredientibus fastigiata apparent; planorumque sub oculo iacentium remotiores à visu partes in altum efferri videntur, ac proinde horizon etiam editiori loco, quam reuera sit, dextris lineis in sinistram, & sinistris contra inclinantibus spectatur.
- III. Planorum verò, quæ supra visum incumbunt, remotiores partes ad ima perlabi videntur.
- IV. Æqualium magnitudinum, quæ sub visum erectæ consistunt, remotiores, altius euectæ apparent: contra quæ supra visum propendunt, remotiores propinquorum comparatione depressæ videntur.
- V. Lineæ parallelæ in plano in infinitum productæ, in puncto lineæ horizontalis, quod punctum primarium, siue principale ab opticis dicitur, tandem concurrere videntur.

## CAPVT I.

### De Oculi structura, & visione.



CVLVM secundum totam suam substantiam minimè sphæricum esse experimentum anatomie oculi animalium, & hominis, à peritissimis Chirurgis factæ docuit; sed hanc figuram, quam hic appictam vides, intuere, vbi ABCB, pellis duriuscula, & in formam vasis omnia reliqua interiora continentis efficta est: DEF verò alia pellis est interior, subtiliorque extensa intradictam priorem: ZH, nervus opticus est compositus ex innumeris filamentis extensis, inde propagatur in reliquum ambitum GHI. Vbi infinitis venulis, arterijsque mixta certum quoddam genus componitur molliusculæ carnis & oppidò teneræ tertiæ pellis vices sustinentes. KLM, tres humorum diaphanorum species




sunt, totum spacium intra pelles contentum replentes, eius figuræ, cuius hic apparent, iuxta densitatem, aut raritatem species refringentes; medius humor crystallino, reliqui aquæ assimilantur: prior pellis inæquali gaudet ambitu, vtpotè ex parte superiori ambitus eminentioris: Pellis EF interior superficies, qua fundum oculi spectat, tota nigra est, & obscura, foramenque habet rotundum EF, quod motu voluntario per musculos, & minimos quosdam tendones, & filamenta BN, originem suam à secunda pelle ducentia nunc stringi, nunc dilatari potest. Porro in hac mirifica fabrica manifestè videtur crystallinum humorem non circularem, sed lenticularem esse à natura ad res exactè representandas institutum. Per huiusmodi igitur hu-

mores species rerum externarum transmissæ adimæ sentienti obijciuntur, sitque visio eadem prorsus ratione, qua supra species rerum coloratarum per pupillam, lenticularem in locum obscurum immisæ, chartaque alba exceptæ, in fundo scilicet oculi exhiberi vidimus; ita vt cubiculum, in quo species exhibentur, referat oculi interiorem statum, foramen pupillam, vitrum lenticulare crystalloidem, reliquosque adiacentes humores: charta verò excipiendis speculis destinata fundum oculi. Sicuti igitur per foramen & pupillam lenticularem in obscuro conclavi in charta exhibentur omnes rerum externarum species vnà cum coloribus, & symmetrijs suis; ita radiatione rerum obiectarum in potentiam visivam agente in fundo veluti charta per foramen FF, omnes rerum visarum species prius, quam à phantasia apprehendantur, delineantur cum coloribus, & symmetria vniuersa. Quod nunquam credidissimè, nisi experimentum à sagacissimo quodam optico Anonimo prius, deinde idem quoque per me metipsum factum de hoc certior fecisset.

*Mira oculi fabrica.*



## I. Experimentum Opticum.



**A**ccipe oculum tauri, aut alterius cuiusdam animalis grandioris, vel etiam hominis, si alicuius anatomia instituendæ occasio fuerit. Hunc oculum lotum ab inferiori parte tunica crassiore, resecis identidem partibus crassioribus, eo usque denudabis, donec humor, perlucere incipiat. Hoc peracto oculum foramini cuidam ita imponito, ut pars exterior, illuminata rectâ forinsecus vergat; obscuroque loco, mirum dictu, quælibet obiecta actinobola, siue rerum obiectarum species per cristallinos humores oculum penetrantia in fundo oculi species suas vnâ cum coloribus, & signis proprijs, naturalibusque ita exactè intus constitutis exhibebunt, ut penicillo depicta videantur, inuersa tamen ratione; adeo ut demonstratio specierum in obscuro loco per vitream pupillam representatarum cum speciebus in fundo oculi per humores intermedios representatis prorsus eadem sit.


## II. Experimentum nouum, &amp; mirum obiecta quælibet in tenebris exhibens.

**I**osephus Bonacursius, nobilitate iuxta ac vitæ probitate doctrinæque fama celeberrimus vir, cum mecum non ita pridem de lucis natura, reconditoribusque effectibus differeret, inter alias obseruationes & hanc protulit: fieri nimirum posse, ut quispiam in tenebris obiecta non secus ac media in luce constitutus videret. Quæ res primò paradoxo instar habita est: at postquam rationes adduxit suæ assertionis, statim apparuit minimè fallax esse, quod tam probabili fundamento niteretur. Ingens igitur in animo experiendi negotij exarsit desiderium: præsertim, cum præcedentis experimenti considerationem mirum quantum assertæ propositioni fauere viderem; præterea in memetipso haud infrequenter compererim, noctu subinde è somno excitato omnia cubiculi obiecta ita clarè & distinctè, ac si candela illuminarentur, representata fuisse.

Hoc igitur bono occurfu eruditissimi Bonacursij animatus, experimentum aggressus veritatem rei non tantum comperi, sed & multa ex hoc vnico experimento concludi posse reperi, quæ & ingens lumen Opticæ facultati, & insolubilium quæstionum enodationem sint præstitura. Experimentum igitur, curiose Lector, hac industria auspicator. In loco quodam, qui perfectissimè claudi possit, ita ut nulla ex parte aliquid lucis affulgeat, relinque fenestram chartaceam, in qua imaginem quaslibet, seu potius vmbas rerum depinges. Sit autem fenestra ita Soli in-

uerfa,

uerfa, ut à Sole illuminari possit. Hoc peracto fixis oculis chartaceam fenestram intueri aliquandiu, donec fundus oculi imaginem eius perfectè imbiberit; deinde clausa fenestra in tenebroso loco pone ob oculos chartam candidam; & ecce mirum dictu, in ipsa charta primo intueberis veluti auroram quandam confluentem croceo primo, deinde rubro, mox puniceo, omni denique (quæ in iride) colorum genere depictum orbem intueberis, & postea tandem figuram fenestræ inuersam, quæ tandem in cæruleum colorem pulcherrimum, rubro intento mistum degenerabit. Imago verò, quæ primo in lucido circulo nigra, modo flaua, subinde recta, & nonnunquam inuersa comparebit. Quæ simulacra tandem in vmbam densissimam vergent, & sic spiritibus consumptis, speciebusque euanescentibus, imago origini suæ, id est tenebris reddita, oculos subterfugiet: atque hoc est experimentum, quod omnes curiosos naturæ indagatores obseruare velim. Porro, quomodo species rerum in oculo mancant, & quomodo varietas illarum colorum causetur, restat inquirendum. Ad primum respondeo, species lucis colorumque, uti & imaginum, eadem prorsus sese ratione habere ad oculum, sicuti se habet lux ad lapidem phosphorum, quem lib. I. cap. descripsimus. Hic enim Soli expositus lucem imbitâ in tenebris sub forma carbonum succensorum perfectè ostendit; cuius rei rationes vide citato loco allatas. Ita dico euenire in oculo, qui imbitas cæterarum imaginum luce illustratarum species, cum eas aliquantulum ob humores oculo connaturales & pellustres, retineat; fit ut in tenebris lux recepta eas in tenebris quoque exhibeat. Neque quisquam hic nobis obijciat, hosce colores tantum phantasticos esse: hoc enim falsum ostendit inuersa specierum forma.



Cur autem forma rerum inuersa videatur, sequenti demonstratione explicandum duximus. Sit igitur oculus CD, fundus oculi E, obiectum Sole illustratum AB. Crux videlicet in lucida fenestra depicta: pupilla oculi GH. Centrum eiusdem pupillæ I. Si quis igitur obiectum Sole illustratum, irretortis oculis aliquantulum inspexerit; species ab obiecto profusæ, & per lineas AT, BS, in fundo oculi lapsæ ibidem obiectum iuxta præcedens experimentum depingent; quod obiectum iuxta propof. 4. par. 2. necessariò in fundo ST, inuersum erit. Cum enim pupilla ob vehementis obiecti lucidi inspectionem contrahatur in minimum circellum, fit ut lineæ in I, sese interfecantes, inuersas quoque extrinsecarum rerum species exhibeant. In tenebris verò cum pupilla paulatim dilatetur, verbi gratia in GH; inde fit ut species ex fundo oculi reuerberatæ per pupillam GH, & lineas SGM, THN, sine vlla sectione facta rem representent in charta, prout in fundo oculi apparet. Sed ostendimus in præcedenti experimento, species in eo omnes inuersas esse, ergo & in charta, MN, ut figura clarè ostendit. Inuersæ igitur in charta apparebunt. Solet tamen subinde contingere, ut etiam rectè compareant in charta: quod tunc fit, cum pupilla voluntario motu stringitur & coarctatur: tunc enim ob intersectionem linearum species deuehentium in charta recta quoque comparebit. Diuersitas verò colorum contingit iuxta gradus in præcedente libro declaratos: primo enim croceus color occurret, qui fit ob lucis oculo impressæ copiam; qua per gradus quosdam deficiente, color quoque ex croceo in rubrum, ex rubro in puniceum, ex hoc in cæruleum, & tandem in tenebras vergens, vnâ cum luce speciebusque euanescet.

Atque hanc genuinam viuacissimamque oculi Ideam perfectissimè refert artif-

ciosa specierum visibilium per vnicum vitrum conuexum in locum obscurum intromisso, atque in obiecta charta representatio multò iucundissima; adeò vt specierum memoratarum per vnam lentem conuexam immisso, nihil aliud sit quam oculi in iisdem potentia visuæ representandis artificiosa imitatio. Et sicut in naturali rerum, oculo obiectarum perceptione plurimæ interueniunt varietates, ita & in earundem transmissione artificiali. Oculus enim simul & semel immotus consistens orthodromo radio omnia in obiecto recò à opposito clariùs distinctius quæ ea quæ ad latera secedunt; idem in lente fit, per quam species in chartam transmissæ quo viciniore eò distinctiores sūt, eoq; obtusiores quo remotiores ab eadē. Quia tam in lente quam in humore crystallino, per axem & iuxta eum illapstæ species vix aliquid refractionis patiuntur, vnde & exactè pinguntur, qualis autem est specierum in oculo pictura, talis etiam sequitur visio clara & clara, hebes habetem.

Iterum sicuti oculus immotus, & inuariatus obiecta inæqualiter à se distita, inæquali visione percipit, alia clarè & distinctè, alia obscurè & confusè ita & lens conuexa immota, in chartam immotam projicit rerum extra positarum species effectum planè diuerso. Ratio vtriusq; est, quod obiecta vicina distinctam projiciant specierum basim, quæ visibilia ordinatè præsentet, à lente aut humore crystallino longius, remota autem breuius: igitur cum in tubo basim illam excipiat charta, in oculo fundus Retinæ, fieri non potest vt simul & semel, vel charta, vel retina tunica excipiat vtramque basim & viciniorem & remotiorem. Rursus sicut obiectum in distantia tandem aliqua remotissima ab oculo quocunque penitus non discernatur, ita in specierum per lentem intromissione datur tandem aliquis tantus recessus, vt species in charta penitus euanescat; datur tantus accessus, vt nunquam discernatur; Ratio quia basis communis, in qua species benè ordinatæ representantur, cadit extra retinam in oculo, extra chartam tubo vel lenti obtensam & ab obiectis longinquis cis, à nimis vicinis trans eandem.

Ex quibus patet 1. quam specierum per lentem conuexam intromisso, in omnibus naturale oculi organum imitando graphicè exprimat. Cuius ratio à priorè vnica ferè & potissima est specierum per humorem crystallinum & lentem similis & proportionata refractione. Hæc enim radios alioquin temerè diffluxuros frangendo in ordinem cogit, & ita in vnam basim disponit, vt obiectis picta imago venustissima resultet. In hoc vno aliqua difformitas reperitur, quod charta lenti prætenfa sit planà, oculi tunica retina sit concaua. Si quis igitur globum, quemadmodum noster Scheinerus dicit expertum esse Serenissimū Archiducem Austriae Maximilianum, ingentem conficeret, eumque ingressus species rerum extrinsecas intus in concauo per lentem conuexam colligeret, is certè reperiret species iuxta exemplar oculi; multò distinctius, ordinatius, & ampliore spatio videri, quam in superficie plana exhibitæ. Vnde patet quoque, quam Deus naturæ oculi benignè prouiderit, qui specierum picturam non in planam, sed concauam tunicam ordinari voluerit, vt hæc ratione visui magis consulere.

Patet 2. decussationem radiorum in ipso oculo fieri, antequam imago obiecti in retina effigietur; quæ omnia pulchrè figura ostendit; cuius & hoc experimentum sumere poteris; si abrafâ in fundo oculi schlerode, immisissum candelæ lumen per purpillam immiseris; nam id radijs decussatis iuxta proposit. 8. præcedentis libri, in tunicam retinam necessariorò incidere deprehendes; vnde & in fundo oculi specierum inuersio resultat.

Patet 3. quod Miopes siue illi qui visu breui vtuntur, rem sibi semper vicinâ sistant, necessariaq; illis sit lens caua ad bene videndum. Cum enim ipsi gestent humorem crystallinum è parua sphaeræ segmentis conglobatum, quorum natura est, radios acceptos refractione intra breue spatium cogere, inde fit, vt imaginem distinctam quidem & accuratissimam semper pingant, at quæ formale visus sensorium

Constat arrium.

Lens conuexa imitatur organum oculi.

Qui sint Miopes?

rium, tunicam videlicet retinam, sâpissimè non assequatur, sed intra humorem vitreum absoluitur, quo fit vt oculus obiectam rem vel omnino non, vel valdè confusè percipiat, quia basis seu sectio coni radiofi communis, non qua species in picturam communem concurrunt, vel omninò tunicam retinam non attingit, vel confusis iam inter se radijs assequitur; oculus autem nil sentit nisi quod à speciebus visibilibus offertur, & eo modo prout offertur. Si clara clarè, si distincta distinctè, si confusa offeruntur, confusa videt. In Miopibus igitur cum obiecta remota per se radios citius in basim communem colligant, quam vicina, remota admodum caliginosè; quia illa species suas in basim longinquirè configurant, hæc in viciniorè: & sic illa tunicam retinam assequitur, hæc vitreo in medio suffocantur. Quia igitur lens caua hanc proprietatem habet, vt radios refractione dilaret, & per hoc vna cum lente conuexa species versus retinam producat, accidit vt Miopes adscito tali specillo egregiè quidem ad remota benè videnda iuuentur: Sed tamen sub magnitudine apparenti minore, quia anguli ad decussationem minores efficiuntur. In Presbytis verò, siue qui remotè res intuentur, contrario modo procedunt.

Patet igitur 4. oculum lentè conuexa præmunitum nihil aliud esse quam tubum partim naturalem, partim artificiosum è lentibus duabus conuexis adornatum, humore videlicet crystallino & conuexo specillo; Tubo verò adhibito enim specillo conuexo, omnia & maiora & distinctiora videbuntur. Experientia clara & omnibus obuia & ad presbytas iuandos vtilissimè adiuuenta, qui cum habeant humorem crystallinum valdè latum, & ex maioris sphaeræ segmentis compactum, fit vt obiecta præsertim vicina speciem seu picturam visibilem vltra formale visus instrumentum, quod est tunica retina, transmittant, & sic videndi potentiam eludant; quam tamen voti compotem efficit suo aduentu lens conuexa, hæc enim speciem illam liberius vagantem reuocat, atq; inter præscriptos termines coërcet. Vide de hisce plura in Magia nostra Catoptrica.

Patet denique oculum lente conuexa præmunitum, nihil aliud esse quam tubum partim naturalem, partim artificiosum è duobus lentibus conuexis adornatum, humore videlicet crystallino & conuexo specillo. Tubum verò duabus conuexis lentibus instructum esse veluti oculum merè artificialem inanimum.

Huiusmodi igitur experimenta, qua natura prius in fundo retinæ mirificè pingit rerum extrinsecarum species, non secus ac in obscuri cubiculi parietibus, sane multarū mihi speculationū ansam præbètia ad innumera in Philosophia naturalire còdita mysteria & Sacra natura portâ aperuit ita vt iam horū experimentorū ope visum cuiusuis animalis ex ipso fundo oculi, dignoscere me posse confidam; fascini quoque naturam, infantiumque in vtero materno notarum causas quasdam propinquiores luminis animalium concreati rationes, aliaque complura; quæ omnia, cum non huius instituti sint, alibi tractanda reseruauimus.

In actum igitur visionis duplex concurrat pyramis: prior extrinseca, quæ basi ipsius obiecti innitens, & intrinseca inuersa basim in fundo oculi constituens: prior species rerum obiectarum potentia visuæ sistit, hæc magis domesticas, & intrinsecas sibi faciens in fundo oculi, iuxta neruum opticum constituit, vt ijs vicinis anima per spiritus visuos excitatis ad perfectam sensationem, visionemque efficiendam vteretur; qualis autem est basis exterioris, talis est interioris pyramidis: cuius coloris obiectum extrinsecum, huius est intrinsecum; ea prorsus ratione, quia de specierum in obscura representatione in præcedentibus docuimus, comparet. Quibus quidem ita constitutis, aliquas hoc loco propositiones actinoboliam opticam concernentes, quibus tanquam in epitome quadam totius opticae naturæ, & affectio contineatur, præmittere visum fuit, vt in tanta rerum dicendarum multitudine innumera paucissimis, confusa & *diuina* clarissimè digestis rationibus comprehenderemus. Sit igitur


Pyramis visibilis.

Propositio I.

*Omnes lineæ directæ, quæ in planis directis & horizontalibus, ipsæque in directos parietes inclinantur, atque in plano parallele sunt: omnes, inquam ad punctum plani mesoptici primarium contendunt, ex quo quidem omnis projectio originem suam trahit.*

**S**icuti lineæ terræ, ita & cæteræ directæ lineæ, quæ radio primario parallelis interuallis assistunt in immensum productæ, cum ipso tandem principali radio, cum inter se parallelæ, omnesque ab aspectu in directum abeant, necesse est illarum intercapedines secundum aspectum paulatim minui, ac ipsas proinde, quæ in directum porriguntur lineas sensim adduci. Cum verò principalis ipse radius ex oculo emicat, ad ipsum cæteræ omnes lineæ, veluti à circumferentia ad circuli centrum radij confluere videbuntur, per hypothèses 4. & 5. & inferiores quidem asurgere, atque in altum efferri; superiores autem tanquam ex editiori loco in subiectum principalem radium dilabi; quæ denique à dextris in sinistram, & quæ à sinistris in dextram, non nihil declinare, sequæ omnes ad principalem radium, qui medium locum tenet, pari inclinatione adiungente; donec cum illo omnes secundum aspectum conueniant, at principalis radius in solitarium planum mesoptici punctum incidit, quod primarium supra nominauimus. Verum cum hoc totius optiæ vnicum fundamentum sit, & omnia in sequentibus huic subsistant, fusiore ea demonstratione enodanda duxi.

Demonstratio.




Oculus sit in A, planum mesopticum HBE, lineæ directæ oculo obiectæ BD, EG, infinite productæ, planum verò mesopticum ad vtrunque BD, & EG, recta sit, in eaque primarium punctum K, dico directarum linearum BD, EG, projecturas ab extremis punctis B, & E, prodeuntes in puncto primario K, sibi mutuo concurrere, quæ omnia membratim demonstrabimus.

Fiant BD, & EG, æquales, erunt ergo DX, & DG, ipsis BI, & BE, æquales, & parallelæ per 31. 1. Euclid. quare per DG. extendi poterit planum mesopticum BHE, parallelum, hoc verò & tabula cum secetur radiosa superficie DAG, erunt communes sectiones DG, & RS, parallelæ per 16. 11. Euclid. Quare ob similitudinem

dinem triangulorum DAX, & RAE, est vt DA, ad AR, ita DX, ad Re. Est autem AD, quàm AR, maior; ergo & DX, hoc est BI, eadem Re, maior erit; ideoque lineæ BR, & Ie, productæ aliquando conuenient, nempe in K, quod ita ostenditur denuò. Quoniam enim BI, & Re, ipsi DX, ideoque & inter se sunt parallelæ per 9. 11. Euclid. erit ob triangulorum BKL, & RKe, similitudinem vt BK, ad KR, ita BI, ad Re: cumque sit DX, ipsi BI, æqualis, eandem proportionem habebit DX, ad Re, quam BI, ad Re, per 7. 11. Euclid. Vt verò DX, ad Re, ita est DA, ad AR, & diuidendo vt DR, ad RA, ita BR, ad RK, estq. prior angulus ARK, angulo DRB, æqualis per 15. 1. Euclid. ergo per 6. 6. æquiangula sunt triangu- angulusque KAR, angulo BDR, æqualis, ideoque AK, parallela est ipsi BD, per 28. 1. Euclid. Erit ergò AK, radius principalis, & K, vbi BR, & Ie, conueniunt, punctum primarium. ES, quoque in idem punctum cadere ita demonstro. Quoniam enim vt DA, ad AR, ita BK, ad KR, & vt DA, ad AR, ita GD, hoc est BE, ad RS, erit etiam vt BK, ad KR, ita BE, ad RS: ES, igitur in K, incidet, quod erat demonstrandum.

Hanc propositionem nobis natura ob oculos proposuit in instrumento, quod hic proponendum duxi.

Fiat primò quadratum ligneum sicut hoc præfens A, M, B, S, S, cuiuscunque magnitudinis, quod insigatur cuidam tabulæ oblongæ, siue parallelogammo MBKL, ad angulos rectos in MB, quæ tabula longa in quocunque quadrata diuidatur sicuti figura docet; habeat autem tigillum CN, eiusdem cum quadrato ligneo altitudinis, qualibet à quadrato directo distantia, refertq. C locum oculi puncti principalis; quadratum ligneum planum mesopticum; K, punctum primarium. His ita preparatis



applicato oculo ad punctum C, respice in KL, & iuxta visum trahatur filum transversum PQ, ita vt filum, & linea KL, in eodem plano sint. Pari ratione iuxta radios in HI tendentes trahatur filum RS, in fenestella AB, & iuxta radios ex C comprehendentes lineam FG, trahatur filum TV, in fenestella AB, & sic inde tot lineas transversas duces, quot in plano radijs visualibus comprehenderis quadrata; eritque MB, sectio communis projectarum linearum in fenestella AB; & linearum ductarum in tabula horizontali; ab hoc deinde semper deuenient minores & minores, vsque dū in O, puncto primario coeant. Vides igitur, parallelas MK, & BL, plani horizontalis lineas in fenestellæ puncto O, seu puncto primario, lineæ horizontalis, oculo C in eadem scilicet horizontali linea constituto tandem coituras, vt proinde nihil excellentius naturæ operationem, ac hoc instrumentum in videndo demonstret, vt pote in qua tota scenographica, & optici radij proprietates explicatur.

Colliges primò ex hisce radijs visualibus in infinitum productis prisma quoddam opticum confici MOBZKL, cuius terminus est linea horizontalis, eiusque medietas pyramis visualis. Eritque quadratum MBSE, in fenestella MX Y B opti-



ca proiectura, proiectura quoque reliquorum quadratorum SG, FI, HL, responde-  
bunt quadratis in fenestella optice proiectis XV, TS, RQ


Colliges secundò ex hoc instrumento, quomodo fiat, vt omnes directę lineę  
tandem in O, punctum principale, quod semper sicuti, & oculus in linea hori-  
zontali constitui debet, comprehendantur.

Colliges tertio, quomodo ex hisce radijs visualibus in infinitum productis, pris-  
ma quoddam opticum construatur, veluti hoc OMBZKL, cuius terminus sit linea  
OZ, horizontalis; & quomodo item huiusmodi prismatis medietas sit semper py-  
ramis visualis, secans prisma bifariam: que omnia hic fusiùs & geometricę, & me-  
chanicę tradere voluimus, vt in hac vnica propositione quicquid in tota optica fu-  
se, & sparsim tractatur, hic ἀνακεφαλαιωτικώς collectum habeas, vbi tamen se-  
quentibus breuissimis propositionibus rem melius dilucidiusque proposuerimus.

### Propositio II.

*Obiectum ὀρθόφανον radians in oculum, in plano mesoptico seu inter-  
posito diaphano, quod obiecto parallelum sit, causat sectio-  
nem pyramidis, minorem quidem obiecto,  
at per omnia similem.*

*Obiectum ὀρθόφανον.* Sit obiectum ὀρθόφανον ABC triangulum Isoleces; intermedium diaphanum  
DEF, oculus G, dico sectionem DEF triangularem minorem quidem sem-



per, sed triangulo BCA, similem; proiectis enim radijs GDA, & GEC, GFB, quo-  
niam latera trianguli ABC, trianguli DEF, lateribus sunt homologa, & sectio basi  
parallela, erunt consequenter per 16. 11. & 2. 6. Euclid. figurę similes, & propor-  
tionata, latera quidem lateribus, radij radijs. Obiectum igitur, &c. quidem.

### Propositio III.

*Si obiectum, vel sectio alterutrum fuerit loxotomum, figura sectio-  
nis in plano mesoptico, semper erit figurę basis,  
seu obiecto dissimilis.*


*Obiectum λοξοτόμων.* Sit pyramis visibilis præcedentis figurę GABC, sectio DEF, basis BCA loxo-  
clita, siue abscedat à parallelismo sectionis. Dico figuras quoque inter se dis-  
similes; quoniam enim sectio ἀπελάλλως est basi pyramidis patet ex 2. 6. trian-  
gulos proportionatos esse minimè posse; ergo neque similes; dissimiles ergo, quod  
erat probandum. Idem dici debet, si basis recta, sectio verò loxotoma foret.

Propo-

### Propositio IV.

*Si obiectum ὀρθόφανον fuerit circulus, mesopticum verò corpus obiecto  
parallelum cõstituat, in eo similiter sectio circuli exprimet.*

Sit obiectum DE, oculus A, actinobolia visiva ADE, sectio BC. Quoniam igitur  
radiatio conũ rectum efficit, sectio autem conũ recti basi parallela circulos iuxta



ea, quæ Apollon lib. 1. demonstrat, efficiat; erit & eadẽ de causa figura BC, in plano  
mesoptico circulus; quod erat probandum Si verò obiectum fuerit λοξόφανον, pro  
varia projectione conũ, variam ellipsim, parabolam, aut hyperbolem efficiet.

### Propositio V.

*Si obiectum fuerit ἀνώφανον, vel ἰσόφανον, & planum mesopticum  
obiecto parallelum; erit & sectio in dicto plano similis obiecto;  
si verò planum mesopticum non esset parallela,  
figurę quoque dissimiles forent.*

Cum ratio huius rei eadem sit cum ea in præcedentibus propositionibus de-  
monstrata; eidem quoque declarandæ immorari noluimus.

### Consectarium.


EX hisce patet, primò tot diuersorum laterum pyramides radiosas esse, sub quot  
angulis obiectum videtur. Si igitur obiectum fuerit figura humana, extremitas  
figurę radians in oculum pyramidem constituet; cuius sectiones quomodo-  
cunque factę in plano semper humanam figuram constituent siue regularem, siue  
irregularem, & transformatam. Ita extremitas pyramidis habentis pro basi canis  
figuram, in planis segmentorum singulorum pro diuersa sectione, canis figu-  
ram diuersimode effigiabit. Non secus de reliquis visibilibus obiectis quibuscun-  
que argumentandum est. Si enim radiatio rerum obiectarum in oculum facta re-  
linqueret in medio pyramidem visibilem, in segmentis singulis, rem, quam basis ef-  
figiat pyramidis, relinqueret. Cum igitur pyra- is infinitarum sectionum capax sit,  
innumerę quoque figurę eiusdem rei nunc rectę, nunc obliquę, modò vniformes,  
modò diffformes pro varia sectione, vt diximus, resultarent. Hanc opticam pro-  
prietatem compluribus in rebus ipsa natura imitari videtur. Nam in plantarum  
Y thyr-

Speciesum visibi-  
litum mira-  
ratio.


thyrsis, arborumq. medullis, subinde figuras quasdam effigiat, quæ figuræ in singulis segmentis thyrsi comparent, ob venarum fibrarumq. æquabilem ductum; cuiusmodi sequens est experimentum.

Experimentum Naturæ Opticæ, & Pictricis.

Accipe thyrsium cylindraceum Filicis grossioris, eumque circa radicem in complures particulas reseces, & in singulis sectionum factarum planis, qui necessario, vel circuli erunt, vel ellipses, vt ex sectione cylindri patet; à natura depictam Imperialis Aquilæ imaginem reperies; fibræ enim, per quas succum terræ, suum scilicet nutrimentum haurit planta, ita à natura dispositæ sunt secundum longitudinem plantæ, vt eæ perfectè cylindrum opticum exprimant. Sicut enim pyramis, seu cylindrus opticus, cuius basis Aquila foret, quacunq. parte sectus in quacunq. parte medij Aquilam efformaret; ita fibræ dictæ plantæ. Ante complures annos, cum huiusmodi fibras in varijs arborum sectionibus, in ordine ad magnetismos botanicos scrutarer, in Salicis quoq. sectionem, quæ perfectam serpentis in spiram torti imaginem referebat, incidi; quam & in omnibus reliquis sectionibus reperi; vt in figura apposita videre est. Cuius quidem rei nulla alia ratio est, nisi eam quam diximus, fibrarum videlicet ductus in spiram constitutus. Non dubito, si experimentum sumeretur in alijs arborum plantarumque sectionibus, innumera alia huiusmodi ludibunda naturæ pictricis opera inueniri posse. Ita in Pinu quadam secta singulis partibus cran-



bratum me reperisse memini. Qui hæc profundius penetrauerit, modum facitè inueniet, quo quispiam ex varia contorsione constrictioneque thyrsi alicuius plantæ datam imaginem in ea adumbrare valeat. Sed de his alibi. Vide quoque quæ de hisce partim in Arte Magnetica cap. de Magnetismo plantarum, partim in Magia lucis & vmbre tractamus.



ARS SCIAGRAPHICA

Siue

De naturali rerum adumbratione.

CAPVT II.

De Organica rerum delineatione.


PROBLEMA I.

Instrumentum Mesopicum construere.



NON ignoro diuersos Authores diuersa organa condidisse, quibus rerum quocunq. situ positarum delineationes perficerent. Sportula Dureri multis placet, non displicet Marolosi mensa optica; habet suos vsus parallelogrammum Scheineri, & Bettini; Dantes quoque & Barbarus varia huius farinae organa tradiderunt, & si nullum eorum sit, quod non difficultate sua careat. Solùm hoc nostrum quamuis simplicissimum omnium, tamen negotio polygraphico expeditissimum, exactissimumque inueni; cum nullum sit, quod actinobolissimum opticum melius referat. Huius igitur vsum prope in finitum paucis declarare visum est, ne quicquam in arte lucis & vmbre omisisse videamur.

Varia instrumenta optica.



Constructio instrumenti mesopici.

Primò fiat parallelogrammum ABCD, quatuor tigillis inuicem commissis conclusum, cuius latera AB, & CD quinque; AC verò, & BD quatuor palmorū habeat longitudinē; huic velum subtilissimum, & prorsus diaphanum, cuiusmodi nobiles sceminæ ad condendas facies passim vti solent, obtendatur.

Secundò in puncto E, lateris CD, tigillum transversum, mobile, seu cursor organi, ita transigatur, vt pro machinatoris arbitrio nunc protrahi nunc retrahi possit. In F, verò puncto cursoris EF, aliud tigillum GF, transversum agatur, ita tigillo EF, insertum, vt pro rerum delineandarum oportunitate nunc eleuari,

nunc demitti possit; habebisque instrumentum perfectum, vt figura docet.

*Multiplex, & insignis huius instrumenti usus.*

**V**Sus huius instrumenti tam amplius est, & vastus, ut nullum ferè in tota optica, siue theorema, siue problema occurrat, quod huius instrumenti theoria non contineat. Primò enim ad oculum quasi demonstrat optici radij naturam, luminosi & opaci, uti & umbrarum, aliarumque omnium projectionum rationes, quemadmodum perito id examinanti patebit. Secundò, dato obiecto quocunque, siue id figura sit, siue corpus quodcunque, siue imago, siue statua, siue domus denique aut templum, vrbs, campus; sylua, mons; ea omnia nullo negotio huius instrumenti ope iuxta naturalem, quo obijciuntur, quo delineari possunt. Tertio, huius instrumenti ope mirificas rerum obiectarum metamorphoses, atque adeò omnes prodigioforum horologiorum delineationes perficies. Verùm ut in sequentibus tanto sit expeditior Lector, quantum fieri poterit, breuissima singularum rerum propositarum paradigmata aliqua trademus.

*Triplex delineatio orthographica, scenographica, sciographica.*

Tribus autem modis rerum delineatio institui potest, vel orthographicè, vel scenographicè, vel sciographicè. Orthographicam descriptionem hoc instrumento perficiendam dicimus, cum obiectum, siue res delineanda parallelum ad parallelogrammum mesopticum, siue velum, situm obtinerit; & sic frontispicia domorum, turrium, templorum, & quicquid rectis radijs in oculos nostros fertur, delineamus. Ad hanc speciem reuocamus quoque omnes illas figuras siue ichnographicè siue scenographicè delineatas, quibus similem in velo depingere præcipimus. Scenographicam delineationem dicimus, cum obiectum loxophanum, seu obliquo situ rem delineamus, cuiusmodi sunt, quæ in obliquo horizontis situ posita delineanda præcipiuntur, aut in verticali plano lateribus abscedentibus. Sciographicam dicimus, cum projectionem umbræ alicuius corporis idemur delineare, & tunc inter tigillum GF, & velum, corpus sciographicè delineandum poni debet. In omnibus verò obiectis, in quibus cum maxima transformatione res depingere desideramus, primò orthographia rei in obiecto transformandæ in ipso velo depingenda est. His igitur ita peractis, nunc ipsas delineationes ordiamur.


**Propositio I.**

*Datam quamcunque figuram polygonam, trilateram quadratam, &c. siue regularem, siue irregularem in velo mesoptico, tum scenographicè, tum orthographicè delineare.*

**Q**ua ratione hæc omnia geometricè in planum conijcienda sint, paulò post dicetur, nunc qua ratione velo nostro polygraphico perfici possint, videamus. Et primò quidem si quis obiectum quoddam orthographicè delineare desideret, is figuram velo parallelam statuet; si scenographicè, horizonti, vel plano verticali abscedenti, vel inclinanti exponet. Quo peracto, protrahito tigillo EF, pro magnitudine, vel paritate imaginis instrumentum ita firmabis in loco suo, ut nulla ratione ab eodem dimoueri contingat. Deinde applicato oculo ad foramen, siue extremitatem G, tigilli GF, manique quiescente supra lignum (quod duobus sulcris innixum à lateribus data opera annexis sustinetur) iuxta ductum visus in figuram obiecti directi in ipso velo, rubrica, creta, vel alia quavis telam colorante materia, quæ tamen facile deleri possit, figuram ultra velum obiectam

in

in ipso velo nullo negotio describes. Hanc autem figuram in tela opticè descriptam ita ostendo. Cum enim penicilli extremum punctum cum puncto G, oculi situati, & cum punctis obiectæ figuræ in eadem semper sint linea, necessariò in tela figura optica proiecta delineabitur, cum tela nihil aliud representet, quàm sectionem pyramidis rectæ, vel obliquæ specierum ex obiecto radiantium in oculum: quæ quidem sectio, si fuerit recta in pyramide recta, figura picta necessariò similis erit rei obiectæ; si verò sectio fuerit recta pyramidis base obliquè incidente; vel sectio obliqua in pyramide recta incidente, in velo figura iuxta rationem sectionis optice pyramidis representabitur. Sed rem exemplo demonstremus. Sit obiectum quadrangulum ABCD delineandum velum mesopticum sit FCGH, parallelum quadrangulo ABCD, oculus in G. Dico FCGH, quadrangulum adumbrarum, at-



que in velo depictum vna cum figura Aquilæ eidem inscripta, simile esse parallelogrammo ABCD, & Aquilam aquilæ & consequenter latera FH, CG, parallela lateribus AB, & CD. Ducatur enim recta ex G, connectentes puncta utriusque parallelogrammi, fiatque pyramis GACBD. Patet luculenter ex 14. lib. 13. Euclid. Sectionem FCGH, esse similem basi ABCD pyramidis. FH verò & CG, parallelas esse ita demonstro. Cum pyramis GABDC, intersecetur plano veli polygraphici HFCCG, basi ABCD, parallelo, sectio diæ basi, ABCD, ut dictum est, similis erit. Itaque FHGC, similis ipsi ABCD, habet latera FH, CG, homologa lateribus AB, CD: & quia AB, & CD, parallela sunt lateribus FH, & CG; erit FHCCG quoque similis ABCD, & latera lateribus parallela. Quod erat demonstrandum. Verum hæc quoque fusè demonstrata reperies lib. 2. cap. 2. prop. 3.

*Conseclarium.*


**H**inc patet, si prototypon e typo non fuerit parallelum, dissimiles quoque figuras depictum iri, uti in sequentibus docebitur.

Pro-


### Propositio II.

Corpus solidum quouis sui propositum delineare.

**A**pplicato oculo ad punctum A, corpus obiectum in velo mesoptico iuxta ductum radij visui, qui in lineas corpus terminantes recta incidat designato, & habebis quæsitum. Sit corpus prototypon cubus ACDS instar putei; ectypon in V, in velo seu tela delineandum; A, verò punctum oculi: dico applicato oculo in A extremo tigilli, & penicillo iuxta ductum oculi progrediente, in tela depictum iri figuram Cubi, figuræ Cubi ACDS, prorsus similem: connexis enim punctis Cubi CADSVI, cum A puncto oculi fiat pyramis, cuius sectio VBOT, cum parallela sit basi eiusdem, & latera lateribus quoque parallela erunt & homologa; ergo etiam ectypon BOT, protypo prorsus simile, quod erat demonstrandum. Hac industria



quamuis aliam figuram solidam, cuiusmodi hæc præsens figura est in modum Crucis efformata, ubi applicato oculo ad punctum A, radijsque visibilibus in BDCE, puncta crucis directis in velo mesoptico figuram similem GFHI, delineatis.



Con-

### Confectarium I.

**E**X his veluti fundamentis patet, qua ratione omnis generis picturæ, ope huius instrumenti delineari possint, etiam ab imperito picturæ; si videlicet applicato oculo ad foramen A, penicillo iuxta visus imaginem prototypam terminantis radij processerit; relinquetur enim in tela seu velo mesoptico designatio de-

*Qua ratione, qui etiam picture imperitus quævis imagines propositas delineare possit.*

### Confectarium II.

**S**i instrumentum hoc in editiori quodam loco ita exposueris, ut ex eo situs alicuius urbis vndeque appareat, eam in velo scenographico secundum omnes turres, templa, palatia (applicato videlicet oculo ad A, extremum tigilli GF, & penicillo sequente radij visui in prototypum incidentis processum) perfectissima symmetria adumbratam describes.

*Qua ratione in scena civitatis alicuius aspectus optice præfici possit.*

### Confectarium III.

**H**inc patet, qua ratione urbium, camporum, & sylvarum situs commodissime secundum naturalem positionem in velo exprimi possit.


*Qua ratione situs alias Provincie describi possit.*

Verum hoc loco quæri posset, qua ratione memoratæ rerû descriptiones in velo peractæ in chartam transferendæ sint? Respondetur hoc dupliciter fieri posse. Primo punctatione acus; quod fiet, si velum supra chartam præparatam applicaveris, ac iuxta designationem puncta chartæ imprefferis. Secundo, si delineatio facta fuerit quadam rubrica, quæ spuma plumbi dicitur; habebis dicto citius petitum, si chartam prius madefactam velo superimpositam compresseris; omnem enim colorem velo inhærentem unâ cum rebus delineatis attractum in se deriuabit.

### Propositio III.

Omniarum rerum dimensiones huius instrumenti ope perficere.

**S**it altitudo, & latitudo rei mensurandæ CB, BD, sitque tantummodo vnus passus Snotus in linea CB, scilicet CI. Scies altitudinis, latitudinis, & singulari partium



intermediarum ad inuicem proportionales, & consequenter quantitates habebis cogni-


gnitas. Cum enim A sit oculus; velum GFHI, æquidistans obiecto mensurando BCDE, erit sectio pyramidis ABCDE, seu quod idem est, figura GFHI, in velo delineata, similis & proportionata figuræ BCDE & latera homologa proportionalia. Fiat igitur, vt GH, ad GF, ita CB, ad BD, & commutando, vt GH, ad CB, ita GF, ad BD, & iterum sicut AH, ad GH, ita AC, ad CB, ergo consequenter sicuti tota superficies triangularis HIA, ad superficiem HGFI, ita ACE ad CBDE: Sunt ergo omnia proportionalia; ergo cognito vno passu in altitudine CB, cognita erit tota altitudo CB, in linea ectypa GH. Sicuti enim CB, ad GH, ita primus passus CI, ad HK. Sit autem CI, decima pars CB, erit ergo & HK, decima pars HG: ergo altitudo HG, nota erit. Sicuti igitur hæc inuenta altitudo mensura est communis partium totius superficiæ CBDE, ita & HK erit communis mensura partium superficiæ GFHI. Ergo cognito vno cognoscentur omnes consequenter quantitates superficiæ CBDE, secundum latitudinem, longitudinem, inclinationem, &c.

Consectarium.

EX his patet, qua ratione vnica statione loco immoti altitudinem, & latitudinem singularum partium alicuius fabricæ quantitates cognoscere possimus, dummodo minima pars altitudinis, aut latitudinis, aut interuallum duarum columnarum in fabrica cognitum sit. Hoc artificio altitudinem Cupulæ S. Petri, cognita sola altitudine columnæ vnus ex ijs, quæ Coronidè ambiunt, 600. ferè pedum Geometricorum, à fundo Collegij Romani incipiendo vna cum latitudine, altitudine, distantijs columnarum eiusdem frontispicij inuenimus.

Obseruandum tamen est hanc dimensionem licitam minimè esse, nisi in maxima distantia: in hac enim vix sensibilem errorem committes: at quo vicinior fueris rei mensurandæ; tantò maiores errores, nisi cum arte processeris, committi necesse est. Cuius quidem rei alia ratio non est nisi projectio optica, quæ cominùs, & è propinquo altitudinem aliquam tantò semper maiorem determinat, quantò basi fuerit vicinior, tantò minorem, quantò altior; vnde consequenter nota mensura alicubi assumpta, reliquis interruptis partibus æquari minimè poterit. In remotiori verò distantia, cum angulus visiuus, sub quo tota altitudo, longitudoque mensuranda videtur, sit admodum acutus, reliquæ quoque partes vix sensibilem inæqualitatis differentiam habebunt. Quæ ratione tamen dimensio etiam rerum ex propinquo spectatarum inueniri possit, paucis aperendum est. Primò notum est ex sequentibus propositionibus, quòd sicuti figuræ quælibet Geometrica in Opticam, sic è contra Optica in Geometricam reduci potest; id est, non est linea opticè projecta, cuius quantitas per reductionem ad lineam Geometricam non possit inueniri; quam quidem reductionem sequentes propositiones docent. Atque hic est primus modus. Alter modus fit per Arithmeticam, quem aliquibus exemplis declarare visum est. Sit igitur altitudo BC, duodecim palmorum; altitudo verò ED, 14. pedum sub eodem angulo comprehensa, distantia AD, 60. palmorum. Quæritur distantia vnus ab altera. Fiat vt CB, ad BA, ita ED, ad DA, & quotus dabit AD, à quo subducta AB, dabit reliquum BD, 10. palmorum: & si fiat vt AB, ad CB, ita


Ratio mensurandi res inaccessas per vniam stationem.



tur distantia vnus ab altera. Fiat vt CB, ad BA, ita ED, ad DA, & quotus dabit AD, à quo subducta AB, dabit reliquum BD, 10. palmorum: & si fiat vt AB, ad CB, ita

ita AD, ad ED, patebit ignota altitudo ED, 14. palmorū. Si verò fuerit altitudo aliqua mensuranda per sinus, ita singularū partium dimensiones inuenies. Sint singulæ partes CD, & reliquæ octo palmorum: fiat igitur vt CA, distantia nota 12. v. g. passuum, ad sinum totum ita CD, octo palmorum ad tangentem anguli DAC, prodibitque tangens, cuius gradus dabit anguli propositi quantitatem. Iterum fiat vt AC, 12. passuum ad sinum totum, ita CE, 16. palmorum ad tangentem: prodibitque tangens EC, cuius gradus dabit quantitatem EAC, à quo si angulum DAC, subducas, proueniet angulus EAD, aliquantò minor prioris, & consequenter res minor quoque videbitur, & tantò quidè minor, quanto res sub minori angulo videbitur. Nò secus de cæteris angulis inuestigandis procedes. Si verò velis habere quantititates sub dictis angulis notis comprehendere, operationè constitues. oppositâ prioribus si velis quãtitatè ED, ad DG, comparatâ. Fiat vt AC, sinus totus ad 12. passus, ita tangens DC, ad aliud, prodibit statue, verbi gratia, inter DG, ponendâ spatium. Iterum vt sinus totus AC, ad 12. passus ita tangens EC ad aliud, prodibit spatium EC, à quo CD nota subducta dabit ED, statuam notam. Idem iudicium fit de loxodroma projectura. Verum de hac mirifica reductione quantitatū opticarum ad geometricam quantitatem, cum res subtilissima, sit & maximè in Architectura, Pictoriaq; locum habeat, alibi ex professo tractabimus. Quare hic tantum ea indicasse sufficiat. Atque hæc de vsu huius mesoptici plani dicta sufficiant. Qui porro plures huius instrumenti utilitates desiderat, is Gnomonica nostra, atque Magiam lucis & vmbre adeat, vbi verum & reconditum huius vsuum non sine admiratione reperiet. Verum cum non omnes huiusmodi instrumentum ad manus habeant, qua ratione dictæ pragmatice geometricæ quoque ratione perfici possint, breuiter docebimus.

Alia reductio nis figura optica ad geometricã, ratio.



CAPVT III.

De projectionibus scenographicis geometricè expediendis.



T suscepti muneris negotium aliquantò felicius cedat, nonnulla hic præmitteremus, tum notitiæ afferendæ, tum ambiguitatis tollendæ gratiæ. Sciendum igitur, duo præcipuè in visionis ratione notatu digna existere. Vnum est simulachrorum appullus ad organum, vnde varij ad spectus obueniunt, partim veri, partim phantastici: de vtrisque in præcedentibus dictum est. Alterum est phantasiæ productæ concursus, cum obiecto quodam plano: is enim locus, in quem rei phantasia profusa incidit, figuram quandam exhibet, quam Projectionem vocamus; quod sit veluti res ipsa, vi efficacique aspectus ad planum vique projecta. Hanc quidam Sectionem quoque vocant, eò quòd sit communis interse-

Duo in visione notanda.

Quid sit Proiectio.

plani & visuum per rem spectatam incidentium; quo etiã loquendi modo pñcipat eas figuras, quas dissecti conũ, aut cylindri ostentant, de quibus in sequenti libro amplior dabitur dicendi materia. Est igitur Proiectio nihil aliud quam superficialis, aut solidæ figuræ in planum trãscriptio. Ad quod præstandum tria sunt cum primis necessaria: res scilicet proijcienda: oculus, ex quo radij optici ad omnes rei propositæ partes emicant: & planum, in quod res ipsa per radiorum productionem transcribitur. His igitur ritè notatis geometricam proijciendarum figurarum methodum paucis expediãmus. Quod vt optimè fiat;

Nota, in omni negotio optico duo spacia plana, quatuor lineas, duo puncta consideranda. Planum prius vocatur naturale seu physicum, estque planum illud, quod opticæ proiectio inieruit. Alterum est opticum planum, quod videlicet optica occupat proiectio; illud signauimus literis ABCD, hoc EDCF.

Quatuor linearum genera sunt; linea terræ, linea horizontalis, linea radialis, linea diametralis.

Linea terræ est linea, quæ est basis plani optici, vti est linea CD.

Linea horizontalis est linea æquidistans lineæ terræ CD, terminãs planum opticum, cuiusmodi est linea AB.


Linea radialis dicitur illa, quæ ex certo quodam puncto figuræ opticæ delineandæ ad lineam horizontalem, ad punctum, quod principale dicitur, trahitur, vti sunt lineæ NM, FM.

Lineæ diametrales, siue diagoniæ sunt, quæ ducuntur ex certis punctis figuræ opticæ delineandæ in lineam horizontalem, in punctum, quod punctum oculi dicitur, cuiusmodi sunt lineæ NR, CR, DR. Sunt igitur duo puncta potissima in optica proiectura consideranda: punctum principale, quod est signatum litera M: & punctum oculi signatum litera R, quæ semper in linea horizontali constituuntur.

Propositio I.

Dato puncto in plano Geometrico, puncto principali, & puncto oculi, inuenire punctum in plano optico.

Sit quadratum Geometricum NOPQ, in quo punctum datum sit Z, punctum oculi R, punctum principale M, oporteat inuenire, punctum hoc in plano Phy-



figo ABCD: ducantur ex NO, punctis lineæ terræ CD, in punctum principale M, lineæ

lineæ NM, OM, deinde ducatur arcus ZV, ex N, per Z punctum assumptum. Ex puncto enim V, si lineam duxeris in R punctum oculi, secabit illa NM, in puncto C, puncto quæsito, & consequenter lineam NZ in plano Geometrico referet lineam NC, in plano optico: hac ratione omnia puncta, & lineas in plano aliquo Geometrico datas assignabis in plano optico, cuius rei demonstratio ex Proposit. I. & instrumeto meloptico clarè patet.

Propositio II.

Datum quadratum optice proijcere, & in quadrato Aquilam.

Sit datum quadratum NOPQ, in præcedenti figura datũ pñctum oculi R, & principale M, illud ita optice proijcietur: Ducantur ex punctis NO, intervallis NP, & OQ, arcus occulti PS, & QN: quo peracto ducantur ex NO, lineæ radiales in M, & diagoniæ ex punctis SN, in R punctum oculi, & vbi SR, & NR, secant NM, & OM radiales, ibi signato puncta ED, quæ coniuncta lineam recta DE, dabunt quadratum opticum DENO, quæsitum: respondebit autem ND, lateri NP, & EF, vel EQ, lateri OQ, & latus denique DE, lateri PQ, NO vero latus vtrique commune est. Ratio facillima est ex instrumeto nostro melophanũ in quo spacium opticum ACBD, velum erectum perpendiculariter, referet NOPQ quadratum Geometricum vna cum figurã inscriptã ad planum horizontale rectum: oculus autem, constituitur in diopetro G, tigilli GF, tanto spacio à veli plano, quanto hoc punctum R, à puncto M, tigillum quoque altitudinem habeat BD, perspicuum est oculum ex G, inspicientem per velum, seu quadratum Geometricum NOPQ, in spacio optico quadratum DENO, optice delineaturum, non fecus ac hic factum vides: vide Propositionem I. præcedentem, vbi omnia fusiùs demonstrata reperies.

Consuetarium.

Siquis porro in quadrato geometrico Aquilam depingeret; puncta Aquilæ terminantia in quadrato optico eadem prorsus ratione inuenirentur, qua in propositione dictum est. Sed hæc clarius in paradigmate apparent.

Alia ratio per fila, omnium facillima.


NE multitudo linearum tam radialium, quam diagoniarum confusionem aliquam in punctis reperiendis pariat, facillimè, & magno rerum compendio affiges, duo subtilia fila puncto principali M, & puncto oculi R: horum enim prius si supra puncta in Geometrico plano signata, videlicet supra NO, alterum autem supra puncta optica SN, extenderis, secabunt ea planum opticum in punctis, quæ rectis coniuncta dabunt propositionis scopum, quæsitum. Fila ipsa representantur lineis SR, & MO.

Propositio III.

Triangulum, vel quadratum delineare, quod in plano geometrico remotum sit a linea terræ.

Sit verbi gratia datus triangulus ACD, optice proijciendus. Primò ducantur ex singulis punctis trianguli ACDB, lineæ perpendiculares ad lineam terræ.

Et sint, verbi gratia, lineæ occultæ ES, PA, PB, GV. Secundò ex punctis EPG,



intercapedine ED, PA, PB, GC, arcus oculi describantur, quæ in linea terræ terminentur in punctis GHIK. Tertiò ex punctis GPE, in punctum L, ducantur radiales. Deinde ex punctis arcuum KIHG, ducantur diagoniæ in M. Vbi enim illæ radiales secuerint, ibi puncta sectionis lineis rectis coniuncta dabunt triangulum opticè projectum, videlicet MNP, quod quærebatur: quorum omnium ratio, vt prius ex instrumento mesoptico patet propositi. præced.

Consectarium.

Trianguli parallelogrammi dimidium.

EX hoc patet, cum omne triangulum dimidium sit sui parallelogrammi quadratum VSCD, in quadrato optico assignari solum trahendo lineam IH, parallelam lineæ terræ: hoc enim peracto, erit MNIH, quadratum opticè projectum, quod quærebatur. Per fila quoque in punctis L, & M, alligata idem facillimè expedit.

Propositio IV

Rhombum opticè delineare, & in Rhombo Aquilam.


Sic rhombus datus ABCD, punctum principale F, & punctum oculi O, ita eam delineabis. Ducantur primò lineæ perpendiculares ad lineam terræ ex singulis rhombi terminis CG, AB, DE; & ex G, intercapedine GC arcus CA; ex A, verò interuallo AB, arcus BI; ex E, denique interuallo ED, arcus DI, describantur, deindè ex punctis F, A, G, in F, radiales, & per puncta IEA, diagonias producet in O, punctum oculi; secabunt hæ illas in punctis, quæ rectis coniuncta constituent rhombum opticum FGMA, quæsitum. Ratio innitur 3. propositi. instrumenti mesoptici. Idem præstabis facillimè per fila in F, & O, affixa, & supra puncta geometrica, & optica extensa, vt in prima propositione fieri docuimus.

Propo-

Propositio V.

Circulum opticè projicere.

Sic circulus A, opticè projiciendus. Primò eum in quotlibet partes diuides, & per puncta perpendiculares ad lineam terræ erigendæ, vt in præcedentibus factum est. Deinde arcus ducendi, intercapedine normalibus congrua, per quorum fines ex linea terræ diagoniæ trahendæ in punctum oculi T, & in punctis perpendicularem in linea terræ radiales in V, notandæque intersectionum puncta: per hæc enim figura X, delineata dabit quæsitum; vt in exemplo patet.




Deinde arcus ducendi, intercapedine normalibus congrua, per quorum fines ex linea terræ diagoniæ trahendæ in punctum oculi T, & in punctis perpendicularem in linea terræ radiales in V, notandæque intersectionum puncta: per hæc enim figura X, delineata dabit quæsitum; vt in exemplo patet.

Propositio VI.

Corpus regulare opticè projicere.

Primò basim corporis dati, videlicet cubi, opticè projicies iuxta propos. 3. Secundò, hoc peracto, accipe perpendicularem altitudinis corporis, quæ supra




lineam terræ AD statuatur, verbi gratia, in puncto D: Et rursus quolibet spacio disto alia

alia æqualis in A, ita vt linea AB, parallela DH, normaliter sit erecta supra lineam terræ. Tertio deinde ex punctis AB extremis in quodlibet punctum lineæ horizontalis SC, vtcunque assumptum ducantur lineæ in punctum, verbi gratia C, sintque lineæ AC, CB. Quarto, hinc peractis, ex punctis basis figuræ DEFG opticè projectis ducantur ad lineam terræ, quæ finiuntur in linea AC, parallelæ EM, vel GM, & FO. Quinto, ex his punctis MO, erigantur normales ad lineam terræ AD, quæ terminentur in linea BC, sintque lineæ MN, OP. Sexto, ex punctis NP, iterum ducantur lineæ parallelæ ad lineam terræ, ad quas denique, si ex punctis D, G, E, F, figuræ basis perpendiculares duxeris, secabunt eæ lineas NL, PK, in punctis, quæ rectis coniuncta cõstituât corpus datum opticè proiectum, cuiusmodi est cubus præfens.

### Propositio VII.

*Tetraedron opticè projicere, ita vt plano vno puncto insistere videatur.*

Primo ponatur vnum ex tetraedri lateribus pro plano Geometrico infra lineam terræ, vt in exemplo, infra lineam HA, fiatque triangulum æquilaterum ABCD, à linea distans, vel non distans.



2 Hoc triangulum opticè projiciatur iuxta proposit. 3. sitque in plano optico ABCD.

3 Transferatur in lineam terræ ex quolibet puncto, verbi gratia H, linea CD, vel AD, vel DB, (quæ sunt æquales, & ducantur ex centro trianguli æquilateri in plano geometrico) harum inquam vna transferatur ex H, in I.

4 Deinde ex H, ducatur HS linea perpendicularis infinita, & intercepto vno ex lateribus trianguli æquilateri in plano geometrico, verbi gratia AB, ex puncto in lineam HS, verbi gratia in K transferatur; habebisque determinatam altitudinem figuræ supra planum.

5 Ex punctis HK, ducantur in quodlibet punctum lineæ horizontalis, verbi gratia L, duæ lineæ HL, KL.

6 Ducantur ex punctis ACB, trianguli in plano optico ad lineam HL, parallelæ AM, CO, vel BO.


7 Ex

7 Ex punctis MO, ducantur perpendiculares ad lineam terræ, siue parallelæ ad HK, quæ secent lineam KL, in punctis NP, ex quibus iterum lineæ parallelæ ducantur occultæ ad lineam terræ. Vbi enim has fecerint lineæ perpendiculares ex angulis A, C, D, ductæ, ibi erunt puncta, quæ rectis coniuncta assignabunt corpus, quod iuxta datum situm projicere oportebat.

### Propositio VIII.

*Dato quadrato, figura cum cellulis, & imagine intra illas collocata, describere figuram Aquilæ propositam in alio quadrangulo optico vna cum figura, quæ dignosci non possit, nisi oculo sub certo puncto constituto.*

Sit igitur quadratū geometricum ABCD, cui Aquila hic inscripta ita sit opticè projicienda, vt non nisi sub certo puncto dato videri possit, ita operare. In aliquo



muro plano, aut etiam superficie horizontali, fiat linea IS, ad cuius terminum I, alia ad angulos rectos ducatur linea AB, æqualis vni ex lateribus quadrati dati, ita vt extrema linea AB, à media linea IS, æquidistant. Hæc igitur AB, fit in totidem partes diuisa, in quot quadrati latus diuiditur; deinde ex punctis AHKB, mediisque spatij ducantur lineæ in S. Deinde fit longitudo oculi linea SO. Ab O, verò vsque in B, linea recta ducatur, & vbi illa lineas AS, HS, IS, KS, BS, intersecuerit, ex iisdem punctis lineas duces parallelas ad AB, habebisque quadratum opticè diuisum in muro, vel plano horizontali, cui iuxta proportionem quadratorum respondentium quadrato geometrico, figuram Aquilæ quoque inscribes. Si enim hanc figuram in plano verticali, siue muro aliquo delinees, deinde oculū in O, styli SO, muro normaliter infixi applices, Aquila in naturali sua figura vti in quadrato apparebit. Non secus quaslibet alias figuras referes opticè, quæ eminus conspiciant, nil nisi confusum, at oculo posito in O, figuram referent naturalem. Sed hæc vulgaria. Nota tamen hoc loco: si in pavimento aliquo dista figura dissipanda foret, tunc in quadrato geometrico ABCD, Aquila ita delineanda esset, vt corpus Aquilæ in quadrato ABCD, horizontali lineæ normaliter insisteret: & iuxta hanc



hanc delineationem Aquila in craticulato trigono SBA, delineanda foret: Videbiturque in plano horizontali figura Aquile dissipata ex O, puncto styli SO, ad horizontem perpendiculariter erecti.

Propositio IX.

Effigiem alia ratione geometricè transformare.

Primus modus.

Si ergo figura Aquilæ transformanda in plano quodam mesoptico AB. Descripto quadrangulo CD, intra mesopticum AB, circa imaginem Aquilæ; divisioque eo in minora rectangula, producatur utrinque laterum extremorum perpendicularium ad basim, siue radicem plani mesoptici, HD in I, & CX, in Y: tum ex K termino, linea normali in E emissa ducantur KI, KY, in infinitum productæ. Deinde per reliquarum linearum ultima puncta ex K, lineæ in infinitum productæ dabunt spacium, intra quas lineas anamorphosis, siue transformatio figuræ faciendæ est.

2 Deinde tota radiatio visualis ex E, per mesopticum planum propagata in planum horizontis hac arte projicitur. Altitudinem EK transferes ex K in L, sitque lineæ KL æqualis lineæ KE, & lineæ KI normaliter insitat: lineam vero HI, ex puncto I in M produces per lineam IM, lineæ KL, parallelam.

3 Latus HD quadranguli imaginis vi à cum diuisionibus ex M transferatur in lineam MN, uti indicant puncta M, O, P, Q, N, per quæ ex L puncto rectæ ductæ secabunt latus KIR, in punctis, per quæ ad basim YI. plani mesoptici AB parallela ductæ dabunt quadrilaterum ZGFR, imaginis CXHD rectæ, in plano horizontali cum omnibus, & singulis rectangulis; ut apparet, transformatum. Intra quod veluti craticulam quandam, si imaginem Aquilinam iuxta imaginis prototypæ craticulatae proportionem depinxeris, habebis transformationem imaginis quæsitam, Cuius demonstratio vel ex ipsa structura patet.

Eadem transformatio mechanicè per lumen.

Secundus modus.


Si imaginis aquilinae lineamenta, in plano mesothetico, acu subtiliter perforaueris, & in E puncto oculi lumen potueris, describet lumen per foramina in planum proiectum imaginis aquilinae transformationem in spacio FRGZ, eadem prorsus ratione, quæ paulò ante eam geometricè descripsimus in eodem spacio.

Eadem transformatio per umbram ope instrumenti nostri mesoptici.

Tertius modus.

Si planum mesotheticum AB fuerit diaphanum; uti nostrum instrumentum mesopticum, ita imaginis transformationem per umbram efficies. Colore crassiori depingatur in velo figura quælibet; uti hinc Aquilæ, ita ut lineamenta in plano

Iconismus I folio 184



plano diaphano colore illo crassiori aliquantulum opacentur. Quo peracto, si in loco E, lumen posueris, vt prius, describet umbra lineamentorum colore crassiori inductorum in plano dictam imaginis transformationem quaesitam; vel si projectio in diuersis planis contingeret, depicta in velo Aquilae lineamentorum principalibus punctis opacum quid applicandum foret, vt umbra opaci corporis in remoto spacio imaginis transformandae puncta ostenderet.

### Confectarium Primum.

**E**X hisce patet umbra, & lumine omnes transformationes fieri posse. Admirandos vero effectus ex hisce resultantes vide in Magia lucis & umbrae.

### Confectarium Secundum.

**P**atet quoque, si mesopticum planum speculare foret oculo eminus constituto, tanto a plano distantia, & altitudine, quanta ab eodem EK, distat lumen, transformata imaginem naturali situ in speculo apparituram.

## Propositio X.

*Figuram quamuis in cono conuexo ita describere, vt ea tamen nulla ratione videatur, nisi  $\kappa\alpha\tau\omega\pi\iota\sigma\tau\iota\sigma$  sub determinato puncto, oculo videlicet in axe producto constituto.*

**P**rimò modum hic trademus, quem Niceronus in Curiosa sua Perspectiua docet, estque is qui sequitur. Ex vno centro describantur octo circuli aequidistantes, quorum circumferentia in totidem partes per radios octo dispescet, vt vides in ST, figuram II. Iconifimi I.

2 In hoc schemate quamlibet figuram naturali situ delineabis.

3 Conum huic similem & aequalem ita praeparabis. Intercepta ducatur diameter schematis ST, bis sumpta in lineam CD; deinde ex D, intercapedine CD, vel CA describatur semicirculus DBA, quem in duos quadrantes, per lineam CB, dispescet.

4 Duces lineam ex A, in B, arcumque CX, ductum intercapedine AC, in octo aequales partes diuides: per quas si ex A, lineas occultas duxeris, secabunt illa latera CB, in punctis, per quae octo circuli in quadrante CBD, ducti dabunt conum optice projectum; in quo iuxta schema figuram intra ST Aquilinae recte depictae, Aquilam depinges deformem & dissipatam, quae tamen ex certo puncto archetypae simillima videatur. Vide figuram II.

5 Hoc peracto quadrantem ita complicabis, vt duo latera CD, & CB, coniungantur in puncto B, & habebis conum praeparatum. Si igitur figuram videre velis, tantum oculus a cono distare debet, quantum apex cono a plano, cui insistit. Et sic habebis intentum.

Nota hic: si in cono concauo figura similis delineanda foret, contrariam projectionis rationem tenendam. Spacia enim strictiora superiorem cono aperti partem, latiora inferiorem vsus apicem locum occupabunt. Quae rationis dictamen melius vnumquemque docebit, quam ego vel multis verbis explicare.

## Alius modus.

*In cono speculari imaginem delineare, quæ non compareat nisi oculo extra cono latera constituto.*

**I**N cono papyraceo plicatili plano cuidam insistenti, oculoque in certo loco fixo, in dicti cylindri ABC turbinata superficie, imago quælibet eo modo quo protinus docebimus, emendatè depicta immoto oculo delineetur. Vt autem delineatio exactior fiat, papyrus ligneo prius cono circumuoluito, peracta verò delineatione, eam à ligneo cono reuolutam in planum extendito, & acu, vel stylo secundum lineamenta in cono facta papyrus perforato, uti supra fieri præcepimus. Hoc quoque peracto, hac charta sic perforata rursus conum circumdabis, ut cono naturalis figuram recipiat, amotoque deinde cono ligneo, reflectaque cono parte DE, candelam, seu lumen intus pones in loco E; & lumen per foramina chartacei cono in planum projiciet transformatam imaginem. Si iterum ex folio Selenitis in speculum opacato conū formes æqualem cono papyraceo, species imaginis transformata in speculo unitæ, in oculū è regione constitutū reflectæ, imaginē veram repræsentabunt. Si porro in cono pellustri GHI, Aquilam umbrosam dicta ratione depinxeris, projiciet lumen retro positum in plano optico Aquilam umbrosam deformatam; quæ in cono eiusdem quantitatis speculari, oculo eminus constituto suo naturali situ spectabitur.

Vide fig. 111.

Vide fig. IV.

## Propositio XI.

*Imaginem in cylindro optice repræsentare.*

**F**lat primò iuxta regulas Perspectivæ curiosæ, quadratū geometricum ABCD, vna cum imagine Aquilæ Imperialis ei inscripta. Ex F, centro in plano aliquo assupto circulus ducatur, cuius diameter sit crassicie cylindri, huius semidiametrū FN, diuides in quatuor partes æquales, & in tertia parte P, posito circino describes circulos 14, tot nimirum, quorū transversæ lineæ quadrati sunt. Primus circulus distet ea distantia à centro, quantam reflexio in speculum sufficiens postulat, reliqui sequentes circuli crescant proportionem quam habent 20, ad 21, vel eosdem circulos sine scrupulo parallelos ducere poteris. Tertio diuidatur circumferentia prima LSTVXY, in 16. partes æquales, per quas ex centro F, lineæ in circumferentiam circuli ultimi ductæ exhibebunt optica quadratula quadratis geometricis respondentia, relictis tamen partibus SL, & LY, utpotè superfluis. Quartò, in hæc igitur spacia optica iuxta seriem, & proportionem membrorum Aquilæ quadratulis inscripæ, veluti per craticulam effigiabis Aquilæ figuram dissipatissimam, cuius tamen species in cylindrum speculari in F centro circuli positum reflecta, Aquilæ figuram naturalem de novo restituet, ut figura VI. Iconismi I, hæc adiuncta demonstrat.

Vide fig. V.

Vide fig. V2.

## Confectarium.

**E**X dictis quoque patet, qua ratione dicta delineandi ratio ipsius cylindri ope etiam multò meliùs, & faciliùs perfici possit: si videlicet in cylindro papyraceo prius figuram, rectæ in plano depictæ similem, oculo in certo assumpto puncto constituto depinxeris, depictam iuxta lineamenta sua perforatam luminis in-

pro-

proportionali distantia exposueris. Lumen enim per foramina imaginem transformam dissipatissimamque projiciet, quæ deinde cylindro in speculum efformato atque in pristinum naturalemq. statum unita, & reflecta, vera oculo apparebit. Quam transformationem geometricè quoque eadem prorsus ratione, qua supra prop. 10. præcepimus, perficere poteris: quæ omnia fuse ostenderem, nisi res ex præmissis exemplis innosceret. Qui verò hæc fusiùs scire desiderat, adeat Apiarium doctissimi Patris Bettini, Perspectivam curiosam Niceronis; qui omnem in hac parte defectum faciliè supplebunt nostri enim instituti non est, in traditis iam ab alijs immorari, sed ea in vltiorem finem directa, superficie tenus tantum attingere.

## CAPVT IV.

## De Arte Scenographica.

## §. I.

*Regula seruanda in Scenarum descriptione, alijsque picturis.*



**N**ihil hic dicimus de triplici Scenarum genere, Tragica, Comica, Satyrica, utpotè notissimis vulgò: sed tantum modum aperiemus quo eæ facillimè optico radio delineari possint: siquidem scenarum repræsentatio non minimam susceptæ contemplationis partem sibi vindicat: à scenis namque veluti à præcipua huius scientiæ materia Scenographices nomen acceptum est. Cum verò lineis, planisque superficiebus, ac solidis partibus, luminibus, vmbriisque varie compositis scenæ effingi soleant, necessariaque hæc sit omnibus pictoribus notitia; quædam coronidis loco hic summam adiungemus.

1 Sciendum igitur, in omni scenarum repræsentatione data communi sectione plani mesoptici, mox primarium punctum esse constituendum secundum datam oculi altitudinem; hac enim omnes lineæ ductæ in quibuscunque planis porriguntur. Quod in porticibus animaduertere licet, cum eas non ex aduerso, sed secundum longitudinem inspicimus; hac enim omnium columnarum summitates, capitulorum, ac basium inspicimus, nec non epistylorum & coronidum directiones ad primarium punctam, quod oculi loco est, contendunt: huc etiam communes illæ lineæ pertinent, quibus pavimenta, & tabulara, & quæcunque demum ad horizontis libramentum constituta sunt, directis parietibus committuntur.

2 Deinde, cum plurimum momenti in oculi altitudine positum sit, non parui ingenij erit opera, quo loco primarium punctum aptè collocetur, alte nē, an demisse, an medio loco? Hinc verò omnem cernendi modum in Opticam, Anopticam, & Catopticam distributum legimus, antiquis etiam notum. Cum ergo historia, quæ repræsentari in plano postulatur, in illa est superficie, quæ per oculum, & horizontem ducitur, scenæ orthoptico radio instituenda est. Cum verò historia supra oculi lineam eminent, anoptico: catoptico denique, cum historia oculi linea inferior est. Anoptice visus est in ijs rebus designandis, quæ vel in montibus, vel in sublimi aère, vel in superioribus domorum contignationibus existunt; has enim suscipiendo ab imo inuemur. Catoptica verò, res exhibet illas, quæ in vallibus, aut sub terra alijsque inferioribus locis sunt, cum eas è superioribus locis despectamus. Quæ au-

tem in medio loco constituta sunt, ad Orthopicum pertinent, quae iterum duplex: aut enim oculi altitudo humanam staturam exaequat; aut ab ea superatur: si prius, manifestum est omnium erectorum hominum capita in eam rectam lineam, quae horizontis projectura est, incidere oportere: si posterius, altiores necessario homines propinqui remotioribus videbuntur. Verum his ita constitutis, iam totius scenographiae rationem secundum trinam Opticæ, Anopticæ, Catoptricæ rationem, aperiamus.



# A R S P I C T O R I A

Sive

Fundamenta Scenographiæ.

## PROBLEMA I.


De artificiosa pavimentorum delineatione.



**I**EMPLORVM, ambulacrorumque, & quarumcunque rerum intra parietes conularum pavimenta si delineare velis: Primò ad lineam terræ QR, fiat quadratum ABCD, cuius latus AD in quotlibet partes æquales diuidatur; nos hic breuitatis causa in quatuor partes id diuisimus. Deinde ducantur ex punctis diuisio- num AFLEd, in punctum quoduis in linea horizontali MGX, as- sumptum, puta in G *ὀφθαλμὸν*, quod punctum principale in præ- cedentibus diximus, lineæ radiales: ex assumpto verò quolibet in eadem lineâ horizontali puncto M, ducatur diagonia MND: & vbi illa secuerit radiales lineas per illa puncta ad lineam terræ parallelæ ductæ, dabunt quadratum ADNS, vna cum quadratulis, circulis, aliisque ornamentis geometrico quadrato prius inscriptis, opticè projectum. Quam eandem habebis; si diagonias in singula puncta AFLEd, ex M, duxeris: latus enim NA, in punctis secabitur, per quæ parallelæ ductæ dabunt quadratum opticum ADNS, vt prius. Si verò huius quadrati optici projectionem versus G, proportionaliter decrescens continueare velis, ita opere- rare. Ex M puncto oculi aliam diagoniam ducito in vltimum lateris quadrati optici punctum S; & vbi hæc diagonia secabit radiales lineas AG, FG, LG, EG, per ea puncta ad priores parallelæ ductæ dabunt proportionalem degradationem quadri- ti optici. Si denique aliã diagoniam ex M, in K, punctum vltimum huius quadri- tertium quadratum proportionaliter decrescens, adeo vt AKOD, totum projecti spatium æquale sit geometrico quadrato ABCD, ter in longum continuato. Hac autem arte quadratorum degradationem proportionaliter in infinitum decrescen- tem vsque in G, projicere poteris; quorum omnium rationes dependent ex prop. I. c. I. quam consule. Si verò punctum principale non in recto, sed obliquo situ, fue- rit, vt in X, ductis lineis radialibus vt prius ex X, in AD, & reliqua puncta, ductaq; diagonia ex M, in C, secabit radios AX, FX, LX, EX, DX, in punctis, per quæ parallelæ ductæ dabunt projectionem pavimenti in situ obliquo quæsitam.

Alius casus pro sectionis.

Con-



*Confectarium.*

**E**X hac projectione patet, qua ratione templorum pavimenta, hortorum, Principumque ambulacra, peristyliorum projectiones artificiosæ depingi possint. Si enim supra altera quadratuli optice projecta columnas erexeris normaliter illis insistentes, habebis quæ situm: de quibus fusius in sequentibus.

**P R O B L E M A I I.**

*Quadrangulum opticum construere.*

**P**rimò assumatur pro basi AB linea, supra quâ describatur triangulum ACB, basis verò diuidatur in quotlibet partes æquales, fiatque pavementum radiosum, si e degradatum, sicuti antea docuimus, ductis videlicet ex centro C, per puncta diuisionū lineis. Secundò, ducta diagona qualibet AN, sitque punctum oculi, dein per puncta communia interfectionum diagonæ & radorum parallelæ ducantur, eritque hoc fundamentum totius Scenographiæ, scilicet pavementum theatri. Tertio, producantur AC, in O, & BC, in E, spacio AC, BC, æquali. Quarto, supra parallelorum extremitates erigantur inter lineas, seu radios CO, CB, CA, CF, normales, quarum extremæ iterum coniungantur, vt fiat quadrangulum opticum, cuius projectura EO IH, anoptica; AEDB, catoptica; HO BD, eiusque opposita EAIF, loxoptica; C, denique orthoptica erit. Si igitur intra loxopticam projectionem depinxeris magnifica palatia, erit scena Tragica; si priuatas domos Comica; si arbores, Scenam satyricam representabis. In anoptica nubes, astra, Solem, Lunam, vel etiam trabium transversim procurrētium projectionem, cui illa in pavimento prorsus similis est.

*Confectarium I.*

**P**atet igitur huiusmodi quadrangulum opticum totius Scenographiæ rationes continere. Si enim loco parallelorum normalium columnæ ponantur, habebis peristylum quoddam, siue columnarum, proportionali, & loxodroma, degradatione se visui ad naturæ exemplar obijcientium seriem pulcherrimam; quam si laqueari claudere velis, parallelorum, loco in anoptico spacio, trabes obliquos singulis correspondentibus columnis impositos duces, quæ proportionali si militer degradatione referent ad naturæ exemplar trabium in laqueari aliquo dispositionem. Si verò fenestras alicubi optice delineare desideres, in centro C alligata duo fila, extendè in HH, intra enim fila CH, CH, quocunque loco fenestram pictæ suam opticam habebunt projecturam: non secus in opposita parte intra duo fila CI, CI. Si verò intra lineas CR, & CQ, portas delineaueris, habebunt & illæ suas projectiones. Vides igitur, sola filorum ope ex C centro ductarum optiarum projectionum omnem symmetriam inueniri posse. Si denique loco parallelorum normalium arbores, vel ambulacra hortensia varijs arborum, fruticumque fornibus contexta secundum parallelorum degradationem delineaueris; habebis dictorum operum opticam ad naturæ exemplar conformatam projectionem. Quæ omnia ex figura melius intelligentur, quam ego vel multis verbis explicare possim. Totum igitur hoc quadrangulum opticum dependet à prima degradatione pavimenti, supra cuius parallelas erectæ normales dabunt parietum, rerumque erectarum qualiumcumque projectionem; contignationum verò, portarum,

rum, fenestrarum ordine sitarum  $\lambda\omicron\zeta\omicron\delta\epsilon\omicron\upsilon\alpha\varsigma$  dabunt duo fila ex centro ducta: intra hæc enim fenestræ, portæ, imagines, siue statuæ depictæ dabunt projectiones quæ sitas. Vide figuram II. Iconismi II.

### Confectarium II.

**E**X hoc quoque patet, qua ratione homines, aliaque animalia in pavimento aliquo, secundum optice projectionem semper minores, & minores delineanda sunt. Si enim inter lineas CS, AC. ut factum esse vides, depinxis statuas, vel homines, & secundum hanc mensuram intra parallelas pavimento, quæ imaginis altitudinem comprehendant, correspondentes quocunque loco homines depinxis, habebis quæ situm. Hac arte dispones homines, animalia, & arbores, in plano quopiam optico iuxta eam diminutionis proportionem, quam optica requirit. Vide figuram III. Iconismi II.

Ex hisce omnibus Scenographicarum projectionum modis, quamvis nullus suapte natura cæteris præstantior sit, sed perfecti omnes, si ex artis præscripto instituantur: tamen pro locorum diuersitate, in quibus statuuntur, & è quibus spectantur, sit ex accidenti, ut non æquè accidentium oculis placeant. Nam si imensum lumen ex ea parte proueniat, qua depictæ sunt umbræ; imago oculos offenderet, cum necesse sit umbras lumini aduersas esse. Rursus si facta secundum catoptricam, imago ex inferiori loco videnda proponatur, non eam ostendit venustatem, quam si è superiori loco conspiciatur, atque eodem modo, quæ secundum anopticam facta est, si ex alto despiciatur, minus apparet perfecta. Tum verò pictura intuentium oculis facit satis, cum eum situm habet, secundum quem eius designatio est instituta. Similis fallacia contingit, cum ex obliquo aspicitur id, quod ex directo intuitu est deformatum, uti in imaginibus in præcedentibus propos. transformatis luculenter apparet: quæ ex aduerso quidem spectatæ nihil præferant; at ex obliquo visæ radio per exile foramen transmissio, ne extra regionem primæ institutionis vegetur, rem propria, & naturali forma exhibent.

### §. II.

*Regula, de mira pictura, quæ oculos ad te semper quocunque te verteris conuersos habet.*

**R**eperta est quædam ratio sanè mirabilis, qua humanus vultus ita ad viuum exprimitur, ut intuentem, quocunque loco steterit, defixa semper acie contueatur, haud secus ac si mobiles imago haberet oculos, quos ad omnem locum, quò se spectator conuertit, propria virtute circumferat: quam rem cum multi mirètur, nec tamen ratione eius assignare possint, nostrarum partium esse rati sumus aliquam pictoribus circa similitudinem imaginum designationem instructionem dare. Sciendum igitur est, quòd planæ imagines, tametsi nunquam perfecti us appareant, quàm cum ex præstituta oculi distantiâ, atque altitudine videntur, tamè non quantum à proprio loco oculis intuentis dimouetur, tantum expressa imago à veri similitudine aberrat. Nam nisi ad perpendicularem mesoptici plani respectum proximè accedas, quocunque te veritas eadem semper rei pictæ dispositio, ac partium responsus sese offert. Picturus igitur imaginem quocunque respicientem: ita operare. Sistas tibi se vir eo habitu, quo vuleris pro prototypo, qui tuos oculos perpetuò cõstanter, & immobiliter

*Regula in Pictura seruanda.*

*Præstituta Pictura.*

ter fixis oculis respiciat: huius igitur hominis te dicta ratione respicientis vultum, si ad viuum depinxis, habebis petitiu; semper enim quocunque te verteris in te respicere videbitur. Cuius rei ratio hæc est, quòd radiatio vtriusque oculi respicientis hominis in pictoris oculos facta pyramides fundet visuales, quarum bases sint oculi imaginis; quæ cum ad viuum à principio sint fundatæ, & iisdem perpetuò punctis insistant, ita & quocunque te verteris oculis tuis insistentes perpetuò te persequentur; cum situm, respectumque à principio acquisitum mira quadam vi, & proprietate, perpetuò conseruent. quod nunquam tamen fieri videmus, si oculi temerè delincentur; neque enim hoc vnquam in statuæ alicuius marmoreæ oculis successum habet. Cuius rei rationem damus, quod cum statuarum oculi sphericæ ut plurimum figuræ sint, & prominentes extra plani superficiem sit, ut basis pyramidis visualis perpetuam quoque mutationem subeat, neque oculi in obliquo respectu totam oculi basim comprehendant; unde, & consequenter memoratæ statuæ in omnem partem prospectus nullus erit. In solis igitur planis superficiebus huiusmodi in omnem partem imaginis alicuius prospectus dicta ratione fieri potest. Hinc Mortis imago cum arcu quidam ita artificiosè depingunt, ut telum arcui impositum quocunque te veritas non sine horrore in te explodere velle videatur. Innumera huius generis à pictoribus varijs occasionibus depingi possunt, ita ad naturæ exemplar efformata, ut nihil ipsis præter vitam deesse videatur. Non enim oculi tantum dicta ratione depicti, sed & optico ingenia instrumenta versus te directa in omnem partem projectionem mentientur, ut figura VI. Iconismi II. clarè docet; sed hæc industriosis pictoribus relinquamus.

*Cur statuarum oculi non respiciunt.*

f. l. 188.

### §. III.

*Regula de anoptica ratione qua scripturas, scamillos, fenestras ita describere iubemur, eæ ut in maxima altitudine appareant oculis inferioribus æquales.*

**M**axima Pictorum industria in hoc quoque consistit, ut res in maxima altitudine constitutas situ naturali referat, præsertim, si columnæ, trabes, fenestræ constituendæ sint. Obseruauit hanc rationem iam pridem Vitruuius lib. 6. cap. 2. his verbis: *Alia ad manum species esse videtur, alia in excelsis; non eadem in concluso, dissimilis in aperto, in quibus magni iudicij est opera, quid tandem sciendum sit: non enim veros videtur habere visus effectus, sed fallitur sepe ab eius iudicio mens. Cum ergo, quæ vera sunt, falsa videantur, & nonnulla aliter quam sunt, oculis probentur; non putat oportere esse dubium, quin ad locorum naturas, & necessitates, detractiones, aut adiectiones fieri debeant. Stylobatam ita oportet adæquari, ut habeat per medium adiectionem, per scamillos impares. Si enim ad libellam dirigatur alueolatus oculo videbitur. Quæ ita intelligenda sunt, supremæ videlicet planitiæ stylobata cum illa horizonti æquilibris cõstruitur, in medio adiectione faciendâ esse, inposito alio veluti plintho. cui ceu scāmillo, scānuloque; basis plinthus insistat, ne coronidis obtentu ab aspectu subducatur tanquàm in alueolū receptus, impactusque; Impares verò Vitruuij scamilli, quantò editiore loco sunt stylobatæ, tantò fiant & sublimiores; cuius rei licet pauca exempla in veterum structuris habeamus; illud tamen præcipuum videri debet, quod Pantheon templorum omnium, pulcherrimum, ac vetustissimum, tribus imparibus coronis in ambitu cinctum sit tanquam scamillis, quibus singulorum ordinum bases fulciuntur, ut integri ex inferiori loco spectari possint. Infimus, seu qui supra primum ordinem collocatus se-*

*Vitr. l. 6. cap. 2.*


*Pantheon Romanum.*

cun-

ter


cundum excipit, humillimus est; proximus huic, seu medius, elatior; tertius omnium excelssimus: quorum tota ratio ab opticis radijs, & coronidum proiecitur manifestè dependet. Quocirca & in testitudinibus non statim à summa coronidis planitie arcuum flexus inchoandi sunt, sed tantò altius, quantò radij eorum, qui ex ima cellæ parte in altum suspiciunt, ab aspectu suffurantur. Scamillis quoque veteres sæpissimè vsi fuerunt in ijs stylobatis, quæ solitarijs columnis, aut statuis clarissimorū vitorū supponere, vt tanquã è suggesto augustiorē ostenderent maiestatem; ac ob id etiam vel maximè, ne quod alioquin Vitruuius fore ait, Signorū imæ partes, cum ab ima parte spectantur, intra puteum depresso videantur. Exemplum

Columna Traiani  
Romæ.



Historia Phidias  
de Alcamone.

huius insignis artificij, præ ceteris præbet Columna Traiani, quæ etiamnum Romæ singulare Urbis monumentum, ornamentumque extat, in qua helices ita artificiosè ductæ sunt, vt interualla helicum superiora, etsi duplo inferioribus maiora, equalia tamen omnia ex imo conspecta compareant. Sint igitur in columna aliqua statuæ collocandæ, & contignationes ita ordinandæ, vt inferior superiori, & omnes inter se equalis videantur, ita operare: Sit Columna AD, cuius contignationes sint AK, KI, IH, HG, GF, FE, ED: ex B, veluti puncto oculi ducatur quadrans AC, diuisus in tot partes equalis, quot contignationes in columna DA: ex centro enim B, per partes in quadrante AC, lineæ ductæ secabunt columnam AD, in punctis, intra quæ fenestæ, picture, scripturæ, imagines, & similia collocata inferius constitutis in B, omnia apparebunt equalia. Quod hisce ostendo: iuxta dictâ enim hypothèsim: Quæcunq; sub equali angulo videtur equalia videtur; at AK, KI, IH, HG, GF, FE, ED, sub equalibus angulis ex hypothèsim videtur: ergo. Res omnino facilis est, & magnos in Architectura vsus habet. Harum rationū peritissimus Phidias de Alcamene, vt est apud Tzetzem, victoriam reportauit. Ambo enim statuariam exactè callabant & Phidias quidem opticæ peritus ad aspectus locique naturam signa facere erat solitus: Alcamon verò ad constitutas tantum parietum symmetrias. Quare cum aliquando oporteret populum Atheniensem duas statuas Mineræ in excelsis columnis statuere, vtrique commissum est opus. At Phidias haud ignarus breuissima apparere quæ in sublimi sunt, fecit statuam hiantibus labris, & naso distracto, & ceteris membris ad conditionem loci deformatis, quæ in excelso collocata magnam præ se tulit artis dignitatem; Alcamonis verò opus cunctis risui fuit & ludibrio.



## §. VI.

## Regule de lumine, &amp; vmbra Scenarum,

Siue

## De Arte Pictoria.

DE graphide dictum est nunc de lumine & vmbra, quæ propriè ad Pictores pertinent, dicamus; hi enim factis designationibus, lumen, vmbraque adhibent, ac subinde etiam proprios cuiusque rei colores. Cum verò ea omnia, quæ in scenarum descriptione vsu venire solent, vel rectæ sint lineæ, vel circuli, vel obtorti sinus nulla certa lege curuati; sintque iam horum omnium rationes propositæ; patet nulla alia re opus esse, ad propositas scenas hoc projectionis genere explanandas. Igitur, vt lumina in proiecctas iam formas aptè ducantur, primò id admonendum censo, in quo plurimos hallucinari video: aliter à lucernis, aliter à Sole diffusos radios luminis admitti: non verò vno eodemq; modo illustri ea, quæ in aperto sunt aère, & quæ fenestris obijciuntur in concluso; alia denique ratione è pluribus luminaribus, alia ab vno lumen suscipi: nam quæ à lucernis, aut suscepto per fenestras lumine in concluso illuminantur, secundum scenographiam ita exprimi debent, vt lumine quidem parcius, vberius verò vtrinq; perfundantur. Quæ autem directos Solis radios admittunt orthographice sunt designanda, ita vt parallelis radijs ex æquo lumen, vmbraque descriptæ figuræ participent. Denique quæ in aperto sunt aère, pari vndique lumine circumfusæ exhiberi debent, vt pote, quæ omni propemodū parte vmbra excludit. Hoc præterea sedulo est adnotandum, quod ad Opticum spectat: si pictura in pictura exhibenda sit, non secundum eum intuitum, quo antea facta est, illam designari debere, sed vt in præsentem aspicitur. Quæ in re Pictores plurimi haud vulgares, at rerum opticarum imperiti, sædè labuntur.

Quid in lumine  
& vmbra ser-  
uandum.

His igitur nunc ita ritè constitutis, nihil restat, nisi vt de proportione, lumine, & vmbra Pictoribus iudiciosis aliquid proferamus: quæ etsi meæ professionis nec sint nec in actum practicum quicquam horum induxerim; quæ tamen mihi continua speculatione exercitatum naturale iudicium circa huiusmodi dictauerit, hic libens promam, memor Musicorum, qui etsi præstantissimas harmonias, & summo iudicio constantes componant, ipsi tamen minimè ad eas voce promendas apti videantur: memor quoque ipsius Horatij.

Fungar vice cotis acutum

Reddere, quæ ferrum valet exors ipsa secandi.

## Regula I.

Quicumque igitur ad aliquem in hac nobilissima arte perfectionis gradū peruenire desiderat, is maximè sibi hanc artem lucis, & vmbra, opticæque fundamenta, quæ sunt totius graphices basis, & fundamentum, addiscenda esse sciat: sine hisce enim neque quicquam cum iudicio, neque ex præcepto artis & naturæ se perfecturum esse nouerit. Hisce ritè imbutus, diligenter celebriorum Pictorum monumenta inspiciat, omni diligentia, & cura imitationem eius,

quod melius est, procurando, assidua mente recolendo umbrarum, luminumque differentias; quibus projectionibus lumen competat clarum, quibus umbrarum, habito semper respectu loci, temporis, historiae; quae umbrarum obscuriores, quae mediae, quae tenebris similiores, quando secundum naturam terminent oras, & limbos imaginum, & quomodo sensum lumine affuso se perdant; habito in omnibus respectu loci, temporis, & historiae: alia enim historia meridie exhibita, alia sub auroram, alia nocte: quas circumstantias temporis umbrarum differentiae necessario sequuntur. Ex his quoque scenographice fundamentis discent projectionem domuum, templorum, turrium, rerum instrumentalium, sedium, leaeorum, camporum, fluminum, ipsarumque imaginum respectus, earundem situm projectionis naturalem. Contra artem enim grauissime peccant, qui vel minimum in hisce, quae distantiam aliquam praefertunt, cespitauerint; ut aut vicina aequo minora, aut distantia aequo maiora obiecta delineauerint.

Qua ratio luminis & umbrarum notanda in pictura.

Quomodo oculis luminis accommodandus.

Gestus, & proportio membrorum diuersum situm obinensium notanda.

Habenda ratio dispositionis corporis.

### Regula II.

AD umbras imaginum plurimum confert, si ob oculos sibi posuerint insignes statuas, siue etiam homines bene proportionatos, atque ex naturali archetipo discant, flexuras, habitus, gestus, situs singularum partium cum umbris suis, & luminibus. Quae omnia singulari, optimoque successu perficient, si oculum infra obiectum aliquantulum constituant, lumine ab albo, & si fieri posset, a plaga Septentrionali, non a Meridie, ob nimis intensam, & variabilem lucem, qua imagines quasi obtunduntur, & infelicem sortiuntur successum, traiecto. Similes errores nostri Academici Pictores Romani committunt, qui noctu ad lumen candelae similia attentare solent, nisi maxima, & singulari industria umbrarum cruditer emendare sciant.

### Regula III.

CORPUS humanum praeter reliquis sibi proponant, singulari industria obseruando proportionem partium adinuicem, sine quarum noticia, ut plurimum omnis Pictura monstruosa euadit, & ridicula; obseruando interim naturam, sexum, aetatem, conditionem, & circumstantias; alia enim est proportio corporis humani in puero, alia in viro, alia in senes, alia in mare, alia in femina; quae iudiciosissime in opere integro maximus ille Pictorum Albertus Durerus describit. Dispiciat quoque quem singulae partes, totumque ad partes situm habeant: alia enim est proportio membrorum hominis humi iacentis, alia stantis, sedentis alia, alia alio situ constituti, alia membrorum extensorum, contractorum, incuruatorum dispositio; alius gestus senis, alius iuuenis, alius pueri.

### Regula IV.

DISCANT Physiognomiam corporis humani, qualitatesque hominum, quos adumbrare cogitant summo studio addiscant; ut corpus forte, & validum a molli, tenero, & debili; virile a iuuenili, Gyantis a Nani distinguere sciant; viuacitatem a tristitia, iram a mansuetudine, tristitiam a luctu, ceterasque omnium passionum virtutibus contrapositas, prout illum docebat historiae circumstantiae, lineamentis, umbris, luceque exprimere studeant. Mortuorum quoque a uiuis, dormientium a vigilantibus discrimen obseruandum est.

Regu-

### Regula V.

STATUAE quoque obseruanda dispositio situsque sunt, ut currentes, ascendentes, descendentes, surgentes, sedentes, ambulantes, situ corporis secundum ita rationem ordinato disponant; lineam directionis in omnibus seruando, & propendentiam membrorum. Ita Pictor ascendens, aut descendens imaginis situm expressurus; picturam ineptam faceret, si eam perpendiculariter, & secundum lineam directionis situaret; ascendens igitur aliquantulum sit inclinatus, & secundum descendens. Idem de portantibus onera intelligendum; alius enim dum iacet aut stat est situs porrigentis manum; alius manum eleuantis situs; alius a terra, alius ex sublimi accepturi quippiam. Quae non tantum in homine, sed & in animalibus obseruanda sunt. Vnde in Equo Castoris, & Pollucis in Capitolio etiamnum praesente foedissime erratum est a sculptore, dum equum expressit duobus pedibus non decussatim oppositis, sed vnus lateris insistentem: quod cum contra naturam sit, & motum progressuum animalium, dici vix potest, quantum oculis peritorum tormentum iniiciat. Dico de stante Equo: Nam hisce temporibus non desunt Hippodidascali, qui Equos subinde vno latere incedere cogat; quem tamen in cessum continuare non multum valent.

Error in statu Castoris Capitolini.

### Regula VI.

HIS ita iudiciosè expensis, non immerito sequitur iam id, quod in pictoria arte perfectissimum, & totius artis complementum vltimum cenletur; colorum videlicet vnicuique rei ad viuum exprimendae adaptatorum temperamentum, sine quo nihil in hac arte dignum efficias: hi enim, si nimis lucidi fuerint, partes vicinae veluti disgregatae molestia oculos ipsos afficient; si nimis obscuri, vicinos obscurando deturpabunt; si varij, confusionem caufabunt. Sint igitur haec regulae. Nullus color reflectens in superficiem alterius corporis refert in illa superficie tincturam proprii coloris, sed apparebit mixtus cum coloribus aliorum corporum reflexis. Si fuluum, & caruleum reflectant in superficiem candidam, resultabit mixtura viridis, uti fuscè supra lib. I. ostendimus. Ita ruber & caruleus caufant purpureum; & quemadmodum contraria iuxta se posita magis elucescunt; ita colores, quod sunt distinctiores, iuxta se positi magis illustres sese exhibent: quas colorum differentias sequuntur reliquae designationes affectuum. Ita puer cum viro, iuuenis cum senes, femina cum viro, debilis cum forte, laetus cum tristi compositi, expressique, magis ad naturam accedunt, & proinde gratiora visui.

Temperamentum Colorum.

### Regula VII.

MVTUM quoque interest, Pictorem summo studio affectare naturam rerum inanimatarum, ut arborum, plantarum, fluminum, marium, distantiam in singulis, cum colore proportionato seruando; ita ut praesentia colore naturali; remota omnia ex viridi in caruleum tandem proportionali decremento colorum desinant. Aquam quoque, quae tincturae omnis coloris capax est, eo colore tingat, quo imbui potest ab obiectis praesentibus: ita nubes nigrae & rubrae, nigro & rubro; arboris viror viridi colore imbuit: quae omnia ad exemplar naturae obseruanda sunt. Suus quoque nunc pacato, nunc irato mari color dandus est: suus fluminum cursibus, nunc saxis spumantibus interruptis, nunc variè crispatis aquis.

Bb 2

Regu-



## Regula VIII.

**I**N habitibus quoque depingendis diligenter obseruent simbriarum flexuras, plicasque vestimentorum cum umbris suis: alia enim plicarum vestimentorum in homine stante, alia in sedente, alia in diuersis gestibus, quos edunt, ratio est: quæ certè nulla alia ratione adisci poterunt, quàm ab ipsa natura, seu viuo hominis vestiti exemplari. Quæ quicumque serauerit, haud dubiè omnes ingeniosi Pictoris partes explebit.

Multa hoc loco de exoticis quibusdam colorum misturis, picturisque dicenda, erant: sed quia illa plerunque in lib. 10. Magiæ lucis & umbræ distulimus, idè superuacaneum esse ratus sum ijs diutiùs hoc loco immorari.



ATHANASII KIRCHERI  
E SOC. IESV PRESBYTERI  
ARTIS MAGNÆ  
LVCIS ET VMBRÆ

Liber Tertius.

GNOMONICÆ CVRIOSÆ  
APPARATVM  
CONTINENS.

P R A E F A T I O

**I**NCEM in hoc Magna Artis Opere sub duplici ratione consideramus. Primo, prout ipsa immobilis in omnibus mundi corporibus existit; deinde, prout mobilis, motu suo vario, varias in hominum animis scientias parit. Postquam igitur à prioribus duobus libris omnia immota lucis latibula discussimus; nihil modo restat, nisi ut in sequentibus omnes & singulas lucis mote semitas perscrutemur; quod tribus omnino libris fiet. In his enim lux omnes Cælorum motus & accidentia ita exhibet; ut immensa illa Cælorum volumina non iam remotè, sed eorundem in terrena hac habitaculorum gurgustia trāsatorum arcana in campo lucido veluti umbroso quodam digito demonstrata coram intueri possimus. Quamobrem ei haud incongruè nomen Gnomonicæ Curiosæ indidimus. Quicquid enim in Gnomonica uniuersa nouum, rarum, eximium, curiosum est, sequentibus tribus libris methode singulari, facilitate maxima, & breuitate, ni fallimur, lucidissima pandimus. Et ne morosa mathematicarum demonstrationum tractatio curiosos Lectores (quæ & nonnullis in Clauio displicet) alicubi offenderet, totius Gnomonicae theoriæ in hoc libro, quem & ideo Apparatum ad Gnomonicam notauimus, præmittere visum est; ut Lector sine Remora, aut offendiculo sequentibus libris procedendo, dulcissimis Theoriæ fructibus impensius fruereetur. Inuenient hic Prælici, quod ament; erunt & Mechanicis obiecta, quibus applaudant: trado multa & pleraque maioris momenti à me reperta, theoreticis haud dubiè nouam innumerarum speculationum sobolem paritura: & cum varietatis amans sic insatiabilis sciendi appetitus, mathematicis haudquaquam contentus angustijs, sed


sed & in amplissimos Physica campos subinde prorumpens, Physicam Mathematicam omnino coniungere studui: quo factum est, ut ex hoc physico-mathematico coniugio noua quadam soboles emer serit, quam si Gnomonicam physico-astronomicam dixerō, nomine eam proprio appellare videbor. His igitur ita constitutis, nil restat, nisi ut Gnomonica Curiosa calamum applicemus.

# APPARATVS IN GNOMONICAM CVRIOSAM


## DEFINITIONES.

- I. **A**RS Gnomonica est certa, & demonstratiua motuum coelestium in quolibet plano, aut superficie representandorum facultas.
- II. **A**nnus Gnomonicus est umbra gnomonis à puncto meridiano tropici cancri ad idem meridianum tropici punctum reuolutio, atque cum tropico anno idem est.
- III. **M**ensis Gnomonicus est spacium, quod umbra gnomonis ab vno parallelo signi ad alterius sibi succedentis signi parallelum conficit.
- IV. **D**ies Gnomonicus est arcus, quem umbra gnomonis ab ortu Solis ad eiusdem occasum in concava superficie conficit, atque idem est, ac dies artificialis, videlicet mora Solis supra horizontem. Dixi, in concava superficie, quia in planis superficiebus umbra ob immensitatem suam, diem artificialem, siue arcum diurnum non exacte mensurat.
- V. **H**ora Gnomonica est spacium, quod gnomonis umbra à linea horaria, ad lineam conficit.
- VI. **A**stròlabium Gnomonicum, siue Sciathericum, est instrumentum, siue organum, in quo totius primi mobilis doctrina gnomonis umbra demonstratur.
- VII. **H**orologium sciathericum est instrumentum, quo tanquam sermone loquentis horarum spatia, gnomonis monstrantur umbra: siue sciatherica sunt organa, in quibus omnis horarum notitia ex umbra Solis, aut Lunæ, aliorumque radijs vmbre vim obtinentibus indagatur, à *σκιά*, quod vmbra, & *θηρὰ* quod venari, & indagare significat.
- VIII. **T**riangulum Gnomonicum est portio analematis circuloꝝ cœlestium, locum, & altitudinem gnomonis vna cum angulis poli, & equatoris supra datum planum manifestans.


Conus.




Parabola.



Hyperbola.



Ellipsis.




IX. Conus

- IX. **C**onus Sciathericus est figura solida, quam Solis motus diurnus vmbre in planum quoddam proiectione decircinat: cuius apex est ipse vertex gnomonis: basis verò parallelus, quem Sol describit. Ita ABC conus est, cuius A vertex gnomonis, BC parallelus Solis ab vmbra descriptus.
- X. **P**arabola Gnomonica est sectio conici sciatherici, quam efficit planum quoddam lateri conici parallelum. Vt in cono ABC parabola est NPQ, cuius axis NO parallelus lateri AC, conici ABC.
- XI. **H**yperbola Gnomonica est sectio conici sciatherici, quam efficit planum quoddam per quodcunque producti lateris ultra verticem punctum basim porrectum in *ἀπὸ ἀλλήλων* lateri conici. In Conis figuræ appositæ ABC, & AFG, hyperbolæ sunt KMD & EOI.
- XII. **E**llipsis Gnomonica est sectio conici sciatherici, quæ, dū planum quoddam conum obliquè, quolibet extra basim puncto secat, efficitur, vt in adiuncta figura conici ABC, ellipsis est PR.
- XIII. **P**lanum conotomum vocamus illam superficiem planam, quæ conum sciathericum incurrens eum quacunque ratione secat. Quam sectionem ipsæ parabolæ, hyperbolæ, & ellipses referunt.
- XIV. **A**xis conici sciatherici idem est, quod axis mundi per centrum basim, & apicem conici transfrens; axis autem sectionis est linea in plano sectionis ex apice ad basim porrecta, basim bifariam secans. Cuiusmodi in parabolâ est NO, in hyperbolâ KMD, linea DD, in ellipsi denique PR.
- XV. **C**ordæ sectionum, quas alij ordinatim applicatas appellant, sunt lineæ parallelæ axem sectionis *πρὸς τὰς ὀρθὰς* intersecantes, in ambitu sectionis porrectæ; Cuiusmodi sunt sectionum conicarum bases.
- XVI. **S**emiordinatæ media pars chordæ dicuntur. Vt in parabola linea EF.
- XVII. **C**entrum reflexionis dicitur punctum illud, in quod omnes in superficiem sectionis incidentes radij reuerberati conflunt; cuiusmodi in ellipsi hic apposita sunt NO. Et si verò Apollonius exiguum huius mentionem fecerit, est tamen magna considerationis punctum, cum ex eo omnes proportionem, & utilitates in vltis humanos emanent, vt in Horographia prodigiola pluribus ostendetur.
- XVIII. **L**atus rectum sectionis alicuius Gnomonicæ est linea æqualis ordinatim applicatæ, quæ per centrum reflexionis ducitur; iuxta quam omnes reliquæ semiordinatæ certam mensuram & proportionem habent. Hanc in figura parabolæ refert linea DS.
- XIX. **L**atus primarium sectionis gnomonicæ est in cono circuli diameter, à quo sectio principium ducit.
- XX. **L**atus transfersum in hyperbola gnomonica est axis eiusdem hyperbolæ ultra verticem producta, cum latere conici opposito similiter producto concurrens, cuius medium punctum vocatur centrum sectionis, eò quod proportio lateris transfersi vna cum suo addito ad semiordinatas ita se habeat, vt partes secti diametri (vt postea demonstrabitur) aut circuli ad semiordinatas. Latus transfersum in hyperbolæ figura est ED.

XXI. AC

XXI.



Asymptotæ, seu intactæ vocantur lineæ lateri hyperboles semper viciniorès, nunquam tamen etiam in infinitum productæ, cum ea concurrentes. Vti sunt in hac figura lineæ FG, quæ semi-hyperbolæ CA semper quidem vicinior, nunquam tamen concurrentes quantumvis productæ.

XXII. Oppositæ sectiones hyperbolæ gnomonicæ vocantur, quæ in duobus conis similibus vno vertice coniunctis sectiones in vtriusq; coni base terminatas habent. Vti in figura hyperbolæ apparet.

## HYPOTHESES, seu PRONVTIATA.

- I. **T**erra *γνομωνικός* est vnum punctum sensu, non ratione imperceptibile, quod apex gnomonis in sciathericis refert.
- II. Radius umbrosus cum radio luminoso, à quo procedit, in directum extenditur; siue, quod idem est, umbrosus radius cum luminoso vnam lineam rectam conficit.
- III. Umbra finita partim opaco corpore, partim luminoso circumfuso, veluti extrinseco termino definitur.
- IV. Corpus opacum in aduersam luminis partem umbram projicit.
- V. Vti puncti umbra semper est linea, ita lineæ umbra superficies, & corporis umbra semper est corpus.
- VI. Moto, seu luminoso, seu opaco; & umbra pariter mouetur.
- VII. Lumen, umbraque circa immotum opacum corpus oppositis mouentur lationibus, hinc dextra sinistra, sinistra dextra parte gaudent; corpus verò luminosum, quò altius, tantò breuiorem, & quò inferius tantò maiorem à gnomone erecto normaliter umbram projicit.
- VIII. Luminosus, umbrosusque radius pari motus velocitate ciuntur.
- IX. In eodem circuli plano semper existunt centrum Solis, centrum terræ, & umbræ extremum: vnde consequenter dum Sol 15. partes perambulat, totidem terminus umbræ in opposito peragrat; dumque Sol in cælo describit circulum, terminus in opposito plano æquidistante circulum similem, describet.
- X. Umbræ, quas styli recti æquales eidem plano in centro terræ, vel planis inter se parallelis in superficie terræ infixi projiciunt; sunt inter se æquales sensu.
- XI. Plana sensu non distant, & radij solares in oppositas partes delati sensu non distant.
- XII. Vertex gnomonis cuiusque sensu cum centro terræ congruit, vti & axis obliquus horologiorum.
- XIII. Centra instrumentorum astronomicorum sensu à terra non distant, & superficies eorundem, seu limbi cum circulis cælestibus sunt *ὁμοκέντροι*, & consequenter tota terræ diameter vnum punctum; tota enim terra est punctum cæli: ergo quodvis in ea punctum idem cæli centrum est.

# PARS PRIMA THEORVM MENA.

## Protheoria I.

### De requisitis ad Artē Gnomonicam, siue Astronomicam Sciathericam.



VM finis noster in hac Arte Gnomonica fit, totius primi mobilis doctrinam in datum quodcunque planum projicere, vel quæcunque astrolabij, planisphærijque passim inuestigare solent Astronomi, ea hic sine labore vilo solius umbræ projectione, veluti radio quodam digito perpetuò demonstrare: ad hoc quidem præstandum sex potissimum scitu necessaria discutienda sunt.

Primò, circularum cælestium, horarumque gnomonicæs describendarum exacta notitia.

Secundò, planorum, in quæ projectio gnomonica fieri debet, discernendorum exactum iudicium.

Tertiò, gnomonis, seu indicis, aut styli omnium monstratoris qualitas, situs, positio.

Quartò, projectionum, sectionumque in planis causatarum natura, & effectus.

Quintò, pragmatica sectionum, projectionumque dictarum in tabulas reductio.

Sextò, superficialium in planum projectio.

Atque hisce sex, cum totius artis huius moles veluti basibus quibusdam incumbat, eaque ingentem rerum considerandarum materiem secum trahant, de singulis seorsim tractandum operæ præcium duximus.

## CAPVT I.

### De definitione circularum cælestium, eorumque in Horographiæ officijs.



**P**TOLEMAEVS iuxta triplex horologiorum (nempè horizontalis, verticalis, ac meridiani) genus, tres quoque tantum circulos maximos in qualibet sphaeræ positione sese ad angulos rectos, vti horizontem, meridianum, & verticalem propriè dictum intersecantes in analemmate suo considerat. Quilibet enim horum trium circularum per ea, quæ à Theodosio lib. 1. propof. 15. demonstrantur, rectus est ad duos reliquos, cum per eorum polos ducatur. Communes quoque eorundem circularum sectiones in centro mundi mutuò inter se rectos constituunt angulos, propterea quòd quilibet duo horum circularum ad reliquum recti sunt, vt diximus, & propterea communis quoque eorum sectio ad eundem perpendicularis. Communis autem sectio horizontalis, & meridiani appellatur

*Communes circularum sectiones quid sint.*

C c

à Pro-

à Ptolemæo linea meridiana, Sectio verò communis horizontis, & verticalis dicitur linea æquinoctialis, eo quòd sit communis etiam sectio horizontis, & æquinoctialis circuli. Communis denique sectio meridiani, & verticalis Gnomon vocatur, Ecce hi sunt circuli, quorum Ptolemæus mentionem facit, vnicuique ex ijs certum motum tribuens. Nos verò latius diuagantes, latius quoque circulorum globosam cœli superficiem ambientium differentias explicandas assumptimus; pluresque, pro officiorum, quæ in gnomonico hoc negotio obtinent, multitudine, ac diuersitate statuimus. Procedentes verò *in uelut* omnes circulos cœlestes in triplicem diuisimus classem. In prima classe sunt omnes ij circuli longitudinis, qui in polis mundi sese interfecantes occurrunt; vti sunt meridiani, colurus vterque, horarij circuli, & similes. In secunda classe occurrunt omnes ij, qui ad horizontem sunt paralleli, veluti circuli altitudinum, quos Arabes *Almucantarath* vocant; ad has reuocari possunt paralleli Solis in sphaera obliquissima. In tertia classe constituiimus omnes illos, qui concipi possunt inter polum mundi, & horizontem intermedij; quorum iterum magna est differentia; alij enim ad axem mundi recti, veluti omnes Solis circuli ad æquatorem paralleli; alij verò ad horizontem recti, vti sunt circuli verticales, quos Arabes *Azimuth* nominant, considerantur; alij denique, qui neque ad horizontem, neque ad mundi axem recti; sed obliqua interfectione, & ad hunc, & ad illum facta in cœlo concipiuntur, cuiusmodi sunt Zodiacus, & omnes circuli, qui concipi possunt, huic æquidistantes; item circuli positionum, domorumque cœlestium, aliorumque; de quibus omnibus ordine agendum.

*Triplicem Classis circulorum.*

*Almucantarath*

*Azimuth*

### DEFINITIONES.

**I.** Meridianus circulus est ille, qui per polos mundi, & verticem loci ducitur, supereminetque alijs maioribus in sphaera materiali, cuius axis est linea meridiana; atque in hoc sumitur altitudo poli, cuiusvis loci.

**II.** Aequinoctialis circulus in sphaera dicitur ille maior, qui ex mundi polis est descriptus, æqualiterque ab vtroque polo mundi secundum omnes sui partes remouetur.

**III.** Zodiacus circulus est oblique secans in duas medietates æquinoctialem, cuius poli tantum à polis mundi recedunt, quantum Zodiacus ab æquatore in Septentrionem, vel Austrum remotus elongatur.

*Horizon*

**IV.** Horizon est circulus maximus ex vertice, seu puncto Zenith, tanquam polo descriptus, diuidit meridianum ad angulos rectos sphaerales; dicitur à Latinis *Finitor*, eo quòd hemisphaerium visum à non viso separat; à Græcis *ὄριζων*, *κέντρος ὀρίζωνος*, *ἡμισφαίριον ἀπορροῦν ἀπὸ τοῦ ὀρίζωνος*.

*Paralleli Solis*

**V.** Paralleli Solis, seu circuli Signorum Zodiaci, sunt illi, qui æquidistantes æquatore ad motum Solis, Lunæ, reliquorumque astrorum intra duodecim signa Zodiaci constitutorum circa terram, centum mundi, tantò magis, quanto ab æquatore magis elongantur, describuntur. Hi omnes iuxta sphaera diuersitatem, diuersimodè quoque considerari possunt; sub sphaera recta omnes ad horizontem recti, media parte apparent, media verò delitescunt; sub sphaera obliqua horizontem obliqua sectione radentes, nunc supra, nunc infra, pro signorum constitutione, portionem maiorem, aut minorem exhibent. Sub sphaera verò obliquissima ad horizontem paralleli, seu æquidistantes, perenni vel apparitione, vel occultatione constituuntur.

Ex his omnibus semper partim supra horizontem conspicuis, partim infra latent-

gentibus. Duo sunt omnium maximi, quasi ex duobus mundi polis vno circini pede in altero polorum fixo, altero ad horizontem vsque extenso, descripti; quorum vnus ab Astronomis maximus semper apparentium; alter verò maximus semper occultorum, appellantur. Et quamuis alter alteri semper sit æqualis, & par; nemo tamèd existimet vtramque semper eiusdem esse magnitudinis; ambo enim tantò maiores existunt, & inter se viciniores, quanto horizon existit obliquior; adeò vt sub alterutro polorum de gentibus eiusmodi circuli prorsus in vno coeant, & cum æquatore coincidant. Sub polaribus verò duo tropici horum circulorum fungentur officio, & vicissim sub tropicis habitantibus polares eorundem duorum parallelorum munus obibunt. Hi namque paralleli in omni regione inter se semper æquales, & æqualiter ab æquatore remoti, vti constat ex propof. 6. lib. 2. Theodosij, vbi demonstrat ipse vnam ex proprietatibus circulorum sphaeræ, quæ est huiusmodi. Circulus in sphaera maximus, qui aliquem circulum non maximum tangit, tangit quoque alium non maximum illi æqualem, & parallelum. Cum ergò circulus maximus, nempe horizon, tangat parallelum semper apparentium maximum supernè, idem infernè tanget circulum maximum semper occultorum illi oppositum. Vbi nota aliud esse circulum maximum simpliciter; aliud maximum cum adiunctione; hi enim dicuntur maximi comparatione aliorum minorum.

*Duo circuli, alter semper apparentium maximus, alter non apparentium.*

**VI.** Circuli verticales dicti *Azimuth* sunt circuli maximi sese in puncto verticis, & imo pedum interfecantes ad horizontem recti.

*Circuli Azimuth quid?*

**VII.** Circuli altitudinum dicti *Almucantarath*, circuli sunt horizonti æquidistantes, qui quantò ab horizonte sunt remotiores, tantò magis magisque diminuuntur; horum maximus est horizon. Vocantur circuli altitudinum, eo quòd altitudinem alicuius astri super horizontem eleuati determinant; suntque in figura circuli 90. horizonti paralleli.

*Circuli Almucantarath quid?*

**VIII.** Circuli cœlestium domorum, seu positionum sunt duplicis generis; iuxta Regionum tantum enim nihil aliud sunt, quam ij circuli, qui transeuntes per communes horizontis, & meridiani sectiones, æquatorem in duodecim æquales interfecant partes; iuxta Campanum verò nihil aliud sunt, quam circuli transeuntes per communes sectiones horizontis, & meridiani, & verticalem primarium in duodecim æquales partes interfecantes.

*Circuli cœlestium domorum.*

**IX.** Paralleli ciuitatum, seu circuli latitudinum, ab arcibus, seu parallelis signorum non differunt; Sunt enim circuli æquatore æquidistantes, Circuli quoque declinationis Solis dici possunt. Atque hi sunt præcipui circuli, de quibus in hac Gnomonica agetur.

*Paralleli Ciuitatum.*

Ex quibus quidem clarè cognoscere poteris omnes circulorum situs, & interfectiones ad meridianum, & horizontem; queis cognitis nullam habebis in sequentibus difficultatem. Quare diligenter sese in ijs sibi firmiter imprimendis allaborabit Lector, antequam ad sequentia progrediatur.

### *De officijs circulorum cœlestium in Astronomia Gnomonica.*

#### **§. I.**

#### *De Circulis verticalibus.*

**C**irculi verticales, quos Arabes *Azimuth* appellant, sunt circuli maiores, qui per cuiuslibet loci verticem, seu *Zenith*, ad singula horizontis puncta deducuntur, sese inuicem in *Zenith*, & *Nadir* interfecantes. Omnes autem hi circuli

rectos cum horizonte angulos sphaerales constituunt, suntque ipsorum plana ad planum horizontis recta per 22. primi libri Theodosij. Et quoniam totus horizon- continet 360. gradus, per quorum semper duos oppositos quilibet verticalis incedit, efficitur, ut in uniuersum sint 180. circuli verticales, quamuis per singula horizon- tis puncta, prout vsus exigit, eos transire Astronomi imaginantur, quæ ratio- ne propemodum infiniti erunt.

Inter hos autem circulos verticales annumeratur quoque Meridianus; transit enim & ipse per verticem cuiusvis loci. Quem quidem meridianum vnus tantum- modò verticalis circulus in vertice ad angulos rectos interfecat; & hic peculiari, ac proprio vocabulo, Circulus verticalis per antonomasiam solet appellari, transit- que per communes sectiones Aequatoris cum Horizonte, qualia sunt in hac figu- ra D, E, quæ veri Orientis, & Occidentis puncta dicuntur.

Meridianus quoque circulus, & verticalis propriè dictus, totum hemisphaerium supernum in quatuor quartas distinguunt; quarum duæ orientales dicuntur, ut est ea, quæ vergit in Meridiem, diciturque orientalis meridiana; & ea quæ versus Se- p- tentrionem portigitur, appellatur orientalis Septentrionalis. Duæ verò occi- dentales nuncupantur, quarum altera occidentalis meridiana, quoniam in meri- diem, excurrit, vocatur; altera Septentrionalis occidentalis, quòd Septentrio- nem respiciat. Quamuis verò omnes circuli verticales maiores sint, non tamen in hemisphaerio inferiori nobis occulto describi solent, sed in superiori tantum nobis manifesto, eo quòd nullum habeant vsum apud Astronomos in inferiori hemi- sphaerio, vel certè rarum admodum vsum. Quoniam verò circulos omnes vertica- les per cuiuslibet loci verticem incedere diximus, perspicuè colligitur, illos nun- quam locum mutare, nisi vertex mutetur. Vnde in quolibet hemisphaerio, hi cir- culi immobiles prorsus concipiendi erunt; alij tamen, atque alij in varijs hemi- sphaerijis.


Excogitati sunt autè circuli verticales ab Astronomis ad varias syderum obser- uationes. Primo enim officio horum circularum distantiam amplitudinemue Solis, & reliquorum astrorum à vero ortu, & occasu, venamus, ac determinamus, quan- do videlicet astra oriuntur, seu supra horizontem ascendunt, vel occidunt, seu in- fra horizontem descendunt. Ostendit namque nobis circulus verticalis, qui tunc per centrum syderis transit, quantus sit arcus horizontis inter sydus, dum ex parte orientis horizontem contingit, & punctum veri orientis; quem quidem arcum horizontis, amplitudinem appellamus ortiuam, quæ distribuitur in Septentrio- nalem, & Meridionalem, prout stella fuerit in quarta Septentrionali ortiua, vel me- ridionali ortiua. Pari ratione ostendit nobis circulus verticalis, quantus sit arcus horizontis inter sydus, dum ex parte occidentis horizontem contingit, & pun- ctum veri occidentis; quem quidem arcum, amplitudinem dicimus occiduam, quæ etiam diuiditur in occiduam Septentrionalem, & Meridionalem, sicut de amplitudine ortiua fuit explicatum. Itaque per verticales circulos cognoscimus, quanta sit Solis, vel alterius cuiusvis stellæ amplitudo tam ortiua, quam occidua, si tamen amplitudinem habet; habent autem omnia astra extra circulum equino- ctialem posita amplitudinem; sola enim sydera in equinoctiali circulo collocata omni carent amplitudine. Hanc porrò amplitudinem, siue ortiuam, siue occiduam vocant quoque Astronomi latitudinem ortus, vel occasus.

Secundò, per circulum verticalem propriè dictum cognoscimus, in qua mundi quarta quæuis stella collocetur quouis tempore; ob quam causam non incommodè à nonnullis isti circuli verticales dici solent circuli rectitudinum. Quanti autem referat hæc cognitio, in qua videlicet mundi parte Sol reperiatur qualibet hora diei; non ignorant ij, qui vel mediocriter in Analemate Ptolemæi sunt versati; nam ipse per hanc distantiam Solis à verticali propriè dicto, quæ quidem per reli- quos

Circulus Ver- ticalis.

Ad quid profici- Verticalis cir- culus.

Amplitudo or- tiua, & occidua quid?



Meridianum, & linea ED, æquatorem.

quos verticales circulos habetur, horologia horizon- talia describit. Cæterum in superiori figura ducti sunt circuli verticales denis inter se gradibus dis- tincti ob angustiam figuræ, in qua A, est sectio com- munitis horizontis cum meridiano Septentrionalis; C, sectio communis horizontis cum meridiano me- ridionalis; B, vertex capitis; D, sectio communis hori- zontis cum æquatore orientalis; E, sectio commu- nis horizontis cum æquatore occidentalis; Circulus denique ADCE, horizontem repræsentat; ABC, me- ridianum, & linea ED, æquatorem.


§. II.

*De Circulis altitudinum.*

Circuli altitudinum, quos Arabes *Almucantarath* Latini plerique circulos pro- gressionum vocant, sunt qui ex cuiuslibet loci vertice, seu polo, horizonti æquidistantes, seu paralleli describuntur, diuidentes cuiuslibet verticalis circuli quadrantem à *Zenith* ad horizontem vsque in 90. gradus (tot enim *Almucantarath* describuntur ab Astronomis) à quibus verticalibus omnibus vicissim singuli in 360. partes diuiduntur, quoniam in toto ambitu horizontis 360. quadrantes circularum verticalium continentur; ita ut circuli *Almucantarath*, & *Azimuth*, hemisphaericam quandam efficiant contexturam, ut in præcedenti figura intueri licet.

Inter omnes autem hos circulos maximus est Horizon, infra quem non descri- buntur reliqui *Almucantarath*, quoniam spectant ad hemisphaerium occultum, quod antipodes nostri inhabitant. Reliqui omnes sunt minores, & omnes inter se inæquales, quorum minimus est is, qui proximus vertici existit. Et quia polus omnium horum circularum est *Zenith* cuiusvisque regionis, perspicuum est eos non mutari, nisi & *Zenith* mutetur vnà cum horizonte. Quare in quouis hemi- sphaerio hi circuli omnino immobiles sunt concipiendi.

Excogitarunt Astronomi hos circulos altitudinum ad altitudines astrorum ob- seruandas; officio enim horum circularum eleuationes supra horizontem omnium syderum tam fixorum, quam errantium metiuntur. Nam tanta est cuiusque stellæ altitudo, quot gradus sunt ab eo circulo altitudinis, quem tunc occupat, ad hori- zontem vsque; quos quidem gradus indicat qua- drans ille verticalis, qui per centrum stellæ incede- re intelligitur. Exempli causa: Sit astrum G, in cir- culo altitudinis GH, perque centrum astri ductus verticalis sit AHC, ostendetque arcus HG, inter horizontem, & circulum altitudinis interiectus, stellæ altitudinem. Maior tamen vsus istorum cir- culorum est in Astrolabio, nam mediantibus ipsis cognoscitur hora diei, vel noctis. Item quantum Sol supra horizontem attollatur singulis horis diei, ut in vsu Astrolabij explicabitur.



Præter hos omnes circulos altitudinum intelligendus est alius infra horizontem 18. gr. ei æquidistans, qualis est QR. Quando enim Sol ante ortum ad hunc perue- nit, initium est auroræ, vel crepusculi matutini; cum verò eundem post occasum attingit, finis est crepusculi vespertini. Nam Sole existente sub horizonte 18. gr. qui

Quomodo Al- mucantarath in celo concipiun- da sunt.

Utilitas horum circularum.


Linea crepuscu- li.

qui quidem gradus computari debent in circulo verticali per cœtrum Solis descritto, illuminari incipit hemisphærium superum matutino tempore; vespertino autem definit illustrari secundum communem Astronomorum sententiam. Hic autem circulus dici potest parallelus crepusculi.

### §. III.

#### De Circulis horarijs.

**C**irculi horarum distinctiores, qui & horarij dicuntur, sunt circuli maiores, qui per mundi polos incedentes, totum æquatorem in 24. partes æquales distribuunt: Nam cum tempus sit mensura motus, & vice versa, motus sit mensura temporis, vt ex Physicorum libris constat; AEquator verò ad modum totius vniuersi regularissimè feratur; mensurabit æquatoris motus non incommodè tempus, in quo primum mobile ab oriente in occidentem mouetur. Vnde fit, vt vigesima-quarta pars temporis, quo totus æquator semel circunducitur, correspondeat vigesima quartæ parti ipsius æquatoris, & è contra. Hanc verò vigesimam quartam temporis prædicti partem, horam consueuerunt appellare Astronomi, ita vt totus æquator spacio 24. horarum semel circunuoluatur; & vna hora, seu vigesima quarta pars præfati temporis mensuret vigesimam quartam partem æquatoris, & versa vice vigesima quarta pars æquatoris, vnius horæ metiatur quantitatem: quæ quidem vigesima quarta pars æquatoris continet gradus 15. ita vt 15. gr. æquatoris vni horæ correspondeant. Si igitur per singulos arcus æquatoris, qui 15. gr. comprehendunt, & per polos mundi circulos maiores descriperimus, qui erunt numero duodecim; (quoniam quilibet transit per duo puncta opposita in æquatore, ita vt inter quoslibet duos immediatos interijciantur 15. gr.) diuidetur totus æquator, & singuli paralleli Solis in 24. partes horarias. Hi igitur circuli horarij dicuntur, seu horarum distinctiores, qui concipiendi sunt omnino immobiles in qualibet sphaera, quemadmodum & meridianus, qui inter horarios quoque circulos connumeratur. Indicant autem isti circuli horarij horas, initio sumpto à meridiano circulo, atque adè à meridie more Astronomorum; ita vt quando Sol ad meridianum circulum in parenti hemisphærio peruenerit motu primi mobilis, sit duodecima hora: quando verò ad sequentem circulum horarium, sit prima hora post meridiem; quando ad secundum, sit secunda hora, & sic deinceps, donec ad meridianum in occulto hemisphærio peruenerit, vbi iterum est duodecima hora, nempe media nox. Quæ




omnia facile intelligi poterunt ex hac figura, in qua meridianus est ABCD, Polus arcticus A, Antarticus C, Aequator BD, Horizont obliquus GE, Verticalis FH. Circuli autem horarij sunt ij, qui per vtrumque polum ducuntur, & diuidunt æquatorem in duodecim horas æquales (representat enim hæc figura dimidiam duntaxat sphaeram, eam nimirum, quæ est à meridiano ad meridianum; Vnde si bis sumatur, habebit integra sphaera. Sunt namque duo talia hemisphæria similia prorsus inter se, quod ad positionem horariorum circulorum at-

tinent) quorum meridianus ABC, est circulus duodecimæ horæ A1C, primæ horæ: A2C, secundæ horæ: A3C, tertiæ horæ, & sic deinceps, vt facile numeri in æquatore positi commonstrant. Atque hi circuli, qui simpliciter, & sine addito, horarij nuncupantur, quoniam à nullo loco, quàm à meridiano circulo, commodius initium


Quæ mensura sit temporis.

tium diei sumitur, vt in sphaera docetur, cum transeant per polos mundi, & partes æquatoris æquales, ijdem semper erunt numero in quouis climate, quamuis variam habeant positionem in varijs horizontibus.



Est aliud genus circulorum horariorum distinctum à prædicto; Non enim transeunt per mundi polos, neque diuidunt omnes parallelos Solis, excepto æquatore, in 24. horas æquales; sed arcum diurnum cuiuslibet paralleli in duodecim partes æquales partes distingunt; quæ quidem partes dicuntur horæ inæquales; quoniam in æstate horæ diurnæ maiores sunt horis nocturnis. Quare si arcus diurnus trium parallelorum, verbi gratia tropici Cæcri, æquatoris, & tropici Capricorni, in duodecim partes æquales diuidamus, similiterque arcus nocturnos, & per tria puncta iuxta horizontem circulum

maximum duxerimus; habebimus circulum primæ horæ. Si verò per sequentia tria puncta, habebimus circulum secundæ horæ, & sic deinceps, vt in hac figura cernis, in qua circuli horarij ducti sunt à tropico ad tropicum duntaxat. Representat autem etiam hæc figura dimidiam sphaeram tantum, eam videlicet, quæ est à meridiano ad meridianum, sicut & præcedens; poterit tamen supplere vices alterius medietatis; sunt enim talia duo hemisphæria inter se omnino similia.



Est postremo aliud adhuc circulorum horariorum genus cum neutro prædictorum coincidens. Quamuis enim diuidant singulos parallelos in 24. partes æquales, in quo conueniunt cum circulis horarijs primi generis, tamen non incedunt per polos mundi, quæ in re ab iisdem distinguntur, & cum circulis horarijs secundi generis conueniunt. Hi autem circuli ita in sphaera describuntur: Omnes paralleli Solis diuiduntur in viginti quatuor partes æquales, initio facto ab horizonte occidentali (si horas more Itatorum desideramus, nimirum ab occasu Solis inchoatas) vel ab horizonte orientali (si horas ab ortu Solis inchoatas exoptamus more Babyloniorum, aut Insularum Balearium)


Et per puncta proxima horizonti ducitur circulus, similiter per sequentia puncta, & sic deinceps donec habeantur viginti quatuor circuli, quorum vnus horizon, sicut & in præcedenti genere secundo: Hoc tamen ordine, vt horizon semper sit circulus vigesimæ quartæ horæ: Deinde more Itatorum, primus circulus sub horizonte occidentali sit circulus primæ horæ; sequens secundæ, &c. More autem Babyloniorum Baleariarumque Insularum, primus supra horizontem, & ex parte orientis sit circulus primæ horæ, sequens secundæ, &c. Hi verò circuli contingunt duos parallelos, qui inter perpetuò apparentes sunt maximi: tanguntque horizontem in viginti quatuor illis punctis, in quibus circuli horarij primi generis eodem secant. Nam si per hæc puncta educantur circuli contingentes dictos parallelos, diuidentur ab illis omnes alij paralleli intermedij in viginti quatuor partes quoque æquales, initio sumpto ab horizonte, vt constat ex 18. propof. 2. lib. Theodosij. Quæ omnia in supraposita figura poterunt conspici, in qua ducti sunt circuli horarij à tropico ad tropicum duntaxat, quamuis hi omnes circuli vna cum interfectionibus suis non nisi in solido corpore seu sphaera ad amussim delineari possint. Hæc igitur circuli concipiendi sunt tangere parallelas EN, GH, in viginti quatuor pun-

Hora inæquales

Hora ab Ortus & Occasu.

Hora Babyloniorum.

punctis, in quibus à circulis horarijs primi generis diuifi sunt in viginti quatuor partes equales: Est autem hæc figura dimidia tantum sphaera à meridiano per occidentem ad meridianum, si more Italarum horas volumus: vel à meridiano per orientem ad meridianum, si horas ab ortu Solis intelligamus: Sed tunc loco vigesima tertiae horæ ponenda est prima hora: & pro vigesima secunda, secunda: pro vigesima prima, tertia, &c. Intellecto tamen vno hemisphaerio, facillè alterum intelligi potest, quamuis non sint hæc duo hemisphaeria inter sese similia. Verùm vt hæc omnia melius concipiantur, hanc figuram vna Synopsi omnia ob oculos ponentem; exhibendam duximus.



Totius horographia idea.

In qua descriptione ABCD medius circulus representat æquatorem 24. punctis in totidem horaria spacia diuifum; circulus EFGH intimus parallelum maximum semper apparentium; circulus KLMN extimus parallelum maximum semper delitescentium; circulus KBSD horizontem obliquum, qui tangit dictos parallelos in punctis SK, in quibus idem secat meridianum KOM, in quo puncto O polus est; recta POQ, refert circulum horæ astronomicae, siue ante meridiem, & 1 post meridiem; circulus PSRT est horæ ante occasum, vel ortum tangens dictos parallelos in punctis PR, in quibus circulus PORQ, secat eosdem, semicirculus scilicet PSR ab ortu, reliquus RTP ab occasu. Arcus autem PK, SR, sunt spacia horaria. Vides igitur vno quasi intuitu totam horarum ab ortu & occasu vna cum astronomicis ideam; ex qua singularum intersectiones cum alijs ita representantur, vt ex hac figura & tabula construatur, & horologia Italica; Babylonia, Astronomica omnis generis construatur, vt in decursu operis dicetur; pendet enim hinc tota linearum horariarum & horologiorum solarium doctrina.

Varia circulorum conditio.

Porro hæc duo posteriora circulorum horariorum genera, quamuis in vna eademque sphaera intelligenda sint prorsus immobilia, vt & primum genus; tamen non sunt eadem in omni sphaera. Variabuntur enim hi circuli, si secundum genus constituent, in diuersis sphaeris, sicut variantur arcus diurni, ac nocturni, vt constat ex ratione descriptionis. Pari ratione iidem circuli variabuntur, si tertium genus horarum indicent, in diuersis regionibus, veluti mutantur paralleli maximi semper apparentium. Nam quod obliquior est sphaera, eò maiores sunt arcus diurni signorum borealium, & arcus nocturni minores: signorum verò australium arcus diurni

diurni minores, & nocturni maiores; pariterque parallelisemper apparentes, & horizontem tangentes, maiores.

#### §. IV.

#### De Circulis Domorum cœlestium.

Circuli domorum cœlestium sunt circuli maiores numero sex, qui totum Cœlum in duodecim partes, quas Domos cœlestes appellant, partiuntur. Dicuntur autem cœlestes domus in celo eæ partes, in quibus varia dominia obtinent sydera. Cum autem veteres Astronomi animaduertissent stellarum vires, & influxus, non solum pro singularum stellarum peculiari natura varios esse; non enim omnes eundem habent influxum, cum quædam exsiccant, quædam frigefaciant, quædam calefaciant, quædam denique aliter, atque aliter afficiant: Verum etiam, in alio atque alio cœli situ eorundem vires modo augeri, modo verominui; quod non obscurè in luminaribus deprehendimus quotidie; cernimus etenim communiter temporum mutationes accidere, Sole horizontem contingente in ortu, vel occasu; Item eodem existente in meridie, vel in media nocte. Similiter aduertimus ob motum Lunæ per eadem quatuor loca, maris fluxum, & refluxum contingere infallibiliter, maximasque ferè semper excitari tempestates. Quæ quidem omnia quibus in reliquis illustrioribus stellis per hæc eadem loca decurrentibus, si modo animo diligenter aduertat, non difficilè obseruabit. Ob hanc enim causam Ptolemæus diligentissimè explicauit stellarum ad hæc quatuor loca accessus, maximè verò cum Sole. Cum hoc, inquam, animaduertissent antiqui illi syderum obseruatores, diuiserunt totum cœlum in duodecim partes, in quibus præcipuè, ob varios situs, & positiones, stellæ varios etiam effectus in his inferioribus producant; quas quidem partes, duodecim domicilia cœlestia appellarunt. Longa enim obseruatione deprehenderunt duodecim esse insignia huiusmodi loca in celo statuenda. Circulos verò has duodecim partes distinguentes, circulos cœlestium domorum nuncuparunt: de quibus nunc sermonem habemus. In quibus constituentis non omnes Authores inter se conueniunt. Quidam enim omnes duodecim domos faciunt æquales; quidam verò inæquales. In quibusdam tamen inter se conueniunt. In primis, ab omnibus quatuor illa mundi loca, nempe Meridies, Occidens, Media nox, Oriens, vocantur cardines mundi, & à recetioribus anguli, seu cuspides; qui quidem cardines, etiam si insignè habeant singuli potestatem; Ptolemæus tamen lib. 3. Iudiciorum Astrologicorum, cœli culmen, id est, cardinem meridianum omnibus alijs præfert. Secundò loco ponit cardinem orientalem. Tertio occidentalem. Quarto, ac ultimo cardinem mediæ noctis. Rursus conueniunt omnes, qui spatium quoduis inter quoslibet duos cardines cõprehensum in tres diuidunt partes, vt habeant duodecim cœlestia domicilia. Conueniunt postremo, quia omnes tamen veteres, & recentiores, initium primæ domus faciunt cardinem orientalem, & reliquas distribuunt secundum successionem signorum propter motum planetarum ab oriente in orientem, ita vt secunda domus sit infra horizontem ex parte orientis, & sic de cæteris: vnde idem quoque initium omnes ponunt quartæ domus, septimæ, & decimæ, quoniam hæc domus secundum illam successionem signorum initium habent in quatuor mundi cardinibus. Licet autem in distributione huius ordinis inter se non discrepent Astronomi, in particulari tamen domorum distinctione alij aliam sunt rationem secuti. Quidam enim antiqui initium sumentes ab Horoscopo, sicut & omnes Astronomi, id est, ab horizonte ex parte orientis (est enim Horoscopus gradus, seu punctum illud Zodiaci, seu eclipticæ, quod supra horizontem


Cur cœlum in 12. domicilia diuisum.

emerge in initio cuiuslibet rei, puta in natiuitate alicuius hominis, vel principio alicuius ædificij, &c.) totum Zodiacum secundum ordinem, successiōnemque signorum in duodecim partes æquales partiuntur, & per sectiones hærum partium, perque polos Zodiaci sex circulos magnos educunt, quibus totum cœlum in duodecim partes æquales dissecant, quæ domicilia cœlestia nuncupantur. Est itaque hæc diuisio cœli in duodecim domos similis illi, qua Astronomi diuidunt totum cœlum in duodecim signa Zodiaci, per circulos maiores, qui ex polis Zodiaci per initia omnium signorum describuntur; hoc verò excepto, quòd in diuisione cœli in duodecim domos circuli diuidentes, non semper transeant per signorum principia, nisi quando initium alicuius signi in horizonte extiterit; & quòd debeant concipi immobiles, cum tamen circuli duodecim signa distinguentes vnà cum cœlo circumuoluantur. Verùm tamen est nunquam hos circulos domorum cœlestium eosdem permanere, propter motum polorum Zodiaci. Verùm si hanc rationem describendorum circularum cœlestium domorum sequi velimus, accidet, vt multæ stellæ in hemisphærio boreali existentes eleuata iam supra horizontem, incidant in primam domum; multæ item in australi hemisphærio constitutæ nondum ortæ supra horizontem in duodecimam, seu vltimam domum; quoniam vtrumque est contra rationem primæ domus cœlestis, & duodecimæ. Secundùm enim omnes ferè Astrologos tota prima domus sub horizonte delitescit; cuius initium est horizon ipse. Item tota duodecima domus supra horizontem statuitur, cuius finis est idem horizon. Quidam verò, inter quos Alcabitius, & Ioannes de Saxonia connumerant, arcum diurnum Horoscopi in sex partes æquales, in totidemque nocturnum distinguunt; per quas sectiones, & polos mundi describunt sex circulos maiores diuidentes totum cœlum in duodecim domicilia cœlestia. Qua diuisione non solum duodecim domus efficiuntur inter se inæquales, cum aliquando illa, quæ sunt supra horizontem, sint maiora ijs, quæ sub horizonte latent, aliquando verò minora, vt perspicuum est ex arcibus diurnis, & nocturnis Horoscopi. Verùm etiam domicilia vnus diei, vel noctis, inæqualia existunt domicilijs alterius diei, vel noctis, cum vnus diei, vel noctis arcus Horoscopi maior sit arcu Horoscopi alterius diei, vel noctis. Quod quidam aduertentes diuidebāt æquatorem perpetuò in duodecim partes æquales, & per sectiones, mundi que polos circulos domorum cœlestium describebant; atque ita æqualia semper domicilia constituebant. Cæterùm his omnibus idem accidere necesse est, quod prioribus; & propterea ab omnibus iam Astrologis hæ rationes diuidendi cœlum in duodecim domos excluduntur. Quare omnes recentiores volentes prædicta incommoda vitare, & semper integra sex domicilia extare supra horizontem, totidemque infra eundem, aliam sunt methodum secuti. Describunt enim sex istos circulos domorum cœlestium, non per polos Zodiaci, aut polos mundi; sed per polos verticalis circuli propriè dicti, hoc est per communes sectiones meridiani circuli cum horizonte. Hac enim ratione, cum medietates omnium circularum cœlestium domorum integræ sint supra horizontem; itidemque integræ sub horizonte, ita vt horizon subeat vicem vnus circuli, facillimè euitabuntur omnia prædicta inconuenientia.

Porrò hi quoque Authores inter se discrepant, cum quidam æquales constituent omnes domos cœlestes, quidam verò inæquales efficiant.

Alcabitius, & Ioannes de Saxonia quomodo diuiserint domorum lineas.

Discrepantia Authorum.



vt ex elementis Theodosij constat; eoque sicut inæquales, quò obliquior fuerit sphaera, vt videre est in hac figura. In sphaera tamen recta erunt hæ domus æquales, quoniam æquator coincidit tunc cum verticali circulo. Appellat Ioannes de Regio monte hunc modum diuidendi cœlum in duodecim domus, Rationalem, quòd omnibus alijs sit rationabilior, & magis expertentiæ consentaneus.

Conueniunt autem Campanus, & Regiomontanus inter sese, sicut omnes alij, in ordine harum domorum, vt perspicue cernitur in præcedentibus figuris, in quibus numeri domorum cœlestium sunt apposti. Iuxta enim vt in hunc primam domum initium sumit ab horizonte ex parte orientis tendens sub horizonte, ita vt finis illius sit sub horizonte; quæ quidem domus appellatur Cardo, cuspis, seu angulus orientis, horoscopus, & ascendens, quia ab inferiori hemisphærio ad superius attollitur. Deinde subsequitur infra horizontem secunda domus, quæ Succedens horoscopo domus dicitur. Postea sequitur tertia, quæ Cadens ab horoscopo nuncupatur. Huic succedit quarta domus initium habens in meridiano circulo infra horizontem, quæ Cardo, cuspis, seu angulus mediæ noctis, vel etiam angulus terræ appellatur. Deinde subsequitur quinta domus, quæ dicitur Succedens imo cœli, seu angulo terræ. Postea sequitur sexta, quæ cadens ab imo cœli vocatur. Cui succedit septima incipiens ab horizonte ex parte occidentis, quæ cardo, cuspis, seu angulus occidentis appellatur. Deinde subsequitur octaua, quæ Succedens angulo, seu cardini occiduo dicitur. Postea sequitur nona, quæ Cadens ab occasu vocatur. Huic rursus succedit decima, cuius principium existit in meridiano supra horizontem, quæ cardo, cuspis, seu angulus meridiei, vel etiam medij cœli appellatur. Deinde sequitur vndecima, quæ Succedens medio cœli dicitur. Postea duodecima, cuius finis est in horizonte ex parte orientis, quæ Cadens à medio cœli vocatur. Ex quibus perspicuum fit has duodecim domus in tres classes distribui: In quarum primam continentur prima, quarta, septima, & decima domus, quæ Cardines appellantur, quòd reliquorum sint tanquam cardines, & in sua significatione fortiores. Secunda classis comprehendit secundam, quintam, octauam, & vndecimam, quæ Succedentes Cardinibus nominantur; vel Secundariæ, quòd secundum locum obtineant in suis significationibus. Reliquas demum quatuor,


Systema 12. domorum secundum Campanum.

Secundum Regiomontanus.

Appellationes variæ domuum.



vt tertiam, sextam, nonam, & duodecimam, complectitur tertia classis, quæ Cardentes à cardinibus nuncupantur, quòd in se nullam ferè significationis vim habeant. Non est tamen prætereundum, has duodecim domos cœlestes ab Astrologis describi in figura quadrata, quando eas ad vsum accommodant, vt hic cernis.



Cæterum, quinam planeta, seu stella, quodvè punctum eclipticæ in qualibet domo reperiatur, in vsu Astrolabij gnomonici docebimus.

§. V.

De Circulis positionum.

Circuli positionum sunt circuli maiores per communes sectiones meridiani cum horizonte, & centra syderum incidentes. Vnde manifestum est, circulos domorum cœlestium esse quoque circulos positionum, quando nimirum stella, seu astrum in puncto alicuius domus extiterit. Quam ob rem ex præcedentibus figuris facillè circuli positionum intelligentur. Solet quoque circulus positionis cuiuslibet stellæ appellari Horizon stellæ, quoniam supra ipsum tunc exoritur stella. Excogitati sunt autem circuli positionum, vt per illos cognoscamus, num stella, aut punctum aliquod cœli, sit in puncto alicuius domus cœlestis; aut si non est, quantum à puncto distet?

Vsus circulorum positionum.

§. VI.

De Circulis latitudinum.

Circuli latitudinum sunt circuli maiores educti per polos Zodiaci, & per singulos gradus eclipticæ: quare numero erunt 180. cum quilibet per duo puncta eclipticæ opposita transeat. In horum circularum numero continentur etiam illi circuli, qui efficiunt signa Zodiaci in tertia acceptione, vt in sphaera declaratur. Officium autem horum circularum est, metiri stellarum latitudines. Est enim latitudo cuiuslibet stellæ arcus circuli latitudinis per centrum stellæ incidentis, inter eclipticam, & stellam comprehensus. Estque duplex, Septentrionalis nimirum, & Meridionalis; prout stella ab ecliptica versus Boream, & Meridiem defleat. Cæterum, quamuis hi circuli maiores, qui per polos Zodiaci ducuntur, communiter ab Astronomis dicuntur latitudinum circuli, quoniam videlicet metiuntur stellarum latitudines; poterunt tamen appellari quoque circuli latitudinum circuli minores, qui per singulos gradus horum maiorum ex polis Zodiaci ipsi eclipticæ paralleli describuntur; quemadmodum circuli minores, qui ex vertice capitis per singulos gradus circularum verticalium horizonti paralleli dicuntur, supra dicti fuerunt circuli altitudinum, quamuis verticales circuli metiantur astrorum altitudines.

Latitudo stellæ quid?

§. VII.

De Circulis declinationum.

Circuli denique declinationum sunt circuli maiores transeuntes per mundi polos, & per singulos gradus æquatoris. Quare numero erunt 180. cum quilibet per duos gradus æquatoris oppositos transeat. In horum circularum numero continentur etiam Meridianus, & omnes circuli horarij indicantes horas à meridie. Officium autem istorum circularum est, metiri astrorum declinationes. Est enim declinatio stellæ cuiuslibet arcus circuli declinationis per centrum stellæ transeuntem inter æquatorem, & stellam comprehensus. Quæ quidem duplex est, Septentrionalis scilicet, & Meridionalis, prout stella ab æquatore recesserit, vel ad Septentrionem, vel ad Meridiem. Verùm, etiam si communiter hi tantum circuli maiores, qui per polos mundi deducuntur, ab Astronomis appellantur circuli declinationum, quia nimirum dimetiuntur stellarum declinationes; non ineptè tamen poterunt quoque appellari circuli declinationum circuli minores, qui per singulos gradus horum maiorum, ex mundi polis æquatori paralleli describuntur; quemadmodum de circulis latitudinum diximus: non enim exiguum habent vitium in compositione Astrolabij gnomonici circuli minores latitudinum, & declinationum, vt postea videbitur.

Quid sit declinatio stellæ.

Officia horum circularum.

CAPVT II.

De quadruplici Horolaborum genere, quod ex dictis horis emanat.



I verum est, quod sciuit Stoicorum Schola, tempus esse normam rerum, & custodiam, quia veritatis index, atque examen est, & rerum gestarum memoriam, ac diuturnitatem posteritati tuetur; ij sanè non exigua laude digni sunt, qui leges temporum umbraticis alligantes vinculis, fugitios annos, menses, dies, horas retractas, ita præsentibus, ac si res permanentes forent, ingenioso sanè commento, sistere conati sunt. Cum enim tempus nihil aliud sit, quam *μὲν πρῶτος ἦν ἡ ἀρχὴ* Quod sæpius fit? *ἢ ἔσται*

Quod sæpius fit?

μετρηται κινήτη, mensura primi mobilis secundum prius, & posterius, Philosopho teste, mensura autem haec omnium humanarum actionum regala sit ad confusionem vitandam assumpta; certè tempus ipsum priscae saeculis, dum horarum nomine tempus necdum sibi constaret, quotidianis actionibus distinctum appellatum fuisse docet Censorinus. Ita Βελιτων vesperam vocabant; nimirum, vt Poeta inquit,

Demeret emeritis cum iuga Phœbus equis.

Item tempus antemeridianum designantes dicebant πληθύνεισ ἀγοράς, conuenientibus scilicet eo tempore in comitiū vitis; vt Hesiodus dicit εὐτ' ἀληθείην λαοὶ κείνοντες ἀγορῆ. Sic Homerus Meridiem designat ὅταν ἄνθρωπος ἀπὸν δόρυον ὀπλισαίτω, imo Athenæo teste, verbo, ὄρα, vt plurimum veteres tempus actuum quotidianorum notabant, vt δὲ δόρυ, δὲ δὲ δὲ δὲ δὲ, Latinis quoque tempus dicitur de quo vide fuisse nos tractantes in Oedypo Aegyptiaco. Idem censeas de veteribus Hebrais, qui Diem in Mane, Meridiem, & Vesperam diuidebant; quas Partes horas dicebant. Ita Psal. 55. Nam totum νυχθήμερον in quatuor partes (quas Vigiliis vocabant) diuisum obseruabant. Prima vigilia erat à vespere: Secunda à media nocte: Tertia ab aurora: Quarta à meridiē. Vnde quidam concludunt, Priscos horarum spacijs caruisse: perperam. Nam Gnomonices artem, & horarum distributionem à principio fuisse facile mihi persuadéo, dum in signem antiquorum in rebus adinueniendis solertiam penitus considero. Nam cum ea, quibus carere nequimus, quibusque necessario vitimur, maxime vtilia iudicamus; certè non est verisimile primos mortales vsum Musicae, vocumque intervalla magis abstrusa, minusque necessaria, inuenisse; Gnomonicam minus difficilem; magis necessariam, neglexisse. Quod si, Philosopho teste, tempus est numerus motus; adeoque actionum nostrarum mensura; necesse est aut veteres caruisse tempore, quo actiones suas mensurarent, aut Gnomonices rudes non extitisse. Astronomiam certè, imò & Astrologiam omnes ferè in primos parentes Adamum, eiusque progeniem referunt. Quem autem latet neutram ipsarum absque Gnomonica stare? Partitio enim temporis vtrique summè necessaria est. Antiquissima igitur fuit diei in certas partes, ἡμερῶν, quas Horas vocabant; cuius principia ipse quasi sensus designauit; in sacris libris passim horarum vsum clarè indicatur. Exod. 9. Deut. 28. Esd. 3. cap. 2. Iob 11. mentio fit horæ dimidiæ, & cap. 12. Per tres horas prostrati orarunt, Eccles. 12. Vna hora permanebit tecum, & 30. Omne opus hora sua. E quibus tale conficitur argumentum: Si antiqui horas habuerunt, habuerunt etiam instrumenta, quibus eas cognouerunt: Ergo & Gnomonicam excogitauerunt. Talia autem instrumenta horologia sunt dicta. Ergo. Sed de his in Horologio Acha, in Oedypo Aegyptiaco fusiis. Porro antiquitas in vfu fuisse horologia Sciatherica, demonstrat locutio ἐν δὲ δὲ δὲ δὲ σὺν ἀνὰ pro hora cœnæ; vel ἐν δὲ δὲ δὲ δὲ σὺν ἀνὰ, quia notis literarum singularum horæ distinguebantur, testatur & ἐπισημασμένη ἀπὸν de Horologio apud Athenæum:

Ἐξ ὧν μὲν βῆσιν ἰκανώτα, ἢ αὖ δὲ μετ' αὐτὰς Περὶ γὰρ μετ' ἀννομῶν ΖΗΘΙ λέγεται βροτῆς.

Nam ante Zi. H. Θ. I. erant A. B. Γ. Δ. E. Ϛ.

Cum igitur successu temporum mundus variarum rerum inuentione excultus, exactiorem temporis rationem obseruaret; vti diei naturalis initium apud diuersas gentes diuersum fuit constitutum; ita diuersæ quoque horarum rationes apud singulos constitutæ sunt. Nam Astronomi diei initium statuunt in meridiano, quod Babylonij in horizonte orientali; Itali in occidentali constituunt; Aegyptij, & Sacerdotes Romani à semicirculo meridiano nocturno, qui est infra horizontem; quæ consuetudo adhuc in Ecclesia permanfit: Vulgus diem computat ab ortu Solis ad occasum, qui dies artificialis est. Maluerunt autem Astronomi à meridiano circumlo diem inchoare, quàm ab horizonte: quoniam vti in 3. cap. Sphæræ docet Clavius, Sol, & astra, eodem semper modo se habent respectu meridiani in omni rigore, non

Hebrai quomodo diem diuidebant.

Gnomonica ab initio fuit.

Adam nonis Gnomoniam.

Gnomonica antiquissima facienda.

Diuisa temporis mensura.

autem

autem respectu horizontis, qui mixtum in modum variatur ratione maioris, aut minoris eleuationis poli supra horizontem.

Sunt itaque duplices horæ, de quibus etiam in præcedentibus dictum est, æquales, & inæquales. Aequales horæ, in quas dies naturalis distribuitur, nihil aliud sunt, quàm vigesimæ quartæ partes vnus diei naturalis, quarum singulæ quindecim, æquatoris gradus continent; æquales autem dicuntur, quia toto anni spacio eiusdem semper sunt magnitudinis, eò quòd singulis quindecim æquatoris gradus tribuuntur, qui omnes æquali temporis spacio supra horizontem emergunt. Viginti ergo quatuor horis æqualibus dies naturalis constat; cuius initium aliud ab alijs constitutum. ac proinde huiusmodi horas aliter ab alijs numerari compertum est. Nam Babylonij, teste Plinio lib. 2. & Macrobio lib. 3. Saturnal, diem appellabant motum Solis ab vno ortu ad ortum alium (quos hac tempestate imitantur Insulæ Baleares) eaque de causa horas à Solis ortu supputabant; quæ Babylonicæ à plebisque Scriptoribus dicuntur, propterea quòd apud Babylonicos in vfu fuerunt. Athenienses autem olim, & nunc tota Italia vnà cum Bohemia, diem definiebant ab vno Solis occasu ad occasum alterum; indeque horas æquales numerabant, quæ iam Italicae nuncupantur, ab Italia, vbi maxime vsum earum viget. Vmbri deinde, nec non Astronomi, totum tempus à meridiē ad meridiem vocabant diem: itaque horas æquales à meridiē computabant. Quæ quoniam ab Astronomis in motibus caelorum supputandis vsurpantur, Astronomicæ dici consueuerunt. Aegyptij denique, auctore Macrobio lib. 1. Saturnal. & Populus Romanus diem numerabant à media nocte in proximè sequentem mediam noctem, atque hinc horas elapsas obseruabant. Id quod Ecclesia quoque Romana in celebratione solennitatum, & ieiuniorum obseruat. Quæ autem Gallis, Germanis, Hispanis, ac Europæ ferè toti nunc in vfu sunt, ab horis Astronomicis, Aegyptijsque non multum differunt, cum hi omnes horas æquales duodecim numerent à meridiē ad mediam noctem, totidemque hinc ad proximum meridiem. Commutatissimè itaque tantum à meridiē, vel media nocte horarum numeris, hi ab illis discrepant.

Horæ porro inæqualis pars est duodecimæ tam diei, quàm noctis artificialis. Diuidebatur quondam quouis artificialis dies, & quælibet nox in partes duodecim, æquales inter se, diurnas diurnis eiusdem diei, & nocturnas nocturnis eiusdem noctis. Sunt autem horæ inæquales, duodecimæ partes segmentorum parallelorum, quæ supra horizontem sunt conspicua, & infra eundem latent; vel, quod eodem modo, duodecimæ partes arcuum diurnorum, nocturnorumque omnium parallelorum; quæ quidem partes, cum in sphaera recta quouis anni tempore 15. parallelorum gradus æquali temporis spacio supra horizontem ascendentium contineant, nil ab horis æqualibus differunt. Aliter porro res se habet in sphaera obliqua. Atque hisce horis inæqualibus olim Iudæi, vt ex sacris literis constat, nec non Romani, & tota fermè antiquitas, vti historia, veterumque Mathematicorum monumenta testantur, vtebantur; atque ex hoc horologium, quod antiquum passim appellatur, constituitur. Ex his quoque horis vigiliæ noctis quaternæ, tribus horis cuique attributis, constiruebantur; sed & horæ Canonicae etiamnum ab Ecclesia decantantur. De his horis intelligenda sunt multa sacre Scripturæ loca; vt cum Dominus dicit: Nonnè duodecim sunt horæ diei, &c. initio nimirum factio ab ortu Solis numerandi horas; ita vt sex cadant in meridiem, & duodecim terminentur in occasu Solis. De quibus horis sic Iudei in Seder-olam.

Horæ aequales & inæquales.

Insulæ Baleares quomodo horas numerant.

Horæ Astronomicae. Aegyptij Romani.

Horæ Canonicae.

Quid sit horæ inæqualis.

Horologium antiquum.

וכל אחד ואחד מן הימים והלילות אשר אינם שוים נחלקים לדעת כל העולם על כי הלקים וקוראין לכל חלק וחלק שעה עקולה להפריש בינה ובין הישרה:

hoc

hoc est: Communi consensu orbis dies, & noctes inæquales diuiditur in duodecim partes æquales, quæ vocantur horæ inæquales. Atque ex huiusmodi horis fuisse horologium Achaz; testantur, Rabbi Eliezer, Abenezra, Ianathas, qui id vocat אבן שעות אבן שעות hoc est, lapidem horarum inæqualium: Rabbi Salomon in Paruschoth huius loci שעות הכלי instrumentum horarum inæqualium. Quale autem id fuerit, in Mathematica Secta, Deo dante, dicemus. Perius quoque harum horarum videtur fecisse mentionem, dum canit.

Horologium Achaz.

Steritimus indomitum, quod despumare Falernum Sufficiat, quinta dum linea tangitur umbra.

Quibus ille verbis horam antemeridianam significat, eam, quam nos vndecimam numeramus. Martialis quoque lib. 4. Epigram. omnes ferè diei artificialis horas elegantissimè hoc complexus est epigrammate.

Prima salutantes, atque altera continet hora, Exercet raucos tertia Causidicos. In quintam varios extendit Roma labores, Sexta quies lassis, septima finis erit. Sufficit in nonam niuidis octaua palæstris, Imperat extructos frangere nona iboros. Hora libellorum decima est Eupheme meorum, Temperat ambrosias cum tua cura dapes. Et bonus athereo laxatur necesse Caesar, Ingentique tenet pocula parca manu. Tunc admitte iocos, gressu timet ire licenti. Ad matutinum nostra Thalia locum.

Fabula Rabbi-norum.

Porro in Sanedrin libro Thalmud, duodecim horarum inæqualium mentionem Hebræi faciunt, in quibus hominem à Deo singulari mysterio creatum fabulantur: sic enim legitur: In prima quidem hora Deus collegit puluerem eius. Hora secunda facta est massa corporis. In tertia extensa sunt membra eius. In quarta infusus est spiritus in eum. In quinta stetit super pedes suos. Hora sexta, (seu in meridie imposuit nomina. Septima coniuncta est ei Eua. Octaua ascenderunt ipsi duo ad lectum, & descenderunt quatuor. Nona prohibitus est edere de ligno scientiæ. Decima data sunt ei alia præcepta. Vndecima sanctificauit mensam. Duodecima ad initium noctis præuaricatus est Adam. Atq; hæc ideo fusiùs tractauimus, vt ea, quæ passim in sacris literis occurrunt de horis; vt de hora mortis Saluatoris nostri; de hora tertia aduentus Spiritus sancti, similibusque passim occurrentibus, faciliùs intelligerentur; cum illa tempora nequaquam secundum horas nostras sumi possint, & debeant; sed secundum horas Iudæicas, seu inæquales, vt dictum est.

Horæ Planetariæ.

Alterum inæqualium horarum genus comprehendit eas, quas vulgò Planetarias horas appellant: quæ quidem sic dicuntur; quòd videlicet non absolute ad Solis cursum, vt æquales horæ; sed ad dominantes planetas referantur. Cum enim sint Planetæ septem (qui hoc ordine cum suis orbibus in sphæra recensentur ☽ ♀ ♀ ☿ ♂ ♃ ♄) singuli horis diei singulis, ordineque dominari, ac præesse dicuntur ab Astronomis. Nam si prima diei hora dominatur Saturnus, secunda dominabitur Iupiter, tertia Mars, quartâ Sol, quinta Venus, sexta Mercurius, septima Luna, octaua Saturnus, nona Iupiter, decima Mars, vndecima Sol, duodecima Venus, decima tertia Mercurius, & sic consequenter. Deinde prima hora diei sequentis, Sol, atque ita deinceps, ordine scilicet Planetarum non eo, quòd eos paulò ante recensuimus, sed retrogrado semper. Sed huius accipe sequens schemà.

Horæ

Horæ Regiminis Planetarum.


Table with 12 columns (hours) and 7 rows (planets: Solis, Martis, Mercurij, Iouis, Veneris, Saturni, Luna). Each cell contains a symbol representing the planet's position in that hour.

Atque ex hac tabula progressus legitimi Planetarum luculenter conspiciuntur. Cum enim dies naturalis 24. horas contineat, necesse est, vt si die Sabbathi prima hora dominatur Saturnus, à quo Saturni dies denominatur, sequenti die prima hora dominetur Planeta ordine retrogrado, sequens, duobus intermissis; nempe Sol, à quo denominatur dies Solis. Similiter die proximo Luna, vnde dies Luna, & in reliquis eodem modo deinceps. Cur autem sic duo transilirentur Planetæ,

usus tabula.

Dispositio tabulae vnde pronuntiat.

In consonantia diastemata tota musica.



retrogrado, nominandum consueverunt; vt post Saturnum, quarto sequatur loco Sol, deinde Luna, deinde Mars, &c. vt in tabula apparet. Quòd si disponas eiusmodi Planetarum progressum, eo modo, quo in præsentibus factum esse apparet: videbis clarè hanc Planetarum dispositionem per septimanæ dies originem suam traxisse ex natura septenarij numeri, qui spatio viginti quatuor horarum terna reuolutione peracta, necessario efficit, vt Planeta præsentis diei; vt tum ex superiore figura, tum ex adiuncto hoc trigono manifestè patet. Musicum porro mysterium, quod hic habet, in Musica nostra mundana hieroglyphica, fauente Deo latius discutiemus.

Mira vis septenarij numeri.

Quòd si quis modò plura de huiusmodi horarum proprietate desiderat, is præter ea quæ in Sciathérica Physica-astrologica tradidimus, consulat quoque Ioannem de Rojas lib. 2. Planisphærij cap. 26. & Politianum Miscellan. cap. 8. vbi Dionægyptios eius ordinis, appellatiisque dierum Authores tradidit, aliosque, quos breuitatis causa filemus. Ab horis ergo inæqualibus prioris huius generis dies olim nomen acceperunt, quæ quidem etiamnum retinent; ab horis, inquam, planetarijs,

E e rijs,

rijs, Planetisque horarijs. Sed licet ex his nullum Solare, aut Sciatericum, quod sciam, hæctenus confectum fuerit horologium; nos tamen inferius modum ostendemus eiusmodi horas cuius horologio inscribendi, ac proinde hoc in loco de ijs vberius dicendum erat.

*Horæ ab Ortū  
& Occasū.*

Atque ex hoc quadruplici horarum genere, quadruplex quoque horolaborum genus exortum est. Quorum primum est horarum à meridie, & media nocte, quod nos dicimus horologium Astronomicum. Alterum horarum ab occasu, quod vulgò Italicū dicitur. Tertium horarum ab ortu, quod Babylonicum appellatur. Quartum denique vocatur horologium antiquum, seu Iudaicum, priscis vsitatum, inæqualium horarum, quia inæquales arcus diurnos perpetuò in duodecim æquales partes diuidit; ex quo fit, vt horæ vnus diei, vel noctis, quando Sol parallelum ex illis aliquem percurrit, sint pares inter se, vel horis alterius diei, cum Sol ad alium parallelum magnitudinis eiusdem peruenerit, inæquales comparatæ inter se diebus, & parallelis, qui verè omnes magnitudine discrepant, si hodierni semper crastinis comparentur, exceptis ijs, qui Arieti, & Libræ æquidistant. Est itaque horologium nihil aliud, quàm signum sensibile ad motum cœli horas indicans: estque vel naturale, vel artificiale, vel ex his mixtum.

*Naturale horo-  
logium.*

Naturale horologium est, quod absque arte, vel potiùs tempus actionibus quotidianis distinctum ostendit, quemadmodum reciprocationes maris in Hybernia, in fretu Siculo, alijsque locis: Februm paroxysmi, florum quorundam explicationes, & quicquid per sympathiam horas ostendit, vt Galli cantus, Cynocephali Aegyptiaci mictus duodecies repetitus, similiaque; de quibus vide Qedypum nostrum, inter horologia naturalia computantur. Horologia artificialia sunt iterum varia; vel enim sunt mechanica, vt ea, quæ rotarum circumuolutione tempus monstrant; vel Solaria, de quibus omnibus, & singulis nos in huius operis serie tractare instituimus. Mixtum ex vtroque naturali, & artificiali compositum: de quibus singulis, cum in sequentibus ex professo dicturimus, superuacaneum esse rati sumus ijs hic diutius immorari. Quare ad Plana, in quibus dicta horologia delineari solent, calamum conuertamus.

### C A P V T I I I .

#### *De Planorum, seu Superficiorum, in quibus horolabia delineantur, varietate.*



**S**IT VM alicuius rei absque relatione ad aliud esse non posse, è Logicis constat. Omnia igitur horolabia suos nascuntur situs: alia namque erecta stant, alia extensa iacent, nonnulla declinant, quædam inclinantur, aliqua situm habent mixtum. Situs huius denominatio planis aduenit in ordine ad locum; hunc designat linea verticalis, quæ si extra æquatorem cadat, latitudinem, extra meridianum, longitudinem subit. De quibus iam nobis incumbit dicere.

Primo itaque nomine Plani intelligo quamcunque superficiem planam, in qua describi Horologia Sciatherica, siue Solaria consueuerunt; quæ vt varia sunt, situque non parum differentia, ita variam quoque ab Artificibus sortita sunt denominationem, quam hoc capite aperiemus. Desumitur autem vt finem, nempe tam situs, quam denominatio, à circulis cœlestibus, quibus æquidistant; inter quos licet plurimum

marium locum obtineat Circulus æquinoctialis; in ratione tamen horologiorum, quod attinet ad eorundem situm, non immerito circulo æquinoctiali, prætulerimus horizontem, cum sit in star fundamenti, ac basis reliquorum, vt mox constabit; ac propemodum de eo nobis primò omnium agendum erit.

*Planum hori-  
zonale.*

2 Planum igitur horizontale est, quod horizonti æquidistat, nempe planum libratum, siue ad libellam factum, quale in figura sic apposita stat uendum est planum A, vt ex eo reliquorum planorum situs facilius inueniatur; quem etiam in finem in eodem plano A, ductæ sunt notæ KL, MN, illa pro linea meridiana, hæc pro linea verticali: quarum officium est monstrare quatuor mundi plagas, Ortum, scilicet, Meridiem, Occasum, ac Septentrionem, vt adscripta etiam nomina indicant. Nam cum dictæ lineæ sese ad angulos rectos intersecent in puncto O, fit vt si vna illarum, qualem ponimus KL, ostendat Meridiem ex vna parte, verbi gratia K, & consequenter ex altera parte L, Septentrionem, reliqua linea MN, Ortum indicet ex parte M, & Occasum ex parte N; id quod iam sæpius à pluribus est comprobatum. Quibus positis, ita aliorum planorum situs definitur. Omnia enim reliqua plana, vel recta sunt ad horizontem, vel ad eundem inclinata: & vtraque rursus, vel directè respiciunt aliquam ex quatuor plagis mundi, vel certè ab eisdem variè declinant; vnde necesse est, vt complures sint Planorum differentiæ: quæ vt certo ordine enumerentur, in situm sumendum erit, à planis ad horizontem rectis plus cæteris vsitatis, quæ videlicet verticalia dici solent, eo quod æquidistant circulis verticalibus, qui & ipsi ad horizontem sunt recti.

*Planum verti-  
cale primariū.*

3 Primò itaque inter plana verticalia occurrit planum verticale proprium, quod æquidistat verticali proprio, hoc est, quod perpendiculariter super horizontem eleuatur ex linea æquidistante lineæ verticali MN. Cuiusmodi sunt in præsentia pictura duo muri B, E, in quibus duplicem licebit considerare superficiem: vnam, quam ipsa Prospectiua aperit, inspicientem directè Septentrionem, vt superficies F; alteram verò, quæ directè respicit Meridiem, quam in muro B, annotauimus imaginandam esse in facie opposita. Vnde duplex quoque Horologij verticalis oritur denominatio. Illud enim, quod in facie meridionali describitur in muro B, appellatur Horologium verticale Meridionale, seu Australe: quod verò delineatum fuerit in facie Septentrionali seu Boreali, dicitur Horologium verticale Boreale, siue ad Septentrionem.


*Planum verti-  
cale meridiano  
æquidistans.*

Secundò loco inter Plana verticalia numerantur Meridiana, quæ circulo meridiano æquidistant, hoc est, quæ super horizontem eleuantur ex linea parallela lineæ meridiana, qualia representant duo muri D, H, in quibus iterum apparet duplex superficies, quæ sunt causa duplicis Horologij meridiani. Horologium enim in facie Orientali parietis D, descriptum, dicitur Horologium meridiano Orientale: huic verò oppositum in muro H, vocatur meridianum Occidentale.

*Planum verti-  
cale declinans.*

Tertiò, præter duo plana iam dicta, quæ sunt quodammodo regularia, sunt alia quam plurima plana verticalia dicta Declinantia, eo quod æquidistant circulis verticalibus ad primarium verticalem obliquis: quæ si comparentur ad quatuor mundi plagas, reuocabuntur vniuersa ad quatuor genera, quæ conspici licet in reliquis quatuor figuræ parietibus C, E, G, I, quorum facies nullam præcisè plagam mundi intuentur. Facies enim parietis C, opposita, quam Prospectiua representare non potuit, simul Meridiem respicit & Ortum, neutram tamen partem directè. Vnde Horologium in eadem superficie delineatum, vocabitur declinans à Meridie in Ortum. Similiter opposita facies parietis I, & Horologium in eadem descriptum, denominabitur Declinans à Meridie in Occasum; eo quod oblique in vtranque hanc plagam tendat. At vero Horologium, in superficie G, depictum, denominabitur Declinans à Septentrione in Occasum, ab vtraque scilicet mundi plaga, quam respicit; & è contrario Horologium confectum in pariete E, appellabitur Declinans

nans à Septentrione in Ortum, propterea quod ab eisdem partibus planum illud conspiciatur.



Explicatio Planorum.

- A, Planum horizontale.
- B, Verticale ad Meridiem in facie opposita.
- C, Declinans in facie opposita à Meridie in Ortum.
- D, Meridianum Orientale.
- E, Declinans à Septentrione in Ortum.
- F, Verticale ad Septentrionem.
- G, Declinans à Septentrione in Occasum.
- H, Meridianum Occidentale.
- I, Declinans in facie opposita à meridie in Occasum.
- KL, Linea Meridiana.
- MN, Linea Verticalis.
- O, Centrum.

4 Ex his facile etiam intelligetur distinctio Planorum ad Horizontem non rectorum. Si enim 8. parietes huius eiusdem figuræ omnes concipiantur inclinati introrsum, ita ut anguli acuti, penes quos attenditur inclinatio, vergant versus O; representabunt iidem parietes omnia prorsus plana inclinata.

Nam primo duo parietes B, F, ponent ob oculos omnia plana quæ proprie dicuntur ad Horizontem inclinata, quorum hæc sunt nomina. Primo, Si paries B, angulo

angulum inclinationis habeat æqualem angulo complementi altitudinis poli, hoc est, angulo inclinationis æquinoctialis, vocabitur Horologium, in eiusdem vtraque superficie descriptum æquinoctiale; in superiore quidem Superius; in inferiori, Inferius. Deinde, si angulus inclinationis non est æqualis angulo inclinationis Aequatoris, dicentur Horologia in pariete B, descripta simpliciter inclinata ad Horizontem, superius quidem ad Septentrionem, at inferius ad Austrum. Tertio, Si angulus inclinationis parietis F, nempe versus Septentrionem, æqualis fuerit angulo altitudinis poli, ita ut æquidistet circulo Horæ 6. Astronomicæ, dicetur vtrūque Horologium tam inferius quam superius, Polare. Quarto, Si vero idem angulus fuerit minor vel maior, dicetur inferius ad Boream, & superius ad Austrum.

5 Secundo, duo parietes D, H, si dicto modo intelligantur inclinati, representabunt omnia plana directe respicientia Ortum vel Occasum, quæ tamen ad distinctionem priorum non solent vocari inclinata, sed declinantia ab Horizonte. Primo enim Horologia parietis D dicentur declinantia ab Horizonte, inferius quidem ad Ortum, at superius ad Occasum. Deinde vero Horologia in pariete H, descripta, dicentur declinantia ab Horizonte, in inferiori facie ad Occasum, in superiore ad Ortum.

Declinantia,  
ab horizonte.

6 Tertio deniq; reliqui quatuor parietes, C, E, G, I, si similiter concipiantur inclinati introrsum, exhibebunt nobis omnia reliqua Horologia plana, quæ simul appellantur Declinantia & Inclinata. Nam primo paries C monstrabit duplex Horologium, superius & inferius, quorum superius dicitur inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum; superius autem inclinatum simul, & declinans à Septentrione in Occasum. Secundo, Horologium inferius in pariete I, descriptum dicitur inferius inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum, & consequenter superius inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum. Tertio, Horologium inferius parietis E, erit inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum; superius vero erit inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum. Quarto deniq; in pariete G, Horologium inferius inclinabitur simul & declinabit à Septentrione in Occasum, & è contrario superius erit inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum.

Declinantia,  
& inclinata.

7 Atq; hic est situs ac denominatio Planorum Horologorum, siue recta illa sint ad Horizontem, siue inclinata, habita semper ratione Ortus vel Occasus, Septentrionis vel Austri. Quod si in planis ad Horizontem inclinatis, quæ continentur numero quarto, & in planis inclinatis simul & declinantibus, advertere velimus certas quasdam inclinationum differentias; reperiemus adhuc plures alias distinctiones Planorum, in quibus descripta Horologia diuersam figuram videntur adipisci.

Et quidem in Inclinatis; Plana illa, quæ non sunt æquinoctialia vel polaria, quorum videlicet inclinatio non est æqualis angulo complementi altitudinis poli, vel ipsimet angulo altitudinis poli; vel habebunt illum angulum suæ inclinationis minorem vel maiorem angulis prædictis. Primo itaque, si angulus inclinationis parietis B, minor fuerit inclinatione Aequatoris, dici poterit Horologium inferius inclinatum ad Austrum & superius ad Septentrionem, ut num. quarto habetur, & vtrūque æquidistans circulo maximo, qui meridianum secat infra æquinoctialem, scilicet ex parte australi. Secundo, Si angulus inclinationis fuerit maior angulo complementi altitudinis poli: poterit Horologium inferius iterum appellari ad Austrum, & superius ad Septentrionem, & vtrūque insuper æquidistans Circulo, qui meridianum secat supra æquinoctialem. Tertio, Si angulus inclinationis parietis F, quem ponimus tendere in Septentrionem, minor fuerit angulo altitudinis poli: Horologium tam inferius, quod tunc est Septentrionale, quam superius, quod est Australe, vocabitur æquidistans circulo, qui meridianum secat infra solum arcticum.

Affectiones planorum  
inclinatum.

Quarto

Quarto deniq; si idem angulus fuerit maior, manebunt eadem plana eiusdem quidem denominationis cum proxime dictis, quod attinet ad plagas mundi: quod vero spectat ad circulum, cui æquidistant, dicentur æquidistare circulo, qui secat meridianum supra polum prædictum.

8 Eadem fere distinctio adhiberi potest in planis declinantibus simul, & inclinatis. Nam duo parietes C, I, qui inclinantur versus Meridiem; vel æquidistant circulo maximo, qui meridianum secat in eodem puncto cum æquinoctiali, vel supra illud punctum vel infra: atq; ita si iidem parietes quo ad utramq; superficiem denominentur à prædictis circulis quibus æquidistant, manifestum est, utrunque parietem C, I, in triplici esse differentia. Eodemq; modo triplicis erunt differentia, parietes E, G, si considerentur, quatenus æquidistant circulis maximis, qui meridianum secant, vel per polos mundi; vel infra, vel supra eosdem polos.

Sequitur Catalogus omnium prædictorum Planorum, quæ sunt numero 49.

|                                |                                            |                                                                                                                                    |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Libratum</i>                | 1                                          | Horizontale.                                                                                                                       |                                      |
|                                | 2                                          | Verticale ad Meridiem.                                                                                                             |                                      |
|                                | 3                                          | Verticale ad Septentrionem.                                                                                                        |                                      |
|                                | <i>Verticalia, seu ad horizontem recta</i> | 4                                                                                                                                  | Meridianum Orientale.                |
|                                |                                            | 5                                                                                                                                  | Meridianum Occidentale.              |
|                                |                                            | 6                                                                                                                                  | Declinans à Meridie in Ortum.        |
|                                |                                            | 7                                                                                                                                  | Declinans à Meridie in Occasum.      |
|                                |                                            | 8                                                                                                                                  | Declinans à Septentrione in Ortum.   |
|                                |                                            | 9                                                                                                                                  | Declinans à Septentrione in Occasum. |
|                                | 10                                         | Æquinoctiale superius, siue Boreale.                                                                                               |                                      |
| 11                             | Æquinoctiale inferius, siue Australe.      |                                                                                                                                    |                                      |
| <i>Inclinata ad horizontem</i> | 12                                         | Inclinatum ad horizontem inferius ad Austrum, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra punctum æquinoctiale.       |                                      |
|                                | 13                                         | Inclinatum ad horizontem superius ad Septentrionem, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra punctum æquinoctiale. |                                      |
|                                | 14                                         | Inclinatum ad horizontem inferius ad Austrum, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra punctum æquinoctiale.       |                                      |
|                                | 15                                         | Inclinatum ad horizontem superius ad Septentrionem, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra punctum æquinoctiale. |                                      |
|                                | 16                                         | Polare superius, siue ad Zenith.                                                                                                   |                                      |
|                                | 17                                         | Polare inferius, siue ad Nadir.                                                                                                    |                                      |
|                                | 18                                         | Inclinatum ad horizontem inferius ad Septentrionem, & æquidistans circulo maximo secanti Meridianum infra Polum.                   |                                      |
|                                | 19                                         | Inclinatum ad horizontem superius ad Austrum, & æquidistans circulo maximo secanti Meridianum supra Polum.                         |                                      |
|                                | 20                                         | Inclinatum ad horizontem inferius ad Septentrionem, & æquidistans circulo maximo secanti Meridianum supra Polum.                   |                                      |
|                                | 21                                         | Inclinatum ad horizontem superius ad Austrum, & æquidistans circulo maximo secanti Meridianum supra Polum.                         |                                      |

Decl-

|                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Declinata ab horizonte</i>            | 22                                                                                                             | Declinans ab horizonte inferius ad Ortum.                                                                                                             |
|                                          | 23                                                                                                             | Declinans ab horizonte superius ad Occasum.                                                                                                           |
|                                          | 24                                                                                                             | Declinans ab horizonte inferius ad Occasum.                                                                                                           |
|                                          | 25                                                                                                             | Declinans ab horizonte superius ad Ortum.                                                                                                             |
|                                          | 26                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat in eodem puncto cum æquinoctiali.        |
| <i>Inclinata simul &amp; Declinantia</i> | 27                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Occasum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat in eodem puncto cum æquinoctiali. |
|                                          | 28                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra punctum æquinoctiale.              |
|                                          | 29                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Occasum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra punctum æquinoctiale.       |
|                                          | 30                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra punctum æquinoctiale.              |
|                                          | 31                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra punctum æquinoctiale.         |
|                                          | 32                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat in eodem puncto cum æquinoctiali.      |
|                                          | 33                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat in eodem puncto cum æquinoctiali.   |
|                                          | 34                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra punctum æquinoctiale.            |
|                                          | 35                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra punctum æquinoctiale.         |
|                                          | 36                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra punctum æquinoctiale.            |
|                                          | 37                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra punctum æquinoctiale.         |
|                                          | 38                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat per polos.                          |
|                                          | 39                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat per polos.                             |
|                                          | 40                                                                                                             | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra polum arcticum.               |
| 41                                       | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat |                                                                                                                                                       |

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | cat infra polum arcticum.                                                                                                                    |
| 42                            | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra polum arcticum.      |
| 43                            | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Occasum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra polum arcticum.         |
| 44                            | Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Occasum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat per polos.               |
| 45                            | Inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat per polos.                      |
| Inclinata simul & Declinantia | 46 Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Ortum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra polum arcticum.   |
|                               | 47 Inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra polum arcticum.        |
|                               | 48 Inclinatum simul & declinans à Septentrione in Occasum inferius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat infra polum arcticum. |
|                               | 49 Inclinatum simul & declinans à Meridie in Ortum superius, & æquidistans circulo maximo, qui Meridianum secat supra polum arcticum.        |

## CAPITULUM IV.

## De compositione Libellæ, deq; usu eiusdem in dignoscendis ac dirigendis Planis.


**I**n hoc Quarto Capite tria præstare conabimur. Primo, docebimus constructionem Libellæ, nempe instrumenti cuiusdam, ad libranda plana, & nonnulla alia perficienda aptissimi. Secundo, quomodo eadem libella utendum sit in dignoscendis planis, num sint librata, an recta, vel etiam obliqua ad Horizontem: & si sunt obliqua, quanta sit illa obliquitas. Tertio, ac postremo, qua ratione libranda sint plana, vel perpendiculariter elevanda, vel certe in determinato quouis angulo dato inclinanda. Quæ omnia plurimum conducunt, ad Horologia tum designanda, tum constituenda; ut taceam, earundem rerum maximum esse usum in alijs etiam Geometricis, ac Astronomicis problematibus.

## Compositio Libellæ.

**N**E vero mireris, si paulo aliter Libellam confecerimus, quam ab Artificibus construi solet: id enim eo consilio fecimus ut eius usum ad plura extenderemus. Sic ergo eam fabricabimus.

Fiat

Fiat seorsim ex duabus regulis AB, AC, eiusdem latitudinis, & longitudinis, Gnomon BAC, ita ut eadem regulæ exactissime angulum rectum contineant tã



in exteriori, quam interiori concursu A. Deinde applicata regula ad extremitates B, C, notentur in eisdem regulis duæ lineolæ, quæ designabunt duas particulas ex utraque regula reserandas, ut in figura vides.

2 Ad hæc præparetur quadrans DEF, eius magnitudinis, ut perpendicularum DG, quod ex eius centro demittendum est non attingat rectam BC, si ea ducta foret: eiusque arcus EF, diuidatur iuxta regulas de circulo diuidendo in omnes 90. gradus, adscriptis etiam numeris ad decimum quemvis gradum, ut fieri assolet in similibus instrumentis, incipiendo à radio DE, qui non debet esse idem cum extremo latere quadrantis, sed ab eodem æquidistare, tantum, ut collocato quadrante intra Gnomonem, ut figura indicat, & perpendicularo superposito radio DE, plumbum perpendiculari non attingat latus Gnomonis: quod ipsum intelligendum est etiam de radio DF. Unde colligitur, in fabrica huius quadrantis, primo procurandum esse, ut duo latera exteriora exactissime etiam angulum rectum contineant, quatenus scilicet congruere possint lateribus Gnomonis, intra quem est collocandus Quadrans. Deinde eisdem duobus lateribus exterioribus ducendas esse duas lineas parallelas DE, DF, in debita distantia, habita scilicet ratione crassitie plumbi perpendiculari. Et licet eadem parallelæ necessario quoque angulum rectum efficiant in concursu D, qualem efficiunt latera exteriora; ut tamen cum maiori certitudine progrediamur, examinandus erit idem angulus D, per diuersas praxes, quas Geometria præscribit. Immo fortassis rectius fecerimus, si primo vnâ solum eorum ducamus, v.g. rectam DE, ac deinde super eam, ex assumpto centro D, quod æqualiter distat ab utroque latere exteriori, perpendicularis erigatur DF, in idem enim debet incidere operatio. Quibus diligenter obseruatis, si denique centro D, describatur arcus EF, diligenterque in gradus distribuatur, ut dictum est, confectus erit vna cum Gnomone Quadrans, atque adeo Libella ipsa, quam construere voluimus.

3 Præter ea lineamenta, de quibus hæctenus facta est mentio, depinximus seorsim quandam laminulam perforatam cum suo perpendicularo. Quæ si in centro D, ita figatur ut foramen in superficie quadrantis iaceat; dependebit perpendicularum ex eodem foramine multo liberius, quam si in centro D, fixum fuisset. Siquidem ex foramine illo descendit recta, ex centro vero necessario reflectitur; quæ reflexio videtur posse impedire motum liberum. Et hanc eandem ob causam, reserari poterit superficies quadrantis intra arcum, & latera intercepta; ne forte, & ipsa liberum motum perpendiculari impediatur; quod facile contingit, nisi quæ exactissime sit complanata.

4 Præterea in quadrante DEF, affiximus lateri DF, duas pinnulas perforatas, quæ inferantur, quando eodem Quadrante, relicto Gnomone, accipienda foret al-

Penna ad Libellam.

Ff cuius

cuius rei altitudo, & alia similia, quæ per Quadrantem, vel Quadratum Geometricum obseruari solent, vt in eiusmodi instrumentorum tractatione explicari solet. Quarum pinnularum constitutio hoc solum requirit, vt quoad fieri potest, radius per vtrumque foramen emissus, existat parallelus lateri DF. Exactissimam simul ac commodissimam similibus pinnularum fabricationem quære in Astrolabio Clauij lib. 3. Can. 1. vbi etiam in alium quendam quadrantem incidet, qui in acuratori- bus obseruationibus rerum Astronomicarum plurimum habet momenti.

5 Postremo ad vsum Libellæ conuenit habere Regulam saltem non breuiorem Gnomonis Diametro BC; & hæc debet duo quæuis latera opposita habere parallela, ita vt concursus quatuor superficierum quoad fieri potest, sint lineæ rectæ, eæ de- que parallelæ, id quod vix poterit fieri rectè, nisi ex metallo conficiatur, vel ligno duro, & sicco, & non admodum subtili.



### Vsus Libellæ in librandis, ac dignoscendis Planis libratis, & non libratis.

ET si ad initium huius Capituli distinxerimus inter se Cognitionem, qua digno- scitur alicuius plani constitutio, ab ipsa collocacone plani in simili situ: quia- tamen, quod attinet ad praxim, vtriusque ferè eadem est ratio; visum est vtrum- que simul pertractare, ne sæpius idem repeteretur.

6 Quando ingitur propositum fuerit aliquod Planum, quod videatur ad sen- sum horisonti parallelum, ex primentoque discere vouerimus, num ita res se ha- beat: sic per Libellam sensum adiuerimus. Sit propositum planum A, in eoque applicetur libella primò secundum longitudinem, pro vt vides in figura, ita vt per- pendiculum liberè dependeat, superficiemque Quadrantis radat. Et si quidem per- pendiculum ceciderit in 45. Gradum quadrantis, Planum A in neutram partem, inclinabit secundum longitudinem, hoc est secundum lineam, supra quam vel ex qua eleuata est Libella. Vel quod idem est, linea illa æquidistabit horisonti, cuius- modi in alijs planis solet vocari linea horizontalis, de qua paulo post. Si vero per- pendiculum à Gradu 45. vel minimum alterutram in partem deflexerit, manifestū erit, Planum, licet sensui app- areat horisonti parallelum, nequaquam tamen esse pa- rallelū, sed inclinari ad eam partem, ad quam perpendiculum inclinatur. Et tunc nõ erit quod vterius idem Planum examinemus. Si vero secundum dictam longitu- dinem Planum deprehendatur esse libratum, tentandum idem erit secundum lati- tudinem, per similem prorsus Libellæ applicationem. Et si quidem lineam etiam Latitudinis librata inuenerimus, hoc est etiam in hac secunda applicatione libel- læ, filum perpendiculi Gradum 45. absiderit: Planum A, omnino prorectum erit, sin minus, inclinabitur.


### Demonstratio.

CVm enim Planum libellæ in duplici illa collocacone, representet duo plana verticalia, hoc est plana per filum perpendiculi ducta, quod semper rectum est ad horisontem; sit vt si duo illa plana Libellæ producta se mutuo intelligantur fecere, faciant communem sectionem lineam rectam perpendicularem ad horisõ- tem, atque adeo parallelam perpendiculo Libellæ. Atque perpendiculum, est per- pendiculare ad vtramque lineam tam longitudinis, quam latitudinis, vt patet si diligenter consideretur constructio libellæ. Ergo etiam illa communis sectio erit perpen-

perpendicularis ad easdem lineas longitudinis, & latitudinis. Ac proinde eadem cõmunis sectio erit per 4. vnd. immo & plana per ipsam ducta, nempe Plana libel- læ quæ representant plana verticalia erunt per 18. vndecimi recta ad planum A, quod per lineas illas ductum est. Horizontale igitur erit idem planum A, hoc est libratum. Siquidem ad ipsum recta sunt plana verticalia, vt monstratum est.

7 Non aliter procedendum erit si planum aliquod proponatur librandum, hoc est, si tabula aliqua, vel marmor bene complanatum, constituendum foret horisõ- taliter. Primo enim collocabitur propositum planum ita vt sensui appareat debite locatum. Deinde per libellam, eadem collocatio examinabitur tam secundum longitudinem, quam latitudinem, vt dictum est. Et si quidem in aliquam illarum partium deprehendatur deflectere, eleuandum erit ex illa parte, subiectis cuneolis, vel alia materia, donec perpendiculum cadat in 45. gradum. Quod vbi successerit in vtraque parte plani, tunc demū collocatū erit planū vt proponitur.

Applicatio Li-  
bella.



8 Intelligimus autem per lineam longitudinis, & latitudinis, quascunque duas lineas transuersales, quæ non sint parallelæ. Quamuis ad præsens negotium sint accommodatiores illæ, quæ se se saltem ad iudiciū sensus secant ad angulos rectos. Si enim ex eiusmodi duabus lineis perpendiculariter erigatur libella, facilius apparebit differentia inclinatio, si forte planum propositum non sit libratum.

Linea longi-  
tudinis, & lati-  
tudinis Libellæ.

9 Ex his porro facile colligitur quomodo in planis reliquis, inueniri possit li- nea Horisonti æquidistans, qualis ad sequentes præses omnino requiritur, vt & li- nea inclinationis in planis inclinatis, quæ ex Horisontali illico describitur. Inuen- turus igitur lineam Horizontalem in plano quouis inclinato, vg. in plano C, applica ei Regulam numero 5. præparatam, ita vt videatur aliquo modo librata. Postea ad corrigendum errorem, si quem forte sensus admisit, adhibe libellam. Ea enim debite eleuata, statim monstrabit si quid peccatum est, prout perpendi- culum ceciderit, vel extra, vel in ipsum 45. gradum. Nam cadente perpendicu- lo in dictum gradum, iam obtinebit planum suum situm ex ipsa prima colloca- tione, atque adeo linea, quam eius latus describit in plano, erit linea horizontalis. Si vero non cadat in 45. gradum: promouenda erit in superficie plani Regula ex ea parte, quæ filum inclinat sursum versus, & eo vsque donec perpendiculum 45.

Inuentio lineæ  
horisontalis in  
quolibet plano  
inclinato.



gradus abscindat, Quibus abscissis constituta erit iterum regula ut oportet: Et si gnata per eandem lineam in ipso plano, erit horizontalis: Ad quam si in eodem plano inclinatio erigatur perpendicularis, ea erit linea inclinationis, cuius paulo antefecimus mentionem. Et talis est linea tam in plano C, quam in plano D, quae per medium eorundem planorum deducta est, cui si forte parallela sint latera, ut in figura contingit, poterunt & ipsa pro linea inclinationis sumi.

In inferiori facie planorum inclinatum, quod attinet ad collocationem regulae & designationem lineae in inclinationis, haec eadem sunt observanda: Gnomon vero una cum quadrante non eodem modo applicabitur. Neque enim bases laterum Gnomonis regulam contingunt ut prius, sed latus *vg.* AB secundum longitudinem regulae accommodabitur. Hoc enim modo perpendicularum libere dependebit, eoque cadente in gradum 90, Regula plano adhaerens consistet librata, ut quivis facile ex dictis coniecerit.

In planis ad horizontem rectis est praeter modum iam dictum inveniendi linea horizontalis per libellam, alius facilius, & fortassis certior, quo etiam communiter uti solent Artifices. Suspendunt enim prope murum perpendicularum, atque e regione filii notant in muro duo puncta, per quae postea ducunt lineam rectam, & ad hanc erigunt perpendicularem, quae est linea horizontalis quaesita. Vbi illud duntaxat observandum venit, ut filium perpendiculari quantum fieri poterit parieti appropinquet, ne in notandis punctis error aliquis committatur. Et propterea convenit ut suspensum pondus, *vg.* plumbum habeat figuram latam, vel longam, non autem crassam. Poterunt etiam eadem puncta notari in umbra, quam eiusmodi filium perpendiculari in planum projicit splendens Sole, etiam si umbra illa non sit directe e regione filii. Sufficit enim quod eadem umbra sit perpendicularo parallela: quod semper eveniet, si paries vere sit rectus ad Horizontem, & perfecte planus.

Quod autem in superioribus operationibus semper visum regula, id non est ita accipiendum, quasi semper sit necesse, Libellam subijcere regulam, sed tunc solum, quando planum est nimis parvum, vel non perfecte planum. Alias enim poterit ipsa libella immediate applicari ad Planum, vel secundum bases Gnomonis, ut fit in planis inclinatis superioribus, vel secundum latus, ut fit in inferioribus. Quae modum etiam ad planum Horizontale A, eandem Libellam sine regula applicatam videre licet.

10. Iam vero, ut veniamus ad plana non librata, eorum constitutio hac ratione inuestigabitur. Inveniatur primum per ea quae numero 9. diximus linea horizontalis atque ad eam erigatur perpendicularis pro linea inclinationis. Deinde, si planum sensui videatur rectum ad Horizontem, quale ponitur Planum B, applicetur lineae inclinationis latus Libellae AB: & si quidem perpendicularum cadat in nullum gradum, hoc est super latus DE, signum erit parietem B rectum esse ad Horizontem: sin minus inclinabitur. Et tunc ut inveniatur angulus inclinationis, tali industria componenda erit Libella, quali eam compositam cernis ad planum D, ubi cum filium abscindat arcum FG, seu angulum FDG, eum dicemus esse angulum inclinationis. Et ita de alijs planis inclinatis. Eodem enim modo deprehendi potuisset inclinatio plani C, nisi eam aliter inuestigare placuisset, ut eo exemplo monstrarem, in planis multum inclinatis, ultra scilicet, vel saltem non citra 45. Gradus, etiam per ordinariam compositionem Libellae haberi posse inclinationem. Nam ut ibidem apparet, filo cadente in latus DE, inclinabitur planum 45. gradibus. Si vero aliter ceciderit intra quadrantem, id quod semper continget inter latus DE & gradum 45. tunc arcus inclinationis erit is qui intercipitur inter filium, & grad. 45. atque adeo tantus quoque erit angulus inclinationis.

Eadem compositio ordinaria Libellae retinenda quoque est quando planum propositum fuerit inferius. In ijs enim applicabitur Libella ad lineam inclinationis,

Gnomoni applicatio.

Inventio horizontalis lineae in planis ad horizontem rectis.

Quomodo plana non librata constituantur.

nis, qualis est recta HQ, quam imaginari oportet in inferiori facie plani C, ut in figura vides, cadetque perpendicularum necessario intra quadrantem, & auferet arcum inclinationis FG, seu angulum FDG, qui omnino aequalis erit angulo inclinationis plani superioris, si totus paries C, eodem modo fuerit crassus, hoc est utraque facies constituant plana parallela. Ac proinde, si in eiusmodi muris in alterutra facie instituat operatio, semper eadem opera inveniatur inclinatio utriusque superficie tam superioris, quam inferioris, ut patet.

11. Superesse nunc modum praescribere, quo planum quodvis propositum aut perpendiculariter eleuandum foret, aut in determinato angulo deprimendum: Sed quia modum illum quivis ex dictis facile coniecerit, non est quod frustra in rem aperta laborem. Manifestum enim est tunc demum planum, verbigitaria B, constitutum esse rectum ad horizontem, si in Libella filium perpendiculari cadat in latus DE: & rursus Planum *vg.* D, debitam habere inclinationem, si perpendicularum auferat praescriptum numerum Graduum ex quadrante EF: atque adeo si id non fiat, tam diu variè torquendum esse planum donec Libella nobis satisfaciatur.

Ceterum ad exactiorem magisque expeditam similibus planorum collocationem, plurimum conducet librare prius aliquod planum horizontale, quale est planum E. ex eo enim facillime educuntur reliqua plana, etiam ex linea ibidem signata. Nam si ex linea IH, eleuandum sit planum B, perpendiculariter, ducemus primo ad rectam HI, perpendicularem KL, deinde in plano B, signabimus alteram lineam HI, ad eamque erigemus perpendicularem KM: & postremo resectis partibus quae sunt infra lineam HI, eleuabimus idem planum B, ex recta HI, ita ut recta KM, congruat lateri gnomonis applicati ad rectam KL, ut in figura vides; hoc enim factum stabit planum B, perpendiculariter ad horizontem. Si vero planum *vg.* C inclinandum sit ex recta HN, ducenda erit in illo plano similiter recta HN, atque ad eam erigenda perpendicularis OP, quae erit linea inclinationis, ad quam si accommodetur Libella, & planum ipsum circa rectam HN, inclinatur vel eleuetur, donec perpendicularum propositum gradum inclinationis abscindat, ut dictum est; obtinebit etiam planum C, suum situm. Et ita de reliquis.

12. Est tamen & alius modus eleuandi plana, fortassis exactior: si videlicet prius praeparatur ex aliqua tabella angulus inclinationis qualis est IHQ, eo enim erecto perpendiculariter ad horizontem E, sicut dictum est de plano B, & quidem ex linea HI, quae rectam HN, secat ad angulos rectos, si planum C, circa rectam HN, ita inclinatur, ut eius superficies, in qua existit HN, cadat super latus HQ, anguli praestructi, habebit idem planum debitam inclinationem, in eaque facillime firmabitur, suppositis quibusdam fulcris, si fortasse firmandum videatur.

13. Itaque in planis quae hac arte ad horizontem fuerint constituta, vel recta, vel inclinata, non erit quod de nouo lineam horizontalem per instrumentum inuestigemus, ut nec lineam inclinationis: siquidem eam iam ponimus esse ductam, nempe in plano B, rectam HI, & in plano C rectam HN, utraque enim est linea horizontalis, cum existat in plano horizontali; nisi forte alibi in eisdem planis aliae horizontales lineae forent ducendae. Haec enim per acceptum punctum designabuntur, si prioribus illis agantur parallelae, ita namque, & ipsae quidam stabunt horizonti, ut patet.

Immo vero simili artificio utendum erit in planis stabilibus, quod attinet ad inveniendam lineam horizontalem, praesertim in planis multum inclinatis, in quibus per libellam vix rectè deprehendi potest vera constitutio dictae lineae, propter multitudinem linearum, quae fere omnes solent apparere libratae si per libellam examinentur. Vnde fortassis non male eandem lineam tunc inquiremus hoc modo. Prope planum inclinatum *vg.* C, collocabimus planum R, illudque diligenter librabimus, ut dictum est numero septimo. Deinde beneficio regulae producemus quavis

Alia methodus

Alia methodus libellandi.

quâsuis duas, vel plures lineas in eodem plano R, notatas donec occurrant plano C, in punctis vg. H. O. N. quæ omnia erunt in vna linea recta HON, si planum R, sit iustum, atque adeo eadē linea HON, erit horizontalis, quam ducere oportebat.

15 Videbuntur fortassis ad hoc caput spectare etiam illi modi, quibus per varias inclinationes Planorū Horologia quædam Viatoria, vt vocant, eaque fere vniuersalia, diuersis altitudinibus poli accommodari consueuerunt; quos etiam Clauis persequitur Capite 1. lib. 8. suæ Gnomonicæ: eos tamen consulto hic censui prætereundos, eo quod Horologijs illis Viatorijs videantur quodammodo proprii, atque adeo cum eorundem constructione commodius pertractentur. Nemo miretur nos planorum librationem hic exactius fusiūque, quam par forsan est, tradidisse. Cū enim libella praxeos bene expediēde fundamentū sit; vt pote, sine qua in horographica machinatione nihil feliciter confici possit; ipsa veluti iure quodam exactiorem hanc tractationem vendicare videbatur.

## CAPVT V.

### De varijs Horolabiorum passionibus.

#### §. I.

#### De Horologijs Cosmocentricis.



**I**n centro terræ horologium fieret in plano quocumque, id neque sensu, neque ratione discreparet à cœlesti, & semper aliquam horam monstraret nunquam otiosum, omni que refractione careret, etiam si vapores circumstarent; siquidem vapores horologijs in centro constitutis sunt homocentrici; vnde omnes radij irrefracti penetrarent, vt pote ad quodcumque punctum normales; in horologijs vero excentricis sunt excentrici; vnde & maior radiorū refraçtio. Iterum, si in cœtro terræ horarium fieret, in cuius plano gnomon axi meridiano exactè responderet: Dico illud horologium idem futurum cum horizontali polari, verticale autem idem futurum, quod horizontale sub sphæra recta, siue verticale sub polo. Ratio patet ex constructione. Si igitur planum aliquod ita inclinaretur ad axem, vt constitueret angulum acutum, in illo futurum horologiū idem cum horologio, quod sub eodem angulo eleuationis poli fieret in sphæra obliqua. Eadem igitur varietas planorum in centro terræ considerari potest, quæ in eiusdē superficie; & consequenter horologia horizontalia, verticalia, meridiana; neque enim magnitudo terræ ista causat, sed situs lineæ verticalis, quam ipsa acquirit ad axem mundi, & ad meridianum aliquem certum designatum; hanc enim lineam sequuntur diuersa plana, non magnitudinem terræ. Sola igitur differentia esset, quod horologia cosmocentrica, vti nullum haberent horizontem sensibilem, ita perpetuò horas in alterutra plani parte monstrarent. In planis quidem ad axem obliquis daretur duplex Ortus, nullus Occasus; nam Sol conficiendo cursum suum in illo plano vsque ad Occasum istius plani, statim post transitum plani alteri plani portioni oriretur: & sic horologium faceret perenne nūquam Sole vacans; vnde si planū esset diaphanum, exhiberet vmbra in vtraque plani parte horas perpetuò; atque in omnibus huiusmodi planis ad axem obliquis cursus Solis se haberet per modum motus

Horologiū in cœtro mundi quibus constituto.

Quomodo horologium fieri possit, quod perpetuo horas monstraret.

### De varijs horolabiorum passionibus.

motus diurni. In planis verò axi parallelis, aut eundem ad rectos interfecantibus, motum annum Solis perpetuo in alterutra plani parte ostenderet. Quæ omnia in superficie extra centrum terræ minimè fierent. Sed vt multa paucis concludam, cū in centro terræ omnes lineæ sursum vergunt, omnia horologia potius verticalia dicenda sunt, quam horizontalia, cū nulla sectio dari possit, quæ non horizontale planum referat. Sed nos hisce relictis tamquam *admiranda* ad consuetam nobis horologia calamum conuertamus.

#### §. II.

#### Consuetaria de varijs Planorum conditionibus.

I. **S**olaria horolabia in planis polaribus, meridianis, æquinoctialibus, vbique locorum sunt eadem. Quod enim est horizontale sub polo constructum, hoc vbique locorum & gentium est horarium æquinoctiale: & quod horologium horizontale est sub sphæra recta, vbique locorum; & gentium est horologium polare; & è conuerso horologium verticale sub polo idem est cum nostro polari; & horologium verticale sub sphæra recta, idem est cum nostro æquinoctiali sub sphæra obliqua.

Varia planorum affectiones.

II. Omnia horologia declinata ad horizontem sunt horologia horizontalia respondentibus ijs populis, quorum tanta est latitudo, siue altitudo poli, quantus est angulus inclinationis ad horizontem in dicto horologio. Sed de his in sequentibus fusius.

III. Omne planum Sciathericum qualecumque alicuius alterius loci horizontale est. Et quoniam sola plana loca eidem parallelo versus eundem polum subdita, eandem eleuationem poli habent; hinc fit sola plana eundem loci parallelum terrestrem tangentia esse altitudinis à polo æqualis, reliqua omnia diuersa. Vnde, & inter tria primaria plana in eodem loco, meridianus nullam eleuationem poli habet, verticalis verò in sphæra recta summam, in obliqua sphæra intermediam, in parallela nullam; contra horizon summam in sphæra parallela, in obliqua mediam, in recta nullam.

IV. Declinantia à verticali primario nunquam æquant altitudinem poli, quam habet verticalis primarius, & quò magis declinant, hæc minus eleuatum polum supra planum suum habent. Declinantia verò ab horizonte pari ratione nunquam æquant eleuationem poli horizontalem.

V. In sphæra recta nullum planum ad horizontem inclinatum, & in parallela sphæra nullum à verticali declinans, vllam plani altitudinem nanciscitur; sunt enim omnes verticale primarij.

VI. In sphæra obliqua, exceptis circulis horarijs Astronomicis, reliqui omnes aliquam poli altitudinem sortiuntur.

VII. Meridianus circulus omnium ab horizonte declinatum maximè declinat. Verticalis primarius omnium inclinatum, ad horizontem, est maximè inclinans. Verticalis declinans cuius est mixtorum inclinatissimus, & declinatissimus.

VIII. Omnia horologia horizontalia sub quacunque latitudine sunt verticalia, ijs in locis, quibus æquatoris altitudo æquata fuerit altitudini data. Exempli gratia, Romæ horizontale est æquale verticali, in omni eo loco, vbi altitudo æquatoris fuerit æqualis latitudini illius loci, ad quem horizontale fuerit constructum; videlicet ijs sub latitudine 48. habitantibus; his enim æquator tantum supra horizontem, quantum nobis polus eleuatur. Ita horizontale 30. gr. lat. æquale est verticali latitud. 60. & è conuerso.

§. III.

De varijs superficiebus, in quibus horolabia projici possunt.

Plana circulari.

Superficies, in quam horastrolabia projici possunt, triplex est, plana, circularis, & mixta. De plana in præcedentibus satis superque dictum est. De alijs modo aliquid breviter quoque dicendum est.

Planum concavum concavum.

Superficies circularis considerari potest alicui corpori intrinseca, vel extrinseca. Intrinseca est superficies concava alicuius corporis, cuiusmodi sunt scaphia, hemicycla, cylindri, & conii seu turbines excavati. Extrinseca est convexa corporis cuiusvis cyclici superficies, quales sunt sphaera, cylindrus, conus, aut horum corporum segmenta.

Plana convexa plana concava.


Iterum superficies corporum mixtae varia quoque sunt: vel enim sunt plano-concavae, vel plano-concavae, vel concavo-concavae, vel plano-concavae. Plano-concavae sunt, in quibus umbra ex plano in concavum, & hinc in planum iterum projicitur, qualis esse potest concha lato constans horizonte. Plano-concavae sunt, in quibus umbra ex plano in concavum, & hinc in planum iterum projicitur, cuiusmodi esse potest hemicyclum plano cuiuspiam incumbens. Concavo-concavae sunt corpora, quae nunc concavis, nunc convexis superficiebus constant. Plano-concavo-concavae sunt, quae tribus constant superficiebus, rectis, concavis, convexis; atque haec iterum varias habent affectiones, vel cylindri, vel conii, vel corporis conoidalis; quae longum esset recensere. In quibus omnibus, qua ratione Astrolabia gnomonica delineari possint, in decursu operis docebitur. Atque haec de planis, eorumque qualitate sufficiant.

Plana convexa concava.

§. IV.

De Gnomone, stylo, sive indice Astrolabiorum Gnomonicorum.

Gnomon, sive stylus, idem in Gnomonicis praestat, quod in astrolabijs vulgaribus Mediclinium, sive regula fiducia. Gnomon esse potest omne corpus obumbrans aliud; estque vel rectus, & hic proprie gnomon dicitur, omnibus horologijs communis; vel obliquus, ut in aequinoctialibus, & horologijs astronomicis, in quibus omnibus obliquus esse potest; sic enim axem mundi refert. Transversus quoque subinde reperitur, ut in Meridianis, cum dictum mundi axem representat; & sic obliquus indeterminatam magnitudinem habet. Axis omnibus ijs horologijs, in quibus linea horaria in centro confluunt, competit, cuiusmodi sunt, verticalia, horizontalia, equinoctialia. In horis ab Ortus, & Occasus, locum nulla ratione habere potest. Vnde gnomon in hisce adhibendus est. Axis mensura est altitudinis gnomonis. Vnde gnomon quamcumque axis partem incurrit, ibi horas a meridie, & media nocte monstrandi



Acquirit potentiam. Hinc rostra auium, globuli in aere penduli, digitus manus, sceptrum alicuius statuae, vel etiam cuiusvis alterius rei imaginabilis extremum, loco gnomonis ad horas monstrandas assumi possunt; dummodo ita constituentur, ut extremum punctum in axem mundi cadat, ut in apposta figura patet, in qua axem mundi refert AB, planum horizontale AC, in quo hora a meridie, & media nocte delineatae sunt. Dico autem, extremum rostri E, in axem cadens una cum alijs aliorum corporum, ut manus G, globuli pendentes D, sagittae F, extremis in axem mundi incidentibus monstraturum horas; tota enim axis umbra monstrat horas: ergo omnia, & singula puncta axis. At huiusmodi referunt extrema puncta indicum, auris, manus, aliarumque rerum paulo ante indicatarum: ergo illa qualibet parte axis monstrabunt horas; quod erat probandum. Sicuti igitur stylus obliquus est axis mundi: ita gnomon plano normaliter insistens idem est, quod axis horizontis, cuius extrema poli horizontis Zenit, & Nadir. Non est porro necessarium semper gnomonis umbram ad horas demonstrandas assumere: potest enim gnomonis vices ipsa lux supplere. Ita radius Solis per minutissimum foramen intronissus idem praestabit in plano umbroso; quod in lucido plano radius praestat umbrosus, Verum de hisce, & similibus in sequentibus varie tractabitur.

Variis figuris gnomonum.

Acquirit potentiam. Hinc rostra auium, globuli in aere penduli, digitus manus, sceptrum alicuius statuae, vel etiam cuiusvis alterius rei imaginabilis extremum, loco gnomonis ad horas monstrandas assumi possunt; dummodo ita constituentur, ut extremum punctum in axem mundi cadat, ut in apposta figura patet, in qua axem mundi refert AB, planum horizontale AC, in quo hora a meridie, & media nocte delineatae sunt. Dico autem, extremum rostri E, in axem cadens una cum alijs aliorum corporum, ut manus G, globuli pendentes D, sagittae F, extremis in axem mundi incidentibus monstraturum horas; tota enim axis umbra monstrat horas: ergo omnia, & singula puncta axis. At huiusmodi referunt extrema puncta indicum, auris, manus, aliarumque rerum paulo ante indicatarum: ergo illa qualibet parte axis monstrabunt horas; quod erat probandum. Sicuti igitur stylus obliquus est axis mundi: ita gnomon plano normaliter insistens idem est, quod axis horizontis, cuius extrema poli horizontis Zenit, & Nadir. Non est porro necessarium semper gnomonis umbram ad horas demonstrandas assumere: potest enim gnomonis vices ipsa lux supplere. Ita radius Solis per minutissimum foramen intronissus idem praestabit in plano umbroso; quod in lucido plano radius praestat umbrosus, Verum de hisce, & similibus in sequentibus varie tractabitur.

Protheoria II.

De sectionibus gnomonicis, quae in planis sciatheericis radiorum solarium projectione contingunt.

Cum tota ars nostra gnomonica, ut plurimum circa sectiones conicas versetur, nihilque ferè sine ijs aut rectè intelligi, aut feliciter confici possit; de ijs hoc loco paulò profundius tractandum duximus; est enim harum mirificus usus cum ad tabulas calculandas, tum ad sectiones dictas artificiosè in plano dato delineandas: tum denique in horographia catoptrica immensas secum portat utilitates, ut suo loco dicitur. Dabimus autem hoc loco reconditioris Mathematicae cultoribus ulterius speculandi materiam; tyronum autem captui ita nos accommodabimus, ut eos in distracta imaginationis applicatione multò facilius hasce nostras methodicas demonstrationes, quam obscurissimas Apollonij capturos confidamus.

PROPOSITIONES LEMMATICAE.

Propositio I.

In parabola, sicut se habet quadratum semior dinatae ad partem axis a vertice, à quo ducitur; ita quadratum alterius cuiusvis semior dinatae ad axis partem, à qua secatur.

Sit conus ABC, sive rectus, sive scalenus rectangulus, acutangulus, vel obtusangulus, perinde est; sectio verò parabola sit EF, quam in plano representat PEO, cuius vertex E, axis EF, semior dinatae HN, LL, FO.


Gg

Dico

διόρισμός.

παράσκευη.

ἀπόδειξις.



in proportione tota. Sicut igitur EH, ad rectangulum GHI, ita EL, ad rectangulum KLM, vel EF, ad rectangulum AFC. Cum igitur rectangulum GHI, æquetur quadrato HN, & rectangulum AFC, quadrato FO, erit etiam vt EH, ad quadratum HN, ita EF, ad quadratum FO, & permutando, vt EH, ad EF, ita HN, ad FO.

συμπέρασμα.

In parabola igitur sicuti se habet quadratum semiordinate ad partem à vertice, &c. quod erat demonstrandum.

Porisma.

**D**elineaturus igitur parabolam in plano, fiat EF in plano, lineæ EF in cono æqualis, hancque diuides in tot partes, in quot illam diuisti, ductisque semicirculis GNI, KIM, AOC, semiordinatisque HN, LL, FO. Si has in axim EF in plano in lineas cæcas ex punctis HLF, ductas transfuleris, habebis puncta, per quæ curva ducta dabit parabolam.

Propositio II.

ἔργατος.

Quandoquunque in cono quopiam sectio hyperbolæ, ellipsis, aut circuli contingit, & in hisce aliqua lineæ iuxta hyperbolæ, & ellipsis basi, & iuxta circulum axi coni parallelæ ducantur, erunt rectangulæ, quæ à partibus ab axe, & parallelis sunt unius & eiusdem proportionis.


ἔκδοσις.

παράσκευη.

ἀπόδειξις.

**S**int tres coni signati ABC, diameter sectionis in singulis DE, parallelæ AC, MN, HK. Dico, quod ita se habeat rectangulum DOE, in vnoquoque ad rectangulum HIK; sicuti rectangulum DOE, ad rectangulum MON, vel rectangulum DOE, ad rectangulum AQC, vt in propof. 1. ostensum est. Si igitur ex punctis parallelorum medijs semicirculi ducantur, deinde ex punctis intersectionis parallelarum, & sectionis conicæ, videlicet in punctis IOQ, *πρὸς τὰς ὀρθὰς* in arcus ducantur rectæ IS, OP, QR, erit iuxta 15. prop. Euclid. quadratū IS, æquale rectangulo HIK, quadratum vero OP, æquale rectangulo MON, & quadratum QR, æquale rectangulo AQC.

In sectione verò circuli, quoniam ipsa basi parallela incedit, atque adeo intersectiones axi parallelæ fieri debeant, mediæ proportionales, vel ex ipsa sectione



patent, suntque rectangula ipsa quadratorum latera; eritque trium sectionum in *συμπέρασμα* plano ductarum proportio *μα.* sicuti rectangulum DIE, ad quadratum IS, ita rectangulum DOE, ad quadratū OP, vel rectangulum DOE, ad quadratum QK, quod erat demonstrandum.

Nam sicuti sectio, hyperbolæ, & ellipsis in cono per intersectionem multorum circulorum basi parallelorū cognoscitur; ita sectiones circuli in cono similiter basi parallelæ per lineam axi parallelam fieri debent: quæ

quidem, omnes excepta illa, quæ per verticem describitur, & triangulum rectilineum efficit, sectiones hyperbolæ sunt.


Confectarium.

**H**inc patet causa, cur Apollonius Pergæus hyperbolem, ellipsin, & circulum in vna & eadem proportione ferè semper assumat, vt videre est in 1. 2. 3. lib. Apoll.

Propositio III.

Quandoquunque in quapiam parabola semiordinata ducitur, & re. *ἔργατος* rectangulum inde fit æquale quadrato semiordinate, cuius latus æquatur distantia à vertice, vel si inuenta fuerit ad distantiam à vertice, & semiordinatam tertia proportionalis; erit alterum latus talis rectanguli, vel tertia linea proportionalis latus rectum parabolæ; punctum verò, quod secat latus rectum parabolæ ordinatum applicatum, est centrum reflexionis parabolæ.

**S**it latus rectum, vel linea inuenienda BI; fiat BF æqualis ED; ducaturque FG *ἔκδοσις* parallela ED, ductaque linea ex B, per D, quæ secet FG in G, erit FG, vel huic *παράσκευη* æqualis BI, latus rectum quæsitum. Sicuti enim *ἀπόδειξις* se habet BE, ad ED, ita ED, vel BF, ad FG, vel BI.



Vel breuius, lineis BE, & ED, quære tertiã proportionalem hac industria: In puncto D, ad lineam BD, fiat normalis DH, quæ secet lineam BH, in H. Est igitur EH, æqualis BI; & sic consequenter rectangulum EB, BI, æquale quadrato semiordinate ED, vt postulatum fuit. Sicut nunc quadrangulum EB, & BI, æquale quadrato semiordinate ED; ita prorsus se res habet cum re-

liquis femiordinatis. Nam rectangulum EB, BI, æquale est quadrato FC, ita quadratum EB, BI, æquale quadrato femiordinatæ FC. Quodcumque igitur in quapiam parabolâ femiordinata ducitur, &c. quod erat demonstrandum.

**Propositio IV.**

*In cono recto ita se habet latus sectionis parabolæ ab basim, sicuti latus primum ad latus rectum.*

ἰσοστάσις.


ἰσοστάσις.

διόριστος.

ἀπόδειξις.

συμπέρασμα.

**S**it conus rectus ABC, sectio parabolæ DE, per quam si linea GH, basi parallela ducatur, faciet illa triangulum DIH, lateri cono ABC, proportionale.



Dico, quod sicut se habet DI, distantia à vertice ad IH, vel BA, latus conij ad AC, basim illius; ita latus primum FD, ad latus rectum DZ.

Quoniam enim femiordinata huius sectionis illa est, cuius quadratum per 13. propof. 16. Euclid. rectangulo GIH, æquale est; erit rectangulum quoque ex ID, & latere recto DZ, per præcedens æquale quadrato femiordinatæ IK; & ideo rectangula GIH, & IDZ, inuicem æqualia. Quoniam verò DI, in DZ, æquatur GI, in IH; erit vt GI, cui æqualis FD, ad DZ, ita DI, ad IH. Nam productum primum in quartum est æquale producto ex secundo in tertium. Iam verò cum triangula DIH, & BAC, sint proportionalia; erit quoque vt BA,

ad AC, ita FD, ad DZ, quod erat demonstrandum.

*Porisma,*

**H**inc patet, qua ratione latus rectum facile inueniri possit. Fiat enim FD, æqualis DM: quo facto si MN, ad IH, parallelam duxeris, erit MN, æqualis lateri recto DZ, quaesito.

**Propositio V.**

*Si sectio hyperbolæ in cono recto axi parallela ducatur, erit latus primum medium proportionale inter exteriorem diametrum, vel latus transversum, & latus rectum.*


ἰσοστάσις.

ἰσοστάσις.

διόριστος.

ἀπόδειξις.

συμπέρασμα.



**S**it conus LEM, sectio parabolæ DN, axi EQ parallela; BD, latus primum.

Dico, quod ita se habet AD, ad DB, sicuti DB, ad latus rectum DZ.

Quoniam enim sectio axi parallela est, erunt trianguli ADB, & DNM, similia, estque proportio AD, ad DB, proportio addita; quapropter sicut se habet AD, ad DZ, ita quadratum AD, ad quadratum DB. Vnde & AD, quoque ad DZ, sicut quadratum AD, ad quadratum DB. Quoniam iam AD, ad DZ, vt quadratum AD, ad aliud quodpiam quadratum; per præcedentia patet tale quadratum DB, medium proportionale esse inter AD, & DZ. Quod erat probandum.

*Porif-*

*Porisma.*


**N**osse cupis latus rectum? fiat DR, æquale lateri primario DB, & duc RS, parallelam AB, eritque SD, æqualis lateri recto DZ, quaesito. Hac ratione quoque demonstrabitur ellipsis minorem diametrum mediam proportionalem esse, inter latus primum, & basim; quoniam ita rectangulum AD, in AD, ad rectangulum DE, in AC, vt rectangulum AF, in ED, ad rectangulum HFI.

**Propositio VI.**

*In parabola distantia centri reflexionis à vertice quarta pars lateris recti est, atque adeo subdupla ad femiordinatam per centrum reflexionis ad ambitum parabolæ ductam.*

ἰσοστάσις.

**S**it parabola AHBEC, cuius centrum reflexionis F, eritque ordinatim applicata per centrum reflexionis ducta DE, æqualis lateri recto.




Dico distantiam centri reflexionis à vertice B, quartam partem esse DE, vel subduplam femiordinatæ FE, vel FD.

Cum enim femiordinata DE, sit media proportionalis inter distantia à vertice BF, & latus rectum, vt ex præcedentibus patuit; & DF, subdupla DE; erit consequenter BF, subdupla DF. Sed DF, est subdupla lateris recti, & hæc quadrupla BF, ergo BF, quarta pars lateris recti; quod erat demonstrandum.

συμπέρασμα.

*Porisma I.*

**H**inc patet, quod quodcumque in parabola femiordinata simul cum distantia à vertice nota est, & hisce notis detur tertia proportionalis, vt sit eadem proportio distantia à vertice ad femiordinatam, sicuti femiordinata ad tertiam proportionalem, quod erit 1/2 pars tertia proportionalis iam inuentæ distantia centri reflexionis à vertice.




Sit parabola ACB, vertex C, data femiordinata ED. Cum igitur iuxta præcedentia, femiordinata media proportionalis sit inter distantiam à vertice, & latus rectum, & CD, vnâ cum DE, nota sint; dabit tertia proportionalis quaesito; ita autem inquires tertiam proportionalem. Ducatur ex E, puncto ad CE normalis, quæ secet HK, in K, eritque DK, tertia proportionalis quaesito, cuius quarta pars ex C, tracta in H, assignabit centrum reflexionis quaesito.

*Porif-*


Porisma I I.

SI verò in hac figura ad diametrum, siue latus trãversum DB, hyperboles ABC, linea quæzatur, quæ cum DB, rectangulum constituat, cuius latitudo cum quadrati latere æqualis sit quartæ parti rectanguli DBE, quod figuram Apollonius vocat. Dico talem lineam, vel latus quadratum, æquale esse distantiæ centri reflexionis à vertice. Cum enim ordinatim applicata HG, quæ per centrum transit, æqualis sit ex præcedentibus lateri recto BE, prolongetur DB, in M, ita vt BE, fiat æqualis BM. Si igitur circa DM, semicirculum duxeris, & BE, in R, produxeris, erit quadratum BR, per 14. propof. 2. Euclid. æquale rectangulo DBM, vel rectangulo DBE; quadratum verò BI, dimidium BR, erit  $\frac{1}{2}$  rectanguli DBE, vel quadrati BR, videlicet  $\frac{1}{4}$  figuræ. Si porò in linea DM, semicirculum duxeris interuallo KI, semicirculum KIL, duxeris, erit BI, quadratum æquale rectangulo LBF, eritque F, centrum petitur. Nam DL æquatur BF, & BL æquatur FD, & sic rectangulum OLBN, æquabitur quadrato BI. Quod erat demonstrandum.



Porisma I I I.


PARI ratione sit ellipsis HBQDN, cuius maior diameter DB, minor NO, habeat eandem distantiam à vertice hac ratione. Cum quadratum minoris diametri NO sit medium proportionale, & consequenter æquale rectangulo ex maiori diametro BD, & latere recto BE, cui HQ, æquale est, constituto; erit etiam, quadratum mediæ diametri minoris,  $\frac{1}{2}$  figuræ: cum iam rectangulum ex maiori diametro, & alia linea fieri debeat æquale quadrato NK, accipe mediũ BK diametri maioris, ED idque ex N, trãnsfer in puncto diametri maioris FC, & habebis puncta reflexionis. Ex puncto quoque F ducatur Semicirculus interuallo FN, eritque rectangulum PKL, vel PKM, æquale rectangulo DFB, & consequenter quadrato KN. Iam verò PL, æquatur BD, & LK æquatur FB. Erit ergo FB, quæ sita linea. Si iam ex PL, & KL, vel LI, rectangulum fiat, latere quadrati IK, videlicet PKM, æquale quadrato NK, eius latus KL, æquale CD, vel FB, distantia centri reflexionis à vertice; quod erat demonstrandum.



Propositio VII.


In cono isopleuro latus primum parabolæ æquatur lateri recto.

SI conus ABC, parabolæ sectio DE, eritque sicuti BA, ad AC, ita ED latus primum, ad DG latus rectum. Quoniam enim BA, æqualis est AC, & BF, æqualis FD, necessario quoque FD, latus primum, æquabitur lateri recto DG. Si igitur latus primum ordinatim parabolæ applicetur, secabit id punctum in axe, quod erit centrum reflexionis. Si verò conus fuerit triangulum rectangulum, dico centrum reflexionis cadere in medium intra verticem sectionis, & commune intersectionis axis, conicæ, & parabolæ punctum.




Primus casus.

Sit conus ABC, sectio parabolæ DE, punctum sectionis E. Quoniam igitur sicuti BA, ad AC, ita KD, ad latus rectum, & angulus ABC, angulo BLK, rectus recto æqualis sit, & consequenter proportionalis, erit etiam sicut KD, ad latus rectum; ita LB, ad BK. Sed LB, & LK, sunt æqualia: ergo & KD, & latus rectum: sunt enim LK, & BL, medium KD. erit quoque B, K, æqualis DE, dimidium lateris AB. Cum igitur BL, medium sit DK, etiam BK, dimidium erit lateris recti. Sed & DF, est dimidium BK, quæ est  $\frac{1}{2}$  lateris recti; erit igitur hoc centrum reflexionis. Trahatur per punctum E, linea HG, parallela KD, & super eum describatur semicirculus; si igitur ex I, ambitu circuli in punctum F, normalem rectam duxeris, erit hæc semiordinata, quæ centrum reflexionis transibit, eritque medium proportionale inter HF, & FG, & subdupla HG. Patet igitur centrum reflexionis esse in F, medio lineæ ED, quod erat demonstrandum.




Secundus casus.

Sit tertio conus rectus ABC, cuius axis BH, AC basi æqualis sit, & sectio hyperbolæ DFE, parallela axi conicæ BH. Dico latus rectum lateris primario subduplum, vel  $\frac{1}{2}$  exterioris diametri, siue trãverseri lateris contineri: sicut enim quadratum DE, ad quadratum FG, ita DF, ad FI, latus rectum; sed DE, ad FG, est vt totum ad totum, & DF, ad FI, vt medium, ad medium. Erit ergo latus rectum FI, ad GF, primum subduplum, quod erat demonstrandum.



Tertius casus.

Si porò in cono rectangulo sectio hyperbolæ axi parallela contingit, erit latus rectum ipsius æquale exteriori diametro, & simul lateri primario. Cum triangula IBG, & BFG, sint æqualia, erunt & latera lateribus æqualia; & consequenter, vt quadratum FG, ad quadratum GI, ita FG, latus trãversum ad aliud, scilicet ad latus rectum; sed FG, est æqualis IG, ergo & lateri recto, & primario, quod erat demonstrandum.





Quartus casus.

**Problema.**

*Quando præter diametrum extrinsecam, siue latus transversum Hyperbolæ, ex quocunque etiam cono secta, latus rectum cognitum est, conum rectum inuenire ex quo hæc sectio axi parallela contingere possit.*

**S**ic latus transversum AD, latus rectum DZ, quaeritur ex hoc conus rectus, ex quo dicta sectio axi parallela contingat: quære ad AD, latus transversum, & DZ




latus rectum mediam proportionalem: deinde fiat DR, æqualis DZ, eritque in semicirculo ABR, linea DB, latus primum cono recti quaesitum. Si itaque ductam lineam BA, in E bifariam secueris, & ex E, EBL, EDM, ducantur, erit LEM, quaesitus conus. Nam ita AD, ad DZ, uti quadratum AD, ad quadratum DB. vel ita rectangulum AID, ad quadratum IK, uti rectangulum AND, ad quadratum NO, quod quaerebatur.

**Propositio VIII.**

*Omnes lineæ parabolæ ex quocunque cono secta sunt similes, & aperiunt se iuxta distantiam centri reflexionis à vertice parabolæ.*

**N**otum est semper semiordinatam ex centro reflexionis duplo longiorem distantia centri à vertice. Vnde sicut distantia centri à vertice ad quadratum



alicu-

alicuius semiordinatæ; ita alia distantia ad aliam semiordinatam ex puncto talis distantia à centro ductam. Si enim diuersæ parabolæ in aliquo cono intra se secantur, dilatant sese istæ iuxta distantias centri à vertice. Quoniam enim semiordinata MA, duplo longior distantia à vertice MG, erit PM, dupla MI; & MO, dupla MK; & MN, denique dupla ML; eritque vt GV, ad quadratum VQ, ita GM, ad quadratum MA; & sicut IV, ad KV; ita quadratum VR, ad quadratum VS. Sunt igitur omnes similes: & quemadmodum in descriptione circuli, tantò circumferentia eius euadit obtusior, quantò diameter fuerit maior; Ita & in parabola iuxta distantiam centri reflexionis à vertice ambitus, nunc maior, nunc minor, nunc obtusior, nunc acutior describitur.

**Porisma**

**H**inc patet modus facillimus parabolam ad datam proportionem ampliandi; Si enim LM, distantia centri se habuerit, vt 2. habebit sese XMN ordinata, vt 8. & si KM, fuerit, vt 3. erit ordinata applicata OMY, & 12. & sic de cæteris, vt in tabula apposita vides. Si enim numerum distantia centri in præcedentem numerum applicatum duxeris, prædabit numerus ordinatam applicatæ dictæ distantia correspondens.

| Distantia centri. | Ordinatum applicata. |
|-------------------|----------------------|
| 1                 | 4                    |
| 2                 | 8                    |
| 3                 | 12                   |
| 4                 | 16                   |
| 5                 | 20                   |
| 6                 | 24                   |
| 7                 | 28                   |
| 8                 | 32                   |
| 9                 | 36                   |
| 10                | 40                   |

*Et sic in infinitum.*


**Propositio IX.**

*Si duo similes cono in puncto verticali sibi inuicem opponantur, & ambo per planum, non tamen per verticem secantur, erunt sectiones in utroque cono similes, & hyperbolæ cum vno eorundem latere recto.*

**S**int duo cono ABC, QBT, in vertice B, coniuncti, qui secantur plano quopiam conotomo RL.

Dico sectionem DL, æqualem sectioni NR.


Fiant igitur NR, & DI, æquales, eruntque rectangula QRT, & CLA. Item DRN, & NLD, iuxta præcedentia similia, & media proportionalis RW, LV, ad inuicem æquales, estque rectangulum NLD, ad quadratum LV, sicuti ND, ad latus rectum, vel uti rectangulum DRN, ad quadratum RW, ita DN, ad latus rectum NZ. Quoniam iam NR, DL, ita, & media proportionalis, vel semiordinata RW, & LV, æquales sunt ad inuicem, & latus transversum omnibus commune, & æquale, vel vnum latus rectum habent, sequitur sectionem NR, & DL, esse æquales, quod erat demonstrandum.



Propositio X.

Si in aliqua parabola ex centro linea ad peripheriam trahatur, & ex tali puncto alia linea axi parallela ad aliquam semiordinatam normaliter ducatur, erit utraque tam longa, quam linea, quae ex centro in peripheriam in hac semiordinata fit.

ἵκνθιος.



διόρισμός.

ἀπόδειξις.

συμπέρασμα.

It parabola ADEF, centrum reflexionis H, semiordinatæ DG, CH, BL, AK, lineæ verò, quæ ex centro H, ad semiordinatas ducuntur, HD, HC, HB, HA, perpendiculares autem sint DQ, CP, BO. Dico HD, & DL, æquales esse HC: HD, & DN, æquales HB, & HD. Iterum HD, & DN, æquales HB. Item HD, & DQ, æquales HA, HC, & CP, æquales HA. Sicuti etiam HB, & BO, æquales sunt HA. Sunt ergo HD, & DQ; HC, & CP; HB, & BO, inter se, & ad HA, æquales. Quoniam enim HD, æqualis est HE, vnâ cum EG; & HC, æqualis HE, bis sumptæ; Erit etiam HD, & GH, hoc est HE, duplata æqualis HC. Similiter HB, æqualis est HE, & IE, simul sumptis. Ita quoque HC, & HI, vel CM, æqualis HB. Et quoniam HD, æqualis HE, & EG, simul sumptæ, erit & HD, & IG, vel ND, æqualis HB; ita DH, & DQ simul æquatur HA. Quod erat demonstrandum.

Confectarium.

EX hac propositione dependet ferè tota ratio speculorum parabolicorum, radios Solares in vnùm punctum H; reflectentium, vt in Magia Catoptrica dicitur. Patet quoque qua ratione, opè filii & gnomonis, parabola nullo pene negotio describi possit, quam praxim vide infra.

Porisma I. De hyperbolis.

ἡγήσις.


ἵκνθιος.

διόρισμός.

παρασκευὴ.

ἀπόδειξις.

Si verò ex oppositarum hyperbolarum centr. reflexionis in punctum quodpiam peripheriæ lineæ ducantur, erit differentia linearum æqualis lateri transverso, siue diametro exteriori.




Sint hyperbolæ oppositæ DHE, MCV, centrum vtriusque AB. Si iam ex A, & B, in punctum E, aut H, lineæ BH, AH, & AE, BE, ducantur. Dico residua AE, ex BE, vel AH, ex BH, equalia esse DC, lateri transverso. Ducantur ex A, B, centr. per vertices arcus DNG, VCM, & ex B, per D, arcus DOF, & ex punctis HE, normales, siue semiordinate ad axim DA; erit vt KD, ad ID, ita EG, ad HN, vti ex præcedentibus patet. Porro si duabus lineis AD, DB, æquales partes veluti NH, & HO, vel EG, & EF, addantur; fiunt ex horum additione partium triangula AHB, AEB, erunt HO, & EF, partes laterum triangulorum BH, & BE, æquales HN, & GE, vti ex præcedentibus patet. Quoniam igitur AD, æqualis est BC, & BD, æqualis BO, vel BF, erit etiam AG, æqualis BM. Sed EG, æqualis est EF. Erit igitur BM, & FE, æqualis AG, simul cum

cum GE, & consequenter MF, & CO, differentiæ nimirum inter AE, & BE, AH, & BH, æquales lateri transverso CD, quod erat demonstrandum. Habet hoc Porisma innumerabiles vsus in descriptione arcuum Zodiaci, vt postea videbitur.

Porisma II.

Si iterum in ellipsi ex ambobus centr. duæ lineæ in vnum punctum ambitus eiusdem ducantur, erunt tales simul sumptæ æquales maiori diametro ellipsis.




Sit ellipsis MHLN, cuius maior diameter LM, minor DH, centra AB. Si ex hisce in aliquod peripheriæ punctum verbi gratia H ducantur lineæ AH, & BH, dico eas simul sumptas æquari LM.

Si enim ex centr. A, B, interuallo AM, quadrans ducatur AMK, & ex B, interuallo BL, alius quadrans priori æqualis BLX ducatur, deinde AM in aliquot æquales partes diuidatur, atque ex hisce semiordinatæ ducantur. Hoc factò FK, & GX, in totidem partes, quot AM diuidantur, quod fiet, si ex termino semiordinatarum A, & B, arcus ducantur

ad lineas FK, & GX: erit igitur AS, æqualis AT: AR, æqualis AC: AH, æqualis AL: AK, æqualis AM, quod & de altera linea GX, dicendum est. Ita BM, æquatur BH, & PN, æqualis IK, & NX, æqualis OI. Vnde & PX, vel OK, æqualis distantia AB, est quoque OI, æqualis YH: PN, æqualis ZH: & ita OI, & PN, vel æquales ipsi YH, & ZH, simul AE, æquales. Iam verò si AY, sit æqualis AL, & BZ, æqualis PM, erit quoque AH, & HB, æqualis LM. Quod erat demonstrandum.

Theorema I.

Sole Aequatorem possidente, describit radius eius circa centrum mundi motu diurno circulum, nempe ipsummet Aequatorem. In planis verò proiecta umbra erit linea recta.



Sit axis mundi BC, equator HI: Sit Sol in aliquo punctorum eius HIMN. Dico Solis radius motu diurno circa centrum descripturum circulum. Quoniam enim ex propof. 15. lib. 1. Theodos. æquator ad axim BC, rectus est, centrum Solis, æquatoris, & terminus radij, iuxta suppositionem 5. 6. & 7. in eodem plano erunt à plano æquatoris non recedente, cumque motu diurno semper in eadem circumferentia remaneat, circulum describi necessariò patet. Circulus autem ille in planis erit linea recta. Nam omnis circuli ma-

ἡγήσις. ἵκνθιος.

παρασκευὴ.

ἀπόδειξις.

συμπέρασμα.

Sol in æquatore constitutus umbra in plano lineam rectam describit.




ximi in planum projectionem lineam rectam esse lib. 1. proposit. 4. docet copiosè Theodosius: Ergo Sole, &c. Quod erat demonstrandum.

Theorema II.

Sole extra Aequatorem cõstituto describit Solis radius motu diurno duos oppositos conos, quorum prior lucidus, alter umbrosus circa centrum mundi tanquam ad commune utriusque coni verticem; Basis autem utriusque coni erit circulus.

It Solis parallelus ED, ab æquatore quantumvis declinans, axis BC, æquator HL, centrum mundi A. Dico Solem in ED, parallelo constitutum duos conos DEA, lucidum; AFG, umbrosum oppositos sibi circa centrum mundi A, tanquam circa commune utriusque verticem descripturum. Sole enim in E, verbi gratia constituto, movetur eius radius in centrum productus semper circa superficiem parallelam ad superficiem æquatoris, cuius centrum, centrum mundi est: quod cum fixum sit circa id, necesse fariò lucis radij EAF, DAG, conicam superficiem, ut in figura patet, describent. Cum tota linea, porrecta recta sit, & æquali velocitate circa centrum, iuxta pronũciatum 6, promouèatur, formabunt radij Solis EAF, DAG, in opposito parallelo GF, aliam conicam superficiem sciathericam, siue umbrosam FG. Sole ergo extra æquatorem constituto, &c. Quod erat demonstrandum.



Theorema III.

Si planum quodpiam gnomonicum basi coni sciatherici, quem res rãs õρθãs secat, fuerit parallelum, decircinabit in hoc plano conotomo gnomonis apex circulum.

It planum KL conotomum, siue gnomonicum, DE, FG, coni oppositi, & plano paralleli; axis mundi BC. Dico MN, esse circulum, qui centrum habeat in axe mundi.

Cum enim plana FG, KL, parallela sint maximo circulo HI, & ipsi inter se iuxta 16. lib. 11. Euclid, parallela erunt. Quare cum conus AFG, secetur à plano conotomo basi FG, coni parallelo, erit sectio MN, per propof. 4. lib. 1. Apollon. Circulus centrum habens in axe BC. Si planum igitur quodpiam, &c. Quod erat demonstrandum.

Conse-

Conseclarium.


Hinc colliges primò, quodcumque planum conotomum fuerit æquidistans basibus conorum, siue parallelis signorum oppositorum diclas bases constituentium, maximos quoque parallelorum semper apparentium, & latentium, in huiusmodi conotomo plano gnomonis umbra in circulos projici. Quemadmodum primò contingit in plano horizontali suppolari. Secundò in plano verticali sub sphaera recta. Tertiò denique in omni plano ad æquinotialem æquidistante, in quibus arcus signorum circuli sunt: ut in sequentibus fufius ostendetur.

Quando & in quo plano umbra circulos describit.

Theorema IV.

Quodcumque planum conotomum fuerit lateri alicuius coni sciatherici parallelum, delineabit in dicto plano conotomo umbra gnomonis parabolam.

It A, centrum mundi, & vertex coni AFG: axis mundi BC, planum conotomum HI. Dico Solem extra æquatorem in dicto plano HI, descripturum umbra gnomonis parabolam.



Quoniam enim circulus maximus SDBTC, transit per BC polos, consequenter omnis circulus parallelas conorum bases in EF, tangens, uti & planum conotomum, iuxta proposit. 20. lib. 1. Theodos. in polis suis secabit. Cũ præterea conus sciathericus AFG, per planum HI, secetur in K, & INM, communi intersectione basis coni, & plani conotomi, plana quoque FE, HI, ad planum circuli maximi BDCG, recta sint, erit quoque eorum communis sectio IM, ad idem recta in puncto N, & ad basim coni perpendicularis, & consequenter KN, axis sectionis parallela lateri FA. Erit ergo sectio in plano conotomo HI, descripta figura IKM, parabola. Quod erat demonstrandum.

επιθασις.

ἀπόδειξις.

συμπέρασμα.

Conseclarium I.

Hinc sequitur primò, quòd quodcumque basis coni sciatherici tantum ab æquatore declinat in Austrum, quantum est complementum altitudinis poli Borei supra circulum maximum, cui planum conotomum æquidistat, umbra in eodem plano describet parabolam, siue quòd idem est, quodcumque planum horizontale coincidit cum vno latere coni, altero altitudinem æquatoris in opposita parte mensurante, quòd tunc umbra in eodem plano describet parabolam.

Quòd gnomon describat in plano parabolam.

Secundò, quodcumque parallelus Solis maximus delitescentium tangitur ab horizonte, cui planum conotomum æquidistat, erit parallelus in planum proiectus para-

*Vbinum locorū  
gnomon parabola  
tam describat.*

parabola; atque talis projectio continget sub elevatione poli 66.30. Cum enim tropicus Cancrī sub hac latitudine totus sit supra horizontem, & tropicus Capricorni totus infra, tanget horizon vtrunque in punctis à meridie, & media nocte; erit ad latus conī semper delitefcntis circulus horizontis, vti & planum conotomū æquidistans; ergo, quod inde sequitur, descriptio parabolæ. Verū, vt Lector curiosus intelligat, sub qua latitudine regionum paralleli Solis in plano conotomo parabolas projiciant, apponam hīc tabulam, in qua luculentius totum negotium patebit. Prima columna significat declinationes Signorum; secunda latitudines regionum. Sole igitur verbi gratia ab æquatore declinante 1. grad. & 12. min. describet in conotomo plano horizontali sub latitud. 88. grad. 48. min. vmbra gnomonis parabola. Ita Sole 16. grad. & 5. min. declinante describet sub latitudine 73. grad. 55. min. in plano conotomo eandem, & sic de cæteris iudicabis. Omnes enim hī paralleli tanguotur à circulo maximo, videlicet horizontali, cui planum conotomum æquidistat in puncto, quod axis conī puncto angulum intercipit elevationis æquatoris supra horizontem, vti in præcedentibus demonstrandum est.

*Tabula declinationis parallelorum Solis, in quibus constitutus Sol sub data elevatione parabola describat, indicans.*

| Declin. parall. ☉ |    | Latit. locorum |    | Declin. parall. ☉ |    | Latit. locorum |    |
|-------------------|----|----------------|----|-------------------|----|----------------|----|
| G                 | M  | G              | M  | G                 | M  | G              | M  |
| 1                 | 12 | 88             | 48 | 13                | 13 | 76             | 47 |
| 2                 | 1  | 87             | 59 | 14                | 23 | 75             | 37 |
| 3                 | 11 | 86             | 49 | 15                | 10 | 74             | 50 |
| 4                 | 22 | 85             | 38 | 16                | 5  | 73             | 55 |
| 5                 | 9  | 84             | 51 | 17                | 14 | 72             | 46 |
| 6                 | 19 | 83             | 41 | 18                | 3  | 71             | 57 |
| 7                 | 15 | 82             | 45 | 19                | 4  | 70             | 56 |
| 8                 | 13 | 81             | 47 | 20                | 21 | 69             | 49 |
| 9                 | 20 | 80             | 40 | 21                | 0  | 68             | 0  |
| 10                | 4  | 79             | 56 | 22                | 0  | 67             | 0  |
| 11                | 39 | 78             | 51 | 23                | 30 | 66             | 30 |
| 12                | 13 | 77             | 48 |                   |    |                |    |

*Confectarium II.*


*Quæ stella parabola describitur.*

Hinc patet quoque stellam quamcunque fixam in plano conotomo, tunc descripturam parabola, cum circulus maximus, siue horizontalis, cui planum conotomum æquidistat, tetigerit parallelum stellæ, & latitudo regionis tanta fuerit, quanta est distantia, siue declinatio paralleli à polis mundi.



Theorema V.

*Quandocumque circulus maximus, cui planum conotomum æquidistat, bases conorum oppositorum secuerit, describet vmbra gnomonis in plano conotomo hyperbolas oppositas, & æquales.*




Sint conī AFG, & DEA, duo conī oppositi, quorum bases DE, FG, sint paralleli Solis; fecerit autem circulus maximus, scilicet horizontalis HI, bases amborum conorū DEA, & AFG. Dico apicem gnomonis in plano conotomo KL, descripturum hyperbolas MNO, PQR, oppositas, & æquales; nam bases conorum plano conotomo secantur non per verticem. Erit ergo in vtraque superficie iuxta propof. 9. huius, sectio, quæ vocatur hyperbole, & duarū sectionum eadem erit diameter KL. Verum huius vltiorem demonstrationem vide propof. 9. & porismate 1. de hyperboles propof. 10. traditam.

*Confectarium.*


Sequitur igitur hinc primò, quòd quandocumque circulus maximus, cui planum conotomum æquidistat, parallelum illum, cuius declinatio ab æquatore minor est complemento altitudinis poli, siue elevatione æquatoris supra illum circulum maximum exaltati, hyperbolas descriptum iri: cum verò complementum elevationis poli semper maius sit parallelis intra 23. grad. & 30. min. quos circulus maximus secat, erunt omnes lineæ in conotomo plano descriptæ hyperbolæ.

Hinc patet omnes arcus signorum in sphaera obliqua in horologijs horizontalibus, verticalibus, meridianis, polaribus descriptos, esse hyperbolas.



Theorema VI.

Si planum conotomum fuerit æquidistans circulo maximo, quinqueque parallelus sit basibus conorum, neque eas tangat, neque secet, erit projecta centri umbra ellipsis.



Sit AB æquator; CD, FG. eius paralleli, conorum CDE, EFG. planum conotomum EH, secans conum EGF, per LR. Cũque hæc recta LR, conum EFG, non secet per basin, sed supra eandem in punctis laterum FE, & FG fiet sectio RL, ellipsis: planum enim conotomum EH, ut dictum est, basin conum FEG, non tangit, neque eas secat, neque iisdem parallelus est: ergo secat conum ellipticè.

Consectarium.

Hinc sequitur, quod quocumque basis conici alicuius sciatherici declinatio australis ab æquatore maior est complemento elevationis poli supra circum maximum, cui planum conotomum æquidistat: tunc in illo plano describetur ab umbra gnomonis ellipsis. Sole igitur tropicum Cancræ subeunte sub elevationi poli 66. grad. & 30. min. in plano conotomo describetur ellipsis. Ita Sole 20. grad. & 11. min. declinante, similiter sub elevatione poli 78. grad. & 51. min. in plano conotomo describetur ellipsis. In his enim complementum elevationis poli supra circum maximum, cui planum conotomum æquidistat, minus erit declinatione parallelorum. Quæ omnia ex figura clara sunt, & faciora, quam ut fufius traduci debeant.

Consectaria ex dictis propositionibus.

Quando circum describitur.

I. Quocumque planum conotomum æquidistat basi conorum, projectio umbræ erit circum, ut fit in regionè suppolari.

Quando parabolam.

II. Quocumque circum quilibet maximum tangit illum parallelum, cuius declinatio æqualis est complemento altitudinis poli supra illum circum maximum, vel quod idem est, cuius declinationis complementum æquat elevationi poli; tunc necessario in plano conotomo umbra projiciet parabolam.

Quando hyperbolam describit umbra.

III. Quocumque verò circum quilibet maximum illum parallelum secat, cuius declinatio minor est complemento altitudinis poli supra circum illum maximum, vel cuius declinationis complementum maius est altitudine poli supra illum circum maximum, necessario in plano projicietur hyperbolæ.

IV. Quan-

IV. Quocumque denique circum maximum illum parallelum neque secat, neque tangit, neque æquidistat, tunc sectio ellipsis est, hoc autem fit, quando declinatio paralleli maior est complemento altitudinis poli supra circum maximum, vel quando complementum declinationis paralleli minor est elevatione poli supra maximum circum.

V. Sub sphaera obliqua usque ad 66. gr. 30. minut. latitud. videlicet usque ad circum Arcticum in omnibus horizontalibus, verticalibus, ut plurimum hyperbolæ projiciuntur; sub sphaera obliquissima, siue parallela, seu frigida Zona, nunc parabolæ, nunc ellipses; sub ipso polo verò in horizontalibus circuli projiciuntur, ut dictum est.


VI. In planis ad horizontem inclinatis nunc hyperbolæ, nunc parabolæ, nunc ellipses, & circuli in declinantibus ab horizonte hyperbolæ projiciuntur.

Qua arte verò explicata iam parabolæ, hyperbolæ, ellipses in plano conotomo describi queant, in sequenti tractatu gymnastico docebitur.

Theorema VII.

Sole in quocumque circum maximo constituto, umbra gnomonis projicitur in lineam rectam, quæ est communis intersectio circuli maximi, & plani horographici.

Sit circum maximum ABCD secans planum horographicum EG, FH. secundum lineam EG, in cuius centro fit fixus gnomon KI, cuius vertex I idem cum centro mundi. Dico: Sole in puncto L, circuli maximi constituto, umbram in lineam rectam EG, projectam in I. Quoniam enim radius Solis centrum mundi, hoc est apicem gnomonis I, feriens in continuum producitur, secabit is circum iuxta Theorema I. in opposita parte circuli maximi, videlicet in M. Cùm ergo recta EG, in plano eiusdem circuli existat, secabit radique LIM, rectam EG, in puncto N, atque adeo umbra projicitur in rectam EG, communem sectionem circuli maximi ABCD & plani horographici EGFH: Sole igitur, &c. quod erat demonstrandum.



Consectarium.

Hinc patet communes circulorum quorumvis sectiones cum planis horologii desumere suas demonstrationes à circum maximo, cui æquidistant. Ita communis sectio æquatoris, & plani horologii dicitur æquinoctialis: quia si planum æquinoctiale protenderetur in infinitum, id planum horographicum transiens in ea, imprimeret lineam, quæ esset æquinoctialis. Ita linea meridiana est linea quæ datur in ipso meridiani plano considerata. Si enim meridiani planum aliquod in infinitum extenderetur, exprimeret id meridiei lineam in plano horographico quomodocumque sito. Ita communis sectio circuli horæ sextæ, & plani horographici est ipsa hora sexta.

ta. Pari ratione sectio communis verticalis primarij cum plano sciatherico, est linea verticalis, quæ in horizontali eadem est, quæ in verticali horizontalis, & sic de cæteris. Nota tamen, quandocunque circulus maximus alicui plano æquidistat, tunc umbram ob infinitam projectionem indeterminatam prorsus euanesceat. Hinc Sole constituto in horizonte, gnomon in plano eidem æquidistante umbram habebit infinitam, neque quicquam determinabit. Similiter Sole in verticali primario constituto, umbra in plano verticali eidem æquidistante prorsus euanesceat. Eandem proprietatem sortiuntur omnes maximi circuli ad planum aliquod paralleli: vt meridianus ad planum suum, æquinoctialis ad sibi æquidistans, & sic de reliquis.

### Theorema VIII.

*Omnes isti circuli maximi, quorum primus meridianus est, in polis Mundi coeuntes, ac parallelorum semper apparentium maximum in 24. æquas partes secantes, indicant horas à meridie, & media nocte.*

**R** Em totam vnico syllogismo demonstratio concludo. Spatia illa 24. quibus Sol motu diurno percurrit parallelos initio à meridie, & media nocte factò, 24. horæ æquales sunt à meridie, & media nocte initium habentes (est enim hora  $\frac{1}{24}$  pars diei naturalis.) Sed circuli maximi, quorū primus meridianus, per polos mundi incedentes, parallelorum semper apparentiū maximum in 24. æquas partes secantes indicant eiusmodi spatia 24. æqualia: secant enim omnes parallelos in partes similes. Ergo circuli maximi in sphaera, quorū primus meridianus sit, &c. indicant horas æquales à meridie, & media nocte initium habentes. Quod erat demonstrandum. Idem dicendum de subdiviisione circulorum in medias, & quartas horarum.

Assumpsimus autem parallelum semper apparentium maximum pro diuisione horarum, non quòd alij paralleli inepti huic diuisioni sint; ob diuisionem enim in similes partes, omnes apti esse possunt; sed ob horas ab Ortū, & Occasū, vt paulò post declarabitur.

### Theorema IX.

*Circuli maximi, quorum primus sit horizon, qui tangunt parallelum semper apparentium maximum in 24. punctis, in quibus idem à circulis horarum à meridie, & media nocte diuiditur, indicant horas ab Ortū, atque Occasū.*

**R** Em hoc syllogismo expedio.

Paria 24. tempora, quæ Sol motu diurno percurrit initio factò ab horis, hoc est, vel ab Ortū, vel ab Occasū, sunt 24. horæ æquales ab Ortū, vel Occasū initium sumentes.

Sed circuli maximi, quorum primus horizon, tangentes parallelum semper apparentium maximum in 24. punctis, in quibus diuiditur idem à circulis horarum à meridie, & media nocte, monstrat eiusmodi paria tempora 24.

Ergo circuli maximi, quorum primus horizon est, &c. indicant horas ab Ortū, & Occasū principium sumentes. Quod erat demonstrandum.


Quòd

Quòd autem parallelum semper apparentium maximum tangant, causa hæc est. Cum enim huiusmodi horæ ab horis incipiant, diuidantque singulos parallelos, quos secant (secant autem omnes intermedios) in 24. partes æquales; necessario hac diuisione, vel transibunt per polos parallelorum iuxta propof. 16. lib. 2. Theodos. vel eorum vnū tangant. Cum ergo per polos eorum non trāteant, vt in horizonte patet, sed circuli horarum à meridie, & media nocte tātum per illos ducantur; omnes necessariò vnū aliquem tangant, qui erit, quem horizon tangit, parallelus, semper apparentium maximus. Quòd verò reliquos intermedios parallelos in partes æquales secant, ex propof. 13. lib. 2. Theodos. patet: cum omnes in partes similes partibus paralleli semper apparentium maximi secantur. Sub polo cessant horæ ab Ortū, & Occasū, cum horizon idem cum æquatore sit, nec patitur diuisionem. Verum vt hæc melius intelligantur, & Theoria non ita forsan omnibus obuia percipiatur præmittenda sunt ea, quæ circa huiusmodi circulorum naturam, par. 1. cap. 1. §. 3. huius differuimus. Quibus peractis, sectiones hac methodo demonstrabimus.

### Propositio.

*Sumpsis quibuscunque duabus lineis horarijs ab Ortū, vel Occasū, quarum circuli æqualiter distet à circulo horæ cuiuspiam astronomica in maximo parallelorum semper apparentium, intersecabūt se mutuo tam duæ horæ ab Ortū, vel Occasū assumptæ in linea horaria astronomica in vno eodemque puncto, quam altera illarum ab Ortū, vel Occasū; & linea illa horæ astronomica in linea reliqua ab Ortū, & Occasū in vno eodemque puncto.*

**C**irculus efs h, sit parallelus semper apparentium maximus, quem e, s, circulus quiuis horarum astronomica, verbi gratia horæ 12. secet in e, & s, pun-



ctis extremis diametri circuli. Deinde sumantur duo puncta x y, æqualiter remo-

ta ab hora 12. es, videlicet x y, hora 10. & 2. à meridie, & media nocte. Dico hos circulos horarios ab Ortus, & Occasu in vno eodemque puncto se interfecare in linea e s, horæ 12. protracta. Cum enim circuli horarij XS, & yL, parallelum tangentes, & e s, astronomica horæ circulus, vnam habeant eandemque sectionem communem; iuxta propof. 19. lib. 1. Gnom. Clauij; fit vt si planum horologij communi huic sectioni non æquidistet, sed ipsum in aliquo puncto secet, in eodem puncto coeant dictæ tres horariæ lineæ, nempe communes sectiones plani horologij, & circulorum e s, XS, L y. Quare in quocunq; puncto vna illarum, alteram reliquarum secuerit, in eodem quoque & reliqua earundem secabit: id est, si hora XS, secet horam e s, in e, in eodem puncto eandem, quoque secabit hora L y. Quod autem de horis 10. & 2. dictum est, de omnibus, & singulis reliquis horis dictum fit.

Confectarium.

EX figuræ hîc appositæ theoria sequitur ille abacus combinatorius; certè admirabilis, quem eo artificio contexuimus disposuimusque, vt ferè in tota horologica arte nihil reperiri possit, quod non huic innitatur. Inuenies in hoc omnem cum theorematum, tum problematicam scièntiam horarum ab Ortus, & Occasu. Quænam horæ ab Ortus, & Occasu, quibusnam à meridie, & media nocte sint parallelæ; quouè in puncto, aut in quo circulo coincidunt eadem, infinita combinationum varietate ostendit. Tantusque est vsus huius tabulæ, & vsus eius descriptio, vt vel in prægrandem tomum excurrere possit. Nos tantum horarum ab Ortus, & Occasu in quolibet plano describendarum vsum breuiter hic declarabimus. Et qua ratione tabulæ particulares in vsum gnomonicum extrahi possunt, per varia paradigmata ita ostendemus; vt non dubitem quin curiosus Lector infinitum campum varietatis sibi suppellectilis coaceruandæ, ex hoc ipso, quo spartam suam exornet, sit habiturus.



Abacus

| G  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | I  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | O  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | K  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | N  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |

| A<br>Horæ<br>ab Ortū | B  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | E<br>Horæ<br>ab Ortū | C  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                      | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |                      | 12 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Vsus Abaci Combinatorij.

Hunc Abacum abdito quodam artificio ita disposuimus, ut non parallelismus tantum horarum ab Ortū, & Occafu ad horas astronomicas, sed & quæ in iisdem horis reperitur interfectionum immensa varietas, vna quasi synopsis ob oculos poneretur. Atque de modo methodoque quidem, qua cum confluximus, non est, quod suscitamus agamus; res ipsa sagaci Lectori patebit, quare ad vsum eius in Gnomonica declarandum, qui totius instituti nostri finis est, calamū conuertamus.

Primus vsus Abaci in describendis horologijs horizontalibus ab Ortū, & Occafu.

Cum in sequentibus harum tabularū ope omnis generis horologia simus confluxu; Abacusque fusior ampliorque sit, quam ut forsitan Tyrones velint: hoc loco docebimus, qua ratione particulares tabulæ ex eo in vsum horologiorum describendorum, extrahi possint.

Si quis igitur Tabulam particularem pro horologijs horizontalibus excerpti desideret, is adeat columnā signatam literis A C bifrontem, idest duplici horarum genere insignitam; prima denotat horas à meridie, & media nocte, ab 1 ad 12 progrediendo; altera denotat horas ab occasu ab 1 ad 24 excurrando. Si igitur has horas, earumque medietates, quadranteseque sibi transfuerim respondentes seorsim extraxeris; habebis vtrarumque horarum parallelismū; quæ scilicet horæ astronomicae, quibus horis ab Ortū, & Occafu æquidistant. Quia tamen ad horologium confluxuendum minimè sufficit dictus parallelismus, oportebit iam horas quoque assignare astronomicas, in quibus sese dictæ horæ in æquinoctiali horologij intersecant. Has horas dabit tibi columnæ E F, comparatas ad horas ab Ortū, & Occafu in columna BD contentas. Ita 2 3 in columna BD ã regione responderet horæ quintæ astronomicae; 22 quartæ; & sic de cæteris. Per has enim in æquinoctiali ducuntur horæ ab Ortū, & Occafu. Si igitur numeris horarijs iuxta bifrontem columnam, subiunxeris numeros columnæ EF, habebis tabulam pro horizontalibus, & verticalibus quæsitam, ut sequitur.

Tabula particularis.

|                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| Horæ ab occasu         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22 | 23  | 24 |
| astro. in linea h. 12. | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
| astron. in æquinoct.   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |

Prima columna monstrat horas ab Occafu; altera monstrat, quibus illæ eadem sint parallela; tertia ostendit, per quas horas astronomicas in æquinoctiali horologij deducendæ sint horæ ab Occafu, ut sint æquidistantes. Horis astronomics in secunda columna contentis. Quarum omnium pragmatias vide in sequentibus.

Canon 2. Pro Verticalibus.

HAEC præcedens tabula non horizontalibus tantum, sed & verticalibus seruire potest, etsi dispari ratione. In horizontalibus enim attenditur parallelismus horarum; in verticalibus vero sectio horarum in linea horizontali, siue linea horæ 24. Si enim horas Italicas in primo tabulæ ordine contentas duxeris, per horas secundi ordinis in punctis, ubi eas linea horizontalis secat, & per tertij ordinis horas

horas astronomicas in æquinoctiali rectas duxeris; habebis horologium verticale quæsitum.

Si iterum in tabulam redigas columnam G H bifrontem intitulatam hora 12, secundum numeros transuersim correspondentes, vt hic sequitur, habebis aliam tabulam pro horologio horizontali.

*Alia tabella pro Horizontalibus.*

|                 |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Horæ ab occ.    | 9   | 10 | 11  | 12 | 13  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| in linea h. 12. | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 1  | 1½ | 2  | 2½ | 3  | 3½ | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  |
| astron. in æqu. | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

**P**rima columna monstrat horas Italicas: secunda, horas astronomicas, per quas videlicet in linea horæ 12 ab Occasu primæ columnæ horæ deduci debeant. Tertia columna, per quas horas astronomicas eadem in æquinoctiali ducendæ sint. Si igitur quispiam hac tabella vti voluerit, conficiet is alia ratione horologium horizontale ab Ortū, vel Occasū. Et sic ex abaco in finitas propè similes tabellas sibi ad dicta horologia construenda, excerptere poterit.

Pro verticali quoque horologio aliam tibi tabellam, comparare poteris: si videlicet in columna A C acceperis horam 6. astronomicam, & deinde transuersim procedendo, horas astronomicas, prout horis ab Ortū, vel Occasū in fronte, vel calce tabulæ correspondent, seorsim describeris. Nam area communis horæ 6. & 24. est 12. 6. & 23. est 13. & sic de cæteris. Sed hæc fusius in tractatu de horologijs ab Ortū, & Occasū describendis tractabuntur.

*Canon 3. Pro horologijs meridianis: ☉ primo quidem pro Occidentali.*

**P**ro meridiano horologio, seruiet tibi tabula alia ex abaco nostro combinatio extracta hac industria, vide columnā H G notatam titulo horæ 12. Si enim horas bifrontis huius columnæ sibi transuersim respondentes in separatam tabulam extraxeris, habebis vnde facillimo negotio meridianum horarium conficias. Quia tamen non omnes huius tabulæ horæ seruiunt, solos horarios numeros inter columnæ spacium GV, contentos in vsu sum tuum excerptere poteris, vt sequitur.

|                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Horæ Italicæ              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Astron. in linea horæ 12. | 1½ | 2  | 2½ | 3  | 3½ | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  |
| Astron. in æquinoctiali   | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

Si itaque horas Italicas per singulas horas binas in linea horæ 12. & in æquinoctiali rectas duxeris; dabunt illæ tibi meridianum Occidentale, quæsitum.

*Canon 4. Pro Orientali meridiano.*

**T**abulam separatam pro meridiano Orientali, tibi suppeditabit columna A C, si numeros horarū transuersim sibi respondentes excerpteris; ab Orientis in <sup>est</sup> Solis hora, quæ hic Romæ quasi 9. ab Occasū est; & in secunda columna continetur incipiēdo; ab hac enim descēdendo, & vsque ad horā meridianam procedēdo; si ho-

ras

ras sex secundæ columnæ, horas videlicet, astronomicas, & Italicas in tabulam redegeris, habebis vnde facile dictum meridianum conficias. Horæ autem astronomicæ in tertia serie tabellæ contentæ ita inueniuntur. Quare horam Italicā, verbi gratia 9. primam in tabellæ primo ordine; deinde vide quæ eidem in columna EF, Abaci respondeat, & inuenies 3. atque hæc erit, per quam hora 9. Italica in æquinoctiali transibit, & sic consequenter 10. transibit per 4. & 11. per 5. & sic in cæteris iuxta tenorem abaci procedendū est: habebisque tabellam completam, vt sequitur.

|                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Horæ Italica         | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Astron. in horizonte | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½ |
| Astron. in æquinoct. | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  |

Si igitur horas Italicas primi ordinis, per binas quaslibet in secunda, & tertia serie tabellæ contentas horas duxeris, habebis horologium Orientale quæsitum. Innumeras hoc loco alias tabellas proponere possem, ad datam horam constructas. Verum hæc ob temporis breuitatem Lectori otiosiori relinquenda sunt.

*Canon 5. Pro Horologio Polari.*

**H**ac tabula eadem est cum ea, quam Canone primo pro horologio horizontali assignauimus. Si quidem horæ per lineam horæ 24. ab Occasū polaris plani deducendæ sunt. Si verò per lineam horæ 12. horæ in dicto plano transire debent, vteris tabula Canonis tertij pro horologijs meridianis; hæc enim vtrique plano seruit.

*Canon 6. Pro Horologio Aequinoctiali.*

**T**abula in canone primo pro horizontalibus condita, horologio quoque in plano æquinoctiali seruiet. Quare de eo fusiores esse nolimus. Hic solum notandum, has tabulas vniuersales esse, & omnibus planis quantumuis irregularibus conuenire, dummodo sectionum primariorum circulorum, horæ 24. siue horizontalis, horæ 12. ab ortu, & occasu; horæ 6. & 12. à meridie, & media nocte rationem habeas. Præterea dato circulo quolibet noto horarum ab ortu, & occasu inuenies in eo ex Abaco cum parallelismum horarum; tum communem earundem intersectionem. Quæ omnia te Abacus melius docebunt, quam ego vel multis verbis explicare possum.

*Canon 7. Pro Horologijs Babylonis.*

**B**abylonica horologia cum sint inuersa Italicis, proprijs quoque tabulis egere non videntur. Si enim numeris horarum Italicarum, siue ab Occasū, addas numeros horarum ab Ortū, habebis tabulam confectam pro horologijs Babylonis; vt in tabella sequenti apparet.

|         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Italic. | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Babyl.  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |

Si igitur vbicumque in tabulis horæ Italicæ occurrerint, ex hac tabula ijs correspondentes horas Babylonicas posueris; habebis tabulam, in qua horæ Babylonice

cæ

cæ per singulas binas horas astronomicas in vltima, & penultima serie contentas transire debent. Sed de his fufius in tractatu de regula sciatherica.

Atque hæc breuiter, de vsu propofiti Abaci combinatorij dicta fufficiant.

### Theorema X.

*Circuli maximi, quorum primus fit meridianus, siue circulus horæ sextæ parallelum semper apparentium maximum una cum reliquis parallelis in duodecimas partes inæqualiter in sphaera obliqua secantes; indicant horas inæquales ab Ortū, & Occasu initium ducentes.*

**C**vm sub sphaera obliqua singuli paralleli ab Aequatore vtrinque æquidistantes arcus habeant æquales diurnos nocturnis, diurnos autem, aut nocturnos inæquales, ita vt quanto horas æquinoctiales superat diurnus, tantò ab horis æquinoctialibus alter superetur diurnus: cum præterea quilibet parallelorum in duodecim partes æquales diuisus censeatur, eademque sit proportio partis ad partem, quæ totius ad totum: sit vt  $\frac{1}{12}$ , arcus 69. tantò sit maior hora æquinoctiali, quantò hora  $\phi$  eadem sit minor. Erunt proinde excessus illi inæquales: quod non fieret, si æquinoctialibus horis æquales forent. Quod & de singulis alijs parallelis dicendum est; vnde formo tale argumentum.

Spacia temporum illis duodecimis arcuum noctu-diurnorum partibus respondentia, quibus Sol motu diurno ac nocturno arcus illos inæqualiter alijs alia comparando percurrit, sunt horæ inæquales ab Ortū, & Occasu initium ducentes.

Sed circuli maximi, & c. per duodecimas omnium arcuum diurno-nocturnorum partes transeunt, eiusmodi spacia ostendunt.

Ergo circuli maximi in sphaera, & c. Quod erat demonstrandum.

#### Corollarium.

**S**equitur primò, sub sphaera recta huiusmodi horas cum horis astronomicis coincidere; cum enim omnes ibi paralleli ab horizonte bifariam secantur, singuli arcus parallelorum diurno-nocturni in 12. æquales partes diuisi assignabunt horas æquales à meridie, & media nocte, quibus ab Ortū & Occasu incipiendo respondent antiquæ. Nulla ergo hic differentia horarum, nisi tantum initij numerationis.

### Theorema XI.

*Quandocunque planum aliquod sciathericum axem mundi secat, secabunt & in eodem puncto tanquam polo sese omnes lineæ horarum à meridie, & media nocte.*

**C**vm enim omnes lineæ horarum à meridie, & media nocte transeant per mundi polos, vt in theoremate ostensum est, erit axis mundi eorum planorum communis sectio. In quo igitur axis plano occurrit, occurrunt & lineæ horariæ astronomicæ. Quod erat demonstrandum.

Ex quo patet, lineas horarias à meridie, & media nocte in omnibus horologijs,

quorum plana axem secant in puncto communis sectionis tanquam centro coire, cuiusmodi sunt omnia verticalia, quacumque ratione declinantia (excepto meridiano) horizontalia, æquinoctialia; inclinantia (excepto polari) & inclinata (excepto congruo cum meridiano verticali.)

### Theorema XII.

*Si horologij planum axi parallelum fuerit, erunt proiectæ lineæ horarum à meridie, & media nocte æquidistantes ad se inuicem.*

**C**vm enim omnes horarij circuli à meridie, & media nocte describantur, ex propof. præcedentibus per polos mundi, vbi eorum circumferentiæ se intersecant; erit axis mundi communis eorum planorum sectio. Quare si planam horologij ipsos circulos horarios secans æquidistet alicui circulo per polos mundi, atque adeo per axem ducto, vel ipsi axi, erunt illorum circulorum, & plani horologij ipsos secantis communes sectiones hoc est lineæ horariæ à meridie, & media nocte omnes parallelæ. Ergò si horologij planum, & c. quod erat demonstrandum.

#### Corollarium.

**P**atet ex hoc theoremate, omnes horarias à meridie, & media nocte lineas, in omni plano, quod axi mundi æquidistet, vt in meridianis, polaribus, in horizontali sub sphaera recta, & verticali suppolari, esse parallelas. Eandem ob causam verticales circuli in plano verticali, paralleli sunt, & in horizontali in centro horizontis coeunt, quia illud verticali parallelum est, hoc verò axem horizontis secat.





# APPARATVS PARS SECVNDA PROGYMNASMATICA

*In qua de usu & utilitate omnia ea, quæ ad Magnam Artē nostram quouis modo deservire possunt, inuestigantur, & ad praxim ordinantur.*



VM magnus in hac arte Gnomonica nostra tabularum sequentium futurus sit vsus, neque ex omnibus presto sint; ea, qua fieri potest breuitate simul, & facilitate, modum earum calculandarum hic docebimus, ne quicquam huic arti ad perfectionem deesse videatur. Sit itaque

## PROGYMNASMA I.

De calculo Astronomico, ad Gnomonicam directo  
Prelusio.

*De linea Meridiana, deque altitudine poli inuenienda supra  
quercunque Horizontem.*



Trumque hoc problema varijs in locis pertractat Clavius. In sphaera cap. 2. dum egit de officijs circuli meridiani, in Gnomonica libro primo scholio propof. 23. & scholio secundo propof. 28. In libello de fabrica, & vsu instrumenti cuiusdam Horometri cap. 18. & denique in Astrolabio lib. 3. can. 12. & 13. Quæ cum sint eiusmodi, vt sine illis nulla Horologiorum constructio recte institui queat; visum est hic quoque nostræ speculationis industria nouas methodos adducere, ne hac in parte Horologiorum studiofis defuisse videamur. Coniungo autem vtrumque hoc problema, non quod vnum sint, aut parum inter se differant; sed idcirco quod vtrumque ijdem fere præceptis absoluantur, mutualque sibi præbeant manus.

II. Nam cum lineam meridianam inuestigamus in quouis Horizonte, nihil aliud quærimus, quam communem sectionem circuli meridiani, quam cum eodem plano horizontali facit: cuiusmodi licet vna tantummodo sit in eodem loco, quia tamē ad multa milliaria meridiani sensibilibiter non differunt; sit vt etiam in eodem plano plures esse possint lineæ meridianæ, nempe omnes illæ, quæ illi communi sectioni æquidistant. At vero dum altitudinem poli obseruamus, inquirimus arcum circuli meridiani interceptum inter Horizontem, & polum ex ea parte, qua idem polus inclinat. Vel, quod in idem incidit, inquirimus angulum, quem in plano meridiani ad centrum mundi facit axis mundanus cum communi sectione meridiani, & horizontis, hoc est cum linea meridiana horizontis. Ita vt omnino diuersa inter se sint hæc duo problemata, cum vnus inuestigatio fundetur quodammodo in hori-

zonte

zonte, alterius verò in circulo meridiano. Nihilominus, vt diximus, & manifeste apparebit ex sequentibus, magna est vtriusque affinitas, quod attinet ad praxim inuestigandi.

III. In eisdem porò problematibus continentur alia duo, videlicet inuentio lineæ verticalis in plano horizontali, & lineæ æquinoctialis, in plano meridiano, eaque non minus quam illa frequentia. Immo plerumque ex his, illa procedunt: ita vt prius inueniatur linea verticalis, vel æquinoctialis, & hinc describatur meridiana, vel axis. Quæ tamen descriptio nouo artificio non indiget. Cum enim Meridianus, & Verticalis primarijs ad se inuicem sint recti, & vterque ad horizontem perpendicularis; sit vt etiam earum communes sectiones, quas faciunt cum horizonte, hoc est, linea meridiana, & verticalis ad se inuicem sint perpendiculares, cuiusmodi lineas erigere nemo est, vel mediocriter in Euclide versatus, qui nesciat. Eodēque modo axis, & æquinoctialis ad se inuicem sunt perpendiculares, siquidem, & circulus ipse æquinoctialis ad suum axem est rectus. Quod si arcum habenda sit ratio, vel angulorum, deducetur etiam hoc alio modo ex inclinatione circuli æquinoctialis, inclinatio axis, vel arcus altitudinis poli. Cum enim arcus meridiani, mēsurans inclinationem æquinoctialis, siue angulus, quem in plano meridiani facit linea æquinoctialis, cum communi sectione meridiani, & horizontis, semper sit cōplementum arcus altitudinis poli, vel anguli inclinationis axis, vt in sphaera docetur: patet, si arcus inclinationis æquatoris auferatur ex quadrante, vel angulus inclinationis æquinoctialis ex angulo recto, remanere angulum inclinationis axis, vel arcum altitudinis poli. Atque hæc inuentio lineæ meridianæ ex linea verticali, vel altitudinis poli ex inclinatione æquatoris, & contra, diligenter est retinenda; siquidem non solum in præsentibus problematibus, sed in plurimis etiam alijs locum habet; vt suis locis fiet manifestum.

IV. Nunc ad praxim ipsam propius accedamus: pro qua duo potissimum instrumenta sunt necessaria. Vnum est Quadrans, vel Quadratum seu quodcumque aliud instrumentum, per quod altitudo Solis obseruari consuevit. qua re lege canonem primum lib. 3. Astrolabij Clauij, necnon cap. 22. libelli de fabrica instrumenti Horometri, quod breuitatis gratia hoc modo libet appellare. In his enim locis reperies tum modum capiendi altitudines Solis, tum fabricam diuersorum Instrumentorum ad hoc negotium spectantium. Inter quæ mihi videtur præcipuū locum obtinere duo: nempe Quadrans, quem docet construere in scholio canonis primi Astrolabij; & Quadratum in libello illo fabricæ Horometri capite prædicto constructum. Vtrumque enim, si bene diligenterque sit præparatum, exhibet non solum gradus integros altitudinis Solis quæ sit, sed etiam minuta, quorum omnino habenda est ratio in inuestigatione lineæ meridianæ, vel altitudinis poli. Licebit autem hanc inter duo illa instrumenta differentiam aduertere: Quod illud, nempe Quadrans, in vsu quidem sit expeditius, at in constructione nonnullam patiatur difficultatem, tum propter multitudinem quadrantum, tum propter diuisionem eorūdem in partes plurimas æquales, quæ vel in vno quadrante molesta esse solet. Hoc verò, nempe Quadratum, è contrario fabricam habet facillimam, cum omnes lineæ sint rectæ, diuisionemque requirant minime molestam. At in vsu requirit calculum, quo ex partibus abscissis beneficio sinuum, vel tangentium, erui debet angulus altitudinis, vt loco citato à Clauio explicatur. Non mihi tamen videtur esse vlla ratio, cur propter eiusmodi calculum, qui solum est vna multiplicatio, vel diuisio, tam nobile instrumentum fugiamus; præsertim cum exactissimum sit, & omnino hanc ultra alias diligentias, inuentio lineæ meridianæ, vel altitudinis poli, industriam requirat. Neque enim eius sum sententiæ, vt eodem Quadrato vtendum putem in communi vsu, quando per altitudinem Solis horam inuestigare libet, vel aliud problema minoris momenti; sed solum in problematibus exactioribus, vt sunt duo, quæ


*Inuentio altitudinis poli.*

*Quæ necessaria ad perfectam obseruationem.*

hoc capite proponimus, quæ saltem semel inuenisse cum diligentia debita conuenit, in ciuitate, vel loco, ubi quemque commorari contigerit: nam, vt postea suo loco dicemus, facile ex linea meridiana semel inuenta quoruncumque aliæ in alijs planis inde non multum remotis describi possunt sine magno labore.

V. Alterum instrumentum est, quo in plano horizontali notatur linea vmbra; quam videlicet gnomon, seu stylus aliquis ad horizontem rectus projicit, quæ est communis sectio horizontis, & circuli verticalis in quo tempore obseruationis Sol existit. Et licet ad eiusmodi lineam signandam sufficere videatur gnomon, vel etiam filum quoduis perpendiculariter suspensum; Clavius tamen proposition. 23. lib. 1. gnom. & cap. 18. libelli de fabrica Horometri, vititur certo quodam instrumento, vt ibidem videre licet: Cuius loco ego aliud construxi aliquantulo simplicius, & fortassis multo ad vsum accommodatius, nempe regulam quandam solidam, qualè hic depictam vides, quæ etiam sui constructionem non obscure insinuat. In ea enim id solum requiritur, vt in finem latus seu basis, & facies anterior, quam represen-

Alterius instrumen-  
tis fabrica.




tant plana A, B. ad se inuicem sint rectæ, & diligenter complanatæ: deinde, vt crassities regulæ aliquantum excuetur ad libitum; & postremo per superficies A, B, duo fila, vel potius duo pili caudæ equinæ extendantur, vnus prope basim, & alter prope oppositum. Neque adeo refert, vt iidem pili sint paralleli inter se, vel basi; quamuis si id fiat, idem instrumentum reddatur quoque aptum ad alios vñs, præsertim si latitudo regulæ non sit nimis parua.

Instrumentum  
Petri Nonij.

VI. Ad finem scholij canonis 12. Astrolabij adfertur adhuc aliud instrumentum à Clauio, quod ingeniosissime Petrus Nonius iam olim eum in finem excogitauit, vt per illud simul, & linea vmbra obseruaretur beneficio lateris trianguli erecti, & altitudo Solis beneficio quadrantis in eodem descripti. In quod cum primum incidissem, summo pere placuit inuentio, non solum propter fabricam, quæ videbatur facilis rem in abstracto consideranti, sed maxime propter vsum omni ex parte expeditum, vt apparebit. Verum in praxi mihi res aliter se habere visa est. Nam cum per instrumentum maiusculum (paruum enim in similibus problematibus non inferuit) obseruationem aggressus fuisset; reperi nihil prodesse magnitudinem; siquidem non nisi exigua particula vmbra, quas latera trianguli projiciunt, distinctè aduertit potuit, adeo vt ad gradus vsque Quadrantis, quos auferre debebat, non satis exquisite pertigerit. Vnde necesse fuit, hoc instrumento relicto, ad solita recurrere: in quibus, si vel hoc vnum obseruetur, vt operatio per duos instituat, quorum vnus vmbra notet per instrumentum num. 5. adductum, & alter altitudinem Solis eodem temporis momento accipiat, nullus prorsus error ob duplex instrumentum obrepit. Si tamen adhuc prædictum Nonij instrumentum alicui arrideat, illi ego consuluerim, vt ex centro Quadrantis tenue filum suspendat. Hoc enim per exiguam illam particulam vmbra, quam licet discernere, extensum, auferet multò apertius gradus optatos ex quadrante, quam ab eadem vmbra dubia auferantur. Loco etiam lateris, quod debet projicere lineam vmbra, poterunt duci duo fila, ad similitudinem instrumenti à nobis constructi, vt quibus facile ex eius vñ con-  
terit, qui est talis.

VII.

VII. Obseruaturus lineam vmbra, depone instrumentum præconstructum supra planum horizontale, quale est planum C, ita vt basis instrumenti superficiem plani contingat. Deinde circumduc idem instrumentum donec concidant in subiecto plano vtriusque pili vmbra, in rectam vg HI, quam ipse vmbra concursus effingit, vt in figura hic apposta videre licet. Eadem enim recta HI, erit linea vmbra, seu communis sectio plani horizontalis, & verticalis, qui eo tempore transit per Solem, quam designare libebat. Quia verò vmbra lineam aliquam permanentem non depingunt, idcirco oportebit illico in eadem vmbra duo saltem puncta notare, vel certe duo puncta iuxta superficies A, B. Ita enim remoto instrumento poterit per illa duo puncta duci linea HI, beneficio alterius regulæ, qua aliàs lineas rectas signare solemus. Nisi forte latus, quod in instrumento opponitur superficibus A, B, iisdem superficibus factum sit parallelum, atque in modum regulæ perfecte sit dedolatum: tunc enim iuxta illud latus licebit in plano C, aliam lineam describere, quæ cum parallela existat rectæ HI, representabit etiam ipsa communem sectionem horizontis, & verticalis per Solem tunc incedentis, quam querimus. Mihi tamen magis placet prior ratio; eo quòd facilius sit habere regu-



lam subtilem bene constructam, quam regulam solidam, vt est instrumentum, quo vtimur.


In hac eadem figura habes quoque modum capiendi altitudinem Solis per Quadrantem, non quòd quadrantem ita semper sit necesse suspendere, vt per pinnulas excipiat radius Solis transiens per verticem instrumenti, qualis est ille quem diximus; sed ex quocunque loco, suspendendo quadrantem. Si quidem omnes radij Solis vno eodemque tempore sunt paralleli, vt in tractatu de mensurationibus explicari solet. Atque hæc de duobus instrumentis, ad solutionem problematum propositorum accommodatis. Sequitur nunc eorundem problematum praxis: quæ cum varia existat, visum est suis quamque titulis distinguere, vt facilius inueniatur id quod queritur. Ordinem autem ab ea praxi, quæ præter tres obseruationes altitudinis Solis, & tres vmbra, aliud nihil supponit: quæ cum ingeniosissima sit vt pote ab ingeniosissimo B.M. Patre Christophoro Crienbergerio inuenta, eam hic fuisse in gratiam eorum, qui subtilibus huiusmodi Geometricis ratiocinijs delectantur, describendam duxi.

### Problema I.

*Lineam Meridianam, altitudinem Poli amplitudines Ortius  
& Occiduas, parallelos ad hæc Solis, ex tribus vmbra,  
& tribus altitudinibus Solis, noua methodo Geometricè reperire.*

VIII. **I**N loco qui Soli, vel toto die exponitur, vel saltem per bonam diei partem, colloctur saxum aliquòd benè complanatum, vel tabula, quæ per calorè non

non facile incuruetur, eaque per cap.3. quoad fieri potest exacte libretur; & si forte marmor sit candidum, aliquantum denigretur, vt ne oculis candor officiat, & in eo vmbrae perfectius discernantur, quas constat experientia, in plano albo vix posse iuste discerni. Vnde commodissimus videtur ille lapis niger, qui Genua Romam deferri consuevit, & ex quo in Germania pugillares conficiuntur, vel etiam in plerisque locis domus ac turres teguntur; quem vt complanare ob teneritudinem laboriosum non est, ita quoque lineas delicatissimas admittit, quae iterum pumice deleri facillime possunt, quando eas auferre libuerit. Deinde in plano sic constituto describatur circulus ABCD, mediocris magnitudinis, & tempore matutino vna cir-



*Praxis anspiciunt.*

citer hora, vel altera post Ortū quando, aer est purior, obseruetur primo per instrumentum num. 5. constructum vmbra AE, transiens per centrum E, vel certe primò notetur vmbra seu linea verticalis, in quo tunc Sol existit vtcunque, eidemque postea ducatur parallela per centrum E, cuiusmodi est vg. recta AE. Qua ducta, vel potius notatis duobus punctis in vmbra, vel quod magis probo, relicto in eo situ instrumento, in quo vtriusque pili vmbra in vnam incidit, vt scilicet postea notentur puncta iuxta superficies A, B, & per ea linea ducatur tempore commodiore; accipiat sine mora per quadrantem, vel quadratum altitudinis Solis, cui in circulo ABCD, æqualis sit arcus AB, abscissus, ad vtramlibet partem vmbrae AI. Secundò, Notetur similiter circa meridiem, quando Sol est altior, vmbra CE, cum sua altitudine, cui æqualis sumatur arcus CD. & denique vespere vna, vel duabus circiter horis ante Occasum obseruetur tertia vmbra FE, Solisque altitudo FG. His enim peractis facta erit necessaria operatio, quam per instrumenta institueri oportebat, & ad quam Solares radij requirebantur. Reliqua verò operatio, deinceps in vmbra, & quouis alio tempore commode, etiam diebus sequentibus perfici potest in hunc modum. Ex punctis altitudinis Solis B, D, G, demittantur in proprias vmbrae perpendiculares BH, DI, GK, (quod facile fit si singulis arcibus altitudinum in alteram partem sumantur æquales, punctaque extrema rectis iungantur, vt multis in locis obseruatur à Clauio) secantes easdem vmbrae in punctis H, I, K, quorum duo HK, quæ videlicet sunt in vmbra matutina, & vespertina, nectantur cum reliquo puncto I, rectis IH, IK, quæ versus H, K, productæ sint vtcunque. Ex eisdem quoque punctis I, H, agantur ad libitum parallelae IL, HM, itemque ex punctis I, K, parallelae IN, KO, & quidem IL, IN, sumantur æquales perpendiculari ID; at HM, æqua-

æqualis ipsi HB, & KO, ipsi KG. & per L, M, eiciatur recta LM, secans IH, in P. & per puncta N, O, recta NO, secans IK, in Q; eruntque inuenta duo puncta, P, Q, que vt demonstrat Clauius in scholio canon. 12. Astrolabij, sunt in communi sectione plani horizontalis, & paralleli, in quo illo die Sol existit. Atque idcirco, si eadem puncta P, Q, recta iungantur PQ, ea erit illa communis sectio; atque adeo, recta ER, quæ ad eam ex centro E, demittitur perpendicularis erit linea meridiana, vt loco citato demonstratur. Immo quæcunque alia linea ad eandem perpendicularis, erit linea meridiana, qualis est recta IS, ex qua poli altitudo sic eruitur. Si enim ex I, super eandem IS, excutatur perpendicularis IT, vel per I, recta PQ, agatur parallela, eademque IT, perpendiculari ID, accipiat æqualis: Constituet ducta TS, angulum ITS, altitudinis poli, & IST, angulum complementi altitudinis poli, quos quærimus, vt in eodem Scholio demonstratur. Sed hic ad exactiorem operationem aliqua sunt annotanda.

*Quomodo observatio commode institienda.*


IX. Primò, vt pro eiusmodi obseruationibus eligantur potius dies prope solstitia, quam alij dies prope æquinoctia; propterea quòd circa æquinoctia eodem die Declinationes Solis magis varientur, quam circa solstitia, vbi Sol non eodem tantum die, sed pluribus etiam diebus, quasi in eodem semper parallelo existit. Ita vt tunc sine vilo errore sensibili recta PQ, sumi possit pro communi sectione illius paralleli, & plani horizontalis.

X. Secundò, cum vniuersa quasi perfectio Problematis huius versetur in præcisa inuentione punctorum P, Q, in ea parte præcipue elaborandum esse, vt eadem puncta iuste inueniantur: id quod fiet, si ea diligenter obseruentur, quæ hic subiiciuntur. In primis, vt in ducendis parallelis vg. IL, HM, (idem intellige de reliquis) earum inclinatio constituatur versus minorem altitudinem, nempe versus punctum H. Deinde in ducendis iisdem parallelis seruari poterit hæc praxis, quam inter alias in similibus operationibus experior certior. Centris I, & H, describantur quouis intervallo duo arcus VX, YZ, versus partes inclinationis, ex eisdemque auferantur quicunque arcus æquales VX, YZ, maiores, vel minores, prout inclinatio earundem requirit: ductæ enim IX, HZ, erunt inter se parallelae, eoque exactiores, quo descripti arcus fuerint maiores, quod attinet ad eorū semidiаметrū. Præterea, in accipiedis rectis IL, HM, sūma adhibenda est diligentia, vt respondentibus perpendicularibus prorsus existat æquales. Nam si forte iuncta LM, quæ protracta debet exhibere punctum P, nimis oblique secet rectam, IH, sumendæ erunt earundem perpendicularium ID, HM, non solum æquales, sed etiam multiples, vg. duplæ, quales sunt IL, Hm, vel triplæ, quadruplæ, &c. in quibus facile committitur aliquis error nisi primarum linearum intervalla quam exactissime fuerint accepta. Si autem in hac parte debita quoque adhibita sit diligentia, inuenietur punctum P, multo exactius, vt videre licet in figura, vbi vides rectam Im, multo rectius secare rectam IH, quam rectam LM, quæ tamen etiam ducenda erit, vt certiores simus de inuento puncto P, siquidem & ipsa per idem punctum debet transire, si error aliquis commissus non est, vt patet ex prop. 4. lib. 6. Euclidis.

XI. Huc spectat etiam hæc alia obseruatio, posse scilicet ex eisdem tribus vmbrae, & altitudinibus Solis inuentis, reperiri tertium punctum, quod cum punctis P, Q, in vna recta linea existat: quod quidem quando commode haberi potest, non est negligendum, siquidem per tria puncta semper certius ducuntur lineæ rectæ, quam per duo, immò tertium illud punctum certiores nos reddet de operatione facta, si tamen in eadem cum reliquis linea existat, vt dictum est. Iuncta enim KH, & versus punctum minoris altitudinis Solis protracta, quale est punctum H, agantur rursum per K, & H, duæ parallelae Kg, Hb, æquales vel multiple correspondentium perpendicularium KG, Hb, (in exemplis sumptimus rectas Kg, Hb, triplas) ducta namque gb, & producta secabit rectam KH, in tertio illo puncto a: quod tamen

temen in figura non potuimus habere, ob nimiam distantiam; id quod semper accidet quando altitudines punctorum K, I, parum differunt. Vnde fortassis non incon-  
sultum fuerit etiam quartam umbram cum sua altitudine eodem die obseruari, quæ magis differat ab alterutra alterius punctorum K, H. quæ si etiam satis differat ab altera puncti I, inuenietur commodissime non solum punctum tertium, sed etiã quartum, & quintum, vt constat ex alijs operationibus hic factis.

XII. Placet hic postremo loco etiam illud insinuare, quod fortassis in praxi à nobis adducta desiderauerit is qui ex praxi Nonij nõnnulla alia deduci posse aduertit; nempe declinationem, & locum Solis, latitudinem Ortuiam, & Occiduam, &c. quæ quidem omnia facillime etiam habentur ex nostra praxi. In primis enim, si ad meridianam ER, in centro E, perpendicularis erigatur rEs, secans circulũ ABCD, qui horizontem refert, in punctis r, s, ea erit verticalis linea exhibens vera puncta Ortus, & Occasus, nempe puncta r, s, in quibus horizontem secat æquinoctialis, vel proprius verticalis. At verò recta PQ, secans eundem horizõtem ABCD, in x, y, dabit punctum x, in quo eo die Sol ortus est, & punctum y, occasus; atque adeo arcus rx, sy, erunt arcus amplitudinis Ortuiæ, & Occiduiæ.



Deinde, si idem circulus ABCD, accipiatur pro circulo Analematis, hoc est pro circulo meridiano, in quo recta pER, est communis sectio horizontis cum meridiano, accipiaturque arcus pq, complemento altitudinis poli æqualis erit qEc, communis sectio meridiani, & æquinoctialis; cui si per punctum R, parallela agatur rKu, ea erit vera diameter paralleli Solis, quem eodem die Sol ad motum primi mobilis describit: & arcus qu, vel ct, erit arcus declinationis eiusdem: ex quo tandem locus Solis in Zodiaco eruetur, vel per tabulas declinationum in sphaera propositas, vel per ea quæ lib. 3. Astrolabij in scholio canon. 3. num. 3. præscribuntur. Demonstrationes harum praxium nullas adduco, eo quod omnes immediate dependeant ex constructione Analematis, quod fusè demonstrat Clavius tum in Gnomonica propof. 1. lib. 1. & nos in sequentibus id fusè quoque demonstrabimus. Similiter nihil dico de quibusdam casibus, qui possent occurrere in regionibus multum Australibus, vel Borealibus, eo quod potissimum rationem habeam harum partium, in quibus maxima dies nunquam est 24. horarum, vbi casus illi locum non habent. Quare etiam ex his bene intellectis, facile casus omnes soluentur.

Pro-


**Problema II.**

*Lineam Meridianam, & altitudinem Poli per duas umbras & duas altitudines Solis, si præterea detur eius locus in Zodiaco, inuenire.*

13 **G**eometricam huius Problematis solutionem iuuenies libro 3. Astrolabij can. 12. nu. 4. & can. 13. nu. 2. cuius loco hic afferam operationem Arithmeticam, si prius eiusdem Theoriam attigerò, quæ est talis.

*Theoria.*

**S**it Meridianus ABCD, Horizon AD, vertex B, duo verticales BE, BG, transeuntes per Solem, diuersis temporibus existentem in F, H. Polus mundi sit C, à quo ad vtrumque locum Solis sint ducti arcus maximorũ circularum CF, CH; & similiter per eadem Solis loca, sit ductus arcus circuli maximi HF. Dico, si cognitus sit arcus GE, quem duo verticales ex Horizonte intercipiunt, vna cum duabus altitudinibus Solis, quas mensurant arcus EF, GH, vnaque cum declinatione Solis, quæ ad locum Solis datum pertinet, cognitum quoque fore arcum CD, altitudinis poli, nec non arcus GD, ED, distantia verticalium à meridiano ex parte poli C. Nam ex arcu GE, notus erit angulus HBF, totidem scilicet graduum quot est arcus GE; & ex altitudinibus EF, GH, nota erunt eorundem complementa, arcus scilicet FB, HB. Item ex Declinatione Solis dabuntur arcus CH, CF, qui sunt æquales, eo quod ducantur ex polo C, ad parallelum Solis. Et vterque erit complementi declinationis, si declinatio sit Borealis: si verò declinatio sit Australis, erit vterque compositus ex arcu declinationis, & quadrante, vt ex sphaera patet. Ex quibus sic licebit propositum concludere.




Ex arcubus BH, BE, & angulo comprehenso, quæ dantur, inuenietur per problema 22. vltimi Lemm. Astrolab. Clauij, tertius arcus HF; & consequenter ex tribus lateribus iam notis cognoscetur per probl. 21. eiusdem Lemm. angulus BHF. Deinde si in triangulo CHF, in latus HF, demittatur arcus perpendicularis CI, diuidens tam angulum HCF, quam arcum HF, bifariam, erit in triangulo rectangulo HCI, præter basim HC, notum latus HI, quod adiacet angulo CHF: ac proinde per probl. 2. vltimi Lemmatis notus fiet idem angulus CHF, quo sublato ex toto BHF, remanebit angulus BHC, & ipse notus. Circa quem cum in triangulo BHC, sint quoque data latera BH, HC; per 22. probl. dabitur arcus BC, complementi altitudinis poli, atque adeo & arcus altitudinis poli CD. Itemque per 21. probl. deprehendetur ex tribus arcubus eiusdem trianguli iam cognitis angulus HBC, hoc est arcus GD, distantia verticalis circuli BG, à meridiano ex parte poli C. cui si dematur arcus GE, relinquetur arcus ED, similis distantia verticalis BE. Quod si loco anguli BHF, per 21. probl. inuestigatus fuisset angulus BFH, & hic sublatus fuisset ex angulo CFH, qui est æqualis angulo inuento CHF; remansisset in triangulo BFC, notus angulus BFC, quem ambiunt cognita latera BF, FC. Vnde per 22. probl. reperiretur iterum arcus BC, & angulus FBC, hoc est arcus ED, adiectoque arcu GE, componeretur arcus GD.

LI

14 Quan-


14 Quando vnus verticalium est citra meridianum, & alter vltra, vt in hac figura apparet: tunc vterliber angulorum BHF, BFH, subtrahendus est, ex alterutro æqualium angulorum CHF, CFH; manebuntque anguli BHC, BEC, cogniti. circa quos cum iterum data sint latera, notus fiet arcus BC, & vterque angulorum HBC, FEC, vt dictum est.



15 Sed occurret fortassis alicui eiusmodi dubitatio: An scilicet fieri possit, vt Sole occupante eundem parallelum, in diuersa saltem altitudine poli, eadem dari possint, nempe arcus, arcui AE, æqualis, cum duabus altitudinibus Solis ipsis EF, GH, æqualibus, licet verticales BE, BG, non eodem modo inclinentur ad Meridianum. Hoc enim posito sequeretur non sibi constare praxim ex prædicta Theoria eruta. Si quidem diuersa illa poli altitudo, ex eisdem hypothesebus nullo modo educi potest. Sed facillè satisficit dubitationi, respondendo, impossibile esse, vt eadem illa dentur. Essent enim vtrobiq; triangula BHF, prorsus æqualia ob arcus æquales, vt & triangula CHF. Vnde ablatas angulus CHF, ex BHF, relinqueret æquales angulos BHC, circa quos cum latera sint æqualia, necesse foret, vt & arcus BC, vtrobiq; essent æquales, quod non ponitur. Non igitur dabuntur eadem in diuersis altitudinibus poli: manebitque firma praxis ex adducta Theoria eruta, quam nunc vnico exemplo declarabimus.

*Pragmatia.*

16 In Plano aliquo Horizontali signentur duæ vmbrae KE, KG, concurrentes in puncto K, ex quo describatur arcus EG, pro capacitate plani maximus, idemque diligenter mensuretur in gradibus, & minutis etiam secundis, si fieri potest.



Ponatur autem exempli gratia idem arcus GE, grad. 19. min. 7. secund. 15. quantum est arcus Horizontis Romani interceptus inter duos verticales, qui tempore Solstitij æstiu H, 14. & 15. ab occasu per Solem incedunt. Deinde obseruentur cum eadem diligentia duæ altitudines Solis vmbrae illis correspondentes, quæ quidem Romæ prædictis temporibus sunt grad. 54. min. 14. secund. 12. & grad. 64. min. 00. secund. 56. Quibus positis cum vtraque hora sit antemeridiana, hoc est ex eadem parte meridiani; instituendus erit calculus iuxta Theoriam, ac figuram numeri 13. 14. vt sequitur.

*Prima Operatio, per quam inuestigatur arcus HF.*

17 Fiat primo, vt 10000000. sinus totus, ad 5844385. sinum arcus BF, nempe

nempe ad sinum complementi altitudinis Solis minoris; ita 4381271. sinus arcus BH, hoc est sinus complementi altitudinis maioris ad aliud; inuenieturque numerus quidam quartus, videlicet 2360583.

Secundo fiet, vt 10000000. sinus totus; ad 2360583. numerum quartum proxime inuentum; ita 551700. sinus versus anguli HBF, vel arcus GE, dati ad aliud: reperieturque numerus 141267. cui si addatur 1445394. sinus versus arcus grad. 9. min. 46. secund. 44. quo inter se differunt arcus BF, BH; conficietur sinus versus arcus HF; partium 2886661. ac proinde ex tabulis sinuum idem arcus HF, erit grad. 13. min. 45. secund. 7. quem quærebamus.

*Secunda Operatio, per quam inuenitur angulus BHF.*

19 Fiat primo, vt 10000000. sinus totus, ad 4381271. sinum arcus BH; ita 2377189. sinus arcus HF, proximè inuenti ad aliud, & prodibit numerus quidam quartus, nempe 1041511.

Secundo fiat, vt 1041511. numerus quartus modò inuentus, ad 10000000. sinum totum, ita numerus 1658580. qui est differentia inter 1885621. sinum versus arcus BF, interque 227041. sinum versus arcus grad. 12. min. 13. secund. 57. quo inter se differunt arcus BH, HF, ad aliud; producet enim 15924748. sinus versus quæsitæ anguli BHF, qui cum sit maior sinu toto, erit idem angulus maior recto, nempe grad. 126. min. 19. secund. 58.

*Tertia Operatio, per quam inuestigatur angulus CFH, & BHC.*

20 Fiat, vt 10000000. sinus totus, ad 4348124. tangentem complementi arcus HC; hoc est ad tangentem declinationis Solis, quæ in exemplo est grad. 23. min. 30. ita 1205878. tangens arcus HI, grad. 6. min. 52. secund. 33. ter. 30. hoc est ita sinus arcus HI, semissis inuenti arcus HF, ad aliud; producetque 524331. sinus complementi anguli CHF, ac proinde idem angulus erit grad. 86. min. 59. secund. 40. Quem si tolles ex angulo BHF, per secundam operationem reperto, reliquus fiet angulus BHC, grad. 39. min. 20. secund. 18.

*Quarta Operatio, per quam quaeritur arcus BC, & consequenter arcus altitudinis Poli CD.*

21 Fiat primo, vt 10000000. sinus totus, ad 9170601. sinum arcus HC, nempe ad sinum complementi declinationis Solis grad. 66. min. 30. ita 4381271. sinus arcus BH, ad aliud: erueturque numerus quartus 4017889.

Secundo fiat, vt 10000000. sinus totus, ad 4017889. numerum quartum proxime inuentum; ita 2265837. sinus versus anguli BHC, ad aliud: habebiturque numerus 910388. cui si addatur 2397704. sinus versus arcus grad. 40. min. 30. secund. 56. quo inter se differunt arcus HC, BH, componetur sinus versus arcus BC, partium 3308092. & idcirco arcus quidem BC, complementi altitudinis poli erit grad. 47. min. 59. secund. 44. Arcus verò CD, altitudinis poli qui quaeritur, erit grad. 42. min. 00. & præterea 16. minorum secundorum, quæ gradibus integris accesserunt, propter multitudinem operationum.

*Quinta Operatio per quam postremo inueniuntur anguli GBD, EBD, seu arcus GD, ED, & consequenter arcus GA, EA.*


22 Fiat primo, vt 10000000. sinus totus, ad 7430929. sinum arcus BC, in superiori

periori operatione inuenti; ita 4381271. sinus arcus BH, ad aliud; reperieturque numerus quartus 3255691.

Secundo fiat, vt 3255691. numerus hic quatuor, ad 10000000. sinum totum, ita numerus 5283621. qui est differentia inter 6012509. sinum versum arcus HC, & sinum versum 728888. arcus grad. 22. min. 00. secund. 40. quo inter se differunt arcus BC, BH, ad aliud; produceturque sinus versus anguli HBC, vel GBD, hoc est arcus GD, partium 16228877. qui cum maior sit sinu toto, erit arcus GD, maior quadrante, videlicet grad. 128. min. 31. secund. 38. & si inde subtrahatur arcus GE, grad. 19. min. 7. secund. 15. remanebit arcus ED, grad. 109. min. 24. secund. 23. & denique utroque iterum subtracto ex semicirculo, remanebit arcus AG, gr. 51. min. 28. secund. 22. at arcus AE, continebit grad. 70. min. 35. secund. 37. quanti ferè sunt iisdem arcus, si per propositionem 3. lib. 5. Gnom. eruantur, ex iisdem altitudinibus Solis, & ex veriori altitudine poli, quæ communiter ponitur Romæ gr. 42. & non grad. 42. & 16. min. secundorum, quantam paulò supra inuenimus: quam proculdubio multo adhuc magis differentem reperissemus, nisi semper in singulis operationibus rationem habuissemus, etiam minorum secundorum, quæ omnino non sunt negligenda in similibus problematibus.

*Quomodo ex inuentis arcibus AG, AE, constituenda sit linea Meridiana.*

23 **E**tsi ad constituendam lineam Meridianam satis erat, inuenisse alterutrum arcuum GD, ED, quia tamen uterque maior est quadrante, libuit eisdem ex semicirculo subtrahere, vt remaneret arcus AG, AE, quadrante minores, cuiusmodi facilius, ac rectius numerantur per quadrantes Capite primo descriptos. Vnde quando arcus GD, ED, non sunt maiores quadrante, non erit opus eosdem ex semicirculo detrahere: sed iisdem immediate utemur in descriptione lineæ Meridianæ, quæ ita se habebit.



Centro K, vel ex quouis alio puncto L, vmbrae verbi gratia KG, cui in sphaera respondet verticalis BG, describatur arcus MN, ex eoque abscindatur ad debitam partem arcus MN, similis arcui AG, nempe tot graduum, & minorum, quot per calculum deprehensa sunt in arcu AG. Iuncta enim LN, erit linea meridiana, eademque protracta secabit reliquam vmbrae KE, cui respondet verticalis BE, in

in puncto O, efficiens angulum NOE, tot graduum, quot continet inuentus arcus AE. Immo si centro O, vel ex quouis alio puncto vmbrae KE, describatur arcus PQ, similis arcui AE, erit necessario ducta recta OQ, iterum linea meridiana, eadem scilicet cum linea LN, vel saltem eidem parallela.

Debita autem pars, ad quam scilicet numerandus est arcus MN, vel PQ, facile conijcitur ex ipsis obseruationibus, prout scilicet ante vel post meridiem sunt factæ. Nam quando vmbra aliqua obseruata est ante meridiem, qualis est vtraque in exemplo abducto: constituendus erit angulus MLN, vel POQ, semper ad sinistram suæ vmbrae; hoc est ad eam partem, quæ nobis est ad sinistram, si nos imaginemur stare prope punctum G, vel E, ex parte Solis, quem tunc habebimus à tergo, & faciem conuertamus versus punctum K, in quo vmbrae concurrunt, & hoc quando linea meridiana inuenienda est per arcus AG, AE: quando enim assumendi forent arcus GD, ED, illi constituendi essent ad dextram. Quando verò vmbra aliqua signata est post meridiem, & rursus operandum sit per arcum AG, vel AE, tunc angulus arcui illi debitus efficiendus erit ad partem dextram vmbrae, ad sinistram verò quando ad operationem commodiores videbuntur arcus GD, ED. Neque vt arbitror res tam plana pluribus indiget. Illud potius postremo loco ad moneamus, qua ratione exactius mensuretur angulus GKE, quem in plano horizontali duæ vmbrae obseruatae constituunt. Nam vt ex dictis manifeste apparet, angulus ille, cum duabus altitudinibus Solis per quadrantem, vel quadratum diligenter obseruatis, præcipuum sunt fundamentum totius operationis.

24 In hunc igitur finem censeo legenda esse ea, quæ in libello de fabrica instrumenti Horometri cap. 22. & in lemm. 3. Astrolabij Clauius enarrat. Ijs enim perceptis facile erit cognoscere, quot non solum gradus, sed etiam quot minuta tam prima, quam secunda complectatur arcus EG, vel angulus EKG. Quia tamen in illis praxibus ferè necesse est, vt arcus EG, extendi possit vsque ad quadrantem; id quod angustia plani non semper concedit; visum est huic difficultati eiusmodi adhibere remedium: videlicet, vt tunc ex arcu EG, quantum fieri poterit producto, vel sexta pars circuli auferatur, eadem scilicet circini apertura qua fuit descriptus; vel pars duodecima, nempe arcus graduum 30. vel saltem arcus 15. graduum, neque enim multo minorem, vel maiorem conuenit esse angulum EKG. Et quoniam cum sexta pars circuli ex arcu EG, producto auferri nequit, neque arcus 30. vel 15. graduum per continuam subdiuisionem arcus proxime maioris haberi potest: fortassis non incongrue ita licebit id ipsum assequi. Describatur primo quouis intervallo maximo arcus verbi gratia RS, sexta pars circuli. Deinde centris R, S, quocunque iterum intervallo duo arcus æquales se inter secantes in T. Hoc enim modo si iungeretur recta TK, ea efficeret angulum TKE, 30. graduum, atque adeo producta, auferret ex arcu EG, arcum totidem graduum. Sed quia in exemplo eadem KT, dictum arcum EG, commode non secat; propterea necesse fuit angulum illum 30. graduum adhuc bisariam secare, sumendo ipsi KT, æquale intervallum KV, & centris V, T, describendo duos arcus æquales se secantes in X. Ducta enim KX, commode iam secat arcum EG, auferetque arcum EZ, 15. graduum. Atque ita iam facile est eundem arcum EZ, in eodem 15. graduum distribuere, eisdemque transferre in reliquum arcum ZG: saltem tot quot possunt. Si enim primo arcus EZ, diuidatur in partes verbi gratia quinque æquales, & rursus qualibet partes tres, erit totus arcus EZ, diuisus in omnes gradus 15, immo & arcus ZG, in suos gradus quos continet, si interim eadem interualla in eum sint translata, vt in figura obseruatum vides.

Vbi etiam aduertis in arcu EG, contineri arcum Ea, grad. 19. & insuper arcum aG, quem in minutis inuestigare oportet, non quidem immediate, cum in arcu EG, non adsint sufficientes gradus, sed mediantibus partibus decimis, in hunc modum

Primo quærat<sup>r</sup>ur quot partes decimas vnus gradus comprehendat arcus aG, eo scilicet modo, quo in lineis rectis partes decimæ inuestigari solent, decuplando eandem particulam aG, vel per se sumptam, vel cum integro gradu: & seorsim notantur partes inuentæ. Deinde ex residua particula, si fortè arcus decuplus non præcisè complectitur aliquot gradus, quærantur similiter partes decimæ vnus decimæ, hoc est partes centesimæ vnus gradus, eademque prope partes prius inuentas versus dextram adscribantur. Et denique ex particula, qua vltimus arcus decuplus superat gradus integros, deprehendantur partes decimæ vnus decimæ vnus decimæ, hoc est partes millesimæ vnus gradus, quæ si iterum partibus prius notatis ad dextram præfigantur, & toti numero denominator 1000. subscribatur, inuenta erit fractio, quæ numerat partes millesimas vnus gradus contentas in particula aG.

In exemplo si omnia iuste fiant, deprehendetur per primam decuplationem vna decima: per secundam decuplationem, duæ partes decimæ vnus decimæ: & denique per tertiam decuplationem, quasi vna rursus pars decima vnus decimæ, vnus decimæ. quæ quidem dicto ordine signatæ efficiunt  $\frac{22}{1000}$ . Ac proinde particula aG, continebit centum viginti vnâ ex partibus millesimis vnus gradus, quæ per regulas fractionum numerorum facile reducentur ad partes sexagenarias, hoc est ad minuta prima, & secunda. Si enim numerator fractionis 121. multiplicetur per 3600. minuta secunda vnus gradus, & numerus productus 435600. per 1000. denominatorem diuidatur, quod fit per abiectionem trium figurarum dextrarum numeri diuidendi, manebit quotiens 435. vel 436. fere numerans minuta secunda arcus aG. quæ si iterum diuidantur per 60. minuta secunda, quæ vnum minutum primum efficiunt, inuenientur minuta 7. prima, & remanebunt 15. vel 16. minuta secunda, ex quibus constat arcus aG. Si igitur vltra dicta minuta adijciatur arcus Ea, graduum 19. erit totus arcus EG, grad. 19. min. 7. & 15. vel fere 16. minorum secundorum, quantum fere suppoluimus numero 17. huius Capituli.

25. Aliter & fortassis exactius, vel saltem cum minori labore, eundem angulum EKG, mensurabimus etiam hac ratione. Ex puncto K, vmbrae KE, quod plurimum abest à puncto K, erigatur ad eam perpendicularis bc, secans alteram vmbra in puncto c. Diuisaque Kb, in 10. partes æquales, (immò si ab initio eadem Kb, sumpta fuisset, decem partium æqualium, haud esset opus hac diuisione, essentque fortassis illæ partes magis inter se æquales, quam si essent inuentæ per posteriorem diuisionem) mensurentur earum beneficio recta 60. in partibus centies millesimis eiusdem rectæ Kb, vt docetur in loco, cuius iam sæpe fecimus mentionem. Nam hac ratione cognita erit recta bc, quatenus est tangens anguli bKc, respectu sinus totius Kb, in centum mille partes diuisi, ac proinde ex tabulis tangentium idem angulus non ignorabitur.

26. Sed quia praxis, quam hoc in negotio tenere oportet, tanto est exactior, quanto recta Kb, longior existit; melius omnino fecerimus, si seorsim in alio plano maiore, accipiamus rectæ Kb, quamcunque multiplicem, qualis est recta Kb, hic in margine depicta, dupla ipsius Kb. Ita enim omnes diuisiones, multo fient commodius, & angulus ipse EKG, multo cum minore errore deprehendetur. Verum tunc etiam recta bc, multiplicanda est secundum multiplicationem rectæ Kb, qualis est recta Ke, quam accepimus duplam ipsius bc, vt scilicet per eam inquiratur magnitudo anguli EKG, id quod fit in hunc modum.

Notatis seorsim tribus partibus decimis, quas cernitur recta Ke, abscindere ex recta Kb, sumatur diligentissimè circino reliqua particula ef, eademque decupletur ex K, vsque ad g. Et quoniam in Kg, cõtinentur quatuor partes decimæ ipsius Kb, præfigatur ad dextram numeri ternarij iam notati numerus quaternarius, & reliqua particula hg, beneficio circi-

|        |
|--------|
| 34669  |
| 100000 |

circini iterum decupletur à puncto K, vsque ad l, ita vt ipsius hg, decupla sit Kl. Quæ cum sex partes decimas auferat ex Kb, addatur duabus figuris prius notatis tertia, nempe sexta, & reliqua ml, rursus decupletur vsque ad n, iterumque numeris seorsim scriptis præfigatur numerus 6. eò quod etiam recta Kn, sex partes decimas contineat ex partibus rectæ Kb. Postremo vt habeatur quinta figura, adijcienda quatuor figuris iam prænotatis; decupletur tandem & reliqua particula mn, à puncto K, vsque ad punctum p, quod quidem aufert præcisè nouem partes decimas. Vnde quatuor illis numeris addenda est ad dextram figura nona, eritque totus numerus partium 34669. nempe centies millesimarum, in quas intelligitur secta recta Kb, vt ex demonstratione huius praxis patet, quam loco citato Clavius adducit. Vnde cum etiam sinus totus communiter ponatur diuisus in 100000. particulas, cognita erit recta Ke, in partibus sinus totius Kb. Et quia eadem est proportio duplæ Kb, ad duplam Ke, quæ simplicis Kb, ad simplicem bc. Si Kb, in figura numeri 23. ponatur partium 100000. nempe sinus totus, erit recta bc, tangens anguli bKc, partium 34669. ac proinde ex tabulis tangentium idem angulus non ignorabitur. inuenietur enim grad. 19. min. 7. secund. 15. quantum etiam supra posuimus.

27. Circa decuplationem particularem illud est obseruandum, vt quando illarum aliqua tam est exigua, vt commode circino nequeat apprehendi, vt tunc accipiat<sup>r</sup>ur reliqua, qua cum illa nimis parua partem decimam constituit, qualis est eh, respectu particulæ ef. Licet etiam ef, capi possit circino satis commode. Si enim illa reliqua particula decupletur à puncto b, versus K; erit etiam reliqua ex tota bK, decupla illius particulæ, quam decuplare oportebat, à puncto K, versus b. Immo quandoque plurimum conducet ad certiore<sup>m</sup> operationem si vtriusque particulæ instituat<sup>r</sup>ur decuplatio ex vtroque termino K, b. Si enim finis vtriusque decuplationis in idem punctum incidat, signum erit saltem multum probabile, in acceptione particularum, ac decuplatione erratum non esse. Nam si in decuplatione verbi gratia particulæ ef, erratum non est, quæ facta est à puncto K, vsque ad punctum g, necesse est, vt si iterum reliqua particula eh, sine errore decupletur, à puncto b, versus K, finis multiplicationis recidat in punctum g. Clavius addit præterea aliam admonitionem, videlicet, vt quando verbi gratia, particula ef, non potest commode accipi circino; vt hunc eadem particula sumatur vna cum proxima parte decima integra, & sic decupletur ed. Verum ea admonitio hic non videtur necessaria, cum semper alterutra particularum, hoc est vel ef, vel eh, commode sumi possit. eo quod tota pars decima fh, semper sit satis magna, atque ita per alterutrum inuenietur punctum g, vt dictum est.

### Confectarium.

*In quo docetur modus, quo exactissime constituitur angulus quinijs propositus.*

28. **E**X his quæ proximis tribus numeris sunt dicta, aperitur nobis excellentissima quædam via constituendi quemcunque angulum propositum etiam in minutis secundis, eaque diuersa ab illa, quam Clavius monstrauit beneficio Quadrantis, quam hic per modum Corollarij inserere libuit, vt facilius inueniretur. Sit enim iterum constituendus angulus EKG graduum 19. minut. 7. secund. 15. quem hæcenus inuestigauimus. Ex tabula tangentium, quærat<sup>r</sup>ur eius tangens, quæ si habeatur ratio partis proportionalis, inuenietur partium 34669. respectu sinus totius partium 100000. Deinde ex recta Kb, ducta in aliquo plano vtriusque eademque

demque secta in partes decem æquales, accipiatur recta Kp, nouem eiusmodi partium decimarum, nimirum tot, quot sunt vnitates in vltima figura dextra tangentis inuenta. Et hæc recta Kp, diuidatur exactè in partes 10. non quidem imprimito puncta in ipsa linea, sed solum quærendo interuallum eiusmodi partis decimæ. Qua inuenta, sumatur linea Km, continens sex partes decimas, totius Kb, tot videlicet, quot sunt vnitates, in penultima figura tangentis ex parte dextra, quæ est 6. eidemque Km, adijciatur mn, æqualis interuallo partis decimæ ipsius Kp, quod proxime beneficio circini attigimus. Et rursus tota recta Km, distribuatur in 10. partes æquales, cuius interuallo sumatur æqualis ml, quæ addatur rursus ad Km, sex partium decimarum totius Kb, eo quod etiam tertia figura proxima in tâgente, totidem vnitates complectatur. Diuisa autem quoque recta Kl, in decem partes æquales, sumatur eius interuallo æqualis hg, vltra rectam Kh; quatuor partium decimarum; siquidem in tangente, figura quæ proxime sequitur est 4. Et denique ad rectam Kf, partium trium decimarum, quot sunt vnitates in prima figura sinistra, eiusdem tangentis, adijciatur recta fe, æqualis interuallo decimæ partis Kg, quam in decem partes æquales postremo diuidere oportuit. Erit enim recta Ke, tandem vltimo loco inuenta, tangens anguli KEG. respectu sinus totius Kb. Atque idcirco si ek b, erigatur perpendicularis ad eandem Kb, eiusque punctum extremum, nectatur linea recta cum puncto K; erit ad punctum K, constitutus angulus quæsitus. Vel certe sumatur eiusdem Kb, dimidia, vel alia pars aliquota, qualis est in figura num: 23. linea Kb; & ex b, erigatur perpendicularis b c, quæ sit similis pars aliquota rectæ Ke, ducta enim Kc, efficiet iterum angulum EKG, qui quæritur; propter eandem scilicet proportionem linearum æquæ multiplicium.


Demonstratio.

29 Quid vero attinet ad demonstrationem praxis allatæ: licet eam quiuis ex demonstratione Clauij facile elicuerit, præsertim si diligenter consideret operationem à nobis factam, cum sit penitus conuersa eius, quæ eadem tangens inuestiganda foret in partibus 100000 sinus totius, si idem sinus solum diuisus fuisset in partes decem æquales: eam tamen hic breuius reconditiuq; demonstrare non grauabor. Dico igitur rectam Ke, tangentem esse arcus supra assumpti, hoc est continere 34669 partes centies millesimas sinus totius Kb. Nam primo recta Kp, continet 10000 partes ipsius Kb, vt patet si singulas partes decime intelligantur diuisa in 10000 partes. Est autem rectæ Kp, pars decima mn, vt constat ex ipsa praxi. Ergo mn, continebit in se 100000 ipsius Kb. Secundò, Rectæ Km, continet 100000. Si igitur addatur mn, partium 100000 erit tota recta Kn, partium 100000 atque adeo recta ml, quæ per operationem est pars decima ipsius Kn, erit 100000 partium. Tertio, Recta Km continet iterum 100000 totius Kb. Addita ergo ml, 100000 erit tota Kl, partium 100000 eiusque pars decima, hoc est, recta hg, erit partium 100000. Quarto, recta Kh, complectitur 100000 partes eiusdem Kb; Eadè igitur Kh, vna cum hg, partium 100000 existet partium 100000, & pars eius decima videlicet recta eh partium 100000. Cui si postremo loco addatur Kf partium 100000 componetur tota Ke, ex 100000 partibus sinus totius Kb. Hoc est recta Ke, complectetur tot partes 100000. sinus totius Kb, quot sunt in tangente anguli propositi, ac proinde eadem Ke, erit tangens illius anguli; quod erat demonstrandum.

30 Caterum, vt est exactissima hæc praxis, si in diuisionibus debita diligentia adhibeatur (nempe propterea quod error, qui forte est commissus in aliqua parte operationis, potius minuatur per diuisionem quàm augeatur, cuius oppositum contingit in multiplicatione partium, quæ requiritur in alijs problematibus superioribus) ita eadem praxis nonnullam patitur difficultatem, quando angulus constituendus maior


maior est 45. gradibus, eo quod eiusmodi angulorum tangentes magis semper magisque excrescant. Quare cum tales anguli fuerint constituendi, eorum loco per praxim traditam efficietur angulus complementi. Ex eo enim describeretur illico, & sine errore etiam angulus propositus, si inuentus angulus subtrahatur ex recto.

31 In diuisione etiam linearum in decem partes æquales, quæ vna est ex præcipuis operationibus huius problematis, quando non est in promptu circinus duplicis aperturæ: poterimus vti triangulo æquilatèro, cuius latera sint æqualia rectæ KB, hoc est sinui toti assumpto; quale ponatur triangulum KBR hic delineatum. Si enim ex latere KB, auferatur KS, pars eius decima, nectaturque RS, fabricatum erit instrumentum pro detractioe partis decimæ ex quacunque



alia linea minore latere KB. Si enim proposita sit linea q, eius memmus æquales RT, RV, eritque ducta TV, in triangulo æquilatèro RTV, æqualis ipsis rt, ru, hoc est ipsi q, necnò recta RS, secans eam in x, auferet eius partem decimam TX, quam quærebamus: & ita de reliquis.

32 Aliter. Ducta iterum Kb, & abscissa eius parte decima s, describantur centro K, per puncta b, & S, duo arcus sexta parte circuli non minores, vt videlicet in



arcu br, per b, descriptum applicari possint rectæ ipsa Kb, non multo minores: factumque erit instrumentum resecandis partibus decimis per oportunitatem. Si enim v. g. iterum ex q, auferenda sit pars 10. applicetur eidem æqualis BT, in arcu BR, nectaturque KT, secans arcum per s, ductum in a. Chorda igitur SV, vel interuallum SV, erit decima pars ipsius BT, eo quod ob similitudinem triangulorum KBT, KSV, eadem sit propositio BT, ad SV, quæ KB, ad suam partem decimam KS.

Atque hæc sunt, quæ fufius forsân quâ par erat tradidimus. At cum illa insignem vsum in rebus astronomicis habeant: ea reconditoris Geometriæ studiosis inuidere nolui. Vt ex hoc specimine videant, quanta subtilitate astronomicarum rerum arcana erui queant. Multa hic alia circa hanc eadem materiã tradi poterant verum cum eiusmodi inuentiones Concilio Geographico reseruauerimus, illuc curiosum lectorem relegandum duximus, ne huiusmodi subtilitatibus geometricis-practicis rædium aliquod gigneremus. Ad filum igitur reuertamur.

Problema III.

Analemma Catholicum construere.


Qum in præcedentibus in gratiam reconditoris Geometriæ studiosorū aliquântulum fusiores fuerimus, modò ad solitâ facilitatem breuitatèq; in gratiam practitorū reuertamur, vt fusa lógitudo facili quadam breuitate compensetur. Analemma igitur catholicum innumeris in Gnomonica vsibus inseruiturum, ita designabis.

Descriptus circulus in plano quopiam in 4. quadrantes diuidatur per lineas in centro P, ad rectos angulos sese interfecantes; quorum NO, verticalem, CD vero horizontalem lineam referat; à puncto C numera eleuationem æquatoris 48. Graduum, atque ex E per centrum P recta ducta EF; dabit æquatorem, quam in centro P, *ισογώνως* secet AB, axis mundi. Hoc peracto ab EF, vtrinque numerentur declinationes signorum; iuxta tabulam paulò post sequentem; atque ex eorum terminis per centrum P rectæ ductæ dabunt radiosum Zodiacum duplicatum SRP, & PVK, Singula quoque duo signa parallela tropico SV, Ω, Ξ, Υ, &c. coniunges, vt fiant coni signorum, quos Sol totius anni decursu describit in P centro, seu puncto vtriusq; coni cõmuni vertice cõiuncti. Habebisq; analemma præparatum, vt apparet.



Conotomas vero conotum lines ita describes. Pro horizontali plano elige prohibitu gnitudinem, v.g. gnomonis Px, & per x ad horizontalem lineam CD, parallelè ducatur GH, fietque triangulum gnomonicum pro horizontale TPY, in quo TP, portio axis mundi: PY, portio axis æquinoctialis: Px, portio axis verticalis, id est styli quantitas. TY, denique plani horizontalis conotomi portio innofcitur. Linea vero GH, radios signorum fecat in punctis q, o, n, y, l, i, k, quæ puncta ex T; in lineam

Conotomica.  
projectio signorum  
pro horizontali.



Conotomica.  
projectio pro ho-  
rologio vertica-  
li.

meridianam alicuius horologij horizontalis translata dabunt puncta signorum pro hora 12. Porro pro horologio verticali ad datam quantitatem styli PZ, verticali NO, per Z, parallela ducatur IK, producereturque triangulum gnomonicum pro verticali PaY. eritque portio Pa, axis mundi; aY, portio plani verticalis: PY, portio æquatoris: PZ, portio horizontalis, seu gnomon. a vero polum axis referet. Linea quoque IK, signorum radios secabit in b c d Y efg. quæ ex a in horologij verticalis lineam meridianam translata assignabunt in ea puncta signorum, per quæ hyperbolæ iuxta sequentes pragmatias describendæ sunt.

Pro polari, &  
meridiano.

Pro horologio Polari, & meridianis, ducatur lineæ LM, æquatorè EF, in punctis, æquatoris & polari interfecans, per apicem videlicet assignati gnomonis Pt; secabiturque LM, signorum radijs in punctis, quæ in polari ex centro styli in horam 12. translata in ea assignabunt puncta, per quæ ceu per vertices hyperbolæ ducendæ sunt; in meridianis vero eadem puncta ex loco styli in lineam horæ sextæ vtrinque transferenda sunt, vt habeas vertices hyperbolarum describendarum.

Pro æquino-  
ctiali.

Pro æquinoctiali denique horologio seruiet vnus ex parallelis signorum, v.g. parallelus  $\text{m}$ , &  $\text{x}$ ; quem nos  $\text{x}$ ,  $\text{k}$ ,  $\text{z}$ ,  $\text{y}$ ,  $\text{m}$ , notauimus. Hæc enim lineæ secat signorum radios in punctis, quæ ex m puncto, in horologij æquinoctialis meridianam translata, in ea dabunt puncta, per quæ ex centro horologij circuli ducti dabunt arcus signorum quesitos. Vides igitur quomodo in vno analemate tota fere gnomonices idea elucefcat. Rogo autem Lectorem, vt firmiter dicta mente sua imprimat; pendent enim ab huius theoria maxima quæuis totius Gnomonicæ arcana, vt in sequentibus fuse declarabitur.

Pro-

Problema IV.

Tabulam declinationis Solis construere.


Possunt tabulæ huiusmodi calculari, vel per sinus, vel per logarithmos, vt in Arte nostra Magnetica fecimus. Quia tamen tabulæ logarithmorum non cui-libet præsto sunt, Solis sinibus contenti calculationem ordiemur. Si igitur primi gradus  $\text{v}$  declinatio sit inquirenda: Sit in analemate ES, declinatio Solis maxima 23. grad. & 30. minut. cuius sinus rectus ES. YY vero sinus rectus sit declinationis primi gradus  $\text{v}$ , qui quærendus est, PE vero sinus totus. Cùm igitur ita se habeat PE, ad ES, sicuti PY, ad YY; tria autem PE, ES, & PY: nota habeantur, fiet vt sinus totus PE, ad sinum rectum maximæ declinationis Solis ES, ita PY, 30. grad.  $\text{v}$ , quæ est distantia grad.  $\text{v}$  à primo puncto Y PA, ad aliud: prodibit YY, sinus rectus, qui in tabula sinuum dabit gradus declinationis pro dato puncto quæsitos. Cùm verò omnia signa æquidistantia ab æquatore, qualia sunt  $\text{v}$   $\text{m}$   $\text{x}$   $\text{ii}$   $\text{d}$   $\text{f}$   $\text{es}$  denique, &  $\text{p}$  eandem declinationem habeant; inuenta declinatione vnus signi, inuenientur & reliquorum signorum æquidistantium declinationes. Sufficiat igitur hic trium tantum signorum  $\text{v}$   $\text{v}$   $\text{ii}$ , eorundemque in singulis gradibus declinationem inquirere, vt reliquorum signorum declinationem habeas. Nos hic ad praxim declarandam tres Solis in principio  $\text{v}$   $\text{ii}$   $\text{es}$  constituti declinationes inuestigabimus, ex quibus Lector facilè reliquarum eruendarum rationem videbit.

Analogismus I.

Ad inuestigandam declinationem Solis.

|                                             |                                                                                                                            |                                                                   |                     |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                            | G                                                                 |                     | G M                                          |
| Pro declina-<br>tione Solis<br>in principio | { $\text{v}$ } fiat vt sinus totus ad<br>{ $\text{ii}$ } sinum maximæ de-<br>{ $\text{es}$ } clin. $\text{v}$ 23.gr. 29.m. | ita { 30 $\text{v}$ }<br>{ 60 $\text{ii}$ }<br>{ 90 $\text{es}$ } | { ad }<br>{ aliud } | fient { $\text{ii}$ 29<br>{ 20 10<br>{ 23 28 |

Non secus operaberis per singulos gradus signorum, semper ponendo primo loco sinum totum: secundo maximam declinationem  $\text{v}$ : tertio distantiam signi ab æquatore in Zodiaco.



*Tabula I. declinationis partium Eclipticæ ab Aequinoctiali.*

| Signa. | γ  | ♌  | ♍  | ♎  | ♏  | ♐  | Signa. |
|--------|----|----|----|----|----|----|--------|
| G      | G  | M  | G  | M  | G  | M  | G      |
| 0      | 0  | 0  | 11 | 29 | 20 | 10 | 30     |
| 1      | 0  | 24 | 11 | 50 | 20 | 23 | 29     |
| 2      | 0  | 47 | 12 | 11 | 20 | 35 | 28     |
| 3      | 1  | 11 | 12 | 31 | 20 | 47 | 27     |
| 4      | 1  | 35 | 12 | 52 | 20 | 58 | 26     |
| 5      | 1  | 59 | 13 | 12 | 21 | 9  | 25     |
| 6      | 2  | 23 | 13 | 32 | 21 | 20 | 24     |
| 7      | 2  | 47 | 13 | 52 | 21 | 30 | 23     |
| 8      | 3  | 10 | 14 | 11 | 21 | 40 | 22     |
| 9      | 3  | 34 | 14 | 30 | 21 | 49 | 21     |
| 10     | 3  | 58 | 14 | 50 | 21 | 58 | 20     |
| 11     | 4  | 21 | 15 | 8  | 22 | 7  | 19     |
| 12     | 4  | 45 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18     |
| 13     | 5  | 8  | 15 | 45 | 22 | 23 | 17     |
| 14     | 5  | 31 | 16 | 3  | 22 | 30 | 16     |
| 15     | 5  | 55 | 16 | 21 | 22 | 37 | 15     |
| 16     | 6  | 18 | 16 | 38 | 22 | 43 | 14     |
| 17     | 6  | 41 | 16 | 56 | 22 | 50 | 13     |
| 18     | 7  | 4  | 17 | 12 | 22 | 55 | 12     |
| 19     | 7  | 27 | 17 | 29 | 23 | 0  | 11     |
| 20     | 7  | 49 | 17 | 45 | 23 | 5  | 10     |
| 21     | 8  | 12 | 18 | 1  | 23 | 9  | 9      |
| 22     | 8  | 34 | 18 | 17 | 23 | 13 | 8      |
| 23     | 8  | 57 | 18 | 32 | 23 | 17 | 7      |
| 24     | 9  | 19 | 18 | 47 | 23 | 20 | 6      |
| 25     | 9  | 41 | 19 | 2  | 23 | 22 | 5      |
| 26     | 10 | 3  | 19 | 16 | 23 | 24 | 4      |
| 27     | 10 | 25 | 19 | 30 | 23 | 26 | 3      |
| 28     | 10 | 46 | 19 | 44 | 23 | 27 | 2      |
| 29     | 11 | 8  | 19 | 57 | 23 | 27 | 1      |
| 30     | 11 | 29 | 20 | 10 | 23 | 28 | 0      |
| Signa. | X  | ♌  | ♍  | ♎  | ♏  | ♐  | Signa. |

**Problema V.**

*Tabulam arcuum semidiurnorum cuiuslibet paralleli Solis supputare.*

**T**Ria in hoc problemate nota esse debent, sinus totus, tangens eleuationis poli in dato loco, & tangens declinationis paralleli, cuius arcus semidiurnus queritur, quoniam est ex tabula præcedenti. Atque hæc tria nota ponuntur ita in omni operatione, vt primo loco sit sinus totus, secundo tangens eleuationis poli, tertio tangens declinationis paralleli. Dic igitur.

Vt sinus totus ad tangentem eleuationis poli alicuius, ita

87 gr. 29 min. princip. 87

tangens 20 gr. 10 min. princip. II ad aliud, prodibitq; sinus in tribus Signis.

23 gr. 28 min. princip. 23

quo arcus semidiurnus vel quadrantem superat, vel à quadrante superatur; est enim eadem ratio in parallelo Australi. Arcus igitur per sinus inuentus, si additur ad quadrantem, conflabitur arcus semidiurnus Borealis; si verò ex quadrante dematur, dabit reliquum arcum semidiurnum Australem. Sufficiat igitur differentiæ tantum inter quadrantem, & arcus semidiurnos vnius quadrantis eclipticæ inuestigare: hæc enim differentiæ differentijs in alijs quadrantibus æquales sunt. Atque hac ratione nos proprias tabulas integrorum arcuum diurnorum, ad 32. eleuationes poli supputauimus, vt sequitur.

Dato verò arcu diurno quocumque horarum eius declinationem ad datam altitudinem poli ita inuenies. Vt sinus totus ad sinum differentiæ inter arcum semidiurnum datum, & quadrantem æquatoris, ita tangens complementi altitudinis poli ad aliud.



Tabula II. arcuum semidiurnorum in gradibus ad eleuationes poli iouis Europæ, qua quantitas dierum, & noctium nullo pæne negotio cognoscitur, Sole in initijs Signorum constituto.

| Altitudin. Poli. | ♄ |        | ♅      |        | ♆    |       | ♇     |       | ♈ |   | ♉ |   | ♊ |   |
|------------------|---|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
|                  | G | M      | G      | M      | G    | M     | G     | M     | G | M | G | M | G | M |
| 35               | 0 | 107 44 | 104 56 | 98 11  | 90 0 | 81 49 | 75 4  | 72 16 |   |   |   |   |   |   |
| 36               | 0 | 108 25 | 105 30 | 98 30  | 90 0 | 81 30 | 74 30 | 71 35 |   |   |   |   |   |   |
| 37               | 0 | 109 8  | 106 6  | 98 49  | 90 0 | 81 11 | 73 54 | 70 52 |   |   |   |   |   |   |
| 38               | 0 | 110 52 | 106 42 | 99 9   | 90 0 | 80 51 | 73 18 | 70 8  |   |   |   |   |   |   |
| 39               | 0 | 110 37 | 107 20 | 99 29  | 90 0 | 80 31 | 72 40 | 69 23 |   |   |   |   |   |   |
| 40               | 0 | 111 24 | 107 59 | 99 50  | 90 0 | 80 10 | 72 1  | 68 36 |   |   |   |   |   |   |
| 41               | 0 | 112 12 | 108 39 | 100 11 | 90 0 | 79 49 | 71 21 | 67 48 |   |   |   |   |   |   |
| 42               | 0 | 113 3  | 109 21 | 100 33 | 90 0 | 79 27 | 70 39 | 66 57 |   |   |   |   |   |   |
| 43               | 0 | 113 55 | 110 4  | 100 56 | 90 0 | 79 4  | 69 56 | 66 5  |   |   |   |   |   |   |
| 44               | 0 | 114 50 | 110 49 | 101 20 | 90 0 | 78 40 | 69 11 | 65 10 |   |   |   |   |   |   |
| 45               | 0 | 115 46 | 111 35 | 101 44 | 90 0 | 78 16 | 68 25 | 64 14 |   |   |   |   |   |   |
| 46               | 0 | 116 46 | 112 24 | 102 10 | 90 0 | 77 50 | 67 36 | 63 14 |   |   |   |   |   |   |
| 47               | 0 | 117 48 | 113 14 | 102 36 | 90 0 | 77 24 | 66 46 | 62 12 |   |   |   |   |   |   |
| 48               | 0 | 118 53 | 114 7  | 103 4  | 90 0 | 76 56 | 65 53 | 61 7  |   |   |   |   |   |   |
| 49               | 0 | 120 1  | 115 2  | 103 32 | 90 0 | 76 28 | 64 58 | 59 59 |   |   |   |   |   |   |
| 50               | 0 | 121 13 | 116 0  | 104 2  | 90 0 | 75 58 | 64 0  | 58 47 |   |   |   |   |   |   |
| 51               | 0 | 122 29 | 117 1  | 104 33 | 90 0 | 75 27 | 62 59 | 57 31 |   |   |   |   |   |   |
| 52               | 0 | 123 49 | 118 6  | 105 6  | 90 0 | 74 54 | 61 54 | 56 11 |   |   |   |   |   |   |
| 53               | 0 | 125 15 | 119 14 | 105 40 | 90 0 | 74 20 | 60 46 | 54 45 |   |   |   |   |   |   |
| 54               | 0 | 126 46 | 120 26 | 106 16 | 90 0 | 73 44 | 59 34 | 53 14 |   |   |   |   |   |   |
| 55               | 0 | 128 23 | 121 42 | 106 53 | 90 0 | 73 7  | 58 18 | 51 37 |   |   |   |   |   |   |
| 56               | 0 | 130 8  | 123 3  | 107 33 | 90 0 | 72 27 | 56 57 | 49 52 |   |   |   |   |   |   |
| 57               | 0 | 132 2  | 124 31 | 108 15 | 90 0 | 71 45 | 55 29 | 47 58 |   |   |   |   |   |   |
| 58               | 0 | 134 6  | 126 4  | 109 0  | 90 0 | 71 0  | 53 56 | 45 54 |   |   |   |   |   |   |
| 59               | 0 | 136 21 | 127 46 | 109 47 | 90 0 | 70 13 | 52 14 | 43 39 |   |   |   |   |   |   |
| 60               | 0 | 138 52 | 129 35 | 110 38 | 90 0 | 69 22 | 50 25 | 41 8  |   |   |   |   |   |   |
| 61               | 0 | 141 40 | 131 39 | 111 32 | 90 0 | 68 18 | 48 25 | 38 20 |   |   |   |   |   |   |
| 62               | 0 | 144 52 | 133 47 | 112 30 | 90 0 | 67 30 | 46 13 | 35 8  |   |   |   |   |   |   |
| 63               | 0 | 148 35 | 136 13 | 113 32 | 90 0 | 66 28 | 43 47 | 31 25 |   |   |   |   |   |   |
| 64               | 0 | 153 3  | 138 58 | 114 39 | 90 0 | 65 21 | 41 2  | 26 57 |   |   |   |   |   |   |
| 65               | 0 | 158 49 | 142 6  | 115 52 | 90 0 | 64 8  | 37 54 | 21 11 |   |   |   |   |   |   |
| 66               | 0 | 167 35 | 145 44 | 117 11 | 90 0 | 62 49 | 34 16 | 12 25 |   |   |   |   |   |   |

Problema VI.

Tabulas amplitudinum ortiuæ & occidua, tam Solis, quam Stellarum fixarum, ubique locorum supputare.

Tria iterum hic necessaria ponuntur: primo loco sinus totus, secundo sinus altitudinis poli, tertio loco tangens declinationis alicuius stellæ. Cum igitur amplitudo ortiua nihil aliud sit, quam arcus horizontis inter æquinoctialem, & parallelum, quem stella quæpiam obtinet, interceptus, quam refert in analemate linea P 3, basis trianguli Pλ 3, in quo triangulo dantur duo anguli cum vno latere, ex quibus cætera innotescunt. Angulus λP 3 notus est ex eleuatione poli; latus P λ, ex sinu declinationis stellæ, & angulus λ, rectus est. Dic igitur.

Vt sinus totus ad secantem altitudinis poli, ita tangens declinationis paralleli stellæ alicuius ad aliud, producentur sinus, quibus in tabula sinuum respondent latitudines ortiuæ, & occidua. Hac arte nos sequentem tabulam supputauimus.


Analogismus II.

Amplitudinis Ortiuæ, & Occidua.

Vt sinus totius { ad secantem altitudinis poli } ita tangens declinationis in signis {  $\begin{matrix} \text{♄} & \text{♅} & \text{♆} & \text{♇} & \text{♈} & \text{♉} & \text{♊} & \text{♋} \\ \text{II} & \text{20} & \text{10} & & & & & \end{matrix}$  } ad aliud } prodibit sinus, quorum gradus sunt { 15 32 } amplitudines } 27 38 } 32 24 } quæsite.

Vsus Tabulae.

Ingrederi in tabulam cum data altitudine poli, & è latere, & cum signo in fronte. Area enim communis vtrique, dabit amplitudinem ortiuam & occidua quæsitam. Ita hic Romæ sub 42. eleuationis poli gradu, Solem in 15 amplitudinem ortiuam, vel occidua habere 32. graduum, & 24. minorum reperies. Sed hic cum nullam difficultatem habeant, omisiss ad alia progrediamur.



Tabula III. amplitudinis ortiva, & occidua ad initia duodecim Signorum Zodiaci ad 32. elevationes Poli.


| Elevat. Poli. | 1 |    | 2  |    | 3  |    | 4  |   | 5 |    | 6  |    | 7  |    |    |
|---------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
|               | G | M  | G  | M  | G  | M  | G  | M | G | M  | G  | M  | G  | M  |    |
| 36            | 0 | 29 | 29 | 25 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | 25 | 13 | 29 | 29 |
| 37            | 0 | 29 | 55 | 25 | 34 | 14 | 26 | 0 | 0 | 14 | 26 | 25 | 34 | 29 | 55 |
| 38            | 0 | 30 | 21 | 25 | 57 | 14 | 38 | 0 | 0 | 14 | 38 | 25 | 57 | 30 | 21 |
| 39            | 0 | 30 | 49 | 26 | 20 | 14 | 51 | 0 | 0 | 14 | 51 | 26 | 20 | 30 | 49 |
| 40            | 0 | 31 | 19 | 26 | 45 | 15 | 4  | 0 | 0 | 15 | 4  | 26 | 45 | 31 | 19 |
| 41            | 0 | 31 | 51 | 27 | 11 | 15 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 27 | 11 | 31 | 51 |
| 42            | 0 | 32 | 24 | 27 | 38 | 15 | 32 | 0 | 0 | 15 | 32 | 27 | 38 | 32 | 24 |
| 43            | 0 | 32 | 59 | 28 | 7  | 15 | 48 | 0 | 0 | 15 | 48 | 28 | 7  | 32 | 59 |
| 44            | 0 | 33 | 37 | 28 | 38 | 16 | 4  | 0 | 0 | 16 | 4  | 28 | 38 | 33 | 37 |
| 45            | 0 | 34 | 16 | 29 | 11 | 16 | 21 | 0 | 0 | 16 | 21 | 29 | 11 | 34 | 16 |
| 46            | 0 | 34 | 59 | 29 | 45 | 16 | 39 | 0 | 0 | 16 | 39 | 29 | 45 | 34 | 59 |
| 47            | 0 | 35 | 43 | 30 | 22 | 16 | 58 | 0 | 0 | 16 | 58 | 30 | 22 | 35 | 43 |
| 48            | 0 | 36 | 31 | 31 | 1  | 17 | 19 | 0 | 0 | 17 | 19 | 31 | 1  | 36 | 31 |
| 49            | 0 | 37 | 22 | 31 | 42 | 17 | 40 | 0 | 0 | 17 | 40 | 31 | 42 | 37 | 22 |
| 50            | 0 | 38 | 17 | 32 | 26 | 18 | 3  | 0 | 0 | 18 | 3  | 32 | 26 | 38 | 17 |
| 51            | 0 | 39 | 15 | 33 | 13 | 18 | 27 | 0 | 0 | 18 | 27 | 33 | 13 | 39 | 15 |
| 52            | 0 | 40 | 18 | 34 | 3  | 18 | 52 | 0 | 0 | 18 | 52 | 34 | 3  | 40 | 18 |
| 53            | 0 | 41 | 26 | 34 | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 34 | 57 | 41 | 26 |
| 54            | 0 | 42 | 39 | 35 | 55 | 19 | 48 | 0 | 0 | 19 | 48 | 35 | 55 | 42 | 39 |
| 55            | 0 | 43 | 58 | 36 | 57 | 20 | 19 | 0 | 0 | 20 | 19 | 36 | 57 | 43 | 58 |
| 56            | 0 | 45 | 24 | 38 | 4  | 20 | 51 | 0 | 0 | 20 | 51 | 38 | 4  | 45 | 24 |
| 57            | 0 | 46 | 59 | 39 | 16 | 21 | 26 | 0 | 0 | 21 | 26 | 39 | 16 | 46 | 59 |
| 58            | 0 | 48 | 43 | 40 | 35 | 22 | 4  | 0 | 0 | 22 | 4  | 40 | 35 | 48 | 43 |
| 59            | 0 | 50 | 38 | 42 | 1  | 22 | 44 | 0 | 0 | 22 | 44 | 42 | 1  | 50 | 38 |
| 60            | 0 | 52 | 47 | 43 | 35 | 23 | 28 | 0 | 0 | 23 | 28 | 43 | 35 | 52 | 47 |
| 61            | 0 | 55 | 13 | 45 | 20 | 24 | 15 | 0 | 0 | 24 | 15 | 45 | 20 | 55 | 13 |
| 62            | 0 | 58 | 1  | 47 | 15 | 25 | 5  | 0 | 0 | 25 | 5  | 47 | 15 | 58 | 1  |



Problema VII.

Differentia ascensionalis supputatio.

EX analemmatis figura patet arcum semidiurnum boreum tantum excedere circuli quadrantem, quantum idem arcus in opposito australi signo à gradibus 90. deficit. Quæritur ergo in analemmate arcus paralleli,  $\lambda$  3; sed hoc in partibus, qualem fit  $\lambda$  V, totus sinus, & vocatur arcus inquirendus differentia ascensionalis; recta verò  $\lambda$  V, ita est ad semidiametrum æquatoris, vt arcus declinationis Solis ad tangentem eiusdem declinationis.



Fiat itaq; vt sinus totus ad tangentem elevationis poli, ita tangens declinationis Solis ad aliud. Si igitur tangentem declinationis Solis in tangentem elevationis poli duxeris, productumque per sinum totum diuideris; indicabit quotiens sinus, quorum arcus in Tabula Sinuum innoscunt. Tabulam verò differentiarum ab alijs supputatam passim apud Astronomicos Authores Clauium, Maginum, Orontium, aliosque innumeros reperies.



Problema VIII.


Tabulas altitudinum Solis, & circumferentiarum horizontalium condere.

Utm in Arte nostra Magnetica fusè de methodo harum tabularum ad omne horarum genus computandarum tractauerimus; idè superuacaneum esse rati sumus hic eandem repetere. Eò ergo Lectorem remittimus; hoc verò loco tantùm tabulas, quæ ibi desiderantur, exponendas duximus.

Vsus Tabulae Almucantaro-azymubicae.

IN fronte tabulae habentur horæ astronomicae; in latere eleuationes poli, quibus singulis tria signa ☉ ☽ ☿ respondent in eodem latere. Si igitur nosse cupies sub 42. eleuatione poli Azimutha, & Almucantaræ; dato signo, & data hora, verbi gratia hora 3. ☉; quæritò datam eleuationem 42. grad. in latere; & area eorum signorum cum hora 3. vel 9. dabit pro ☉, 48. grad. 29. min. Almucantarum, 12. grad. 4. min. Azimuthum. Et sic de cæteris.

Nota hic Lector, per Almucantaræ nihil aliud nos intelligere, nisi circulos altitudinem Solis supra horizontem; sicuti per Azimutha nihil aliud, nisi circulos verticales, quibus locus Solis in quacunque plaga cœli quolibet momento temporis determinatur.



Faint text or bleed-through from the reverse side of the page, partially obscured by the decorative ornament.

Tabula IV. Almucantaro-azymubica ad 32. eleuationes Poli supputata, siue altitudines Solis, & circumferentias horizontales exhibens.

Table with columns for elevation (Elevat. poli), signa (☉, ☽, ☿), hora à merid. & med. noc., and columns 1-6 (I2, I, 2, 3, 4, 5, 6) with sub-columns G and M. Rows represent elevations from 36 to 41.

*Residuum Tabule IV. Almucantaro-azymuthica.*

| Elevat. poli | Signa | Horæ a merid. & med. noc. | 12    |       | 11                       |       | 10    |       | 9     |       | 8     |   | 7 |   | 6 |   |
|--------------|-------|---------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
|              |       |                           | G     | M     | G                        | M     | G     | M     | G     | M     | G     | M | G | M | G | M |
|              |       |                           | 42    | ☉     | Alm. 71 30<br>Azym. 90 0 | 67 41 | 58 59 | 48 29 | 37 25 | 26 18 | 15 28 |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 48 0<br>Azym. 90 0   | 45 52 | 40 4  | 31 42                    | 21 49 | 11 5  | 0 0   |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 24 30<br>Azym. 90 0  | 23 3  | 18 52 | 12 25                    | 4 14  | 0 0   |       |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 70 30<br>Azym. 90 0  | 66 54 | 58 31 | 48 16                    | 37 24 | 26 31 | 15 47 |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 47 0<br>Azym. 90 0   | 44 57 | 39 18 | 31 8                     | 21 27 | 10 55 | 0 0   |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 23 30<br>Azym. 90 0  | 22 5  | 18 0  | 11 40                    | 3 38  | 0 0   |       |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 69 30<br>Azym. 90 0  | 66 5  | 58 2  | 42 2                     | 37 22 | 26 36 | 16 5  |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 46 0<br>Azym. 90 0   | 44 1  | 38 32 | 30 34                    | 21 5  | 10 44 | 0 0   |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 22 30<br>Azym. 90 0  | 21 7  | 17 7  | 10 55                    | 3 2   | 0 0   |       |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 68 30<br>Azym. 90 0  | 65 17 | 57 31 | 47 46                    | 37 19 | 26 44 | 16 22 |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 45 0<br>Azym. 90 0   | 43 5  | 37 46 | 30 0                     | 20 42 | 10 33 | 0 0   |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 21 30<br>Azym. 90 0  | 20 9  | 16 14 | 10 10                    | 2 25  | 0 0   |       |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 67 30<br>Azym. 90 0  | 64 27 | 56 59 | 47 30                    | 37 15 | 26 51 | 16 14 |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 44 0<br>Azym. 90 0   | 42 9  | 36 59 | 29 25                    | 20 19 | 10 21 | 0 0   |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 20 30<br>Azym. 90 0  | 19 11 | 15 22 | 9 25                     | 1 49  | 0 0   |       |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 66 30<br>Azym. 90 0  | 63 36 | 56 26 | 47 13                    | 37 11 | 26 58 | 16 57 |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 43 0<br>Azym. 90 0   | 41 12 | 36 12 | 28 50                    | 19 56 | 10 10 | 0 0   |       |       |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 19 30<br>Azym. 90 0  | 18 13 | 14 29 | 8 40                     | 1 13  | 0 0   |       |       |       |       |   |   |   |   |   |

Ref.

*Residuum Tabule IV. Almucantaro-azymuthica.*

| Elevat. poli | Signa | Horæ a merid. & med. noc. | 12    |       | 11                       |       | 10    |       | 9    |      | 8     |   | 7 |   | 6 |   |
|--------------|-------|---------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|---|---|---|---|---|
|              |       |                           | G     | M     | G                        | M     | G     | M     | G    | M    | G     | M | G | M | G | M |
|              |       |                           | 48    | ☉     | Alm. 65 30<br>Azym. 90 0 | 62 45 | 55 52 | 46 54 | 37 6 | 27 4 | 17 14 |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 42 0<br>Azym. 90 0   | 40 16 | 35 25 | 28 18                    | 19 33 | 9 58  | 0 0   |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 17 30<br>Azym. 90 0  | 16 16 | 12 43 | 7 9                      | 0 0   |       |       |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 63 30<br>Azym. 90 0  | 67 2  | 54 41 | 46 15                    | 36 53 | 27 16 | 17 47 |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 40 0<br>Azym. 90 0   | 38 27 | 33 49 | 27 2                     | 18 45 | 9 35  | 0 0   |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 16 30<br>Azym. 90 0  | 15 18 | 11 50 | 6 24                     | 0 0   |       |       |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 62 30<br>Azym. 90 0  | 60 9  | 54 4  | 45 53                    | 36 46 | 27 20 | 18 13 |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 39 0<br>Azym. 90 0   | 37 26 | 33 2  | 26 25                    | 18 20 | 9 22  | 0 0   |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 15 30<br>Azym. 90 0  | 14 20 | 10 57 | 5 38                     | 0 0   |       |       |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 61 30<br>Azym. 90 0  | 59 16 | 53 26 | 45 31                    | 36 37 | 27 25 | 18 29 |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 38 0<br>Azym. 90 0   | 36 29 | 32 13 | 25 48                    | 13 56 | 9 10  | 0 0   |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 14 30<br>Azym. 90 0  | 13 22 | 10 4  | 4 53                     | 0 0   |       |       |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 62 30<br>Azym. 90 0  | 60 9  | 54 4  | 45 53                    | 36 46 | 27 20 | 28 3  |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 39 0<br>Azym. 90 0   | 37 26 | 33 2  | 26 25                    | 18 20 | 9 22  | 0 0   |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 15 30<br>Azym. 90 0  | 14 20 | 10 57 | 5 38                     | 0 0   |       |       |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☉     | Alm. 61 30<br>Azym. 90 0  | 59 16 | 53 26 | 45 31                    | 36 37 | 27 25 | 18 19 |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ☽     | Alm. 38 0<br>Azym. 90 0   | 36 29 | 32 13 | 25 48                    | 17 56 | 9 10  | 0 0   |      |      |       |   |   |   |   |   |
|              | ♃     | Alm. 14 30<br>Azym. 90 0  | 13 22 | 10 4  | 4 53                     | 0 0   |       |       |      |      |       |   |   |   |   |   |

Ref.



Residuum Tabulae IV. Almucantaro-azymuthicae.

Table with columns for hours (12-6) and rows for Azymuth (Alm., Azym.) at various elevations.

Nota in sequentem Tabulam.

NE Lector πολυαεργμων in operis executione necessario apparatu destituere- tur; hic tabulam quoque Almucantaro-azymuthicam pro horis Italicis & Babylonis, ad 10: elevationes poli, id est, ad totius Italiae latitudinem ordinatam adiungendam duxi; Ex qua sibi vnusquisque tabellas separatas horizonti suo congruas excerpere poterit.



Tabula V. Almucantaro-azymuthica pro horis Italicis, & Babylonis.

Large table with columns for Italic and Babylonian hours (24-12) and rows for Azymuth (Alm., Azym.) at various elevations (35-45).

Hic ingredere Tabulam pro signo 35.

Hic ingredere Tabulam pro signo 45.

Explicatio litterarum, & notarum.

Per hoc signum † notamus Meridiem; per \* Occasum, vel Ortum Solis: per a plagam Australem; per b Borealem.



Alterapars Tabulæ V. Almucantaro-azymuthicæ pro horis Italicis, & Babylonicis.

| Elevat. poli | Horæ Ital.  | 11    | 10    | 9     | 8     | 7     | 6     | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     | 12    |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | Horæ Babyl. | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    |       |
|              |             | P M   | P M   | P M   | P M   | P M   | P M   | P M   | P M   | P M   | P M   | P M   |       |
| 35           | Alm.        | 15 21 | 3 58  | 5*36  | 14 57 | 22 38 | 28 0  | 31 27 | 30†21 | 26 5  | 19 6  | 10 13 |       |
|              | Azym.       | 18 14 | 26 5  | 34*51 | 45 5  | 57 12 | 72 22 | 87 4  | 76†57 | 62 7  | 48 29 | 37 13 | 28 24 |
| 36           | Alm.        | 16 11 | 4 54  | 5*36  | 14 57 | 22 38 | 28 0  | 30 25 | 29†30 | 25 25 | 18 42 | 10 2  |       |
|              | Azym.       | 17 36 | 25 38 | 34*30 | 44 48 | 56 49 | 70 51 | 86 22 | 77†47 | 62 59 | 50 1  | 38 59 | 29 32 |
| 37           | Alm.        | 17 1  | 5 51  | 4*34  | 13 51 | 21 29 | 26 52 | 29 23 | 28†38 | 24 47 | 18 18 | 9 57  |       |
|              | Azym.       | 16 57 | 25 8  | 34*7  | 44 28 | 56 26 | 70 19 | 85 39 | 78†38 | 63 51 | 50 48 | 39 36 | 29 57 |
| 38           | Alm.        | 17 52 | 6 48  | 3*31  | 12 44 | 20 20 | 25 44 | 18 20 | 27†46 | 24 8  | 17 53 | 9 39  |       |
|              | Azym.       | 16 15 | 24 37 | 33*43 | 44 3  | 56 0  | 69 46 | 84 56 | 79†30 | 64 44 | 51 36 | 40 15 | 30 24 |
| 39           | Alm.        | 18 42 | 7 45  | 2*29  | 11 37 | 19 10 | 24 35 | 27 17 | 28†53 | 23 26 | 17 27 | 9 27  |       |
|              | Azym.       | 15 31 | 24 4  | 33*17 | 43 39 | 55 34 | 69 12 | 84 12 | 80†22 | 65 37 | 52 25 | 40 54 | 30 52 |
| 40           | Alm.        | 19 33 | 8 42  | 1*26  | 10 29 | 18 0  | 23 26 | 26 13 | 26†0  | 22 48 | 17 19 | 15    |       |
|              | Azym.       | 14 44 | 23 28 | 32*49 | 43 13 | 55 6  | 68 37 | 83 28 | 81†14 | 66 32 | 53 15 | 41 36 | 31 54 |
| 41           | Alm.        | 20 23 | 9 39  | 0*23  | 9 21  | 16 50 | 22 17 | 25 9  | 25†6  | 22 7  | 16 35 | 9 2   |       |
|              | Azym.       | 13 55 | 22 50 | 32*17 | 42 45 | 54 36 | 68 0  | 82 42 | 82†6  | 67 27 | 54 6  | 42 18 | 31 54 |
| 42           | Alm.        | 21 14 | 10 37 | 0 41  | 8*13  | 15 39 | 21 7  | 24 5  | 24†11 | 21 26 | 16 8  | 8 48  |       |
|              | Azym.       | 13 3  | 22 9  | 31 43 | 42 14 | 54 4  | 67 22 | 81 55 | 83†0  | 68 23 | 54 59 | 43 1  | 32 27 |
| 43           | Alm.        | 22 5  | 11 35 | 1 45  | 7*4   | 14 28 | 19 57 | 23 0  | 23†26 | 20 44 | 15 41 | 8 35  |       |
|              | Azym.       | 12 8  | 21 26 | 31 7  | 41*41 | 53 30 | 66 42 | 81 7  | 83†56 | 69 21 | 55 53 | 43 48 | 33 2  |
| 44           | Alm.        | 22 56 | 12 33 | 2 50  | 5*55  | 13 16 | 18 46 | 21 54 | 22†20 | 20 1  | 15 13 | 8 22  |       |
|              | Azym.       | 11 9  | 20 39 | 30 29 | 41*6  | 52 53 | 66 80 | 80 17 | 84†53 | 70 20 | 56 49 | 44 37 | 33 40 |
| 45           | Alm.        | 23 47 | 13 32 | 3 35  | 4*45  | 12 4  | 17 35 | 20 48 | 21†23 | 19 17 | 14 44 | 8 8   |       |
|              | Azym.       | 10b 6 | 19 50 | 29 45 | 14*28 | 52 14 | 65 16 | 19 29 | 85†50 | 71 20 | 57 46 | 45 27 | 34 20 |

Hic ingredere Tabulam pro signo 66.

Hic ingredere Tabulam pro signo 6.

Explicatio literarum, & notarum.

Per hoc signum † notamus Meridiem; per \* Occasum, vel Ortum Solis: per a plagam Australem; per b Borealem.

Nota


Nota in Tabulam præcedentem.

HÆc Tabula tantum ad tropicos in horologio quouis, & cuiusvis plani describendos inferuit. Ostendit enim communia intersectionis puncta, quæ singulis horis Italicis, & Babylonicis se secant tam Almucantaræ, quàm Azymutha. Cum verò ad horarias lineas describendas tribus signis  $\overline{\text{66}}$ ,  $\overline{\text{6}}$ , &  $\overline{\text{b}}$  opus sit, vt per tria puncta in dictis signis inuenta arcus horarius duci possit; hinc Y, &  $\overline{\text{6}}$  plerique astronomi eligunt, vna cum  $\overline{\text{66}}$ , &  $\overline{\text{b}}$ ; vti nos in præcedenti Tabula IV. fecimus. In hac tamen Tabula Y, vel  $\overline{\text{6}}$  consultò omisimus; non quòd ad horas Italicas describendas non utilis sit; sed quòd Almucantaræ, & Azymutha, quæ seruiunt horis astronomicis in præcedenti Tabula, Sole in Y, vel  $\overline{\text{6}}$  constituto, etiam hic seruiant eadem cum horis Ital. & Babyl. ita Almucantara, & Azymuthum, quæ horæ 12. astronomicæ respondent Sole in Y, vel  $\overline{\text{6}}$  constituto; congruunt horæ Italicæ 18. & 6. Babylonicæ, & sic de cæteris. Si igitur hac Tabula vti velis; excerpe numeros Almucantaro-azymuthicos tum eleuationi poli tuæ regionis, tum horis in fronte correspondentes, & pro punctis quidem  $\overline{\text{66}}$  ingredere Tabulam ex ea parte, in qua eleuationes poli describuntur: pro punctis verò  $\overline{\text{b}}$  ex opposita parte Tabulam ingredere, pro Y verò, &  $\overline{\text{6}}$  excerpes numeros præcedentis Tabulæ Y, &  $\overline{\text{6}}$  respondentes, vti dictum est, & poteris votis tuis.

Problema IX.

Tabulam umbrarum calculare.

Valde necessaria est hæc Tabula ad inscriptiones signorum, aliorumque celestium circulorum. Quare eam ita ad quamcunque eleuationem Solis calculabis. Sit Solis altitudo nota E, planum horizontale AB, stylus HI, umbra



GH, recta; & versa FG. Dimittatur ex E recta in S normalis. Quoniam igitur triangulum IES lucidum, triangulo GIH vmbroso simile est, erunt anguli angulis æquales, & latera lateribus proportionalia. Fiat igitur, vt sinus altitudinis Solis cognite ES, ad IS, sinum complementi eiusdem altitudinis Solis, ita gnomon IH, in 10. vel 12. vel quaslibet alias partes diuisus ad GH, vmbra rectam facta operatione notam. Si verò vmbra versam desideres, fiat vt EV, sinus complementi datæ altitudinis Solis, ad sinum

Operatio per Sinus.

rectum VI, vel ES, eiusdem altitudinis: ita FI stylus in 10. 12. vel quaslibet partes diuisus ad FG, vmbra versam facta operatione notam: ita data qualibet altitudine Solis, vmbra rectam, & versam inuestigabis.



Residuum Tabule VI. Vmbrarum tam rectorum, quam versarum, dato stylo in 12. partes diuiso.

| Gradus Altit. ☉ | 60    | 61   | 62    | 63   | 64    | 65   | 66    | 67   | 68    | 69   |
|-----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Min.            | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      |
|                 | P     | M    | P     | M    | P     | M    | P     | M    | P     | M    |
| 0               | 6 56  | 6 39 | 6 23  | 6 7  | 5 51  | 5 36 | 5 21  | 5 6  | 4 51  | 4 36 |
| 10              | 6 53  | 6 36 | 6 20  | 6 4  | 5 49  | 5 33 | 5 18  | 5 3  | 4 48  | 4 34 |
| 20              | 6 50  | 6 34 | 6 17  | 6 2  | 5 46  | 5 31 | 5 16  | 5 1  | 4 46  | 4 32 |
| 30              | 6 47  | 6 31 | 6 15  | 5 59 | 5 43  | 5 28 | 5 13  | 4 58 | 4 44  | 4 39 |
| 40              | 6 45  | 6 28 | 6 12  | 5 56 | 5 41  | 5 26 | 5 11  | 4 56 | 4 41  | 4 27 |
| 50              | 6 42  | 6 26 | 6 10  | 5 54 | 5 38  | 5 23 | 5 8   | 4 53 | 4 39  | 4 24 |
| 60              | 6 39  | 6 23 | 6 7   | 5 51 | 5 36  | 5 21 | 5 6   | 4 51 | 4 36  | 4 22 |
| Gradus Altit. ☉ | 70    | 71   | 72    | 73   | 74    | 75   | 76    | 77   | 78    | 79   |
| Min.            | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      |
|                 | P     | M    | P     | M    | P     | M    | P     | M    | P     | M    |
| 0               | 4 22  | 4 8  | 3 54  | 3 40 | 3 26  | 3 13 | 3 0   | 2 46 | 2 33  | 2 20 |
| 10              | 4 20  | 4 6  | 3 52  | 3 38 | 3 24  | 3 11 | 2 56  | 2 44 | 2 31  | 2 18 |
| 20              | 4 17  | 4 3  | 3 49  | 3 36 | 3 22  | 3 8  | 2 55  | 2 42 | 2 29  | 2 16 |
| 30              | 4 15  | 4 1  | 3 47  | 3 33 | 3 20  | 3 6  | 2 53  | 2 40 | 2 26  | 2 13 |
| 40              | 4 13  | 3 59 | 3 45  | 3 31 | 3 17  | 3 4  | 2 51  | 2 37 | 2 24  | 2 11 |
| 50              | 4 10  | 3 56 | 3 42  | 3 29 | 3 15  | 3 2  | 2 48  | 2 35 | 2 22  | 2 9  |
| 60              | 4 8   | 3 54 | 3 40  | 3 26 | 3 13  | 3 0  | 2 46  | 2 33 | 2 20  | 2 7  |
| Gradus Altit. ☉ | 80    | 81   | 82    | 83   | 84    | 85   | 86    | 87   | 88    | 89   |
| Min.            | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      | Vmbra |      |
|                 | P     | M    | P     | M    | P     | M    | P     | M    | P     | M    |
| 0               | 2 7   | 1 54 | 1 41  | 1 28 | 1 16  | 1 3  | 0 50  | 0 38 | 0 25  | 0 13 |
| 10              | 2 5   | 1 52 | 1 39  | 1 26 | 1 14  | 1 1  | 0 48  | 0 36 | 0 23  | 0 10 |
| 20              | 2 3   | 1 50 | 1 37  | 1 24 | 1 11  | 0 59 | 0 46  | 0 34 | 0 21  | 0 8  |
| 30              | 2 0   | 1 48 | 1 35  | 1 22 | 1 9   | 0 57 | 0 44  | 0 31 | 0 19  | 0 6  |
| 40              | 1 58  | 1 45 | 1 33  | 1 20 | 1 7   | 0 55 | 0 42  | 0 29 | 0 17  | 0 4  |
| 50              | 1 56  | 1 43 | 1 31  | 1 18 | 1 5   | 0 52 | 0 40  | 0 27 | 0 15  | 0 2  |
| 60              | 1 54  | 1 41 | 1 28  | 1 16 | 1 3   | 0 50 | 0 38  | 0 25 | 0 13  | 0 0  |

Nota


Nota in Tabulam præcedentem.

**D**Ata altitudine Solis quæratu eius gradus inter maiusculos numeros : & , si minuta habuerit adiuncta, ea in latere quærantur, & area communis vtriusque dabit vmbra in partibus, qualem stylus habet 12. Exempli gratia: si velis scire, quot partium vmbra faciat altitudo Solis supra horizontem 50. gradibus eleuari; quare igitur intra series maiusculorum numerorum 50. grad. 40. min. & area communis dabit vmbra horizontalem 10. par. 4. min. Si verò 50. grad. & 40. min. fuerit eleuatus, accipe in latere 40. min. & in vertice 50. grad. atque area communis dabit 9. grad. 50. min. vmbra horizontalem. Si verò vmbra verticalis quantitatem scire desideret; accipe complementum altitudinis Solis inuentæ, & minuta in dextra parte Tabulæ ponè vmbra verticales; & area communis vtriusque dabit vmbra quæsitam. Exempli gratia: sit data altitudo Solis 50. grad. & 40. min. & desiderabit quispiam vmbra versam, siue verticalem: quare complementum altitudinis datæ 39. grad. & 20. min. & gradus quidem positi censentur intra eandem columnam in calce, minuta verò 20. quærantur in laterculo vmbra verticalium; & area communis dabit 9. part. 50. min. vmbra verticalem quæsitam. Non secus in reliquis operaberis.

Problema X.

Tabulam parallelorum Solis horologijs inscribendorum supputare.

**P**rimò, habeantur altitudines Solis ex præcedentibus tabulis pro initijs signorum ad singulas horas à meridie, & media nocte supputatæ. Deinde fiat: Vt sinus rectus datarum altitudinum ad sinus complementi earundem, ita stylus in 12. partes diuisus ad aliud; prouenientque vmbra pro horis datis in plano quidem horizontali rectorum, in verticalibus verò versarum longitudines quæsitæ, quas in tabulas redigas, vt sequitur.



Pars I. Tabula VII. pro hyperbolicis  $\infty, \epsilon$   $\phi$   
plano horizontali inscribendis.

| Elevat.<br>poli | Horæ<br>P.M. | 12    |    | 1     |    | 2     |    | 3     |    | 4     |    | 5     |    | 6     |    | 7     |    |
|-----------------|--------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                 | Horæ<br>A.M. | II    |    | IO    |    | 9     |    | 8     |    | 7     |    | 6     |    | 5     |    |       |    |
| Signa           | Tang.        | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    |
|                 |              | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  |
| 35              | $\infty$     | 16    | 32 | 16    | 37 | 16    | 59 | 17    | 15 | 18    | 65 | 23    | 11 | 40    | 10 | 285   | 52 |
| 35              | $\phi$       | 30    | 60 | 31    | 44 | 34    | 58 | 43    | 08 | 76    | 43 |       |    |       |    |       |    |
| 36              | $\infty$     | 15    | 98 | 16    | 04 | 16    | 27 | 16    | 86 | 18    | 30 | 22    | 84 | 29    | 13 | 229   | 49 |
| 36              | $\phi$       | 30    | 74 | 31    | 63 | 34    | 96 | 44    | 10 | 81    | 53 |       |    |       |    |       |    |
| 37              | $\infty$     | 15    | 67 | 15    | 73 | 15    | 98 | 16    | 59 | 18    | 15 | 22    | 58 | 38    | 21 | 102   | 09 |
| 37              | $\phi$       | 30    | 95 | 31    | 90 | 35    | 45 | 45    | 28 | 87    | 16 |       |    |       |    |       |    |
| 38              | $\infty$     | 15    | 39 | 15    | 46 | 15    | 71 | 16    | 35 | 17    | 94 | 22    | 33 | 37    | 36 | 165   | 41 |
| 38              | $\phi$       | 31    | 22 | 32    | 22 | 36    | 00 | 46    | 58 | 94    | 01 |       |    |       |    |       |    |
| 39              | $\infty$     | 15    | 12 | 15    | 20 | 15    | 46 | 16    | 13 | 17    | 75 | 22    | 11 | 36    | 54 | 145   | 04 |
| 39              | $\phi$       | 31    | 56 | 32    | 63 | 36    | 66 | 48    | 11 | 102   | 17 |       |    |       |    |       |    |
| 40              | $\infty$     | 14    | 88 | 14    | 95 | 15    | 24 | 15    | 93 | 15    | 57 | 21    | 90 | 35    | 78 | 129   | 07 |
| 40              | $\phi$       | 31    | 97 | 33    | 11 | 37    | 44 | 49    | 89 | 112   | 14 |       |    |       |    |       |    |
| 41              | $\infty$     | 14    | 66 | 14    | 74 | 15    | 04 | 15    | 74 | 17    | 41 | 21    | 71 | 35    | 06 | 116   | 02 |
| 41              | $\phi$       | 32    | 47 | 33    | 69 | 38    | 31 | 51    | 87 | 125   | 40 |       |    |       |    |       |    |
| 42              | $\infty$     | 14    | 45 | 14    | 54 | 14    | 85 | 15    | 57 | 17    | 27 | 21    | 53 | 34    | 37 | 105   | 48 |
| 42              | $\phi$       | 33    | 05 | 34    | 35 | 39    | 34 | 54    | 19 | 141   | 73 |       |    |       |    |       |    |
| 43              | $\infty$     | 14    | 26 | 14    | 36 | 14    | 68 | 15    | 43 | 17    | 13 | 21    | 36 | 33    | 72 | 96    | 80 |
| 43              | $\phi$       | 33    | 72 | 35    | 12 | 40    | 53 | 56    | 88 | 164   | 26 |       |    |       |    |       |    |
| 44              | $\infty$     | 14    | 09 | 14    | 19 | 14    | 52 | 15    | 29 | 17    | 02 | 21    | 20 | 23    | 11 | 89    | 36 |
| 44              | $\phi$       | 34    | 50 | 36    | 01 | 41    | 86 | 59    | 97 | 195   | 62 |       |    |       |    |       |    |
| 45              | $\infty$     | 13    | 94 | 14    | 04 | 14    | 38 | 15    | 18 | 16    | 91 | 21    | 07 | 32    | 52 | 83    | 05 |
| 45              | $\phi$       | 35    | 39 | 37    | 02 | 43    | 39 | 63    | 62 | 242   | 86 |       |    |       |    |       |    |

Residuum partis 1. Tabulae VII. pro hyperbolicis  $\infty, \epsilon$   $\phi$   
plano horizontali inscribendis.

| Elevat.<br>poli | Horæ<br>P.M. | 12    |    | 1     |    | 2     |    | 3     |    | 4     |    | 5     |    | 6     |    | 7     |    |
|-----------------|--------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|                 | Horæ<br>A.M. | II    |    | IO    |    | 9     |    | 8     |    | 7     |    | 6     |    | 5     |    |       |    |
| Signa           | Tang.        | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    |
|                 |              | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  |
| 46              | $\infty$     | 13    | 80 | 13    | 90 | 14    | 26 | 15    | 06 | 16    | 82 | 20    | 92 | 31    | 97 | 77    | 53 |
| 46              | $\phi$       | 36    | 40 | 38    | 17 | 45    | 15 | 67    | 85 | 321   | 98 |       |    |       |    |       |    |
| 47              | $\infty$     | 13    | 67 | 13    | 78 | 14    | 14 | 14    | 97 | 16    | 74 | 20    | 81 | 31    | 45 | 72    | 75 |
| 47              | $\phi$       | 37    | 56 | 39    | 49 | 47    | 16 | 72    | 01 | 481   | 15 |       |    |       |    |       |    |
| 48              | $\infty$     | 13    | 56 | 13    | 67 | 14    | 05 | 14    | 89 | 16    | 67 | 20    | 68 | 30    | 95 | 68    | 48 |
| 48              | $\phi$       | 38    | 89 | 41    | 00 | 49    | 48 | 78    | 99 | 964   | 18 |       |    |       |    |       |    |
| 49              | $\infty$     | 13    | 46 | 13    | 58 | 13    | 96 | 14    | 82 | 16    | 61 | 20    | 58 | 30    | 47 | 64    | 74 |
| 49              | $\phi$       | 40    | 41 | 42    | 73 | 52    | 17 | 86    | 44 |       |    |       |    |       |    |       |    |
| 50              | $\infty$     | 13    | 38 | 13    | 49 | 13    | 89 | 14    | 76 | 16    | 57 | 20    | 49 | 30    | 02 | 61    | 38 |
| 50              | $\phi$       | 42    | 15 | 44    | 72 | 55    | 31 | 95    | 70 |       |    |       |    |       |    |       |    |
| 51              | $\infty$     | 13    | 30 | 13    | 42 | 13    | 83 | 14    | 72 | 16    | 53 | 20    | 41 | 29    | 59 | 58    | 41 |
| 51              | $\phi$       | 44    | 16 | 47    | 02 | 59    | 01 | 107   | 54 |       |    |       |    |       |    |       |    |
| 52              | $\infty$     | 13    | 24 | 13    | 37 | 13    | 78 | 14    | 69 | 16    | 59 | 20    | 32 | 29    | 19 | 55    | 67 |
| 52              | $\phi$       | 46    | 48 | 49    | 70 | 63    | 40 | 123   | 15 |       |    |       |    |       |    |       |    |
| 53              | $\infty$     | 13    | 19 | 13    | 32 | 13    | 75 | 14    | 66 | 16    | 48 | 20    | 25 | 28    | 80 | 53    | 21 |
| 53              | $\phi$       | 49    | 19 | 52    | 84 | 68    | 69 | 144   | 62 |       |    |       |    |       |    |       |    |
| 54              | $\infty$     | 13    | 16 | 13    | 29 | 13    | 72 | 14    | 65 | 16    | 47 | 20    | 20 | 28    | 43 | 51    | 00 |
| 54              | $\phi$       | 52    | 37 | 56    | 56 | 75    | 17 | 175   | 86 |       |    |       |    |       |    |       |    |
| 55              | $\infty$     | 13    | 13 | 13    | 27 | 13    | 71 | 14    | 65 | 16    | 47 | 20    | 14 | 28    | 08 | 48    | 93 |
| 55              | $\phi$       | 56    | 15 | 61    | 01 | 83    | 27 | 225   | 55 |       |    |       |    |       |    |       |    |
| 56              | $\infty$     | 13    | 12 | 13    | 25 | 13    | 71 | 14    | 66 | 16    | 49 | 20    | 09 | 27    | 74 | 47    | 05 |
| 56              | $\phi$       | 60    | 70 | 66    | 43 | 93    | 61 | 316   | 50 |       |    |       |    |       |    |       |    |

*Pars 2. Tabula VII. pro hyperbolis  $\Pi \Omega$ ,  $\Theta$   $\approx$   $\ddagger$  plano horizontali inscribendis.*

| Elevat. poli       | Horae P.M.   | 1     |    | 2     |    | 3     |    | 4     |    | 5     |    | 6     |    | 7     |    |          |
|--------------------|--------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|----------|
|                    | Horae A.M.   | 11    |    | 10    |    | 9     |    | 8     |    | 7     |    | 6     |    | 5     |    |          |
|                    | Signa        | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    |          |
|                    |              | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  |          |
| 35                 | $\Pi \Omega$ | 16    | 92 | 17    | 00 | 17    | 28 | 17    | 98 | 19    | 80 | 25    | 20 | 47    | 39 | Infinita |
| $\approx \ddagger$ |              | 28    | 67 | 29    | 36 | 31    | 91 | 38    | 59 | 61    | 90 | 11    | 81 |       |    |          |
| 36                 | $\Pi \Omega$ | 16    | 59 | 16    | 67 | 16    | 97 | 17    | 70 | 19    | 56 | 24    | 95 | 46    | 24 | 1525 43  |
| $\approx \ddagger$ |              | 28    | 70 | 29    | 43 | 32    | 13 | 39    | 25 | 64    | 50 |       |    |       |    |          |
| 37                 | $\Pi \Omega$ | 16    | 29 | 16    | 37 | 16    | 68 | 17    | 44 | 19    | 33 | 24    | 70 | 45    | 16 | 714 85   |
| $\approx \ddagger$ |              | 28    | 79 | 29    | 56 | 32    | 40 | 39    | 94 | 67    | 44 |       |    |       |    |          |
| 38                 | $\Pi \Omega$ | 16    | 01 | 16    | 10 | 16    | 42 | 17    | 21 | 19    | 13 | 24    | 47 | 44    | 15 | 467 99   |
| $\approx \ddagger$ |              | 28    | 93 | 29    | 74 | 32    | 74 | 40    | 78 | 70    | 89 |       |    |       |    |          |
| 39                 | $\Pi \Omega$ | 15    | 75 | 15    | 85 | 16    | 19 | 17    | 10 | 18    | 95 | 24    | 26 | 43    | 19 | 346 53   |
| $\approx \ddagger$ |              | 29    | 12 | 29    | 98 | 33    | 16 | 41    | 74 | 74    | 80 |       |    |       |    |          |
| 40                 | $\Pi \Omega$ | 15    | 52 | 15    | 61 | 15    | 97 | 16    | 80 | 18    | 79 | 24    | 07 | 42    | 28 | 274 45   |
| $\approx \ddagger$ |              | 29    | 38 | 30    | 28 | 33    | 66 | 42    | 86 | 79    | 10 |       |    |       |    |          |
| 41                 | $\Pi \Omega$ | 15    | 30 | 15    | 41 | 15    | 77 | 16    | 63 | 18    | 65 | 23    | 89 | 14    | 43 | 226 77   |
| $\approx \ddagger$ |              | 29    | 69 | 30    | 66 | 34    | 24 | 44    | 09 | 84    | 90 |       |    |       |    |          |
| 42                 | $\Pi \Omega$ | 15    | 11 | 15    | 21 | 15    | 59 | 16    | 48 | 18    | 52 | 23    | 73 | 40    | 62 | 193 06   |
| $\approx \ddagger$ |              | 30    | 07 | 31    | 09 | 34    | 91 | 45    | 51 | 91    | 18 |       |    |       |    |          |
| 43                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 93 | 15    | 04 | 15    | 43 | 16    | 34 | 18    | 41 | 23    | 57 | 39    | 85 | 168 17   |
| $\approx \ddagger$ |              | 30    | 52 | 31    | 61 | 35    | 68 | 47    | 13 | 98    | 90 |       |    |       |    |          |
| 44                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 77 | 14    | 88 | 15    | 29 | 16    | 22 | 18    | 30 | 23    | 42 | 39    | 13 | 148 96   |
| $\approx \ddagger$ |              | 31    | 04 | 32    | 20 | 36    | 56 | 48    | 96 | 108   | 21 |       |    |       |    |          |
| 45                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 62 | 14    | 74 | 15    | 16 | 16    | 12 | 18    | 22 | 23    | 31 | 38    | 44 | 133 78   |
| $\approx \ddagger$ |              | 31    | 64 | 32    | 88 | 37    | 56 | 51    | 07 | 119   | 74 |       |    |       |    |          |

*Residuum partiu 2. Tabula VII. pro hyperbolis  $\Pi \Omega$ ,  $\Theta$   $\approx$   $\ddagger$  plano horizontali inscribendis.*

| Elevat. poli       | Horae P.M.   | 1     |    | 2     |    | 3     |    | 4     |    | 5     |    | 6     |    | 5     |    |        |
|--------------------|--------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|--------|
|                    | Horae A.M.   | 11    |    | 10    |    | 9     |    | 8     |    | 7     |    | 6     |    | 7     |    |        |
|                    | Signa        | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    |        |
|                    |              | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  |        |
| 46                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 49 | 14    | 82 | 15    | 05 | 16    | 02 | 18    | 14 | 23    | 18 | 37    | 78 | 121 32 |
| $\approx \ddagger$ |              | 32    | 33 | 33    | 65 | 38    | 69 | 53    | 44 | 134   | 37 |       |    |       |    |        |
| 47                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 38 | 14    | 51 | 14    | 95 | 15    | 94 | 18    | 09 | 23    | 09 | 37    | 16 | 111 06 |
| $\approx \ddagger$ |              | 33    | 11 | 34    | 53 | 39    | 88 | 56    | 18 | 153   | 49 |       |    |       |    |        |
| 48                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 28 | 14    | 41 | 14    | 87 | 15    | 88 | 18    | 03 | 22    | 98 | 36    | 57 | 102 32 |
| $\approx \ddagger$ |              | 34    | 01 | 35    | 54 | 41    | 43 | 59    | 33 | 179   | 41 |       |    |       |    |        |
| 49                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 19 | 14    | 33 | 14    | 80 | 15    | 83 | 18    | 0  | 22    | 90 | 36    | 01 | 94 03  |
| $\approx \ddagger$ |              | 35    | 02 | 36    | 67 | 43    | 09 | 63    | 01 | 216   | 65 |       |    |       |    |        |
| 50                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 12 | 14    | 26 | 14    | 74 | 15    | 79 | 17    | 98 | 22    | 82 | 35    | 48 | 83 56  |
| $\approx \ddagger$ |              | 36    | 17 | 37    | 96 | 44    | 98 | 67    | 31 | 274   | 43 |       |    |       |    |        |
| 51                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 06 | 14    | 20 | 14    | 70 | 15    | 77 | 17    | 96 | 22    | 77 | 34    | 97 | 83 00  |
| $\approx \ddagger$ |              | 37    | 47 | 39    | 43 | 47    | 14 | 72    | 41 | 375   | 81 |       |    |       |    |        |
| 52                 | $\Pi \Omega$ | 14    | 01 | 14    | 16 | 14    | 67 | 15    | 75 | 17    | 96 | 22    | 70 | 34    | 49 | 78 06  |
| $\approx \ddagger$ |              | 38    | 96 | 41    | 10 | 49    | 63 | 78    | 52 | 600   | 54 |       |    |       |    |        |
| 53                 | $\Pi \Omega$ | 13    | 98 | 14    | 13 | 14    | 65 | 15    | 75 | 17    | 97 | 22    | 65 | 34    | 03 | 73 73  |
| $\approx \ddagger$ |              | 40    | 66 | 43    | 02 | 52    | 52 | 85    | 99 | 1517  | 27 |       |    |       |    |        |
| 54                 | $\Pi \Omega$ | 13    | 96 | 14    | 12 | 14    | 65 | 15    | 76 | 17    | 98 | 22    | 63 | 33    | 60 | 69 91  |
| $\approx \ddagger$ |              | 42    | 60 | 45    | 25 | 55    | 89 | 95    | 23 |       |    |       |    |       |    |        |
| 55                 | $\Pi \Omega$ | 13    | 95 | 14    | 11 | 14    | 65 | 15    | 78 | 18    | 01 | 22    | 58 | 33    | 18 | 66 40  |
| $\approx \ddagger$ |              | 44    | 85 | 47    | 78 | 59    | 87 | 107   | 01 |       |    |       |    |       |    |        |
| 56                 | $\Pi \Omega$ | 13    | 96 | 14    | 12 | 14    | 67 | 15    | 82 | 18    | 05 | 22    | 56 | 32    | 79 | 63 27  |
| $\approx \ddagger$ |              | 47    | 46 | 50    | 76 | 64    | 60 | 122   | 46 |       |    |       |    |       |    |        |

Pars 3. Tabulæ VII. pro hyperbolis & m, ⊕ X m plano horizontali inscribendis.

| Elevat. poli | Horæ P.M. | 12    |    | 11    |    | 10    |    | 9     |    | 8     |    | 7     |     | 6          |    | 5              |   | 4     |   | 3     |   | 2     |   | 1     |   |
|--------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|------------|----|----------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
|              | Horæ A.M. | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |     | Tang.      |    | Tang.          |   | Tang. |   | Tang. |   | Tang. |   | Tang. |   |
|              | Signa     | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M   | P          | M  | P              | M | P     | M | P     | M | P     | M | P     | M |
| 35           | ♁ m       | 18    | 63 | 18    | 76 | 19    | 25 | 20    | 42 | 23    | 35 | 22    | 44  | 85         | 96 | Infinita & sic |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 82 | 25    | 26 | 26    | 83 | 30    | 72 | 41    | 97 | 111   | 86  | de cæteris |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 36           | ♁ m       | 18    | 32 | 18    | 46 | 18    | 97 | 20    | 18 | 23    | 16 | 32    | 29  | 83         | 62 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 68 | 25    | 13 | 26    | 78 | 30    | 84 | 42    | 61 | 118   | 21  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 37           | ♁ m       | 18    | 04 | 18    | 19 | 18    | 71 | 19    | 96 | 23    | 00 | 32    | 13  | 81         | 67 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 57 | 25    | 05 | 26    | 77 | 31    | 00 | 43    | 34 | 125   | 58  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 38           | ♁ m       | 17    | 79 | 17    | 94 | 18    | 41 | 19    | 76 | 22    | 86 | 32    | 00  | 79         | 84 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 51 | 25    | 01 | 26    | 79 | 31    | 22 | 44    | 18 | 133   | 78  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 39           | ♁ m       | 17    | 55 | 17    | 72 | 18    | 28 | 19    | 59 | 22    | 75 | 31    | 89  | 78         | 10 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 48 | 25    | 00 | 26    | 86 | 31    | 49 | 45    | 10 | 143   | 56  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 40           | ♁ m       | 17    | 35 | 17    | 50 | 18    | 10 | 19    | 45 | 22    | 66 | 31    | 80  | 76         | 47 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 49 | 25    | 02 | 26    | 98 | 31    | 83 | 46    | 14 | 154   | 87  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 41           | ♁ m       | 17    | 16 | 17    | 33 | 17    | 93 | 19    | 32 | 22    | 59 | 31    | 73  | 74         | 92 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 54 | 25    | 10 | 27    | 14 | 32    | 21 | 47    | 32 | 168   | 57  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 42           | ♁ m       | 17    | 00 | 17    | 17 | 17    | 79 | 19    | 22 | 22    | 53 | 31    | 68  | 73         | 46 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 62 | 25    | 21 | 27    | 34 | 32    | 65 | 48    | 57 | 185   | 31  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 43           | ♁ m       | 16    | 85 | 17    | 03 | 17    | 68 | 19    | 14 | 22    | 49 | 31    | 64  | 72         | 07 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 74 | 25    | 36 | 27    | 59 | 33    | 17 | 50    | 02 | 205   | 29  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 44           | ♁ m       | 16    | 73 | 16    | 91 | 17    | 58 | 19    | 07 | 22    | 47 | 31    | 160 | 70         | 76 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 24    | 91 | 25    | 56 | 27    | 89 | 33    | 74 | 51    | 59 | 230   | 68  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| 45           | ♁ m       | 16    | 62 | 16    | 81 | 17    | 49 | 19    | 03 | 22    | 47 | 31    | 61  | 69         | 51 |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|              | X m       | 25    | 11 | 25    | 79 | 28    | 23 | 34    | 37 | 53    | 33 | 263   | 76  |            |    |                |   |       |   |       |   |       |   |       |   |

Ref-

Residuum partis 3. Tabulæ VII. pro hyperbolis & m, ⊕ X m plano horizontali inscribendis.

| Elevat. poli | Horæ P.M. | 12    |    | 11    |    | 10    |    | 9     |    | 8     |    | 7     |    | 6     |    | 5     |     | 4     |   | 3     |   | 2     |   | 1     |   |  |  |
|--------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|--|--|
|              | Horæ A.M. | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |    | Tang. |     | Tang. |   | Tang. |   | Tang. |   | Tang. |   |  |  |
|              | Signa     | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M  | P     | M   | P     | M | P     | M | P     | M | P     | M |  |  |
| 46           | ♁ m       | 16    | 53 | 16    | 73 | 17    | 43 | 18    | 99 | 22    | 49 | 31    | 66 | 68    | 33 |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 25    | 35 | 26    | 07 | 28    | 63 | 35    | 11 | 55    | 27 | 308   | 03 |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 47           | ♁ m       | 16    | 46 | 16    | 66 | 17    | 29 | 18    | 98 | 22    | 53 | 31    | 63 | 67    | 21 |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 25    | 64 | 26    | 39 | 29    | 00 | 35    | 92 | 57    | 43 | 370   | 96 |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 48           | ♁ m       | 16    | 40 | 16    | 62 | 17    | 36 | 18    | 99 | 22    | 57 | 31    | 66 | 66    | 14 |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 25    | 98 | 26    | 77 | 29    | 60 | 36    | 82 | 59    | 82 | 466   | 42 |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 49           | ♁ m       | 16    | 36 | 16    | 58 | 17    | 35 | 19    | 01 | 22    | 64 | 31    | 70 | 65    | 13 |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 26    | 37 | 27    | 20 | 30    | 19 | 37    | 82 | 62    | 51 | 629   | 79 |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 50           | ♁ m       | 16    | 39 | 16    | 57 | 17    | 31 | 19    | 05 | 22    | 72 | 31    | 75 | 64    | 16 |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 26    | 81 | 27    | 68 | 30    | 84 | 38    | 93 | 65    | 54 | 971   | 43 |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 51           | ♁ m       | 16    | 34 | 16    | 57 | 17    | 37 | 19    | 11 | 22    | 81 | 31    | 84 | 63    | 25 |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 27    | 31 | 28    | 23 | 31    | 46 | 40    | 16 | 68    | 93 | 2134  | 76 |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 52           | ♁ m       | 16    | 35 | 19    | 59 | 17    | 41 | 19    | 18 | 22    | 93 | 31    | 91 | 62    | 37 | 1065  | 225 |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 27    | 87 | 28    | 85 | 32    | 38 | 41    | 54 | 72    | 81 |       |    |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 53           | ♁ m       | 16    | 38 | 16    | 63 | 17    | 47 | 19    | 27 | 23    | 06 | 32    | 01 | 61    | 54 | 151   | 982 |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 28    | 50 | 29    | 54 | 33    | 28 | 43    | 07 | 77    | 23 |       |    |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 54           | ♁ m       | 16    | 43 | 16    | 68 | 17    | 64 | 19    | 37 | 23    | 20 | 32    | 14 | 60    | 75 | 817   | 93  |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 29    | 21 | 30    | 31 | 34    | 30 | 44    | 66 | 82    | 32 |       |    |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 55           | ♁ m       | 16    | 49 | 16    | 75 | 17    | 63 | 18    | 30 | 23    | 36 | 32    | 25 | 60    | 00 | 558   | 76  |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 30    | 00 | 31    | 17 | 35    | 43 | 46    | 70 | 88    | 33 |       |    |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
| 56           | ♁ m       | 16    | 57 | 16    | 84 | 17    | 74 | 19    | 64 | 23    | 54 | 32    | 38 | 59    | 29 | 424   | 28  |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |
|              | X m       | 30    | 89 | 32    | 14 | 36    | 60 | 48    | 85 | 59    | 21 |       |    |       |    |       |     |       |   |       |   |       |   |       |   |  |  |

Proble-

## Problema XI.

*Tabulam pro inscribendis Azymuthis, seu verticalibus in plano verticali condere.*

**S**i tangentes singulorum graduum quadrantis talium partium, qualium stylus est 10. vel 100. in tabulas redegeris, habebis quæsitum.

## Problema XII.

*Calculus Tabularum pro horoscopijs Signorum Ascendentium.*

**T**abulæ horoscopia signorum declarantia nihil aliud sunt, quàm tabulæ ostēdentes quota hora quotlibet signum Zodiaci supra horizontem eleuetur, aut sub eundem deprimatur, aut in medio vel imo Cœli situm sit. Pro huiusmodi igitur notitia in Gnomonicæ vsu, tabulas hac arte calculabis.

## Regula I.

**S**ole in 4. punctis cardinalibus  $\Upsilon$   $\ominus$   $\wp$   $\text{♁}$  existente, inquire quota hora ante vel post meridiem initia 12. signorum orientur hac industria.

Queritur verbi gratia Sole existente in  $\Upsilon$  cum arcus semidiurnus 6. horarum, est, quota hora principium  $\text{♁}$  Romæ supra horizontem emergat. Quære ascensionem obliquam Solis in  $\text{♁}$  constituti, id est arcum inter principium  $\Upsilon$ , & primum gradum  $\text{♁}$ , quem ex tabulis deprehendes grad. 66. min. 57. hosce gradus in horas resolutio, & inuenies horam 4. min. 28. quæ subtractæ ex horis 6. hęc est ex arcu semidiurno  $\Upsilon$ , reliquunt 1. hor. 32. min. ante meridiem. Hac igitur hora principium  $\text{♁}$  ascendit supra horizontem, Sole in  $\Upsilon$  existente, quæ respondet horæ 10. & 28. min. post mediam noctem. Iterum Sole in  $\text{♁}$  principio constituto queritur hora, qua principium  $\text{♁}$  supra horizontem emergat; computa ascensionem obliquam arcus inter principium  $\text{♁}$ , &  $\text{♁}$  intercepti, qui est 190. gr. 12. min. hi in horas conuersi dant 12. horas min. 41. a quibus si arcum semidiurnum horarum 7. min. 32. subtrahas, relinquetur hora 5. min. 9. post meridiem hora scilicet qua initium  $\text{♁}$  supra horizontem tunc emergit; & hæc regula in omnibus reliquis signis tibi obseruanda est. Si enim ascensio obliqua dum arcus semidiurnus minor est, in horas redacta, ab arcu semidiurno dematur, relinquentur horæ quæ superant vsque ad meridiem, dum signum illud cuius obliqua ascensio sumpta est oritur. Si verò arcus semidiurnus à dictis horis, si ascensio obliqua arcum semidiurnum superat, dematur; erunt reliquæ horæ post meridiem elapsæ, cum initium illius signi, cuius ascensio obliqua assumpta est, exoritur, vt in positis exemplis patet. Tabulas peculiare hic non posuimus, cum vnusquisque eas facillime proprio Marte secundum datam regulam computare possit.

*Paradigmata  
computus.*

Regula

## Regula II.

*De calculandis tabulis mediationum signorum, declinationumque eorundem.*

**H**æc Regula nihil aliud præcipit, nisi inuenire puncta Ecclipticæ in circulo meridiano existentia, hoc est mediationes Cœli, cum principia signorum. 12. oriuntur, eorundemque punctorum declinationes. Vt dicta puncta habeas ita procedito: Ex ascensione obliqua initij cuiuslibet signi auferatur quadrans circuli adiecto prius integro circulo ad ascensionem obliquam, si subtractio fieri non possit, numerus enim reliquus erit ascensio recta puncti ecclipticæ, quod tunc in meridiano reperitur, quodque culminans siue medians dicunt astrologi. Ex tabula igitur ascensionum rectarum punctum illud ecclipticæ innotescet, cuius oppositum punctum in eodem meridiano existet infra horizontem, quod inum Cœli, siue angulum, seu mediam noctis cuspidem vocant astronomi. Verum regulam paradigmate declaremus.

## Paradigma.

**S**i igitur velis scire, quod punctum in eccliptica mediet, dum  $\text{♁}$  oritur, accipe obliquam ascensionem principij  $\text{♁}$  grad. videlicet 141. minut. 33. ex qua si dematur quadrans, remanebunt grad. 51. m. 33. pro ascensione recta, cui in tabula ascensionum rectarum respondet grad. 23. min. 57. & quæsitum punctum ecclipticæ medians, cuius oppositum punctum infra horizontale grad. 23. min. 57. m. Iterum obliqua ascensio  $\text{♁}$  est grad. 66. min. 57. cui si addatur integer circulus 360. sunt grad. 426. min. 57. à quibus dempti 90. relinquant 336. grad. min. 57. ascensionem rectam, cui in tabula ascensionum rectarum respondet 5. grad. min. 6. X. quæsitum punctum ecclipticæ medians initio  $\text{♁}$  supra horizontem emergente. Hac industria computabis tabulam mediationum eleuationi tuæ competentem, cuius exemplar vide in Probl. XX. Lib. V.

## Regula III.

*Punctum Ecclipticæ in circulo horæ sextæ inuenire, & in tabulam redigere.*

**C**um ascensio obliqua principij cuiuslibet signi, sit ascensio recta illius puncti Ecclipticæ, quo eodem tempore in circulo horæ sextæ existit ante meridiem: Ita ex tabula ascensionum rectarum tabulas distorum punctorum in linea horæ sextæ reperies. Sole verbi gratia in principio  $\text{♁}$  constituto, cum eius ascensio obliqua sit 66. grad. 57. min. erit eadem ascensio recta puncti Ecclipticæ tunc in circulo horæ sextæ constituti prorsus eadem, totidemque graduum; cui ascensioni in tabula ascensionum rectarum correspondent grad. 8. min. 41. II (habita semper ratione partis proportionalis, si numerus præcise in tabulis non reperiretur.) Cuius oppositum punctum erit 8. grad. min. 41.  $\text{♁}$ . Non secus in alijs procedendum.

PRO-

# PROGYMNASMA II. GEOMETRICVM.

De conicis sectionibus in plana Sciatherica  
proijciendis.


## §. I.

*Parabolarum descriptiones.*

### Pragmatia I.

*Parabolam, hyperbolam, vel ellipsem geometricè delineare.*

**I**T conus rectangulus ABC, in quo sectio parabolæ DE; hyperbolæ DX; ellipsis DA. Ducatur latus primarium DF basi parallelum, deinde axis XP diuidatur in aliquot partes æquales, & per hæc ducantur parallelæ ED, HI, KL, MM; atque ex punctis, vbi axem secant ducantur semicirculi FKD, HPI, KIL, MIN, ACB; quorum diametri sint parallelæ dictæ. In quarum singulis, semiordinatas ita determinabis; pro parabola DE, vide vbi dictas parallelas secat DE, sectio parabolæ: ex illis punctis duces in circumferentias singularum normales EC, PO, KO, BI,



BG; Pro hyperbola DX, seruiet DN, linea: pro ellipsi DA: vbi enim illæ interfecant parallelas, ex ijs in circumferentias normales ductæ dabunt semiordinatas. His

His ita reñe peractis, si quispiam parabolam describere cupiat, accipiat sectioni DE, seorsim æqualem iisdem literis DE signatam, quæ & in totidem partes æquales diuidet, in quot ZP, diuisa erat. Deinde semiordinatas FG, HI, KL, MN, EN, normales, videlicet lineas ex communi intersectionis puncto sectionis, & parallelarum in arcus sibi correspondentes ductas trāsferet in axis DE seorsim positi semiordinatas vtrinque; per harū enim extrema linea curua ducta dabit parabolā quæsītā.

Ita, si semiordinatæ ex communi intersectionis puncto sectionis DX hyperbolæ, & parallelarum puncto in semiperipheriam ductæ seorsim in DX, lineam æqualem DX sectioni, & in totidem partes diuisam vtrinque transferantur, earumque extrema curua iungatur, dabunt illæ hyperbolam quæsītā.

Si denique semiordinatæ in sectione DA ellipsis, in DA lineā seorsim positæ, & in totidem partes, in quot axis DA, diuisus est, discretam vtrinque transferas, dabunt extrema semiordinatarum curua coniuncta ellipsem quæsītā, quarum omnium demonstrationes dependent ex 5. 7. 8. propof.

### *Centra reflexionis reperire.*

**I**N parabola medium DK, sectionis DE, erit centrum reflexionis. In hyperbola latus AC prolongatum vnā cum sectione DX determinante in y puncto sectionis YD, latus transfuersum, siue diametrum exteriorem; quæ diuisa bifariam in W, & hinc ad CY parallela ducetur WZ, quæ translata in sectionem hyperbolæ DX, ex W in O, ibidem dabit punctum centri reflexionis quæsītum. WD verò dabit semiordinatam centri in figura separata; vti demonstratum est in propof. 7.

In ellipsi pari ratione iuxta posita 3. propof. 6. dicta centra habebis, si medietatem maioris diametri transferas ex vltimis terminis, & minoris diametri vtrinque in axim maiorem AD, videlicet ex T, in V, & S; hæc enim duo puncta dabunt centra reflexionis in axe maiore DA, videlicet V; & S quæsītā.


## §. II.

*Parabolarum variæ descriptiones.*

### Pragmatia II.

*Data distantia à vertice ad centrum, siue lateris recti parabolam describere.*

**S**it distantia à vertice ad centrum linea data Z: supra quam quadruplicatam veluti diametrum AB, describatur semicirculus, eritq. semidiameter iuxta prop. 7.






semiordinata centri diuisa in duas partes, quarum vtramque iterum in quatuor partes, vel quotuis alias pares diuides; nos hic eam in octo partes diuisimus. Hoc peracto ad B, extremum diametri AB normalis erigatur BE. Deinde ex singulis punctis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. intervallo 1A. 2A. 3A. &c. arcus describantur, qui vbinormalē BE fecerint; diligenter nota; spatia enim normalis BG, BH, BI, BK, BL, &c. in lineam QX æqualem diametro AB seorsim ductam, atque in totidem partes, in quot BC semidiametrum diuisimus, videlicet octo partes lectam, vtrinque transferes hac industria, vt singulæ ex punctis correspondentibus ad axim DX normales semiordinatæ, & inter se parallelæ sint; per harum enim extrema ambitus ductus dabit parabolam; cuius vertex Q, centrum reflexionis S.

**Pragmatia III.**

*Dato latere recto parabolam describere.*

**S**it latus rectum parabolæ iuxta propof. 7. KE: sumatur in plano quopiam linea quæcumque EH, in qua sumantur quotcumque partes inter se æquales (quod autem minores hæ partes fuerint, tantò parabola euadet exactior.)



In hac autem notentur puncta imparia, ita vt EA sit 1. AB, 3. BC. 5. CH. 7. & sic deinceps, per quæ, vt in præcedente factum est, ducantur normales. Deinde inter latus rectum KE, & rectam EA, inuenta media proportionalis dabit semiordinatam AD vtrinque.

Deinde ex B vtrinque abscindatur BF, dupla ipsius AD; & ex C, vtrinque CG, tripla eiusdem AD, & ex H, ipsa HI, quadrupla, & sic deinceps secundum naturalem numerorum seriem. Nam per extrema harum semiordinatarum puncta descripta curua linea dabit parabolam quæ sitam: quæ omnia demonstrata reperies in propof. 1. 2. 3. & fusè demonstrat Apollonius lib. 1. propof. 11.

**Pragmatia IV.**


*Parabolam alia ratione describere.*

**P**rimò sit conus rectus ABC, in quo sectio parabolæ quomòdòcumque incidens sit DP, producta in S.

Secundò, diuidatur DP, axis parabolæ in quotlibet æquales partes, vti & latus eius DA, & per puncta diuisionum ducantur parallelæ ad basim AB, cuiusmodi sunt DQ, MR, &c. Pari ratione ducantur per puncta diuisionum in axe DP, signata normales occulte indeterminatæ magnitudinis, cuiusmodi sunt WV, YX, &c.

Tertiò, intercapedine IM, vel IR, circulo ducto ex centro I, medio puncto lineæ MR, ad eam per E, commune intersectionis punctum DP, & MR, normalis ducatur HK, quæ equabitur ordinatim applicatæ WV.

Quar-




Quarto, Deinde posito circulo in singulis punctis, EFG, &c. axis DP, ex C, vertice conu ad productum axem parabolæ DP, arcus ducantur, quos similibus literis signabis.

Quintò, Intercepta spatia inter C, & puncta diuisionum MNY, &c. lateris DA, ex consequentibus punctis productæ lineæ PDS, arcus ducantur, quæ secabunt ordinatim applicatas in punctis, per quæ parabola ducenda. Vide demonstrationem eius in propof. 1. & 2. & Apollon. lib. 1. propof. 11.

**Pragmatia V.**

*Dato centro reflexionis, & cuiusvis semiordinatæ, parabolam aliter describere.*

**P**rimò, Sit data semiordinata CD, centrum reflexionis B, harum ope, & vertex parabolæ, & puncta parabolæ reperiuntur, vt sequitur. Coniungantur puncta CB,



y

recta, suntque iuxta propof. 10. omnes lineæ ex B, cetro ad ambitum parabolæ, & hinc ad semiordinatam normaliter ductæ æquales lineæ BC. Ducto igitur arcu DR, fiat BR, æqualis BD, & RC, bifariâ diuisa in E, dabit ER, vel CE, ex B centro trās-lata in A, verticem parabolæ; reliqua puncta ita inuenies; linea EB, in quotcumque partes diuidatur, quæ sint LMNOPQ.

Secundò, Deinde spatia inter C, & L, CM, CN, CO, CP, intercepta posito vno circini pede in B, altero arcus occulti describantur. Iterum circinus intercepto spacio BL, in arcu F, vno pede posito hucusque in tantum moueatur, donec altero semiordinatam CD, tetigerit: ex hoc enim puncto H, alius arcus ducetur, qui vbi priorem secuerit, ibi erit punctum, per quod ambitus parabolæ curret. Porro intercepto spacio BM, circinus in arcu BI, in tantum promoueatur, donec alterum crus basim CD tetigerit, & habebis in arcu BI, secundum punctum parabolæ. Tertium punctum T, ita inuenies; intercepto spacio BN, circinus in arcu BT, huc illuc dicurra, donec altero crure CD tetigerit, & in arcu BT, crus quiescens dabit tertium punctum quæsitum; non secus de cæteris punctis inuestigandis operabere, vt in exemplo patet. Demonstrationem dedimus propof. 10.


**Pragmatia VI.**

*Dato vertice parabolæ, & centro reflexionis, parabolam omnium facillima methodo describere.*

**P**rimò, Sit A vertex, C centrum parabolæ; quibus ex præcedenti praxi assignatis, parabolam cuiusvis magnitudinis describes hac industria. Diuidatur AC, in

Quar- 2 quot-

quotuis partes æquales, verbi gratia sex, & si maiorem desideres ultra C, in alias, & alias partes æqualium partium 12, verbi gratia diuisione expedias, ita vt AC, tanta sit, quanta CB; & per puncta diuisionum ducantur lineæ occultæ parallelæ ad AB, normales, quæ referent ordinatim applicatas.




Secundò, posito circini pede in C centro, altero pede intercapedine CA, in semiordinata CM, arcu ducto secetur L, quæ æquabitur lineæ CA, in totidem partes diuisa, productaque CL, in D, ita vt LD, æquatur toti AB, axi parabolæ; quo facto diuidatur LD, in 12. partes, æquales 12. partibus axis AB, quæ signentur numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. &c. Deinde posito circini crure in C, altero per singula pñcta diuisionum lineæ LD, arcus occulti ducantur, ab L, quidem vsque ad M sursum; ab L vero in D deorsum; vbi enim hi arcus semiordinatas secant, per illa puncta parabola ducetur, quæ puncta ex axe AB, in oppositas semiordinatas traducta, dabunt puncta, per quæ in opposita parte ducetur altera parabolæ pars. Atque hæc est omnium mea quidem opinione, facillima regula parabolæ geometricè describendarum.

Pragmatia VII.

Parabolam ope fili mechanicè describere.

Præparetur tabula planissima XY, cui ad angulos rectos applicetur norma DE, ita vt norma circa E, tabulæ latus EG, radat *oēs rās opbas*, & promotæ axi parabolæ semper æquidistet. Descripturus igitur parabolam huius instrumenti ope, affigatur centro L, filum subtilissimum: deinde posita norma super LB, filum graphio





D, in L circumducatur, quod & in E, radice normæ deinde firmetur, ita vt filum longitudinem habeat LB, duplicatam. Cùm enim iuxta propof. 10. omnes lineæ à cetro ad ambitum parabolæ vnâ cum ijs; quæ hinc in semiordinatam cadût, æquales sunt, describet graphium D, motu normæ necessariò parabolam FBG, vt in propof. 10. demonstrauimus.

Hanc

Data distantia centri à vertice, & semiordinata hanc eandem geometricè describere.

Primo. In linea quapiam AQ, sit distantia centri à vertice AB, semiordinata BC; distantia à vertice dupla sit BC, quibus datis quæretur tertia proportionalis quæ erit BQ. Hoc peracto diuidatur AB, in quotlibet partes æquales, videlicet 6.



Deinde spacia NQ, MQ, IQ, KQ, IQ, AQ, bifariam diuidantur: si enim ex his medijs pñctis veluti centris semicirculos duxeris, secabunt illæ BC in punctis, quæ terminabunt semiordinatas. Traducta igitur AB, distantia centri à vertice in separata linea AB, quæ in totidem partes, in quot AB, videlicet sex diuidatur; & per puncta NMLKI parallelæ occultæ agantur: si enim transferas spacia BD, BE, BF, BG, BH, semiordinate BC, ex punctis NMLKIB, lineæ AB, seorsim descriptæ, in lineas parallelas DN, ME, LE, KG, IP, transibit per extrema earum parabola quæ sita. Verum hæc ita facilia sunt, vt vel sola inspectione figuræ innotescant.


Pragmatia VIII.

Data axe parabolæ, & data basi parabolam describere.

Primo. Diuidatur axis AD, in quotlibet partes æquales, hic cum in 11. diuisimus; ducanturque per puncta diuisionum ad basim, BC, parallelæ occultæ.


Secundò. Deinde duc in plano quopiam lineam WX: determina in hac lineæ parte, aliâ vtcunque, quæ sit WI, & ex W normalem WY, iunganturque pñcta Yi, recta Yi, eruntque quadrata WY, & WI, æqualia quadrato Yi, par 47. 1. Euclid.

hanc Yi, ex W puncto in 2. punctû transferes; deinde Y2, ex W in 3. & ex W puncto



80


cto Y<sub>3</sub>. in W 4. & sic vsque ad 12. progrediere iuxta seriem numerorum in axi AD contentam.



Tertio, Trahe ex W, arcum XZ, & interceptum spacium BD, vel BC, in arcum paulo ante ductum transferas, tractaque linea WZ, ex singulis punctis lineæ WX, arcus ducantur, quorum subtensæ semiordinatas in axi AD assignabunt. Ita spacium inter 1. & 1. dabit semi-

ordinatam HE; inter 2. & 2. semiordinatam EL, & sic de cæteris, per quarum extrema curua linea ducta dabit parabolam quæsitam. Quæ omnia demonstrata in propof. 1. reperies. Parabolam igitur descripsimus, quod erat faciendum.

Porrò data distantia centri à vertice, hanc parabolam aliter describes. Diuidatur AC, data distantia in numerum quadratum, verbi gratia 9. id est, in 9. æquales partes, & quarum punctis parallelæ ad AB, semiordinatam scilicet ad distantiam AC, duplam ducantur, quam & in-



totidem partes, scilicet 9. diuides, non tamen æquales, vt in AC, factum vides, sed proportionales quadraticas hac in dustria. Diuidatur primò tota AB, in tres partes æquales, & AE, vni tertiæ reddatur æqualis AD, in-

producta axe, coniunctisque in lineam punctis DE, transfer hanc interceptã ex A, in punctum 2. & iterum D2. ex A, in 3. & sic consequenter vsque 9. vt in præcedenti quoque factum est, dabunturq. in semiordinata AB, puncta, ad quæ normales ductæ, vbi parallelas simili numero signatas secuerint, per illa parabolam describendam scias. Demonstratio pendet ex propof. 1. Plures parabolæ describendarum rationes vide in Magia Catoptrica.


§. II.

*Hyperbolarum descriptiones.*

Pragmatia IX.

SVper lineam quàmuis rectam, verbi gratia BD, erigatur ad B, normalis BG. Deinde accipiat pro libitu semidiametra BA, ex cuius medio puncto C. semicirculus ducatur.

A puncto A, incipiendo reliquam lineam AD, in 9. vel quotlibet alias partes æquales diuides; per hæc enim puncta diuisionum ex C, arcus ducantur, quorum interfectionem cum linea BG, diligenter nota.




Seorsim in charta trahatur linea HI, æqualis BG, quæ erit axis parabola, quam etiam in 9. æquales partes, diuides iuxta diuisionem lineæ AD, ex quibus singulis parallelas ad basim occultas duces; si enim in has transferas spacia in BG comprehensa, ita vt BE, det MN, & BF, semiordinatam OP, & sic de cæteris, transibit per extrema puncta semiordinatarum hyperbola.

Pragmatia X.

*Datis centris hyperbolarum oppositarum, & vertice, hyperbolam describere.*


Sit A vertex hyperbolæ, B centrum reflexionis, & C centrum oppositæ hyperbolæ per Porisma 1. propof. 10. Cùm igitur ibi demonstratum sit, quod si ad BA, & CA, æquales partes addantur, & æquales distantie ex C, & B, in vnum ducantur, puncta coniunctionis in hyperbolæ ambitum cadant; producatut itaque AB in F, & AF, citima linea, in quolibet partes, verbi gratia octo diuidatur: pari ratione transfusa linea AS, æqualis AF, in octo partes diuidatur; horum punctorum ope hyperbolam ita describes. Posito iterum cruce circini in C, altero intercipias punctum 1, versus B citimum ducantur vtrinque occuli arcus DD; Posito iterum circini cruce in centro B, foci puncto, altero ex primo puncto transfusæ lineæ AS, arcus versus D, ducantur vtrinque; vbi enim priores cum hisce se intersecuerint, ibi erunt puncta hyperbolæ. Posito deinde circini cruce in C, altero ex puncto 2. lineæ AF, arcus vtrinque ducantur vt prius, & deinde posito circini pede in B, altero ex 2. puncto AS: arcus vtrinque ducantur; vbi enim hi arcus priores secuerint, erunt puncta hyperbolæ. Non secus in alijs punctis hyperbolæ inuestigandis procedes, alterna circini in opposita centra positione; atque ex oppositis numerorum punctis in arcuum descriptione procedes, donec omnia puncta repereris, per hæc enim curua ducta dabit hyperbolam quæsitam, cuius demonstrationem dabit Porisma 1. propof. 10.



Pragmatia XI.

Dato centro reflexionis, & vertice, hyperbolam describere.

Sit vertex A, centrum reflexionis C, axis AB, in 12. partes æquales, vel quotlibet alias diuisus, ex quibus diuisionum punctis parallelæ ducantur, in quibus semiordinatæ determinabuntur. Semiordinata centri CM, cuiuslibet magnitudinis assumpta producat in D, utcumque. Deinde ab L, incipiendo, quæ tantum a




C distabit, quantum C à vertice A) LD, lineam in duodecim partes æquales partibus axis AB, diuides; per hæc enim puncta diuisionis ex C centro arcus ab L, vsque ad M supra, & hinc vsque ad D infra lineam ducti, secabunt parallelas in punctis, per quæ curva ducta dabit hyperbolam.

Pragmatia XII.

Hyperbolam ope fili describere.

Sit centrum reflexionis A, oppositum centrum B, C vertex: his datis filo hyperbola hac industria ducetur.



In ambobus centris A, & B, infingantur acus subtiles, quibus singulis filum alligetur: habeatur deinde aliud graphium, quod inferius foramen habeat ad instar acus, vt in D apparet: per hoc foramen vtrumque filum ducatur.

Moueatur deinde graphium D ex C vtrinque, ita vt ad motum semper laxentur duo fila, & hoc motu describetur hyperbola quesita. Quæ omnia pendent à Porismate I. propof. 10.


§. IV.

Descriptiones Ellipseon.

Pragmatia XIII.

Dato maiori diametro, & minori semidiametro ellipsin describere.

Sit diametret maior AB, semidiameter minor CE, quibus datis inuenietur quotuis puncta in ambitu Ellipseos; cum enim in porism. 3. propof. 6. demonstra-



tum sit, semidiametrum maiorem AB, centra ellipsis assignare, si ex communi intersectionis puncto ambitus, & diametri minoris semidiametrum maiorem AE, vel EB, transferas vtrinque in diametrum maiorem, videlicet in FG; pari ratione cum ex centris in quoduis ambitus punctum duæ lineæ ductæ æquales sint maiori diametro, ita ellipsin facile describemus. Sint in diametro AB, data centra FG, quæ vt diximus, habebuntur, si ex puncto C in diametrum maiorem semidiametrum AE, vel EB transfuleris. Ab F, autem versus E assumentur quotlibet puncta HIKLM. Deinde interuallo AH, ex F, & G, centris ducantur vtrinque duo arcus occulti: deinde intercapedine BH, ex iisdem F, & G, centris describantur vtrinque duo alij arcus, qui vbi priores secabunt, videlicet in N, inde ellipsis ducenda est. Deinde intercepto spacio AI, ex F, & G, centris fiant arcus vtrinque; deinde spacio BI intercepto ex G, & F, fiant vtrinque alij arcus, qui vbi priores secuerint, videlicet in O, ibi erunt puncta ellipsis. Intercepto deinde spacio AK, ex centris FG, vtrinque ducantur arcus: deinde intercepto spacio BK, ex centris FG, alij arcus fiant, qui vbi priores secuerint, scilicet in P, ibi erunt puncta ellipsis. Non secus procedes in alijs punctis ellipsis inuestigandis. Vbi nota, quod quanto plura puncta in AE, assignabuntur, tanto ellipsis euasura sit perfectior: quæ omnia demonstrantur in porism. 3. propof. 6.

Corollarium.

Hinc patet, qua ratione duobus fili Ellipsis describatur. Sint iterum in ellipsi data diametri Ellipseos AB, maior, & CX minor, erunt iuxta precedentem loci, siue puncta ex comparatione facta FG. Si igitur duo fila focis F, & G, ita alligaueris, Rr vt


vt ista in C, coniungatur, describet intra fila graphium circumactum ellipsin ACBX, desideratam, sed de his in sequentibus fusius.

**Pragmatia XIV.**

*Dato vertice A, centro C, & semiordinata centri CM, Ellipsin describere.*

**D**ato ex C centro per A arcum in E, erit LC æqualis CA: hæc CA linea diuidatur in aliquot æquales partes, scilicet: deinde hinc eadem diuisio in CB, continetur vsque ad i. ducanturq. ad AB normales, inter se parallelæ. Iterum prolongetur semiordinata CM in D, ita vt CD, æqualis sit CB. quo facto ab L incipiendo, diuidatur LD, in totidem partes, & eodem ordine, quo AB, diuisimus: deinde ex C per singula puncta ducantur lineæ, seu arcus occulti, qui vbi parallelas correspondentes secuerint, per illa puncta ellipsis describetur. Demonstratio dependet à porism. 2. prop. 10.


Nota Lector numeros lineæ AB, errore scilicet primis spatium transiisse; in primo igitur spacio ab A, incipiam ducant.



**Pragmatia XV.**

*Dato maiore diametro Ellipsis AB, vel minori CD, Ellipsin describere.*

**D**ata linea AB, & OD in medijs punctis ad angulos rectos coniungantur: hoc peracto, seorsim fiat FE æqualis CD, minori diametro, è cuius medio veluti centro ducatur semicirculus FHE. Deinde diuidatur GE, in quotlibet æquales partes, videlicet 6. in totidem diuides semidiametrum maiorem, per quarum puncta parallelas duces occultas. Ex punctis autem diuisionis lineæ GE, ducantur normales, siue sinus recti in peripheriam, sintque IK, LM, ND, GH, quos transfer ex punctis axis maioris semidiametri in parallelas correspondentes; per extrema enim determinationis puncta transibit ellipsis: ita IK, sinus dabit semiordinatas PQ, LM, semiordinatas RS, ND, semiordinatas TV. Demonstrationem vide in prop. 1.




lipfis; ita IK, sinus dabit semiordinatas PQ, LM, semiordinatas RS, ND, semiordinatas TV. Demonstrationem vide in prop. 1.

**Pragmatia XVI.**

*Ellipsin fili ope describere.*

**S**it data diameter maior CE, minor HE, in maiori quærentur duo centra: quod fiet si semidiametrum maiorem transferas ex alterutro puncto EH, in diame-




trum maiorem FC, vt supra diximus: prodibunt AB, centra quæsitæ, quibus insigantur duo acus subtiles, istque duo fila alligentur; ponatur & in E, graphicum, cui duo fila ita alligentur, vt laxa amplius non possint. Si igitur graphium intra hæc fila coniuncta circumducatur, describetur hoc motu Ellipsis quæsitæ. Sed hæc omnia, vel ex ipsa figura patent: Demonstratio, verò eius ex porism. 2. propof. 10. petenda est.

**Pragmatia XVII.**

*Ellipsin simplici regula describere, data prius utraque diametro.*


**S**it maior diameter AB, minor CD, in medio ad angulos rectos coniunctæ: accipe regulam lineam, vel è subtili pergameno constructam, quæ sit FG, in qua ad extremum eius punctum G, determinetur maior semidiameter AE, vel EB, scilicet ex puncto G, dicta semidiameter maior transferatur in F, & minor CE, vel ED, ex G in H. Si igitur regula ita applicetur semidiametris, vt H, semper maiorem semidiametrum, F minorem tangant; dabunt puncta in G notata, puncta ambitus ellipsis.



Pragmatia XVIII.

Datis diametri Ellipsin aliter geometrice describere.

Sint diametri ellipsis describende diameter maior EF, minor PR, circa vtrumque describantur duo circuli ex centro M, deinde a T, incipiendo diuidatur maior circulus in partes equales quotuis, ductisque ex centro M, lineis occultis in similes secabitur circulus minor: sint partes maioris circuli TKHF. Hoc peracto coniungantur singula duo puncta aequae a punctis F, & E remota rectis lineis, deinde duo quilibet puncta aequae a punctis P, & R minoris circuli, similiter rectis lineis connectantur enim, vbi similes duae lineae maioris, & minoris circuli concurrent, ibi erunt puncta, per quae ellipsis describetur. Vide figuram, vbi HH, & KK: in punctis V, & Y. Sed haec facillima, ad alia igitur diuertamus.



PROGYMNASMA III.

De superficieum circularium corporum in planum projectione, ut Sciathericarum delineationum sibus seruire possint.

CAPVT I.

De vera, & certa methodo Geometrica, qua dato cuiilibet arcui circuli rectam aequalem assignare docemus.

PRAEFATIO.




INTER eas lineas, quae veterum Mathematicorum scriptis celebrantur, duae primum locum obtinet, Admirabilis, & mirabilis Pappus. Admirabilem tribuit Menelao, & mirabilem vero, sine quadratricem Dinoftrato, Nicomedi, Hippie, & traque ad circulum quadrandum excogitata fuit. Nos illa relicta, de quadratrice hic tantum tractabimus. Describitur autem haec quadratrix per duos motus imaginarios, radij scilicet, & lineae contra basin quadrantis parallelae: quae dum motu circulari, & isochrono procedunt, radij quidem quadrantem, & parallelae radij rectum percurrendo, quacumque eorum sectio communis procedit, linea ducitur, quae ab officio quadratricis appellatur: Id vero inuentum reprehendit Pappus, quia principium petit. Cum enim principium ei finit, comparatum sit, vt punctum terminus definit, idque prius euanescat, quam inuentum sit, neque vlla ratione ex Dinoftrati principijs obtineatur; recte eam rejicit Pappus, vt inutilem, & quae describi non possit. Hanc vltimam propos. lib. 6. Euclid. doctissime Clavius explicuit quidem: quia tamen se ex eius estu extricare non potuit; nos quid circa hanc rem tentauerimus, subtilioris Geometrie studiosis communicamus.

Propositio I.

Si arcus quadrantis continue bifariam secetur, & eadem ratione octavus. laus quadrantis, & a puncto diuisionis vltimo peractae per diuisionis quadrantis punctum vltima diuisione peracta recta in correspondentem adscriptam ducatur; ressecabit haec ex ducta adscripta adscriptam arcui quadrantis, vltima diuisione peracta, aequalem.


Sit arcus quadrantis BD, sectus bifariam in C, vti & latus eius AB, in E, secundum. cum sit, ducanturque ab E per C, puncta diuisionis recta ECF. Dico hanc in adscripta DG, secare DF, aequalem arcui DC.

Secetur bifariam EA, in H, & ex H per I, medium punctum eius CD, ducatur recta HK, in tangentem DG, eritque vt DC ad DL, medium ad dimidium sui, ita



DF, ad DK (nam supponimus hic ex Cyclometria Lanspergij, peripheriam, sinum rectum, tangentem esse inter se aequales, si peripherie sinus, vel tangens sit ad sinum, vel tangentem peripherie dimidie, vt periphèria ad peripheriam dimidiam. Nam si inaequales essent per demonstrata à Prologo 1. c. 9. περί της μεγάλης συνταξ, &c. essent ἀλόγοι; sed ἀνάλογοι sunt; ergo & inaequales) Nam propositionem hic semper sequitur equalitas, vti inaequalitas disproportionem: ergo per hanc hypothesein DE, adscripta abscissa equalis erit arcui

DC, & illius dimidium DK, dimidio DL. Quam numeris primò demonstranda duxi. Sit radius, siue AB, particularum 100000000. & AE  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  earundem 1953125. sitque arcus DC  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  arcus BCD, grad. 45. qualium DB 90. datur ex tabulis sinuū CL, sinus rectus, arcus 45. 3067956. eritque sinus complementi EN 999995293. Si igitur LN, subduxeris ex LC, relinquetur NC, 1114831. Quare erit vt EN ad NC, ita EM, siue radius AD, ad MF, 1114836. cui si addideris DM, 1953125. erit DF, 3067961. Secetur iam AE, 1953125. & arcus DC, 45. grad. bifariam, eritque AH, 976562. & DL, grad. 22.5. eiusque sinus rectus siue inscripta 01533980. & complementum HQ. 999998823. Iterum AH, subductus ex 01. relinquitur, QL. 557417.5. erit igitur vt HQ, & QL, ita HP, ad PK, 557418. cui si addas DP, 976562.5. erit DK, 1533980.5. Patet igitur rectam HIK, bifariam secare DF, in K. Sicuti enim DF, ad DK, ita arcus DC, ad arcum DL. Erit igitur DF, equalis DC & DK, equalis DL. Quod erat demonstrandum.




Consectarium I.

**H**inc patet primò . Si lineis datis AH, CN, & AB, quarta proportionalis detur, eam æqualem fore arcui quadrantis BC. Vt enim AH, ad DC, ita AB, ad BC; & conuertendo, vt AH, ad CN æqualem CD, per præcedens, ita AB, ad quartam proportionalem quadranti BC, æqualem: que inuenitur, si ex puncto sectionis communi linearum RHN, & RAC, per B, in adscriptam CM, productam recta ducatur. Nam SC, erit quæsitæ quarta proportionalis.


Consectarium II.

**P**atet ex his quoque, quomodo rectæ datæ æqualis circuli perimeter dari possit, si prius cuiusuis circuli quadranti æqualis recta descripta fuerit, quia rectis CB, GB, & AI, quæ  $\frac{1}{2}$  est lineæ AB, datæ quartæ proportionalis assignata dabit quæsitum, videlicet BF. Sicuti enim CB,

BD, quadranti æqualis ad BC, ita BF, vel AI, ad EB. Circulus igitur circa EB, descriptus erit æqualis lineæ AI, quadruplicatæ. Si itaque ad FG, ex quibusuis pun-



ctis lineæ BA, verbi gratia ETA, in puncta CNO, lineæ BO, productæ parallelas du-



duxeris; dabit BC, lineam æqualem arcui BK quadrantis EBK, & lineæ BN, æqualem BL; arcui quadrantis IBL; & BO denique æqualem BM, arcui quadrantis ABM, & sic in infinitum, procedendo. Si vero dictas lineas BC, BN, BO, duplaueris, & quadruplaueris, habebis semicirculos aut circulos integros. Verum de hoc Instrumento infra fufius. Vt autem proportio diametri ad circumferentiam sibi constet, assumendus est ad proportionem proximè veram eruendam radius multarum zipharum, vt si quispiam in figura propof. I. assumeret radium

*Proportio diametri ad circumferentiam proximè vera.*

AB, 100000. 00000. 00000. 00000. 00000.  
 erit in figura propof. I.  
 AH, 28421. 70943. 04040. 07434. 84497. 07033.  
 IO, 44644. 71677. 45104. 88313. 33428. 3564.  
 HQ, 99999. 9999. 9999. 99999. 9999. 9900.  
 IQ, 16223. 00734. 40064. 80878. 48931. 2860.  
 DK, 44644. 71677. 44148. 83133. 34283. 876.

Erit igitur vt HQ, sinus rectus complementi vltimi arcus ad differentiam IQ, ita HP radius ad KP, differentiam perimetri arcus DK, & radij DP; quæ differentia cum vltima parte radij componit perimetrum DK. Itaque vt AH, ad DK, ita AB, ad aliud, cuius quadruplum erit circuli perimetrum. vt sequitur.

Diametros. 10000000000000000000000000000.  
 Perimeter. 31415926535897932384626433832705532.


Simili industria Archimedes secuti insignes Logistæ Rudolphus à Cœulen, & Christophorus Grinbergerus nostræ Societatis Mathematicus Eminentiissimus; inuenerunt proportionem diametri ad circumferentiam, etiam modus hic propofitus multò Archimedeo fit vicinior; neque Archimedeæ methodus fit adeo simplex quemadmodum hæc nostra, eò quod in ea limites  $3\frac{1}{10}$ . &  $3\frac{1}{7}$ . nimis latè dissident, ex priore enim limite colligitur ratio diametri ad peripheriâ, vt 10000. ad 31428. ex altero, vt 10000. ad 31418. vt Lanspergius quoque notauit; atque inter has media scilicet, & 10000. ad 31418. non est satis accurata. Quod & Apollonius Pergæus notauit, & Eutorius Alcaonita, Philo Gadarensis, alijque summi Geometræ viderunt. Verum vt tandem *tetragonorum* originem euidentius videamus, fit.

Propositio II.

*Si in dati circuli quadrante ab ultimo in latere quadrantis factæ sectionis puncto in tangentem vltimo arcui æqualem, cuius terminum ex centro alia recta ducta priorem secat, ducatur; normalis à puncto sectionis in basim quadrantis ducta abscindet basim quadratricis.*

**S**it quadrans ABD, quadrato BAOD, inscriptus: sit autem arcus quadrantis BD, continuè bisectus primum in C, deinde in E; hanc eandem admittere in latere AB, bisectò primum in F, postea in G: deinde per præcedentia descri-

describatur DI, æqualis arcui ED; & ex G parallela ducatur ad AD, quæ secet ad scriptam DN, in H; & ex centro A, alia AL, quæ secet GH, in K. Dico AL, quam abscindit KL, normalis ad AD, esse basim quadratricis Dinoftrati. Cum enim ALM, & ADN, triangula similia sint, erit per proposit. 4. lib. 6. Euclid. vt AL, ad LM, ita AD, ad DN. Est autem DN, æqualis arcui BCD. Nam vt KL  $\frac{1}{2}$  radij ad ID, rectam æqualem  $\frac{1}{2}$  quadrantis; ita LM, id est radius AB, ad DN; rectam æqualem quadrantis BCD. Vt igitur AL, ad LM, ita AD, ad DN, id est ad BCD, arcum quadrantis: ad eodq. recta AL, LM, & quadrans ACD, sunt cõtinuè proportionales. Sed & Dinoftratus, vt est apud Clavium, basim, radius, & peripheriam quadrantis continuè proportionales demonstravit: Erit ergo AL, abscissa ab LK, basim quadratricis, quod erat demonstrandum.




Consectarium.

Cum igitur basim quadratricis sit ad radius, vt radius ad circumferentiam quadrantis, & ex nostra demonstratione basim quadratricis sit ad radius, vt radius ad tertiam proportionalem; patet ambitum quadrantis, & tertiam proportionalem habere eandem rationem ad radius, atque adeo per 9. propof. lib. 5. Euclid. ambitum quadrantis, & tertiam proportionalem inter se æquales esse.

Problema I.

Ἐπιγραφὴ τετραγώνου, siue quadratricem describere.

Describatur rectangulum ex tertia proportionali data, & radio quadrantis minoris AD, lateraque AB, CD, in quatuor æquales partes, vbi & quadrantis arcus BE, diuidatur. Deinde per laterum puncta parallelæ trahantur FG, HI, KL: & ex centro A, arcus per quadrantis quadrifariam diuisi puncta ducantur; vbi enim radius AB, secat parallelam BC: & radius AM, parallelam FG, & AN, HI; AO denique KL, lineam; per hæc puncta linea curva ducta dabit quadratricem BPQR. Radius enim AB, circa cõtrum A, per BPQR, eodem tempore, & æquali motu mouetur, quo per BMNO, latus BC, deorsum ad latus AD, περιλλίλον. Hinc patet hæc lineam speciem esse quandam helicis; hoc tamen discrimine inter illas posito, quod ordinata helix æqualibus radij decremetis, & quadratrix in æ-



qualibus describatur.

Consectarium I.

Hinc patet, quod si ex centro quadrantis A, ad quodcumque punctum quadratricis, verbi gratia in P, ducatur linea, & hinc ad basim AD, perpendicularis PS: hanc normalem PS, æqualem fore arcui DV, quem AP, secet in quadrante TD. Vt enim AF, hoc est PS, ad AB, ita EM, ad EB: sed AB, hoc est DC, iuxta præmissa æquatur arcui DT: ergo & PS, arcui DV.

Consectarium II.

Hinc sequitur, qua ratione cuiusuis circuli arcui dato rectam æqualem, in DC, adscripta quadrantis, assignare possimus: arcus enim TD, æquatur DC, per præcedentem, & VD, rectæ DG, siue PS, æquabitur, & arcus YD, lineæ DL. Iterum si detur arcus compositus ex quadrante DT, & arcu VD, æquabitur ei pariter linea ex DC, & PS, composita. Si verò lineam rectam desideres arcui quadrantis DT, bis sumpto, siue semicirculo æqualem; AB, bis sumpta dabit questum. Sic quadrantis arcus DT, bis sumptus vnà cum arcu DX, æquabitur lineæ AB, bis sumptæ vnà cum linea ID, & sic de cæteris.

Consectarium III.


SI circulo dato adscripta fuerit quadratrix, quomodo eum in datam proportionalem secare liceat. Primò secetur AB, tertia proportionalis in datam proportionalem, videlicet quadruplam, ducantur per puncta sectionis ad basim AD, parallelæ FG, HI, KL; & puncta communia intersectionis harum parallelarum cum quadratrice diligenter notã, videlicet PQR, per hæc enim, si ex centro A, rectas duxeris, dabunt eæ arcum quadrantis DT, in datam proportionalem sectum, ita vt TV, VX, XY, YD, quartæ partes arcus DT, sequentur BF, FH, HK, KA, quartis AB. Sicut enim AB, ad DT: ita BF, ad TV; & reliquas partes. Sed AB, per præmissa æquatur TD. Ergo & BF, arcui TV. Non secus quamcunque aliam datam proportionem expedies. Estque huius vsus in Geometria insignis. Nam huius ope quæcunque figuræ dato circulo inscribuntur, circulusque & quæuis eius peripheria data in datam proportionalem diuiditur. Secundò, quicuis angulus in datam proportionalem, & triangulum isosceles, cuius vterque angulorum æqualem ad reliquum datam habeat proportionem. Hinc etiam dependet intricatissimum illud problema. Quamcunque figuram circulo adscribere.

Problema II.

Datis duobus circulis inæqualibus, datoque in alterutro arcu æqualem abscindere ex altero.


Sint in adiuncta figura arcus circuli minor BC, & IK, maior: petitur ex arcu maiori IK, rescindi PK, æqualis arcui minoris EC. Cum igitur per præmissa FG, æqualis sit arcui EC; HM verò assumpta sit æqualis FG; hæc autem æqualis sit OK: erit, & OK quoque æqualis EC, iuxta commune illud. Quæ sunt eadem, &c. Arcus igitur OK, in maiori circulo abscissus æqualis datur EC, minoris circuli, quod erat faciendum.





Confectarium I.

Hinc patet quoque, dato circulo minore eius peripheriæ in quocunque altero circulo maiore arcum æqualem determinare. Sit circuli minoris quadrans AEC, cum adscripta quadratrice SC, cui oporteat in arcu maioris circuli GI, arcum æqualem dare. Ita operare. SE, tertia proportionalis applicetur lateri HK,





maioris in puncto V, ex quo ad HK, normalem ducas VE. Deinde per commune intersectionis punctum parallelæ, & quadratricis adscripta ex H, ducatur recta; vbi hæc arcum GI, secuerit, ibi erit punctum terminans arcum IS, æqualem arcui quadrantis CA. Hunc igitur arcum IS si quadruplices, erit arcus quadruplatus æqualis datæ circumpheriæ minoris arculi BACD, quod quærebatur. Erit huius confectarij in toto hoc libro ingens vsus. Quare id tibi familiare reddas suadeo.

Propositio III.

Datum arcum circuli in datam proportionem dividere:

Sit proportio data sesquialtera, sitque arcus HB, ita diuidendus, vt partes diuise se habeant ad se inuicem, vt O, linea 3. ad P, 2. Ducatur linea ex centro A, in H, quæ perpendicularis secat in F: ex hoc puncto in latus AD, recta normalis IF ducatur, deinde recta IA, in datam pro-




portionem secetur: quod fiet, si in quinque partes eam diuideris; si enim ad N, normalis ducatur in K, quadratricem, & linea ex A, per K, ducta secuerit arcum HB, in U, puncto quadrantis BD. Dico arcum HB, in proportionem datam O, ad P, scilicet sesquialteram, secum esse: sicuti enim HL, ad LB, ita est IN, ad NA. Est autem IN, ad NA, vt O ad P. Ergo & HL, ad LB, vt P, vel O, quod erat demonstrandum.

Propositio IV.

Quadrantem totum in proportionem datam secare.


Sit proportio data superbi-partiens tertias, in quam totus quadrans secundus sit, ita vt HB, se habeat ad HD, sicuti 5. ad 3. Diuisa diametro DA, in I, secundum datam proportionem, atque ex I, normalis ducta in quadratricis punctum F, per quod ex centro A, ducta linea secabit in H, quadrantem DB, in datam proportionem: sicuti enim DH, ad HB, ita DI, ad IA. hoc est 3. ad 5.



Propositio V.

Quadrantem in duos arcus ita diuidere, vt vnus eorum habeat se ad alterum in data proportione.

It proportio data quadrupla in lineis TV, vt 8. ad 2. Quærat ad has TV, & latus quadrantis DA, quarta proportionalis, cui æqualis sit AN, ducta NK, ipsi AE, parallela secante quadraticam in K, ducatur ex A per K recta AKL. Dico quadrantem in L, sectum esse iuxta datam proportionem: sicut enim DA, ad NA, ita DB, ad LB.



Problema III.


Constructio noui instrumenti Cyclotetragonici, qua rectæ curuis, curuæ rectis æquantur.

Atque ex dictis huc vsque patet, qua ratione instrumentū confici possit, cuius ope dicto citius cuilibet arcui circuli recta æqualis, & contra datæ rectæ æqualis arcus assignari possit. Cùm enim in præcedentibus demonstratum sit, basim quadraticis, latus eiusdem, & quadrantis arcum proportionales esse; sequitur necessariò, si basis statuatur semidiameter alicuius circuli, eius latus AD, quadrantæ æquatum iri. Fiat igitur gnomon in charta solida cuiusuis magnitudinis, vt in figura quadraticis refert triangulus EDA, in quo basis quadraticis AE, circuli semidiametrum refert; AD, verò latus eiusdem lineam rectam æqualem arcui quadrantis, cuius semidiameter EA. Ad hanc itaque lineam DE, parallelè ductæ RO, IO, SG; & quotquot alias volueris, formant triangula diuersa omnia proportionalia, quorum bases referunt semidiametros circulorum, latera verò, seu catheti lineas rectas æquales arcibus quadrantum, quæ describuntur ex semidiametris vnuscuilibet. Ita AO, basis erit quadrantis, cuius arcui recta æqualis dabitur AR; arcui verò quadrantis intervallo AO, descripto recta AI æqualis dabitur, & sic de cæteris. Vt verò sine vlllo labore desideratum effectum, & sine imaginationis violentia Tyro habere possit, ex hoc veluti fundamento, aliud instrumentum excogitabimus, quò datam rectam cuilibet curuæ æqualem assignare possimus. Fit autem instrumentum eo qui sequitur modo.

Fabrica noui instrumenti.

Intersecent sese in centro A, duæ lineæ rectæ æque distantes. Deinde ex centro A, supra diametrum CD, describantur semicirculi ad se inuicem æquidistantes, vt in figura apparet, ductis ex punctis vtriusque assumptis FGHKC; semicirculis. Hoc pacto accipe AF, semidiametrum circuli FLQ, æqualem AX, basi quadraticis præcedentis figuræ; eritque iuxta demonstrata latus AY; quadraticis æquale arcui quadrantis. Hoc igitur latus in præcedenti figura refert linea AX; ita ut si hæc fuerit semidiameter quadrantis alicuius circuli, AY recta futura sit æ-

qualis arcui quadrantis XN. Hanc igitur AY, in hoc instrumentum transfer ex F, in lineam AE, quæ eam in puncto I interfecabit: erit igitur hæc linea FI, æqualis arcui quadrantis FL. Hoc etiam peracto, si huic FI, ex singulis punctis GHKC, extremis scilicet semicirculorum punctis ad FI, lineæ parallelæ ducantur GM, HN, IO, KP; atque ex hisce ad semidiametri alterius quadrantis puncta QBSTVD, aliæ parallelæ ducantur, & hinc aliæ parallelæ in lineam AX, atque ex his in lineam CA; vt fiant totidem Rhombi, quot puncta fuerant assumpta. Erunt singula latera Rhomborum, hoc est parallelæ æquales illi arcui quadrantis; ex cuius extremo




in lineam AE, ducuntur; ita CE, æquabitur arcui quadrantis CB, KP; arcui KY; IO; arcui IZ; HN; arcui HS; GM verò arcui GS. Et Rhombi singuli isoperimetri circulis. Si igitur quamcunque ex hisce parallelis in 90. partes æquales diuiseris, ac per singula puncta ex A, rectas duxeris; secabuntur omnes in partes proportionales, eruntque singulæ partes æquales singulis gradibus arcuum, & quibus emanant: eritque instrumentum ad cuilibet curuæ quamlibet rectam æqualem assignandam præparatum.

Vsus instrumenti novi Cyclostragonici.

Datis arcibus 40 80 90 120 180 200 graduum,
ijsdem rectas aequales assignare.

Sit primò arcus 40. grad. & dati circuli semidiameter sit AC. Numero igitur in
instrumento à puncto C, vsque ad 40. in linea recta, seu parallela CE, linea




enim C 40. erit æqualis arcui 40. grad. quadrantis ABC. Sit secundò datus arcus
80. grad. cui rectam æqualem assignare debeamus: numera à C, puncto vsque
ad 80. in linea CE, & linea C 80. erit recta æqualis arcui 80. graduum in quadran-
te ABC, quæ sita. Sic 90. grad. arcui æquabitur tota CE: arcui verò quadrante ma-
iori, videlicet graduum 120. æquabuntur duæ rectæ CE, & EY, simul iunctæ, &
in directum positæ. Sic demum integro semicirculo CBD, æquabuntur duæ lineæ
CE, & ED simul iunctæ, & in directum positæ. Quòd si arcus semicirculo maior
fuerit verbi gr. 200. tunc CE, ED, & DB, simul iunctæ, & in directum positæ dabunt
rectam æqualem arcui 200. graduum, & consequenter toti circumferentiæ æqualis
dabitur recta, si CE quadruplicaueris, aut CE, CD, EX, XC, siue quatuor latera
Rhom-

Rhombi, in directum posueris. Hac industria procedes in quibuscunque alijs cir-
culis, quorum semidiameteri in linea AC, assignata fuerint quadrantis. Vides igitur
quanta facilitate simul ac vtilitate hoc instrumentum mutet recta curuis, &
quadrata rotundis.

Nota tamen hoc loco, ex eo quod quatuor Rhombi latera equalia sint circumfe-
rentiæ circuli CBD, non sequi aream quoque eiusdem Rhombi æqualem esse areæ
circuli: esset enim hoc insignis paralogismus, cum non omnes isoperimetra figuræ
spacia equalia cõtineant. In hunc paralogismum non ita pridem incidit haud igno-
bilis Mathematicus. Est igitur Rhombi CXDE, area multo minor area circuli sibi
isoperimetri: fiet tamen Rhombi area equalis circulo, si singula latera in quadratum
ordinentur: de quibus Lectorem curiosum primo monere volumus, ne nos alicuius
paralogismi argueret.

Monitum ad Geometras.



Si quis porrò instrumento Consecrario 2. Propo-
sitionis 1. descripto, vti desideret is primo semidia-
metrum circuli, cui æqualis recta assignanda est, in
linea BA, quantumuis producta assumat. Nam ex as-
sumpto puncto ad AO, vel FG parallela, abscindet
in BO, lineam quadrati circuli æqualem, quæ quater
in longum, seu directum posita lineam assignabit dato
circulo æqualem, ita BF quadruplicata æquabit
circulum G. BC quadruplicata circulum interuallo
BE, & BN quadruplata circulum interuallo BI, & de-
nique BO quadruplata circulum interuallo BA, de-
scriptum æquabit. Si quis verò diuidat BF, BC, BN,
aut BO, in partes partibus quadrantis proportiona-
les habeat is, vt in præcedente instrumento, in
dictis lineis partes arcibus quadrantis quibuslibet
datis æquales. Verbi gratia si quispiam lineam BO,
in tres æquas partes diuideret, haberet is 1/3 arcui 30.


graduum in quadrante ABM æqualem; Si in 90. æquas partes, 1/90 æquaretur vni
gradui dicti quadrantis, & sic de cæteris.

Problema IV.

Gnomonicam superficiem heliodromon alicuius hemisphaerij, siue
viam Solis, quam vulgo Zonam Torridam dicunt, data
quavis elevatione poli in planum conijcere.

Superficies gnomonica ἡλιοτρόπιος dicitur hic totum illud spacium, quod in ali-
quo hemisphaerio concauo tropicis duobus, & horizonte clauditur. Hanc igitur

Quid sit spatium ἡλιοτρόπιον.




tur superficiem ita in planum deduces. Sit describenda dicta superficies in plano
sub

sub elevatione poli Romana: sitque circulus maximus hemisphærij dati idem, qui in instrumento cyclotetragonico GSR, siue quod idem est, cuius diameter sit GA, Primò detur linea recta æqualis semicirculo GSR, quam habebis, si AM, & MR, in directum posueris in plano seorsim, vt hic videtur: ad M verò normalem duxeris IS. Secundò accipies rectam æqualem 23. grad. & 3. quàm tibi suppeditabit in instrumento in eadem linea GM, linea GV: hanc ex M, versus I, & S, transferes, æquualet enim vtrique arcui 23. grad. & 30. min. quæ duplicata totam Solaris viæ latitudinem efficiunt, vt vides. Tertio, accipe dicto instrumento rectam æqualem arcui 113. grad. & 3. min. vti ex tabula probl. 3. constat. Talis enim est arcus semidiurnus Romæ Solis in  $\infty$  constituti principio, atque hanc lineam datam ex S, transferas vtrinque in lineam NV, ad AR parallelam, referetque hæc ita duplicata lineam arcum dici maximi Romæ. Quarto, detur iterum recta æqualis arcui 66. grad. & 57. min. quam ex I, puncto vtrinque in lineam XY, ad AR, parallelam applicabis, referet enim hæc XY, duplicata vtrinque arcum minimi dici Romæ. Si igitur XAN, & YRV, extrema linearum puncta rectis coniunxeris, habebis superficiem  $\eta\lambda\iota\sigma\delta\rho\mu\omicron\nu$  quesitam, in qua horas omnis generis vt & circulorum cœlestiū representationes, vt in sequētibus dicitur, inscribere poteris: hæc enim inserta hemisphærio, cuius semidiameter sit magnitudinis AG, in instrumento cyclotetragonico, ita vt M, tantū à Nadir, siue cœtro hemisphærij distet, quantū est cōplemētū elevationis poli, Romanæ scilicet 42. grad. & 15. min. & IMS, respondeat meridiane, habebitque superficies suum locum, quem Sol nunquam transgredietur. Quoniam verò tropici in hac proiectione minime sunt circuli maximi, vt horologium omnibus numeris absolutum euadat, intercipias in instrumento tetragonico diametrum circuli vtriusque tropici dicte spheræ, quam habebis si ad æquatore per 23½. gradus parallelam duxeris: hæc enim erit diameter tropici vtriusque. Si igitur ex instrumento tetragonico acceperis rectas dicto circulo tropicorum congruas, habebis spheræ spacium heliodromon in planum coniectum.

Problema V.

Cylindraccam concavam superficiem in planum conijcere.

Si cylindri latitudo, seu diameter data AB, longitudo verò, seu axis AC, vel DB, ita eum in planum conijcies. Primò detur basi cylindri, qui circulus est:




re-

recta æqualis, quam tibi instrumentum cyclotetragonico suppeditabat. Ita cum semidiameter cylindri AV, æqualis sit AF, semidiametri circuli FLQ, in instrumento cyclotetragonico, erit FL, recta æqualis arcui quadrantis FL. Quare conuenienter illa quadruplicata dabit rectam æqualem toti circulo. Hanc igitur FL, quadruplicatam in planum transfer, è cuius extremis NM, si normales duxeris NO, MP; earumque extrema puncta OP, recta coniunxeris, erit rectangulum MNOP, superficies concava cylindri quesita; eruntque NCOF, CDEG, DEGH, EMHP, superficies quadrantales cylindri, quarum singuli bases 90. graduum sunt.

Problema VI.

Coni recti superficiem in planum conijcere.

Si conus isosceles, seu rectus ABCDE, centrum basis F, axis AF, triangulū, per axē ABC, vel ADE, cœtro G, intervallo AB, vel AC, describatur semicirculus HIL, in plano: & vt AC, ad CF, ita fiat circumferentia circuli HLI, ad quartam proportionalem: hæc enim erit pars circumferentiæ circuli HLI, æqualis circum-



ferentiæ circuli BDCE: nam vt diameter ad diametrum, & semidiameter ad semidiametrum, ita est circumferentia ad circumferentiam. Et quia circuli solent diuidi in 360. partes, si hic arcus æqualis circumferentiæ BDCE, desideretur in gradibus circuli HLI, fiat vt AC ad CF, ita 360. circuli HLI, ad numerum quartum. Sic enim numerus quartus numerabit gradus illius arcus, qui est æqualis circumferentiæ circuli BDCE. In proposito exemplo fecimus angulum BAC, angulum trianguli æquilateri. vnde sequitur FC, sinum esse anguli FAC, adeoque semissem sinus totius AC, ita vt proportio AC ad CF, sit eadem, quæ 2. ad 1. Facta igitur operatione iuxta regulam proportionum, erit etiam circumferentia HLI, dupla illorum graduum, qui debentur circumferentiæ DBCE, hoc est arcus circuli HLI, qui est æqualis circumferentiæ BDCE, erit semicirculus, id est


T t gra-

graduum 180. Dico igitur semicirculum HLI, esse æqualem propositæ superficiei conicæ. Si enim GL, intelligatur superponi ipsi AC, & reliqua superficies semicirculi superponi superficiei conicæ, curvitas huius semicirculi curvitatibus circuli BDCE, necessariò congruet, hoc est, omnia puncta circumferentiæ semicirculi HLI, cadent in circumferentiâ circuli CDBE, quia etiam semidiametri ex G producti congruunt lineis, quæ ex A ducuntur ad puncta circumferentiæ CDBE.

Hinc est, quòd medietas LH, LI, æquales sunt semicirculis BDC, BEC, & singulas lineas ex G eductas ad prædictas partes circumferentiæ HLI, respondere ijs, quæ in cono ducuntur ex vertice ad singulos gradus basis. Id quod etiam intelligendum de quibuscunque alijs partibus, licet non sint gradus integri, modò detur earum proportio ad totam basim; huiusmodi enim partibus inveniuntur partes correspondentes, si sint vt tota circumferentia basis ad partes propositas: hoc est, vt numerus antecedens ad consequentem, ita gradus totius arcus HLI ad quartum: is enim dabit punctum eiusdem arcus HLI, parti basis correspondentem.

*Alia ratio facillima turbinem in planum coniiciendi.*

Primo fit conus ABC, cuius superficiem in planum coniicere oporteat. Intercepe primò CA, vel CB, latus conì, & ex centro A, arcus circuli cuiusvis magnitudinis, qui sit BCDEF, describatur.




Secundò diametrum conì AB, iuxta proportionem Archimedeam diametri ad circumferentiâ quæ est 14. ad 44. supra traditam in 14. partes æquales diuidas, vel mediam tantum in 7. Deinde ex diametro interceptum spacium 11. partium, talium quâlium diameter est 14. in arcum seorsim descriptum, à B incipiendo consequenter transfer: erit enim hoc spacium in 11. partes diuisum, quadrans in horizonte conì AS, vel SB. Quod si in arcu quadruplicetur, erit totus arcus BF diuisus in 4. quadrantes, vt vides, quorum vniuscuiusque quadrans 11. partium. Si igitur hunc arcum claueris AB, & AF, erit ABF superficies turbinis, siue conì datì. Idem quoque efficies, si circulo seu basi conì, in arcu circuli BCDEF, æqualem designes; quod fiet per problema folio 326. demonstratum. Hac arte quemuis conum in planum nullo fere labore transferes. Quare hic tantum rationes demonstratiuas indicasse sufficiat.

Pro-

Problema VII.

*Globum in planum proyicere, siue quod idem est, chartas illas dodecamorias globo inducere.*

Fiat quadrans bac, quem diuides in tres æquales partes ad, de, e, c, deinde ducatur linea indeterminatæ magnitudinis VX, in quam spacium ad, quadrantis bac, circino interceptum transferas trigefies iuxta numeros 1. 2. 3. 4. &c. interceptisque circino earum partium 10. vno pede circini in puncto 1. altero per a. punctum describatur arcus; Deinde eadem apertura reliquos arcus persequentia ordine puncta 12. describantur arcus, vt vides; quibus peractis vno circini crure posito in 29. 28. 27. & altero ordine describantur arcus 12. qui cum prioribus se interfecantes conficiant duodecim veluti radios, textorum radijs hæud abfimiles; habebisque sphaera partitionem dodecamoriam in planum proiectam.



Fiat igitur lignea, vel gypsea sphaera tãtæ magnitudinis, quanta ba, radius quadrantis, cui descriptos paulò ante 12. excisos radios ordine agglutines, habebisque sphaeram preparatam. Si verò vnum ex semicirculis Mc, vel Oz, in alias 90. partes diuidas, & ex polis seu apicibus arcus duxeris, habebis latitudines, & declinationes stellarum, vna cum altitudinibus Solis, prout polos sphaera constitueris. Sex enim ex dictis radijs implebunt superficiem concavam, vel conuexam hemisphaerij totius, cuius semidiameter ba, tres verò vnum quadrantem hemicycli bac explebunt.

Corollarium.

*Medium æquatorem cum duodecim horis in planum coniicere.*

Fiat per præcedentia vna recta equalis semicirculo, cuius semidiameter Ba, quam & in duodecim æquales partes diuides. Deinde ad singulas duodecimas

mas partes ducantur vtrinque lineæ ad VX normales, cuiusmodi est MC, quæ omnes æquales sint arcui semicirculi quadrantis Bca, per singula enim tria puncta, cuiusmodi sunt MNO, & OPZ; arcus ducti dabunt radios medij æquatoris hemicyclo concauo inferendos, vt in sequentibus libris fufius explicabitur.

### Problema VIII.

*Alius modus chartas dodecatomorias globis inducendi.*

**L**ineam rectam AB, intelligunt Artifices viginti partium: CB, CE singulæ vnus partis, ipsique AB, summunt æqualem EF, & centris A, F, interuallis AB, FE, describunt duos arcus DBG, DEG; qui constituunt vnum ex duodecim dodecatomorijs globo inducendis, quorum inductione; vt superficiei globosæ aptentur, necesse est huiusmodi dodecatomorias planas extendi tam in longum, quam in latum, ita vt tam DG fiat æqualis vni arcuum DBG, DEG; quam EB, sexduplum arcus: puncta enim DB, concurrunt in polis, & sextuplum EB, debet pertingere ad semiperipheriam; vel quod idem est, singuli arcus EB, debent respondere 30. gradibus circuli maximi. Quæritur igitur semidiameter illius globi in partibus ipsius AB datis; in partibus 100000. in quibus dimidia circumferentia vero proxima est 314159. minor tantum vna. Sed primò inuestigandus est arcus BD in ipsdem partibus notæ AB datis: quod ita fiet: Quarum AB, est 20. earundem partium est arcus BC, 1. quarum igitur eadem AB, est 100000. earundem est BC, 5000. & consequenter reliqua AC erit 95000. sinus complementi arcus BD, cui in tabula respondent grad. 18. 11. 40. qui faciunt minuta secunda 65500. Dimidia verò circumferentia continet 648000. Proportio igitur dimidiæ circumferentiæ ad arcum BD, erit vt 648000. ad 65500. hoc est vt 1296. ad 131. & consequenter si fiat vt 1296. ad 131. ita 314159. dimidia circumferentia in partibus 100000. ad quartam inuenietur BD, in ipsdem partibus partium 31755  $\frac{2}{3}$ . & dimidia circumferentia erit 63510  $\frac{2}{3}$ . vel 63510  $\frac{1}{2}$ . ferè & tanta erit dimidia circumferentia globi, cuius diameter quæritur, & facile habetur, si fiat vt 314159. ad 100000. ita 63510  $\frac{1}{2}$ . ad quartum, quartus enim numerus dabit semidiameterum globi partium 20216.

Si igitur globi semidiameter foret vnus palmi, vel partium 1000. & fiat vt 20216. ad 100000. ita 1000. inuenietur AB in eisdem partibus 1000. palmi partium 4946  $\frac{1}{2}$ . hoc est palmos 4. vncia 11. & 2. grana; & vice versa si fiat vt 100000. ad 20216. ita data AB vnus palmi ad quartum inuenietur semidiameter globi, pro dodecatomorijs chartaceis datis.

Rectè autem AB, habetur ex latitudine data, si BE decupletur.

AB ad semidiameterum globi, vt 100000. ad 20216.

Vel etiam ad semidiameterum globi, vt 1000. ad 20216.

# ATHANASII KIRCHERI E SOC. IESV PRESBYTERI ARTIS MAGNÆ LVCIS ET VMBRAE

Liber Quartus.

## HOROGRAPHIA VARIA

QVA

## OMNIA HORARVM GENERA

VMBROSO GNOMONE

IN LVCIDO CAMPO DEMONSTRANTVR.

### P R A E F A T I O.




*Remissis omnibus ijs, quæ ad vniuersam Gnomonicam perfectè exercendam quouis modo requiri videbantur, nunc ordo postulat, vt relictæ paulisper Theoria ad proxim nos conferamus: quod dum facimus, nō deerunt emulitoris naris Mathematici, qui rem tritam nos agere occinent. Sed eorum dicam me facillimè elusurum spero, dū ea, quæ ipsis prius haud forsitan ita nota erant, produxero.*

*Securus igitur procedo: noui, quibus scribam; noui quid mundus iam in Mathematicis desideret; non ignoro quid Principibus, hoc tempore gratum sit, quorum & instantia hæc qualiacunque prodo. Vsum aliquem in rebus humanis appetit insatiabilis hominum sciendi aviditas, quam dum in Mathematica speculatiua, siue ob spinosas elementorum traditiones, siue ob intricatam demonstrandi rationem, non reperiunt; mirum non est tam paucos, qui se huiusmodi studijs abstractioribus addicant, reperiri; imò, quod deplorandum est, summorum viorum elucubraciones, & monumenta ita saepe numero exiguo in precio haberi, vt non materiem ingenijs subtilibus aptam, sed Salsamentarijs, Sepiasarijsque in cucullos supellestem tanto labore partam preparasse videantur. Talia fuerunt opera Adriani Romani; talia doctissimi Vietæ, ante quam in lucem affererentur: talia sunt pleraque opera, quæ de Algebra, alijsque abstractioribus argumentis Mathematici tradunt. His ego absterritus ære, vt dici solet,*

*verbe-*

reverbare nolui, ob tres aut quatuor Mathematicos reconditoris scientie peritos  
 Sefulariorum me iniurijs exponere nolui. Sed speculationes abstractioris subtilio-  
 risque Mathematicæ in aliquam Vita humane Civilitatem conferendas duxi;  
 ut quanto alij nescio qua affectata obscuritate ipsum usum abscondunt; tan-  
 to ego amplius in eodem publici juris faciendo laborem, ita materias attemperan-  
 do, ut subtilium theoriarum notitiâ usum, praximque nunquam excludat; omni-  
 que hominum generis cuiuscumque professionis fuerint; stylum, materiemque ac-  
 commodem. Invenient igitur hic practici, quod ament: erunt Mechanicis obie-  
 cta, quibus applaudant. Addo multa, & pleraque maioris momenti, & nova  
 à me excogitata, & inuenta; Theoricis novam innumerarum speculationum so-  
 bolem paritura: & cum varietatis amans sit hominum curiositas, non Mathe-  
 maticis contentus gustijs; sed in amplissimos Physica campos sæpe prorumpo;  
 Naturam Mathematica ita coniungere studui, ut ex huiusmodi connubio, eum  
 inventionum fetum, quem cum opus hoc præsens cum alia passim edenda, &  
 demonstrarunt; & demonstrabunt; Vides igitur, ni fallor, Lector candide, ex  
 hisce instituti mei rationem. Quæ cum ita sint, nihil restat, nisi ut iam plenis  
 velis propositum nostrum auspicietur.

IN FACIE CAMERÆ HOROGRAPHICÆ  
 PRÆSENTATIO



PARS PRIMA.  
 HOROGRAPHIA  
 VARIA,

SIVE  
 DE HORARIORVM  
 CIRCULORVM  
 IN QVIBVSVIS PLANIS INSCRIPTIONE.

CAPVT I.

*De prærequisitis ad Summam Gnomonicæ.*



Vadruplici methodo Summa totius Gnomonicæ perficitur;  
 Geometrica; Arithmetica, siue tabulari; Mechanica, seu  
 Organica; & Tyretica, siue quæ est per observationes. Et <sup>Quadruplici me-  
 thodus horogra-  
 phiæ</sup> quamvis complures de hisce, integris voluminibus iam tra-  
 ctarint; nos tamen hic nostra tantum speculatione parta,  
 aut saltem ab alijs obscurius tradita; noua eaque facillima  
 methodo, simulque ea qua fieri poterit breuitate, & perspi-  
 cuitate prodere volumus. Quod dum facimus, ita nos Ty-  
 ronum ingenio accommodamus, ut quiuis nihil aliud nos, nisi ut Tyro sine suo in  
 assumpto exercitio potiatur, sit notaturus. Vnde, ut omnia difficultatis obstacula  
 tollerentur, Problematum propositorum demonstrationes paucis inuere, vel  
 etiam ut plurimum profus omittere solemus; ut pote earum principia, & ratio-  
 nes seorsim in Apparatu, demonstratiua methodo profecuti, ad quem eruditio-  
 rem Lectorem remittimus; noui enim huiusmodi demonstrationes mistas non pa-  
 rum retardare filium pragmatias. Quicumque igitur Problematum propositorum  
 rationes profundius scire voluerint, ij se ad Apparatum conferant, vbi omnia fu-  
 sè demonstrata, iuxta allegationes cuique Problemati appositas reperient. Ut quo-  
 que Tyro inoffensa praxi procederet, intricatas illas tot characterum repetitiones  
 data opera omisimus; de quibus omnibus prius Lectorem commonefacere volui,  
 ne ipsum mea in hoc opere procedendi lateret intentio.



# PROBLEMAT A PARASCEVASTICA.


## Pragmatia I.

### *Quadrantis horographi constructio.*



Quadrantem appellamus mirificum ob admirabiles, quas in Sciathericis conficiendis habet utilitates. Dicitur etiam horographus, eo quod eiusdem ope, horæ omnis generis in quavis superficie inscribantur. Sic igitur conficiatur.

Fiat in materia quacumque solida expolita quadratum AIKL, è cuius angulo A, tanquam centro describatur quadrans circuli IK, per cuius limbi in 90. gradus diuisi puncta lineæ rectæ ex centro A deducantur in latera KL, IL, habebisque quadratum præparatum, cuius in tota Gnomonica ingenus vsus est.



*Varij vsus quadrantis mirifici*

Primò enim si lineam BS, ad latus AI, quadrantis parallelam duxeris, quæ cum omnes radios secet, primò tibi seruiet ad tabulas tangentium, & secantium componendas, cum è centro A, rectæ omnes sint secantes; partes verò in linea BS, arcui CB, ad scripta referetæ tangentibus sint; sinus verò totus AB, in 100. partes censetur diuisus.

Secundò, ad tabulas umbrarum tam versarum, quam reftarum seruiet, si AB, pro stylo in 12. vel 10. partes æquales diuisa fuerit.

Tertiò, eadem linea BS, per hectamorios radios diuisa, pro horologijs omnis generis dicto citius delineandis seruiet.

Quar-

Quartò, pro altitudinibus Solis, & consequenter horis in quacumque perpendiculari superficie inscribendis.

Quintò, pro omnis generis portatiliū horologiorum constructione, vt in decursu operis patebit.

Sextò, lineæ IB, RB, FB, EB, OB, CB: representant medios conos, quorum axes AI, AR, AF, AE, AO, AC, &c. & in quorum concavis superficiebus, quas referunt latera IB, FB, &c. omnis generis sciatherica describentur, ita vt in dato quolibet cono concauo, cuius angulus inter axem, & latus cognitus fuerit, & in hoc quadrato determinatus, quodlibet horolabium inscribi possit.

Septimò, arcus verò CI, ON, EV, FM, RK, sunt segmenta circulorum, quæ referunt scaphiorum, phialarum, aliorumque corporum sphericorum concauam superficiem cuiusuis magnitudinis.

Octauò, arcus vero quadrantis ex centro A, ductus, cuiusmodi vltimus IK, est, quadrantem hemicycli concaui horarum projectioni aptum indicat.

Nonò, pro declinatione planorum quorumuis accipienda, in ordine ad declinantia, & inclinata describenda, idem seruiet.

Decimò, arcuum signorum, cæterorumque circulorum cœlestium inscriptiones, non alio medio facilius, quam huius quadratis ope, vt in decursu huius operis indicabitur, expedientur. Quare vt cum tibi familiarem reddas, antequam Pragmatias aggrediaris, suadeo.

## Pragmatia II.

### *Gnomonicum triangulum ad quamuis latitudinem construere.*

Principium, & fundamentum totius Gnomonicæ est situs determinatus styli, ita vt debitam suam distantiam à centro horologij, siue polo, & æquinoctiali habeat, & in omnibus quidem horologijs horizontalibus, verticalibus, declinantibus, & inclinatis (si plana æquinoctialia, & meridiana excipias) vt stylus debitam suam distantiam à dictis punctis habeat, triangulo opus est, quod nos gnomonicū vocamus, in quo data gnomonis longitudine altitudo poli vnà cum suo complemento dicto citius assignatur. Hoc igitur qua ratione in quolibet plano ad quamlibet regionem construi debeat, iam videamus.

*Triangulum gnomonicum fundamentum totius horographiæ.*


### Primus modus.

NVmera igitur latitudinem regionis tuæ in limbo quadrantis AKI, diligenter notado punctū F, in quo videlicet radius AF, Romæ eleuationis poli 42. graduum secat arcum IK, ductaque ex F, in P, normali, habebis triangulum propositum. Hic namq; radius AF, secans arcum 42. graduum, erit basis trianguli gnomonici, tota scilicet latitudo à centro horologij vsque ad æquinoctialem: FP verò sinus rectus, vel tangens eiusdem gradus: AP, denique sinus complementi eleuationis poli Romani, vel sinus totus respectu tangentis eiusdem. In hac trianguli gnomonici base locus, & altitudo styli ita inueniatur. Ducatur ex puncto P, siue angulo recto ad basim AF, normalis; dabitq; hæc ipsa in PS, lineæ, & locū styli in S, & altitudinem eius determinatā. Hac ratione triangulum Gnomonicum inuenies ad quamcunque altitudinem datam. Sunt enim omnes lineæ ex centro A, in arcum IK ductæ, bases triangulorum gnomonicorum ad singulas eleuationes poli

V v dataz.



data. Verùm, vt vnico intuitu omnem rationem triangulorum gnomonicorum percipias, hic subdam figuram ad decades eleuationum polarium constructam, in



qua triangulum gnomonicum eleuationis poli 10. grad. est ABL, stylus, locusque LS: triangulum verò 20. graduum erit ACM, stylus MS, locus in S. Sic triangulum 30. grad. erit ADN, locus in S, stylique altitudo NS, vt in sequenti pinacio apparet.


|                                |            |        |                          |                                    |                                                  |
|--------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                | Grad.      |        |                          |                                    |                                                  |
| Triangulum<br>gnomoni-<br>cum. | { ABL 10 } | stylus | } basis,<br>seu<br>secas | } Sinus rectus,<br>seu<br>Tangens. | { BL<br>CM<br>DN<br>EO<br>FP<br>GQ<br>HR<br>IK } |
|                                | { ACM 20 } |        |                          |                                    |                                                  |
|                                | { ADN 30 } |        |                          |                                    |                                                  |
|                                | { AEO 40 } |        |                          |                                    |                                                  |
|                                | { AFP 50 } |        |                          |                                    |                                                  |
|                                | { AGQ 60 } |        |                          |                                    |                                                  |
|                                | { AHR 70 } |        |                          |                                    |                                                  |
|                                | { AIK 80 } |        |                          |                                    |                                                  |

Ex quo etiam notare licet, ea triangula esse æqualia, quorum bases æqualiter distant à 90. & 0. talia sunt 10. & 80. 20. & 70. 30. & 60. 40. & 50. 45. grad. Hac tamen differentia, quòd horologium horizontale, sub latitud. 10. grad. est, & verticale sub latitud. 80. grad. & contra, & sic de alijs.

**Secundus modus.**

*Constructio trianguli gnomonici per tangentes pro horizontali, & verticali plano.*

Si gnomonis longitudo AO, 1000. partiū loco radij, siue sinus totius; accipe tangentem complementi eleuationis poli in partibus styli, eumque ex A loco styli transfer in punctum B, habebisque centrum horologij. Item accipe tangentem eleua-



eleuationis poli, siue altitudinis æquatoris in partibus styli, eaque ex A loco styli transfer in V, habebisque communem intersectionem meridiani, & æquatoris: tangens autem eleuationis poli 42. grad. est 900. eleuationis æquatoris 1111. Si itaque ex B, & V, in apicem styli lineas BO, VO, duxeris: habebis triangulum gnomonicum quæsitum, videlicet BOV. Hic modus omnium facillimus est, maximè si quis tangentès altitudinis poli, & æquatoris suæ eleuationis proprias habuerit præparatas. Vt etiam facilius procedas, accipe longitudinem styli AO, eamque aliquoties in lineam AN, transferes, ita vt spatium AO, respondens stylo in 1000. vel 10. partes censeatur diuisum; ON in totidem, & NM in totidem. Si igitur spatium AO, fuerit in 10. partes diuisum, vnaquæque decimarum partium adhuc in alias 100. partes diuisa censebitur. Sed hæc faciliora sunt, quam vt explicari debeant. Porro hoc triangulum inuersum seruiet pro plano verticali, ita illud dicto plano applicando, vt V centrum fiat horologij, B, verò communis intersectio æquatoris, & meridiani; VO, stylum seu axem mundi, OB, radium æquatoris referat. Quæ omnia, cum fusè demonstrata sint in Apparatu Gnomonico, eò lectorem remittimus.

Tangens 42. gr. 900.  
Tangens 148. grad. 1111.


**Pragmatia III.**

*Constructio trianguli pro quouis plano declinante.*

Dupliciter inuestigabimus huiusmodi triangula gnomonica. Primò Geometricè, seu analemmaticè. Secundò per sinus.

**Prior modus ita se habet.**

Si igitur planum quodpiam 30. grad. à meridiana, siue quod idem est, 60. grad. à verticali primario declinans. Fiant in dicto plano duæ lineæ AB, CI, in N, ad rectos sese intersectantes, descripto ex N, arcu BC, in eo computetur declinatio muri; quam determinet linea NI: deindè in quolibet puncto pro magnitudine horarij, scilicet, in V, tangens cõplementi eleuationis poli, vt & in NA, tangens eleuationis poli 42. graduum determinetur; habebisque triangulum ANV, in quo A centrum est horologij declinantis; triangulum autem ANV, erit triangulum gnomonicum in plano horizontali. Hisce præmissis ita triangulum gnomonicum supra planum declinans reperies.



Primò, transfer tangentem NV, ex N, in lineam declinationis NP, in punctum I. Secundò, ex I, puncto ad CI, ducatur perpendicularis IM. Tertiò, per M, ducatur ex A, recta, quæ erit linea styli.

Quartò, ad AM, ducatur normalis OQ, quæ erit æquinoctialis in plano declinante  
 Quintò, ab M, versus O, determinetur æqualis ML, videlicet MO, eritque AO,  
 ducta axis trianguli.


Sextò, ex M, ad OA, astra normalis MX, scilicet, semidiameter æquatoris, & ex X,  
 ad MA, lineam styli, alia normalis ducatur, quæ & longitudinem styli, & locum  
 eius in F monstrabit, eritque triangulum gnomonicum MXA, supra planum 30.  
 grad. declinans, inuentum, quod quærebatur.

Non secus ad quamuis aliam eleuationem poli triangulum reperiens supra quod-  
 uis planum declinans à verticali.

### Pragmatia IV.

*Per numeros, siue tangentes, triangulum gnomonicum supra  
 planum declinans inuenire.*

**S**it planum declinans 30. graduum, in quo locus styli C, altitudo gnomonis CO,  
 1000. partium. Ducatur per C, linea ad basim plani parallela DE, quæ erit  
 horizontalis, in qua tangens declinationis plani à meridie est CB: per B itaque  
 perpendicularis ad DE ducta dabit horam 12. in plano: per C verò locum styli nor-  
 malis ducta dabit in A centrum horologij. In hac igitur  
 linea AC, centro horologij  
 dato, consequenter triangulum  
 propositum hac industria repe-  
 rietur: & primò quidem in clinatio-  
 nem gnomonis, siue lineæ styli  
 à linea AB, distantiam per sinus  
 hac ratione. Cum ita se habeat  
 tangens complementi eleuatio-  
 nis poli ad tangentem declinationis styli, vt sinus totus ad sinum eleuationis  
 muri; multiplica tangentem complementi eleuationis poli in sinum declinationis  
 muri & summa diuisa per sinus totum dabit desideratam lineæ styli inclinationem.



Paradigma Pragmatia.

**H**ic Romæ declinat in Ortum planum quodpiam 30. grad. erit eius sinus re-  
 ctus 5000. eleuationis poli complementi tangens 48. grad. erit 1111. quæ  
 ducta in 5000. dabunt summam, quæ diuisa per 10000. sinum totum, dabit tangen-  
 tem declinationis styli 555. eiusque arcus innotescit ex tabulis sinuum 29. grad.  
 58. min.

Angulo declinationis habito, tangentem complementi eius duc in tangentem  
 declinationis muri; productumque diuide per summam totam, habebisque distan-  
 tiam AB, centri A, à puncto B, lineæ horizontalis DE; si enim ex A, per C, locum  
 styli rectam OC, duxeris, dabit punctum A, & O, vna cum linea OC, triangulum  
 AOC, supra planum propositum. Sed tamen hoc idem per sinus ita reperietur.  
 Duc sinum declinationis styli in tangentem complementi declinationis plani 60.  
 grad. & productum diuide per sinum totum, & productum dabit tangentem ele-  
 uationis styli CO. Sicuti enim sinus totus ad sinum declinationis styli paulò ante  
 inuentum: ita tangens complementi declinationis plani ad tangentem eleuationis  
 styli, cuius gradus dabunt tabulæ tangentium.

Aliter.

### Aliter.

**V**T finis totus ad sinum complementi eleuationis poli, ita sinus complemen-  
 ti declinationis plani ad sinum eleuationis styli, cuius arcus in tabulis sinuum  
 dabit quæsitum.

### Pragmatia V.

*Triangulum gnomonicum eleuationis poli in horologijs ad hori-  
 zontem inclinatis, & ab horizonte declinantibus  
 determinare.*

**C**um horologia ad horizontem inclinata nihil aliud sint, quàm horologia ho-  
 rizontalia diuersis latitudinibus respondentia; triangulum certè latitudini  
 respondens erit triangulum quæsitum. Ita in horologio ad horizontem inclinante  
 5. grad. triangulum gnomonicum æquale erit triangulo gnomonico in horizontali  
 horologio ad eleuationem poli 37. grad. constructo. Vide *ædificia* 1.1. partis, &  
 infra, vbi de horologio inclinante tractamus. Cum porò horologia ab horizonte  
 inclinantia nihil aliud sint, quàm declinantia à verticali, fit vt triangulum eleuatio-  
 nis poli supra planum quodpiam à verticali declinans ideò semper respondeat  
 alicui horologio ab horizonte declinanti; ita triangulum gnomonicum in plano  
 30. grad. in Occasum ab horizonte declinante idem est, quod triangulum gno-  
 monicum in plano à Meridie in Occasum 30. grad. declinans ad latitudinem 48. grad.  
 Vides igitur omnia triangula gnomonica in quibuscumque planis, vel ad triangula  
 planorum horizontalium, vel ad planorum verticalium triangula reuocari.

*Horologia de-  
 clinantia, & in-  
 clinantia sunt  
 semper alicubi  
 horologia hori-  
 zontalia, vel  
 verticalia.*


### Pragmatia VI.

*Instrumentum encliticum, siue declinatorium vniuersale  
 construere.*

**E**T si in problemate 2. fusè sit de planorum declinatione, & inclinatione tracta-  
 tum; si cui tamen illa minus arriderent; illi hic aliud Instrumentum describe-  
 re volumus, in quo, tanquam in anacephalæossi quicquid ibi dictum est, compre-  
 hensum inueniet; cuius vniuersalis, & infinitus prope vsus esse potest in tota  
 Gnomonica. Ita autem sese habet.

Delineetur in tabula quadà solidissima KMNO, circulus QPNR, in quatuor qua-  
 drantes diuisus, vt vides, supra quem circulum in S, centro inseratur tigillum, su-  
 pra cuius extremitates LO, (quæ in medio lineam fiduciæ habeat gradibus decli-  
 nationis monstrandis aptam) fundentur duo alij tigilli LF, OE; tigillum autem  
 LF, in F, semicirculum in gradus suos diuisum adnexum habeat. Fiat item tabu-  
 la quædam plana, quæ in FE axem habeat, semicirculi centro F, & E, inserenda,  
 vt in ijs veluti polis pro libitu machinatoris deprimi, & eleuari possit: habeat quo-  
 que in X, cochleolam, vt supra datum gradū firmari possit. In Y, quoque puncto cur-  
 sor æBY, inseratur, vt ita pro vtentis arbitrio is nunc subingeri, nunc extrahi possit.  
 Habeat quoque cursor in punctis æB, quadrantem erectum, supra cuius limbum By,  
 linea

linea fiduciae  $ad$ , ex centro  $a$ , versatilis educatur: huic cursori  $YB$ , in  $a$ , alia quaedam tabula  $X$ , adnecti potest: quae quem vium habitura sit, dicetur in sequentibus.



Instrumentum Encliticum

Idea, & epitome totius Gnomonicae est.

Vfus instrumenti Enclitici.

His igitur rite peractis habebis instrumentum praeparatum, quo dicto citius quodlibet planum representabis. Si enim tigilla  $LF$ , &  $OE$ , vna cum linea fiduciae  $PS$ , & reliqua tigillis inserta versatili Tabula  $IBCD$ , gyratur supra  $LO$ , Ortus, & Occasus puncta: demonstrabit linea fiduciae  $SP$ , necessario lineam meridianam; tabula autem  $IBDC$ , tum vnum ex inclinantibus, aut inclinatis demonstrabit, vel etiam horizontale, si situm habuerit parallelum, pro gradu semicirculi, quem latus abscondit. Praeterea, si tabula  $IBDC$ , statuatur ad planum inferius  $KOMN$  recta; habebis verticale recte Austrum respiciens, cuius opposita pars semper habet planum quod Boream respiciat. Si tabulam iterum ponas supra  $42$ . gradum, ostendet ea tibi planum polare superius, opposita pars inferius polare. Si supra  $30$ . habebis inclinans ab horizonte  $30$ . grad. Si porro totam tabulam rectam ita verteris, vt in quadrante semicirculi  $GH$ , latus  $DI$ ,  $48$ . abscondat, dabit tibi ita eleuatum planum equinoctiale Romanum superius, & opposita pars inferius. Si latus tabulae  $Id$ , supra caeteros gradus promoueris, dabuntur plana inclinata Boream respicientia.

Si

Si statuas denuo tabulam  $IBDC$ , ad planum  $KLMNO$ , rectam, & linea fiduciae vna cum tigillis, & reliquo systemate statueris supra  $\phi$  adum quemcunque a meridiano puncto  $P$ , declinatem; ostendet tibi tabula  $IBDC$ , ad horizontem recta planum declinans tot gradibus a Meridie, & Boream in Ortum, vel Occasum, quot  $SP$  linea fiduciae gradus abscederit ostendetque tabula sic gyrata omnes verticalium declinantium superficies.

Si iterum linea fiduciae statuatur supra punctum  $O$ , vel  $L$ , Ortium, vel Occiduum, ostendet tibi tabula  $IBDC$ , iuxta gradus semicirculi depressa, vel eleuata, omnia plana ab horizonte declinantia superiora, & inferiora Ortum, & Occasum respicientia.

Si denique statuatur linea fiduciae supra gradus a  $P$  meridiano puncto vtrinque declinantes, & tabula  $IBDC$  supra gradus semicirculi  $GHX$ , ostendet tunc tabula omnia plana mista. Vnico igitur instrumento omnia plana exhibemus, quod erat faciendum. Cursor vero cum quadrante, & linea fiduciae ostendit, quem situm videlicet quodlibet planum ad axem mundi, quem linea fiduciae  $a d$ , refert, habeat, atque haec per totum mundum. Verum haec omnia fusius in sequentibus explicabuntur.


### Pragmatia VII.

Regula sciatherica, sive horographica fabrica, vsusque in tota Gnomonica mirificus.

Meminerunt cuiusdam regulae Clavius in noua descriptione horologij, & Voellius in sua Horologiographia: sed quoniam eius vsus valde limitatum demonstrat, ego eam prius vniuersalem hoc loco condere docebo; ita vt nihil feret in tota Gnomonica sit, quod regulae huius beneficio expediti non possit. Ad rem igitur veniamus.

Regula horographica, sive sciatherica ad omnia horarum delineandarum genera utilis.


Determina in quadrante mirifico latitudinem Regulae ex  $A$ , versus  $B$ , & per  $B$  parallela  $BS$ , ducta ad  $A$ ; dabit mediam partem regulae  $AB$   $ML$ , seorsim




delineadae. In hac medietate ad limbum designa heceteriorum diuisionem quadrantis, sive sex horas a meridie, & media nocte: quod fiet si in linea  $BS$  quadrantis, pro vna hora  $15$ . gradus numeres; puncta enim  $cdefg$ , dabunt  $6$ . horas, cum medijs horarum punctis, & si spacium permittat, cum quadrantibus horarum. Haec eadem heceteriorum spacia ex  $B$ , versus  $K$ , in alteram partem regulae transferas, habebisque regulam horographicam  $MKLI$ , perfectam: quae vt vniuersalior sit, scalam latitudinum regionum ad quouis triangula gnomonica formanda, ita constitues.

Trans-

Transferantur ex centro quadrantis mirifici A, omnes lineæ secantes quadrantis inter A, & lineam BS, interceptæ, in regulam scorsim delineatam ex puncto ali-



quo lineæ meridianæ, vg. ex S, vtrique versus X, & Y: versus Y quidem pro basibus triangulorum gnomonicorum in horologijs horizontalibus: versus X verò pro basibus triangulorum in horologijs verticalibus: & punctis lineæ SX, adscribatur numeri latitudinum ab I, incipiendo versus S. Numeris verò latitudinum in



SY, signatarum complementa latitudinum adscribas, eritque regula omnibus numeris completa, vti præcedens figura docet. Si verò vsum regulæ ampliorem desideres; rescinde ex quadrante mirifico totum parallelogrammum ABIS, alterutriusque regulæ parti ita agglutina, vt extremo regulæ M, congruat: vel illud etiam ex quadrante in vtramque regulæ partem circino transferas, ei numeris graduum vnâ cum complementis, vt hic vides, additis, habebisque scalam latitudinum, ex quo dicto citius, triangulum gnomonicum conficere liceat; quarum hæc, ad confusionem vitandam in posterum Expansam, alteram Contractam appellare visum est: vtraque seruiet Almucantaris, & Azymuthis, reliquisque primi Mobilis circulis, hisce correspondentibus planis datis inscribendis, vt in decursu operis dicetur. Vide figuram hic appositam, vbi Expansam regulam nil aliud esse vides, quam quadrantem circuli, cuius radij producti in parallelogrammum ABLS finiant. Contractam verò, nihil aliud esse, quam parallelogrammum BTSV, in quo ex B puncto in lineam BS, & TV, singuli radij inter B, & AL, intercepti, translati parallelisque coniuncti constituant regulam BTSV.

CAPVT II.

*Horographia Analemmatico-geometrica.*

Problema I.


*Horarum à meridie, & media nocte, solius trianguli gnomonici ope, in quinque planis regularibus, vna & eadem opera describere.*



Primò, præstò sit triangulum gnomonicum iuxta Problema II. Progym. IV. ad Romanam latitudinem 42. grad. adaptatum. ACD, cuius basis CD, semidiametrum horizontis; AD, verticalis; BD, verò æquinoctialis semidiametrum referat. Huius ope in quinque planis regularibus ita horas astronomicas projicies.


Primò, ducantur in plano quopiam duæ lineæ AB, CD, in centro E, orthogonales se interfecantes.

Secundò, assumpta intercapedine semidiametri æquinoctialis BD, ex E, circulus descriptus in 24. æquales partes diuidatur à G, & O punctis oppositis incipiendo, eritque hoc horologium æquinoctiale.



Tertiò, fiant ad puncta GO, duæ lineæ contingentes HI, KL; quas ex E centro lineæ rectæ per 24. diuisionis puncta secant: puncta verò in contingentibus lineis signata rectis coniuncta dabunt horarias lineas ad GO meridianam parallelas; eruntque horæ in plano meridiano Orientali, & Occidentali, vti & in polo: i plano quæsitæ.

Quartò, accipe ex triangulo gnomonico semidiametrum horizontalem CD, camque ex O puncto contingentiæ, in B punctum transferes, eritque B centrum, ex quo ad communes interseccionés parallelarum, & lineæ contingentis KL, rectè ductæ dabunt horas à meridie, & media nocte in plano horizontali.



Quintò, assumpta semidiameter AD trianguli gnomonici, ex G transferatur in A, ex quo lineæ ad communes sectiones lineæ contingentis HI, & parallelarum ductæ dabunt horas à meridie, & media nocte in plano verticali. Horologia igitur quinque, videlicet æquinoctiale, polare, meridianum, horizontale, & verticale construximus ope trianguli gnomonici, quod erat faciendum.

*Methodus alia per Tangentes multo facilior, & uniuersalior prædicta.*

Accipe in partibus semidiametri æquatoris DB, in 10. æquas partes diuisse, scilicet, in partibus sinus totius tangentiarum horariarum à meridie, easque transferas à meridiano G, & O punctis vtrinque in contingentes HI, KL. Sunt autem distantie horariæ graduum 15. 30. 45. 60. 75. per puncta enim signata lineæ ex centrâ A verticalis, & B horizontalis horologij ductæ, dabunt horas in plano verticali, & horizontali: puncta verò in lineis HI, KL, æquè à meridiana remota rectis cõiuncta dabunt horas in plano polari, & vtroque meridiano.

Si igitur primò circulum in 24. æquales partes diuisum in superficiem æquatori æquidistantem, siue 48. gradibus hic Romæ eleuatam transtuleris; habebis horologium æquinoctiale ad horas monstrandas dispositum, si priùs in centro eius styli indeterminate quantitatis ὀρθογώνως erexeris. Demonstratio ex ipsa constructione notior est, quàm vt dici debeat. Nota tamen, hoc horarium duplex esse, inferius, & superius. In inferiori monstrat horas Sole in australibus; in superiore Sole

*Æquinoctiale horologium.*

in boreis signis constituto; numerus horarum in inferiori erit inuersus, & contrapositus horis superioris.

Secundò, si parallelogrammum HKIL vna cum parallelis horarum lineis supra planum circulo horæ sextæ parallelum, siue, quod idem est, supra axem mundi, ita applicaueris, vt id rectè austrum respiciat; stylus autem in E hora 12. tantæ altitudinis, quantæ DB est, normaliter erectus fuerit: monstrabit id horas à meridie, & media nocte in plano polari quæsitas. Huius demonstrationem dedimus in Protheoria 3. propos.

*Horarium polare.*

Tertio, si parallelogrammum RSIL, portionem parallelogrammi HKIL, transtuleris in superficiem meridiam orientali plano parallelam, ita vt lineæ horæ sextæ lineæ CA in triangulo gnomonico, iuxta cuius situm erigi debet, exactè respondeat, stylusque ex E quantitatis BD trianguli normaliter erectus fuerit; ostendet is in plano meridiano horas à media nocte quæsitas. Ratio longè facillima per se patet.

*Meridianum Orientale.*

Quartò, si verò PQHK quadrangulum, portionem parallelogrammi HKIL, in occidentalem plani meridiani superficiem transtuleris supra triangulum CDA, ita vt lineæ horæ sextæ axi mundi (quem ABC, trianguli linea refert) congruat; stylusque vt prius ex E normaliter quantitatis BD, erectus fuerit, monstrabit is in dicto plano horas à meridie.


*Meridianum Occidentale.*

Quintò, si horologium VOX cum horis suis plano horizontali lineis quantumuis extensis intuleris, ostendet gnomon in eo normaliter erectus horas à meridie, & media nocte quæsitas. Locus autem styli, & altitudo eius ita habebitur. Transfer in triangulo gnomonico CBD, spaciū inter CS, ex centro horologij B, in lineam meridianam in punctum S, eritque id locus styli, altitudo verò SB.

*Horizontale.*

Sextò, si denique plano verticali horologium SGT intuleris, monstrabit gnomon in eo horas à meridie, & media nocte. Ita autem inuenietur locus, & altitudo gnomonis: in triangulo ABD gnomonico, AT spaciū transferatur ex A, centro horologij in lineam meridianam, & terminus lineæ ostendet locum gnomonis; longitudinem verò eius indicabit BT linea. Rationes singulorum, cum clarissime sint, & ab omnibus horologiographis demonstratæ; consultò omittimus, ne in re nullius difficultatis tempus teramus.

*Verticale.*



Si præterea horologium horizontale, & verticale vnico stylo obliquo horoditicum desideres; ita operare. Si planū horizontale GFDE, verticale HKFG, filum ID per vtriusque horologij centrum ID ductum, dabit quæsitum. Ratio dependet à triangulo NAO, cuius angulus A altitudinem poli arcus HC, 42. grad. O, verò angulus complementum eius continet.

**Problema II.**


*Dictas horas à meridie, & media nocte, in dictis planis, vnica circuli apertura dicto citius expedire.*

**Pragmatia I.**

*Æquinoctialis horologij descriptio vnica circuli apertura.*

Primò, si horologium plani æquinoctialis delineare desideras vnica apertura; ducantur in plano dato duæ lineæ ad se normales IA, HG, ex quarum communi interseccionis puncto ducatur circulus cuiusuis magnitudinis IGAH; deinde

eadem apertura sexies ex A in ambitum circuli ducta diuidet circulum in sex partes. Secundo, iterum vno crure circini posito in puncto H, vel G, alia sex puncta in ambitu signentur, eritque circulus diuisus in 12. partes. Tercio, posito circini pede in A, & F, ite in A, & H, punctis arcus occulti describantur, per quorū intersectio-



nem ex B centro lineæ ductæ secabunt arcum AF, in S: AH, in O. Posito igitur inuariati circini pede in S, altero imprime puncta in ambitu circuli, eritque circulus in octodecim partes diuisus: deinde posito in O, inuariato circino totidem puncta imprimes in circumferentia, & erit circulus diuisus in 24. partes æquales, cui per puncta diuisionum lineæ ductæ dabunt horas à meridie, & media nocte. Ordo horarum, & ratio styli, fitulque eius non differet à præcedenti descriptione.

**Pragmatia II.**

*Horas à meridie, & media nocte, in horologio polari vna & eadem apertura circini ita describes.*

**P**rimò, ex quouis puncto lineæ æquinoctialis GH, v. g. ex B interuallo quantitatatis styli describatur circulus AGHI, cuius semiperipheriâ inferiorem GAH, eadem apertura ex punctis H, & G, in sex partes diuides, vti in præcedenti operatione factum est.

Secundò, si itaque per puncta sectionum GFHI, ex I, & A, veluti centris denuo rctas occultas duxeris, habebis puncta in æquinoctiali XY, per quæ parallelæ ad meridianam ductæ dabunt horas quæsitas. Horas igitur vnica apertura descripsimus in plano polari, quod erat faciendum. Cum verò meridianum horologium solo horarum ordine discrepet à polari, fiet polare meridianum orientale, si duodecimæ adscripseris sextam, & horæ vnde cimæ septimam, decimæ octauam, & sic de cæteris, vt in præcedenti inscriptione patet. Occidentale verò fiet, si duodecimæ sex adscripseris; primæ quintam, secundæ quartam; &c.

**Aliter.**

**P**rimò, styli magnitudo vtrinque ex puncto B, in lineam GH translata dabit duas horas 3. & 9.

Secun-

Secundò, spacium IA, translatum ex alterutro puncto I, vel A, in lineam XY, vtrinque dabit 4. & 8.


Tercio, hoc idem spacium IA, ex punctis 4. & 8. vtrinque versus X, & Y, translatum dabit 5. & 7.

Quartò, hoc idem spacium IA ex puncto 4. versus B translatum dabit 11. & ex puncto octauæ horæ versus B translatum dabit horam primam. Secundam, & decimam dabit tertia pars lineæ B4. & B8. Demonstratio horum in sequentibus patebit. Porro si per puncta horarum in linea XY inuenta, ad meridianam IA parallelas duxeris; habebis horas à meridie, & media nocte descriptas. Demonstratio- nem vide in vltima operatione huius.

**Pragmatia III.**

*Horologij verticalis vna circini apertura descriptio.*

**S**it triangulum gnomonicum ABCD, applicatum lineæ meridianæ in punctis A & D: ad AV erigatur normalis EF, in puncto D. Hoc facto horas vna & eadem circuli apertura ita reperies. Ducatur primùm circulus interuallo DB, qui secabit



æquinoctialem EF in punctis 9. & 3. Diametrum huius circuli ex V vtrinque in lineam EF transferes, & habebis horas 8. & 4. Ex punctis autem 8. & 4. eadem diameter in eadem linea vltius translata 7. & 5. dabit; hæc eadem ex punctis 8. & 4. versus meridianam translata dabit 11. & 1. Restant puncta 10. & 2. quæ ita inuenies. Ex LN punctis interuallo semidiametri DB, fiant in circumferentia puncta S, & A, per quæ ex V rectæ ductæ secabunt EF, in punctis 10. & 2. Si igitur ex A per inuenta puncta rectæ agantur, prodibit horologium, quod quærebatur. Vel breuius aliter; Superior, vel inferior semicircumferentia, vti paulò ante factum est, diuidatur in sex æquales partes, per quæ ex punctis L.V rectæ ductæ secabunt æqui-


æquinoctialem EF in punctis; per quæ iterum ex A centro horologij rectæ ductæ dabunt horas quæfitas.

**Pragmatia IV.**

*Horologij horizontalis descriptio unica circuli apertura.*

**S**it triangulum gnomonicum congruenter applicatum lineæ meridianæ, quam NV, orthogonôs secet in puncto A.

Primò, ex A, interuallo AB, circulus describatur; dico hunc circulum in lineâ VN æquinoctiali refecare horam 3. & 9. Cùm enim AG æqualis sit rectis A9. & A3; erunt anguli AS9. & A9S, æquales; sunt enim æquales vni recto, ergo vterque femirectus erit, hoc est 45. graduum, ac proinde 3. horas à meridie complectitur. Rectè ergo dictus circulus in VN abscindet 9. & 3. horas.



Secundò, diameter dicti circuli ex S in NV, lineam vtrinque translata dabit horam 8. & 4. quod ita ostendo. Quoniam enim diameter dupla est AB, id est AM, erit ex hypothesi M8. & M4. Sive quod idem, S8. & S4. quoque duplæ lineæ AB, siue AM. & cùm 7. & 8. 60. gradibus, id est quatuor horis distent à meridie, anguli verò AM8. & AM4. totidem gradus comprehendant, patet lineas M8 & M4 rectè in VN, secare 4. & 8. horas.

Tertiò, si porrò diametrum MS, siuè ei æqualem M8 vltèrius in lineâ NV, ex punctis horarum 8. & 4. transferas, refecabit illa tibi horas 5. & 7. Cùm enim M5 angulum EM4 biseceat, erit angulus AM5 consequenter 75. graduum, quæ 5. horas ante meridiem complectuntur. Idem dicendum de 5. post meridiem. Rectè igitur assignauimus 5. & 7. Si iterum ex 4. & 8. diametrum MG versus meridiem transtuleris, offerent sese puncta 1. & 11. Restât igitur inquirèdæ horæ 10. & 2. quas habebis, si per S in quadrâte M9. vel per P in arcu M3. ex G, vel M, rectas duxeris, occultas; eæ enim NV lineam in punctis 10. & 2. secabunt; est enim hora 2. & 10.

tertia

tertia pars lineæ A8. vel A4. Si igitur ex D per puncta in NV, inuenta rectas duxeris, habebis horologium horizontale. Quòd si interualla inter S, & puncta horarum imparium ex ipsis punctis imparium horarum transferas in vtramque partem; habebis puncta mediarum horarum. Quadrantes quoque horarum habebis, si interuallum inter punctum cuiusuis semihoræ, & punctum S, hinc inde transferas; quæ omnia praxis ipsa clariùs docebit. Vel breuius: Pro semihoris diuidatur semicirculiferentia alterutra in 12. partes æquales; per quæ si ex punctis MS rectas occultas duxeris, secabunt eæ æquinoctialem NV in punctis, per quæ ex D rectæ ductæ medias horas assignabunt. Si verò semiperipheriam in 24. partes diuiseris, & ex punctis MS, per eæ rectas duxeris, dabunt illæ in lineâ NV quartas partes horarum.

*Dimmodo quadrantes horarum habeantur.*

**Problema III.**

*Horas à meridie, & media nocte, in quinque regularibus planis per Tangentes describere.*

**Pragmatia I.**

*Æquinoctialis descriptio.*

**A** Equinoctialis horologij constructio, cùm omnium facillima sit, nihilque aliud quam circulus in 24. partes æquales diuisus hic aliam à præcedente diuersam tradere nolui. Quare ad polare describendum nos conuertamus.

**Pragmatia II.**

*Polaris horologij per Tangentes delineatio.*

*Pro Meridiano Orientali, & Occidentali.*

AM Tangentes PM

|               |       |               |
|---------------|-------|---------------|
| 4             | 5 77  | 8             |
| $\frac{1}{2}$ | 4 14  | $\frac{1}{2}$ |
| 5             | 2 68  | 7             |
| $\frac{2}{3}$ | 1 31  | $\frac{2}{3}$ |
| 6             | 0 0   | 6             |
| $\frac{1}{2}$ | 1 31  | $\frac{1}{2}$ |
| 7             | 2 68  | 5             |
| $\frac{1}{2}$ | 4 14  | $\frac{1}{2}$ |
| 8             | 5 77  | 4             |
| $\frac{1}{2}$ | 7 67  | $\frac{1}{2}$ |
| 9             | 10 00 | 3             |
| $\frac{2}{3}$ | 13 03 | $\frac{2}{3}$ |
| 10            | 17 32 | 2             |
| $\frac{1}{2}$ | 24 54 | $\frac{1}{2}$ |
| 11            | 37 32 | 1             |
| $\frac{1}{2}$ | 75 95 | $\frac{1}{2}$ |


**D**vplex est polare, superius, & inferius. Superius Zenith, siue Austrum; inferius Nadir, & Boream respicit. Vtrumque vnum & idem est, sola differentia consistit in inuerso numerorum ordine, vt in figura apparet.

Dato igitur stylo AB, in decem partes diuiso, quarum vnaqueque iterum in alias decem, vel centum partes censetur esse subdivisa, ita vt stylus 100. aut 1000. partium sit, subsidio tabulæ hic appositæ ita harum puncta inuenies. Accipe styli quantitatem, eamque in lineam AH aliquoties diuisam transfer.

Deinde ex tabula acceptas tangentes horis correspondentes ex B in lineam XY transfer; per hæc enim si parallelas ad IA duxeris, habebis horologium polare descriptum. Ratio huius rei est, quia, cùm æquinoctialis ad polare planum recta sit; erunt hectemorij radij æquinoctialis in planum proiecti necessariò puncta horarum. Quoniam verò hectemorij radij ad meridianam comparati, angulos distantie Solis à meridie singulis horis

*Horologii polaris descriptio per tangentes.*

ris



ris efficiunt, dabunt eorum tangentes necessariò puncta horarum in equatorem projecta.

*Scholium circa tabellas Tangentium.*

*Nota in tabula tangentium.*

**N**Os, cum omnes tabellas tangentium ordinemus ad stylium in 1000. partes diuisum; ne cogamur lineam quamlibet stylo respondentem in 1000. partes diuidere; primos tantum numeros, id est illos, qui dempti ex quouis tangente remanent, adhibendos existimauimus, ita vt dempti loco sectionum sint: ita tangens horæ 11. & 1. est 267. à quo dempti duo numeri 67. relinquunt 2. Si igitur in stylo accipiantur duæ partes, & adhuc  $\frac{1}{100}$ . id est 67. partes vnus ex 10. in 100. partes diuisas, dabit tibi idem punctum, quod daretur, si stylium in 1000. equales partes diuisisses, & hinc 267. partes pro tangente horæ 1. & 11. assumpsisse. Quæ omnia diligenter notes velim. Vtemur enim hac methodo in omnibus sequentibus tabellis.


Cum igitur polaria, & meridiana vniuersalia sint, & per vniuersum mundum, si horarum spectes discrimina, eadem sint; erunt tabule quoque vniuersales toti mundo, & vtrique communes. Sicuti præterea in polaribus inuentionem punctorum ordiris à communi puncto meridiani, & æquinoctialis; ita in meridiano horologio eandem à communi puncto lineæ horæ sextæ, atque æquatoris vtrique in æquinoctialem transferendo tangentes, habebisque tam polaria, quam meridiana ope sinuum confecta.

**Pragmatia III.**

*Horology verticalis, & horisontalis per Tangentes constructio.*

**S**it triangulum Gnomonicum ADB verticalis plano applicatum, cuius diameter æquinoctialis DB in 10. 100. vel 1000. partes sit diuisa; id est, sit sinus totus. Si igitur ex tabula sinuum tangentes horarum cum semissibus earundem in partibus DB, ex puncto D, in lineam æquinoctialem transfuleris, & ex centro A per tangentium extrema puncta rectas duxeris; habebis horologium verticale.

Iterum



*Pro horologii Horizon, & Verticalibus Polaribus.*


| AM Tangentes PM |         |               |
|-----------------|---------|---------------|
| 12              | 0 0     | 12            |
| $\frac{1}{2}$   | 1 31    | $\frac{1}{2}$ |
| 11              | 2 67    | 1             |
| $\frac{1}{2}$   | 4 14    | $\frac{1}{2}$ |
| 10              | 5 77    | 2             |
| $\frac{1}{2}$   | 7 67    | $\frac{1}{2}$ |
| 9               | 10 00   | 3             |
| $\frac{1}{2}$   | 13 03   | $\frac{1}{2}$ |
| 8               | 17 32   | 4             |
| $\frac{1}{2}$   | 24 14   | $\frac{1}{2}$ |
| 7               | 37 32   | 5             |
| $\frac{1}{2}$   | 75 95   | $\frac{1}{2}$ |
| 6               | infini. | 6             |

Iterum si horologium horizontale desideres, fit triangulum gnomonicum pro plano horizontali D B A, sitque diameter æquinoctialis AB, diuisa in 10.00. partes æquales, id est, assumatur pro sinu toto linea AB. Si igitur ex A, vtrique in æquinoctialem VN, tangentes horis, & semissibus, quadratibusque horarum respondentes transfuleris, & per inuenta horarum puncta ex D centro horologii rectas duxeris, habebis horas à meridie, & media nocte in plano horizontali quæstas.

*Alius modus describendi horisontalia, & verticalia.*

**D**Escripito circulo aliquo ABCD, cuius AB sit meridiana; CD, verticalis primarij; describes ex tabula sequenti horologium vrrunque, vt sequitur. Accipe gradum eleuationis poli,

videlicet 42. gradus; deinde numera à puncto B, 10.9. & 10. min. vtrunque; per hosce enim ex cetro linea ducta dabit horam 1. & 11. pro hora 2. & 10. ab eodem B numera 21. grad. 7. minut. & ex centro per eos recta ducta dabit horam 2. & 10. & sic de ceteris procedendum. Pro verticalibus accipies numeros eleuationibus poli datas correspondentes in opposito latere, vt titulus docet.





*Tabula arcuum horizontalium inter meridianum, & verticalem  
 primarium interceptorum pro horologijs horizontalibus, &  
 verticalibus ad 21. elevationes poli sup. putata.*

|    | 12 |   | 1  |    | 2  |    | 3  |    | 4  |    | 5  |    | 6  |   |    |
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|    | G  | M | G  | M  | G  | M  | G  | M  | G  | M  | G  | M  | G  | M |    |
| 35 | 0  | 0 | 8  | 43 | 18 | 18 | 29 | 49 | 44 | 49 | 64 | 35 | 90 | 0 | 55 |
| 36 | 0  | 0 | 8  | 57 | 18 | 46 | 30 | 32 | 45 | 30 | 65 | 29 | 90 | 0 | 54 |
| 37 | 0  | 0 | 9  | 10 | 19 | 9  | 31 | 2  | 46 | 11 | 66 | 0  | 90 | 0 | 53 |
| 38 | 0  | 0 | 9  | 22 | 19 | 34 | 31 | 37 | 46 | 50 | 66 | 29 | 90 | 0 | 52 |
| 39 | 0  | 0 | 9  | 33 | 19 | 58 | 32 | 11 | 47 | 28 | 66 | 55 | 90 | 0 | 51 |
| 40 | 0  | 0 | 9  | 45 | 20 | 21 | 32 | 44 | 48 | 7  | 67 | 21 | 90 | 0 | 50 |
| 41 | 0  | 0 | 9  | 57 | 20 | 44 | 33 | 16 | 48 | 39 | 67 | 47 | 90 | 0 | 49 |
| 42 | 0  | 0 | 10 | 10 | 21 | 7  | 33 | 46 | 49 | 12 | 68 | 11 | 90 | 0 | 48 |
| 43 | 0  | 0 | 10 | 22 | 21 | 29 | 34 | 18 | 49 | 44 | 68 | 33 | 90 | 0 | 47 |
| 44 | 0  | 0 | 10 | 32 | 21 | 51 | 34 | 47 | 50 | 16 | 68 | 54 | 90 | 0 | 46 |
| 45 | 0  | 0 | 10 | 43 | 22 | 12 | 35 | 17 | 50 | 46 | 69 | 15 | 90 | 0 | 45 |
| 46 | 0  | 0 | 10 | 54 | 22 | 33 | 35 | 44 | 51 | 15 | 69 | 35 | 90 | 0 | 44 |
| 47 | 0  | 0 | 11 | 5  | 22 | 53 | 36 | 11 | 51 | 42 | 69 | 53 | 90 | 0 | 43 |
| 48 | 0  | 0 | 11 | 17 | 23 | 13 | 36 | 37 | 52 | 9  | 70 | 11 | 90 | 0 | 42 |
| 49 | 0  | 0 | 11 | 25 | 23 | 33 | 37 | 3  | 52 | 35 | 70 | 28 | 90 | 0 | 41 |
| 50 | 0  | 0 | 11 | 35 | 23 | 52 | 37 | 28 | 53 | 0  | 70 | 43 | 90 | 0 | 40 |
| 51 | 0  | 0 | 11 | 45 | 24 | 9  | 37 | 52 | 53 | 24 | 70 | 59 | 90 | 0 | 39 |
| 52 | 0  | 0 | 11 | 55 | 24 | 27 | 38 | 15 | 53 | 46 | 71 | 13 | 90 | 0 | 38 |
| 53 | 0  | 0 | 12 | 5  | 24 | 43 | 38 | 37 | 54 | 8  | 71 | 28 | 90 | 0 | 37 |
| 54 | 0  | 0 | 12 | 13 | 25 | 2  | 38 | 58 | 54 | 29 | 71 | 41 | 90 | 0 | 36 |
| 55 | 0  | 0 | 12 | 22 | 25 | 18 | 39 | 19 | 54 | 49 | 71 | 54 | 90 | 0 | 35 |

Altitudines poli pro Horizontalibus.

Altitudines poli pro Verticalibus.

*Nota.*

**S**i utriusque horologii tam horizontalis, quam verticalis ex hac tabula constructi centra F, G, filo coniunxeris; ostendet id axi mundi congruum tam in plano horizontali BA, quam verticali BC, horas quaesitas; eritque in plano utroque linea meridiana GF, & EF.



CA.

**CAPVT III.**

*De horolabijs declinantibus à meridie, seu verticali primario.*

**Pronunciatum I.**



**M**ne horologium verticale, alicubi est horizontale, & contra.  
 II. Omne horologium declinans à verticali, alicubi est horologium horizontale, & verticale.  
 III. Omne horologium inclinatum est alicubi horizontale, & verticale.  
 IV. Omne horologium declinans ab horizonte, est aliquod horologium declinans à verticali, & consequenter alicubi horizontale, ita ut omnia horologia in omnibus horologijs contineantur. Quænam autem sint horologia horizontalia, seu ad quam elevationem poli constituenda sint, pulchrè docet triangulum gnomonicum supra planum declinans, aut inclinans. Rem exemplo declaro. Horologium sub sphaera recta horizontale, sub polo est verticale rectum, & declinans: in plano polari ubique est inclinans ad horizontem: in meridiano plano est ab horizonte declinans 90. grad. in plano polari 45. grad. inclinante, & declinante. Mistum est, ex inclinante, & inclinato compositum. Idem de vnoquoque alio horizontali dicendum est.  
 Si quis igitur horizontale, aut verticale rectum constituere sciuerit, omnia reliqua declinantia, & inclinantia nullo pene negotio describere poterit. Totum negotium quatuor problematis resoluemus.

**Problema IV.**

*Horas à meridie, & media nocte in horologio à verticali declinante describere.*

**Q**uatuor in hoc negotio scitu necessaria requiruntur. Primò muri declinatio; Secundò linea indicis, siue meridianus horatij declinantis. Tertio æquinoctialis situs. Quarto triangulum gnomonicum supra planum declinans, cuius ope postea horæ sicuti in reliquis horologijs horizontalibus describantur. Primò singula geometricè, deinde arithmeticè inuenire docebimus.


**Pragmatia I.**

**D**escribantur duæ lineæ in plano quopiam declinante in E, ad rectos sese intersecantes ABCD. Sitque declinans planum Austrinum à meridie in ortum 30. grad. cuius complementum 60. graduum eius à vertice primario declinatio. Primò ex E arcus circuli quolibet intervallo ducatur, in quo numerabis declinationem plani. Sit arcus HF declinatio muri, si is in ortum: HG verò arcus, declinatio eiusdem, si is in occasum declinauerit. In plano verò boreali declinatio à meridie in ortum erit IL. in occasum I K, contrario priori situ.

I. His igitur præmissis, transferatur ex E in N, tangens elevationis poli Romani 42. grad. eritque N centrum horologii, & ex E in M, tangens complementi eiusdem. Est autem tangens 42. grad. 9. 00. tangens 48. complementi 11. 11.

Yy 2 II. Tan-

II. Tangentem EM ex E transferes in EF lineam declinationis muri, scilicet in O, & hinc ad CD, erecta normalis in P, dabit punctum, per quod ex N centro horologij recta dabit lineam styli, seu meridianum plani declinantis, supra quam triangulum gnomonicum fundandum est.



III. Ad lineam styli NPV, in P, normalis ducta assignabit æquatorem QR, in plano declinante.

IV. In linea QR, ex P, versus Q, determinetur linea PG, æqualis PO, dabitque punctum G coniunctum puncto N, axem mundi supra planum; normalis verò ad NG, videlicet SP, diametrum æquatoris, & normalis ST, gnomonem, eiusque in T locum, eritque triangulum gnomonicum supra planum præparatum.


V. Si itaque PS in lineam styli traduxeris, atque ex puncto terminationis V circulum cuiusvis magnitudinis descriperis, refecabit is in 24. æquales partes diuisus lineam QR, æquinoctialem in punctis, per quæ ex N centro lineæ rectæ ductæ dabunt horas à meridie, & media nocte in dato plano declinante quæstas (initium numerorum faciendò à puncto X, in quo videlicet linea EB, & æquinoctialis se interfecant, vt Schema docet: quod bene notandum.)

Pragmatia II.

Declinantium à verticali per Tangentes descriptio omnium facillima.

I. Sit igitur recta AB, utcumque ducta pro horizontali; in qua locus styli eligatur C, sitque normalis CD stylo æqualis. Sumptis autem in qualibet recta seorsim quotcumque segmentis, CD æqualibus, & primò quidem segmento in 10. partes æquales diuiso, accipiatur tangens muri declinantis à meridie in ortum 30.grad. (Tangens 30.grad.est part.styli 5.77.min.) & transferatur à C: loco styli dextrorsum, si in ortum; sinistrorsum; si in occasum declinauerit; in horizontem AB, signatoque puncto terminationis B, accipe tangentem complementis declinationis muri, videlicet 60.grad. quæ respectu styli in 1000. partes diuisi est partium 17.min.74.eamque ex C in A contrariam partem B transferas, eritque B punctum

etum lineæ meridianæ, A communis intersectio horizontalis, æquinoctialis, & lineæ horæ sextæ.



II. Hoc peracto in linea meridianæ EBF, à B, versus N, determinetur tangens altitudinis poli 42. grad. 900. partium, ut dictum est. Tangens complementi elevationis poli 11. 11. in partibus styli, & in eadem versus F, tangens elevationis æquatoris 48.grad. eritque E centrum horologij, F vero punctum in meridianæ, per quod ex A linea ducta dabit æquinoctialem AF, ad quam ex E, centro horologij normalis EK, ducta dabit in horologio lineam styli, siue meridianum proprium in plano declinante, quæ, si erratum non est, necessariò per locum styli transire debet, eo quod meridianus eius ad horologium rectus per stylum erectum, & E centrum transeat. Si porro ad hanc lineam styli ex loco C, normalis CZ, erigatur æqualis stylo, dabunt rectæ ex E, & K; per Z; ductæ triangulum gnomonicum EZK, supra planum declinans datum, & linea sexta erit recta EA, per centrum E, & A, educta.

III. His ita præparatis, duplici ratione ei horæ inscribi poterunt; prima in linea horizontali per tangentes: altera per tangentes horarum distantiarum à meridie in æquinoctiali.

Prior ratio ita se habet: transfer à loco styli C tangentes horarum 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. in lineam horizontalem versus dextram; tangentes autem linearum 9. 8. 7. 6. 5. versus sinistram. Si enim ex E rectas per puncta lineæ horizontali impleta duxeris, habebis horologium declinans quæsitum. Si vero in occasum declinauerit, eadem prorsus distantia vsurpari debent; sed horæ in earum complementa vsque ad 12. commutari debent; & quarum distantia à loco styli versus dextram vergebant, earum complementa distantias habent versus dextram, & contra.

Ratio calculi. distabulas.

Qua ratione autem quilibet sibi tabulas pro horologijs declinantibus constitue-  
re proprias suæ regionis possit, sic accipe.

*Tabella distantiarum horariarum à loco styli in horizontali linea.*

|                    |    |    |    |         |                    |    |    |    |         |
|--------------------|----|----|----|---------|--------------------|----|----|----|---------|
| Ad dextram styli   | H  | G  | M  | Tägêtes | Ad dextram styli   | H  | M  | G  | Tägêtes |
|                    | 12 | 30 | 0  | 5 77    |                    | 12 | 30 | 0  | 5 77    |
| Ad sinistram styli | 11 | 19 | 50 | 3 61    | Ad sinistram styli | 1  | 40 | 10 | 8 44    |
|                    | 10 | 8  | 53 | 1 56    |                    | 2  | 53 | 7  | 12 40   |
| Ad dextram styli   | 9  | 3  | 47 | 0 66    | Ad dextram styli   | 3  | 63 | 47 | 20 31   |
|                    | 8  | 19 | 13 | 3 49    |                    | 4  | 79 | 13 | 52 50   |
| Ad sinistram styli | 7  | 38 | 11 | 7 86    | Ad sinistram styli |    |    |    |         |
|                    | 6  | 60 | 0  | 17 32   |                    |    |    |    |         |
| Ad dextram styli   | 5  | 81 | 8  | 64 10   | Ad dextram styli   |    |    |    |         |
|                    |    |    |    |         |                    |    |    |    |         |

I. Excerpe ex tabula arcuum horizontalium supra problem. 3. pragm. 3. pro-  
posita, gradus arcuum singulis horis respondentium, vel complementa eorum sub  
data latitudine loci.

II. Si horologium in ortum respexerit, adde declinantis muri gradibus arcus  
horarum pomeridianarum: si verò in occasum respexerit, declinantis muri gradus  
ab arcubus horarum ante meridiem subtrahes, vel ipsos arcus ab ipsa declinatio-  
ne muri, si scilicet ipsi minores hac fuerint. Horum additorum, vel subtractorum  
tangentes in tabulas rediges, vt in præcedente tabula nos fecisse vides: & hac arte  
ad quamuis loci latitudinem tabulas construere poteris.

Altera ratio per tangentes distantiarum horariarum à linea styli in æquinoctia-  
li, expeditur ope tabellæ sequentis.

*Tabella distantiarum horariarum à linea styli in Æquinoctiali.*

Ad dextram lineæ styli.

|                            |       |       |       |      |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Horæ<br>ante me-<br>ridiem | 12    | 11    | 10    | 9    | 8     | 7     | 6     | 5     |
|                            | G M   | G M   | G M   | G M  | G M   | G M   | G M   | G M   |
|                            | 40 48 | 25 48 | 70 48 | 4 12 | 19 12 | 34 12 | 49 12 | 64 12 |
| Tägêtes                    | P M   | P M   | P M   | P M  | P M   | P M   | P M   | P M   |
|                            | 8 63  | 14 71 | 1 91  | 0 73 | 3 48  | 6 80  | 11 59 | 20 69 |

|                            |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Horæ<br>post me-<br>ridiem | 12    | 1     | 2     | 3     |
|                            | G M   | G M   | G M   | G M   |
|                            | 41 48 | 55 48 | 70 48 | 85 48 |
| Tägêtes                    | P M   | P M   | P M   | P M   |
|                            | 8 63  | 14 71 | 28 72 | 36 17 |

Ad sinistram lineæ styli.

Si

Si ex K puncto, vbi linea styli æquinoctialem intersecat vtrique in æquino-  
ctialem, harum tangentes horarum respectu sinus totius ZK, transfuleris, habebis  
puncta, per quæ ex centro E, lineæ ductæ conficiet horarium quæsitum.

Conficitur autem tabula hæc, si declinationi lineæ styli ab hora 12. Semper ad-  
dideris 15. gradus in horis post meridiem; in horis verò antemeridianis subtra-  
xeris 15. habebis gradus, quorum tangentes in tabulam rediges, vt hic factum  
vides.

**Problema V.**

*Horas à meridie, & media nocte in plano inclinato ad  
horizontem describere.*

Planum inclinatum duplex est, superius, & inferius, vt in protheoria 2. osten-  
dimus. Ita autem inclinatum ad horizontem perficies. Vide in tabula se-  
quenti, cuius latitudinis horologium horizontale respondet gradibus inclinati  
plani ad horizontem; ad huiusmodi enim latitudinem horizontale descriptum,  
dabit inclinatum ad horizontem superius; inferius autem continebit horas post  
vtramque sextam residuas.

Si itaque planum aliquod inclinaret ad horizontem 15. gradibus, vide in tabu-  
la ad eleuationem Romani poli condita, in columna inclinationum grad. 15. &  
huic respondentem inuenies numerum 27. quæ est latitudo regionis, sub qua ho-  
rologium horizontale constructum dabit inclinatum ad horizontem, quæsitum.  
Fit autem tabula hac ratione: vel plani inclinatio æqualis est eleuationi poli, vel  
minor, vel maior: Si æqualis, erit horologium polare; si minor sit, subtrahere incli-  
nationem ab eleuatione poli, & reliquum dabit latitudinem; sub qua horizontale  
constructum, sit desideratum inclinatum. Si verò inclinatio maior sit eleuatione  
poli, eleuatio poli ab inclinatione subtracta dabit latitudinem quæsitam horologii  
horizontalis. Si igitur scire velis, cuius latitudinis horologium horizontale re-  
quirat, subtrahere inclinationem ab 42. eleuat. poli Rom. & residuum dabit latitud.  
eius quæsitam, videlicet 11.

*Constructio ta-  
bula.*

*Tabula, in qua datis gradibus inclinati horologii, dicto citius  
habetur latitudo regionis, sub qua horizontale descriptum  
inclinato dato æquipollet.*

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. | incl. lat. |
| 1 41       | 11 31      | 21 21      | 31 11      | 41 1       | 51 9       | 61 19      | 71 29      | 81 39      |            |
| 2 40       | 12 30      | 22 20      | 32 10      | 42 0       | 52 10      | 62 20      | 72 30      | 82 40      |            |
| 3 39       | 13 29      | 23 19      | 33 9       | 43 1       | 53 11      | 63 21      | 73 31      | 83 41      |            |
| 4 38       | 14 28      | 24 18      | 34 8       | 44 2       | 54 12      | 64 22      | 74 32      | 84 42      |            |
| 5 37       | 15 27      | 25 17      | 35 7       | 45 3       | 55 13      | 65 23      | 75 33      | 85 43      |            |
| 6 36       | 16 26      | 26 16      | 36 6       | 46 4       | 56 14      | 66 24      | 76 34      | 86 44      |            |
| 7 35       | 17 25      | 27 15      | 37 5       | 47 5       | 57 15      | 67 25      | 77 35      | 87 45      |            |
| 8 34       | 18 24      | 28 14      | 38 4       | 48 6       | 58 16      | 68 26      | 78 36      | 88 46      |            |
| 9 33       | 19 23      | 29 13      | 39 3       | 49 7       | 59 17      | 69 27      | 79 37      | 89 47      |            |
| 10 32      | 20 22      | 30 12      | 40 2       | 50 8       | 60 18      | 70 28      | 80 38      | 90 48      |            |

Ex quibus patet, polare horologium esse vnum ex inclinatis. Si verò hoc  
polare declinat à circulo lineæ horæ sextæ ad axem rectum, erit id declinans si-  
mul,

mul, & inclinatum. Si itaque declinauerit ab horæ sextæ circulo 15. gradus in Ortum, hoc casu eadem manebunt linearum interualla. Stylus quoque quoad lineas eundem semper locum obtinet; hora tantum mutatur. Si igitur, uti assumpsimus, planum hoc 15. in Ortum gradibus declinauerit; lineæ per centrum styli traſeunt, non 12. ut in polari, sed 11. vnam videlicet horâ anticipantē adſcribes. Si in Occasum declinauerit quindecim gradibus, mediæ lineæ styli apponatur numerus horæ primæ, & sic conſequenter. Si verò triginta gradus in Ortum, vel Occasum declinauerit, erit mediæ lineæ styli, illi decima, huic ſecunda adſcribenda. Si declinauerit 45. erit mediæ lineæ Orientem reſpiciens 9. Occasum verò 3. & ſic viſque ad ſextam, iuxta tabellam ſequentem.

*Quomodo ſimilè inclinans ſimilè, & inclinatum horologium fiat.*

|                                                                               | G  | H  | H  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                               | 07 | 12 | 12 |
| Si polare declinauerit à circulo horæ sextæ ſemper ad axem reſectum gradibus. | 15 | 11 | 1  |
|                                                                               | 30 | 10 | 2  |
|                                                                               | 45 | 9  | 3  |
|                                                                               | 60 | 8  | 4  |
|                                                                               | 75 | 7  | 5  |
|                                                                               | 90 | 6  | 6  |

Atque ex hac tabula in plano polari à circulo horæ sextæ ſuper axem mundi declinante impoſitis gradibus, diſto citius horologium declinans, & inclinatum ſimilè conſtrui poterit. Si enim verbi gratia 30. in Ortum declinauerit, appones mediæ lineæ horam 10. ſequenti 11. deinde 12. 1. 2. 3. 4. Si verò Occasum reſpexerit, mediæ lineæ 1. ſequenti 2. & deinde 12. 1. 2. & ſic de cæteris. Quæ cum facilia ſint, vltiorem explicationem non requirunt.

**Problema VI.**

*Horas à meridie, & mediæ nocte, in plano ab horizonte declinante deſcribere.*


**C**um horologia deſcribere ab horizonte declinantia, nihil aliud ſit, quam ſub complemento latitudinis loci, ſub qua horologium conſtruendum eſt, deſcribere declinans à verticali tot gradibus, quot declinans ab horizonte declinat gradibus; omnia tibi vnica ſequentis tabulæ ſynopſi repræſentamus.

|                                      | G  | G  | G  | G  |
|--------------------------------------|----|----|----|----|
| Sub latitudine, ſeu eleuatione poli. | 10 | 10 | 10 | 80 |
|                                      | 20 | 20 | 20 | 70 |
|                                      | 30 | 30 | 30 | 60 |
|                                      | 40 | 40 | 40 | 50 |
|                                      | 50 | 50 | 50 | 40 |
|                                      | 60 | 60 | 60 | 30 |
|                                      | 70 | 70 | 70 | 20 |
|                                      | 80 | 80 | 80 | 10 |
|                                      | 90 | 90 | 90 | 0  |

Sit

Sit igitur propoſitum declinans ab horizonte 10. gradibus ſub latitudine 10. grad. cuius complementum 80. grad. conſtruere oporteat. Sub hac igitur eleuatione poli 80. grad. declinans à verticali 10. grad. conſtruendum eſt, ut habeas declinans ab horizonte 10. grad. ita declinans ab horizonte 70. grad. ſub Romana latitudine 42. grad. æquiualeat horologio verticali totidem, id eſt 70. gradibus declinanti ſub latitudine 48. grad. Denuò declinans ab horizonte 70. grad. ſub latitudine 50. æquiualeat horologio declinanti à verticali totidem, id eſt 70. gradibus ſub latitudine 40. prout te tabula docet. Vbi in quarta columna omnia comprehendimus: quarta namq; columna mōſtrat numeros latitudinū, ſub quibus verticale declinans, ab horizonte declinanti æquale horarium conſtrui debeat, ita ut latitudines quarta columna nihil aliud ſint, quam complementa latitudinum primæ columnæ. Qui igitur per Problema IV. nouerit deſcribere verticale declinans, nouerit etiam deſcribere declinans ab horizonte. Verum cum aliqua diuerſitas in triangulo eleuationis poli, & ſitu eius occurrat, breuiter totum negotium declarabo, ne vllus in curioſi Lectoris animo ſcrupulus relinquatur.

I. Repetatur igitur figura Problematis IV. Sitque declinans ab horizonte in Occasum 30. grad. ſub Romana latitudine conſtruendum. in figura loco declinationis à verticali ſumenda eſt declinatio ab horizonte 30. grad. ita ut angulus de-



clinationis muri FEH, ſumatur hic pro angulo declinante plani ab horizonte, infra rectam CD verſus punctum C, ſi planum ſuperius fuerit, & ad Occasum ſpectet: verſus D verò, ſi ſit ſuperius, Ortumque reſpiciat; ſi verò inferius Occasum reſpexerit, angulus declinationis ſupra lineam CD verſus D. Si verò idem Ortum reſpexerit: idem angulus ſupra CD verſus C formandus erit: quod bene notandum.

II. In puncto M, non ut in verticali angulus eleuationis poli ſupra horizontē, ſed complementi eiufdem, angulus ſcilicet 48. grad. conſtituendus eſt, ſiue quod idem eſt, triangulum NEM, inuertendum eſt. His poſitis, in reliquis nulla erit operandi diuerſitas, ab operatione in verticalis declinantis hic propoſiti horologii deſcriptione adhibenda, niſi quòd verticale hic deſcriptum, ut hoſas monſtrare poſſit, ad verticalem primarium rectum iuxta inclinationem eius ad horizontem applicari debet. Ratio dictorū eſt, quod horizon in hoc negotio debet concipi tan-

quam

quam verticalis proprius, & alij circuli positionum ex polis verticalis descripti ab horizonte declinantes instar declinantium à verticali: vnde consequenter eadem erit ab horizonte, & à verticali declinantium descriptio: sicuti enim verticales circuli, quorum communis sectio est axis horizontis ad horizontem, ita se habent circuli maximi positionum ex polis verticalis primarij descripti, quarum communis sectio axis verticalis est, ad ipsum verticalem primarium. Verùm hæc omnia amplius in sequentibus declarabuntur.

**Problema VII.**

*De inclinatis simul, & declinantibus, quorum infinita varietas est.*

**C**um hæc horologia, quorum infinita varietas est, ob multitudinem linearum sint aliquantulum intricata; commodè eorundem construendorum rationem in sequentibus alia ratione, videlicet per observationem docemus.

**C A P V T I V.**

*De Sphæra Gnomonica,*

Seu

*De modo construendi omnis generis horologia per globum, seu sphæram in circulos cœlestes diuisam.*

**Problema VIII.**


*Sphæram gnomonicam construere.*

**I**n Sphæra solida perfectè rotunda, ex assumpto in ea puncto A, pro Polo Boreo describatur maximus circulus B, C, D, eoque in-

trecentas & 60. partes diuiso, per singulas 15. partes, & polum A, describantur 12. magni circuli diuidentes totam Sphæram in 24. partes æquales, eruntque hi circuli horarij concurrentes in A, & E, polis Mundi. Quod si patiat globi magnitudo, semihorarum quoque, & quartarum horæ partium inscribantur circuli, sed colore diuerso, vt facilius ab horarijs discernantur, adijcianturque singulis circulis sui horarum numeri, eritque globus ad vsum paratus.

Superficies planæ, (deijs enim solis hoc loco agimus, omisissis sphæricis cylindricis, & conicis, in quibus horologia passim describuntur) trifariâ diuiduntur.

Prima,



**Prima, & simplicissima superficies est Horizontalis, cui inscriptum horologium ipsum quoque Horizontale seu iacens appellatur.**

Secunda, est superficies perpendicularis, quæ in horizonte ad angulos rectos erigitur. Et hæc triplex est: aut enim erigitur ex orientali linea, quæ meridianam ad angulos rectos secat: aut erigitur ex meridiana linea, quæ orientalem ad rectos secat: aut denique ex intermedia quadam linea inter meridianam, & orientalem.

In prima superficie describitur ex altera parte horologium Meridionale, ex altera Septentrionale.

In secunda describitur ex altera parte horologium Orientale, ex altera Occidentale.

In tertia, quæ ipsa quoque duplex est: aut enim erigitur inter Meridiem & Ortum, aut inter Meridiem & Occalum: describuntur declinantia, vel à Meridie, vel à Septentrione.

Tertia superficies est, quæ non ad angulos rectos Horizonti erigitur, sed angulum quandam inclinationis cum horizonte constituit. Et hæc quoque triplex est.

Aut enim inclinatio fit in lineam meridianam; infimo latere planicie coniuncto cum linea Orientali.

Aut inclinatio fit in Orientalem lineam, inferiori latere planicie coniuncto cum meridiana.


Aut denique inclinatio fit in lineam quandam inter mediam inter Meridianam, & Orientalem.

Cuiuslibet harum superficierum ex supra composito globo facillime horologium inscribi potest. Cum enim quælibet plana superficies sit pars circuli maximi per centrum Vniuersi transeuntis (terræ enim magnitudinem respectu sphære Solis instar centri aut puncti esse supponimus) si in dato globo cuiuslibet superficie conueniens describatur circulus, apparebunt confestim eius cum circulis horarijs intersectiones. Inde sumitur horologiorum descriptio. Id autem fit modo, qui sequitur.

In circulo Meridiei sphære, vt supra diximus distinctè, ab A polo mundi Boreo numeretur complementum eleuationis poli tui loci vsque in F, & ex F, vt polo describatur maximus circulus GCH, eritque F Zenith; GCH verò Horizon tuæ regionis. Eius cum horarijs circulis intersectiones sint, G, I, K, L, M, N, C, quæ dabunt distantias horizontales horarum communium à linea meridiana.

**§. I.**

*Horologium horizontale Astronomicum ad latitud. 50. grad.*



**A**d horizontale itaque horologium describendum, describendus est in plano horizonti parallelo circulus, qui eiusdem sit magnitudinis, cum maximo globi tui circulo. Id fiet si circino accipiatur distantia sexaginta graduum in globi æquatore, & ad eam circini aperturam, quæ semidiametrum tibi dat circuli quæsitæ, describatur circulus A C B D, ex centro E. Hoc circulo in quatuor æquas partes, duabus diametris ad normam diuiso, erit A, B, linea meridianæ, C D verò lineæ horæ sextæ. Transfer deinde distantiam G I, ex glo-

*Nota circulos omnes sequentes debere esse æquales circulo globi; hic enim alij quantâ minores vultu ad lineam tuis erunt. Et menâ ad vniuersi autem si aliam peripheriam ex eodem circulo centro æqualem peripheria globi describeris, de quibus primum te monendum duximus.*

bo, in circulum in plano descriptum ex B in F, & ex B in G: eruntque lineæ ex centro E, per F, & G protractæ, altera vndecima antemeridiana, altera prima pomeridiana hora. Similiter transfer ex globo distantiam G, K, in eundem circulum ex B in H, & ex B in I: eruntque lineæ ex centro E per H & I protractæ: altera linea horaria decime antemeridiane, altera verò horaria secundæ pomeridiane. Non secus faciendum cum ceteris lineis.


Gnomonis erectio.

Ad gnomonis erectionem transferatur ex globo arcus H, A, qui est elevationis poli tui loci, in circulum planum, ex B in K, & linea ex E centro horologij ad K protracta, ostendet tibi angulum, ad quem axis mundi supra meridianam lineam erigi debet.

§. II.

*Horolabium verticale astronomicum ad latitud. 50. grad.*

Pro secundi generis superficiebus, quæ nempe ad Horizontem perpendiculares sunt, atque imprimis ad eas, quæ in Orientali linea eriguntur, describatur ex G, aut H, communi intersectione Meridiani, & Horizontis per F punctum



verticis, circulus maximus F, C, P, is representabit nobis dictam superficiem. Eius cum horarijs circulis intersectiones sint F, Q, R, S, T, V, C; quæ dabunt distantias verticales horarum communium à linea meridianâ. Ad verticale itaque horologium delineandum, describatur iterum in plano circulus, maximo globi circulo equalis, modo quo diximus: is fit A, C, B, D: eoque in quatuor partes duabus diametris ad normam diuiso, erit iterum linea A, B, meridianâ, & CD, horæ 6. linea. Transfer itaque distantiam FQ ex globo, in descriptum in plano circulum ex B in F, & in G; eritque linea

Gnomonis erectio.

ex centro E per F ducta hora prima pomeridiana: per G verò ducta vndecima antemeridiana. Non secus agendum cum reliquis horis. Pro gnomone erigendo transferatur ex globo arcus F A, qui est complementum elevationis poli, ex B in K, & linea ex E per K protracta, ostendet angulum, ad quem axis mundi super linea meridianâ erigi debet.


Ad eas superficies, quæ in meridianâ linea eriguntur, Orientalia, & Occidentalia, uti diximus, describuntur horologia: ea certè in ijs parietibus, aut planis Orientem, vel Occidentem directè insipientibus, tam facilia factu sunt, ut de ijs verba facere superfluum sit.

§. III.

*Horolabium declinans astronomicum ad latit. 50. grad.*

Ad tertias superficiem huius horizonti perpendicularis species, quæ ex intermedia linea inter Meridianam, & Orientalem eriguntur, horologijs designandas, scire imprimis necessarium est, quantum ex epli gratia ad Occasum, aut Ortum à Meridie declinent. Hoc cognito, numeretur in circulo Horizontis globi nostri à communi intersectione eius cum meridianâ G: dextram quidem versus, si ad Ortum;

cum; sinistram vero, si ad Occasum complementum declinationis date, vsque in L, verbi gratia, atque ex L, ut polo per F, & P verticem describatur maximus circulus



FOP, is erit in globo datâ superficiem referens. Eius cum horarijs circulis intersectiones, & distantie sint, F, Y, Z, a, b, c, d, cum ijs eadem omnino ratione, qua in horizontali, & verticali docuimus, in circulo A, C, B, D, describetur horologium declinans, quod figura exhibet.

Vide figuram globi gnomonici

Ad gnomonem erigendum, quaerenda in primis est linea substylaris, super quam ipsum erigere oporteat. Ea linea in horizontali, & reliquis omnibus horologijs Meridiem, seu Septentrionem directè aspicientibus, vna eademque est cum linea meridianâ. In declinantibus verò sic inuestigatur. Ex polo ad circulum, qui datum planum refert, ducatur arcus circuli maximi ipsi circulo perpendicularis A, e, eritque arcus F, e, distantia substylaris à meridianâ; A, e, verò, quantitas anguli, per quem Axis super substylari erigendus est.

In figura itaque horologii declinantis apposita, transferatur arcus F, e, ex B in H, & arcus A, e, ex B in K, eritque linea ex E, centro per H protracta substylaris; linea verò ex E per K, protracta dabit angulum HEK, ad quem axis super substylari erigendus est.

Atque hac ratione in omnibus planis tam declinantibus tantum, quam inclinatis, & declinantibus simul, substylaris à meridianâ distantia, & Axis altitudo super substylari indaganda est: quod hic monere volui, ne posthac repetendum sit.


Notandum autem est, meridianam lineam, in omnibus superficiebus horizonti perpendicularibus, ipsam quoque horizonti, aut eius æquabili perpendicularem esse.

Notandum autem est, meridianam lineam, in omnibus superficiebus horizonti perpendicularibus, ipsam quoque horizonti, aut eius æquabili perpendicularem esse.

§. IV.

*Horolabium ad Horizontem inclinatum ad latit. 50. grad.*

Tertij generis superficies, quæ ad horizontem inclinatae sunt, hoc modo designantur.




Vide figuram globi gnomonici

Si inclinatio fit in lineam meridianam, numeretur ab F vertice; æquatore quidem versus, si ipsa superficies Meridiem aspexerit; polum verò versus, si Septentrionem (nos æquatore versus numeramus datam superficiem inclinationem) inclinationem appello angulum, quem ipsa superficies cum horizonte efficit) vsque in f, ex eoque tanquam polo descriptus maximus sphaeræ circulus B, C, h, is est, qui datam refert superficiem. Eius cum horarijs intersectiones transferuntur in planum, eadem ratione, qua supra docuimus; Gnomon erigitur in linea meridianâ,

ut cum ea faciat æqualem arcui A, h.

§. V.

*Horolabium ad verticalem primarium inclinatum ad latitud. 50. grad.*



Si verò inclinatio fiat in lineam Orientalem, ea quoque numeranda est ab F vertice, non tamen in meridiano, sed in circulo Orientali, quem verticalem simpliciter appellare solent, vsque in i, & ex i, sine numeri, vt polo, descriptus circulus G, I, H, is erit, qui horarias tibi dabit distantias.

Substylaris distantia à meridiana, quæ in hisce horologijs horizonti parallela est & gnomonis eleuatio supra substylarem, inquirenda est per arcum perpendicularem ex A polo ad modò descriptum circulum ductum, vti supra docuimus.

§. VI.

*Horolabium declinans, et inclinatum ad latitud. 50. grad.*

Si denique inclinatio fiat in lineam quandam intermediam inter Meridianam, & Orientalem; tum imprimis designanda est ea declinationis linea, quod fit per cognitam superficiem declinationem, modo quo supra; eam referat circulus F, O, P, atque in ea ex F, vertice numerata inclinatione datae superficiem vsque in M, ex M, sine numeri, vt polo describatur circulus maximus n, m, p, is dabit horarum linearum quæstas inter se, & à meridiana distantias.

Vt itaque hinc construat horologium, describatur iterum in plano proposito circulus, maximo globi circulo æqualis: & quia in hisce superficiebus meridianæ lineæ positus incertus est, designanda est in primis in descripto circulo per eius centrum linea horizonti parallela, acceptoque ex globo, arcu IL (qui est arcus, circuli horologii planum referentis, inter meridianum, & horizontem interceptus) transferatur is ex puncto communi intersectionis circuli, & horisontis, eritque linea ex centro horologii per finem protracta, meridianam plani propositi. Ab hac deinceps vtrinq; in circulum translatis horarum linearum à meridiana distantias, modo iam sæpius tradito, descriptum erit horologium declinans, & inclinatum, quod facere oportuit. Substylaris lineæ locus, & axis altitudo inuestiganda est vti prius. Figuram male à Sculptore incisam omisimus; facile tamen Lector, si hanc cum præcedentibus rite contulerit, eam intelliget. Hinc facile videre est, non adeo necessarium esse in horologijs conficiendis, horarum linearum distantias à meridiano circulo accipere; sed & ab horizonte, aut quocunque circulo maximo in globo descripto, numerationis initium fieri posse, modò is circulus, ante omnia in data superficie, per rectam lineam debite sit descriptus. Nota quoque Lector, nos hæc horologia ad 50. grad. altitud. medium Germaniæ meridianum condidisse, mensuram autem arcuum globi optice projectorum non perfecte respondere circulorum interuallis, nisi in globo materiali, & solido; de quibus primum hic te monere volui, ne nos alicuius commisi erroris arguere possis.

CAPVT

CAPVT V.


*De horologijs omnis generis per observationem facillime construendis.*

Parasceuafticon I.

*Instrumentum καταπριτικόν, siue Observatorium instrumentum.*



Præparetur tabula, quam instrumentum horographicum appellabimus, ex ligno perpolito, vel ex quacunque alia materia dura, solida, & polita, quæ hic signata est literis ABCD, cui in quouis latere extet E tabulæ pars in rotundam, vel quadratam figuram elaborata. Porro tabula ABCD, à posteriori parte in centro H, ita firmari debet supra globum N versatilem, vt tabula in omnem situm commodè versari possit, & si opus fuerit, trochlea S, ad quemlibet firum firmari; habebitque instrumentum præparatum, cuius ope in dato plano, & superficie, datas celestium circulorum lineas dicto citius delineabis, ea quæ sequitur ratione.



In E, prominente parte tabulæ ABCD delineatur quoduis è quatuor horarum generibus sciathericum horizontale, vna cum circulo celestium in scriptione (quod nos archetypum instrumentum imposterum appellabimus) vel in quacunque alia materia seorsim descriptum; ita in parte E prominente firmetur, vt linea meridianæ KE horarum ad latus tabulæ AB, quæ horam sextam refert, sit normalis: huius enim horolabij ope aliud quodcunque circulorum genus in quocunque plano delineabimus, vt sequitur.

*Archetypum horologium.*

Problema IX.

*In quinque regularium corporum superficiebus horas astronomicas delineare vna operatione.*

Ostendemus praxim in solis horis astronomicis, iuxta quam postea quouis alias quasuis lineas simili ratione dictis planis inscribere possit.

Prag.

Pragmatia I.

Tetraedrum horologium describere.

It igitur primo in singulis tetraedri lateribus horologium delineandum ; firma- bis primo tetraedrum supra planum tabulæ , ita vt loco dimoueri non possit , & vt latus vnum è lateribus recta meridiem respiciat , alterum lineam meridianã EV, in plano isogonos secet. In singulis autem lateribus tetraedris stylos pro libitu rectos, obliquos, longos, vel breues, perinde est, prout commoditas lateris in So- lis radio recipiendo tulerit, infigas . Hoc peracto, exponas quolibet tempore diei, hoc systema lucenti Soli, & gyrando illud eò vsq̃ue donec gnomon horologij archetypi lineam meridianam, siue horam duodecimam ex præcise tangat, & sine mora in singulis lateribus illuminatis, extremas gnomonum vmbas in suis lateri- bus notabis, adscriptis vnicuique hora 12. iuxta archetypum, Sole enim in ex cõ- stituto hora 12. vmbra stylorum in notata puncta cadet.

Deinde admota vmbra archetypi gnomonis versatione totius systematis, supra reliqua horarum puncta in ex, insuper in singulis lateribus tetraedri, extremam gnomonis vmbra notando adscriptis singulis horas, horis archetypi competẽ- tes; estque hæc prima observatio.

Iterum gyretur totum systema sciathericum (ita vocamus totum tabulæ com- plexum cum archetypo, & corporibus, in quibus sciatherica describere proponi- mus, in tabula firmatis) eò vsq̃ue donec extrema vmbra gnomonis in singula pũ- cta tropici s̃ in archetypo ceciderit, eodemque tempore extremam gnomonum lateribus tetraedri in fixorum vmbra notabis, singulis punctis horas, horis arche- typi correspondentes adscribendo; per puncta enim vnus & eiusdem horæ in- prima, & secunda observatione notata, lineæ rectæ ductæ dabũt in la- teribus tetraedri horas quæritas; atque hac ratione in omnis generis pyramidibus, tetragonis, pentagonis, hexagonis horas inscribere,

nullo pane negotio poteris. Tetraedron est corpus solidũ quatuor triangulis isop- leuris æqualibus terminatum. Si igitur ex materia aliqua conficiantur quatuor triangula æquilatera æqualia, disponanturque, vt in hac figura vides; fiet ex ip̃is ritè inter se complicatis corpus quæsitum.

Systema sciathe- ricum quid?



Quid sit tetrae- dron, & quo- modo componatur?

Pragmatia II.


Cubum horologium describere.

Cubus est figura solida sub sex quadratis æqualibus contenta. Si itaque sex qua- drata in planum proiecta, vt hac in figura vides, excisaque singula ritè inter se connexueris, fiet cubus, in cuius lateribus circularum cœlestium descriptiones perficies, vt sequitur.

I. Cum cubi latus BF, verticale planum in Austrum, oppositumque eius in Bo- ream; BG verò meridiani occidui, oppositũ ortui meridiani planum; GE denique horizontale planum referat; Describẽtur primò horolo- gia in singulis lateribus, si vnicuique plano iuxta operationes in præ- cedentibus adhibitas horologia propria inscriperis.

II. Per observationem verò ea prorsus ratione, quam in tetraedri inscriptione Sciatherica adhibuimus, in singulis cubi lateribus horo- logiographiam perficies; quæ res, cum clarissima sit, exemplo non indiget.

Quid cubus sit, & quomodo cõ- ponatur.




Prag-

Pragmatia III.

Octaedrum horologium describere.

Octaedrum figura solida est sub octo triangulis æqualibus æquilateris conten- ta. Ita construitur. Fiant ex materia quapiam solida octo triangula isopleura æqualia, disponanturque, vt figura indicat, con- stituet hæc figura lateribus ritè inter se compli- catis octaedron quæsitum.



Octaedron quid sit, & quomodo componatur.

In hoc corpore semper vnum ex octo lateri- bus erit planum horizontale, reliqua vero, vel inclinata ad horizontem, vel ab eodem decli- nantia. Si in horizontali plano vnum latus trian- guli referat lineam meridianam, erunt duo late- ra Orientale, & Occidentale parallela, & decli- nantia ab horizonte 60. grad. reliqua verò latera erunt declinantia ab horizonte simul, & inclinata ad eundem. Hoc igitur corpus in tabula horographica firmatũ ita situabis, vt vnum ex lateribus plani horizontalis incidat cum EV linea meri- diana in tabula horographica: quod facillè perficies, si perpendiculum extremis la- teris dicti punctis applicaueris, atque hinc inde moueris donec perpendiculum vtrinque meridianam EV tetigerit. Hoc peracto describes horas in singulis octaedri lateribus (quæ prius styli suis magnitudine, & capacitare superficierum, proportionalibus in- struantur) ea prorsus ratione archetypi horologij ope, quam in- præcedentibus ostendimus.

Qualitas plano- rum huius cor- poris.




Pragmatia IV.

Dodecaedron horologicum describere.

Dodecaedron figura solida est sub duodecim æqualibus pentagonis isopleu- ris æqualium angulorum contenta: quod ita construes. Construantur in- aliqua materia duodecim pentagoni isopleuri, vt vides: quos si rectè inter se com- plicaueris, euadet dodecaedron quæsitum. Hoc cor- pus præter horizontale, nullum aliud regulare planũ admittit: sed omnia erunt, vel inclinata ad horizon- tem, vel declinantia ab eodem, vel declinantia simul, & inclinata ad horizontem. Si pentagoni hori- zontalis latus quodpiam fiat linea meridianã; erit pen- tagonũ Occasum respiciens declinans superius ab-

Quid sit dode- caedron, & quo- modo componatur.



horizonte 35. grad. eiusque oppositum inferius, superiori semper parallelum; reliqua pentagona Zenith respicientia erunt mista inclinata simul, & declinantia ab horizonte ex Austro, & Borea in Ortum, vel Occasum vergentia tot gradibus; quot angulus pentagoni comprehendit, videlicet 72. Pentagona verò Nadir respi- cientia, sunt inferiora inclinata simul, & declinantia, ab horizonte, ex Austro in- Boream, & in Ortum, vel Occasum vergentia.

Qualitas linte- rum.

Si verò latus vnum pentagoni horizontalis lineæ horæ sextæ situm habuerit, id est meridianam isogonos secuerit, erit pentagonum Meridiem respiciens inclina- tum superius 72. grad. & totidem ipsi oppositum, & parallelum inferius Boream,

A a a respi-



respiciens, reliqua verò omnia erunt mista, semperque, vel à Meridie, & Borea in Ortum, & Occasum: vel ab horizonte, vel ad horizontem 72. gradibus inclinantiâ.


Corpus igitur dodecaëdron tabulæ horographicæ impositum, firmatum, stylis. que instructum ita situabis, vt vnum latus pentagoni horizontalis, EV lineæ meridianæ in tabula respondeat, vel lineæ horæ sextæ in eadem tabula. Hoc peracto, singulis superficiebus pentagonis horas ope archetypi, eadem prorsus ratione, qua in primâ pragmatia docuimus, inscribes. Hoc interim notandum: quò minores gnomones fuerint assumpti, eò plures horas in dictis planis inscribi posse.

**Pragmatia V.**

*Icosaëdron horologum describere.*

**I**cosaëdron figura solida est sub 20. triangulis isopleuris æqualibus contenta, quod ita construes. Describantur in materia aliqua solida 20. triangula eo ordine, & situ, quo in figura apparet; quæ leniter incisa, complicataque constituent icoëdron propositum. In hoc corpore, præter horizontale, nullum rectum est; sunt enim omnia, vel inclinata ad horizontem superiora, vel inferiora; vel declinantiâ ab eodem inferiora, vel superiora; vel denique mista superiora, vel inferiora: quæ omnia à primarijs circulis suis, verticali, meridiano, horizonte vel 30. vel 60. gradibus declinant. In huius igitur corporis singulis superficiebus horas inscripturus, illud primo stylis suis instructum tabulæ horographicæ impositum, firmatumque ita situabis, vt vnum latus trianguli horizontalis lineæ meridianæ, vel horæ sextæ in tabula respondeat; quo peracto horas singulis lateribus dicta methodo archetypi ope facillè inscribes.

*Icosaëdron quod sit, & quomodo componatur.*




**Problema X.**

**Corporibus irregularibus horas inscribere.**


*In cylindri, siue columnæ superficie concaua, vel conuexa, vti in paralopipedo, & pyramide concaua, & conuexa, horas inscribere.*

**C**ylindrum ABCD excauatum axe suo in centro finiente loco gnomonis, vti & stylo in exteriori superficie instructum impones tabulæ horographicæ; ita vt ES lineæ styli ipsam meridianam tangat. Deinde gytrato systemate in tabulis huc illucque, donec umbra gnomonis archetypi omnia pñcta horarum tropici 20. tetigerit, diligenter notando eodem tempore, quo umbrarum extrema in vtraque cylindri superficie cadant, vt in præcedentibus factum est. Deinde gytrato systemate denuò in archetypo puncta horarum in tropico 20. vel si in illo ea haberi non possent, in æquinoctiali, vel alio quouis Boreali parallelo umbræ notandæ forent, & iuxta illas in vtraque cylindri superficie notanda puncta; horum enim punctorum singula vni & eidem horæ respon-




dentia

dentia recta si coniunxeris, habebis horas corporis dati superficiebus inscriptas



I conismus VI  
folio 371



eadem prorsus methodo in paralelipedo horologo, seu prismate, & pyramide, quorumuis laterum delineando procedes. Vide schemata prismatum, & pyramidis hic apposita.

Demonstratio operationis factae.

**H**inc patet, nullum corpus dari posse tam irregulare, cui horae inscribi non possint dicta methodo: de qua, quia fuse in sequentibus dicturi sumus, hic tantum breuiter artificium insinuare voluimus. Demonstratio autem huius negotij facillima est. Cum enim omnia haec corpora in eodem plano horizontali firmetur; imagineris tibi Solem stare, loco Solis verò totum hoc complexum moueri: cum verò motus systematis fiat iuxta horarum in archetypo descriptarum intervalla, idem hoc motum vmbrae in diuersis corporum planis facit, quod Solis radij vmbrae gnomonum in diuersa plana immota proiectis. Quod enim Sol motus efficit in immotis corporum superficiebus, id ad immotum quasi Solem circumductum systema vmbrae gnomonum in diuersis superficiebus aequali tenore ad motum vmbrae archetypae proiectis. Secundò, si systema ita inclinetur, vt vmbra archetypa tropicum  $\sigma\sigma$  percurrat, habebit eodem tempore Sol eandem eleuationem supra tabulam, quam, dum vere, & realiter tropicum describit supra horizontem loci, in quo horologium describitur. Idem dicendū de quouis alio parallelo. Cū igitur reliquarū superficierū vmbrae vniformiter moueantur ad motum vmbrae archetypae, necessariò, & in omnibus idem delineabitur, scilicet tropicus  $\sigma\sigma$ , si vmbra archetypa  $\sigma\sigma$  parallelus verò  $\Omega$ , &  $\Pi$ , si vmbrae archetypae per eosdem percurrant; & sic de caeteris omnibus idem iudicium esto. Dixi, ad immotum quasi Solem, quia tota haec operatio fieri debet toto illo temporis momentaneo spacio, quo Solem nequaquam sensibiliter promotum verisimile est; si enim interim operatione tardares, errore horoscopium caritutum non esset. Atque haec de horologijs per obseruationem faciendis sufficiant.

Demonstratio  
huius descriptio  
nis

docting huius Leonis vide pagin. 371

C A P V T V I.

De Regula Sciatherica,

*Cuius beneficio omnis generis horologia construuntur.*

*Data Regula Sciatherica horas astronomicas cuius plano dato inscribere.*


Problema XI.

Pragmatia I.

*Horologium horizontale astronomicum describere.*

Regula I.

**D** VCTIS duabus rectis lineis in centro N, se ad normam interfecantibus, quarum CD æquinoctialem, AB vero meridianum referat. In scala latitudinis in Regula descripta elevationem poli tuæ regioni congruen-



tem inter punctum S, & Y interceptum, transferes ex puncto N horologii, versus B, eritque B centrum horologii horizontalis assignatum.

Regula II.

343

**A**pplica Regulam horographicam lateri suo KBM, supra CD æquinoctialem in horologio, ita vt punctum B regulæ, puncto N horologii exacte respondeat. deinde regula hoc situ manente, iuxta puncta horarum in regula descriptarum imprimes puncta in CD, cui vnique numerum horæ respondentem addes; per hæc enim puncta ex centro horologii B lineæ ductæ dabunt horologium horizontale quaesitum.

Regula III.

**S**tyli erigendi ratio hæc est. Ad basim trianguli Gnomonici, siue quod idè est, diuisa linea NB in I, bifariam, positoque in I circino, describatur circulus, qui

lineas CD, & KM, in punctis N & B contingat. Deinde ex N, in huius ambitum circuli vtrique transferatur spaciùm inter N, & puncta horæ tertix, vel nonæ interceptum, vti in PQ factum vides. Si enim per hæc duo puncta rectam duxeris, secabit illa lineam NB in puncto, qui erit locus gnomonis, altitudo vero eius terminabitur in P, vel Q. Factum igitur est quod proponebatur.

Pragmatia II.

*Verticalis horologii descriptio per regulam.*

**I.** DVCTIS, vt in priori duabus lineis meridiana, & æquinoctiali, de nouo seorsim, vel eadem lineæ AB, CD seruiant vtrique horologio: in scala latitudinis regulæ, elevationem poli regionis tuæ, scilicet grad. inter S, & X, interceptâ ex N versus A transferes.


**II.** Regula applicata, vt prius puncta horaria in CD, imprime; per hæc enim ex A lineæ rectæ eductæ dabunt horologium verticale. Styli locum, & altitudinem ita inuenies. Inter N, & A circulum duces, vt prius in horologio horizontali fecimus, in cuius ambitum ex N vtrique transferes spaciùm inter N, & punctum horæ tertix, vel nonæ interceptum, videlicet in V, & Z. per hæc enim recta ducta secabit A N, in O loco styli quaesito, cuius longitudo erit OZ, vel VO.

*Inuentio styli.*

Pragmatia III.

*Horologium Orientale, & Occidentale astronomicum describere.*


**I.** IN plano proposito supra EB lineam horizontalem, ducantur lineæ AB, GE quæ cum linea EB angulum complementi elevationis poli regionis tuæ con-



gruentem faciant: qui bus alias CD ad normam in punctis N N sese interfecantes ducas; eritque axis mundi CD; æquinoctialis vero EG, AB.

II. In

II. In N, puncto applicata regula iuxta longitudinem lineæ æquinoctialis EG, & AB, imprimatur puncta horarum in æquinoctiali Orientali, & Occidentali (est enim vnum & idem horologium, horis tantum diuersum) iuxta numeris in regula descriptis correspondentia; per hæc enim parallelæ ad axim CD ductæ dabunt horas plani Orientalis, & Occidentalis quæsitæ, referetque lineæ CD lineam horæ sextæ, vt in figura apparet.



III. Locus gnomonis erit in N, communi puncto intersectionis horæ sextæ, siue axis, quem, vt dixi, refert lineæ DC, & æquinoctialis: altitudo gnomonis erit latitudo regulæ, siue spaciū inter N, & punctum horæ 3. vel 9. in horologio; porro horæ in secundo spacio regulæ descriptæ erunt ante-meridianæ, siue horologij Orientalis; in tertio vero spacio regulæ descriptæ sunt horæ pomeridianæ pertinentes ad horologium Occidentale.

*Quantitas gnomonis.*

**Pragmatia IV.**

*Horologium polare delineare.*

I. DVtis duabus lineis, vt in horologio horizontali factum est; applica regulam supra lineam ENB, ita vt B punctum regulæ, N exactè respondeat. Deinde iuxta hunc situm lineæ EB, puncta horarum imprimes; per hæc enim parallelæ ad AB, meridianam ductæ dabunt horologium polare quæsitum; gnomonis locus erit N, altitudo eius ipsa latitudo regulæ est, vel spaciū N3. vel N9. vt in horologio meridiano præcedente dictum est. At, vt multa paucis complectamur; regula ipsa nihil aliud est, quam horologium polare: si enim supra horam 12. loco styli quadratam tabulam erigeres tantæ altitudinis, quæta est latitudo regulæ; monstraret ea in situata regula horas quæsitas.

*Regula scaberrima est horologium polare.*

Ex quo patet horologium meridianum, & polare quoad horarum discrimina, vnum & idem horologium esse, situ tantum, & horarum denominatione discrepare, vti cuiuslibet tyroni patere potest. Situs huius horologij erit supra planum polare, ita vt lineæ horæ 12. axi mundi perfectè respondeat, estque superius, & inferius, vtrumque idem, sola horarum transpositione differens, vti in præcedentibus dictum est.

Prag-

**Pragmatia V.**

*Horologium æquinoctiale delineare.*


I. **F**iat in plano quopiam circulus intervallo latitudinis regulæ descriptus, diametris suis GO, MN, in quatuor quadrantes descriptus, eritque GEO, lineæ horæ duodecimæ, & lineæ horæ sextæ CD. Circulus quilibet in 24. æquales partes diuisus dabit horologium quæsitum, si in plano dato ita applices, vt 12. respondeat meridianæ: per regulam verò gnomonicã, id nullo ferè negotio ita conficies. Applica regulam puncto suo S, in centro dati plani. Vide figurã c. 2. probl. 1.

II. Applicando regulam in punctis G & O, puncta horarum in lineis HI, KL, contingentibus imprimantur; per hæc enim, ex E centro circuli lineæ ductæ in ambitu semicirculi NCBD terminantes, dabunt horologium æquinoctiale quæsitum, vt figura docet; stylus ex centro E, erectus indefinitæ magnitudinis est, refert enim axem mundi, monstrabitque horas supra planum æquatoris applicatum, ita vt lineæ duodecimæ lineæ meridianæ exactè respondeat.

**Pragmatia VI.**

*Horologium astronomicum declinans à verticali describere.*

I. **D**Vtis duabus lineis ad rectos angulos in E sese interfecantibus, AB, quæ meridianam, & CD, quæ communem intersectionem plani horizontalis, & plani declinantis referet.




II. Accipiat declinatio muri in quadrante dextro SD, si murus ex Meridie in Occasum; in quadrante verò sinistro SC, si in Ortum declinauerit planum. Sit igitur planum declinans 20. grad. in Occasum, ducta ex centro E lineæ EF, per 20. grad. quæ referet lineam meridianam, ad quam alia normalis in E puncto ducatur, quæ sit GH.

III. In hac lineæ GH applicata regula imprimantur puncta horarum. Quo peractò interceptam in Regula latitudinem loci inter S, & Y, ex scala latitudinum pro horis horizontalibus transfer in lineam EF, ex E versus V, tractisque ex V centro horolo-

horologij horizontalis lineis occultis in lineam GH, diligenter obſeruetur, vbi illæ lineam DC interſecent.

IV. Interceptam latitudinem loci ex ſcala latitudinum pro horis verticalibus in linea SX regulæ transfer ex E in EA-lineam verticalem, in punctum A, quod erit centrum horologij verticalis; ex hoc enim, ſi per puncta horaria in linea CD notata rectas duxeris, habebis horologium verticale declinans. Demonſtratio rei adeo facilis eſt, vt unicuique, vel ex ipſa conſtructione patere poſſit.



V. Linea horæ sextæ ita ducatur: Ad punctum V centrum horologij horizontalis normalis ducatur V6; vbi enim hæc lineam CD ſecuerit, per id punctum ex A, linea ducta dabit horam sextam quaſitam.

VI. Gnomonis locum, & altitudinem, & lineam ſtyli ita inuenies.

1 Ducatur ex V ad CD, normalis VN, per N enim ex A, recta ducta dabit lineam ſtyli.

2 Ad lineam ſtyli per N, recta MP normaliter ducta dabit æquinoctialem in horologio declinante: in hac ſi æqualis lineæ NV accipiatur, videlicet NM, ex quacunque parte lineæ MP volueris, perinde eſt, dabit ex A per M, recta ducta axem mundi; & NAM angulum eleuationis poli ſupra dictum planum declinans.

3 Ad axem mundi ex N normalis ducta NR, erit ſemidiameter æquatoris, ab hoc puncto R, ad lineam ſtyli iterum normalis ducta, dabit longitudinem gnomonis, cuius locus in S; per quod punctum parallela ad lineam CD ducta dabit horizontalem horologij. Declinans ergo deſcripſimus, quod erat propoſitum.

Pragmatia VII.

Horologium aſtronomicum inclinatum deſcribere.

Nota primò, hoc planum duplicem reſpectum habere poſſe. Vel enim angulus inclinationis ſux vergit in Boream: vel in Auſtrum: Si angulus plani cum horizonte vergens in Boream æqualis fuerit angulo eleuationis poli, erit horologium plani inclinati idem quod horologium polare. Si verò angulus vergēs in Auſtrum

Inuentio horæ 6

Locus & quantitas ſtyli.

atrum æquale fuerit complemento altitudinis poli, ſue altitudini æquatoris, erit horologium inclinatum idem quod horologium æquinoctiale.

Nota ſecundò: Si planum ſuperiori parte reſpiciens Auſtrum & Zenith, minore habuerit inclinationem altitudinis poli; ſubtractis inclinationis gradibus, remanebit altitudo poli ſupra planum, iuxta quam horizontale delineandum eſt, vt habeas horologium inclinatum. Exempli gratia, inclinet aliquod planum 30. gradibus, in quo horologium deſcribendum eſt; ſubtracto igitur 30. à 42. eleuatione poli Romani, remanent duodecim. Si igitur horologium deſcripſeris ad latitudinem 12. grad. habebis horologium dato plano inclinato inſcriptum; ſi verò inclinatio ſuperet altitudinem poli, quæ ſit verbi gratia 50. grad. auferas 42. à 50. & reliquum 8. dabit latitudinem regionis, ſive eleuationem poli 8. graduum ad quam horologium horizontale deſcriptum dabit quaſitum. Si verò planum Zenith, & Boream reſpexerit, & altitudine æquatoris minorem habuerit inclinationem, adde inclinationi altitudinem poli, & conſtabit altitudo poli, iuxta quam horologium horizontale deſcriptum dabit quaſitum. Si verò inclinatio eleuatione æquatoris, maior fuerit addenda erit altitudo æquatoris complemento altitudinis inclinationis, & conſtabit altitudo poli, iuxta quam horologium horizontale delineatum dabit quaſitum. Sed hæc ex præcedentibus fatiſ liquida ſunt.

PARS II. HOROGRAPHIAE VARIÆ

CAPVT I.

Horographia Babylónico-Italica, ſive de horologijs ab Ortu, & Occaſu deſcribendis.

Problema XII.

Horologia omnis generis ab Ortu, & Occaſu deſcribere.

Pragmatia I.


Horologium horizontale ab Ortu, & Occaſu deſcribere.

I. **D**ICTIS duabus lineis, meridiana, & æquinoctiali AB, CD, vt in horizontali factum eſt, & applicata regula ſupra æquinoctialem CD, imprimantur puncta horarum, vt ſupra. II. Applica regulam ſupra lineam EF horæ sextæ; hæc induſtria vt punctum horæ 11½. in regula notatæ exactè reſpondeat A centro horologij. Hoc peracto nota, vbi punctum horæ quintę in regula fecerit lineam AE, ibi imprime punctum. Deinde regulam puncto ſuo 11. applica ſupra punctum A, ſeu centrum horologij, ita vt ei punctum horæ 11. exactè reſpondeat, & in eadem regula iuxta punctum horæ 4. imprime punctum in linea horæ sextæ, ſive AE. Iterum applica regulam puncto horæ 10½. ſupra A, in eadem linea iuxta punctum horæ 3. imprime punctum; & ſic ſemper promotis in regula mediarum horarum punctis, ſupra A retro grado ordine progrediendo, impreſſisque punctis horæ sextę iuxta puncta horarum integrarum in linea EA, habebis puncta ab Ortu, & Occaſu

tu ad horas delineandas necessaria. Si enim punctum horæ quintæ astronomicæ in æquinoctiali, & punctum E quintæ in linea horæ sextæ, siue AE recta coniu-

Nota punctas  
lineas signa-  
re horas astro-  
nomicas quarū  
media semper  
12. EF linea ho-  
ræ sextæ est; re-  
liquæ horæ ab E  
versus B ante  
merid. à E ver-  
sus E post me-  
rid.

Tabula consumit terram,  
lapidesque vetustas.



xeris; dabit tibi recta ducta horam 23. ab Occasu. Si verò puncta 4. & 4. signata in æquinoctiali, & linea horæ sextæ coniunxeris recta, dabit illa tibi horam 22. ab Occasu; si 3. & 3. coniunxeris habebis 21. & sic vsque ad 12. quæ coniunctæ dabunt semper horam 18. ab Occasu. Hinc eadem puncta repetendo si 1. 2. 3. 4. 5. coniunges cum horis in æquinoctiali respondentibus, videlicet 1 cum 11; 2 cum 10; 3 cum 9; 4. cum 8; 5. cum 7. habebis horas ab Occasu descriptas: horam 12. dabit linea inter æquinoctialem CD, & horæ sextæ lineam FE. media. Quo- modo verò reliquæ horæ 11. 10. 9. ducantur in hoc horologio, paulo post dice- tur.

*Horarum ab Ortum delineatio.*


SI horas ab Ortum eidem inscribere desideres, transferantur omnia puncta hora- rum in linea AE signata ex A versus F alteram partem lineæ horæ sextæ vnâ cum duplici horarum serie. Si enim punctum 7. & 7. in æquinoctiali, & lineæ horæ sextæ recta coniunxeris, dabit illa tibi horam 1. ab Ortum: si 8. & 8. habebis 2. ab Ortum. Si 9. & 9. habebis 3. & sic de reliquis ages, vt in præcedenti descriptione horarum ab Occasu; hora 12. erit vtrique horologio communis: Si verò horam 11. ab Occasu desideres, coniunges punctum 7. in linea AF, cum puncto quintæ in æquinoctiali, illa enim dabit horam quæsitam; si decimam ab Occasu; coniuncta 8. in linea AF cum 4. in æquinoctiali, dabit propositum; & sic de cæteris. Oppositam rationem tenebis, si horæ 13. 14. 15. ab Ortum, & sequentes sint inscriben- dæ. Demonstratio ex ipsa constructione patet; centrum horologii, gnomon, eius- que locus, eo prorsus modo, quo in horologio astronomico factum est, inuestiga- bis.

**Pragmatia II.**

*In plano verticali horas ab Ortum, & Occasu inscribere.*

DŪctis AB, & CD lineis meridiana, & æquinoctiali, vt prius, applicata regu- la in æquinoctiali CD, describes astronomicum non integrarum duntaxat, sed & mediarum horarum; ductisque ex centro A per singula puncta in CD signa- ta lineis occultis, vide vbi illæ lineam horizontalem EF (quæ semper ad æquino- ctialem CD parallela per centrum gnomonis ducetur) interfecent: ibi imprime puncta numeris suis distincta, vt patet in figura. Horum punctorum subsidio, per sequentem tabulam horas ab Occasu ab hora 23. incipiendo, hæc inscribes indu- stria.

stria. Cùm enim intersectiones horarum ab Occasu fiant in æquinoctiali, & linea horizontali.



|                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| Horæ ab ortu.       | 24 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10 | 11  | 12 |
| Horæ ab occasu.     | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22 | 23  | 24 |
| Horæ astr. in æqu.  | 12 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |
| Horæ astr. in hori. | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |

Quære in Tabula horam 23. ab Occasu, & vide quas horas in æquinoctiali, & hori- zontali EF illa fecet: reperiesque secare 5. astronomicam in æquinoctiali, & 11½. in horizontali; per hæc enim linea recta ducta dabit horam 23. quæsitam. Ita linea ducta per horam 4. in æquinoctiali, & 11. in horizontali, dabit horam 22. ab Oc- casu: & sic de cæteris horis ducendis, idem, prout te tabula docebit, iudicium esto.

Horas ab Ortum eidem inscribes, si ductum linearum ex opposita parte lineæ ho- rizontalis AE, cum horis in æquinoctiali institutum seruaueris. Est enim nihil aliud horologium Babylonicum, nisi horologium Italicum inuersum; cui si horas ab Or- tum appinxeris, habebis Babylonicum. Si itaque ex centro gnomonis vtrique in lineam horizontalem transferas puncta horarum ab Occasu, hæc cum punctis in æquinoctiali correspondentibus coniunctæ dabunt horas ab Ortum. Res nihil prorsus difficultatis habet. Tabularum huiusmodi construendarum methodum, vt & sequentium, vide in Theorema IX. fol. 251.

*Horologium Ba- bylonicum.*


**Pragmatia III.**

*Horas ab Occasu in verticali plano Orientali, plano meridiano equidistante depingere.*

DŪscribatur primò horologium Astronomicum Orientale iuxta Pragmatiam III. præcedentis problematis, vnâ cum medijs horis, in quo linea hori- zontalis sit EF, locus gnomonis I, æquinoctialis CD, linea mundi AB, in quo horas ab Occasu hac arte inscribes, ab hora 9. incipiendo. Vide per quas horas hæc transeat, & inuenies in tabula transire per 3. in æquinoctiali, & 4½. in horizontali; per hæc enim puncta recta ducta dabit horam 9. ab Occasu, horam 10. duces per 4. in æquinoctiale, & 5. in horizontali, & sic de cæteris ordine horis. Horam 12. ita duces: ex puncto I, loco gnomonis ad lineam horizontalem.

*Quomodo 12. ducenda.*

deſcribe arcum ZV, in quo ſpacio arcum ZB ab horizonte vſque ad lineam horæ ſextæ duplâ; per finem enim duplati arcus, & per centrum gnomonis, ſi rectam VX



duxeris, erit illa hora 12. quæſita; ſtylus erit tantus, quanta eſt altitudo regulæ, vel ſpaciũ inter horam 6. & 3. ſive 9.

*Horologij Orientalis Italici interſectiones omnes in linea æquinoctiali, & linea horizontali ſive linea 24. contingunt.*

|                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Horæ ab occaſu.                    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Horæ in æquinoctiali.              | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| Horæ in horizontali, ſive lin. 24. | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  |

**Pragmatia IV.**

*Horas ab Occaſu in plano meridiano Occidentali delineare.*

Horæ æſtronicæ primò iuxta Pragmatiam III. præcedentis problematis deſcribantur in plano propoſito: ſitque AB, axis; CD æquator; FE horizon, V locus gnomonis, ſintque horarum earundem puncta cum dimidijs in æquinoctiali, & linea horæ 12. (In hac enim interſectiones contingunt) ritè notata. Primò horæ 12. lineam ita deſcribes; quadrans à linea horizontis per T, deſcribatur; in quo ſi arcum ST, duples in arcum SM, erit linea per M, & locum V gnomonis ducta linea MN horæ 12. quæſita. Reliquas horas ex Tabula ſequenti ita inſcribes, ab hora 23. incipiendo.

*Horæ 12. deſcripſio.*

|                |    |    |    |    |    |    |    |                        |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|
| Horæ Italicæ   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ſive ab occaſu.        |
| Horæ æſtronicæ | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | in linea æquinoctiali. |
| Horæ æſtronicæ | 3  | 4½ | 4  | 5½ | 5  | 6½ | 6  | in linea horæ 12.      |

Vide

Vide in Tabula, per quas horas æſtronicas tranſeat hora 23. & inuenies 5. in æquinoctiali; & 6½. in linea horæ 12. per has enim linea recta ducta dabit, hora 23.

Hora 22. ducatur per 4. in linea CD, & per 5. in MN.

21. ducatur per 3. in CD, & per 5½. in NM.

20. ducatur per 2. in CD, & per 4. in NM.

19. ducatur per 1. in CD, & per 4½. in NM.

18. ſemper erit parallela æquinoctiali CD, ducique debet per punctum commune interſectionis MN lineæ horæ 12. & lineæ horæ tertie æſtronicæ, habebisque horologium occidentale quæſitum. Stylus, eiufque locus, & quantitas, vt in præcedenti.

*Horæ 18. qui ducenda.*

**Pragmatia V.**

*Horas ab Ortu in eodem meridiano plano deſcribere.*


Si in plano meridiano deſcriperis horologium Italicum Occidentale, habebis horologium Babylonicum Orientale; & ſi in plano meridiano deſcriperis horologium Italicum Orientale, habebis Babylonicum Occidentale; differentia tantum erit in horis; in Orientali enim Babylonico prima poſt 24. lineam 1. horam refert; & ſic de cæteris; in Occidentali verò vltima hinc Romæ erit 15. cætera omnia eadem ſunt. Horas igitur ab Ortu, & Occaſu inſcripſimus, quod erat propoſitum.

*Horologium Babylonicum in meridiano plano.*

**Pragmatia VI.**

*Horologium polare in plano polari, ſive circuli horæ ſextæ deſcribere.*

Deſcribatur horologium polare æſtronicum cum medijs horis, iuxta regulas in præcedentibus traditas, ductis duabus lineis AB, SN, in G, ad rectos angulos ſe interſecantes.



II. Pro fundamento horologij deſcribes duas lineas, ſcilicet lineam horæ 12. & 24. hac induſtria: producat lineam horæ nonæ in directum in T, atque ex horæ nonæ puncto deſcribatur quadrans ST. Si itaque per I, terminum elevationis poli à T, numerando, & per centrum quadrantis rectam duxeris, ſecabit illa lineam AB, in puncto X, per quod ad AB, normalis ducta CD, dabit horam 12. Si horam 24. ſive horizontalem deſideres, transferes GX, ſpaciũ ex G, verſus A, in V, per

*Horæ 12. quomodo ducatur.*

per quod parallela ad SN, ducta dabit quæſitum. Vel erigatur ad IX, lineam ex puncto 9, normalis, hæc enim ubi AB lineam ſecuerit, per id punctum ſcilicet V, parallela ad SN, ducta dabit RQ, quæſitam lineam 24. ſive horizontalem :

Porro horas ab Occaſu in dato polari plano per tabulam ſequentem, inſcribes hac arte.

| Ital. Bab.                  |    |    |                                                        |                                                |                                             |    |    |
|-----------------------------|----|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Horæ Italicæ, & Babylonice. | 23 | 11 | ducuntur per horas aſtronomicas in linea æquinoctiali. | & per horas aſtronomicas in linea horizontali. | vel per horas aſtronomicas in linea hor. 12 | 5½ |    |
|                             | 22 | 10 |                                                        |                                                |                                             | 4  | 5  |
|                             | 21 | 9  |                                                        |                                                |                                             | 3  | 4½ |
|                             | 20 | 8  |                                                        |                                                |                                             | 2  | 4  |
|                             | 19 | 7  |                                                        |                                                |                                             | 1  | 3½ |
|                             | 18 | 6  |                                                        |                                                |                                             | 12 | 3  |
|                             | 17 | 5  |                                                        |                                                |                                             | 11 | 2½ |
|                             | 16 | 4  |                                                        |                                                |                                             | 10 | 2  |
|                             | 15 | 3  |                                                        |                                                |                                             | 9  | 1½ |
|                             | 14 | 2  |                                                        |                                                |                                             | 8  | 1  |
|                             | 13 | 1  |                                                        |                                                |                                             | 7  | ½  |

Vt igitur lineam horæ 23, ab Occaſu habeas, duces iuxta tabulam lineam per 5½ in æquinoctiali, & per 11½ in horizontali, ſive lineam horæ 24. vel etiam per 5½ in linea horæ 12. & habebis lineam horæ 23. Ita pro hora 22, duces lineam per 4 in æquinoctiali, & per 11 in horizontali, vel 5 in linea horæ 12. & habebis quæſitum. Atque ita ordine ſingulas horarum lineas tabule huius longe facillimæ beneficio deſcribes. Stylus, ſive gnomon erit tantus, quantum ſpacium eſt inter locum gnomonis G, & lineam horæ 9. vel 3. in æquinoctiali SN.

Horologium Babylonicum.

Horologium Babylonicum cum protuſum idem ſit cum Italico, inuerſam tantum rationem habens in ſitu, & horis; ideò ſuperuacaneum eſſe ratus ſum, in re nullius difficultatis explicanda tempus perdere. Sufficiat igitur figura hic appoſita vtriuſque rationem clarè oſtendere.

Pragmatia VII.


In plano æquatori parallelo horas ab Ortū, & Occaſu deſcribere.

Huiusmodi horarum deſcriptio, cū longè facillima ſit, eam breuioribus quoque expediamus.

I. Deſcribat horologium æquinoctiale aſtronomicum iuxta Pragmatiam V. eritque linea horæ 12. CD; horæ ſextæ BA.

II. Sint cæteræ horæ æqua diſtantia ſe conſequentes: hoc peracto, ſi per ſingulas horas eo in puncto, ubi ambitum ſecant, ad circulum, tangentes ducantur, habebis vtrumque horologium Italicum, & Babylonicum expeditum: tangens MZ, refert horizontem, horæ inſcribentur ea ratione, qua hic factum vides. Styli longitudo ita inuenietur: ex C puncto ubi meridiana & horizontalis ſe ſecant, deſcribatur arcus EXN, in quo ab N incipiendo, numeretur complementum altitudinis poli 48. grad. Si enim per terminum huius gradus EXC rectam duxeris, ſecabit ea lineam horæ ſextæ in puncto X terminum altitudinis ſtyli aſſignante. Quantitas igitur gnomonis in N centro normaliter conſiſtentis erit NX. Stylum quoque hac indu-

inducta inquire, Cum errore ſculptoris arcus EXN, in figura omiſſus ſit, intentionem noſtram circa quantitatem ſtyli hac declaratione melius forſan clariuſque ob oculos ponere volumus.



Ad angulum C, in puncto communi interſectionis meridianæ, & horizontalis, conſtituatur angulus complementi elevationis poli, verbi gratia Romæ 48. graduum; Linea enim CB, dictum angulum ad C, cum linea CN, conſtituens ſecantque lineam NB, in B, aſſignabit NB, quantitatem, ſive altitudinem ſtyli quæſitam; eritque triângulum gnomonicum ſupra planum datum NBC. Quantitas igitur ſtyli erit linea NB, locus eiufdem N, in quo normalis; NB, ſive NA, ſemidiameter circuli omnium ſemper apparentium maximi.

Pragmatia VIII.

Dato plano à verticali primario declinante, in eo horologium delineare Italicum.

Et primò horologium aſtronomicum in dicto plano per Pragmatiam VI. vna cum medijs horis. Si enim ope tabule in Pragmatia II. huius Problematis propoſite, per duo quælibet puncta, per quæ in æquinoctiali, & horizonte horæ ab Occaſu tranſeunt, rectas duxeris; habebis Italicum horologium quæſitum. Quæ interſectiones cum communes ſint omnibus horis aſtronomicis in quibuſcunque planis delineatis, poteris dictæ tabule ope, nullo penè negotio deſcribere omnis generis declinantia, inclinantia, inclinata, & ex his mixta.



C A P V T I I.


*Horarum Planetariarum, ſive inæqualium in dato plano inſcriptio.*

Problema XIII.

*Horas inæquales, ſive antiquas, ſeu Planetarias, in dato plano delineare.*


Pragmatia I.

*ſi datum planum horizontale.*

I.  iuxta Pragmatiam III. Geographiæ gnomoniæ, XY parallelum 18. horarum deſcriperis in horologio horizontali aſtronomico, habebis horas inæquales ope tabulæ ſequentis, quam ad mediashoras ſupputabis, hæc ratione.

|              |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |     |     |
|--------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Horæ aſtron. | III | 3½ | 4½ | 5½ | VI | 6½ | 7½  | 8½ | IX | 9½ | 10½ | 11½ | XII |
| Horæ inæqu.  | XII | 1  | 1  | 1½ | II | 2½ | III | 3½ | IV | 4½ | V   | 5½  | VI  |

Ab hora 6. inæquali, quæ ſemper cum 12. aſtronomica coincidit, operationem ordire. Quintam igitur horam deſcripturus, vide vbi aſtronomica 10½. fecerit parallelum XY, horarum 18. Si enim per hoc punctum, & horam V inæqualem, aut



11. aſtronomica in æquinoctiali rectam duxeris, habebis horam quaeritam. Ita per IX. aſtronomica eo in loco, vbi parallelum 18. horarum ſecat, & per IV. inæqualem in æquinoctiali (ſunt enim, vt in figura apparet, in æquinoctiali horæ inæquales).


æquales, ſive aſtronomicae proſus eadem) vel etiam per 10. aſtronomica. duxeris, rectam, habebis horam quartam inæqualem, non ſecus cum alijs procedes. Donec primò integras, deinde etiam medias horas expediueris, gnomonicum triangulum idem in omnibus eſt cum præcedentibus.

Si quis verò difficultatem reperiat in ducendo parallelo 18. horarum, is ſequenti methodo vti poterit.

*Alius modus.*

Fiat circulus in materia pellucida, quem diuides ex tabula ſupra fol. 278. tradita, in arcum minimi diei totius anni; ſitque arcus diurnus  $\phi$  ſive minimi diei DNE, arcus verò  $\omega$  ſive maximi diei ANB: vtrumque in 12. æquales partes diuides, ita tamen, vt diuiſiones ſint cuique ad conſuſionem vitandam propriæ, vt apparet. Huius circuli ope, vnà cum regula centro O eius affixa, ita horas in æquales deſcribes. Deſcripto prius horologio horizontali aſtronomico vnà cum tropicis, & triangulo gnomonico: Sint horarum aſtronomicarum ſolummodo puncta in æquinoctiali impreſſa, vt apparet. Hoc peracto, applica centrum circuli cum regula ſupra lineam meridianam, ita vt illud tantum ab æquinoctiali remoueat, quanta eſt linea CB, videlicet in D & G lineæ meridianæ exactè reſpondeat, quemadmodum circulus DMBN luculenter declarat. Sit

*Organum pro ducendis horis inæqualibus.*




igitur hora 5. inæqualis in tropico  $\phi$  deſcribenda, applica regulam ſupra 5. horam arcus diurni DNE, vide vbi illa ſeſe cum æquinoctiali interſecet: per hoc igitur interſectionis punctum ex centro V horologii filum extenſum ſecabit tropicum  $\phi$  in puncto; per quod punctum, & punctum quintæ inæqualis, ſive horæ 11. in æquinoctiali recta ducta dabit horam quintam. Remoue iterum regulam ſupra horam quartam arcus DNE, nota vbi ſecetur æquator: per hæc enim ex centro horologii V filum extenſum ſecabit tropicum  $\phi$  in puncto, per quod, & per 4. inæqualem, ſive 10. aſtronomica in æquinoctiali recta ducta dabit horam quartam inæqualem; & ſic operaberis in reliquis horis, donec medium arcum abſolueris; puncta enim horarum inuentarum in alteram arcus medietatem translata, dabunt in tropico  $\phi$  horas inæquales poſt meridiem. Iterum præcipitur inſcribi hora 1. inæqualis Sole in  $\omega$  conſtituto; admoue regulam horæ 1. arcus diurni ANB, & nota vbi æquinoctialem ſecet regula, per hoc punctum, & per centrum horologii V recta ducta, ultra centrum, tropicum  $\omega$  ſecabit in puncto, quod horæ 7. aſtronomice reſpondeat.

nomica, siue in aequali in aequatore coniunctum, dabit horam 1. quaesitam. Par ratione ceteras ordine horas inscribes. Demstratione huius vide in Protheoria III.

**Pragmatia II.**

*In plano verticali propositas horas describere.*

**F**iat primò horologium verticale astronomicum cæcis tantum lineis effigiatum, vna cum parallelo 6. horarum, qui cum 18. horarum parallelo idem est; & tropicis, quos descriptos habes praxi paulò post explicanda, describes in hoc plano horas, antiquas eodem prorsus modo, quo in præcedentibus. Primò quæ



dem subsidio tabulæ in hac Pragmatia propositæ. Deindè circulo cum regula, cuius centrum tantum distet ab æquinoctiali puncto C, quanta est linea CB trianguli gnomonici verticalis, videlicet in O puncto, & linea MON circuli congruat lineæ meridianæ, siue 6. inæquali. Deinde operabere, vt in præcedente, & desideratum effectum poteris.

**Pragmatia III.**

*In plano meridiano propositas horas inscribere.*


**S**i prius horologio astronomico cæcis tantum lineis instructo, parallelum 18. horarum inscripseris, habebis subsidio tabulæ sequentis puncta intersectionis

|             |     |       |    |       |    |        |    |       |      |       |   |       |     |
|-------------|-----|-------|----|-------|----|--------|----|-------|------|-------|---|-------|-----|
| Horæ astro. | III | 4 1/2 | 6  | 7 1/2 | 9  | 10 1/2 | 12 | 1 1/2 | 3    | 4 1/2 | 6 | 7 1/2 | 9   |
| Horæ inæq.  | XII | I     | II | III   | IV | V      | VI | VII   | VIII | IX    | X | XI    | XII |

horarum in æquinoctiali, & parallelo 18. horarum, per quæ rectæ ductæ dabunt horas quaesitas.

Horizon in horologio est DR, arcus 6. vel 18. horarum, XY, quem secant horæ astronomicæ. In reliquis non est modus operandi à præcedentibus diuersus. Si ve-

ro per circulum operari volueris, ita illum applicabis. Centrum eius tantum sit ab æquinoctiali remotum in linea horæ sextæ astronomicæ, quanta est altitudo sty.




li, & MN sit parallela æquatoris; eritque circulus ad operandum firmatus. Age igitur, vt in prioribus, & habebis quaesitum: sed figura te melius docebit omnia.

**Pragmatia IV.**

*In plano polari idem describere.*

**C**vm horologium polare idem sit cum meridiano, situ tantum, & horis differat, non est quoque diuersa ratio eius delineandi. Quare qui meridiani ra-



tionem horologij probè perceperit, hic dubius esse non poterit. Sufficiat igitur loco instructionis sola figura.


**Pragmatia V.**

*In plano æquinoctiali horas inæquales describere.*

**N**ihil facilius est, quàm in æquinoctiali plano propositas horas inscribere. Ita igitur operare: Diuide arcum nocturnum  $\overline{AHB}$  in 12. partes æquales: iterum arcum  $\overline{CFD}$   $\text{X}$ , &  $\text{XI}$  in totidem partes æquales: per puncta enim in utroque arcu signata recte ducte dabunt lineas horarum antiquarum quæsitas. Porro, si arcum  $\overline{AVB}$  iterum in 12. partes, & arcum  $\text{X}$ , &  $\text{XI}$   $\overline{CSD}$  in totidem diuiseris, habebis puncta, per quæ recte ducte dabunt horas antiquas quæsitas.

*Aliter.*

**S**i parallelum horarum 18. descriperis, qui cum in æquinoctialis plano circulus sit; facilis quoque erit eius descriptio, & per Tabulam in præcedentibus positam operatus fueris, prodibunt iterum linee horarum quæsitæ.



Nota tamen hic horas in arcu  $\overline{DSC}$  descriptas feruire superiori plano æquinoctiali; horas verò in arcu  $\overline{CFD}$ , descriptas, inferiori æquinoctialis plano, ubi tamen horæ inuersum ordinem seruabunt.

**CAPVT IX.**

*De alia Horolaborum Italico-Babyloniorum descriptione.*

**Problema XIV.**


*Horas ab Ortu & Occasu, cuius dato plano summa facilitate inscribere.*

**Pragmatia I.**

*Organum, cuius beneficio horæ ab Ortu, & Occasu dicto citius inscribantur, construere.*

**D**ESCRIBATUR primò circulus  $\overline{MANB}$ , linea, seu diametro  $\overline{MN}$  bifariam diuisus. Secundo ab  $M$  numera utrinque arcum semidiurnum ex Tabula propria in primo Progymnasmate proposita, verbi gratia, hic Romæ 113. grad. & 3. minut. atque per puncta  $\overline{DE}$ , terminantia arcum diurnum  $\overline{DE}$  linea ducatur  $\overline{DE}$ , diuideturque arcus in duo segmenta, diurnum, & nocturnum. Sole in  $\overline{CO}$  sito. Iterum tranferatur ex  $M$ , utrinque arcus diurnus  $\text{X}$ , id est arcus  $\overline{NE}$ , vel

*Omnia sunt hominum tenui pendencia filo.*




*Et casu subito, que valere, & trun.*

$\overline{ND}$ , ducaturque linea  $\overline{AB}$ . Tertio, à  $B$  incipiendo diuidatur totus circulus  $\overline{BMAN}$  in 24. æquales partes, & circulus idem ab  $E$ , incipiendo in totidem partes, ut figura docet. Per quas ex centro  $O$ , rectas ducet, vel loco linearum regulam affiges. Circulus autem sit in charta tenui, vel alia quapiam materia pellucida: vel si regula sit affixa, prorsus excusus; tantum armillis ad regulam sustentandam relictis: habebisque instrumentum præparatum.

Pragmatia II.

Dato triangulo gnomonico, tropicis, & æquatore beneficio Organi constructi, horas Italicas in plano horizontali describere.

Describatur primò in plano horizontali triangulum gnomonicum, & duo tropici vnâ cum æquatore punctis horarum à meridie, & media nocte prius insignito; Deinde applicetur pellucidus ille circulus horarius paulò ante præparatus linea sua MN ita meridianæ AB, vt centrum organi à puncto æquinoctialis



juxta quãtãtatem semidiametri æquinoctialis in triângulo gnomonico distet; In organo quoque linea BA, vel DE, circulum in duo sequenta diurni, & nocturni arcus dici maximi secans sit æquatori parallela, & consequenter linea NM meridianæ congrua. Hoc peracto, vide vbi lineæ horariæ in pellustri circulo, vel regula supra horarum puncta posita, ex centro circuli ductæ secant CD æquinoctialem horologij. Si enim per hæc puncta, ex centro horologij filum duxeris, secabit id tropicum in punctis, quæ cum punctis horarum à meridie, & media nocte correspondentibus coniuncta dabunt horas ab Occasu, cuius inuersum horologium Babylonicum est. In quoloco 23. pones 1: pro 22. 2. & sic de cæteris.

Nota tamen hoc loco: si puncta horarum in tropico ☉ habere desideres, numerationem horarum à puncto B per MADNE instituendam esse. Si verò puncta desideres in tropico ☿, eandem numerationem ab E per BMADN instituendã, ipse circulus diuisus ostendit. Ita vides regulam positam supra puncto 18. secare CD in lineam in puncto per quod ex centro A filum eductum, secabit tropicum ☉ in γ: per hoc enim punctum, & per 12. astronomica recta ducta dabit lineam horæ 18. quæ sitam.

Vt autem scias, cum quibus punctis horarum à meridie, & media nocte, in æquinoctiali coniungi debeant puncta horarum ab Occasu in tropicis inuenta: consules hanc tabellam, quam & in regulam sciathericam transtulimus.

|                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| Horæ Ital. in trop. ☉ | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6  | 5  | 4  | 3 | 2 | 1 |
| Horæ altr. in æquin.  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |


Quomodo numero horarum in organo inscribendi sit.

PRAG-

Pragmatia III.

Dato triangulo gnomonico tropicis, & æquatore; horas ab Ortus & Occasu in plano verticali, præcedenti Organo inscribere.

Fiat in plano verticali triangulum gnomonicum ad verticale planum constructum: sitque planum tropicis quoque cum æquatore punctisque horarum astronomicarum signatum, vt prius. Hoc peracto applicetur circulus pellucidus in 24. æquales partes diuisus, iuxta lineam MN, lineæ meridianæ ita congruè, vt cen-



trum eius tantum in eadem linea meridianâ à puncto æquinoctialis distet, quãta est semidiameter æquinoctialis in triangulo gnomonico. Circuli autem diuisio, horarum initium capiet à puncto A, quam diuisiõnem sola inuersione circuli obtinebis, si fiat vt B veniat loco A, & E loco D. Hoc etiã peracto, obserua vbi lineæ horariæ interfecent æquinoctialem, Super hæc enim puncta, & super centrum horologij posita regula, vel filum ex eodem eductum sectione dabit in tropico ☉ puncta, quæ cum punctis horarum astronomicarum in æquinoctiali inuenta coniuncta dabunt horas ab Ortus, & Occasu. Si tamen numeratio horarum instituta fuerit ab A iuxta seriem punctorum MBEN, Si verò numeratione à D, iuxta puncta A, M, B, E, N, D, instituta, horarum ex centro circuli ductarum interfectiones cum æquinoctiali obseruaris: per hæc ex centro horologij rectæ, vel filum ductum, secabunt tropicum ☿ in punctis, quæ cum punctis horarum in æquinoctiali in lineas contracta, dabunt horas ab Occasu, & Ortus. In horologio Boreali tropicus ☿ fiet tropicus ☉ situmque supra horizontem rescissum dabit horologium Boreale.


Pragmatia IV.

Datis tropicis, & æquatore, horas Italicas in plano polari describere.

Eundem circulum pellucidum horarium applicabis supra meridianam AB, horologij tropicis, & æquatore suo instructi, ita vt ab æquatore horologij, tantum distet O centrum organi in meridianâ, quanta est altitudo styli, & deinde ita operare. Ab A versus M numeratione instituta, vide vbi lineæ circuli, vel regula supra puncta horarum posita æquinoctialem secet: ad hæc enim puncta normales ductæ secabunt tropicum ☉ in punctis, per quæ lineæ horarum Italica-

rum

rum ducendæ ſunt. Si verò numerationem inſtituas à D verſus M, ſecabitur equis




noctialis SN in punctis, ad quæ normales ductæ ſecabunt tropicum  $\sigma\sigma$  in punctis, quæ cum horis aſtronomis in æquinoctiali cõiuncta iterũ eandem horas dabunt.

**Pragmatia V.**

*Datis tropicis æquatore, triangulo gnomonico, horas Italicas in Meridiano plano tam Orientali quàm Occidentali deſcribere.*

**C**um meridiani plani horographia proſus eadem ſit cum ea, quæ ſit in plano polari, eadem quoque operatio adhibita dabit eundem, quem in illo, effectum. Si enim planum polare ita ſtatuas, vt æquinoctialis ſit in ſuo plano 48. gradus exaltatus, ad horizontalem verò lineam hoc ſitu parallela per centrum gnomonis recta ducatur, ſcilicet horizontalis, ſiue hora 24. dabunt conſequentes lineæ horæ ab Occaſu queſitas 23. 22. 21. 20. & ſic de ceteris. Verùm ſi te huius laboris te-

OCIDENTALE      ORIENTALE



deat, applicato circulum Organi horarium vtrique plano, eo præciſè ſitu, quem tibi figura monſtrat: hoc etiam peracto, ſi opereris vt in præcedentibus docuimus, obſeruan-

ſeruando videlicet vbi lineæ circuli CD æquatorem vtriuſque plani ſecent, per hæc enim puncta ad æquinoctialem normales ductæ ſecabunt tropicum  $\sigma\sigma$  vel  $\phi$  in punctis, per quæ tranſibunt horæ Italicæ, iuxta tabulam præcedentem.


Nota tamen hanc pro punctis in tropico  $\sigma\sigma$  numerationem horarum in circulo inſtituendam à puncto C, verſus N, in orientali. Pro punctis verò in tropico  $\phi$  ab E, verſus N, in eodem orientali horologio. In occidentali puncta tropici  $\sigma\sigma$  habebis, ſi numerationem horarum inſtituas à D, verſus B; & tropici,  $\phi$  ſi numeraueris à B, verſus N. Vide figuram, quæ te omnia melius docebit, quam ego vel multis verbis declarare poſſim.

**Problema XV.**

*Horas antiquas, ſiue inæquales, in dato plano organice inſcribere.*

*Fabrica Organi.*

**M**aneat idem circulus paulò ante diuiſus per lineam AB in duo ſegmenta arcus diurni, & nocturni diei maximi, ſitque arcus diurnus ANB $\sigma\sigma$ ; nocturnus, ſiue diurni diei minimi, videlicet  $\phi$  DNE, quorum vtrumque in 12. æqua-




les partes diuides ab A, incipiendo verſus N, ducesque per puncta diuiſionum in vtroque arcu rectas è centro circuli. Benè autem, & ſine confuſione operaberis, ſi lineas per puncta arcus  $\sigma\sigma$  ductas diſtincto colore ab illis, quæ per puncta arcus  $\phi$  ducentur, deſcriperis; & habebis inſtrumentum perfectum, cuius ope facillimè reliquas horas inſcribes, vt ſequitur.

**Pragmatia I.**


*Dato triangulo gnomonico, tropicis, & æquatore in plano polari Horas antiquas deſcribere.*

**D**elineatis duobus tropicis, & æquinoctiali vna cum punctis horarijs in dato plano applicabis organum diuiſi circuli meridiane ea ratione, vt centrum circuli tanto ab æquinoctiali interuallo diſtans ſit, quantum eſt interuallum in-

teriz. & 9. siue 3. horam in æquinoctiali: AB verò equidistet equatori. Deinde vide vbi lineæ horariæ per centrum V æquinoctialem fecerit; nam ad illa normales occulte ductæ secabunt tropicum  $\sigma\sigma$  in punctis, quæ cum punctis horarum à meridie, & media nocte in æquinoctiali coniuncta dabunt horas antiquas quæsitas.



Pro meridiani plano operaberis eadem ratione, qua in Pragmatia 3. præcedentis problematis operati sumus. Vt tamen securius præcedas, hic vtriusque tam orientalis, quàm occidentalis horologij, figuram apponendam duxi. Si enim puncta horarum pro tropico  $\sigma\sigma$  desideres, numerabis à punctis A, versus N. Si verò puncta




pro tropico  $\sigma\sigma$  à D, versus N, instituetur, vt in figura patet: notandaque in æquinoctiali horologij interfectiones, per has enim normales ductæ secabunt tropicos in punctis, quæ rectis coniuncta dabunt horas quæsitas. Circulus autem debet habere

habere situm in vtroque, quem figura demonstrat. Pro plano æquinoctiali in præmissis quoque dictum est. In declinantibus, & inclinatis operaberis eadem prorsus ratione, quam in astronomicis declinantibus, & inclinatis præscripsimus.

**Pragmatia II.**

*Eisdem in horizontali plano describere.*

**F**iant primò in plano quopiam horizontali triangulum gnomonicum cum tropicis, & æquatore, vt in priori pragmatia dictum est. Hoc peracto, applica organum diuisi circuli lineæ meridianæ, vt priùs; videlicet, vt distantia centri circuli à C, in meridiana, sit tanta, quanta CB, semidiameter æquinoctialis in triangu-




lo gnomonico, & NM dictæ meridianæ congruat. Hoc peracto: si puncta tropici  $\sigma\sigma$  desideres, numeratione ab A versus N, instituta, vide vbi lineæ horarum ex circumferentia per centrum ductæ secant æquinoctialem; per hæc enim filum ex V centro horologij ductum secabit tropicum  $\sigma\sigma$  in punctis, quæ cum punctis horarum in æquinoctiali coniuncta dabunt lineas horarum inæqualium, cuius hora sexta semper respondet 12. astronomicæ. Si verò puncta horarum in tropico  $\sigma\sigma$  desideres, initio horarum circuli factò à D, versus N, vide vbi lineæ ex hoc arcu per centrum ductæ secant æquinoctialem; per hæc enim puncta ex V centro horologij filum ductum in tropico  $\sigma\sigma$  dabit puncta, quæ cum punctis in tropico  $\sigma\sigma$  inuentis coniuncta dabunt horas antiquas: quæ, si benè operatus fueris, omnes se interfecare debent in horarijs punctis æquinoctialis.

**Pragmatia III.**

*Horas antiquas in plano verticali describere.*

**I**N plano horologij verticalis, tropicis, æquatore, & triangulo suo gnomonico constructi, organum horographum meridianæ plani, ea industria applicetur, vt centrum eius tantum distet ab æquinoctiali, quanta est CD, semidiameter æquinoctialis.

notialis in triangulo gnomonico, & meridianæ congruat MD, vt prius. Hoc per-  
actio, initio numerationis horarum in circulo facta, à B versus N, pro punctis 6;  
à D vero versus N, pro punctis 6. Est enim situs circuli in hoc horologio oppo-



ras ei, quem habet in horizontali, vt figura ostendit. Obserua, vbi lineæ horariæ se-  
cent æquinoctialem: per hæc enim puncta ex centro horologii filum ductum seca-  
bit-tropicum 66, & 70 in punctis quæ punctis horarum à meridie, & media nocte in  
æquinoctiali horologio conjuncta dabunt horas antiquas in plano dato.

Pragmatia IV.

Easdem mechanicè describere.

Si instrumento denique obseruatorio cap. 3. descripto, vti velis describes horas  
ab ortu, & occalu, vti & planetarum ad archetypum horolabium in dato quoli-  
bet possibili plano, vt in dicto capite traditum est.

Appendix,

Sive

Artificium Mirificum terminandarum horarum.

Periam hic colophonis loco mirificū quoddam per quemuis parallelum So-  
lis darum, terminandarum horarum artificium, quo nihil pulchrius, facilius,  
atque exactius in hoc genere excogitatum esse credo, est enim omnium modo-  
rum, qui vquam hucque, quod sciam, reperti sunt, & vniuersalissimus, & ele-  
gantissimus in finitisque modis variari potest, quo quidem non dubito, sagacibus  
ingenijs innumera similia inueniendi occasionem præbebimus. Hanc inuentionem  
nobis suggestit propositio 5. lib. 2. Astrolabij Clauij num. 36. & propositio 6. num. 37.  
vbi sagax Lector machinationis nostræ fundamenta reperiet; Cuius quidem de-  
mon-

monstrationis Authorem inuenio P. Grienbergerum, à quo Clauius, complura alia  
hauit ingeniosè demonstrata suis in operibus. Nos relicta demonstratione,  
quam Lector citato loco videre poterit, nostra tantum inuenta hinc prodemus. Ve-  
rum ne in tam singulari inuentione a multis procedamus, rem ab otio, vt dici so-  
let ordiemur.

Propositio I.

Dato puncto cuiuscunque paralleli Solis in quacunque hora notifi-  
cato, reliquarum datarum horarum terminationem per id  
punctum infinitis modis inuenire.

Si primò puncta parallelorum Solis data in linea hora 12. horologii, quæ qui-  
dem ex analemmate fol. 273. & 274. descripto facile habebis, hac industria, di-  
cantur in plana quadam superficie duæ lineæ ad rectos sese intersecantes AB, CD,  
quorum AB meridianam, CD æquinoctialem designet; ex analemmate vero super  
AB constituitur triangulum gnomonicum horizontale, cuius A centrum sit ho-  
rologii, B punctum æquinoctialis meridianum: D, locus styli eiusque quanti-  
tas DV, productoque radio æquatoris VB, circa eum vtrinque radiorum ex V,  
prodeuntium lineæ hoc est signorum Zodiaci declinationes ex analemmate citato  
describantur, vbi enim hic radius Zodiaci lineam meridianam secabit, ibi erunt  
puncta parallelorum Solis in meridiana, siue 12. assignata. Horum opè punctorum  
reliquas horas infinitis, vt diximus modis terminabimus. neque enim in nostro  
hoc artificio post horarum linearum descriptionem aliud requiritur, nisi vnum  
aliquod punctum quo terminata est aliqua hora; & puncta in super æquinoctialis  
per quæ tum horæ integræ, tum horarum partes saltem earum aliqua incedunt.  
Nam pro terminatione omnium horarum integralium requiruntur puncta æqui-  
noctialis tum integralium horarum, tum semihorarum, vel saltem vnus alicuius  
semihoræ, pro terminatione vero semihorarum, & puncta quadrantum, & denique  
pro terminatione quadrantum puncta in super semiquadrantum, vel saltem vni-  
cum illorum est necessarium, vt ex sequentibus patebit.

Quæ terminan-  
tur ad horarum  
integralium ter-  
minationem,

Si igitur ex fundamento verbi gratia inuentum sit punctum meridianum can-  
cri F, ita ex eo reliqua puncta inueniemus in alijs etiam lineis horarijs tam pro can-  
cro, quam pro capricorno. Applicetur regula ad punctum F, & ad singula puncta  
horarum, & semihorarum in æquinoctiali inuenta, in ijs enim applicationibus ter-  
minabuntur omnes lineæ horariæ vbi easdem regulam interfecat tam pro cancro,  
quam pro capricorno (ex cepta hora 12. capricorni, quoniam ipsa quoque ex funda-  
mento terminetur) videlicet hoc ordine. Hora prima 66 pomeridianæ terminatur  
ex puncto æquinoctialis spectans ad dimidiam horam vltra sextam ante, vel pome-  
ridianam. Deinde ex proximo puncto horæ 7. vel ante, vel pomeridianæ termi-  
natur hora 2. & ita deinceps donec perueniatur ad horam terminandam, quæ in  
arcu diurno cancri non habetur. Tunc enim eadem illa hora terminabitur in ca-  
pricorno, cuiusmodi est hora 8. & reliquæ vsque ad horam quartam: post eam  
verò rursum terminabuntur ab hora 5. incipiente, reliquæ horæ in cancro, idem-  
que verum est si terminationem instituire liberet ex puncto capricorni E.

Exemplum ope-  
rationis.

Ceterum inuentis hoc modo omnibus punctis licebit quoduis illorum exami-  
nare, & ex quouis omnia alia. Nam si verbi gratia punctum c. horæ quintæ exami-  
nare velis per punctum in hora 3. cancri inuentum: considerabis quæ nam horæ  
sit media inter horam quintam, & tertiam, nempe hora quarta. Si igitur ab hora  
quarta exclusiue sex numeres horas verbi gratia vsque ad horam 10. erit punctum  
horæ

Aliud exemplū

horæ 10. æquinoctialis illud, quod cum punctis horæ quintæ, & tertie exiſtit in eadem linea recta. Si verò punctum horæ tertie, per quod probare libet punctum horæ quintæ, foret in capricorno, tunc eſſet ipſum punctum æquinoctialis horæ quartæ, quæ videlicet eſt media inter horam quintam, & tertiam illud, quod cum punctis horæ quintæ, & tertie iacet in eadem linea recta, & ita de reliquis. Eodem enim diſcurſu idem punctum horæ quintæ, ex alijs punctis examinaſis, & per punctum horæ quintæ omnia alia. Verum ut hæcæ duas regulas facilius retineas eas ſeorſim ſubijcere libuit, necnon tertiam adijcere ex qua colligitur ſi in æquinoctiali ſumatur aliquod punctum alicuius horæ ad illudque, & ad punctum terminationis alicuius horæ regula applicetur, quæ nam per illam applicationem alia hora terminetur, id quod pertinet ad ipſum modum terminandi initio traditum.

**Regula I.**

*Qua inuenitur punctum in æquinoctiali, quod cum duobus punctis duarum horarum Cancræ, vel Capricorni, quorum vnum quaeritur & alterum datur, vel quorum vtrumque datur, in eadem linea recta exiſtat.*

**Q**uærat primo, quæ hora ſit media inter duas horas Cancræ, vel Capricorni assignatas. Deinde quænam hora ab illa hora media excluſiue, teneat locum ſextum. Nam punctum eius horæ in æquinoctiali erit illud quod cum punctis duarum horarum Cancræ, vel Capricorni in eadem linea recta iacet.

Vnde ſi duo quæſus illorum punctorum dentur, per applicationem regulæ ſemper inuenietur tertium.

**Regula II.**

*Qua ruruſum inuenitur punctum æquinoctialis, quod cum duobus punctis, quorum vnum in Cancro, alterum in Capricorno exiſtit, iacet in eadem linea recta.*

**Q**uærat hora, quæ inter horas tropicorum eſt media. Eius enim punctum, in æquinoctiali erit id quod quaeritur.

Vnde ruruſum ex quibuſcunq; duobus datis inuenietur eorum tertium.

**Regula III.**

*Qua inuenitur, quodnam punctum tropicorum, cum duobus punctis, quorum alterum ſit quoque in alterutro tropico, & reliquum in æquinoctiali, iaceat in eadem linea recta.*

**A**b hora æquinoctialis excluſiue numerentur horæ ſex: punctum enim horæ tropici, quæ cum hora altera assignata in tropico equaliter diſtat ab illa hora ſexto loco reperta, erit illud, quod cum duobus reliquis in eadem linea recta exiſtit.

ſit. Si igitur hora illa tropici poſterius inuenta contineatur in arcu diurno horæ tropici assignatæ, erit vtraque hora in eodem tropico. Si verò illa hora poſterius inuenta non contineatur in arcu diurno alterius horæ tropici, erunt in diuerſis tropicis.

Atque ita, ſi duo quæſus ex tribus punctis dentur, dabitur per applicationem regulæ, & reliquum.

Exempli cauſa, cupio ſcire punctum H, 7. æquinoctialis, & punctum horæ 12. cancri, cum quo puncto tropici iaceat in eadem linea recta. Numerando 6. horas excluſiue ab hora 7. inuenio horam primam: deinde numerando ruruſum vnam horam vltra horam primam, propterea quod hora 12. ab eadem hora prima diſtat citra per vnam horam, inuenio horam ſecundam, quæ cum ſit pomeridiana, contineaturque in arcu diurno cancri, erunt puncta horarum 2, 12. cancri, & 7. æquinoctialis in eadem linea recta.

Ruruſum cupio ſcire punctum horæ 10. æquinoctialis, & punctum horæ 8. à media nocte in cancro, cum quo alio puncto tropico in eadem linea recta exiſtat. Numerando primò ab hora 10. excluſiue, ſex horas, reperio horam quartam verbi gratia pomeridianam: deinde numerando ab hora quarta, horas nouem, quot videlicet horis diſtat hora octaua Cancræ ab hora quarta, inuenio horam 12. media noctis. Cum igitur iſta hora non contineatur in tropico Cancræ, erunt puncta 12. Capricorni, 8. Cancræ, & 10. æquinoctialis in vna linea recta: & ita de reliquis. Quas operationes compendioſius in ſequenti tabella tibi exhibemus. Ita in primo exemplo quære horam 7. in æquinoctiali è latere, & numerus in tranſuerſa ferie ſub 12. in fronte tabula dabit 2. numerum quaeritum; hæc enim hora cum 7. & 12. in eadem linea recta iacet, & hora 2. terminatur. Iterum in ſecundo exemplo, ſi quaerueris 10. in latere, dabit tibi in tranſuerſa ferie ſub 12. in fronte numerus 8. horam quaeritam. Hora igitur 10. 12. & 8. in eadem recta linea exiſtunt. Non ſecus in reliquis procedendum eſt.

*Horæ parallelorum.*

|               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
|               | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |               |
| $\frac{1}{2}$ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | $\frac{1}{2}$ |
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 7             |
| $\frac{1}{2}$ | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | $\frac{1}{2}$ |
| 2             | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 8             |
| $\frac{1}{2}$ | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | $\frac{1}{2}$ |
| 3             | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 9             |
| $\frac{1}{2}$ | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | $\frac{1}{2}$ |
| 4             | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 10            |
| $\frac{1}{2}$ | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | $\frac{1}{2}$ |
| 5             | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 11            |
| $\frac{1}{2}$ | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | $\frac{1}{2}$ |
| 6             | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12            |

Horæ cum diuidijs in æquinoctiali.

Horæ cum medijs in æquinoctiali.

Verum ne Lector curioſus, in hac operandi methodo alicubi perplexus hæreret, totius



totius speculationis ideam sanè admirabilem, sequenti Pinace, quam ob innumerabilem operationum multitudinem, & varietatem, non immerito mirificam appellamus, complexi sumus. Ex hoc enim horæ cuiuscunque punctum innumeris modis; non per tropicos tantum, sed per quemlibet datum Solis parallelum, præter voluptatem, facilitatemq. penè incredibilem, vbertate quoque, & varietate combinationum infinita, terminare docemus. Quicumque hoc artificium profundius rinatus fuerit, is portam sibi ad innumera alia in reconditori astronomia sacramenta apertam cognoscat; faterique cogetur illud Phocylidis: *Ὅτ' ἴσα ἡμέρα πάντα καλῶν.*



Pinax

*Explicatio Pinæis mirifici.*

**V**T Lector curiosus mirabilem speculationis ideam *καθ' ἑαυτὴν* comprehendere; hic pinacem ordinauimus, in qua singulæ terminationum horarum combinationes mira quadam arte ita proponuntur, vt in omni gnomonico negotio infinitum vsum præbere possit innumerarum praxium: vnde & eum mirificum appellauimus. Vfus eius, est qui sequitur. Si itaque ad manum sit Pinax, quam hic adscripsimus, licebit per eam instituere terminationem horarum sine superiori discursu, ac numeratione horarum, in hunc modum. Quærat horam, cuius punctum terminationis datur, & ex quo aliarum horarum puncta sunt inuenienda, in supremo, vel infimo latere Tabulæ, & sub eadem, vel supra eandem intrâ aream eiusdem Tabulæ, hora quam placet terminare; in lateribus enim dextro & sinistro è regione horæ terminandæ, reperies horam æquinoctialis lineæ, ex qua proposita debet institui terminatio. Hoc est, si ad datum punctum terminationis, & ad inuentam horam lineæ æquinoctialis regula applicetur, secabit ea lineam horariam, quam terminare iubet in puncto quæsito. Quod in horizontali quidem horologio ad parallelum, seu arcum borealem spectabit, si ea sectio fiat supra æquinoctialem versus centrum horologij: ad australem verò, si infra æquinoctialem ea sectio contingat. Si tamen regula applicetur ad vtrunque punctum in æquinoctiali inuentum, & hora proposita in vtroque parallelo, tam boreali, quam australi contineatur; inuenietur per vnam applicationum eorum punctorum vnum, & per alteram alterum. Si verò proposita hora terminanda, solum habeatur in boreali parallelo, terminabitur eadem hora ex vtroque illo puncto æquinoctialis, solum pro parallelo boreali; & vnum quidem punctum erit terminus horæ à media nocte, & alterum horæ eiusdem à meridie. Exemplis res fiet clarior.

*Vfus Tabulæ.*

Ex puncto, verbi gratia F, horæ 12. Cancræ, sint terminandæ omnes horæ reliquæ, tam pro Cancro, quam pro Capricorno; verbi gratia prima hora, quæ tam in Cancro habetur, quam in Capricorno. In supremo igitur latere, quaero horam 12. eam videlicet, per quam hora prima est terminanda, & sub eadem intra aream horam primam, quam terminare libet: atque ab hac in transversum progredior ad vtranque partem, vsque ad latus dextrum, & sinistrum, in quibus reperio dimidiam horam ante primam, in latere sinistro, & dimidiam horam ante 7. in dextro. Cōcludo igitur, terminationem horæ primæ per punctum 12. F, institui debere ex duobus punctis æquinoctialis lineæ, quæ pertinent ad dimidias horas ante horam primam, & septimam. Quod ita se habere inuenies, si regulam ad dicta puncta applies: nam ex dimidia horæ septimæ inuenies terminari horam primam pro Cancro; & ex dimidia horæ primæ, terminari eandem horam primam pro Capricorno. Quod si loco puncti F, nempe 12. Cancræ sumpsissemus punctum E Capricorni, inuentum fuisset punctum in linea horæ primæ pro Cancro ex dimidia horæ primæ, & pro Capricorno ex puncto æquinoctialis, quod spectat ad dimidiam horam septimæ, videlicet ordine inuerso.

Rursum ex eodem puncto 12. F, vel E, terminanda sit hora, verbi gratia, 7. quæ in Capricorno Romæ non habetur, sed vtraque in Cancro, nempe tam ante quam post meridiem. Quoniam igitur sub 12. terminante (sic enim breuius appellabitur ea hora, per quam alia est terminanda) hora septima terminanda, in lateribus dextro & sinistro habet respondentes dimidias horas æquinoctialis, videlicet, ante horam 10. & 4. Si ad hæc duo puncta æquinoctialis applicetur regula, & verbi gratia ad punctum F; terminabitur ex hora quidem dimidia ante 4. hora 7. à media nocte; ex hora verò dimidia ante horam 10.

Ecc hora

hora 7. à meridie , & quidem vtraque in Cancro , &c. Eadem enim prorsus est ratio de alijs horis , ex quibus aliae , vel quæ ex alijs sunt terminandae , cum dicto modo semper in æquinoctiali inueniantur puncta , ex quibus eiusmodi terminatio instituitur .

Possent etiam ex eadem Tabula terminari lineæ horariæ , assumendo primum punctum in æquinoctiali , atque ad illud , & ad punctum alicuius horæ iam terminatæ , regulam applicando : illico enim ex Tabula constabit , quænam alia lineæ horaria , per illam regulæ applicationem terminetur : nempe in hunc modum . Inuenta illa hora æquinoctialis in lateribus dextro , vel sinistro eius partis tabellæ , in cuius supremo vel infimo latere continetur hora terminans , procedatur ab eadem hora æquinoctialis in transuersum ; donec perueniatur ad cellulam directè suppositam horæ terminanti : in ea enim cellula existet hora , quæ per illam applicationem regulæ terminatur ; nisi forte hora illius cellulæ horæ terminanti sit æqualis : tunc enim applicatio regulæ , in nulla alia lineæ præterquàm in lineæ horæ terminantis , punctum terminationis monstrabit .

Itaque , vt vides , amplissimus est vsus huius tabellæ ; cum per eam infinitis penè modis diuersis terminari possint lineæ horariæ , vel certè examinari , num videlicet puncta terminationum sint bene inuenta ; & haec non solum in tropicis , sed in quibuscunque alijs parallelis oppositis , si in lineæ meridiana , vel lineæ horæ sextæ reperiantur ex fundamento , eorundem parallelorum vnum aliquod punctum . Sed & illud accedit ad excellentiam eiusdem tabellæ , quòd quasi vnico aspectu inueniri faciat omnes illas horas , quæ sese mutuo ex alijs atque alijs punctis horarijs in æquinoctiali repertis , definiunt ac terminant . Si enim verbi gratia per punctum 12. Cancræ alias lineas terminatæ libet , accipiasque in tabellæ supremo latere eandem horam 12. habebis sub eadem omnes horas , tum integras , tum earum semisses quadrantisque , simulque in latere dextro , & sinistro è regione earundem horarum , horas æquinoctialis lineæ , ex quibus eadè horæ terminantur per 12. Si verò in latere dextro , vel sinistro , aliquam horam æquinoctialis accipias , ab eaque in transuersum procedas , reperies rursus omnes horas terminandas , ex illa hora æquinoctialis ; horæ verò terminantes erunt illæ quæ singulis horis terminandis in supremo latere sunt directè superscriptæ .

Quod si etiam eandem tabulam diligentius consideres , videbis ex horis integris lineæ æquinoctialis per horam quamcunque parem , cuiusmodi sunt 12. 2. 4. 6. &c. duntaxat terminari horas pares ; & per horam impari , solum horas impares : atque adeo si terminatæ sint duæ aliquæ horæ , quarum vna sit par , & altera impar , beneficio earum omnes reliquas tum pares tum impares posse terminari : si videlicet ad singula puncta æquinoctialis , quæ pertinent ad horas integras , regula applicetur , & ad puncta duarum illarum horarum terminatarum , verbi gratia primo ad horam parem , & postea ad horam impari . Atque hinc illud quoque facile deduces , quòd quidem diligenter est obseruandum ; ne quando in horologio solum descriptæ sunt lineæ horarum integrarum , in æquinoctiali tamen etiã puncta semihorarum necesse sit inuestigare : nempe tunc sufficere , si in æquinoctiali vnum aliquod punctum inueniatur , quòd spectet ad vnã aliquam horam dimidiam : vt videlicet , ex ea per punctum verbi gratia horæ 12. Cancræ terminetur aliqua horarum imparium ; quam quidem illico agnosces ex tabula . Nam si verbi gratia inuentum sit in æquinoctiali punctum dimidiæ horæ ante horam nonam : reperies ex tabula , quòd ex illo puncto per horam 12. terminetur hora quinta ; quæ cum sit impar , terminabuntur per eam omnes reliquæ impares , si regula ad eius punctum terminationis applicetur , & ad singulas horas integras æquinoctialis , vt dictum est .


Si verò in horologio descriptæ sint etiam semihoræ , requiritur vt in æquinoctiali

Præstantia huius Tabellæ.

Pinax Mirificus Horarum a meridie et media nocte , Inferendus folio 402. Hora per quas aliae terminantur.

Table with 12 columns and 12 rows, containing numerical data for 'Hora linearæ Aequinoctialis' and 'Hora linearæ Aequinoctialis'.

Hora per quas aliae terminantur.



Residuum Tabula.  
Horæ per quas aliæ terminantur.

|   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 6 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 1/32 | 1/33 | 1/34 | 1/35 | 1/36 | 1/37 | 1/38 | 1/39 | 1/40 | 1/41 | 1/42 | 1/43 | 1/44 | 1/45 | 1/46 | 1/47 | 1/48 | 1/49 | 1/50 | 1/51 | 1/52 | 1/53 | 1/54 | 1/55 | 1/56 | 1/57 | 1/58 | 1/59 | 1/60 | 1/61 | 1/62 | 1/63 | 1/64 | 1/65 | 1/66 | 1/67 | 1/68 | 1/69 | 1/70 | 1/71 | 1/72 | 1/73 | 1/74 | 1/75 | 1/76 | 1/77 | 1/78 | 1/79 | 1/80 | 1/81 | 1/82 | 1/83 | 1/84 | 1/85 | 1/86 | 1/87 | 1/88 | 1/89 | 1/90 | 1/91 | 1/92 | 1/93 | 1/94 | 1/95 | 1/96 | 1/97 | 1/98 | 1/99 | 1/100 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

Horæ lineæ æquinoctialis.

Horæ lineæ æquinoctialis.

Horæ per quas aliæ terminantur

ciali saltem vnus aliquis inueniatur quadrans, vt ex eo per 12. vel 6. terminetur aliqua semihorarum, quam tabula indicabit: per punctum enim terminationis illius semihoræ, terminabuntur omnes aliæ semihoræ, partim ex horis dimidijs, partim ex horis integris æquinoctialis.

Postremo, ad terminandum lineas quadrantum necesse erit in æquinoctiali inuenire punctum pro semiquadrante, hoc est, pro octaua parte alicuius horæ: inde enim per 12. vel 6. terminabitur vnus aliquis quadrans, ex quo alij possint terminari.

Hinc patet ratio, quare in lateribus tabularum; ad octauas vsque partes horarum lineæ æquinoctialis fuerimus progressi: nempe vè eadem tabula inferuiret etiam ad terminationem quadrantum, qui cum sint partes omnium minimæ quæ in horologijs communiter describi possunt, eousque extendisse tabulam sufficebat.

Qui tamen minutiores partes in horologio describere voluerit; is facile tabulam extendet, si in lateribus descenditibus, inter horas, & partes hic positas interponat quartas partes quadratum, hoc est, partes decimasextas integrarum horarum; & in supremo; & infimo latere, inter horas, & earum partes terminantes, partes octauas interijciat, vt & inter horas, & horarum partes, in area tabula contentas.

Quòd potius, cum rarissimum sit vt quadrantes describantur B solum semihoræ, vè etiam solum horæ integræ; quiuis poterit sibi in eum vsum particularem tabulam ex hac vniuersalem decerpere, ne sit opus tam magnam tabulam circumferre. Sed explicemus nunc seorsim vsum eiusdem tabellæ per proprios canones; quòd facilius, quid in terminatione linearum sit agendum, inueniatur.

Semihora quomodo terminetur.

Tabula ad octauas horas partes extenditur.

Sequuntur Canones Tabule superius adductæ.

Canon I.

Proposita hora arcus alicuius paralleli; ex quonam ea puncto æquinoctialis, per horam terminatam arcus eiusdem paralleli, vel oppositi, terminanda sit, inquirere.

Quærat hora terminata, seu terminans, in supremo verbi gratia latere Tabulæ, & sub eadem hora terminanda intra aream. E regione enim huius horæ inuenies in sinistro dextroque latere æquinoctialis horas, quarum alterutra satisfaciens proposita questionem.

Canon II.

Ex assignata hora in æquinoctiali, per quamnam horam arcus paralleli terminari possit hora propòsita, inuestigare.

Quærat hora æquinoctialis in sinistro, vel dextro latere tabellæ, & inde in transversum procedatur per aream eiusdem, donec in cellulam incidat horæ terminandæ. Si igitur ab eadem cellula sursum eas, vel deorsum; inuenies in supremo, vel infimo latere horam quæsitam, nempe per quam terminari possit hora propòsita.

## Canon III.

*Ex assignata hora in æquinoctiali, quænam hora terminetur per horam datam ac terminatam arcus alicuius paralleli, dignoscere.*

**Q**uæratnr rursus hora æquinoctialis in latere sinistro, vel dextro hora terminans, seu terminata in supremo, vel infimo latere: intra enim arcum, directè infra, vel supra horam terminantem, existet terminanda quæ quaeritur.

*Cyclus I. A, B, Anacephaleonicus maioris Tabule.*

**Q**uia tamèn nò omnes hæc tabulas secum circumferere possunt, hinc Lectoris christi commoditati studentes, ingentem Pinacem in Cyclicum systema disposuimus, ea industria, ut quæcunque in abaco ingenti, in hoc cyclico systemate continerentur. Propositiones verò præcedentium trium canonum facile etiam accommodabuntur sequenti Cyclo, in quem superiorem tabulam eo consilio contraximus, ut quando fuerit opus, in minori aliquo spacio totum illud, quod in illo tabula prolixius habet, describi possit.

Anacephala ofis  
Tabula.

*Solutio propositionis Canonis I. per Cyclum AB.*

**P**onatur hora terminanda, inuenta inter horas Cycli medij, qui est extimus rotæ mobilis, sub hora terminata seu terminante, inuenta in Cyclo extimo, nempe in immobili. Eo namque in situ constitutis Cyclis, respondebunt horæ 12. Cycli tertij, extimi horarum terminantium, in Cyclo intimo, qui est horarum lineæ æquinoctialis, vel earum partes, quæ in tabula inuenta fuissent in lateribus dextro, & sinistro, si per eam propositio soluenda fuisset.

*Solutio propositionis Canonis II. & III.*

**P**onatur hora æquinoctialis, inuenta in intimo Cyclo, sub hora 12. Cycli extimi horam terminantium: in ea enim constitutione Cyclorum, respondebit in extimo Cyclo hora terminans, horæ terminandæ, quæ accipiendæ est in Cyclo medio; vel contra hora terminanda in medio Cyclo respondebit horæ terminanti, quæ reperta est in primo Cyclo; prout scilicet secundi, vel tertij canonis propositio soluenda proponitur.

His igitur obseruatis: si verbi gratia hora sexta terminanda ponatur sub 10. terminante, videbis sub 12. terminante positam horam 2. & 8. æquinoctialis, ex qua iuxta primum canonem, debet fieri ea terminatio.

Rursum si verbi gratia hora secunda, vel octaua æquinoctialis ponatur sub 12. Cycli horarum terminantium, respondebit iuxta secundum canonem, horæ verbi gratia 6. terminandæ medij Cycli, hora 10. terminans in Cyclo extimo. Vel iuxta III. Canonem horæ 10. terminanti Cycli extimi, hora sexta terminanda in Cyclo medio: & ita de reliquis, ut endo lineis cellulas distinguendis loco partium proximè

ximè minorum, quam in cellulis contineantur, quando ad quadrantes, vel octauas partes descendendum est.

*Cyclus horarius II. CD inferniens ad descriptionem Arcuum Parallorum, in quouis horologio Astronomico, nullo panenegotio perficiendam.*

## Explicatio Cycli.

**C**omplectitur hic Cyclus duas partes, rotam immobilem vnam, & alteram mobilem.

Rota immobilis duobus constat Cyclis, extimo, qui æquinoctiali tribuitur, continetque 12. horas integras cum semihoris, quadrantibus & semiquadrantibus seu octauis partibus horæ; necnon Cyclo interiorè, cuius horæ, semihoræ, & quadrantes sunt illi quorum in descriptione arcuum puncta, vel querunt, vel reperiuntur. Ac proinde idem hic Cyclus interior non male Cyclus horarum terminandarum poterit appellari. Rota verò mobilis vnicum habet Cyclum horarum semihorarum, & quadrantum, qui cum ad horas, & partes horarum parallelorum pertineant, libuit eundem Cyclum nominare Cyclum horarum Paralleli, vel etiam horarum terminantium quod in eo accipiantur propriè horæ per quas horas alias placet determinare. Itaque

|                |                   |                  |                               |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Rotæ immobilis | { Extimus         | } appellabitur { | Cyclus Aequinoctialis.        |
|                | { Cyclus Interior |                  | Cyclus horarum terminandarum. |
| Rotæ mobilis   | { Cyclus vnicus   | }                | Cyclus horarum terminantium.  |

## Vfus appositi Cycli.

Vfum propositi Cycli tribus expediemus Problematibus, quæ sequuntur.

## Problema I.

*Ex assignata hora in Æquinoctiali, quænam hora determinetur in arcu cuiusvis paralleli, per eiusdem horam datam ac terminatam, dignoscere.*

**I**n hoc Problemate duo dantur, & assignantur nempe punctum alicuius horæ in æquinoctiali linea, & punctum in aliqua linea horaria, quod spectet ad arcum alicuius paralleli: Tertium verò inquiritur, nempe linea horaria, in qua inueniatur punctum eiusdem arcus paralleli, si ad duo puncta assignata regula applicetur, id quod ex appposito Cyclo nullo negotio ita reperietur. Posita enim hora 12. Rotæ mobilis seu Cycli horarum terminantium (quam index monstrat manus ad pictæ) sub hora assignata in æquinoctiali in eiusdem Cyclo reperta, si rursus in Cyclo, horarum terminantium quaeratur hora paralleli, respondebit eidem in Cyclo proximo horarum terminandarum hora paralleli quæ quaeritur, ea videlicet quæ ex datis punctis determinatur. Ut; si data hora in æquinoctiali sit quinta, vel decima prima ante, vel post meridiem, & hora paralleli per quam determinare libet aliam sit verbi gratia sexta ante meridiem, si horam 12. Cycli horarum terminantium statuamus, sub hora 5. vel 11. Cycli æquinoctialis, inueniemus è regione

giōne horae sextae Cycli horarum terminantium; nempe in Cyclo horarum terminandarum horam 4. quae per horas datas ac assignatas omnino determinabitur si in proposito horologij plano eadem hora contineatur. Eademque est ratio de alijs horis, earumque partibus, quae in proposito Cyclis ponuntur. Quod si hora terminans foret assignata 12. non esset necesse quodquam mouere Rotam mobilem, cum in Rota immobili, sub hora aequinoctialis, quaesita hora ac terminanda sit collocata. Id quod intelligas non de horis integris duntaxat, sed etiam de semihoris, & quadrantibus, adeoque & de octauis partibus in Cyclo aequinoctiali descriptis. Ita vides, ex hora 1. vel 7. aequinoctialis determinari horam secundam: item ex hora prima, cum  $\frac{1}{2}$  determinari horam  $\frac{1}{2}$  post secundam, tertiam, & denique ex  $\frac{1}{4}$  ultra primam tertium quadrantem post secundam, si videlicet dictae horae per 12. paralleli determinantur.

### Problema II.

*Ex assignata hora in aequinoctiali, per quamnam horam paralleli terminetur hora proposita, inuestigare.*

**H**ic etiam duo dantur, videlicet horae aequinoctialis, & hora terminanda; quarumque tertium, videlicet, quamnam sit illa hora paralleli, per quam ex dato puncto aequinoctialis ducta linea exhibeat punctum arcus paralleli, in linea horae assignatae. Pone iterum horas 12. Cycli horarum terminantium sub hora Cycli aequinoctialis: hora enim, quae in eodem Cyclo horarum terminantium respondet horae assignatae inuenta, & in Cyclo horarum terminandarum, erit illa per quam insituenda est determinatio. Vt verbi gratia si horam 12. Cycli horarum terminantium colloces sub 9. horae aequinoctialis; videbis e regione horae 5. Cycli horarum terminandarum, quae videlicet proponitur exempli causa terminanda, horam 1. positam in Cyclo horarum terminantium, per quam videlicet proposita hora quinta, potest determinari, si punctum in hora prima non desideretur.

### Problema III.

*Proposita hora Paralleli, ex quonam ea puncto aequinoctiali, per datam horam paralleli determinanda sit, inquirere.*


**Q**uestum in hoc Problemate est punctum aequinoctialis lineae, & vtrumque datum horae sunt paralleli, vna quidem terminans, & altera terminanda. Inquiratur quaelibet illarum in proprio Cyclo, videlicet terminanda in Cyclo horarum terminandarum, & terminans in Cyclo horarum terminantium, & haec per circumuolutionem rotae mobilis sub illa constituatur: quae enim in hoc situ Cyclorum, in Cyclo aequinoctialis respondet hora, duodecimae horae Cycli horarum terminantium (quam scilicet index manus demonstrat) ea erit ex qua proposita hora determinari potest, si punctum eiusdem hora in aequinoctiali linea existat. Hoc modo, si hora quarta Cycli terminantium horarum constituatur sub tertia Cycli horarum terminandarum, cum duodecime Cycli horarum terminantium respondeat hora dimidia ultra tertia, vel nona in Cyclo aequinoctialis; colligetur

getur, Horam tertiam per quartam, terminari ex puncto aequinoctialis horae  $\frac{1}{2}$  post tertiam, vel nonam.

### *Notandum circa primum, & secundum Problema.*

**Q**vando tam hora terminans quam terminanda occurrit eadem; tunc Problema redditur quidem inutile, cum determinari hora per seipsam non possit: illud tamen inde habetur, quod ex illa hora facile iudicetur quae duae horae ex eodem aequinoctialis puncto simul terminentur. Semper enim duae aliquae horae terminabuntur ex assignato illo puncto aequinoctialis, quae vel aequaliter distant ad vtramque partem horae terminantis, quae cum terminanda conincidit; vel quae aequaliter distant in vtramque partem horae assignatae in aequinoctiali.

Qui porro vsum omnium dictorum exactius scire desideret, consulat Ouranographiam sequentem nostram sciathericam, vbi per exempla, & varia paradigmata, fusius omnia tractata reperiet.



ATHANASII KIRCHERI  
E SOC. IESV PRESBYTERI  
ARTIS MAGNAE  
LVCIS ET VMBRAE


Liber Quintus.

OVRONOGRAPHIA  
GNOMONICA,

Siue

DE TOTIVS PRIMI MOBILIS  
DOCTRINA  
IN QVIBVSCVNOVE  
PLANIS SCIATHERICE REPRÆSENTANDA.

PRAEFATIO.



**P**RAEMISSA Horographia tanquam notiori, nunc ordinis ratio postulare videtur, ut celestium circulorum doctrinam, eadem, qua illam, methodo prosequamur. Et quamvis non ignorem, Clavium nostrum eruditissime in hac materia versatum: quia tamen opus eius gnomonicum adeo plerisque difficile videtur, ut vix sint, qui aut mentem Authoris percipiant, aut si percipiant, morosarum demonstrationum in intricatissimis figuris tedium sustineant: Ego cura singulari in id incubui, ut nova, & hucusque inuisa methodo tam insignem, & curiosam doctrinam quantum possem, promoverem, ingeniaque è tot tricis liberarem. Cum vero experientia doctus, plerosque praxi inhiare, demonstrationes quoque Problematibus annexas Tyronibus plus impediendi, quam adiumenti adferre notarem; omnem demonstrationum gnomonicarum appa-

apparatum seorsim expendere visum est; quod in prima huius Operis parte praestitimus; ut sic exercitatio pragmatica inoffenso pede cursum suum teneret, simulque tam Theoricis, quam Practicis, hoc quantumcumque meo studio prodesse. Multorum quoque problematum à me recens inuentorum demonstrationes, rationesque data opera subicui, aut subobscurè indicaui; ut curiosis ingenijs, dum cognoscendarum, que in problematis proposita sunt, rationum desiderio tenentur, ulteriores speculando, rimandoque, inventionum campum aperirem. Discet igitur Lector in hoc opere omnis generis Planisphaeria, siue Astrolabia sciatherica in quacumque superficie data, & methodo, & facilitate, qua à nemine alio, quod sciam, praestitum sit, delineare. Atque hæc sunt, de quibus primò Lectorem monendum duxi; ut si forsan propositiones à modo d'icatas videret, ob eam, quam diximus causam, id contigisse sciret. Sicut itaque varij situs Astrolabiorum secundum variam opticam proiectionem contingunt, ita varia hic Astrolabia secundum planorum diuersitatem docebimus. Ita videbis in planis polaribus, meridianis, æquinoctialibus, Astrolabia uniuersalia; in reliquis particularia. Sed omnis verborum ambagibus; rem ipsam aggrediamur.

PRAEEXERCITAMENTVM


PRIMUM.

Triangulum radiosi Zodiaci delineare.



**P**ADIOSVS Zodiacus nihil est aliud, quam figura Trigona declinationis signorum, à radijs Solis causata, quos in principio signorum in centro terræ, seu gnomonis apice sese intersecantes, in plano ad æquatorum recto, siue polari diffusos rectè imaginamur; nihilque aliud sunt, quam latera conorum sciathericorum, quos Sol circa apicem gnomonis describit in dicto plano. Dictum autem Zodiacum ita delineabis.

Primò, ex Tabula declinationis Solis fol. 276. proposita vide singulorum signorum ab æquatore in Austrum, vel Boream declinationem, quam seorsim acceptam hic posuimus.




Primus modus  
cõstruendi Zo-  
diacum radio-  
sum.

Secundò, arcu CD circa lineam AB ducto, à B vtrinq. numerentur declinationes signorum iuxta tabellam hic è latere appositam. Primò, pro  $\gamma$   $\mu$ , & oppositis  $\eta$   $\chi$  ab æquatore æquidistantibus signis numerentur 11. grad. & 30. min. vtrinq. & per terminum numerationis ex A, lineæ ducantur, quarum vna erit radius  $\gamma$ , &  $\mu$ , altera radius  $\eta$ , &  $\chi$ . Iterum ex B vtrinq. numerentur 20. grad. & 30. min. per quorum finem ex A lineæ vtrinq. ductæ dabunt radios  $\Pi$   $\Omega$ , &  $\Phi$   $\Sigma$ . Iterum numerentur ex B vtrinq. 23. grad. & 30. min. per quos ex A lineæ ductæ termini erunt declinationis maximæ Solis. Si


|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
|   | G  | M  |   |
| Y | 0  | 0  | ☉ |
| ♈ | 11 | 30 | ♋ |
| ♉ | 20 | 30 | ♌ |
| ♊ | 23 | 30 | ♍ |

igitur puncta C, & D, recta coniunxeris; habebis triangulum Zodiaci radiosum quæsitum, Vel etiam media pars Zodiaci radiosum sufficere poterit uti hic, ubi AD radium æquatoris, DE maximam Solis declinationem refert tam australem, quam borealem. Porro Zodiacum radiosum, alia industria præparabis, vt sequitur. Ex A centro descripto arcu CD, in eo vtrinq. numera maximam declinationem Solis, punctaque extrema numerationis CD recta coniunges; è cuius medio puncto E, intercapedine EC, vel ED, describatur circulus FDGC, quem in 12. æquas partes diuides. Hoc peracto; si per puncta NP, KL, HI, MO, æquè à punctis C, & D, remota occultas lineas duxeris, secabunt eæ arcum CED in punctis, per quæ ex A rectæ ductæ exhibebunt Zodiacum radiosum quæsitum,

Secundus modus.



Tertius modus.



Consectarium I.

Hinc patet, quæ mediõrum signõrum, vel quotuis partium radij Trigono inscribi possint; si videlicet à B, in prima figura, aut secunda à C, numeratas vtrinq. declinationes medijs, vel tertijs, aut sextis signõrum partibus respondentes, lineis ex A ductis determines. Nos hic tantum mediõrum signõrum radios duximus.

Consectarium II.

Triangulum Menographum.

Si verò triangulum Menographum, siue mensum describere velis, videbis quibus gradibus signõrum principia mensum respondeant; horum enim graduum declinatio à B, vtrinq. versus C, & D, numerata dabit puncta, per quæ radij ex centro A, ducantur. Vide figuram huius trianguli in Geographia gnomonica.


Consectarium III.

Si denique singulos gradus declinationis Solis describere placeat, per singulos gradus à B versus C, & D, puncta rectæ ex A ductæ dabunt quæsitum.

Præexercitamentum II.

Triangulum radiosum quantitatis dierum, & noctium delineare.

Ex centro E, intercapedine qualibet EC, vel EF, describatur arcus circuli, in quo à C vtrinq. computetur completum eleuationis poli, vsque in F, vel



A, quod recta AF, terminet. Hoc peracto, intercapedine AG, vel GF, cuiusvis magnitudinis circulus describatur, quem & in 48. partes æquales diuides: huius enim duo quælibet puncta ab A, & F, vtrinq. æquè remota, si rectis occultis coniungas, secabunt hæ lineam AF, in punctis, per quæ ex E rectæ ductæ dabunt trigonum quantitatis dierum, & noctium quæsitum. Atque hæc est *menographia* Schoënerij particularis; nos verò eam vniuersalem reddimus in Geographia gnomonica, quam consule. Si enim lineas eduxeris ex centro ad lineas latitudinis, vbi secatur à lineis horarijs; ibi dabuntur declinationes arcuum diurnorum sub eleuationibus datis.


Modus instrumenti vniuersalis.

Præexercitamentum III.

Analemma, pro conicis sectionibus describendis, construere.

Circulus ABCI duabus diametris AI, & CB in centro D, se ad rectos intersecantibus dirimatur, eritque BC horizontalis, AI verò verticalis linea. hunc à B & C incipiendo vtrinq. in 4. quadrantes, & vnumquemque in 90. gradus diuides, vt vides.

2 Numerata à C, altitudine poli vsque in E, per centrum D ducatur linea EDS, quæ erit axis mundi, quam in centro D ad rectos fecer æquinoctialis XY.



III. Coniungantur singuli gradus à punctis lineæ horizontalis BC æquè remoti rectis lineis, vel ad confusionem vitandam singuli 10. aut 5. gradus, vt nos hic fecimus, & per eosdem gradus ex centro ducantur aliæ lineæ, constituenturque triangula conica declinationis stellarum quæsitâ.


IV. Ad verticalem AI parallela ducatur QR, tanto ab ea intervallo distans, quanta est altitudo gnomonis; figurabiturque ex segmentis axis mundani PD æquatoris DL, & lineæ plani PL, triangulum gnomonicum PLD, pro plano verticali. Si verò idem gnomonicum triangulum pro horizontali desideres, duces horizontali BC parallelam MN, longitudine gnomonis ab ea distantem, fietque ex segmentis axis mundi SD, æquatoris DL, planique horizontalis SL, triangulum gnomonicum DSL plano horizontali inscribens; secabuntque lineæ QR, & MN, conos ijs in punctis, per quæ in lineam meridianam translata hyperbolæ duci debent, vt postea in praxi videbitur. Seruiet autem hoc analemma pro conicis sectionibus omnium parallelorum declinationis stellarum in toto mundo, Vnde instrumentum fiet vniuersalius, si æquinoctialis, & axis mundi coniuncti, & in centro D versatiles supra datam poli, & æquatoris altitudinem sisti possint. Seruiet etiã hoc ad conicas sectiones arcuû diurnorum in quouis plano inscribendas, vt in sequentibus patebit.

Quomodo instrumentum vniuersale reddatur.

Præexercitamentum IV.


Rete, siue Instrumentum Almucantaro-azymuthicum describere; hoc est, Almucantaras, & Azymutha, siue circulos horizontales, & verticales in plano horizontali, regulæ sciathericæ ope, describere.

Itaque Rete Almucantaro-azymuthicum pro plano horizontali sic describes. Fiat primò seorsim circulus cuiuscunque magnitudinis HRTV, duabus diametris





eris HT, & VR, in quatuor quadrantes se se in centro D, ad rectos interfecantibus diremptus; sitque triangulum gnomonicum applicatum lineæ meridianæ HT, erit-



que radius BC axis mundi, AC æquatoris, DC gnomon, cui in quadrante horographico abscindes æqualem portionem AB, seorsim in figura 2. Si igitur BY, parallelam ad AI, latus quadrantis duxeris, dabit hoc parallelogrammum ABIY, excisum regulam expansam, quæ centro suo B applicabitur ad centrum D, loci styli seorsim in plano horizontali assumpti; ita ut vnum latus regulæ BY, lineæ DV, vel DR; & alterum regulæ latus AB, lineæ HT, perfectè congruat. Si itaque iuxta applicatæ regulæ gradus in lineæ DV, vel DN, puncta impresseris; dabunt per ea ex centro D, circuli ducti Almucantaras, siue circulos horizontales quæstos. Si verò A, centrum linearum in regula descriptarum centro D, ea ratione applicetur, ut latus AI, lineæ DT, vel DH, perfectè congruat; dabunt extrema puncta graduum lineæ BY, in lineæ AI, puncta, per quæ, si ex D centro, seu loco styli in peripheriam circuli lineas rectas duxeris, erunt hæ lineæ verticales, siue Azymutha quæ sita in vno quadrante, quæ deinde in alios quadrantes transferentur.

Hoc instrumentum tam insignem vsum habet, ut vix vllum linearum genus dari possit, quod ope huius in plano projici non possit, ut in sequentibus fufius demonstrabitur. Vnde id instrumentum, Almucantaro-azymuthicum intitulandum duximus. Si quis enim in vasto aliquo plano Almucantaras, & Azymutha per singulos gradus dicta industria describet; habebit is mechanicum instrumentum, quod idem præstabit, quod tabulæ Almucantaro-azymuthicæ; ut in sequentibus videbitur.


*Instrumentum Almucantaro-azymuthicum.*

**Præexercitamentum V.**

*Almucantaras, & Azymutha in plano verticali describere.*

**A**pplicetur ABC, triangulum gnomonicum verticale AC, lineæ meridianæ plani, notatisq. tribus punctis A poli, C æquatoris, & O styli; si per O, ad AC normalem VR, & per C, ad VR, aliam parallelam duxeris, erit VR horizontalis, MN æquinoctialis, Hoc peracto; applica regulam latitudinem habentem altitudini styli æqualem paulò

paulò ante constructam, ita lineæ VR horizontali, vt BY dictæ lineæ perfectè congruat. Si itaque puncta graduum in hoc situ lineæ horizontali VR impresseris, & per




ea ad lineam meridianam parallelas duxeris, habebis verticales circulos, siue Azymutha in dato plano descripta. Eadem habebis, si ad quantitatem styli OB, ex O puncto in lineam AC, translata circulum ex termino styli supra, vel infra horizontalem assumpto duxeris; hunc enim in 360. partes si diuiseris, & per puncta diuisionum in horizontalem VR, rectas duxeris, dabunt per puncta parallelæ ad meridianam AC ductæ, Azymutha quæ sita.

Alia ratio de  
scribendi Azy-  
mutha.

### Pro Almucantaribus ita operare.

**I**N quadrantem horographicum transferantur (retenta priori quantitate styli AB) vel DB, trianguli gnomonici, singuli radij in latere BY, regulæ expansæ terminantes, videlicet secantes AB. A 10. A 20. A 30. A 40. A 50. &c. ex A, versus B, in quadrante horographico, quemadmodum dictum est. Vel si nimis sibi puncta appropientur, transferantur primò singuli quini & quini gradus, vel deni aut deni, vt nos hic fecimus; vel etiam quindenari & quindenari gradus in lineam AK, quadrantis horographici transferantur: ducanturque per translata puncta ad lineam AB, lateris quadrantis parallelæ, quarum ope in verticalibus, seu Azymuthis Retis venaberis puncta conicarum sectionum, per quæ hyperbolæ Almucantararum ducendæ erunt, vt sequitur (nos hic ob spacij angustiam tantum duximus lineas 80. 70. 60. 50. literis N, D, B, Y, signatas.) Primò, applica in quadrante Azymuthum 80. grad. signatum litera N, supra lineam parallelam verticali lineæ retis numero eodem, videlicet 80. notatæ, ea industria, vt sibi perfectè congruant. Hoc peracto, singulos ordine quindenos & quindenos gradus acicula perforatos notabis: vel iidem etiam circino ex quadrante in retis azymuthum transferri possunt, adscriptis singulis punctis 15. 30. 45. 60. 75. Hoc peracto, applica lineam D 70. in quadrante designatam azymutho 70. in plano retis, & vt ante in hoc 70. Azymutho singula quindenorum & quindenorum graduum puncta diligenter

genter nota, adscriptis, vt paulò ante numeris. Deinde lineam quadrantis B 60. verticali, seu azymutho retis 60. graduum applicando, dictos gradus in ea notabis,



vti dictum est, & sic ordine reliquas parallelas 50. 40. 30. 20. 10. verticalibus Retis 50. 40. 30. 20. 10. graduum applicando, singulos quindenos & quindenos gradus notabis, vt factum est, habebisque omnia puncta, per quæ hyperbolæ, siue conicæ sectiones altitudinum Solis, hoc est, singulos denos & denos, vicenos & vicenos, &c. per 15. gradus ducendæ sunt. Si igitur omnia puncta, quæ primo numero Y 80. erunt notata, curua conuexeris; dabunt tibi illa hyperbolam, quam Sol in dato plano 80. graduum eleuatus totius anni decursu describit: vbi enim umbra gnomonis hanc lineam tetigerit, certò scias 80. graduum Almucantaram Solem obtinere; ad quam tamen altitudinem Sol hic Romæ nunquam ascendit. Si iterum omnia puncta 70. signata curua conuexeris; habebis Almucantaram 70. graduum quæ sitam, & sic de cæteris. Hac arte tibi præcedens Rete conteximus, cuius vsus tam admirandus est, vt nullum prorsus planum irregulare dari possit, in quo eius ope omnis generis lineæ inscribi non possint; nouumque hic, Lectori, secretum pandimus, quo nihil non in tota gnomonica, summaque cum facilitate peragas; ita vt de eo, id (quod de natura Democrates *πάντα ἐν πάντι*, omnia in omnibus) non immerito dici possit. Sed hæc omnia fufius in sequentibus patebunt. His igitur ita præmissis, nunc ad ipsam circulorum cælestium inscriptionem nos conferamus.

Secretum gno-  
monicum.

### Problema I.

*Arcus signorum Zodiaci in dato plano inscribere.*


### Pragmatia I.

*Parallelos signorum Zodiaci in plano æquinoctiali inscribere.*

**C**vm in plano æquinoctiali arcus signorum nihil aliud sint, quam circuli; ita eos in eodem plano nullo ferè labore inscribes, Ductis duabus lineis in cen-  
tro

tro E ad rectos sese interfecantibus, erit AB meridiana, siue linea horæ 12. CD vero linea horæ sextæ. Si igitur in Zodiaco radiofo in linea VZ, axem representante ab O, versus alterutram partem LO, vel NO, styli quantitatem determines, & per L, vel N, rectam ad AB radium æquatoris parallelam duxeris; secabit ea radios signorum in punctis, per quæ ex L circuli ducti dabunt quæsitum.

Sit igitur, vt dixi, styli quantitas in VZ determinata OL, vt in radiofo Zodiaco sequenti patet, & LM, ad AB parallela fecerit in punctis P, Q, R, radios signorū. Si itaq; interuallis LP, LQ, LR, ex E cetro plani æquinoctialis, circuli ducantur, dabunt ij arcus



signorū quæsitos. Æquinoctialis in hoc horologio nō habetur, sed prorsus euanescit, sicuti in horisotali horizon, vt supra ostēsū est, eo quod æquator plano æquidistat. Efficit igitur tēpore æquinoctij in plano æquinoctiali gnomon vmbra in finitam, & tantō semper maiorem, quantō ei vicinior fuerit Sol; vnde consequenter nascitur duplex planum æquinoctiale, superius, & inferius; in superiori per sex signa borealia, in inferiori per totidem sex australia commoratur. Linea verō horizontalis dirimit partem supernam ab inferna, quam ita inuenies. Ex E versus I determinata quantitatem styli EI, & ex I ducatur linea, quæ angulum SIE eleuationis poli contineat: vbi enim linea dicta meridianam AB secuerit, per illud punctum parallela ad lineam CD horæ sextæ ducta dabit lineam horizontalem, quæ dirimit infernum à superno plano. Sed hæc faciliora sunt, quàm vt explicari mereantur. Hos arcus quoque inscribes ope instrumenti Almucantaro-azymuthici. Si enim illud plano æquinoctiali ita applicaueris, vt centrum eius D, centro E plani æquinoctialis, & linea meridianam exactè congruant, referent omnes circuli ab 1. 2. 3. vsque ad 23½. circulos declinationis signorum, vmbra gnomonis monstrante omni die gradum delineationis ab æquatore, & consequenter declinationes signorum, dum in principijs eorum Sol existit. Alium modum vide in probl. IX. §. III. prag. L.

Duplex æquinoctiale, inferius, & superius.

Inuentio lineæ horizontalis.

Alius modus.

*Confectarium.*


**H**inc sequitur, arcus signorum in hoc plano eiusdem proiectionis esse cum ea, quam Sol facit sub sphaera obliquissima in horizonte, & sub sphaera recta in plano verticalis primarij.

Pro-

**Problema II.**

*Arcuum signorum Zodiaci in plano polari conotomica proiectio vniuersalis.*


**P**rimus modus fit horarum in radiofo Zodiacum translatarum subsidio, Cum itaque horologium polare prorsus idē fit cum meridiano, & sola horarum po-



Primus modus.

sitione ab eo discrepet; hinc quod de hyperbolicis in polari describendis hoc loco dicemus, de meridianis quoque Orientali, & Occidentali dictum sit. Vnde simul ea hic coniunximus. Ad rem igitur procedamus à polari initium facturi.

Ductis duabus lineis ad rectos se interfecantibus in centro N, quarum AB meridianā, EB æquinoctialem, NA vel NB styli quantitatem referat (qui semper equalis esse debet spacio inter horā 12. & 9. intercepto vti supra; quodq; in polaris horologij descriptione ostēsum est) transferatur in radiofo Zodiaci hic appositi æquatoris lineam OB, lineæ horariæ ex O, hoc ordine: BN, vel AN, in horologio quantitati styli æqualis circino intercepta transferatur ex O, centro radiofo Zodiaci in lineam æquinoctialem OB; deinde interceptas ordine sequentes lineas horarias horologij inter B, & puncta communia intersectionis æquatoris, & horarum, v.g. B 1. B 2. B 3. B 4. B 5, ex eodem radiofo Zodiaci puncto O, in radium æquatoris transferes, adscribendo singulis punctis suos numeros, vt hic videtur; per hæc enim puncta parallela ad axem YZ, ductæ dabunt lineas horarias Zodiaci radiofo inscriptas. Has igitur lineas parallelas vna cum Zodiaco, ita applicabis horologio, vt Zodiaci æquinoctialis OB,



Quæ Zodiaci radiofo hora prima inscribantur.

Ggg horo-

horologii polaris æquinoctiali EB, & linea horæ 12. Zodiaci, horæ 12. horologii perfectè congruat. Quo factò, in eadem meridiana puncta intersectionis radiorum, & horæ 12. vtrinque diligenter nota; per ea enim transibunt paralleli Solis tam Boreales, quàm Austrini. Deinde promotà parallela horæ 1. in Zodiaco supra lineam horæ 1. in horologio, puncta radiorum, vt priùs in lineà horæ 1. imprime. Deinde eadem imprime in lineà horæ 2. applicando parallelam horæ 2. Zodiaci radios, supra 2. in horologio. & sic procedendo cum cæteris, donec hestimoriam inscriptionem absolueris; per puncta enim ad eundem parallelum signi spectantia curuæ ductæ dabunt arcus signorum in horologio polari; quorum arcuum medietatem, si in alteram partem horologii transferas, habebis integros arcus signorum, quos inuenire oportebat. Stylus erit normaliter erectus in N, quantitate spacij NB vel N3. aut 9. horæ.

Tabula Secantium.

| Horæ polar. | Secantes |       | Orien. Occ. |   |
|-------------|----------|-------|-------------|---|
|             | G        | M     |             |   |
| 12          | 10       | 0     | 6           |   |
| 1           | 11       | 10 35 | 7           | 5 |
| 2           | 10       | 11 54 | 8           | 4 |
| 3           | 9        | 14 11 | 9           | 3 |
| 4           | 8        | 20 30 | 10          | 2 |
| 5           | 7        | 38 63 | 11          | 1 |
| 6           | 0        | 0     | 12          |   |

Secundus modus.

Idem quoque subsidio tabulæ hinc appositæ Secantium perficies, si secantes horarum a 12. polari, vel 6. meridiani horologii incipiendo, in medium æquatoris OB transtuleris; per puncta enim ad axem parallelæ ductæ secabunt radios signorum in punctis, quæ ex æquatore translata in lineas horarias similes, vt ante factum est, puncta indicabunt, per quæ conotomica proiectio parallelorum incurret.

Secundus modus inscribendi arcus facillimus simul & iucundissimus est. Ita autem operare. Sint in horologio polari aut meridiano descryptæ integræ cum medijs horis: quo factò applica radiosum Zodiaci vertice O supra punctum 9. in æquinoctiali horologii, ita vt æquinoctialis æquinoctiali perfectè respondeat (sitque radiosus Zodiacus in charta pellucida tincta oleo descriptus). Quo factò imprime in lineà horæ 12. puncta radiorum, vt priùs. Deinde promotò vertice O supra mediam horam post 9. & secabitur lineà horæ 1. in punctis, per quæ arcus signorum transibunt. Deinde promotò denuo vertice O supra 10. secabitur hora 2. in punctis, per quæ arcus signorum transibunt, & sic de reliquis procedes, semper vertice O supra medias horas applicando; & in integris communia intersectionis radiorum, & horarum puncta signando; per hæc curuæ lineæ ductæ dabunt arcus signorum.

Tertius modus.

Tertius modus fit ope latitudinis vmbrearum ex tabella vniuersali omnibus polaribus, & meridianis per totum mundum inserviente, quam ex tabula VI. fol. 292. eruimus. Sint igitur horæ plano polari inscriptæ, vt apparet. Pone vmbrearum tabulam ante te, & pro punctis arcuum signorum in hora 12. accipe vmbrearum partes ex tabula 12. horæ correspondentes, easque ex partibus in quales 12. stylus diuiditur, ex N, loco inquam styli transferas vtrinque in lineam meridianam, habebisque puncta signorum in hora 12. Secundò, pro punctis signorum in lineà 1. & 11. accipiantur par-

Tabella latitudinis vmbrearum.


| P M | ♊              |    | ♋  |    | ♌  |    | A M |
|-----|----------------|----|----|----|----|----|-----|
|     | P              | M  | P  | M  | P  | M  |     |
| 12  | 5              | 13 | 4  | 25 | 2  | 26 | 0   |
| 1   | 6              | 17 | 5  | 35 | 4  | 5  | 3   |
| 2   | 9              | 11 | 8  | 35 | 7  | 27 | 6   |
| 3   | 14             | 5  | 13 | 31 | 12 | 39 | 12  |
| 4   | 23             | 15 | 22 | 45 | 21 | 21 | 20  |
| 5   | 49             | 6  | 47 | 57 | 45 | 45 | 44  |
| 6   | Vmbra infinita |    |    |    |    |    | 6   |

par-

partes ex tabula horis 1. & 11. correspondentes; hæ enim ex loco styli in lineam horæ 1. & 11. vtrinque translata ibi assignabunt puncta, per quæ arcus transibunt: non secus puncta arcuum signorum in reliquis horarijs lineis ope tabulæ reperies. Modus omnino facilis, & vniuersalis.

Quartus modus est per conicas sectiones, quæ solius fili ductu describuntur, estque mirè ingeniosus & iucundus, & sine præuijs horis perficitur.

Primò, ita procedito. Sint duæ lineæ CD, AB, vt priùs in A, ad rectos sese interfecantes.



Secundò, puncta signorum per radiosum Zodiacum, vel tabulas paulò ante positas in lineà 12. ab A, vtrinque secundum rationes in præcedentibus traditas priùs determinatas; erunt enim hæc puncta vertices hyperbolarum contra positarum, siue puncta ex comparatione facta in plano describendarum.

Tertio, ducta normali GR, vel HS, stylo equalis ex punctis G, & H, & S, interuallum AR, vel AS traducatur in lineam meridianam vtrinque in I, & K, quæ erunt puncta ex comparatione facta, siue centra reflexionis, seu foci hyperbolarum sibi oppositarum.

Quarto, in duobus focis I, & K figantur duo acus, quibus duo fila adnectes, quæ in H primum coniunges contorta, deinde ea laxando sensim resolues, donec communis earum iunctura attingat singulas horarias lineas. Vel si horæ descriptæ non fuerint, fila sensim per foramen acus resoluta nodo illo, siue iunctura filorum, & acus, describent hyperbolam desideratam. Si verò fila vna cum acu in puncto G opposito contorseris; motus iuncturæ filorum sensim laxatorum describet hyperbolam oppositam.

Si verò reliquorum parallelorum conotomicas proiectiones desideres: primò ad vertices proijciendarum hyperbolarum normales æquales stylo ducantur, vt hic n o, m p; deinde interuallum A o, vel A p interceptum transferendum in lineam meridianam: habebisque focos quæ sitos, quibus acus affiges, & fila, operaberisque cum ijs, vt in præcedenti operatione factum est, habebisque alias duas hyperbolas. Non secus in alijs procedes. Demonstrationem huius rei fusam, dedimus in Protheoria II. Poteram hoc loco etiam adhibere quamcumque aliam hyperbolarum delineandarum praxim. Verum sagax Lector facile eam, ex tractatu de conicis sectionibus deducet; in eo enim varios modos docuimus, quos Lectorem sibi familiares reddere, ante quàm secreta gnomonica adeat, suadeo.

Qua ratione quoque solo circino hæ hyperbolæ duci possint, vide in citato Prognomasmatis loco. Lineam horizontalem ita designabis. Fiat angulus ad punctum horæ 9. vel 3. qui cum A 9 cõtineat cõplementum eleuationis poli, vbi enim lineæ quæ angulum terminat, lineam meridianam secuerit, per illud punctum ad æquinoctiale parallela ducta dabit horizontalè. Eandem inuenies per applicationem trianguli gnomonici. Cum verò duplex polare sit, inferius, & superius; fiet superius, inferius, si dextra illius fuerit sinistra huius, & contra: situsque fiat in omnibus cõtrarius. Vbi nota quoque, quò maior fuerit loci latitudo, tantò plures horas in inferiori monstra-

tum tri, tãto pauciores, quantò latitudo minor fuerit. Eodem modo se habet polare inferius ad superius, sicuti verticale australe ad verticale boreale, cum in vtroque boreali reliquum horarum ab hora sexta ad ortum, vel occasum vsque Solis demonstrat. Arcus igitur signorum in horologio polari varijs modis delineauimus, quod erat faciendum.

**Problema III.**

*Arcus signorum in horologio meridiano describere.*

**C**um meridianum horologium à polari, situ solum, & horarum ordine differat, erit descriptio arcuum signorum in eo prorsus eadem. Hoc tantum notandum est, vt pro linea horæ 12. in polari, hic lineam horæ 6. punctum E verò pro styli loco, & initio conotomicæ projectionis statuas; verbo, si transferas Zodiacum ex polari in meridiani horologij lineas horarias; habebis quæsitum. Cætera in nullo à polari differunt. Sed cum de hoc fusè in præcedentibus dictum sit, eò Lectorem remittimus.

**Problema IV.**


*Arcus signorum horizontali plano inscribere.*

**V**arios modos inscribendi arcus signorum, vide apud diuersos Authores; nos nostras tantummodo inuentiones vnà cum facillima, & vniuersali methodo communicamus curioso Lectori.

**§. I.**

*Primus modus, nouus, atque facillimus per sinus secantes.*

**P**rimò igitur applica triangulum gnomonicum horizontale ea ratione, vt AC lineam meridianam, A centrum horologij, AB verò axem, BC radium æquatoris, DB stylum referat, sitque A angulus elevationis poli, C angulus complementi eius. Hoc peracto, diuide CB in 10. æquales partes, quæ erunt loco sinus totius. Deindè applica radius Zodiacum centro suo O, in puncto B, trianguli, siue apicis styli, ita vt radius æquatoris radio æquatoris BCZ exactè respondeat. Quo facto transfer secantes distantie singularum horarum à meridie ex B, in lineam BCZ, in partibus lineæ BC, semidiametri æquinoctialis; per hæc enim puncta ex A, lineæ rectæ ductæ dabunt puncta conotomicæ projectionis quæsitæ. Idem de alijs parallelorum Solis conicis sectionibus describendis statues. Est autem hæc tabula vniuersalis, & seruit singulis elevationibus poli, dato




prius

*Tabella vniuersalis Tangentium, & Secantium distantiarum horariorum à meridie.*

| Secantes | Tangentes |    | Hora merid. |   | Distan. horarum à mer. |
|----------|-----------|----|-------------|---|------------------------|
|          | P         | M  | P           | M |                        |
| 10       | 0         | 0  | 0           | 0 | 12                     |
| 10       | 35        | 2  | 68          | 1 | 11                     |
| 11       | 54        | 5  | 77          | 2 | 10                     |
| 14       | 14        | 19 | 0           | 3 | 9                      |
| 20       | 0         | 17 | 32          | 4 | 8                      |
| 38       | 64        | 37 | 32          | 5 | 7                      |
| infinita | infinita  | 6  | 6           | 6 | 90                     |

prius triangulo gnomonico ad datam latitudinem constructo, & assumpto radio æquatoris in dicto triangulo pro sinu toto. Qui hanc praxim bene perceperit, difficillè illa, & morosa operatione in delineationibus arcuum signorum ab Authoribus possum adductis adhibenda non indiget; sed vnus trianguli radiosi ope vnà cum tabula hic apposta signa facillimè inscribet. Vt autem operatio facillimè euadat, poterunt secantes, vel tangentes in regula horographica ita describi, vt regula horologij centro applicata dicto citius in homogeneis lineis horarijs arcus signorum describat. Quæ omnia tuæ industriæ relinquimus. Sufficit nobis hoc loco occasionem rem semper ad maiorem facilitatem deducendi, dedisse, sed prax in exemplo declaremus.

Sit igitur horologium horizontale suo triangulo gnomonico, horisque astronomicis, vt in præfenti figura, apparet instructum; si eidem signorum hyperbolas inscribere velis, ita operare. Transfer in Zodiaco radiofo ex A omnia spacia lineæ



horæ 12. vbi à signorum radijs interfecantur hic ex A, centro horologij horizontalis in meridianam, A D u habebisque puncta signorum, pro hora 12. Iterum, vt habeas omnia signorum puncta in hora 1. & 11. ita procede: puncta communia intersectionis lineæ horæ 1. vel 11. & radiosi Zodiaci ex A, centro horologij; vtriusque in horam 1. & 11. transferes, & hæc dabunt puncta signorum pro dictis horis quæsitæ. Ita puncta in reliquis consequenter horarum lineis ope Zodiaci radiosi reperies.




§. II.

Secundus modus per conicas sectiones.

Pragmatia I.

Datis verticibus hyperbolarum in analemmate catholico una cum diametris sectionis conicæ, omnium signorum hyperbolas describere in plano horizontali.

It in analemmate hic proposito, quantitas styli PX, triangulum gnomonicum TPY. illud in horizontis planum in lineam meridianam transferto, ita ut T sit centrum horologij, X locus gnomonis, Y punctum meridianum.




æquinoctialis. Si igitur ex T, puncta  $\epsilon$  on ylik, in lineam meridianam transferas, dabunt illa puncta signorum in linea meridiana, seu vertices, per quos hyperbolæ luc-umbres ducendæ sunt.

Hyperbolæ verò hac industria ex ijs, quæ pragmat. IX. §. III. demonstrauimus, describes. Transferatur conus RPQ analemmatis, quem Sol in  $\sigma$  constitutus circa apicem gnomonis describit in planum seorsim, vt hic factum esse vides in figura signata  $\sigma$ . in hoc cono primo exactè lineam conotomam, siue diametrû sectionis coni, quam in analemmate linea horizontalis GH efficit, ordinabis; hanc autem lineam in analemmate refert y  $\epsilon$ , hanc eandem eodem situ ordinabis in separato cono  $\sigma$ , sitque linea n z. Hoc diligenter peracto secerur latus RP, separati coni  $\sigma$  in quotlibet partes æquales C, D, E, S, O, fiantque lineæ parallelæ on, sm, E  $\epsilon$ , DS, CT, RQ, secantes axem PY, ad angulos rectos; lineam verò n z, in punctis u, x,


u, x, y, Y, Z. Hoc etiam peracto describantur ex communibus interfectionis axis PZ, & dictarum parallelorum punctis semicirculi, diligenterque notentur

Prima figura




Pro hyperbola  $\sigma$

Secunda figura



Pro hyperbola II &  $\Omega$

Tertia figura





Pro hyperbola  $\delta$  &  $\eta$

tur puncta u n y Yz, sectionis conicæ, per hæc enim in circumferentiam semicirculorum rectæ ductæ dabunt semiordinatas, iuxta ea, quæ citato loco demonstrauimus, hyperbolarum demonstrandarum.

Rursus, transferantur seorsim in aliam chartam in lineam quampiam rectam vt-cunque descriptam, quæ sit, verbi gratia, in figura sequenti, cuius titulus (hyperbola Cæcri) puncta sectionis conicæ ex cono  $\sigma$  præcedentis figuræ desumpta, sintque literis in hac figura separata insignita, videlicet n u x y, y z. Si enim in parallelas per hæc puncta ad lineam n z, normaliter ductas præcedentis figuræ semiordinatas up, x q, y r, Y s, z t, in hac figura ex correspondentibus punctis u x y z, vtrinque in

in occultas parallelas transfuleris; secabuntur parallelæ in punctis p q r s t; per quæ linea curva ducta dabit hyperbolam  $\infty$  quaeritam; quam abscissam si in horologio iuxta analemma constructo supra verticem  $\infty$  ita applices, vt vertex n, puncto  $\infty$



Praxis conica scientia in Gnomonica.

In meridiana linea per prædicta iam inuento, & axis parabola n z meridianæ congruat, describerur desiderata  $\infty$  hyperbola, nullo pane negotio in dicto horologio. Quod erat faciendum.

Simili prorsus industria procedes in hyperbolis II & Q, V & M, aliisque consequentium signorum describendis. Verum, ne in re satis clara tempus teramus, hic figuras dictarum hyperbolarum ponendas duximus, iisdem literis insignitas, vt ex primo exemplo appareat, qua ratione in cæteris procedendum sit. Nam si hyperbolam II & Q desideres, conus, quem Sol in iisdem signis constitutus circa apicem P describit in analemate, seorsim transferendus est; vti in figura 2. II, & Q factum vides; & deinde eadem prorsus ratione procedendū, qua in cono  $\infty$  potissimus. Pro hyperbola verò V & M seorsim extrahendus est conus m o p  $\infty$  in analemmate, & procedendum iuxta prædicta, vt habeas hyperbolam t n r V & M.

Si verò oppositorum signorum conos ex analemmate extraxeris, vnâ cum diametris sectionum conicarum, & iuxta methodum hic traditam processeris; describes eadem prorsus ratione signorum oppositorum hyperbolas. Cum verò hæc describendarum hyperbolarum ratio omnium sit pulcherrima, & ingeniosissima, vt potè ex subtilissima conicorum doctrinâ immediatè educta; in ea vt maximè sese exerceat Lector consulo. Ex hac enim methodo, omnium stellarum, si vmbra projicerent, hyperbolas facillimo negotio descriperis; parabolas quoque & ellipses,

pses, quas citra apicem styli describerent, facile assignabis. Ex quo etiam hoc coniectarium catholicum formo.


Dato parallelo cuiusvis stellæ ex cono, quem circa cætrum gnomonis motu suo, si vmbra projiceret in plano parallelo æquidistante, describeret, parabolam, hyperbolam, ellipsim, quam in quocunque alio plano dato conotomo delinearet, inuenire. Vide, quæ de hisce in Geographia nostra gnomonica fusiùs tractamus.

Imò sufficit tantum semihyperbolas borealium signorum describere: qua ratione enim totas vnâ cum australibus circino explorare possis, iam aperiendum est.

Pragmatia II.

Data semihyperbola alicuius signi, hyperbolam totam vnâ cum opposita hyperbola circino describere.

Sit, verbi gratia semiarctus, siue semihyperbola  $\infty$  in horologio quopiam delineata, & alteram hyperbolæ partem, vnâ cum opposita  $\infty$  hyperbola, habere desideres; ita procedito.




Accipe diametrū trāsuersā hyperbolarū oppositarū  $\infty$  &  $\infty$ , siue quod idem est, distantia duorū tropicorū in meridiano, quæ sit verbi gratia in præsentī figura NO; semihyperbola verò sit NV: puncta GH vtcūque assumpta, vel ex comparatione facta, siue focus hyperbolarū habebis, si in triângulo gnomonico semidiametrum æquinoctialis ex puncto cõmuni meridianæ, & æquatoris sc. ex puncto 12. in meridianâ transferas. Nam habebis G focū hyperbolæ  $\infty$ . Oppositâ H habebis, si ex OB, refeceris OH, æqualem NG. Deinde dimidiata NO, in K, assumantur in VN, quotlibet puncta Q, R, S, T, X, per quæ ex K, circuli occulti ducantur: deinde posito circino in puncto G, & per VQRSTXN, alij circuli occulti, vel tantum arcus circulorū ducatur: vbi enim hi ex altera parte horologij circulos priores secuernit, per illa pũcta, altera pars hyperbolæ  $\infty$  ducenda est. Si iterum interuallis HM, HN, HO, HP, HQ, vtrinque ex H, cætro seu foco circulos duxeris, secabūt ij priores circulos in punctis, per quæ opposita hyperbola ducenda est. Si verò hyperbolas reliquorū parallelorum describere desideres, eadem prorsus ratione procedes, qua in tropicorum descriptione, retentis punctis GH, vtcunque assumptis, vel punctis etiam ex comparatione factis, siue centris focusque reflexionum. Hic modus ingeniosus est, & miramcum facilitate iucundita tem annexam habet; quare vt eum Tyrones sibi familiarem reddant, suadeo.

Pragmatia III.

Hyperbolas arcuum ſignorum ſolo fili ductu in plano horizontali deſcribere.

Tertius modus ope fili.

**A**ccipe primò ex analemmate baſis conì, cuius ſectionem, ſeu hyperbolam deſideras, diametrum GK, cum diametro euſdem ſectionis IA, quæ baſis




KG, dimidiabitur in I, atque ex hoc axe perpendiculari ID, ſume IB, duplam ipſius IG, & IC, trium partium, qualium recta GI, eſt 4. & ſic recta GC, eſt neceſſario partium 5. eademque æqualis rectæ CD. 3. enim ex 8. relinquunt 5. atque hoc modo determinabis in axe IB, puncta ex comparatione facta C. & D. verticèſ verò A & B, ſic reperièſ. Ipſi DG facièſ æqualem DE, & EF æqualem ipſi GC, vel DC. & CF diuidèſ bifariam in A, ubi eſt vertex hyperbolæ deſcribendæ; vertex autèm B, ſectionis oppoſitæ habetur; ſi ipſi AC, fiat æqualis BD, vel AB, æqualis ipſi FD. Porro affigatur regula circa centrum D, mobilis longitudinis DG, longitudo fili CG, vel EF, cuius vnus terminus figitur in C, alter in

extremitate regulæ, atque ita graphium, contorta fila iuxta lineam fiduciæ regulæ laxâdo ſtringens, deſcribet hyperbolam GEK. Vel aliter alligentur D, & C, focus acus, iſſque duo fila circumligentur, quæ contorta per foramen acus ducatur in A, verticem. Deinde laxatis filiſ pedetentim promoue acum ex A, in alteram partem, euſque motu hyperbola eadem prouſ ratione, quam in problemate præcedente oſtendimus, deſcribetur. Atque hic eſt modus Patris Grinbergerij bonæ memoriæ; præclaruſ ſanè, & ingenioſuſ.

Pragmatia IV.

Conicæ ſectionèſ arcuum ſignorum in plano horizontali per tangentèſ deſcribere.

Quartus modus ope tangentium.



**A**ccipe tabulam ſequentem, applicato priuſ triangulo gnomonico meridianæ AB, in plano horizontali, eritque linea ad A centrum horologii, normaliter ducta linea ſexta; ad B, normalis ducta æquinoctialis; ad Q, normalis denique ducta gnomon QC. Deſcribatur horologium horizontale aſtronomicum iuxta rationeſ, & regulaſ in præcedentibuſ præſcriptaſ. Deinde ſtylo CQ, diuiſo priuſ in 10. parteſ æqualeſ reſpondenteſ 1000. partibuſ ſinuſ totiuſ, tranſfer in partibuſ ſtyli ex A, centro horologii j in lineaſ horariaſ correſpondenteſ

tan-

tangentèſ ſignorum incipièdo à 12. iuxta ordinem in tabula notatorum; punctum 12. reperturuſ, accipe tangentem 14.45. in partibuſ ſtyli, eamque in Q oñ tuum meridianum ex A centro horologii tranſfer, id enim erit punctum 12. in quæſitũ. Si verò 12. punctum in ſ deſideraſ, accipe tangentem 33. 05. eamque in partibuſ ſtyli ex centro A, in punctum R, lineæ meridianæ tranſferèſ: id enim erit punctum quæſitum. Non ſecus aliorum parallelorum puncta inuenieſ, in quacunquè hora data. Sed hæc cum facillima ſint, ea vno atque altero exemplo declaraffe, ſufficiat.

Conficitur autem hæc tabula artificio propoſito oſteſoque in Probl. X. fol. 295. Porro tabulam ibidem ad omneſ Europæ eleuationeſ poli ſupputatam reperieſ, ex qua quique hyperbolis horizonti ſuo inſcribendiſ congruaſ tabulaſ excerpte poterit.

Tabula Sinuum tangentium rectarum pro arcubus in horologio horizontali.

| Hore A.M. | ☉         |    | ♋         |    | ♌         |    | ♍         |    | ♎         |    | Hore P.M. |    |     |    |    |
|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----|----|----|
|           | Tägètes P | M  | Tägètes P | M  | Tägètes P | M  | Tägètes P | M  | Tägètes P | M  |           |    |     |    |    |
| 12        | 14        | 45 | 15        | 11 | 17        | 0  | 20        | 11 | 24        | 62 | 30        | 07 | 33  | 05 | 12 |
| 11        | 14        | 54 | 15        | 21 | 17        | 17 | 20        | 43 | 25        | 21 | 31        | 09 | 39  | 35 | 1  |
| 10        | 14        | 85 | 15        | 59 | 17        | 79 | 21        | 56 | 27        | 34 | 34        | 91 | 34  | 34 | 2  |
| 9         | 15        | 57 | 16        | 48 | 19        | 22 | 24        | 20 | 32        | 65 | 45        | 51 | 54  | 19 | 3  |
| 8         | 17        | 27 | 18        | 52 | 22        | 53 | 30        | 78 | 48        | 57 | 91        | 18 | 141 | 73 | 4  |
| 7         | 21        | 53 | 23        | 73 | 31        | 68 | 54        | 12 | 185       | 31 |           |    |     |    | 5  |
| 6         | 34        | 37 | 40        | 62 | 73        | 46 |           |    |           |    |           |    |     |    | 6  |
| 5         | 105       | 48 |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |     |    | 7  |

Idem artificioſuſ confici poterit ex tabula longitudiniſ vbrarum, ſi per altitudineſ quatuor horæ competenteſ vbræ quantitatem eliciaſ, atque eam ex loco ſtyli intra lineas horariaſ determineſ. Innumereſ hoc loco alioſ modeſ adducere poſſem. Verum quandoquidem iſ apud alioſ quoque Authoreſ, Clauium, Schoenerum, Maurolycum, continentur; eoſ conſultò omitto.


Arcuſ quoque ſignorum inſcribeſ ope inſtrumentuſ Almuzantari-azymuthici, & ſubſidio tabulæ Almuzantari-azymuthicæ, ſic Vide ubi Azymuthum, & Almuzantari ſeſe interſecent Sole in principio 12. conſtituto, quod tabula Almuzantari azymuthica tibi ſuggeret; ſi enim numeroſ Azymuthicoſ, & Almuzantariicoſ in arca comuni 12. & horæ 12. illoſ à meridia vtrinq; hoſe in inuèto Azymutho, computeſ: ubi illæ ſeſe interſecuerint, ibi erit punctum 12. 12. & ſic de reliquiſ punctiſ in horaruſ lineiſ inueſtigandiſ procedeſ. Verum cum hæc omnia in ſequentibuſ fuſiùſ tractentur, hæc illiſ explicandiſ parcioreſ eſſe voluimùſ.



**Problema V.**

*Arcus signorum in plano verticali describere.*

**D**escribantur arcus signorum in verticali eadem profus ratione, qua in horizontali: sola differentia in trianguli gnomonici applicatione est: ita ut angulus




complementi elevationis poli, qui in plano horizontali ad æquatorum fundabatur, in verticali fundetur ad commune axis, & meridiani intersectionis punctum. Verum singula breuiter percurramus.

**Pragmatia I.**

*Primus modus pro Verticali.*

*Verticalis.*


**A**pplicetur triangulum gnomonicum ABCD, ita meridianæ in plano verticali, ut A, sit angulus complementi elevationis poli, eritque AB axis, BC radius æquatoris, DB gnomon, AC linea meridianæ; in horologio verò VR, horizontalis, IT linea horæ sextæ, CS æquinoctialis. Deinde signentur in plano proposito horæ astronomicæ, quibus per secantes hac industria arcus inscribes. Diuidatur primò CB radius æquatoris in Zodiaco radiofo in decem, vel centum, aut mille partes æquales loco finis totius, secantesque distantia horarum à meridie in partibus lineæ CB, iuxta tabulam S. 1. problem. præced. transferes ex B, in CZ, radium æquatoris; per huiusmodi enim puncta ex A, radij horarij obliquè ducti secabunt radios signorum in punctis, quæ deinde singula ex A intercepta rursus ex centro A horologii in lineas horarias respòdètes translata, dabunt puncta arcu signorù quæsitâ. Ita spacia inter A, & puncta radiorum 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. à radio  $\sigma\sigma$  abscissorum ex cetro horologii verticalis in 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. horas translata dabunt puncta, per quæ transibit hyperbola  $\sigma\sigma$ . Idem de alijs statuendum.



*Secundus*

*Secundus modus per duo fila facillimus.*

**P**rimò fiant duæ lineæ ad angulos rectos in E, se intersecantes, ad lineam verò AB, in A, normalis ducatur TAS.



Secundò, huic lineæ AS applica triangulum gnomonicum pro verticali, ita ut AB lineæ axis mundi, AS congruat, eritque CB stylus, BD radius æquatoris, AD linea meridianæ, siue hora 12. ut hic figura prima ostendit. Si verò horas signorum pro plano horizontali desideres; triangulum gnomonicum horizontale, id est inuersum triangulum pro verticali applicabis lineæ AT.

Tertio, interuallo ED describatur semicirculus ADB, in 12. partes exactè diuisus, in quo singula puncta diuisionum æquè à D remota rectis lineis occultis coniunges, diligenter notando, vbi illa lineam ED secent; sint autem puncta intersectionis EFGHIK.

Quarto, iterum applicetur Zodiacus radiosus centro suo, puncto B, trianguli gnomonici in secunda figura, ita ut BD, radio æquatoris respondeat, resecenturque omnia in semicirculo prioris figuræ, præter limbos AE, AB, & ED; in radiofo quoque Zodiaco resecentur omnia, præter limbum declinationis signorum, & limbum æquatoris BY; habebisque instrumentum arcubus signorum facillimè inscribendis præparatum.

*Praxis præcedentis Organi.*

**H**uius instrumenti ope, data qualibet hora, punctum in ea, per quod datus parallelus Solis transeat, dicto citius, & consequenter arcus omnium parallelorum nullo penè negotio inueniemus. Sit inueniendū punctum  $\sigma\sigma$  in hora 3. vel 9. astronomica; extende filum B, veluti centro affixum supra punctum paralleli  $\sigma\sigma$ , & alterum filum ex A, veluti centro supra datam horam 3. in linea ED. Si enim spacium inter A, & punctum sectionis filorum interceptum transtuleris ex centro horologii in lineam horæ tertiæ; erit id punctum  $\sigma\sigma$  data hora quæsitum. Sit iterum assignandum punctum  $\rho$  in lineæ horæ 12. extendantur duo fila ex A, & B; illud per horæ 12. punctum in linea ED; hoc ex B per M punctum paralleli  $\rho$  in limbo signorum. Si igitur spacium inter A, & punctum intersectionis filorum transtuleris,

ris,


ris ex centro horologii in lineam horę 12. habebis queſitum. Non ſecus de alijs aſtorum parallelorum punctis inueniendis ſtatues.

*Tertius modus per conicas ſectiones.*

**Q**ui nouerit arcus ſignorum per conicas ſectiones ex analemmate deſcribere in plano horizontali, prout in Pragmatia I. S. II. præcedentis problematis dictum eſt, iſ poterit eadem ratione eos in plano verticali deſcribere, ſi in analemmate communia interfectionis pūcta plani verticalis, & baſium parallelorum Solis in lineam meridianam, ex loco ſtyli tranſferat; per ea enim puncta iuxta Pragmatiam ibidem traditam, hyperbolę ductę dabunt arcus ſignorum queſitos: quinimō quecunque in Problemate II. dicta ſunt de conotomicis projectionibus, huic verticali quoque accommodari poſſunt.

*Quartus modus per conotomicas projectiones.*

**S**it triângulum gnomonicum pro plano verticali *Abcd*, producanturq. radij *AC*, in *E*, & *BC*, in *E*, & *AB*, in *V*. huic triângulo applicetur radioſus Zodiacus in *b*,



ita vt radius æquatoris radio *bcE* congruat, & communia interfectionis puncta parallelorum cum linea meridiana dabunt puncta ſignorum in hora 12. eruntque vertices hyperbolarum deſcribendarum. Hoc peracto, à puncto *T*, vbi radius *TF* ſecat *AF*, meridianã *T*  $\phi$  in quatuor, vel quotlibet alias partes *KIHG*, æquales diuides; ductaque ex *K*, ad axem normali *KS*, notabis vbi illa lineã *AF* ſecet, ſimiliter in lineã *TA*, quatuor partes æquales determina, ſintque *WXYZ*. ad hæc enim normales parallele, & occultę ductę ſine termino dabunt ordinatim applicandas in hyperbola  $\omega$ . Si itaque ex *A*, per puncta *KI, HG*, circulos duxeris, ſecabunt iſ lineas parallelas ordinatim applicandas in punctis, per que hyperbola  $\omega$  tranſibit. Eodem modo procedes in hyperbola  $\omega$  deſcribenda, & alio quouis parallelo. Huius demonſtrationem vide ſupra in Protheoria III. & apud Clauium cap. 11. nouę deſcriptionis horologiorum.




Pro-

**Problema VI.**

*Arcus ſignorum in horologijs verticalibus declinantibus deſcribere.*


**I**n his ferè eadem ratio eſt, que in verticalibus directis: nam, vt ſupra oſtenſum eſt, omnis plana ſuperficies à noſtro meridiano declinans, ſemper alicubi regioni eſt horizontalis, aut verticalis directi. Si igitur inuenieris cui regioni horologium declinans à vertice ſit horizontale, dabunt arcus ſignorum iuxta varias pra-



xes in Problemate IV. edoctas in eodem horologio arcus ſignorum. Vel ſi verticali ad complementum eleuationis poli horizontalis ante conſtructi, arcus ſignorum iuxta præxes in præcedentibus traditas, arcus ſignorum inſcripſeris; prodibit idem horologium verticale, horizontale, & declinante æquale. Verùm quanta cum cautela in hac Pragmatia procedendum ſit, paulò fuſius declarandum duxi.

Sit igitur planum in Ortum declinans 30. graduum ad eleuationem poli Romani iuxta præmiſſa. Primò inueſtigabis lineã ſtyli à meridiana declinationem, quam ſupra fol. 349. 357. inuenire docuimus. Secundò eleuationem ſtyli ſupra planum: quam præxim quoque loco citato traditam inuenies. Sit igitur triângulum gnomonicum eleuationis poli ſupra planum datum *EZK*, ſupra lineam ſtyli *CE*, in horologio declinante fundatum, eritque *ZK* radius æquatoris, *CZ* ſtylus, *EZ* axis, Tangens igitur delinationis muri in horizontalem lineam translata dabit punctum *B*, per quod ex *E* recta ducta dabit meridianam, ſiue 12. Tangens autem complementi declinationis in contrariam horizontalem lineã translata dabit punctum

æum A, communis intersectionis verticalis primarij lineæ horæ sextæ, & æquinoctialis. Quod si K, cum puncto A, in rectam contrahas, habebis æquinoctialem in horologio depictam.



Si igitur triangulum gnomonicum supra planum declinans æquale, inuento alicubi horologio horizontali, Zodiaco radiofo ita adaptaueris, vt EZ sit axis, ZK radius æquatoris, ECK linea styli, siue meridiana plani declinantis, & ZC stylus. Rursus si beneficio tabule 2. folio 358. in problemate horologij declinantis propositæ, secantes tangentiũ à linea styli in æquinoctiali, ex Z centro radiofi Zodiaci in radium æquatoris transferis, & per puncta ex E rectas duxeris, secabunt hæc radios signorum in punctis, quorum interualla ab E, ex centro horologij in lineas horarias correspondentes translata, dabunt arcus signorum in declinante quesitos.

Præterea, si in horologio horizontali, quod verticali declinanti æquale est (quod qua ratione inueniri debeat, citato loco dictum est) arcus signorum per easdem prorsus

praxes in horologio horizontali traditas, seruatis tamen seruandis, inscripseris; habebis in dato plano arcus signorũ quesitos. Si quem verò huiusmodi tedio afficiat, is mechanicis operationibus, quas in sequentibus producemus, vti poterit, quibus nullo ferè negotio desiderato effectu poterit.

Problema VII.

In horologijs inclinantibus ad horizontem arcus signorum inscribere.

Cum inclinantia horologia nihil aliud sint, quàm horizontalia sub aliqua certa latitudine, quam tabula fol. 359. in problemate de inclinantibus proposita, docet: Si itaque iuxta traditas in Problemate IV. de arcubus signorum inscribendis pragmatias in aliquo horologio horizontali inclinanti correspondente, per tabulam citatam inuento arcus inscripseris, planumque ab horizonte iuxta inclinationis gradus, ita vt linea meridiana meridianæ correspondeat, eleuaueris, monstrabit gnomon parallelus Solis quesitos. Hoc problema cum facillimum sit, vteriori explicatione indigere non videtur.

Problema VIII.

In declinatione ab horizonte arcus signorum describere.

Cum declinantia ab horizonte nihil aliud sint, quàm alicubi verticalia declinantia: si per tabulam secundam fol. 360. in Problemate VI. constructum, horologium verticale declinans alicui declinanti ab horizonte correspondens, inuenieris, & in eo arcus signorum iuxta Problema VI. inscripseris; habebis quesitum.

fitum. Vel si in horologio horizontali huic verticali declinanti æquali arcus iuxta praxes in Problemate IV. traditas inscripseris, prodibunt ijdem arcus pro horologio declinante ab horizonte quesiti. Quicumque igitur horizontale, aut verticale cõstruere, aut in ijs cœlestes quaslibet lineas delineare nouit, in omnibus alijs planis easdem se inscripserit nouerit. Cum nullum horologium tam irregulare sit, quod non alicubi horizontale, aut verticale, vel ex his mistum sit.

Catholica methodus dictorũ.

Problema IX.

Anacephalaëonicon, & vniuersale, quo arcus signorum per terminationem horarum in quolibet plano dato inscribi docentur: & desumptum est ex Abaco mirifico supra fol. 400. posito.

Quicumque nouerit communes intersectiones horariorum circularum, & parallelorum Solis, is habebit methodum insignem, & καθολικώτερον hyperbolarum Solarium in quocunque plano inscribendarum; quam methodum breuiter hic ponimus; decerptum ex Abaco mirifico terminationis horarum, supra folio 400. proposito.

Primo exerpatur ex Pinace mirifico tabella separata, cuiusmodi sequens est.

|                |    |    |    |    |    |    |    |                |   |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----------------|---|
| A              | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | B              |   |
| $\frac{1}{2}$  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | $\frac{1}{2}$  |   |
| 1              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 7              |   |
| $\frac{3}{2}$  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | $\frac{3}{2}$  |   |
| 2              | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 8              |   |
| $\frac{5}{2}$  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | $\frac{5}{2}$  |   |
| 3              | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 9              |   |
| $\frac{7}{2}$  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | $\frac{7}{2}$  |   |
| 4              | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 10             |   |
| $\frac{9}{2}$  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | $\frac{9}{2}$  |   |
| 5              | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 11             |   |
| $\frac{11}{2}$ | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | $\frac{11}{2}$ |   |
| C              | 6  | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6              | D |

Explicatio Tabulae.

Primò horæ in fronte AB signatæ notant horas, per quas aliæ terminandæ sunt; horæ columnæ AC horas in æquinoctiali horologij post meridiem; horæ in columna BD horæ sunt in æquinoctiali ante meridiem: intermediae horæ terminatæ dabunt puncta parallelorum Solis desiderata.

In horologio igitur quopiam, verbi gratia horizontali, vel quocunque alio cuiuscunque plani, describantur horæ astronomicæ cum dimidijs. Quo facto terminabis horas, seu describes in eo parallelus Solis terminantes horas, eo, quod sequitur, artificio.

## Canones Pragmatici.

**S**I descriptionem parallelorum volueris per horam 12. siue per columnam primam; primò ope Zodiaci radiosi in meridiana linea horologij inquires puncta parallelorum. Si verò per horam 1. & 11. siue columnam secundam: in dictis lineis horarijs puncta parallelorum prius inuestiganda sunt. Si per columnam 2. & 10. in eadem horaria linea puncta dictorum arcuum signorum inquires. Datis igitur in quibuscunque horarijs lineis, punctis signorum, inuenies subsidio tabulæ præcedentis in reliquis horis puncta, per quæ arcus signorum ducendi sunt. Si igitur per columnam primam, hoc est 12. quam nos paradigmatis loco selegimus, terminatio instituenda sit; ita procedendum est.

## Canon I.

*Inuenire puncta tropica in hora 1. & 11.*

| A              | B  | C              | D |
|----------------|----|----------------|---|
| 12             | 12 | 6              |   |
| $\frac{11}{2}$ | 1  | $\frac{5}{2}$  |   |
| 1              | 2  | 7              |   |
| $\frac{9}{2}$  | 3  | $\frac{7}{2}$  |   |
| 2              | 4  | 8              |   |
| $\frac{7}{2}$  | 5  | $\frac{9}{2}$  |   |
| 3              | 6  | 9              |   |
| $\frac{5}{2}$  | 7  | $\frac{11}{2}$ |   |
| 4              | 8  | 10             |   |
| $\frac{3}{2}$  | 9  | $\frac{11}{2}$ |   |
| 5              | 10 | 11             |   |
| $\frac{1}{2}$  | 11 | $\frac{11}{2}$ |   |
| 6              | 12 | 12             |   |

**S**I horam primam terminare velis, applica regulam supra horam 12. in puncto  $\phi$ , & supra  $\frac{1}{2}$  horam ante 1. vt columna AC ostendit; & vbi hora 1. secatur, ibi punctum est tropici  $\sigma$ , terminantis horam 1. Si iterum regulam ponas supra horam 12. in puncto  $\phi$ , & supra mediam horam, id est  $\frac{1}{2}$  ante 7. vt columna BD notat; vbi hora 1. secabitur, ibi est punctum tropici  $\phi$ . Vides igitur horas, quæ terminari debent, semper mediam columnam occupare.

2. Applica regulam supra punctum  $\Phi$  &  $\infty$  in linea meridiana, siue 12. & supra  $\frac{1}{2}$  ante 1. & vbi hora 1. secabitur, ibi erit punctum  $\Omega$ , vel  $\Pi$ . Rursus supra idem punctum  $\Phi$  &  $\infty$ , & supra  $\frac{1}{2}$  ante 7. posita regula, vide vbi hora 1. secatur: illud enim punctum erit punctum, per quod Sol in  $\Phi$ , &  $\infty$  constitutus transibit.

3. Applica regulam supra punctum  $\mathcal{M}$ , &  $\mathcal{X}$  in linea meridiana inuentum, & supra  $\frac{1}{2}$  ante 1. & vide vbi secatur hora 1. per id enim punctum transibit  $\Omega$ , &  $\sigma$  parallelus. Si verò regulam supra puncta  $\mathcal{M}$ , &  $\mathcal{X}$ , & supra  $\frac{1}{2}$  ante 7. applicabis, secabit illa horam 1. in puncto, per quod  $\mathcal{M}$ , &  $\mathcal{X}$  parallelus transibit. Vides igitur quanta facilitate simul & voluptate habeantur puncta parallelorum Solis.

## Canon II.

*Inuenire puncta parallelorum in hora 2.*

**A**pplica regulam supra punctum  $\phi$  in linea meridiana, siue 12. & supra horam 1. in æquinoctiali, vt columna AC ostendit, quæ horæ 2. è regione columnæ respondet, & vide vbi regula secet horam 2. per illud enim tropicus  $\sigma$  transibit. Iterum applica regula supra horam 12.  $\phi$  & supra 7. in æquinoctiali, vt columna BD monstrat, & vide vbi hora 2. interfecetur, per illud enim punctum transibit tropicus  $\phi$ . Similiter reliquorum parallelorum puncta reperies.

## Canon III.

*Pro punctis parallelorum in hora 3.*

**A**pplica regulam primò supra F punctum 12. tropici  $\phi$ , & supra  $\frac{1}{2}$  inter 1. & 2. vt prima columna docet, & vide vbi hora 3. secetur: per id enim punctum transibit tropicus  $\sigma$ . Iterum applica eandem regulam supra E, & supra  $\frac{1}{2}$  inter 7. & 8. in columna BD, & vide vbi secetur hora 3. per id transibit tropicus  $\phi$ . Si verò regulam supra punctum X paralleli  $\Phi$ , &  $\infty$  applicaueris, & supra  $\frac{1}{2}$  inter 1. & 2. dabit tibi sectio in hora 3. punctum, per quod oppositus parallelus  $\sigma$ , &  $\mathcal{M}$  transeat. Supra punctum verò Y paralleli  $\mathcal{M}$ , &  $\mathcal{X}$  applicata regula, & supra  $\frac{1}{2}$  dabit punctum sectionis paralleli oppositi  $\Pi$ , &  $\Omega$ . Porro regula applicata supra E, & supra  $\frac{1}{2}$  inter 7. & 8. in columna BD, ressecabit in linea horæ 3. punctum, per quod  $\phi$  transibit. Et sic iuxta ordinem horarum in columnis comprehensarum procedes, donec puncta parallelorum in singulis horis deprehenderis.

## Canon IV.

*Si verò puncta parallelorum in hora 11. nota fuerint, inuenies in omnibus reliquis horarijs lineis puncta, per quæ paralleli transire debent subsidio columnæ 2. numero 11. siue MN signata, hac industria.*

**S**I punctum  $\sigma$ , verbi gratia in hora 2. inuenire desideres; vide quæ horæ in æquinoctiali, id est in columnis AC, & BD ipsi respondeant, reperiesque 12. & 6. si igitur regulam applices supra punctum  $\phi$  in hora 11. & supra  $\frac{1}{2}$  inter 12. & 1. in æquinoctiali: secabit ea horam 2. in puncto, per quod  $\sigma$  transibit. Si regulam applices supra punctum  $\phi$  in 11. & supra  $\frac{1}{2}$  inter 6. & 7. dabit regula in hora 2. punctum  $\phi$  questum. Et si applices regulam supra punctum  $\phi$  in linea horæ 1. & supra  $\frac{1}{2}$  intra 12. & 11. dabit punctum intersectionis in linea horæ 10. punctum, per quod  $\sigma$  transibit. Et tropici  $\phi$  punctum habebis in hora 2. si applicaueris regulam supra punctum  $\phi$  in hora 1. & supra  $\frac{1}{2}$  inter 9. & 8. Quidquid dicimus hic de tropicis, de reliquis parallelis quoque dictum sit, vti in Canone I. ostendimus.

*Nota.*

**S**I puncta parallelorum nota fuerint in linea horaria 10. tibi seruiet tertia columna eodem numero signata; si nota fuerint in 9. hora, tibi quarta columna seruiet, pro reliquis horarum punctis determinandis, & sic de ceteris. Quare hæc breuiter dicta sufficiant. Qui plura desiderat, is adire poterit lib. 4. vbi hunc Abacum mirificum fusè declarauimus. Est autem hoc artificium ita immensum, tantæque combinationum serie procedit, vt vix exhauriri posse videatur; eruius autem id ex abdita quadam hyperbolice sectionis proprietate, quam lib. 3. part. 2. theor. 12. indigitauimus. Non dubito, quin curiosus & sagax Lector, si hæc penetraverit, innumera alia sit inuenturus ad hanc materiam pertinentia, nemini penetrata. Verùm his breuiter indicatis, nunc ad alia progrediamur.


## Problemâ X.

*Mechanica arcuum inscriptio.*

## Pragmatia I.

*Instrumento obseruatorio arcus signorum inscribere.*

Varia sunt ab artificibus excogitata instrumēta ad arcus signorum inscribendos. Verūm cum eorum fabricæ, vt plurimum laboriosæ sint; idē ijs omiſſis eas adducemus, quæ & faciles sint, & facillè comparari possint. Arcus itaque signo-




rum nullo penè negotio in quauis superficie describes ope instrumenti obseruatorij hoc loco propositi. Ponatur igitur in huius instrumenti tabula ABCD, in eminente parte E, prototypon horologium quodcumque vnâ cum Zodiaci inscriptione, id est arcubus signorum exactè eidem inscriptis. Deinde imponatur plano tabulæ cuiuscunque declinationis planum, verticale inclinatum, declinansue; vt si planum à meridiana EV, in ortum 30. grad. declinauerit, dispones planum verticale tali ratione, vt basis plani cum linea EV, tabulæ angulum dictæ declinationis contineat. Quo facto, gyrâ totum systema, donec umbra gnomonis in prototypo per singulos parallelos decurrat. Quod dum fit, eodem tempore umbram styli in plano declinante notabis; & hac ratione dicto, citiùs, desiderato effectu poteris

*Alius modus.*

**A**ccipe instrumentum encliticum, quod sequens figura docet; cuius tabulam ABCD, ita diriges, vt eius planum datam inclinationem, aut declinationem

nem quam cunque referat. In huius igitur tabulæ plano infixo stylo, firmatoque toto systemate ABCDGLOE, supra situm datum, vt loco moueri non possit. Hoc fa-




cto ex archetypo horologio in tabula X, priùs delineato, in plano declinato, inclinante, vel declinante, horologium quæsitum eadem prorsus ratione, qua in præcedente instrumēto factum est, describes; puncta umbrarum in tabula ABCD, signandos; iuxta motum umbræ styli in horologio tabulæ archetypæ X. inscripto.

## Pragmatia II.

*Fili ductu idem in quouis plano perficere.*

**D**Vta in plano quopiam linea horæ 12, AB, & axi AC, in ea iuxta triangulum gnomonicum dati plani erecto firmatoque, affiges ei radiosum Zodiacum ligneæ tabulæ inscriptum, ita vt radius æquatoris OB, ad axem OA, rectus sit. Sit autem ita firmatus in O puncto, vt gyrari quidem circa axem possit, locum autem, minimè mutare. Hoc peracto, ex O filum extendatur, quod superficiem tabulæ Zodiaci

diaci radioſi liberè radat. Si itaque huiusmodi filum ſupra radium  $\overline{os}$  ita exten-  
deris, vt ſemper ſupra dictum radium rectâ, vſque in murum extenſum currat, in-



dicabit id in muro punctum, per quod tropicus  $\overline{os}$  deduci debet: & ſi gyrate cir-  
cum axem trigono Zodiaci, filum ſupra eundem radium ſemper rectum maneat,  
deſcribet filum in murum extenſum deſideratum arcum  $\overline{os}$ . Si filum ſupra reli-  
quos radios extenderis, deſcribes eo in muro correfpondentes arcus. Ratio cla-  
riſſima eſt ei, qui fili ductum in radioſo Zodiaco radium Solis referentem, rectè con-  
ſiderauerit. Deſcriptis igitur hac ratione arcubus, ſublato trigono loco O, nodum  
ſubſtitues, cuius vmbra loco apicis conſueti gnomonis, locum Solis intra arcus  
oſtendet. Nota autem omnes reliquas mechanicas inſcriptiones, quæ apud alios  
Authores habentur, adhuc vſque propoſitas reuocari.

#### Alius modus per ſphæram concauam.

**S**I quis verò in hemiſphærio concauo horas omnis generis, vti & lineas cœ-  
leſtes inſcriperit: deinde duos tropicos & æquatorem exciderit; applica-  
tum hemiſphærium centro ſuo apici ſtyli, & ducto filo ex eodem centro per pun-  
ctum horæ 12. in murum, ita vt filum vtriſque 12. cum in hemiſphærio, tum in mu-  
ro reſpondeat, perfectè ſituabitur. Si igitur per figuram tropici  $\overline{os}$ , &  $\overline{p}$  filum ſu-  
pra ſingula horaria puncta in murum vſque recta extenderis; dabit terminus fili in  
muro puncta eadem horaria, quæ rectis coniuncta in muro horologium vnâ cum  
arcubus ſignorum efformabunt.


## Problema XI.

Almucantaras, & Azymutha planis datis inſcribere.

### Pragmatia I.

In plano horizontali, & verticali.


**A**ccipe regulam expanſam A B I Y, ſupra quoque Præexercitamento IV. tra-  
ditam, eamque ſupra lineam ita applica, vt A punctum, D centro, ſeu lo-  
co gnomonis, B Y verò lineæ Ia congruat. Hoc peracto, iuxta B Y latus in linea Ia  
puncta graduum in latere B Y ſignatorum, imprime; per quæ, ſi ex A tanquam cen-



tro lineas rectas duxeris, dabunt illa tibi lineas verticales, ſiue Azymutha quæſta.  
Quibus numeros, eo ordine, quo in regula ſignata ſunt, appones;

Iterum, ſi regulæ latus B Y, lineæ VR, ita applicaueris, vt B centrum, ſeu locum  
gnomonis D obtineat, & puncta graduum in ea impreſſeris; dabunt circuli ex loco  
gnomonis D, per dicta graduum puncta deſcripti Almucantaras quæſitas. In verti-  
cali vero plano, quomodo Almucantaræ, & Azymutha inſcribi debeant, docui-  
mus in Præexercitamento IV. huius capitis. Ex quo patebit quoque, quod qui ho-  
rarias lineas in polari horario inſcribere norit, is etiam in verticali Azymutha de-  
ſcribere nouerit: eſt enim eadem omnino ratio, vt in Protheoria III. fuſè demon-  
ſtrauiſus.


*Quomodo Ver-  
ticali plano in-  
ſcribantur.*



Pragmatia II

In plano æquinoctiali Almucantaras, & Azymutha inſcribere.

**D**Vcantur duæ lineæ AB, CD, ad rectos ſe interfecantes in A, eritque CD horizontalis, A b verò diamèter æquinoctialis: Siue lineæ 12. adaptetur trian.



gulum gnomonicum meridianæ AB ea industria, vt angulus Abd, contineat gradus eleuationis poli ſub data latitudine, cõtinebitq. angulus A, vel dbc angulũ complementi eleuationis poli, videlicet æquatoris, eritq. C punctum verticis. Si igitur horizontale horologium delineaueris, & huic plano ita impoſueris, vt centrum eius centro C, & linea meridiana lineæ AC, reſpondeat, oſtendet d b ſtylus verticales circulos ſingulos quindenos & quindenos; eſt enim verticaliũ deſcriptio in æquinoctiali plano eadem præſus, quæ linearum horariarum in horizontali. Quare ſicut ſe habent circuli omnes horarum à meridie, & media nocte, & mundi axis cum horizonte, & plano ipſi parallelo, ita ſe ſe habent Azymutha, & communis eorum ſectio axis, videlicet horizontis cum æquatore, & plano ei æquidiftante, hæc tantum differentia, quod quæ in horologio horizontali dicitur æquinoctialis, hoc loco dicatur horizontalis; & quæ illic linea horæ ſextæ, hic verticalis primarij linea fit. Si igitur lineam Ab in triangulo gnomonico in S transferas, atque ex eodem circum in 360. partes diuiſum deſcriperis, dabunt ex S lineæ rectæ per diuiſiones ductæ in horizontali CD puncta, per quæ ex C, ſeu centro alia rectæ ductæ, erunt verticales quæſitæ. Demonſtratio rei ex dictis patet.


*Aſtronomia  
horæ in plano  
horizontali, idẽ  
ſunt quod ver-  
ticales in plano  
æquinoctiali.*

Almu-

Almucantaras autem ex analemmate Præexercitamento III. huius capitis propoſito ita inſcribas. Pono æquatorem cum axe mundi circa centrum analemmatis verſatilem, hoc pacto, vt æquinoctialis ſitum obtineat horizontis, & axis mundi ſitum obtineat axis horizontis. Quo facto in ipſo analemmate fol. 404. propoſito, in axe mundi SE, æqualis ſumatur DP, per cuius punctum P, normalis ducatur KL, quæ horizontalem BC ſecabit in T. Si igitur à T, incipiendo, ſpacia MNIO, &c. ex A lineæ horizontalis puncto in plano horologii æquinoctialis transferas in meridianam verſus C, habebis puncta, ſeu vertices hyperbolarum; per quæ, ſi iuxta regulas, & pragmatias in Progymnaſmate III, vti & in præcedentibus traditas, conotomicas proiectiones deſcriperis, dabunt illæ tibi Almucantaras quæſitas; notando diligenter, cuius coni lateri æquidiftiterit æquinoctialis, per illud enim non hyperbola, ſed parabola ducenda erit, cuius nodi in hoc horologio æquinoctiali eſt 48. Almucantara. Si verò conum neque tetigerit, neque baſim ſecuerit, erit Almucantara illa ellipſis, vti hæc 60. quæ benè notanda ſunt. Nota præterea à T verſus L Almucantaras deſcriptas ad inferius planum pertinere.

Alius modus facillimus per regulam Almucantaro-azymutham.

**A**pplicetur triangulum gnomonicum duabus lineis AC, & AB, in figura radiola, ita vt BD meridianæ, lineæ AC in plano æquinoctiali inter centrum C, verticis, & punctum A, commune interſectionis horizontalis, & meridianæ reſpondeat. AB verò æqualis ſit Ab, & AD æqualis b C. Ex A quoque in figura, adiuncta quolibet interuallo quadrans ABC deſcribatur in 10. vel 15. gradus per lineas, quæ ſunt Almucantaræ, diuiſus. Hoc peracto, accipe contractam regulam latitudinis Ab, lineæ trianguli gnomonici, atque iuxta eam hic ad AB applicatam imprimantur puncta graduum, vt vi des, cum numeris. Si igitur ex D figura radiola per hæc puncta rectas duxeris; ſecabunt eæ lineas quadrantis ex A ductas in punctis, quæ ex C centro plani æquinoctialis in lineas verticales prius delineatas correfpondenter ductæ dabunt Almucantaras quæſitas. Ita ſpaciũ inter D, & AE interceptum, atque ex C in meridianam traductum, dabit puncta Almucantaræ 15. in AC linea merid. Si verò punctũ Almucantaræ 30. in eadẽ habere deſideres, ſpaciũ inter D, & F radium quadrantis 30. ex C, in meridianam translatum dabit quæſitum, & ſic de cæteris. Si verò quiſpiam deſideret in




verticali 45. Almucantaram 30. is quærat in linea AB radium verticalem 45, & in quadrante BC, Almucantaram 30. Vbi enim hæc duo ſeſe interſecant, videlicet in V; ibi poſito circini pede altero intercipe punctum D, atque hoc interuallum transfer ex C in verticalem 45. plani æquinoctialis vtrinque, habebisque puncta Almucantaræ 30. quæſitæ; in his enim Sol 30. graduum ſupra hoc planum eleuatus vmbra mittet; non ſecus de cæteris Almucantaribus inſcribendis operaberis. Hinc patet quoque, qua ratione facillimè tota hæc deſcriptio ope duorum filorum in A & D fixorum perfici poſſit. Atque hic eſt modus omnium facillimus, & præcedenti multo expeditior; quare eum adhibendum Lectori ſuaſerim.


### Problema XII.

*Almucantaras, & Azymutha in plano polari inscribere.*

**A**zymutha, siue verticales lineæ in plano polari inscriptæ, si sumantur per quindenos & quindenos gradus, eadem sunt cum lineis horarijs in horologio verticali. Si itaque verticale horologium plano polari ita applicaueris, ut li-



nea meridiana meridiane polari respondeat, & loco horarum ponas singulos quindenos gradus, usque ad 90. habebis verticales horologio polari inscriptos: sicuti enim se habent circuli horarij cum axe mundi ad planum verticali æquidistant; ita verticales circuli cum axe horizontis ad planum polare, siue circulum horæ 6. differentia tantum est, quod ubi in verticali est æquinoctialis, in hoc sit horizontalis, & ubi in verticali est linea horæ 6, in hoc sit verticalis. Si igitur in hoc horo-



logio, ita applicaueris triangulum gnomonicum, ut in verticali, & intervallo EB, supra lineam horizontalem in linea meridiana ex A circulum descriperis in 360. partes, vel in quinos, aut denos, quindenosue gradus pro capacitate plani diuisum, rectasq. occultas ex centro vsque ad horizontalem duxeris; dabunt aliæ rectæ ex C centro verticis per puncta in horizontali signata ductæ, verticales quæ sitas.

Almucantaras quoque eadem prorsus ratione hisce verticalibus inscribes, qua eas in præcedente horologio dictis verticalibus inscripsisti: triangulum gnomonicum applicabis, ita ut lineæ CE, lineæ CA, in radiofa figura, EB verò lineæ BC, & CB, denique BA respondeat. Deinde regula latitudinem habeat li-

neæ


neæ BE æqualem cum scala contracta, iuxtam quam in latere BD puncta graduum imprimas, per quæ deinde verticales ex B duces. Deinde ex A radiofa figura transfer Almucantaras in verticales horologii, posito circini pede in verticis puncto C: altero in verticales correspondentes: sic spacium AD in radiofa figure meridiana signata 90. ex C translatum in lineam meridianam ibi assignabit punctum 45. Almucantaræ, & sic de cæteris procedendum est.

### Problema XIII.

*In plano meridiano, vti & in alijs omnibus declinantibus verticalibus, Almucantaras, & Azymutha inscribere.*

**I**N omnibus verticalibus planis quomodocunq. declinantibus eadem prorsus est Almucantararum, & Azymuthorum inscribendorum ratio. Beneficio igitur Retis verticalis Almucantaro-azymuthici folio 414. propositi, & hic repetiti, in data qualibet verticali superficie, Almucantaras, & Azymutha inscribes, ea, quæ sequitur, ratione. Sit primò datum planum meridianum. Applicetur in plano meridiano memoratum Rete hac industria, ut linea meridiana Retis, siue verticalis 90. respondeat verticali lineæ primariæ, & horizon Retis horizonti plani meridiani pariter respondeat. Hoc peracto, acicula puncta communia intersectionum verticalium cū horizontalibus in subiecto plano notabis; per hæc enim lineæ rectæ ad horizontem normales, dabunt verticales; hyperbolæ verò ductæ dabunt Almucantaras: & numeri Almucantararum semper quidem manent ijdem; Azymuthorum verò mutantur, ita ut in meridiano plano primo Azymutho apponas 0, & vtrinque sequentibus verticalibus reliquos consequenter numeros vsque ad 90. habebisque Almucantaras, & Azymutha meridiano plano inscripta.

Sit verò iam datum planum verticale à meridie in alterutram partem 30. vel



quod idem est, à puncto ortivo, vel occiduo 60. gradibus declinans: si huic plano applic-



applicaueris Rete nostrum memoratum, ita vt medius verticalis AC respondeat verticali medio, plani 30. gradibus à meridiano, vel 60. à verticali primario declinanti, & deinde acicula in subiecto plano verticalium, & horizontalium puncta signata rectis coniunxeris, habebis Almucantaras, & Azymutha dicto plano inscripta; hoc obseruando, vt medio huius plani verticali 60. apponas, & reliquis deinde sequentibus alios secundum ordinem, vt sequitur 90. 85. 80. 75. 70. 65. 60. 55. 50. 45. 40. 35. 30. 25. 20. 15. 10. 5. non secus de omnibus alijs planis declinantibus procedes, Vnde maiori cum facilitate operaberis, si in pergamenoqueodam numeros ordine descriptos habeas; vt occurrente plano aliquo declinante, supra medium verticalem, seu meridianum declinantis plani, numerum declinantis muri in pergamenoe descriptum applices; & occurret semper ordo se consequentium ordine verticalium: quæ omnia vius, & experientia melius docebunt, quam ego vel multis explicare.

Consectarium I.

Arcanum Gnomonicum.


Hinc patet admirandus quidam modus, quo ope huius Retis dicto citius quoduis declinans à verticali delineare possis, si ex tabula Almucantara-azymuthica communes intersectiones verticalium, & Almucantararum, horis astronomicis in tabula ordine respondentibus, acicula in subiecto plano denotes, per has enim ex centro horologii rectæ ductæ dabunt horas plani declinantis.

Consectarium II.

Hinc sequitur ulterius, non esse vllum genus linearum, aut circulorum celestium, quod huius Retis ope dicto citius per tabulas dictorum celestium circulorum in quolibet plano dari non possit. Magnum sanè, & insigne in gnomonica, arcanum. Verùm cum hæc omnia fufius in sequentibus libris declaremus, eò Lectorem remittimus;

Problema XIV.

De Positionum circulis, siue de duodecim domuum celestium in quolibet dato plano delineatione.



Quid sint positionum circuli, quidque lineæ domorum celestium, dictum est in Apparatu Protheoria I. vbi duplicem protulimus methodum: vnã Campani, qui circulos positionum per communes intersectiones horizontis, & meridiani, & singulos gradus verticalis primarij ducit: alteram rationalem Regiomontani, qui per easdem intersectiones, & meridiani intersectiones, & equatoris singulas partes circulos describit. Vtramque methodum plano cuiuslibet dato inscribere docebimus. Præsupponimus ergo hoc loco tropicos æquinoctialem, & horizontalem lineam, iuxta præcedentia in plano dato prius esse delineata. Quo facto sic operare.

Prag-

Pragmatia I.

Circulos domorum celestium in plano horizontali describere.

Applicato igitur, supra lineam meridionalem CA, sæpius proposito triangulo gnomonico, vt in horologio horizontali factum est, eritque ST æquinoctialis, DE stylus simul, & lineæ verticalis. Si igitur in regula scalam expansam (cuius latitudo tanta fuerit, quantus radius æquinoctialis AB) limbo graduum supra æquinoctialem ST applicaueris, & iuxta eam quinquorum & quinquorum, vel denorum & denorum graduum puncta notaueris; dabunt per singula puncta parallelæ ad meridianam ductæ, lineas positionum quæ sitas iuxta mentem Regiomontani, eruntque per singula 30. graduum puncta parallelæ ductæ lineæ domorum celestium, & singulæ 15. graduum parallelæ mediæ domus.

Linea positionum. Iuxta methodum Regiomontani in plano horizontali.

Alius modus.

Idem habebis, si AB radiũ trianguli gnomonici, ex A in E transtuleris, & ex E circulum in 360. partes diuisum descriperis; radij enim æquinoctialem secabunt in punctis, per quæ parallelæ ad meridianam ductæ dabunt circulos positionis quæ sitos.

Si verò in regula quapiam (cuius latitudo stylum siue gnomonem DB æquauerit) scalam expansam supra verticalẽ lineam MN in 2. figura applicaueris, & singula quinquorum, denorum, quindenorum, aut tricenorũ graduum puncta notaueris; dabunt parallelæ ad lineam meridianam ductæ lineas positionum secundum Campanum; & cum vnaquæque domus 30. graduum sit, habebis lineas sex domorum superiorum; si per singula 30. graduum puncta parallelas paulò distinctiores duxeris, & parallelæ per 15. graduum puncta ductæ dabunt dimidiã domus, & per quoslibet 10. graduum dabunt tertias partes, & sic de cæteris. Idem præstabit circulus ex V (cuius centrum tantum à verticali MN distet, quanta est altitudo styli) descriptus, & in 360. partes diuisus, vbi enim lineæ per gradus è centro V ductæ verticalem secant, ex ijs ad meridianam parallelæ ductæ dabunt quæ situm, vt secunda figura ostendit.

Linea positionum secundum Cā. panum.

Consectarium.

Patet, horologium polare, seu meridianum, in plano horizontali, nihil aliud esse quam schema domorum celestium, iuxta Campanum. Si igitur id plano dato affixeris, referet id tibi integras domus cum medijs, quibus loco horariorum numerorum rescribes numeros domuum, vti hic factum vides.

Insigna compendium descriptiois celestium domuum.


Cum autem Sol semper prius sit in fine alicuius domus, quam in principio, ob domuum celestium situm oppositum situi horarum. Hinc fit, vt vmbra cadens in aliquam ex illis lineis, verbi gratia in 11. ostendat Solem esse in fine 11. domus, & tendere versus principium 10. Idem dicendum de gradibus positionum, qui terminantur in meridiano, qui est 90. circulus positionis. De significatione, vlti, & qualitate harum domuum, circulorumque positionis, vide in Gnomonica nostra Physico-astrologica.

Prag-

Pragmatia II.

Eaſdem domus in plano verticali deſcribere.

Primo meridiane applicetur triangulum gnomonicum pro verticali conſtru-  
ctum: deinde præpara regulam expanſam tantæ latitudinis, quantæ eſt radius  
æquatoris in triangulo gnomonico: hanc applica æquinoctiali, & iuxta gradus qui-



Iuxta Regiomontanum.

Iuxta Campanum.

nos, denos, quindenos, imprime puncta in eo: per quæ ſi ex loco gnomonis rectas duxeris, habebis circulos poſitionum, quorum 90. meridianus eſt: ſi verò per ſingula 30. graduum puncta diſtinctiores ex loco ſtyli lineas duxeris, habebis domus cœleſtes iuxta Regiomontanum, vt in prima figura patet. Iterum poſito centro regulæ in loco ſtyli, ita vt latus regulæ hori- zonti incumbens æquatori ſit parallelum, referentq; radij ex centro ſtyli ducti lineas poſitionum iuxta Campanum. Si igitur iuxta gradus in regulæ latere puncta ſignaueris in ſubiecto plano, dabunt per ea ex loco ſtyli rectæ ductæ circulos poſitionum, & per ſingula 30. graduum puncta domus cœleſtes iuxta Campanum, vt in ſecunda figura patet.

Ratio ex ipſa poſitione, & ductu circulorum adeò clara eſt, vt nulla explicatione indigeat. Idem quoque habebis, ſi ex loco ſtyli circulum in 12. æquas partes diuiſum deſcriperis; per puncta enim diuiſionum è centro circuli rectæ ductæ dabunt lineas domorum cœleſtium in plano verticali, iuxta Campanum.


Conſectarium.

Patet igitur, horologium æquinoctiale in plano verticali poſitum, referre lineis ſuis horarijs, lineas domorum cœleſtium cum medijs iuxta Campanum.

Pragmatia III.

Eaſdem plano meridiano inſcribere.


Accipe regulam dodecatemoriam, vel hecetemoriam, quam ſupra æquinoctialem MN, in meridiano plano ductam ita applicabis, vt linea meridiana, ſiue



Domus cœleſtes iuxta Regiomontanum in plano meridiano.

latitudo regulæ, lineæ horæ 6. CD respondeat: deinde iuxta eam puncta hecetem-

moria, vel trimoria imprime in æquinoctiali MN; per ea enim parallelæ ad lineam horizontalem in plano meridiano ductæ dabunt medias, & integras domus cœleſtes, in vtroque plano orientali, & occidentali, iuxta Regiomontanum, vt 1. & 2. figura docet. Eritque 1. vel 7. domus ſemper horizontalis; reliquæ domus eo ordine, quo vides, ponentur; 10. domus in hoc, quemadmodum & 12. hora euaneſcunt, ob rationes, iam ſæpiùs dictas. Aliter. Si interuallo quantitatis ſtyli, ſcilicet NV ex V circulum deſcriperis; ſecabunt ſinguli 30. gradus MN in punctis, per quæ ad horizontalem PC parallelæ ductæ dabunt quæſitum. Si verò iuxta Campanum




Iuxta Campanum.

negotium expedire deſideres, ducta per cõmune punctum interſectionis horizon- tis, & æquinoctialis normali GH, ad ipſum horiſontem PQ, quæ verticalem referet. Si regulam expanſam ita applicaueris, vt latus graduum verticali GH, latitudo verò regulæ ſtylo æqualis PQ horiſonti congruat; ſecabunt gradus regulæ GH, lineam in punctis, per quæ ad horiſontem parallelæ ductæ dabunt circulos poſitionum, domusque cœleſtes in dato plano quæſitos.

Pragmatia IV.

Eaſdem in plano polari inſcribere.

Delineato priùs in dato plano triangulo gnomonico, horizontali, æquinoctia- li, & verticali lineis, vt in figura apparet, accipe regulam dodecatemoriam expanſam, cuius latitudo altitudini ſtyli ſit æqualis; eamque applica ſupra æquinoctia-



Modus iuxta Regiomontanum.


Modus iuxta Campanum.

læ puncta imprimèdo, per quæ ſi ex cõmuni interſectionis horiſontis IV. & meridia- næ rectas duxeris, habebis medias cum integris domibus cœleſtibus, ſecundum Regiomontanum, vt 1. figura monſtrat, in plano polari delineatas: ſtylus in puncto, vbi æquinoctialis meridianam ſecat, ponetur normalis. Iuxta Campani mentem domus cœleſtes cum medijs hoc in plano habebis, ſi iuxta regulam dodecatemoriam (quæ tantam latitudinem habeat, quanta eſt in triangulo gnomonico TS) lineæ verticali VN applicatam puncta graduum impreſſeris; per hæc enim ex cõmuni puncto interſectionis horiſontis, & meridianæ rectæ ductæ dabunt quæſitum, vt 2. figura monſtrat.

Pragmatia V.

In plano æquinoctiali domus cœlestes inscribere.

Præsupposita linea horizontali, & alterutro tropico, & quantitate styli, vna cum triangulo gnomonico dicto plano congruo, vt in præcedentibus dictum est; iuxta mentem Rëgiomontani domus cœlestes cum medijs inscribes, si circulum



Iuxta Rëgiom. tanum.

Iuxta Campan.

in 12. æquales partes diuiseris, ita vt 10. domus sit eadem cum meridiana FG, & horizontalis cum domo 7. & 1. Deinde ex H communi puncto interfectionis horizontalis, & meridianæ ad lineas ex A centro circuli ductas, parallelas duxeris; hæ enim dabunt domus quęsitas. Iuxta mentem Campani habebis, si puncta æquinoctialis dodecamoria in verticali horologio in verticalem æquinoctialis transuleris; per hæc enim rectæ ductæ dabunt domus cum medijs, iuxta mentem Campani inscriptas. Vel etiã, si placet, applica regulam dodecamoriam tantę latitudinis, quantã semidiametër NM, in triangulo gnomonico; per puncta enim

iuxta XY fitum regulæ in linea verticali impressa, si ex puncto C rectas duxeris, habebis quęsitum.

Problema XV.

In quocunque plano irregulari dato domus cœlestes describere per obseruatorium instrumentum.

Delineentur primò domus cœlestes in horologio horizontali, vel alio quouis irregulari plano; ponaturque hæc cœcographia in tabulę parte E, impositaque tabula quibuslibet planis, gyretur totum systema, donec vmbra cadat supra lineas domuum cœlestium in tropicis terminantes; & eodem tempore in planis gnomonibus iam suis instructis vmbra notabis. Si enim per consequentia puncta rectas duxeris, habebis domos cœlestes in datis planis delineatas.

Problema XVI.

Horoscopographia Signorum.

Quod signum Zodiaci quolibet momento temporis oriatur, vel occidat, vmbra in quolibet plano determinare.

Agemus in hoc problemate de situ, & positione astrorum, situque signorum Zodiaci in cœlo; vt quem quodque in cœlo situm, & positionem sortiatur, per vmbra innotescat.


Quam-

Quamuis Clavius hæc satis fusè attigerit; quia tamen multi ex discipulis meis, alijsque insignibus, cum mihi non semel de nimia obscuritate Clauij circa hanc materiam cõquęsti essent; vt laudabiles eorũ conatus in negotio gnomonico promouerem, seriò huic negotio facilitando incubui: quo factum est, vt trigonometricę artis subsidio modum paulò post aperiendum, à nemine, quod sciam, adhuc traditum, quoue faciliorem, expeditioremque dari posse vix credo, tandem etsi non sine sudore eruerim. Et quoniam hoc genus linearum in nullo plano melius, minorique cum confusione, quàm in æquinoctiali, describi potest; ab illo initium descriptionis nostrę ordiemur.

Pragmatia I.

Datis parallelis Solis, & linea horizontali in plano æquinoctiali, ascendentiũ signorum lineas in eadem describere.

Describantur primò, & ante omnia in plano æquinoctiali paralleli signorum, cum linea horizontali, ea industria, qua folio 416. factum est. Cum igitur lineę ascendentiũ signorum, sine sectiones communes eclipticę, & cuiuslibet



plani ad lineas horarias ea prorsus ratione se habeant, quemadmodum se habent lineę horarum ab ortu, & occasu in quolibet plano ad lineas horarum à meridie, & media nocte; cumque sicuti lineę horarum ab ortu, & occasu circulum semper apparentium, & semper per delitescentiũ maximum tangunt in punctis, in quibus eundem horę à meridie, & media nocte interfecant; ita se habeant ascendentes lineę ad tropicos, quos tangunt ijs in punctis, in quibus secantur ab horis, quibus dicta signa supra horizontem emergere solent. Inscribes subsidio tabulę sequentis nullo pene negotio in plano æquinoctiali reliquis commodiori, ascendentiũ, & descendentiũ signorum Zodiaci lineas, vt sequitur. Diuiso circulo ADBC, per AB in binos semicirculos ADB, ACB vtrunque in 180. partes dispesces, ab A vtrinque numerationem incipiendo. Et lineas quidem ascendentiũ Y, & Z inscriptas habebis, si in punctis AB, normales erexeris circulum contingentes in punctis meridiani: in has enim vmbra gnomonis incidens monstrabit in superiori quidem

Qui nouit describere horas ab ortu & occasu, nouit & lineas ascendentes signorum describere.

plano ascensionem  $\alpha$ , in inferiori verò  $\gamma$  ascensionem. Deinde reliquas signorum ascendentium lineas ita inscribes.

|          |     |    |           |          |   |
|----------|-----|----|-----------|----------|---|
| P        | M   | G  | M         | A        | M |
| $\gamma$ | 0   | 0  |           | $\gamma$ |   |
| $\delta$ | 15  | 10 |           | $\chi$   |   |
| $\Pi$    | 30  | 34 | $\approx$ |          |   |
| $\alpha$ | 60  | 28 |           | $\rho$   |   |
| $\Omega$ | 90  | 61 |           | $\phi$   |   |
| $\mu$    | 120 | 26 |           | $\eta$   |   |

Pro linea  $\delta$  duc ex centro per grad. 15. & 10. min. in quadrante AD pomeridiano, ab A incipiendo, lineam occultam, ad hanc enim in puncto, vbi tropicum  $\alpha$  secat, ducatur contingens, quæ erit linea  $\delta$ . Iterum pro  $\Pi$  ad rectam è centro E, per 30. grad. & 34. min. ductam ducatur alia tangens tropicum  $\alpha$ , quæ erit linea  $\Pi$ . Pro linea  $\alpha$  ad rectam è centro E, per 60. grad. & 28. min. ductam contingens tropicum  $\alpha$  ducatur, quæ erit linea  $\alpha$ , & sic de reliquis facies. Si verò per hosce eosdem gradus in quadrante AC antemeridiano rectas ex centro E duxeris, &

in punctis, vbi tropicum  $\alpha$  secant, contingentes duxeris, dabunt illæ tibi lineas  $\chi$   $\rho$   $\phi$   $\eta$  quæ sitas. Pertinebuntque lineæ signorum infra horizontalem lineam ad planum superius; reliquæ vltra lineam horizontalem ad inferius planum spectabunt, in uersis tamen omnibus partibus, vt in horologio huius plani declaratum est.

Alius modus.


Aliter. Si per communia puncta intersectionis horizontis, & parallelorum Solis lineas rectas tropicum  $\alpha$  contingentes duxeris, erunt illæ lineæ signorum ascendentium, vt prius.

Ex quo vterius sequitur, ductis in plano æquinoctiali grandiore singulis parallelis graduum declinationis; dari & singulas signorum partes dictis gradibus correspondentes.

### Pragmatia II.

*Datis parallelis Solis cum linea horizontali in plano polari; dictas lineas inscribere.*

**D**vcantur primò in horologio polari arcus signorū Zodiaci cū horizonte CX; deinde inscribe lineas ascendentium signorum, vt sequitur. Applica regu-



lam AB cum scala, cuius tanta latitudo sit, quanta est longitudo styli in dicto plano.


|             |    |    |
|-------------|----|----|
| Ante merid. | G  | M  |
| $\gamma$    | 60 | 51 |
| $\Pi$       | 45 | 26 |
| $\alpha$    | 15 | 32 |
| Post merid. |    |    |
| $\Omega$    | 0  | 51 |
| $\mu$       | 45 | 26 |
| Ante merid. |    |    |
| $\rho$      | 90 | 0  |
| $\phi$      | 45 | 26 |
| $\eta$      | 0  | 51 |
| Post merid. |    |    |
| $\rho$      | 15 | 32 |
| $\mu$       | 45 | 26 |
| $\chi$      | 60 | 51 |

no. Deinde ex hac tabula ab F numera pro  $\delta$  60. grad. 51. min. & ibi in regula imprime punctum, quod erit ascendentis  $\delta$ ; pro  $\Pi$  numera ab F 45. grad. 26. min. & ibi fac punctum pro  $\Pi$ . Pro  $\alpha$  verò numerabis ab F 15. grad. 32. min. & ibi fac punctum cum signo  $\alpha$ , & sic de cæteris numeris in tabula ordine sequentibus operaberis: hanc enim regulam ita præparatam, si polari plano ita applices, vt meridiana EF meridiana DM respondeat, & puncta signorum in æquinoctiali polaris plani impressa dabunt puncta, in quæ umbra Sole in  $\gamma$  cõstituto projicitur. Iterum nota diligenter puncta, in quibus horizontalem secant arcus signorum in horologio ducti: per punctum enim in æquinoctiali inuẽtum, & per punctum commune intersectionis horizontis, & arcus signi correspondentis, rectæ ductæ dabunt lineas signorum. Ita punctum  $\delta$  in æquinoctialis antemeridiana parte LM horologii inuentum: rectaque coniunctum puncto, in quo horizontalis pars DC secat arcum  $\delta$ , dabit lineam ascendentis  $\delta$ . Ita punctum  $\Pi$  in æquinoctialis parte LM horologii antemeridiana coniunctum cum puncto  $\Pi$  in horizontalis parte DC, dabit lineam ascendentis  $\Pi$ , & punctum  $\alpha$  in æquinoctiali coniunctum puncto  $\alpha$  in horizontali DX dabit lineam  $\alpha$ . Punctum verò  $\Omega$  in æquinoctialis pomeridiana parte MN coniunctum punctum horizontalis partis DC dabit rectam ascendentis  $\Omega$ , & sic de cæteris. Lineas verò ascendentis  $\gamma$ , &  $\rho$  habebis, si rectas duxeris ad æquatorẽ parallelas per duo puncta, in quibus sese intefecat meridiana, & duo tropici  $\alpha$ , &  $\rho$  eorundemque tangentes, videlicet vertices hyperbolarum  $\alpha$ , &  $\rho$  oppositarum, vt vides. Australium verò puncta signorum, Sole in  $\rho$  constituto, inuenta coniunges cum punctis signorum in horizontalis parte DX inuentis, vbi loco borealium signorum intelliges signa australia, vt in figura patet. Ita linea  $\phi$  ducatur per punctum ei in MN æquinoctialis parte respondens, & per punctum vbi hyperbola  $\phi$  secat horizontalem lineam DX: non aliter in reliquis lineis describendis procedes. Multæ aliæ rationes occurrunt huiusmodi linearum describendarum: verum, quia illas in sequentia problemata reseruauimus, hinc parciore esse voluimus. Cùm itaque meridiana, & polaria plana eandem linearum designationem habeant; qui lineas hæc nouerit inscribere, alias consequenter inscribere non ignorabit. Punctatæ lineæ ortum signorum descendente Sole demonstrant.

### Pragmatia III.

*Ascendentium, & descendentium signorum lineas in plano verticali inscribere.*

**A**ccipe ex sequẽte tabula tangẽtes graduũ in partibus BC semidiametri æquatoris, quas in regula expansa tantæ latitudinis, quanta dicta semidiameter æquinoctialis est ex F vtrinque, in lineã EG, siue æquinoctialẽ à meridiana in antemeridianam, vel pomeridianam partem iuxta tabulæ ordinẽ trãsferes, habebisq. puncta ascendentium signorum, applicata regula in æquinoctiali, quæ sita. Quæ si, vt in præcedenti plano cum punctis in horizontali lineã, in quibus arcus signorũ sese intefecant, vt in exemplo vides, coniunxeris; habebis signa quoque ascendentia in plano verticali. Reliquos modos vide in sequenti Pragmatia, cui cunctam descri-




ptionem harum linearum referuauimus. Punctatæ lineæ ortum signorum ascendente Sole; non punctatæ ortum signorum descendente Sole, demonstrant.

**Pragmatia IV.**

*Lineas ascendentium, & descendendum in plano horizontali describere.*

**F**iat primò regula cum scala expansa, quæ habeat latitudinem tantam, quantum est semidiameter bC æquinoctialis in triangulo gnomonico pro plano hori-



zon-

zontali. In cuius parte c ed determinabis iuxta tabulam hîc appositam puncta.

| Tabula 1. pro punctis in æquinoctiali. |    |    | Tabula 2. pro punctis in tropicis. |   |    |    |       |
|----------------------------------------|----|----|------------------------------------|---|----|----|-------|
| ☉ in Y existente                       |    |    | ☉ in ♀ existente                   |   |    |    |       |
|                                        | A  | M  | Tang.                              | A | M  |    |       |
| ♈                                      | 60 | 51 | 17 93                              | ♋ | 60 | 28 | 17 65 |
| ♉                                      | 45 | 26 | 10 15                              | ♌ | 30 | 34 | 5 91  |
| ♊                                      | 15 | 32 | 2 78                               | ♍ | 15 | 10 | 2 71  |
|                                        | P  | M  |                                    |   |    |    |       |
| ♋                                      | 0  | 51 | 0 15                               | ♎ | 0  | 0  | 0 0   |
|                                        |    |    |                                    |   | P  | M  |       |
| ♌                                      | 45 | 26 | 10 15                              | ♏ | 15 | 10 | 2 71  |
|                                        |    |    |                                    | ♐ | 30 | 34 | 5 91  |
| ☉ in ♄ existente                       |    |    | ☉ in ♁ existente                   |   |    |    |       |
|                                        | 90 | 0  | infinita                           | ♉ | 60 | 28 | 17 65 |
|                                        | A  | M  |                                    |   | A  | M  |       |
| ♍                                      | 45 | 26 | 10 16                              | ♊ | 75 | 9  | 37 72 |
| ♎                                      | 0  | 51 | 0 15                               | ♋ | 30 | 34 | 5 91  |
| ♏                                      | 15 | 32 | 2 78                               |   | 0  | 0  | 0 0   |
|                                        |    |    |                                    |   | P  | M  |       |
| ♐                                      | 45 | 26 | 10 15                              | ♌ | 30 | 34 | 5 91  |
| ♑                                      | 60 | 51 | 17 93                              | ♍ | 75 | 9  | 37 72 |

graduum vniciuique signo correspondentia, vt in Pragmatia II. huius Problematis factum est, habebitque puncta ascendendum signorum pro æquinoctiali. Deinde in altera parte a d b regulæ determinabis puncta graduum æquinoctialis in tabella secunda protropicis ☉ & ♀, diligenter notando puncta. Dato igitur plano horizontali, in quo primò duo tropici ♀ & ☉ vnâ cum æquinoctiali ST, & meridiana a c e, sint delineati, ita inscribes lineas ascendentium signorum. Accipe regulæ latus c ed, in gradus suos distributum (quod fiet si ex centro d quadratis d e 90, rectas duxeris) illudque applica supra ST, ita vt e punctum regulæ puncto c æquatoris medio, & c d toti ST congruat. Quo facto imprime in æquinoctiali ST puncta iuxta numeros primæ tabellæ signorum ascendendum in vtraque parte meridiana, eruntque hæc puncta, in quæ Sol in Y, & ☉ constitutus vmbra gnomonis projiciet. Vt verò iam habeas puncta in æquinoctiali, Sole in tropicis constituto; accipe latus regulæ a d b pro

tropicis, in gradus suos diuisum (quod fiet si ex centro e quadrantis e d 90, rectas duxeris) idque applicato supra æquinoctialem, vt paulò ante factum est, notando in eo puncta, iuxta numeros in tabella secunda ascendendum signorum descriptos. Si igitur ex centro horologij A rectas occultas duxeris tropicum ♀ secantes, transibunt per duo quælibet puncta vnus signi lineæ rectæ ascendendum signorum. Verbi gratia inscripturus lineam ♈, habito iam puncto O in æquinoctiali, erit N alterum punctum in æquinoctiali post meridiem, per quod recta linea ex centro A ducta secabit tropicum ♀ in S. Per S igitur, & per O recta ducta dabit lineam ascendens ♈. Idem de reliquis statuendum.

Totum hoc negotium sine regula expedietur per solas tangentes in partibus latitudinis regulæ, siue semidiametri æquatoris c b. Accipe tangentes signorum ascendendum, gradibus earundem correspondentes, eosque ex loco C æquinoctialis in vtramque partem transferes, habebisque puncta pro æquinoctiali, Sole in æquinoctiali, scilicet in Y, & ☉ constituto. Si verò tangentes in secunda tabula contentos gradibus signorum ascendendum vtrinque in dictam æquinoctialem transtuleris, habebis puncta in æquinoctiali, Sole in ☉, vel ♀ constituto; per quæ horariæ lineæ ex centro horologij ductæ secabunt tropicum in punctis, quæ cum prioribus punctis vnus & eiusdem signi coniuncta dabunt ascendendum signorum lineas; notando diligenter, ne puncta vtriusque tabellæ in eadem æquinoctiali impressa confundas. Lineas Y, & ☉ habebis, si rectas ad æquinoctialem parallelas per vertices hyperbolarum sibi oppositarum ☉, & ♀ duxeris, vt figura demonstrat.

*Operatio per tangentes.*

strat. Rationem verò tabulæ computandæ ad quamvis elevationem poli, vide fol. 302. Punctatæ lineæ monstrant lineas, quibus Sol descendens signorum ortum ostendit; lineæ verò non punctatæ, ascendentiæ signa ostendunt Sole ascendente.

Corollarium I.

**C**um ita se habeant lineæ ascendentiæ signorum ad horas, quibus ascendunt, ex centro horologio ductas, ad tropicos, sicuti se habent horæ ab ortu, & occasu ad horas in meridie, & media nocte, duos circulos semper apparentium, & delitescentium maximos in 24. æquales partes secantes. Cumque horæ ab ortu, & occasu dictos maximos circulos semper apparentium, & delitescentium maximos ijs in punctis, in quibus ab horis à meridie, & media nocte secantur, contingant; fit, vt puncta contactus cum punctis in æquinoctiali coniuncta dent lineas horarum ab ortu, & occasu: ita dico lineas ascendentiæ signorum tropicos tangere. Si itaque ex centro horologii lineæ horariæ ducantur, per puncta graduum, quæ horis ascensionis signorum, Sole in ♀ verbi gratia constituto, competunt; secabunt illæ tropicum ♀ in punctis, per quæ vnâ cum punctis in æquinoctiali per primam tabulam inuentis contingentes ductæ dabunt lineas ascendentiæ signorum quæsitas. Alios modos vide apud alios; nos tantum eos hic posuimus, qui & nouitatem cum facilitate coniunctam habent, & ex quorum principijs maximè vniuersalibus alia innumera deduci possunt.


*Y signo compendium huius operationis.*

Corollarium II.

**H**inc patet, sub latitudine 23<sup>o</sup>. grad. horologium ad ortum, & occasum delineatum, coincidere cum lineis ascendentiæ signorum.

Alius modus.

**S**i in præsentè Pragmatica forsitan alicui displiceat, quòd tangentes ad hyperbolas non ita commodè duci possint; illi subiungemus hic aliam praxim, quæ per declinationum mediationum cœli puncta in meridiano, & declinationum mediationum cœli, & per eclipticæ puncta in circulo horæ sextæ inuenta, lineæ ductæ dent lineas quæsitas. Puncta verò mediationum per tabulas sequentes, ita reperies. Et primò quidem per analemma præcedenti figuræ Prag. IV. suprapositum, in quo sit horizon a b, axis mudi c d, æquator e f, verticalis g h; I K planum horizontale, horologii. Si itaque ab E puncto æquinoctialis computaueris versus g, si declinationes mediationum cœli fuerint boreales; versus a verò, si australes, & per fines numerationum, centrumque rectæ ducantur; secabunt eæ lineam IK in punctis, quæ ab m puncto analemmatis ex loco styli in horologio in lineam meridianam translata dabunt puncta mediationum quæsitæ. Sed hæc adhuc meliùs inuenientur per radiosum Zodiacum, vt sequitur. Applica triangulum gnomonicum AB, CD, ita



*Y. Operatio per analemma.*

vt in figura Pragmaticæ IV. semidiameter æquatoris bc radio æquatoris OB, in præsentè figura congruat, eritque a c e linea meridiana, ab stylus, ab axis, au linea horæ sextæ, ST æquator. Si itaque à B puncto æquatoris radiofi Zodiaci in vtranque partem suppetes declinationem mediationum cœli ex tabula prima versus C quidem, si mediationum signa fuerint borealia, versus D; si australia, secabunt lineæ ex O per fines supputationum ductæ in linea ac meridiana, siue 12. puncta, quæ ex a loco styli, vel d centro horologii in meridianam translata dabunt puncta mediationum, per quæ signum ascendens duci debet; vt verbi gratia per 22. grad. 32. min. à B versus C supputata, lineæ ex O per terminum ducta secabit lineam ac e meridianam in puncto, quod ex a centro horologii translatum dabit punctum in meridianam horologii; per quod linea g duci debet.

Vt verò habeas puncta eclipticæ in hora sexta, numera à puncto B versus C declinationes punctorum eclipticæ iuxta tabulam secundam. Quo præstito, si ex O radiofi Zodiaco per fines numerationum rectas duxeris, secabunt illæ LM lineam horæ sextæ in punctis, quæ ex a centro horologii in lineam horæ sextæ ante, vel post meridiem (prout tabula ostendit) translata dabunt puncta, quæ cum punctis mediationum ad vnum & idem signum spectantibus coniuncta rectis lineis, dabunt quæsitas lineas ascendentiæ signorum.

Tabula 1. declinationum mediationum cœli.


|       | Υ      | ♌      | ♈      | ♊      | ♉    | ♈     | ♇     | ♆     | ♅    | ♄      | ♃      | ♂      |
|-------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
|       | G M    | G M    | G M    | G M    | G M  | G M   | G M   | G M   | G M  | G M    | G M    | G M    |
| Decl. | 23 30  | 22 32  | 18 48  | 9 40   | 5 32 | 18 48 | 23 30 | 18 48 | 5 32 | 9 40   | 18 48  | 22 32  |
|       | Austr. | Austr. | Austr. | Austr. | Bor. | Bor.  | Bor.  | Bor.  | Bor. | Austr. | Austr. | Austr. |

Tabula 2. punctorum eclipticæ in circulo horæ sextæ.

|       | Υ   | ♌    | ♈    | ♊     | ♉     | ♈    | ♇   | ♆      | ♅      | ♄      | ♃      | ♂      |
|-------|-----|------|------|-------|-------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | G M | G M  | G M  | G M   | G M   | G M  | G M | G M    | G M    | G M    | G M    | G M    |
| Decl. | 0 0 | 7 23 | 15 8 | 21 48 | 22 58 | 15 8 | 0 0 | 15 8   | 22 58  | 21 48  | 15 8   | 7 23   |
|       |     | Bor. | Bor. | Bor.  | Bor.  | Bor. |     | Austr. | Austr. | Austr. | Austr. | Austr. |

Inuentis porò punctis mediationum per præcedentes regulas poteris nullo fete negotio lineas ascendentiæ describere: si nimirum ad tropicos tangentes duxeris, illa enim erunt lineæ quæsitæ. Quomodo verò hæc tabulæ ad singulas elevationes poli compurentur; supra docuimus fol. 303. Quoniam verò non omnes lineæ; quæ gnomonis vmbra tanguntur, ostendunt illa signa oriri tunc temporis; sciendum est ea duntaxat sex signa, quæ interdiu oriuntur, cuiusmodi semper sunt illa, quæ à loco Solis secundum signorum successionem numerantur, vmbra monstrari; vt si 22. Februarij Sole in principio ♀ existente, vmbra styli supra lineam m ceciderit, noli putare m tunc temporis oriri, cum is tunc temporis minimè supra horizontem sit. Si itaque vmbra in lineam g ceciderit, certò scies id tunc oriri cum id supra horizontem sit, & inter sex à Solis loco computata vnum sit. Omnia igitur signa à ♀; vsque ad ♄ inclusivè cum 22. Februarij supra horizontem sint, vmbra Solis indicabuntur, reliqua minimè: vnde horologium hoc ad confusionem vitandam in duo diuidi poterit; quorum vnum ostendet à ♄ ad ♀ in descendentiis; alterum à ♀ ad ♄ in ascendentiis sine exceptione semper lineas signorum, quæ tunc

*Nota circa usum horum Sciabhoricorum.*




tunc temporis oriuntur, quas hic subnectendas duxi. Veruntamen de his vide-  
filius tractatum in Gnomonica nostra physio-astrologica.

### Problema XVII.

*In plano horizontali Stellarum fixarum particulares ortus  
describere.*

**N**Ouum sanè inuentum, & à nemine, quod sciam, traditum, stellarum fixarum  
horaria describere, id est, quibus quolibet momento stellæ cuiuspiã fixæ, etiã  
non videatur, ortus per umbram Solis demonstretur. Nos igitur primò secretum  
aperiamus. Inuestigetur primò à Sole determinatè aliquæ stellæ fixæ intra tropicos  
constitutæ, dum oritur, distantie in horis; & has computa in quadrante circuli *e n*  
ab *e* versus *n*, si hora fuerit antemeridiana, & ab *e* versus *m* in pomeridiana; per  
finem enim numerationis recta per centrum ducta secabit æquinoctialem in pun-  
cto, in quam umbra Solis in *Y*, vel *æ* constituti incidit eodem tempore, quo stella  
aliqua supra horizontem emergit: alterum punctum vt habeas, numera horam, seu  
distantiam Solis à stella, dū oritur in quocunque signoq. hora, si antemeridiana fue-  
rit, ab *e* versus *n*, si pomeridiana verò, ab *e* versus *m* supputetur; si enim per finem  
supputationis, & centrum circuli rectam duxeris, secabit ea æquinoctialem in pun-  
cto, per quod ex a centro horologij recta ducta secat parallelum Solis, in quo Sol à  
stella distat secundum assumptam horam. Si igitur prius, & posterius punctum in-  
uen-

*Scintilla stellarum fixarum.*



uentum rectæ jungas, habebis lineam ortus stellæ quæsitam, in quam quâdo cun- que Solis radius incidet, monstrabit eodem tempore stellam horizontem subire, Hac industria omnium reliquarum stellarum ortus & occasus determinabis in particularibus horologijs. Notandum autem, vnam lineam sufficere pro ortu stellæ alicuius toto anno monstrando. Si igitur eidem spacio  $\alpha\lambda\iota\sigma\theta\rho\mu\phi$  aliarum stellarum lineas, ortus, & occasus inscripseris, & vnicuique horam addideris, veluti Caniculæ cordis Leonis, Aldebaran, Spicæ Virginis, monstrabit vmbra ortum eius, cuius no- men profert syderis eodem tẽpore. Vide quæ fusiùs in Gnomonica Physico-astro- logica de hisce tradimus.

**Problema XVIII.**

*Totum systema stellarum fixarum ita in plano describere, vt stellarum fixarum ortus, vmbra perpetuo monstretur.*

**Q**uamuis in omnibus planis huiusmodi stellarum projectio fieri possit; quia, tamen nullum planum commodius, ac naturali huiusmodi hemisphærio- rum astriferorum projectioni accommodatius est æquinoctiali, in eo illa exhibere præ alijs visum est. In vtroque igitur plano æquinoctiali delincentur stellarum fixarum hemisphæria cum omnibus stellarum figuris, vt hic factum vides. Delineatio autem ita instituetur. Rete horizontale Azymuthico-almucantanicum, quod supra Præexercitamento IV. construere docuimus, plano æquinoctiali ita accommodetur, vt centrum Retis referat polum mûdi, 90. verò Azymuthum referat lineam meridianam, siue diametrum æquinoctialis, & reliquæ lineæ ex centro ad circumferentiam ductæ, circulos meridianos, siue horarios; circuli verò concentrici ad æquatorem paralleli, circulos declinationum stellarum, habebisque Rete præparatum.

*Rete equinoctiale.*

In hoc Reti itaque iuxta tabulas latitudinis, & longitudinis, vel declinationum stellarum à Clauio, Grinbergero, alijsque editas, delincentur duo hemisphæria stellarum fixarum in superiori pro hemisphærio boreali, in inferiori pro australi. Vel si loco delineationis hemisphæriorum stellarum fixarum gnomonicè delineatarum accipiatur quælibet duo hemisphæria stellifera; habebit illa eundẽ vsum, quẽ illæ. Ita autem accommodabuntur plano æquinoctiali. Primo in asserẽ crassiusculo describatur circulus interuallo semidiametri vnus ex hemisphærijs, & fiat in plano circulus, cui concentricum alium describes maiorem, vt vides; quorum hic in 24. æquales partes diuidatur, ductisq; ex centro per diuisionum puncta lineis, dabunt illæ lineas horarum à meridie, & media nocte, vt apparet, eritque hic circulus semper immobilis. Hunc asserem iuxta minorem concentricum, ab vtraque parte ita excauabis, vt orbis hemisphæriorum commodè ei inserti, ad arbitrium vrentis circum gyri intra cauitatem possint; quemadmodum Retia, siue araneæ astrolabij inserti solent; & vt circa styllum (qui centro circuli normaliter erectus sit indeterminatè magnitudinis) dicti orbis in oppositis facibus, veluti circa axem in plano æquatoris pro libitu moueri possint: habebisque horologium stellis monstrandis aptum, vt sequitur.

*Vsus huius horologij.*

**S**ituato plano iuxta altitudinem æquatoris requisitam, & meridianam lineam horologij æquinoctialis: Si velis scire totius cœli situm, obserua vmbra styli horas in limbo monstrantem, cadat que v.g. vmbra styli in tertiam horam pomeri-  
 M m m dia-



dianam: ad totius cœli ſitum cognoscendum promoue gradum Solis: quem Sol eodem die occupat, ſub vmbra ſtyli, & habebis hemiſphærium ſituatum ad ſitum totius borealis hemiſphærij cognoscendum: ille enim ſtellę, quę ſub lineis horarijs continentur, eum in cœlo locum obtinent, quem circuli horarij in cœlo; ita ſtatim videbis, quę ſtellę in medio cœli, ſeu quę in linea horę ſextę, quę in alijs cœli plagis ſitę ſunt. Si verò eodem tempore ſitum ſtellarum in aſtrali hemiſphærio, in quod Sol nondum intrauit, ſcire cupias; applicabis hemiſphærium aſtrale ſupra eandem lineam horariam, ſupra quam in ſuperiori vmbra cadit: & habebis queſitum. Verùm vt hæc omnia melius dignoſcere poſſis, hic tres figuras poſuimus: quarum prima monſtrat aſtrographicam delineationem; ſecunda ortum ſtellarum per vniverſum orbem; tertia applicationem orbis ſupra axem mundi oſtendit. Secundę figurę vſus hic eſt, Applica Romanum meridianum ſupra ſignū ædũ aſcendens; & habebis ſigna aſcendentia reliquis locis correſpondentia.

Explicatio figurarum in ſequentiſimo.

## GEOGRAPHIA GNOMONICA.

### Problema XIX.

*Circulos aſcenſionum reſectarum, ſiue circulos meridianos in plano horizontali deſcribere.*

Circulos aſcenſionales, hoc loco vocamus eodem, quos circulos horarios, ſiue meridianos vocant, ex polis mundi ductos, arque æquatorem in 360. partes ſecantes: habentque hoc officium, vt vmbra inter illos cadens monſtret quot gradus Sol in æquatore confecerit; eſt autem proſectio horum circulorum eadem, prout ſolus, quę horarum à meridie, & media nocte. Si igitur regulam noſtram ſciathericam ſcala ſua expanſa applices ſupra æquatorem horologii horizontalis, cuius latitudo tanta ſit, quantum radius æquatoris trianguli gnomonici, & pũcta in eo iuxta regulam gradus vtrinque impreſſeris; dabunt lineę per puncta impreſſa in æquinoctiali ex centro horologii ductę lineas, ſiue circulos aſcenſionales queſitos. Pro verticali habebis dictos circulos, ſi ex centro horologii verticalis per puncta graduum in æquinoctiali impreſſa reſectas duxeris, quę ſunt lineę aſcenſionales. Debet autem regula eius eſſe latitudinis, quanta eſt ſemidiameter æquinoctialis in horologio gnomonico pro horologio verticali conſtructo. Eoſdem habebis in polari, ſi in applicata regula, quę latitudinem habeat altitudini ſtyli æqualem ſupra æquinoctialem polaris plani puncta graduum, iuxta ſcalam expanſam impreſſeris; hæc enim puncta, ad meridianam parallelę ductę dabunt lineas queſitas. Eadem methodus ſervabitur in iſtæ meridiano plano inſcribendis. Pro æquinoctiali denique plano circulus in 360. partes diuiſus (ſtylo indeterminatę quantitatis aſſumpto, & in centro normaliter erecto) petitioni ſatisfaciet.

Aſcenſionum reſectarum lineas in Verticali deſcribere.

In polari plano.

Pro æquinoctiali plano.




Pro-

### Problema XX.

*Mecographiam, ſeu longitudines locorum in horologio horizontali deſcribere; vt data qualibet hora, quota hora in toto orbe terrarum ſit, cognoscere poſſis.*

Deſcriptio longitudinum Ciuitatum non differt à præcedente, niſi poſitione dumtaxat primi meridiani Inſularum Canariarum, quam ita inuenies. Deſcribantur, vt prius, ope regulę lineę aſcenſionales, ſiue meridianę: deinde numerata à meridiana verſus occidentem horologii partem, diſtantiã primi meridiani à Romano, quę ſecundùm Ptolemæum 36. graduum, ſecundùm recentiorum verò accuratam obſervationem 30. graduum eſt. Secundùm Ptolemæi itaque obſervationem



nem numerata in regula ab O primo meridiano verſus meridianam lineam, quindenos & quindenos gradus, quibus ſingulis nomina locorum, longitudine per gradus denotata, diſtantiam appones, eritque Mecographia finita. Verùm figura reſent meliùs explicabit, quàm ego vel multis verbis explicare queam.

Vſus.

EX hac Mecographia dicto citiùs intelliges, quibus populis, quouis momento meridies ſit, & quota hora ſit in qualibet ciuitate alicui meridiano aſcripta. Si enim gnomonis vmbra incidit in 70. meridianum, cui adſcripta eſt ciuitas Babel, ſcies certò ibidem eſſe meridiem; & ſic de cæteris.

Quomodo mecographia reſectio in verticali perficienda ſit.

In verticali plano Mecographia eadem perficietur, ſi meridianos, ſiue aſcenſionales circulos priùs inſcriperis, & eadem nomina locorum cum iſdem gradibus poſueris; hoc obſeruando, vt ſemper primus meridianus ſit verſus partem occidentem

duam plani, in quam scilicet Sol umbram suam post meridiem projicit; reliqui deinde versus meridianum computentur.

Quomodo in planis polari & meridiano.

In polari plano circuli meridiani longitudinum erunt lineae parallelae, quibus eodem numero cum iisdem nominibus appones, ut in verticali, & horizontali.

Pragmatia I.

Mecographiam locorum in plano aequinoctiali describere, qua quoti hora sit in toto orbe terrarum, cognosci possit.

Quemadmodum nulli plano hora astronomica facilius inscribuntur, quam aequinoctiali, ita nullum quoque longitudinibus locorum aptius eo, commodiusque inueniri potest. Duplici igitur via horas, meridianosque longitudinum inscribemus: prima geographica; altera, positione nominum dumtaxat. Prior methodus ita se habet: Delineentur duo hemisphaeria cum omnibus suis meridianis, & parallelis, locorumque geographia, ut hic vides; quorum boreale superius, australe verò inferius stylo normaliter erecto, ita affiges, ut liberè veluti circa axem moueri possit, quemadmodum supra paulò ante cum hemisphaerij stellarum fixarum fecimus. Si itaque Soli horolabium prius situatum exposueris, meridianumque principalis loci, ad quem scilicet locorum longitudines supputatae sunt, ut hic Romanus est, umbræ styli subdideris, monstrabunt horarum lineæ, siue meridiani in geographica delineatione in limbo horario horas, in vrbus sub iisdem meridianis contentis, quæ sitas. In hoc præsentè iconismo prima figura ostendit delineationem geographicam, in vno tantum, videlicet boreali hemisphaerio, yna epim horarum circulo margini inscripto, qui & aequinoctialem refert. Secunda figura refert modum applicandi dicta hemisphaeria supra axem ope quadrantis, ut monstrandis horis aptæ esse possint, & superius quidem hemisphaerium monstrabit Sole in Borea, alterum in Austro constituto. Tertia figura, ostendit modum alium, quem in sequenti Pragmatia explicamus.

Pragmatia II.

Alia praxi idem perficere.




Rosa Geographica.

Qui verò simplici nominum positione contentus est, is accipiat hanc rosam nostram geographicam, qualem hic, secunda figura exhibet; eamque duplicatam pro inferiori, & superiori plano, in circulo horario exciso insertam, ita stylo normaliter erecto affigat, ut circa eum veluti axem liberè volui possit. Lucente itaque Sole, situatoque horologio, applica meridianum Romanum sub umbræ styli; & limbus horarius quota hora sit in omnibus locis, quibus horæ respondent, monstrabit.

Problema XXI.

Spacium  $\mu\lambda\delta\epsilon\rho\mu\omicron\nu$ , siue zonam torridam in quolibet plano dato gnomonica projectione delineare.

Finis huius projectionis est videre, cui loco sub zona torrida Sol verticalis sit, cui quoque loco meridianus. Ita autem primò in plano horizontali negotium insti-



institues. Primum iuxta cap. 2. 3. 4. 5. 6. horographiæ variæ delineetur horologium astronomicum, iuxta praxes ibidem traditas, vel singulas lineas circuloꝝ ascensionaliũ iuxta Problema præcedens, vnâ cum singulis arcibus declinationum Solis iuxta Problema sequens huius, qui vniuersim 47. erunt, seruientque lineæ horariæ pro meridianis circulis, & arcus declinationis pro circulis latitudinum. Si itaque per mappam accuratam inter tropicos ope longitudinum, & latitudinum vrbium in dicta mappa contentarum spacio  $\eta\lambda\iota\omicron\delta\rho\omicron\mu\omega$ , siue gnomonico Solaris limitis spacio geographicè inserueris, habebis quæsitum.

In polari cum lineæ horariæ sint parallelæ, erit zona torrida eidem inserta, mappa parallelæ; circuli verò latitudinum, erunt arcs declinationum Solis. Idem dicendum de meridiano plano, quibus vnâ & eadem mappa applicata seruiet in toto orbe.

*Quomodo idem in polari meridiano declinationibus delineatur.*


In inclinantibus, & declinantibus planis leges procedendi in præcedentibus traditæ seruariuntur. Spacium igitur  $\eta\lambda\iota\omicron\delta\rho\omicron\mu\omega$  declarauimus, quod erat faciendum.

**Problema XXII.**

*Parallelos arcuum diurnorum in quolibet plano dato delineare.*

**Pragmatia I.**

**D**Uc in charta quapiam separata duos conos radiosos arcuum diurnorum, iuxta regulas Præexercitamento II. huius traditas, sintque BSHT in B communi vertice coniuncti.



2. Intra vtrunque conum applica triangulum gnomonicum ABC pro horizontali, & verticali, vt figura ostendit.


2. Ex puncto S describatur semicirculus GFI intervallo SC in 12. partes æquales diuisus; cuius singula duo puncta ab F equè remota rectis coniunges, quæ lineam SF in punctis secabunt. quæ ex S versus C translata in linea SC assignabunt puncta horarum à meridie, & media nocte; vt figura adscriptis horarum numeris apertè docet; habebisque instrumentum pro arcibus diurnis in horologio horizontali, & verticali inscribendis præparatum. Pro polaribus verò, & meridianis ita operare. In horologio polari, cuius styli quantitas sit DB, puncto assumpto in linea sexta tantum ab æquinoctiali distante, quanta ducti gnomonis DB longitudo est. Ex hoc puncto transferantur secantes distantie horarum à meridie; hoc est, secantes 15. 30. 45. 60. 75. graduum ex B vertice coni radiosi in lineam BH. Si enim per puncta translata, ad lineam BH normales duxeris, siue quod idem est, parallelas ad lineam ABA; secabunt hæ omnes diurnorum arcuum radios. Quæ deinde ex æquinoctiali linea polaris aut meridiani horolabij, in horas correspondentes translati dabunt puncta, per quæ hyperbolæ arcuum diurnorum duci debent, vt in sequentibus patebit.

Quomodo instrumentum polaribus, & meridianis aptandum.

Vsus Organi.

Huius igitur organi ope dicto citius omnium arcuum parallelas in plano horizontali sine vlla confusione linearum in plano horologii horizontalis describes.

Ex punctis A & B duo fila educantur, quorum illud, quod ex B ducitur in lim-



bo SHT lineis arcuum diurnorum, alterum ex A in linea SC linearum horarium

rum radios referet. Sit igitur primò in plano assumpto describendus arcus diurnus 13. horarum (arcus enim horarum 12. est ipse æquinoctialis in horologio.) Filum B applica supra punctum 13. in limbo SH, ibique id firmabis. Deinde filum ex A duces per C punctum 12. in linea SC. Vbi enim duo fila sese interfecabunt, ibi erit punctum arcus diurni horarum 13. quod ex A in lineam meridianam ex centro horologii translatum, ibi dabit punctum, per quod arcus diurni 13. horarum transibit. Deinde posito filo A in puncto horæ 1. & 11. lineæ SC, duorumque filorum, intersectionem notabis: interuallum enim inter hoc punctum intersectionis, & A in lineam horæ 1. & 11. è centro horologii translatum, dabit puncta arcus diurni in dictis horis quæsitæ.

Arcus diurnos horarum filorū quo describere.

Item applica filum A supra punctum 2. & 10. horæ in linea SC, & spacium inter A, & commune intersectionis punctum filorum ex centro horologii in horam 2. & 10. translatum dabit puncta quæsitæ. Non secus puncta arcus diurni 13. horarum in consequentibus horis, per duorum scilicet filorum, (quorum vnum semper quiescit supra limbum SH, alterum per horarum puncta mouetur in SC) intersectionem inuestigabis.

Iterum sit describendus arcus diurnus horarum 14. promotum filum ex B supra numerum 14. in limbo SH ibidem firmabis; alterum autem filum A per singula puncta horaria in linea SC promotæ dabunt cum altero filo B spacia, quæ ex centro horologii in correspondentes lineas horarias translata præparabunt puncta, per quæ arcus diurnus 14. horarum transibit, cuius maximus in horis ab ortu, & occasu describendis vsus est. Si verò filum B posueris supra 18. grad. in limbo HS firmatum; alterum filum A per puncta horaria in SC motum dabit spacia inter A, & punctum intersectionis filorum, quæ ex centro horologii translata in lineas horarias correspondentes dabunt puncta, per quæ transibit arcus diurnus 18. horarum, qui etsi non cadat intra, sed extra tropicos, est tamen maximus eius vsus in horis inæqualibus describendis, vt in descriptione huiusmodi horarum partim dictum est, partim in sequentibus dicitur.

Arcus diurnus 18. horarum quomodo describatur.

Vbi nota, quod quando cunque duo fila sese interfecant, tunc arcus intersectionum punctis descriptos fore hyperbolas; & vbi duo fila alicubi fuerint parallela, descriptum iri parabolas, quod tunc in horologio contingit, quando filum B ponitur supra T punctum in limbo SHT, & alterum filum A supra 12. in linea SC. Cum enim hoc situ fila sint parallela, describetur parabola iuxta præces, & methodos in Progymnasmatibus traditas: quarum omnium rationes in Protheorijis vide. Cum verò fila non se secuerint, scias ellipses describendas esse.

Vides igitur Lector modum non minus iucundum, quàm cum primis ingenio, ad cuius normam arcus signorum, & mensium, dierumque, non minori facilitate, quam arcus diurnos predictos inscribes; si videlicet filum B supra datum declinationis signi gradum in limbo SHT posueris, & reliquum filum A supra horaria puncta in SC moueris; dabunt enim spacia inter punctum intersectionis, & A in horologio ex centro in lineas horarum correspondentes translata, arcum signi, mensis, & diei quæsitæ.

Pragmatia II.

Pro Plano Verticali.

Si itaque arcus diurnos in verticali horologio delineare desideres, affixis duobus filis in A, & B trianguli gnomonici pro verticali horolabio assumpti: ita vt B semper in limbo SHT supra dati arcus gradum, alterum supra horaria spacia

moucantur, dabunt ſpacia inter puncta interfectionis ſilorum, & A in lineas horarias ex centro horologij translata arcus diurnos deſideratos. Praxis in nullo à priori differt, niſi tantum in applicatione trianguli gnomonici, vt vides.

### Pragmatia III.

*Arcuum diurnorum parallelos in plano polari, & meridiano vnico ſili ductu deſcribere.*

**T**ranslatis in radium BH ſecantibus diſtantiarum horariarum in partibus ſtyli in 10. partes diuiſi, & ad puncta normalibus inter ſe parallelis deſcriptis, vt paulò ante in Pragmatia I. docuimus, ita operationem ordire. Si ſilum in B firmatum ſupra arcum, verbi gratia diurnum 13. horarum direxeris, ſecabit id parallelas, ſcilicet horarias lineas in ſpacia, quæ intercepta, & in lineas horarias correſpondentes ex æquatore horologij trãſlata, dabunt puncta, per quæ tranſibit arcus diurnus 13. horarum. Hac arte ſpacium B 12. in cono radioſo transferes ex loco gnomonis in horologio polari vtrinq; 13. in meridianam. Item, ſpacium inter lineam horæ 3. & B, in radio B 13. interceptum, atque ex puncto, vbi æquinoctialem horologij ſecat, linea horæ 3. in lineam horæ 3. translatum, in ea dabit punctum, per quod tranſibit quæſitus arcus. Non ſecus de alijs arcibus inſcribendis procedes.

Cum verò meridiana plana eandem ſignorum, & horarum proiectionem habeant, in ijs eadem quoque ratione arcus diurnos inſcribes. Quare de ijs nihil amplius dicendum reſtat.

### Pragmatia IV.

*In horologio æquinoctiali diurnorum arcuum parallelos deſcribere.*

**C**vm paralleli æquatoris in plano æquinoctiali ſint omnes circuli, ita nullo penè negotio arcus diurnos in eo delineabis. Determinetur in cono radioſo linea BO æqualis BD ſtylo horologij, & ad O normalis ducatur OR, parallela BH. Si itaque ſilum in B firmatum ponatur ſupra numerum arcus diurni 13. horarum, reſecabit id in linea OR, ſpacium, ad cuius interuallum ex centro horologij in plano æquinoctiali circulus ductus dabit arcum 13. horarum. Si verò ſila promoueris ſupra 14. horarum arcum, reſecabitur in linea OR ſpacium, ad quod ex centro dicto alius circulus ductus dabit arcum diurnum horarum 14. Sic promotum ſilo ſupra 15. reſecabit id in linea OR interuallum; ad quod ex cẽtro circulus ductus dabit 15. horarum arcum. Ita 18. horarum arcum habebis, ſi poſito ſilo ſupra numerum 18. ad interceptum in linea OR ſpacium ex centro horologij circulum duxeris. Ita quoque vltimum 24. horarum arcum habebis, ſi poſito ſilo ſupra 24. intercepto in linea OR ſpacio ex centro circulum duxeris. Vides igitur quanta facilitate ſimul & iucunditate dicti arcus in plano quolibet deſcribantur.

In planis declinantibus, & inclinãntibus eadem regulæ ſeruandæ ſunt, quæ in deſcriptione parallelorum Solis. Quare nihil de ijs reſtat dicendum.


Pro-

### Problema XXIII.

*Climata totius orbis gnomonicè deſcribere.*

**C**lima nihil aliud eſt, quam zona æquatori parallela duobus circulis æquatori parallelis terminata, totam terram cingens; cuius latitudo tanta eſt, vt à termino iſtius auctrali ad borealem, dies maxima ex creuerit per ſemihoram. Cum autem dictum ſit vnum parallelum ab altero ſequenti diſſerre per horæ quadrantem, ſequitur clima tribus parallelis conſtare; duobus terminantibus, & vno per medium climatis incedente; non quod illud bifariam ſecet (ſunt enim verſus Boream, & Auſtrum ſemper climata anguſtiora) ſed ob æqualitatem differentiæ temporis. Verùm, vt paucis multa complectar, vide Tabulam Climatorum ſequentem; ex qua, veluti ſynopſi quadam, dicta innotefcent.

In horologio itaque gnomonicè repræſentaturus climata, deſcribes parallelis climatum hoc artificio vniuerſali nouo, & à nemine, quod ſciam, adhuc tradito.



Deſcribatur ſeorſim in charta ex A, arcus BDC, quæ vtrinq; in 66½. gradus diuides; referentq; CD latitudinem 12. climatũ in Auſtrum: DB verò latitudinem 12. climatũ in Boream: AD verò radium æquatoris ager. Deinde transferes eadem puncta horaria in lineam CL, vt in citata paulò ante Pragmatia factum eſt. Hoc facto, poſito ſilo A ſupra latitudinem primi climatis per Meroen, in limbo BD, alterum autem ſilum ex b ſupra puncta horaria, & ſpacia inter puncta interfectionis ſilorum, & b translata in lineas horarias ex centro horologij horizontalis correſpondentes, dabunt puncta, per quæ arcus ductus dabit parallelum primum. Iterum

N n n pro-

promoto filo A ſupra latitudinem ſecundi climatis per Syenem, videlicet ſupra latitudinem eius in circulo BD, & filo ex b ſupra puncta horaria CI extenſo, interual-  
la enim inter b, & puncta interfectionum filorum ex centro A horologij in lineas  
correspondentes horarum translata, dabunt puncta, per quæ tranſibunt arcus cli-  
matis ſecundi: & ſic iuxta datas climatum latitudines in tabula propoſitas proce-  
des, cum filiſ, donec omnes climatum arcus inſcriperis: cadet enim maior pars  
extra tropicos, notando interim hyperbolas, parabolas, & ellipſes; ſi enim fila fue-  
rint parallela, deſcribenda erit loco hyperbolæ parabola, & 66½. erit ellipſis, & ſic  
de cæteris. Quod autem climata extra tropicos poſuerimus, idèd factum eſt, quòd  
eorum arcuum ope multa circa horarum diuerſarum conſtructiones expediri poſ-  
ſint, vti partim dictum eſt, partim dicetur in ſequentibus.

*Climatum in  
plano verticali,  
polari, meridia-  
no, æquinoctia-  
li deſcriptio.*

In verticali inſcribes dicta climata ſola mutatione trianguli gnomonici, vt in  
præcedenti factum eſt. In polari climata deſcribes, ſi ſpacia horaria figura Pragmat-  
tiæ præcedentis in radium æquatoris translata per puncta terminantia parallelas  
ad IC duxeris; ſilum enim ex A ſupra gradus climatum in limbo BD applicatum  
fecabit in parallelis ſpacia, quæ in horologij lineas translata dabunt puncta arcuum  
climatum. Eadem deſcribendi ratio ſeruabitur in meridiano horologio. In æqui-  
noctiali plano Rete Præexercitamento IV. conſtructum dabit quæſtum.

Nota hoc loco, tantam eſſe diuerſitatem opinionum, circa climatum poſitionem;  
vt vix ſit ex Geographis, qui cum altero conſentiat. Nos Climatographiam ſciat-  
hericam hoc loco ordinauimus, ſecundum Tabulam ex Iunctino depromptam.  
Si quis verò Ptolemaica deſcriptione vti malit, faciat quod libuerit. Tabulam eius  
hic ſubiungimus.

Tabula Climatum ſecundum Ptolemaum.

|                     | 1               | 2               | 3                   | 4               | 5              | 6               | 7                    | 8               |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Media clima-<br>ta. | Per Me-<br>roen | Per Sye-<br>nem | Per Ale-<br>xadriam | Per Rho-<br>dum | Per Ro-<br>mam | Per Pon-<br>tum | Per oſtia<br>Boryſt. | Per Ta-<br>nain |
|                     | G M             | G M             | G M                 | G M             | G M            | G M             | G M                  | G M             |
| Eleuatio poli.      | 16 30           | 23 54           | 30 20               | 36 8            | 42 50          | 45 0            | 48 30                | 52 0            |
| Paralleli.          | 4               | 6               | 8                   | 10              | 12             | 14              | 16                   | 17½             |
| Dies maxima.        | 13              | 13½             | 14                  | 14½             | 15             | 15½             | 16                   | 16½             |

Nota figuram præcedentem vniuerſalem eſſe. Si enim illa vti velis pro loco 50.  
grad. latitud. linea parallela tranſuerſa iungens 50. grad. in ſcala laterali, & ſimul  
ſecans lineas perpendiculariter deſcendentes, in communi interfectione puncta  
dabit, per quæ ſilum ex b, cum filo ex A, per climatum gradus ductum, dabit ſpa-  
cia climatica pro horologio quæſita. Non ſecus de alijs ſtatuumdum eſt.



Tabula


Tabula Climatum ſecundum Iunctinum, & Neotericos.

| Climata.   | Ordo<br>parall. | Maxima<br>dies. | Altitud.<br>poli.      | Loca per quæ tranſeant paralleli. |
|------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| AMPHISCII  | 1               | 12 0            | 0 0                    | Per Africam.                      |
|            | 2               | 12 15           | 4 15                   | Per Taprabanem.                   |
|            | 3               | 12 30           | 8 25                   | Per Sinum Aualicum.               |
|            | 4               | 12 45           | 12 30                  | Per Meroen Inſulam.               |
|            | 5               | 13 0            | 16 27                  | Per Barnagaſſum.                  |
|            | 6               | 13 15           | 20 14                  | Per Adenum.                       |
|            | 7               | 13 30           | 23 51                  | Per Syenem ſub 60.                |
|            | 8               | 13 4            | 27 40                  | Per Mècham.                       |
|            | 9               | 14 0            | 31 22                  | Per Alexandriam.                  |
|            | 10              | 14 15           | 33 18                  | Per Palæſtinam.                   |
|            | 11              | 14 30           | 36 0                   | Per Rhodum.                       |
|            | 12              | 14 45           | 38 35                  | Per Smyrnam.                      |
| HETEROSCII | 13              | 15 0            | 40 56                  | Per Helleſpontum.                 |
|            | 14              | 15 15           | 43 5                   | Per Marſiliam.                    |
|            | 15              | 15 30           | 45 1                   | Per Venetias.                     |
|            | 16              | 15 45           | 46 51                  | Per Heluetiam.                    |
|            | 17              | 16 0            | 48 31                  | Per Oſtia Boryſtenis.             |
|            | 18              | 16 15           | 50 0                   | Per Motidem paludem.              |
|            | 19              | 16 30           | 51 35                  | Per Coloniam Agrippinam.          |
|            | 20              | 16 45           | 52 50                  | Per Mare Balticum.                |
|            | 21              | 17 0            | 54 1                   | Per Oſtia Tanais.                 |
|            | 22              | 17 15           | 55 0                   | Per Bullæum Angliæ.               |
|            | 23              | 17 30           | 56 0                   | Per Eboracum Angliæ.              |
|            | 24              | 17 45           | 57 0                   | Per Camaldunum Angliæ.            |
|            | 25              | 18 0            | 58 0                   | Per Hyberniam.                    |
|            | 26              | 18 35           | 59 0                   | Per Edenburgum Scotia.            |
|            | 27              | 19 0            | 61 0                   | Per Hebridæ Inſulas.              |
|            | 28              | 19 35           | 62 0                   | Per Vltima Hyberniæ.              |
|            | 29              | 20 0            | 63 0                   | Per Orcadas.                      |
| 30         | 21 0            | 64 0            | Per Scythiam.          |                                   |
| 31         | 22 0            | 65 0            | Per Finlandiam.        |                                   |
| 32         | 23 0            | 66 0            | Per Bergam Norvvegiæ.  |                                   |
| 33         | 24 0            | 67 0            | Per Islandiam.         |                                   |
| 34         | Méf. 1          | 69 0            | Per Nördhuys caſtrum.  |                                   |
| 35         | Méf. 2          | 73 0            | Per Fretum Weygats.    |                                   |
| 36         | Méf. 3          | 78 0            | Per Nouam Zemblam.     |                                   |
| 37         | Méf. 4          | 82 0            | Per Nouam Zemblam.     |                                   |
| 38         | Méf. 5          | 87 0            | Per Gronlandiam.       |                                   |
| 39         | Méf. 6          | 90 0            | Per Terram Suppolarem. |                                   |

## Problema XXIV.

*Singulos declinationis Solaris parallelos describere in horologio horizontali.*

**D** Veta linea AD, arcum describito BC, quem à D incipiendo vtriusque diuides in 23. gradus  $\frac{1}{2}$  eruntque BC puncta termini Solares. Si itaque huius trianguli ope singulos declinationis Solaris parallelos in plano horizontali describere



desideres, accipe triangulum gnomonicum pro horizontali, idque applices ita, vt semidiameter æquatoris AE radio æquatoris AD perfectè congruat. Si itaque horaria puncta, quemadmodum in præcedentibus fieri præcepimus, in CE transferantur, erit organum declinationum Solarium, siue describendorum parallelorum, præparatum.

Delineato igitur horologio astronomico in plano quopiam horizontali, in eo hac arte declinationes Solis describes. Fixis filiis in punctis BA organi, vnum eorum supra primum solaris declinationis gradum, si horologium magnum fuerit, firmabis; altero supra singula horaria puncta lineæ CE applicato; diligenter notando, vbi filum B, filum A fecer. Si enim spacia inter puncta intersectionis, & A median- tia in lineas horarias correspondentes ex centro horologij trãstuleris, transibit per dicta puncta parallelus primus declinationis Solaris. Item applicato filo A supra secundum gradum limbi BD, altero supra singula puncta horaria applicato, transferantur spacia inter B & filum A facta in horologij lineas correspondentes, habebis- que puncta secundi paralleli Solaris. Non secus in consequentium parallelorum descriptione procedes, habebisque quæsitum.

Pro

## Pro Plano Polari.

**D** Elineato horologio in plano polari, transfer in lineam AD radii æquatoris præcedentis organi ex A, secantes horariorum distantiarum à meridie in partibus sinus totius, & per puncta trahantur parallela; dabitque filum A ad singulos declinationis gradus in limbo BDC applicatum in lineis parallelis horarijs segmenta, quæ in lineis horologij correspondentes translata monstrabunt puncta transitus singulorum parallelorum declinationis Solaris. Idem dicendum de meridianis planis. In verticali inscribes dictos parallelos sola trianguli gnomonici inuersione, vt in præcedentibus quoque traditum est.

## Confectarium I.

*Lineas temporis ortus, & occasus Solis, in horologio determinare.*

**V** Nicuique parallelorum declinationum Solarium in separato spacio limbi horologij addes suum tempus ortus, & occasus Solis (quod dabunt arcus femidiurni) monstrabitque gnomonis ymbra in eos parallelos incidens, tempus ortus, & occasus quæsitum.

Ortus Solis, &amp; occasus.

## Confectarium II.

*Crepusculi tempus determinare intra lineas horologij.*

**V** Ide in tabula crepusculorum, quantum quolibet declinationis parallelo crepusculum sit, & huic in separato spacio adscribes numeros durationis crepusculorum per totum annum, & ymbra monstrabit quæsitum.

Crepuscula.

## Confectarium III.

*Amplitudinem ortiuam, & occiduam determinare.*

**V** Ide ex tabula amplitudinum ortiuarum, quantum quilibet declinationis parallelus à puncto æquinoctialis ortiuo declinet, & huic declinationi numerus adscriptus dabit amplitudinem ortiuam istius dici, in quam ymbra gnomonis incurere deprehenditur.

Amplitudo ortiuæ &amp; occidua.

## Confectarium IV.

*Ascensiones rectas, obliquas, &c. cum differentijs ascensionalibus in horologio determinare.*

**S** I ex tabulis supra positis singulis parallelis declinationis in tabula correspondentes ascensiones rectas, obliquas, &c. adscripseris, habebis quæsitum. Sed hæc omnia in figuris clariùs patent, quàm vel dici mereantur. Figuram horum omnium vide in Gnomonica Physico-astrologica.

Ascensiones rectæ, &amp; obliquæ.

Atque

Atque hæc sunt, quæ de primi Mobilis doctrina in quouis dato plano sciathericè representâda breuiter dicere volumus. Habes hæc hic Astrolabiographiam nouam, qua quæcunque alij in vulgatis astrolabijs, ea hic in sciathericè delineatis in dato quolibet plano reperias; vt proinde non mirere, si hoc pentasticho librum claudam.

*In cælum vt scandas, supponas Pelion Ossia  
 Non opus; id præstas commodiore via.  
 Umbra vias monstrat, qua mundi ad mœnia latus  
 Aethereas possis hac penetrare domus.  
 Nam, qua vel veteres, vel qua docuere recentes  
 Astronomi, trutina hæc dexteriore probat.  
 Quo sint astra loco, queis motibus orbe ferantur  
 In Terris, umbra hæc digērit, atque mouet.  
 Ergo si umbra nihil, nihilo mysteria discas  
 Maxima, grande, homines quod docet umbra, NIHIL.*

