TABLA XIIa

DISPAREUNIA Y APETENCIA SEXUAL.

DISPAREUNIA	APETENCIA SEXUAL						TOTAL
	SI		ESCASA		NO		
	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	8	20	12	30	20	50	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	16	26'67	14	23'33	30	50	60
TOTAL	24	24	26	26	50	50	100

$X_i^2 = 0'8547$

N.S.

TABLA XIII

DISPAREUNIA Y ORGASMO.

DISPAREUNIA	ORGASMO				TOTAL
	SI		NO		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	17	47'22	19	52'72	36
HALLAZGO ANAMNESICO	14	21'28	50	78'13	64
TOTAL	31	31	69	69	100

$\chi^2_i = 6'9204$

$p < 0'005$

TABLA XIIIa

DISPAREUNIA Y ORGASMO.

DISPAREUNIA	ORGASMO				TOTAL
	SI		NO		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	23	57'5	17	42'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	46	76'67	14	23'33	60
TOTAL	69	69	31	31	100

$\chi^2_i = 4'1218$

$p < 0'025$

TABLA XIV

DISPAREUNIA Y SATISFACCION SEXUAL

DISPAREUNIA	SATISFACCION SEXUAL				TOTAL
	SI		NO		
	N	%	N	%	
MOTIVO CONSULTA	16	44'44	20	55'56	36
HALLAZGO ANAMNESICO	25	39'06	39	60'94	64
TOTAL	41	41	59	59	100

$X_i^2 = 0'\ 2758$

N.S.

TABLA XIVa

DISPAREUNIA Y SATISFACCION SEXUAL

DISPAREUNIA	SATISFACCION SEXUAL				TOTAL
	SI		NO		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	13	32'5	27	67'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	28	46'67	32	53'33	60
TOTAL	41	41	59	59	100

$X_i^2 = 1'9911$

N.S.

TABLA XV

DISPAREUNIA: RELACION CON EL MOMENTO DEL COITO.

DISPAREUNIA	MOMENTO DEL COITO								TOTAL
	DE ENTRADA		CONCOMITANTE		POSTERICR		COMBINACIONES		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	14	38'88	11	30'85	1	2'17	10	27'67	36
HALLAZGO ANAMNESICO	13	20'31	33	51'56	9	14'06	9	14'06	64
TOTAL	27	27	44	44	10	10	19	29'64	100

$x_i^2 = 10'4711$

$p < 0'025$

TABLA XVa

DISPAREUNIA: RELACION CON EL MOMENTO DEL COITO.

DISPAREUNIA	MOMENTO DEL COITO								TOTAL
	DE ENTRADA		CONCOMITANTE		POSTERIOR		COMBINACIONES		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	12	30	12	30	4	10	12	30	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	15	25	32	53'33	6	10	7	11'66	60
TOTAL	27	27	44	44	10	10	19	19	100

$x_i^2 = 7'4364$

$p < 0'05$

TABLA XVI

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: SINTOMAS MENSTRUALES.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-4		ELEVADA = ó > 5		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	20	57'14	15	42'85	35
HALLAZGO ANAMNESICO	40	63'49	23	36'50	63
TOTAL	60	61'28	38	37'77	98

$X_i^2 = 0'3820$

N.S.

$t_{exp} = 0'0466$

N.S.

TABLA XVIa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: SINTOMAS MENSTRUALES.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-4		ELEVADA = ó > 5		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	24	60	16	40	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	36	62'06	22	37'93	58
TOTAL	60	61'22	38	38'77	98

$x_i^2 = 0'042$

N.S.

$t_{exp} = 0'2568$

N.S.

TABLA XVII

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: PELVIALGIA

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-2		ELEVADA = ó > 3		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	7	20	28	80	35
HALLAZGO ANAMNESICO	8	12'69	55	87'35	63
TOTAL	15	15'30	83	87'35	98

$X_i^2 = 0'9253$

N.S.

$t_{exp} = 2'962663$

$p < 0'0025$

TABLA XVIIa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: PELVIALGIA

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-2		ELEVADA = ó > 3		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	5	12'50	35	87'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	10	17'24	48	82'75	58
TOTAL	15	15'30	83	84'89	98

$x_i^2 = 0'4103$

N.S.

$t_{exp} = 0'6575$

N.S.

TABLA XVIII

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: RECHAZO DE EMBARAZO.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-3		ELEVADA = ó > 4		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	18	51'42	17	48'57	35
HALLAZGO ANAMNESICO	17	26'98	46	73'01	63
TOTAL	35	35'71	63	64'24	98

$X_i^2 = 5'8558$

$p < 0'0125$

$t_{exp} = 1'4570$

N.S.

TABLA XVIIIa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: RECHAZO DE EMBARAZO.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-3		ELEVADA = ó > 4		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	21	52'5	19	41'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	14	24'13	44	75'86	58
TOTAL	35	35'71	63	64'28	98

$\chi^2_i = 7'1838$
$p < 0'005$

$t_{exp} = 2'3140$
$p < 0'0125$

TABLA XIX

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: RECHAZO SEXUALIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-2		ELEVADA = ó > 3		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	7	20	28	80	35
HALLAZGO ANAMNESICO	12	19'04	51	80'95	63
TOTAL	19	19'38	79	80'61	98

$X_i^2 = 0'0130$
N.S.

$t_{exp} = 0'5092$
N.S.

TABLA XIXa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: RECHAZO SEXUALIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-2		ELEVADA = ó > 3		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	9	22'5	31	77'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	10	17'24	48	82'75	58
TOTAL	19	19'32	79	80'67	98

$X_i^2 = 0'7974$

N.S.

$t_{exp} = 0'3720$

N.S.

TABLA XX

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: RECHAZO DE LA FEMINIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-2		ELEVADA = ó > 3		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	29	82'86	6	17'14	35
HALLAZGO ANAMNESICO	52	82'54	11	17'46	63
TOTAL	81	82'65	17	17'34	98

$X_i^2 = 0'0015$
N.S.

$t_{exp} = 1'1021$
N.S.

TABLA XXa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: RECHAZO DE LA FEMINIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-2		ELEVADA = ó > 3		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	36	90	4	10	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	45	77'58	13	22'41	58
TOTAL	81	82'65	17	17'34	98

$X_i^2 = 2'5434$

N.S.

$t_{exp} = 2'0464$

$p < 0'025$

TABLA XXI

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: INDICE DE INESTABILIDAD ENDOCRINO-VEGETATIVA (CURTIUS-KRUGER)

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-6		ELEVADA = ó > 7		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	12	34'28	23	65'71	35
HALLAZGO ANAMNESICO	25	39'68	38	60'31	63
TOTAL	37	37'75	61	62'24	98

$X_i^2 = 0'2788$

N.S.

$t_{exp} = 1'3879$

N.S.

TABLA XXIa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: INDICE DE INESTABILIDAD ENDOCRINO-VEGETATIVA (CURTIUS -KRUGER)

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-6		ELEVADA 1 ó > 7		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	17	42'5	23	57'5	40
SIN HALLAZGOS ORGANICOS	20	34'48	38	65'51	58
TOTAL	37	37'75	61	62'24	98

$X_i^2 = 0'6445$
N.S.

$t_{exp} = 0'4556$
N.S.

TABLA XXII

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: INDICE MENOPAUSICO (BLATT)

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-6		ELEVADA = ó > 7		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	15	42'85	20	57'14	35
HALLAZGO ANAMNESICO	18	28'57	45	71'42	63
TOTAL	33	52'38	65	66'32	98

$X_i^2 = 2'055$

N.S.

$t_{exp} = 1'8163$

N.S.

TABLA XXIIa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: INDICE MENOPAUSICO (BLATT)

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-6		ELEVADA = ó > 7		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	15	37'5	25	68'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	18	31'03	40	68'96	58
TOTAL	33	33'67	65	66'32	98

$X_i^2 = 0'4429$

N.S.

$t_{exp} = 0'3138$

N.S.

TABLA XXIII

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: INDICE DE CORNELL ABREVIADO.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	N.NORMAL 1-9 N.LIGERO10-14		N.ELEVADO > 14		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	12	34'28	23	65'71	35
HALLAZGO ANAMNESICO	16	25'39	47	74'60	63
TOTAL	28	28'57	70	71'42	98

$X_i^2 = 0'871$

N.S.

$t_{exp} = 0'5516$

N.S.

TABLA XXIIIa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: INDICE DE CORNELL ABREVIADO.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	N.NORMAL 1-9 N.LIGERO 10-14		N.ELEVADO > 14		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	13	32'5	27	67'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	15	25'86	43	74'13	58
TOTAL	28	28'57	70	71'42	98

$\chi^2_i = 0'511$

N.S.

$t_{exp} = 0'2666$

TABLA XXIV

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: ANSIEDAD

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-18		ELEVADA = ó > 19		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	13	37'44	22	62'85	35
HALLAZGO ANAMNESICO	16	25'39	47	74'60	63
TOTAL	29	29'59	69	70'40	98

$X_i^2 = 1'4899$

N.S.

$t_{exp} = 1'1921$

N.S.

TABLA XXIVa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: ANSIEDAD

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0-18		ELEVADA = ó > 19		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	9	22'5	31	77'5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	20	34'48	38	65'51	58
TOTAL	29	29'59	69	70'40	98

$X_i^2 = 1'6288$

N.S.

$t_{exp} = 1'1479$

N.S.

TABLA XXV

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: PUNTUACION TOTAL

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 12-32		ELEVADA = ó > 33		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	7	20	28	80	35
HALLAZGO ANAMNESICO	5	7'93	58	92'06	63
TOTAL	12	12'24	86	87'75	98

$\chi^2_i = 3'0472$

$p < 0'05$

$t_{exp} = 1'9318$

N.S.

TABLA XXVa

DISPAREUNIA Y CUESTIONARIO GINECOLOGICO: PUNTUACION TOTAL.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 12-32		ELEVADA = ó > 33		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	4	10	46	90	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	8	13'79	50	86'20	58
TOTAL	12	12'24	86	87'75	98

$X_i^2 = 0'3168$
N.S.

$t_{exp} = 0'7126$
N.S.

TABLA XXVI

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: ANSIEDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0-2		3-5		= ó > 6		
	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	18	54'54	9	27'27	6	18'18	33
HALLAZGO ANAMNESICO	18	29'03	31	50	13	20'96	62
TOTAL	36	37'89	40	42'10	19	20	95

$X_i^2 = 6'4250$

$p < 0'025$

$t_{exp} = 1'1167$

N.S.

TABLA XXVIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: ANSIEDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0-2		3-5		= ó > 6		
	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	15	40'54	11	29'72	11	29'72	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	21	30'20	29	50	8	13'79	58
TOTAL	36	37'89	40	42'10	19	20	95

$X_i^2 = 5'1849$
$p < 0'05$

$t_{exp} = 0'5052$
N.S.

TABLA XXVII

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: AGRESIVIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0-2		3-4		= ó > 5		
	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	15	45'45	10	30'30	8	24'24	33
HALLAZGO ANAMNESICO	21	33'87	30	48'38	11	17'74	62
TOTAL	36	37'89	40	42'10	19	20	95

$x_i^2 = 2'8903$ N,S.

$t_{exp} = 0'2795$ N.S.

TABLA XXVIIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: AGRESIVIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0-2		3-4		= ó > 5		
	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	15	40'54	15	40'54	7	18'91	37
SI LLAZGO ORGANICO	21	36'20	25	43'40	12	20'68	58
TOTAL	36	37'89	40	42'10	19	20	95

$x_i^2 = 0'1826$
N.S.

$t_{exp} = 0'3286$
N.S.

TABLA XXVIII

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: CULPABILIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0		ELEVADA = o´> 1		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	12	36'36	21	63'63	33
HALLAZGO ANAMNESICO	30	48'38	32	51'61	62
TOTAL	42	44'21	53	55'78	95

$X_i^2 = 1'2623$

N S.

$t_{exp} = 0'1959$

N.S.

TABLA XXVIIIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: CULPABILIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION				TOTAL
	NORMAL 0		ELEVADA = ó > 1		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	21	56'75	16	43'24	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	21	36'20	37	63'79	58
TOTAL	42	44'41	53	55'78	95

x_i^2 = 0'8676

$p < 0'025$

t_{exp} = 0'7010

N.S.

TABLA XXIX

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: FEMINIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0-2		3-5		= ó > 6		
	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	0	0	6	18'18	27	81'81	33
HALLAZGO ANAMNESICO	1	1'61	26	41'93	35	56'45	62
TOTAL	1	1'05	32	33'64	62	65'26	95

$x_i^2 = 6'2632$
$p < 0'025$

$c_{exp} = 1'8788$
N.S.

TABLA XXIXa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: FEMINIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION 0-2 N	%	3-5 N	%	= ó > 6 N	%	TOTAL
CON HALLAZGO ORGANICO	0	0	12	32'43	25	67'56	37
SIN HALLAZGOS ORGANICOS	1	1'72	20	34'48	37	63'79	58
TOTAL	1	1'05	32	33'64	62	65'26	95

$X_i^2 = 0'7154$
N.S.

$t_{exp} = 0'3080$
N.S.

TABLA XXX

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: INSEGURIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0		1		= ó > 2		
	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	11	33'33	13	39'39	9	27'27	33
HALLAZGO ANAMNESICO	31	50	18	29'03	13	20'96	62
TOTAL	42	44'21	31	32'63	22	23'15	95

$X_i^2 = 2'4314$
N.S.

$t_{exp} = 1'1333$
N.S.

TABLA XXXa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: INSEGURIDAD.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0		1		= ó > 6		
	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	14	37'83	14	37'85	9	24'32	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	28	48'27	17	29'31	13	22'41	58
	42	44'21	31	32'63	22	23'15	95

$x_i^2 = 1'0956$ N.S.

$t_{exp} = 0'1087$ N.S.

TABLA XXXI

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: DEPRESION.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0		1-2		= ó > 3		
	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	2	6'06	18	54'54	13	39'39	33
HALLAZGO ANAMNESICO	5	8'06	30	48'38	27	43'54	62
TOTAL	7	7'36	48	50'52	40	42'10	95

$x_i^2 = 0'367$
N.S.

$t_{exp} = 0'7153$
N.S.

TABLA XXXIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: DEPRESION.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0		1-2		= ó > 3		
	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	5	13'51	15	40'51	17	45'94	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	2	3'44	33	56'89	23	39'65	58
TOTAL	7	7'36	48	50'52	40	42'10	95

$x_i^2 = 4'5141$ N.S.

$t_{exp} = 1'4679$ N.S.

TABLA XXXII

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION DE MURRAY: RECHAZO.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0		1		= ó > 2		
	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	6	18'18	12	36'36	15	45'45	33
HALLAZGO ANAMNESICO	17	27'41	15	24'19	30	48'38	62
TOTAL	23	24'41	27	28'42	45	47'36	95

$X_i^2 = 1'9205$ N.S.

$t_{exp} = 1'9308$ N.S.

TABLA XXXIIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: RECHAZO.

DISPAREUNIA	PUNTUACION						TOTAL
	0		1		= ó > 2		
	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	7	18'91	10	27'02	20	54'05	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	16	27'58	17	29'31	25	43'10	58
TOTAL	23	24'21	27	28'42	45	47'36	95

$X_i^2 = 1'3142$
N.S.

$t_{exp} = 1'6395$
N.S.

TABLA XXXIII

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: PERCEPCION.

DISPAREUNIA	PERCEPCION				TOTAL
	BUENA		MALA		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	25	75'75	8	24'24	33
HALLAZGO ANAMNESICO	32	51'61	30	48'38	62
TOTAL	57	60	38	40	95

$X_i^2 = 5'2311$

$p < 0'0125$

TABLA XXXIIIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: PERCEPCION.

DISPAREUNIA	PERCEPCION				TOTAL
	BUENA		MALA		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	28	75'67	9	24'32	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	29	50	29	50	58
TOTAL	57	60	38	40	95

$X_i^2 = 6'2048$

$p < 0'0125$

TABLA XXXIV

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE.

DISPAREUNIA	ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE								TOTAL
	NO EXPRESA		POSITIVA		NEGATIVA		PREOCUPACION		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	15	45'45	2	6'06	13	39'39	3	9'09	33
HALLAZGO ANAMNESICO	30	48'38	1	1'61	25	40'32	6	9'67	62
TOTAL	45	47'36	3	3'15	38	40	9	9'47	95

$x_i^2 = 1'4007$

N.S.

TABLA XXXIVa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE.

DISPAREUNIA	ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE								TOTAL
	NO EXPRESA		POSITIVA		NEGATIVA		PREOCUPACION		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	22	59'45	0	0	14	37'83	1	2'70	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	23	39'65	3	5'17	24	41'37	8	13'79	58
TOTAL	45	47'36	3	3'15	38	40	9	9'47	95

$x_i^2 = 6'7878.$

$p < 0'05.$

TABLA XXXV

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE.

DISPAREUNIA	ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE						TOTAL
	ANSIEDAD		AGRESIVIDAD		OTRAS		
	N	%	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	13	39'39	9	27'27	11	33'33	33
HALLAZGO ANAMNESICO	32	51'61	14	22'58	16	25'80	62
TOTAL	45	47'36	23	24'21	27	28'42	95

$x_i^2 = 1'3039$

N.S.

TABLA XXXVa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE.

DISPAREUNIA	ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE						TOTAL
	ANSIEDAD		AGRESIVIDAD		OTRAS		
	N	%	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	16	43'24	11	29'72	10	27'02	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	29	50	12	20'68	17	29'31	58
TOTAL	45	47'36	23	24'21	27	28'42	95

$x_i^2 = 1'0216$

N.S.

TABLA XXXVI

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: RESPUESTA A LA LAMINA 2.

DISPAREUNIA	RESPUESTA LAMINA-2				TOTAL
	RELACIONES AFECTIVAS		OTRAS		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	14	42'42	19	57'57	33
HALLAZGO ANMNESICO	36	58'06	26	41'93	62
TOTAL	50	52'63	45	47'36	95

$X_i^2 = 2'1131$

N.S.

TABLA XXXVIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: RESPUESTA LAMINA-2.

DISPAREUNIA	RESPUESTA LAMINA-2				TOTAL
	RELACIONES AFECTIVAS		OTRAS		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	19	51'35	18	48'64	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	31	53'44	27	46'35	58
TOTAL	50	52'63	45	47'36	95

$x_i^2 = 0'0397$

N.S.

TABLA XXXVII

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: RESPUESTA LAMINA-7.

DISPAREUNIA	RESPUESTA LAMINA 7								TOTAL
	ACTUA MADRE SIN RESPUESTA		HIJA ATIENDE		HIJA SIN INTERES		OTROS		
MOTIVO DE CONSULTA	12	36'36	5	15'15	12	36'36	4	12'12	33
HALLAZGO ANAMNESICO	10	16'12	14	22'58	26	41'93	12	19'35	62
TOTAL	22	23'15	19	20	38	40	16	16'84	95

$X_i^2 = 5'2383$

N.S.

TABLA XXXVIIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: RESPUESTA LAMINA-7.

DISPAREUNIA	RESPUESTA LAMINA 7								TOTAL
	ACTUA MADRE SIN RESPUESTA		HIJA ATIENDE		HIJA SIN INTERES		OTROS		
CON HALLAZGO ORGANICO	12	32'43	6	16'21	15	40'54	4	10'81	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	10	17'24	13	22'41	23	39'65	12	20'68	58
TOTAL	22	23'15	19	20	39	40	16	16'84	95

$X_i^2 = 3'9982$

N.S.

TABLA XXXVIII

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: RESPUESTA LAMINA-18.

DISPAREUNIA	RESPUESTA LAMINA 18								TOTAL
	REL. MATERNAL CUIDADO, PREOC		AGRESION		REL. MARITAL POSITIVA		OTRAS		
MOTIVO DE CONSULTA	11	33'33	15	45'45	3	9'09	4	12'12	33
HALLAZGO ANAMNESICO	21	33'87	24	38'70	9	14'51	8	12'90	62
TOTAL	32	33'68	39	41'05	12	12'63	12	12'63	95

$x_i^2 = 0'7527$

N.S.

TABLA XXXVIIIa

DISPAREUNIA Y TEST DE APERCEPCION TEMATICA DE MURRAY: RESPUESTA LAMINA-18.

DISPAREUNIA	RESPUESTA LAMINA 18								TOTAL
	REL. MATERNAL CUIDADO, PREOC		REL. MARITAL POSITIVA		AGRESION		OTRAS		
CON HALLAZGO ORGANICO	11	29'72	7	18'91	14	37'83	5	13'51	37
SIN HALLAZGO ORGANICO	21	36'20	5	8'62	25	43'10	7	12'06	58
TOTAL	32	33'68	12	12'63	39	41'05	12	12'63	95

$X_i^2 = 2'3678$

N.S.

TABLA XXXIX

DISPAREUNIA Y RECUENTO DE ATALANTA.

RECUENTO DE ATALANTA: SINTOMAS	N	%
AMENORREA/TRASTORNO MENSTRUAL	17	12'68
DISMENORREA	47	35'07
HIPEREMESIS GRAVIDICA	12	8'95
PERDIDAS REPRODUCTORAS	7	5'22
DISTOCIA FUNCIONAL DEL PARTO	3	2'23
PROLONGACION DE EMBARAZO	1	0'74
PARTO PREMATURO	0	0
HIPOGALACTIA/AGALACTIA	7	5'22
MENORRAGIA	9	6'71
FRIGIDEZ	31	23'13
DEPRESION POSTPARTO	0	0
TOTAL	134	

TABLA XL

DISPAREUNIA Y RECUENTO DE ATALANTA.

DISPAREUNIA	NUMERO DE SINTOMAS				TOTAL
	< 4		= ó > 4		
	N	%	N	%	
MOTIVO DE CONSULTA	33	91'66	3	8'33	36
HALLAZGO ANAMNESICO	58	90'62	6	6'34	64
TOTAL	91	91	9	9	100

$X_i^2 = 0'0303$

N.S.

TABLA XLa

DISPAREUNIA Y RECUENTO DE ATALANTA.

DISPAREUNIA	NUMERO DE SINTOMAS				TOTAL
	< 4		= ó > 4		
	N	%	N	%	
CON HALLAZGO ORGANICO	38	95	2	5	40
SIN HALLAZGO ORGANICO	53	88'33	7	11'66	60
TOTAL	91	91	9	9	100

$X_i^2 = 1'3022$

N.S.

RESUMEN DE LOS PROTOCOLOS

PACIENTE: M.M.L. CASO: 1 N.H. 6663 EDAD: 43
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DOLOR PELVICO

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	7 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1-2/sem.
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N.
Vagina:	N.
Genitales internos:	Utero ↑ de tamaño.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Miomatosis uterina+endometriosis ovárica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Reglas abundantes.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	8
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	0
S.E.V.:	5
Blatt:	7
Ansiedad:	23
Cornell:	16
Total:	44

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	6
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	2 niveles
Lámina 7:	apersonación.
Lámina 18:	agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Depresión.

PACIENTE: R.G.G. CASO: 2 N.H. 6157 EDAD: 42
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración: 1 año.
Desde inicio rel. sex.: -
Post. inicio rel. sex.: si
Tipo:
- Entrada o penetrac.: -
- Concomitante: si
- Posterior: -
- Combinaciones: -
- Mal definida: -

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito: 1/dos sem.
Apetencia: si
Orgasmo: ocasional.
Satisfacción: no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: Utero en retro Iº, engrosado.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Miomatosis uterina.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	7
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	0
S.E.V.:	7
Blatt:	10
Ansiedad:	20
Cornell:	19
Total:	57

T.A.T. DE MURRAY no evaluab.

Ansiedad:
Agresividad:
Culpabilidad:
Feminidad:
Inseguridad:
Depresión:
Rechazo:
Percepción:
Lámina 2:
Lámina 7:
Lámina 18:

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

PACIENTE: V.V.M. CASO: 3 N.H. 6648 EDAD: 44
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: Cont. Or. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: REGLAS ABUNDANTES.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3-4 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero aumentado de tamaño.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Micmatosis uterina.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hipermenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	7
Algia:	6
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	2
S.E.V.:	7
Blatt:	5
Ansiedad:	12
Cornell:	7
Total:	36

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	6
Agresividad:	6
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	2
Depresión:	3
Rechazo:	4
Percepción:	B.P.

Lámina 2: rel. niña-mujer.
Lámina 7: falta interés hija
Lámina 18: agresividad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

insegura-rechazante, agresión.

PACIENTE: E.J.V. CASO: 4 N.H. 6839 EDAD: 46
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: Combinac. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: TRASTORNOS MENSTRUALES

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero aumentado de tamaño.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Miomatosis uterina.

RECUENTO DE ATALANTA:

Trastornos menstruales

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	6
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	1
S.E.V.:	5
Blatt:	10
Ansiedad:	27
Cornell:	18
Total:	43

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	sin relaciones.
Lámina 7:	hija no atiende.
Lámina 18:	se abrazan.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad.

PACIENTE: J.V.R. CASO: 5 N.H. 18.019 EDAD: 46
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	muchos años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	irregular
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Tricomonas
Genitales internos:	Pólilo cervical, Utero irregular, Anejos engrosados.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Ca. cervical+Quistes derm. bilaterales+Endometritis y salpingitis inespecificas.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	5
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	1
S.E.V.:	6
Blatt:	5
Ansiedad:	24
Cornell:	40
Total:	muy elevado

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	4
Culpabilidad:	1
Feminidad:	8
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	sin relaciones
Lámina 7:	hija atiende
Lámina 18:	agresividad

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-Agresividad

PACIENTE: Mª J.M.P. CASO: 6 N.H. 6.653 EDAD: 36
PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: Lig. Tub. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	5-6 meses
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	3
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	9
Blatt:	9
Ansiedad:	28
Cornell:	17
Total:	46

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	No, por dolor
Apetencia:	si
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	si

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	4
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Sin relac.
Lámina 7:	Hija atiende madre
Lámina 18:	Cuidado

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Vitíligo lab.me.
Vagina: N
Genitales internos: Tumoración en cervix de aspecto pólipo

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Cancer de cervix.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hipermenorrea.

PACIENTE: J.S.P. CASO: 7 N.H. 6638 EDAD: 34
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: Cont. Or. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DOLOR PELVICO.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Varios años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem.
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Violácea
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Congestión pélvica + S. de Allen y Masters.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	7
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	1
S.E.V.:	11
Blatt:	12
Ansiedad:	31
Cornell:	25
Total:	55

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	5
Culpabilidad:	2
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	4
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Rechazo situación
Lámina 7: Madre consuel.hij.
Lámina 18: Agresividad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa-agresividad.

PACIENTE: R.L.P. CASO: 8 N.H. 61.414 EDAD: 48
PARIDAD: 5 ANTICONCEPCION: C. O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: MOLESTIAS HIPOGASTRICAS

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	4-5 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal.
Apetencia:	no
Orgasmo:	Ocasional.
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Quiste de Ovario izdo. + Varicocele pélvico.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	5
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	0
S.E.V.:	6
Blatt:	2
Ansiedad:	19
Cornell:	12
Total:	33

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	1
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	0
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	Sin relación.
Lámina 7:	Hija triste.
Lámina 18:	Cuidado, afecto.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: Mª J.C.C CASO: 9 N.H. 6.179 EDAD: 33

PARIDAD: 6 ANTICONCEPCION: L. T. TIPO COITO: Normal e interrup.

MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR/PELVIALG

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	15 años
Desde inicio rel. sex.:	si (violacion)
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal.
Apetencia:	escasa.
Orgasmo:	ocasional.
Satisfacción:	no.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Desgarro IIº
Vagina:	N
Genitales internos:	Tumoración en anejo dcho. Dolor explor.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Enfermedad Pélvica Inflamatoria.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	4
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	2
S.E.V.:	8
Blatt:	8
Ansiedad:	24
Cornell:	19
Total:	48

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	0
Culpabilidad:	0
Feminidad:	8
Inseguridad:	1
Depresión:	5
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Dos niveles.
Lámina 7:	Hija no atiende.
Lámina 18:	Madre consuela hija.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad-culpa.

PACIENTE: C.G.F. CASO: 10 N.H. 6.405 EDAD: 37
PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: PELVIALGIA .

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	9 meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem.
Apetencia:	escasa.
Orgasmo:	ocasional.
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Sindrome adherencial ovárico bilateral.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	4
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	1
Feminidad:	2
S.E.V.:	6
Blatt:	9
Ansiedad:	23
Cornell:	17
Total:	37

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	3
Rechazo:	3
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. triangular.
Lámina 7: Hija indiferente.
Lámina 18: Ambiguedad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo.

PACIENTE: V.C.P. CASO: 11 N.H. 70.625 EDAD: 36
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Normal.
MOTIVO CONSULTA: ESTERILIDAD SECUNDARIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	13 años.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: Anejo izd. doloraso, empastado.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Metroanexitis crónica residual. Varicocele pélvico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez. -

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	8
Algia:	5
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	1
S.E.V.:	14
Blatt:	10
Ansiedad:	17
Cornell:	17
Total:	41

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	6
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. triangular.
Lámina 7: Hija enfadada
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad, rechazo, depresión.

PACIENTE: Me.A.H. CASO: 12 N.H. 7868 EDAD: 21

PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA Y DOLOR PELVICO

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N

Vagina: N

Genitales internos: Anejo izd. muy doloroso.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Metroanexitis izda.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	5
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	1
S.E.V.:	5
Blatt:	4
Ansiedad:	15
Cornell:	11
Total:	29

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	I
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Dos niveles.

Lámina 7: Madre indiferente.

Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa.

PACIENTE: A.G.R. CASO: 13 N.H. 7543 EDAD: 24

PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal.

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-perineé:	N
Vagina:	Granuloma de cicatriz (episiotomia)
Genitales internos:	

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Granuloma Vaginal.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

Distocia funcional en parto.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	3
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	1
S.E.V.:	10
Blatt:	7
Ansiedad:	17
Cornell:	11
Total:	30

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	1
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	0
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Rel. familiar

Lámina 7: Apersonación

Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ambibalencia-ansiedad

PACIENTE: Mª P.G.L. CASO: 14 N.H. 6.046 EDAD: 26

PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR./DISMENORREA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	si
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Anejos engrosados.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Quiste endometriósico en ovario izdo.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea. Trastornos menstruales.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	7
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	1
S.E.V.:	12
Blatt:	12
Ansiedad:	31
Cornell:	28
Total:	45

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	4
Culpabilidad:	2
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	3
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	No relaciones.
Lámina 7:	Hija atiende.
Lámina 18:	Riña, odio.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo-ansiedad.

PACIENTE: A.M.M. CASO: 15 N.H.6438 EDAD: 44
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/dos m.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Desgarro II º
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Quiste endometriósico + S.Allen y Master + S. adherencial.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea + Trastornos menstruales + Frigidez

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	8
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	2
S.E.V.:	17
Blatt:	12
Ansiedad:	37
Cornell:	28
Total:	67

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	8
Culpabilidad:	1
Feminidad:	4
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Dos niveles
Lámina 7: Hija indiferente.
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa-agresividad-depresión.

PACIENTE: A.C.N. CASO: 16 N.H. EDAD: 24

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA + DISMENORREA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	+ 5 años
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/mes.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Endometriosis pélvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea + Trastornos menstruales + Frigidez

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	5
Rechazo sexual:	8
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	3
S.E.V.:	9
Blatt:	13
Ansiedad:	29
Cornell:	12
Total:	65

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	1
Feminidad:	5
Inseguridad:	2
Depresión:	4
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Dos niveles.

Lámina 7: Rechaza la madre

Lámina 18: Ambiguedad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Inseguridad-rechazo.

PACIENTE: E.E.C. CASO: 17 N.H. 6476 EDAD: 30
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: POLISINTOMATOLOGIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	6 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2-4 sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: Utero en retroflexión.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Endometriosis Ovario izd. y Douglas.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hiperemesis.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	6
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	10
Blatt:	9
Ansiedad:	31
Cornell:	16
Total:	53

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	6
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	0
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Sin relación.
Lámina 7: Solo actua madre.
Lámina 18: sensación espanto.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo, agresividad.

PACIENTE: I. D. F. CASO: 18 N.H. EDAD: 44

PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: TRASTORNOS MENSTRUALES Y DISMENORREA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	+ 5 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	diario
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Desgarro IIº

Vagina: Colpocele doble Iº

Genitales internos: Utero engrosado.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Adenomiosis.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea + Trastorno menstrual + Frigidez

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	7
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	14
Blatt:	11
Ansiedad:	36
Cornell:	29
Total:	63

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	2
Depresión:	2
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar

Lámina 7: Mad.orgullosa de hija

Lámina 18: Afecto.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo-agresividad.

PACIENTE: J.L.R. CASO: 19 N.H. 7336 EDAD: 49

PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: 0 TIPO COITO: No

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA QUE IMPIDE COITO

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Hace 6 a., era leve
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	5
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	0
S.E.V.:	8
Blatt:	10
Ansiedad:	22
Cornell:	15
Total:	45

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	No coito
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY No eval.

Ansiedad:	
Agresividad:	
Culpabilidad:	
Feminidad:	
Inseguridad:	
Depresión:	
Rechazo:	
Percepción:	
Lámina 2:	
Lámina 7:	
Lámina 18:	

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Estenosis atrófica
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Estenosis vaginal atrófica.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

RECUENTO DE ATALANTA:

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

PACIENTE: F.M.M. CASO: 20 N.H. 6809 EDAD: 27
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1'5 años.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/mes.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Estenosis 1/3 super.
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Estenosis 1/3 superior de la Vagina. Por Laparosc., G. ~~I. normales.~~

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	1
Algia:	6
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	1
S.E.V.:	8
Blatt:	10
Ansiedad:	24
Cornell:	13
Total:	39

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	1
Culpabilidad:	2
Feminidad:	4
Inseguridad:	2
Depresión:	0
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Rel. familiar.
Lámina 7: Hija atiende.
Lámina 18: Cuidado, afecto.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa-rechazo-ansiedad.

PACIENTE: A.S.C. CASO: 21 N.H. 6956 EDAD: 25
PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: C.Vulvar
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 meses.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+ 1/semana
Apetencia:	si
Orgasmo:	frecuente
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Amplio himen tabicado.
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Estenosis himeneal.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	1
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	1
Feminidad:	1
S.E.V.:	2
Blatt:	2
Ansiedad:	9
Cornell:	8
Total:	17

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	3
Feminidad:	4
Inseguridad:	2
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. familiar
Lámina 7: Hija no atiende.
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo-agresividad-culpa

PACIENTE: F.S. CASO: 22 N.H.6086 EDAD: 24
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: no TIPO COITO: N.y Vulvar
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	3-4/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Introito esten.
Vagina:	por cicatriz episiotmia.
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Estenosis Introito por cicatriz de episiotomía.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	0
Algia:	0
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	1
S.E.V.:	3
Blatt:	4
Ansiedad:	9
Cornell:	10
Total:	23

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	0
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Rel. familiar
Lámina 7:	No resp. ante madr.
Lámina 18:	Relacion agresiva

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Inmadurez, dependencia.

PACIENTE: E.G.D. CASO: 23 N.H.6223 EDAD: 28
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: Preser., COITO TIPO: Normal.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA Y PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	5 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	4
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	0
S.E.V.:	8
Blatt:	10
Ansiedad:	20
Cornell:	18
Total:	40

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/sem
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	5
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relac. triangular.
Lámina 7: Madre no atiend.hij
Lámina 18: Rel. agresiva.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-perineé: Estenosis leve.
Vagina: Algo atrof, borramien. fondos de saco.
Genitales internos: N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Estenosis vaginal.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

agresividad.

PACIENTE: A,M.C. CASO: 24 N.H. 7060 EDAD: 24
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	0
Algia:	1
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	2
S.E.V.:	2
Blatt:	2
Ansiedad:	16
Cornell:	10
Total:	22

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	8
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Dos niveles
Lámina 7: Apersonación
Lámina 18: Agresión

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: Cérvix hipertrófico ,sangrante.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Hipertrofia cervical,cervicitis,

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Preocupación

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

PACIENTE: M.L.G.S. CASO: 25 N.H. 7749 EDAD: 48

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I + C.O TIPO COITO: C.I.y Nor

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	más de 10 a.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2-4 sem
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Desgarro perin.

Vagina: Colpocele doble 1º

Genitales internos: Elongación hipertrófica del cervix.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Elongación hipertrófica del cérvix.

RECUENTO DE ATALANTA:

Trastorno menstrual+Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	5
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	2
S.E.V.:	6
Blatt:	6
Ansiedad:	22
Cornell:	16
Total:	37

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	1
Culpabilidad:	1
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Dos niveles

Lámina 7: Hija atiende

Lámina 18: Agresividad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-depresión.

PACIENTE: P.M.C. CASO: 26 N.H.6060 EDAD: 46

PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: 0 TIPO COITO: Normal

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA, ESCOZOR Y DOLOR VULVAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Varios años más intensa varios meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2 sem
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Enrogecida.
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Vulvo-Bartholinitis.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez+Trastornos menstruales.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	4
Rechazo sexual:	8
Rechazo embarazo:	1
Feminidad:	2
S.E.V.:	3
Blatt:	6
Ansiedad:	19
Cornell:	14
Total:	36

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	6
Agresividad:	0
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Dos niveles

Lámina 7: Hija pensativa.

Lámina 18: Cuidado

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad y depresión.

PACIENTE: A.S,J. CASO: 27 N.H. 58280 EDAD: 39
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I.+Prese TIPO COITO: C.I, Norm.
MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2-3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/semana
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-perine:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Cervicitis crónica+Varicocele pélvico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Embarazo prolongado+ hipogalactia.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	4
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	1
Feminidad:	1
S.E.V.:	6
Blatt:	4
Ansiedad:	8
Cornell:	5
Total:	31

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	5
Inseguridad:	3
Depresión:	0
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: No relaciones
Lámina 7: Apersonación
Lámina 18: Agresión

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: J.M.S. CASO: 28 N.H. 7147 EDAD: ?
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: Preservat. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	4 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	5
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	1
S.E.V.:	4
Blatt:	3
Ansiedad:	11
Cornell:	8
Total:	33

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Madre represiva.
Lámina 7:	Apersonación
Lámina 18:	Agresión

EXPLORACION GENITAL

Vulva-perineé: N
Vagina: Cicatriz pared post. extirpación granuloma.
Genitales internos: Dolor a la palpación cervix.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Cervicitis.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad-rechazo

RECUENTO DE ATALANTA:

-

PACIENTE: R.C.O. CASO: 29 N.H.7457 EDAD: 50
PARIDAD: 7 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: TRASTORNOS MENSTRUALES Y VASOMOTORES

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Muchos años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1-3/sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N

Genitales internos: Utero hipertrófico+cervicitis.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Cervicitis

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	7
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	7
Feminidad:	2
S.E.V.:	6
Blatt:	5
Ansiedad:	25
Cornell:	17
Total:	50

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	9
Agresividad:	5
Culpabilidad:	2
Feminidad:	6
Inseguridad:	2
Depresión:	4
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Rel. familiar
Lámina 7: Hija no atiende.
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: A.R.R. CASO: 30 N.H. 7698 EDAD: 26
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: Preserv. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2/sem.
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Dolor palpación del cervix.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Cervicitis crónica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hiperemesis+Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	4
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	0
S.E.V.:	9
Blatt:	7
Ansiedad:	23
Cornell:	14
Total:	37

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	6
Agresividad:	4
Culpabilidad:	2
Feminidad:	8
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Sin relación.
Lámina 7: Equilibrio.
Lámina 18: Cuidado

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa

PACIENTE: M.S.V. CASO: 31 N.H. 6672 EDAD: 50

PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: No realiza

MOTIVO CONSULTA: CONTROL POST-OPERATORIO.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración: 6 años, tras Hist. por Miomatosis.

Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	No por dolor.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Inflamada
Genitales internos:	Histerectomizada.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis atrófica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	1
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	0
S.E.V.:	2
Blatt:	2
Ansiedad:	12
Cornell:	9
Total:	23

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	6
Culpabilidad:	2
Feminidad:	5
Inseguridad:	1
Depresión:	0
Rechazo:	2
Percepción:	B.p.

Lámina 2: Dos niveles.

Lámina 7: Armonía madre-hija

Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpabilidad.

Depresión.

PACIENTE: L.H.F. CASO: 32 N.H.754 EDAD: 32

PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.O./C.I. TIPO COITO: Normal.C.I

MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración: 1 año.
Desde inicio rel. sex.: -
Post. inicio rel. sex.: si
Tipo:
- Entrada o penetrac.: -
- Concomitante: si
- Posterior: -
- Combinaciones: -
- Mal def. ida: -

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito: 2-4/sem.
Apetencia: escasa
Orgasmo: ocasional
Satisfacción: poca

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: Leucorrea intensa.
Genitales internos: nódulos miomatosos en fundus.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis por Trichomonas y Cándidas.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	7
Rechaz sexual:	6
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	6
Blatt:	6
Ansiedad:	20
Cornell:	19
Total:	45

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	3
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. triangular
Lámina 7: Hija ausente
Lámina 18: Cuidado.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-depresión.

PACIENTE: M.V.O.G. CASO: 3? N.H. ? EDAD: 25

PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: Preser/C.O TIPO COITO: Normal

MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 mes.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	1
Algia:	3
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	2
S.E.V.:	6
Blatt:	8
Ansiedad:	23
Cornell:	16
Total:	38

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

T.A.T. DE MURRAY No evaluable.

Ansiedad:	
Agresividad:	
Culpabilidad:	
Feminidad:	
Inseguridad:	
Depresión:	
Rechazo:	
Percepción:	
Lámina 2:	
Lámina 7:	
Lámina 18:	

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	leucorrea
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis por Trichomonas

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

RECUENTO DE ATALANTA:

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

PACIENTE: M.M.A. CASO: 34 N.H. 6589 EDAD: 50

PARIDAD: 5 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	5 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	8
Algia:	4
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	2
S.E.V.:	7
Blatt:	5
Ansiedad:	22
Cornell:	19
Total:	45

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito: No desde la.

Apetencia: por dolor.

Orgasmo: no

Satisfacción: no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Rel. familiar

Lámina 7: Actua la madre

Lámina 18: Riña.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Vulvitis. Dolorosa

Vagina: Tumoración quistica i/3 superior. Leucor.

Genitales internos: N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Vulvo-vaginitis tricomonia sica+quiste vaginal.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad

RECUENTO DE ATALANTA:

Abortos repetidos.

PACIENTE: T.G.B. CASO: 35 N.H. 6204 EDAD: 43
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración: 2 años, tras Histec subtotal por Miomatosis.

Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	enrogecida lig.
Vagina:	Leucorrea abun.
Genitales internos:	-

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis Moniliásica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Emesis; Frigidez+Trastornos menstruales.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	7
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	7
Feminidad:	3
S.E.V.:	11
Blatt:	7
Ansiedad:	27
Cornell:	21
Total:	54

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	2
Feminidad:	8
Inseguridad:	1
Depresión:	4
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Sin relaciones.
Lámina 7: Apersonación.
Lámina 18: Rel. conyugal +

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo-agresión

PACIENTE: C.M.G. CASO: 36 N.H.? EDAD: 34
PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I./D.I.UTIPO COITO: C.I./Norm.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	? años.
Desde inicio rel. sex	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	9
Algia:	7
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	7
Feminidad:	3
S.E.V.:	16
Blatt:	12
Ansiedad:	38
Cornell:	28
Total:	73

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	. +1/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	indiferencia

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	0
Agresividad:	5
Culpabilidad:	2
Feminidad:	8
Inseguridad:	2
Depresión:	5
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Rel.familiar.
Lámina 7: Rechaza a la madre
Lámina 18: Mujer mata a jove

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis Moniliásica.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa-agresividad.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Trastornos menstruales+Depresión post parto+Hipogalactia.

PACIENTE: M.D.S.S. CASO: 37 N.H. 7552 EDAD: 48

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: DOLOR PELVICO Y DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2-4 sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Algo atrófica.

Vagina: muy enrogecida.

Genitales internos: N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis Moniliásica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	6
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	1
S.E.V.:	12
Blatt:	11
Ansiedad:	30
Cornell:	18
Total:	57

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Descripción.

Lámina 7: Apersonación

Lámina 18: No sabe.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: M.B.M. CASO: 38 N.H. 6652 EDAD: 36
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Varios meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/3 sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero engrosado y doloroso.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis inespecífica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez+Dismenorrea+Trastornos menstruales+Distocia funcional partos.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	7
Rechazo sexual:	7
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	2
S.E.V.:	11
Blatt:	8
Ansiedad:	27
Cornell:	19
Total:	53

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	5
Culpabilidad:	3
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	5
Rechazo:	4
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación triangular
Lámina 7: No interée.
Lámina 18: Rel. maternal.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo-agresividad.

PACIENTE: C.H.M. CASO: 39 N.H. 6042 EDAD: 28
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: Preser/C.O TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año. Más dolor, lm.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	3/sem.
Apetencia:	escasa.
Orgasmo:	ocasional.
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Leucorrea amarillenta
Genitales internos:	Anejos dolorosos.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpitis inespecífica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+emesis

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	3
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	0
S.E.V.:	4
Blatt:	5
Ansiedad:	17
Cornell:	18
Total:	39

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	5
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Descripción simple
Lámina 7: Hija rechaza madre
Lámina 18: Afecto.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresión-rechazo

PACIENTE: P.C.G. CASO: 40 N.H. 7576 EDAD: 35
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: Útero aumentado tamaño.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpo-cervicitis inespecífica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Menorragias+Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	5
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	4
S.E.V.:	9
Blatt:	10
Ansiedad:	35
Cornell:	19
Total:	61

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	8
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Sin relación.
Lámina 7: Madre no atiende.
Lámina 18: Afecto, cuidado.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad.

PACIENTE: I.A.F. CASO: 41 N.H. 6790 EDAD: 24
PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Vulvar
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	15 meses.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Himen íntegro, espasmo leve.
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Vaginismo.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	4
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	1
Feminidad:	2
S.E.V.:	8
Blatt:	6
Ansiedad:	15
Cornell:	10
Total:	33

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Dos niveles.
Lámina 7:	Hija no atiende.
Lámina 18:	Otras.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Depresión.

PACIENTE: D.R.S. CASO: 42 N.H. 6605 EDAD: 24

PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Vulvar

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA Y GESTACION

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	1
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	2
S.E.V.:	7
Blatt:	4
Ansiedad:	18
Cornell:	17
Total:	36

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	5
Culpabilidad:	0
Feminidad:	5
Inseguridad:	1
Depresión:	4
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	No relaciones
Lámina 7:	No relaciones
Lámina 18:	Agresión.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N

Vagina: Espasmo vaginal leve

Genitales internos: Utero gestante de 24 sem.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Vaginismo.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresión-ansiedad.

RECUENTO DE ATALANTA:

PACIENTE: C.C.S. CASO: 43 N.H.6605 EDAD: 35
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: MENORRAGIAS

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero en retro, aumentado tamaño.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Retroflexión uterina.

RECUENTO DE ATALANTA:

Trastornos menstruales.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	8
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	2
S.E.V.:	3
Blatt:	6
Ansiedad:	11
Cornell:	9
Total:	33

T.A.T. DE MUHRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	8
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar
Lámina 7: Madre ausente.
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

NO expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad-depresión.

PACIENTE: E.J.P. CASO: 44 N.H.6598 EDAD: 34
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	9 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	6
Rechazo sexual:	9
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	1
S.E.V.:	12
Blatt:	11
Ansiedad:	34
Cornell:	26
Total:	61

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-4/sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	6
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	2
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: No relaciones.
Lámina 7: Madre sitisfecha
Lámina 18: Riña en matrimon

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: Utero en retro de IIº

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Retroflexión uterina.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

[illegible]va.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo-inseguridad.

PACIENTE: M.R.U. CASO: 45 N.H. 65005 EDAD: 37

PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I./Pres. TIPO COITO: C.I./Norm.

MOTIVO CONSULTA: DOLOR PELVICO.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	7 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Dolor mov. utero y pruebas tracción.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Varicocele pélvico(en los infundíbulo-pélvicos)

RECUENTO DE ATALANTA:

Menorragias.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	
Algia:	
Rechazo sexual:	
Rechazo embarazo:	
Feminidad:	
S.E.V.:	
Blatt:	
Ansiedad:	
Cornell:	
Total:	

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	
Agresividad:	
Culpabilidad:	
Feminidad:	
Inseguridad:	
Depresión:	
Rechazo:	
Percepción:	
Lámina 2:	
Lámina 7:	
Lámina 18:	

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

PACIENTE: M.C.C. CASO: 46 N.H. 61721 EDAD: 27
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I./Pres TIPO COITO: C.I./Norm
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA /P.F.DEFINITIVA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	7 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	7
Algia:	8
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	1
S.E.V.:	10
Blatt:	10
Ansiedad:	26
Cornell:	17
Total:	26

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/seman.
Apetencia:	no
Orgasmo:	a veces
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	2
Culpabilidad:	1
Feminidad:	4
Inseguridad:	1
Depresión:	4
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Descripción.
Lámina 7: Apersonación
Lámina 16: Agresión

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero lig. engrosado, doloroso movil.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Congestión pélvica con Varicocele infundibulopelvico bilateral.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpabilidad-rechazo.

PACIENTE: M.M.L. CASO: 47 N.H. 6427 EDAD: 28
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal.
MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	varios meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	si
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero en retro de I-IIº

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Retroflexión uterina.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	6
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	2
S.E.V.:	12
Blatt:	10
Ansiedad:	27
Cornell:	19
Total:	59

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar
Lámina 7: Rechazo del herman
Lámina 18: Riña de mujeres

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad-rechazo

PACIENTE: D.L.O. CASO: 48 N.H. 6770 EDAD: 39
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Varios años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero en retroflesión.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Retroflexión uterina.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Agalactia+Frigidez+Pérdidas reproduc.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	5
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	2
S.E.V.:	8
Blatt:	10
Ansiedad:	31
Cornell:	24
Total:	49

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	5
Culpabilidad:	3
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar.
Lámina 7: Hija no atiende
Lámina 18: Agresividad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad-culpa.

PACIENTE: M&P.H.H. CASO: 49 N.H.6915 EDAD: 40
PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: Espermic. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3-4 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	7
Algia:	4
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	4
S.E.V.:	9
Blatt:	6
Ansiedad:	22
Cornell:	16
Total:	42

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2-4 sem.
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	3
Inseguridad:	1
Depresión:	3
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Dos niveles.
Lámina 7: Madre habla hija enfadada
Lámina 18: Agres.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero en retroflexión de IIº

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Retroflexión uterina.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Depresión.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

PACIENTE: F.S.U. CASO: 50 N.H. 7694 EDAD: 45
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: Combinacio TIPO COITO: C.I/Normal
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1-2/mes.
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	Ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero-sacros muy dolorosos.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Pelipatia vegetativa.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Hiperemesis gravídica.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	5
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	0
S.E.V.:	11
Blatt:	14
Ansiedad:	33
Corneil:	15
Total:	52

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	5
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	No relaciones
Lámina 7:	Le habla la madre
Lámina 18:	Pelea.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-depresión.

PACIENTE: M.J.G. CASO: 51 N.H. 10254 EDAD: 48
PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I/C/O / TIPO COITO: C.I./Norm.
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	6-7 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal.
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	a veces

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero en retro de IIIº, dolor uterosacros

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Varicocele pélvico y Retroflexión uterina de IIIº

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	8
Algia:	7
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	7
Feminidad:	3
S.E.V.:	14
Blatt:	12
Ansiedad:	36
Cornell:	15
Total:	69

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	5
Culpabilidad:	2
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	3
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Rel. triangular
Lámina 7:	Apersonación
Lámina 18:	Riña por celos.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad/agresividad.

PACIENTE: C.P.M. CASO: 52 N.H. 6168 EDAD: 40
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DOLOR PELVICO PREMENSTRUAL.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero doloroso, en retroflesión,

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Retroflexión uterina+Congestion pélvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	7
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	2
S.E.V.:	9
Blatt:	11
Ansiedad:	21
Cornell:	20
Total:	47

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	4
Culpabilidad:	2
Feminidad:	8
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Descripcion simple
Lámina 7: Hija no atiende
Lámina 18: Agresión

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-Culpa.

PACIENTE: C.V.G. CASO: 53 N.H. 58122 EDAD: 40

PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2-3 meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	6
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	2
S.E.V.:	14
Blatt:	11
Ansiedad:	31
Cornell:	15
Total:	56

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1-2/sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	a veces
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Dos niveles

Lámina 7: Apersonación.

Lámina 18: Agresión.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N

Vagina: N

Genitales internos: Dolor intenso al tensar uterosacros.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Congestión pélvica y Varicocele pélvico cara post. Lig. Ancho izd.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad.

PACIENTE: N.L.S. CASO: 54 N.H. 6762 EDAD: 26
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	4-5/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Anejo izd. doloroso a la palpación.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Varicocele pélvico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hiperemesis gravídica.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	7
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	1
S.E.V.:	7
Blatt:	8
Ansiedad:	26
Cornell:	15
Total:	43

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	5
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. niña-hombre.
Lámina 7: Apersonación.
Lámina 18: Actitud maternal.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: C.S.S. CASO: 55 N.H. 6260 EDAD: 35

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	6
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	1
S.E.V.:	10
Blatt:	7
Ansiedad:	16
Cornell:	15
Total:	42

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal.
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional.
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	3
Culpabilidad:	2
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Triángulo.

Lámina 7: Hija no atiende

Lámina 18: Agresión.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero engrosado, irregular.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Varicocele pélvico.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa e inmadurez

RECUENTO DE ATALANTA:

-

PACIENTE: T.C.J. CASO: 56 N.H. 7291 EDAD: 34
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Varios meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Desgarro IIIº
Vagina: N
Genitales internos: Utero en retroflesión de IIIº

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Retroflesión uterina.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	0
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	2
S.E.V.:	4
Blatt:	6
Ansiedad:	16
Cornell:	12
Total:	31

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	3
Culpabilidad:	3
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Relación familiar.
Lámina 7: Culpa ante la madre
Lámina 18: Agresión, riña.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa-ansiedad.

PACIENTE: M.F.S. CASO: 57 N.H. 7366 EDAD: 28
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	dos años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Varicocele ovárico bilateral.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	7
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	0
S.E.V.:	10
Blatt:	11
Ansiedad:	26
Cornell:	15
Total:	49

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	8
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	2
Depresión:	5
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar.
Lámina 7: Madre consuela hij
Lámina 18: Riña.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Positiva, preocupación.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad

PACIENTE: A.F.R.M CASO: 58 N.H.5084 EDAD: 29

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I./C.O. TIPO COITO: C.I/Norm.

MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	ocasional.
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	3
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	1
S.E.V.:	6
Blatt:	7
Ansiedad:	12
Cornell:	10
Total:	39

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	3
Culpabilidad:	2
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Relación familiar

Lámina 7: Hija ausente

Lámina 18: Marido

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa.

PACIENTE: E.A.C. CASO: 59 N.H.? EDAD: 35
PARIDAD: 7 ANTICONCEPCION: D.I.U. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración: meses.
Desde inicio rel. sex.: -
Post. inicio rel. sex.: si, tras 2º D.I.U.
Tipo:
- Entrada o penetrac.: -
- Concomitante: si
- Posterior: -
- Combinaciones: -
- Mal definida: -

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito: +1/sem.
Apetencia: escasa.
Orgasmo: ocasional.
Satisfacción: no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecologico. Deseos P.F. definitiva.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	5
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	1
S.E.V.:	5
Blatt:	6
Ansiedad:	16
Cornell:	8
Total:	32

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	0
Culpabilidad:	0
Feminidad:	1
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: No relaciones
Lámina 7: Actua la madre.
Lámina 18: Act. de preocup.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: T.C.G. CASO: 60 N.H.7100 EDAD: 37

PARIDAD: 5 ANTICONCEPCION: C.I./D.I.UTIPO COITO: I.Norm.

MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	19 meses
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si, desde D.I.U.
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Desgarro I'IIº
Vagina:	N
Genitales internos:	N
	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	1
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	1
S.E.V.:	6
Blatt:	9
Ansiedad:	21
Cornell:	16
Total:	34

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	8
Agresividad:	7
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. triangular.

Lámina 7: Hija disgust. madr

Lámina 18: Rel. madre-hija.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad

PACIENTE: E.Y.M. CASO: 61 N.H. 7061 EDAD: 37
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	8 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico,

RECUENTO DE ATALANTA:

Hiperemesis gravídica+
Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	6
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	9
Blatt:	9
Ansiedad:	29
Cornell:	17
Total:	48

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	5
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	2
Depresión:	1
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Descripción
Lámina 7:	Apersonación
Lámina 16:	Agresión.Riña

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Positiva.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad.

PACIENTE: A.M.C. CASO: 62 N.H. 7060 EDAD: 24
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.O./C.I TIPO COITO: Normal/I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	2
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	1
Feminidad:	2
S.E.V.:	4
Blatt:	5
Ansiedad:	11
Cornell:	9
Total:	34

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	1
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Rel. familiar
Lámina 7: Hija no atiende
Lámina 18: Afecto.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: E.B.B. CASO: 63 N.H. 6650 EDAD: 49
PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DOLOR HIPOGASTRICO

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	6
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	2
S.E.V.:	6
Blatt:	10
Ansiedad:	21
Cornell:	18
Total:	42

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	6
Agresividad:	0
Culpabilidad:	2
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	1
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: No relaciones.
Lámina 7: Niña embarazada.
Lámina 18: Madre con su hijo

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa

PACIENTE: M&J. A. G. CASO: 64 N.H. 6150 EDAD: 22
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	5
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	3
S.E.V.:	10
Blatt:	10
Ansiedad:	30
Cornell:	15
Total:	55

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/mes
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	2
Culpabilidad:	1
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	1
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Sin relaciones.
Lámina 7: Hija ausente
Lámina 18: Agresión, rival.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo, inmadurez.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Frigidez.

PACIENTE: D.R.C. CASO: 65 N.H. 6366 EDAD: 38
PARIDAD: 6 ANTICONCEPCION: C.I./Lig. TTIPO COITO: C.I./N
MOTIVO CONSULTA: DISMENORREA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Varios años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+ 1/sem
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Desgarro
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	2
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	5
Blatt:	4
Ansiedad:	19
Cornell:	11
Total:	33

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	5
Inseguridad:	3
Depresión:	2
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Triangulo
Lámina 7: Hija enfadada
Lámina 18: Pelea

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:
Negativa.
ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:
Ansiedad-agresividad.

PACIENTE: D.S.H. CASO: 66 N.H.6373 EDAD: ?

PARIDAD: 6 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA/ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	7 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Desgarro Iº
Vagina:	Cianótica.
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Congestión pélvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hipermenorrea+Frigidez+
Abortos de repetición.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	7
Algia:	5
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	3
S.E.V.:	12
Blatt:	8
Ansiedad:	20
Cornell:	12
Total:	47

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	8
Agresividad:	3
Culpabilidad:	1
Feminidad:	8
Inseguridad:	1
Depresión:	4
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Relación familiar.
Lámina 7: No interés.
Lámina 16: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo.

PACIENTE: J.G.M. CASO: 67 N.H. 6343 EDAD: 38
PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	=/2-4 sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Colpocele doble Iº
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	5
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	7
Feminidad:	1
S.E.V.:	8
Blatt:	9
Ansiedad:	30
Cornell:	22
Total:	52

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	4
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar.
Lámina 7: Hija no atiende.
Lámina 18: Rivalidad entre h.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa.

PACIENTE: C.D.G. CASO: 68 N.H. ? EDAD: 34

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	12 años.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hiperemesis+Dismenorrea+ Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	5
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	1
S.E.V.:	7
Blatt:	11
Ansiedad:	27
Cornell:	19
Total:	48

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	5
Culpabilidad:	1
Feminidad:	8
Inseguridad:	2
Depresión:	3
Rechazo:	4
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Relación triangular
Lámina 7:	Hija no atiende
Lámina 18:	Cuidado, preocup.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad-ansiedad.

PACIENTE: N.P.U CASO: 69 N.H. 7087 EDAD: 20

PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: Preservat. TIPO COITO: Normal.

MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2-4 sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	0
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	2
S.E.V.:	4
Blatt:	4
Ansiedad:	14
Cornell:	8
Total:	25

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	2
Culpabilidad:	1
Feminidad:	8
Inseguridad:	0
Depresión:	4
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Dos niveles.

Lámina 7: Rechazo a la niña

Lámina 18: Agresividad

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Preocupación.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-rechazo.

PACIENTE: C.B.N. CASO: 70 N.H. ? EDAD: 24
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	3
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	0
S.E.V.:	6
Blatt:	7
Ansiedad:	23
Cornell:	16
Total:	36

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	5
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	3
Depresión:	4
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. triangular.
Lámina 7: Hija atieende.
Lámina 18: Rel. maternal.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo.

PACIENTE: C.H.P. CASO: 71 N.H.6847 EDAD: 28
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I./C.O. TIPO COITO: Norm/I.
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	9 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	diario
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	1
Algia:	7
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	2
S.E.V.:	3
Blatt:	4
Ansiedad:	12
Cornell:	15
Total:	35

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	0
Culpabilidad:	2
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Ausencia de relac.
Lámina 7: Rel. madre-hija
Lámina 18: Malo, llorando.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: R.E.D. CASO: 72 N.H. 6857 EDAD: 38
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I./Esper TIPO COITO: I./Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional.
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: N
Genitales internos: Utero ligeramente en retro. Dolor palpación anejo izdo

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hiperemesis+Trastornos menstruales+Dismenorrea+ Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	6
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	0
S.E.V.:	9
Blatt:	10
Ansiedad:	25
Cornell:	17
Total:	47

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	3
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Rel. triangular
Lámina 7: Madre consuela hij
Lámina 18: Amor, cariño.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad.

PACIENTE: A.G,F CASO: 73 N.H. 7453 EDAD: 32
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: Combinac. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Muchos años
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	a veces
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: N
Vagina: Colpocele ant.Iº
Genitales internos: Anejo dch. doloroso.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	4
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	0
S.E.V.:	4
Blatt:	2
Ansiedad:	15
Cornell:	9
Total:	29

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	2
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relac. familiar.
Lámina 7: Hija no atiende
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad

PACIENTE: T. M.M. CASO: 74 N.H. 6599 EDAD: 23
PARIDAD: 0 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: DISPAREUNIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si, nov.
Mal definida:	coito.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	2
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	1
Feminidad:	3
S.E.V.:	7
Blatt:	3
Ansiedad:	14
Cornell:	5
Total:	27

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2 sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	si
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	2
Culpabilidad:	1
Feminidad:	8
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: No relaciones.
Lámina 7: No la atiende.
Lámina 18: Cuidado o agresión

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecologico.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Inseguridad-culpa.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

PACIENTE: J.R.G. CASO: 75 N.H. 7349 EDAD: 26
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: POLISINTOMATICA/ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3'5 años
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico

RECUENTO DE ATALANTA:

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	4
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	9
Blatt:	7
Ansiedad:	12
Cornell:	15
Total:	40

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	3
Culpabilidad:	1
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	0
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	No relación
Lámina 7:	Apersonación
Lámina 18:	Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa-rechazo.

PACIENTE: P.M.M. CASO: 76 N.H. 5133 EDAD: 26

PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I./Norm

MOTIVO CONSULTA: GESTACION

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años, tras 5 de vaginismo.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	si
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero gestacional como gest. 7 m.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Gestación.

RECUENTO DE ATALANTA:

Trastornos menstruales+

Agalactia.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	0
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	2
S.E.V.:	9
Blatt:	4
Ansiedad:	11
Cornell:	12
Total:	35

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	0
Culpabilidad:	4
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	1
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Relación triangular
Lámina 7:	Hija no atiende.
Lámina 18:	Mujer pide perdón

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa.

PACIENTE: D.A.E. CASO: 77 N.H. 6147 EDAD: 44

PARIDAD: 5 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ANORGASMIA Y RECHAZO SEXUAL

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/seman.
Apetencia:	no
Orgasmo:	alguna vez
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero engrosado

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	2
Rechazo sexual:	7
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	3
S.E.V.:	6
Blatt:	9
Ansiedad:	17
Cornell:	16
Total:	43

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	5
Culpabilidad:	0
Feminidad:	5
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.

Lámina 2: No relaciones

Lámina 7: Apersonación.

Lámina 18: Actitud maternal.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad

PACIENTE: M/A/G/ CASO: 78 N.H. 7615 EDAD: 37

PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 años.
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	9
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	3
S.E.V.:	5
Blatt:	8
Ansiedad:	20
Cornell:	17
Total:	20

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	1
Culpabilidad:	1
Feminidad:	1
Inseguridad:	0
Depresión:	1
Rechazo:	3
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	No relación
Lámina 7:	Hija enfadada
Lámina 18:	Riña.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero engrosado.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa-rechazo

RECUENTO DE ATALANTA:

1

PACIENTE: M.G.V. CASO: 79 N.H. 7526 EDAD: 33

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: Preservat. TIPO COITO: Condonat.

MOTIVO CONSULTA: DISMENORREA/PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Desea P.F. definitiva tras tres partos por Cesárea.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	4
Rechazo sexual:	1
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	1
S.E.V.:	10
Blatt:	6
Ansiedad:	18
Cornell:	10
Total:	39

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	2
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	Simple descrip.
Lámina 7:	Hija no atiende
Lámina 18:	No sabe.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Preocupación.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: A.S.P. CASO: 80 N.H. 7751 EDAD: 38

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: DETECCION PRECOZ

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	7 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	si
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	3-4/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	a veces
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	6
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	3
S.E.V.:	6
Blatt:	8
Ansiedad:	24
Cornell:	15
Total:	44

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	2
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	3
Rechazo:	1
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Rel. familiar.
Lámina 7:	Hija no atiende
Lámina 18:	Agresión

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Positiva

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad.

PACIENTE: E.U.G. CASO: 81 N.H. 6170 EDAD: 43
PARIDAD: 5 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: INCONTINENCIA URINARIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	mensual
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	Colpocele ant IIº
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Colpocele anterior IIº

RECUENTO DE ATALANTA:

Pérdidas reproductoras+hipogalactia+Dismenorrea+Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	7
Algia:	10
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	7
Feminidad:	3
S.E.V.:	15
Blatt:	11
Ansiedad:	27
Cornell:	20
Total:	59

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	2
Culpabilidad:	3
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Maestra en el cam.
Lámina 7: Hija triste.
Lámina 18: Culpabilidad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa-rechazo.

PACIENTE: F.J.A. CASO: 82 N.H. 6237 EDAD: 34
PARIDAD: 5 ANTICONCEPCION: Combinac TIPO COITO: Norm/Int.
MOTIVO CONSULTA: POLISINTOMATICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Muchos años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/3-4 sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez+Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	7
Algia:	8
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	3
S.E.V.:	10
Blatt:	12
Ansiedad:	27
Cornell:	24
Total:	69

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	7
Agresividad:	4
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	1
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.

Lámina 2: No relaciones.
Lámina 7: Hija no atiende.
Lámina 18: Ambibalencia.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: M.P.R. CASO: 83 N.H. 6602 EDAD: 40
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: METRORRAGIAS/MENORRAGIAS

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	10 años
Desde inicio rel. sex.:	si
Post. inicio rel. sex.:	-
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Desgarro IIº
Vagina: N
Genitales internos: Utero en retro Iº

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Metropatia hemorragica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez+Dismenorrea+Menorragias+Hiperemesis.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	5
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	1
S.E.V.:	10
Blatt:	12
Ansiedad:	29
Cornell:	19
Total:	44

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	1
Depresión:	3
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	Descripción.
Lámina 7:	"
Lámina 18:	"

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad

PACIENTE: J.O.T. CASO: 84 N.H. 6792 EDAD: 37
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: TRASTORNOS MENSTRUALES.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2-3/sem.
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero algo hipertrófico.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Trastorno funcional.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Trastornos menstruales+Hiperemesis+ Distocia funcional parto

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	4
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	7
Feminidad:	1
S.E.V.:	10
Blatt:	10
Ansiedad:	23
Cornell:	16
Total:	44

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	4
Culpabilidad:	1
Feminidad:	5
Inseguridad:	0
Depresión:	3
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	Rel.niña-hombre
Lámina 7:	Sin interés por mad
Lámina 18:	Cuidado, afecto

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Ambibalente.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad-culpabilidad.

PACIENTE: D.P.R. CASO: 85 N.H. 6364 EDAD: 41

PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	2 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/2 sem
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Desgarro perin.
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Algia Pélvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Abortos de repetición+Dismenorrea+Hipogalactia+Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	4
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	2
S.E.V.:	8
Blatt:	3
Ansiedad:	18
Cornell:	11
Total:	33

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	2
Inseguridad:	1
Depresión:	0
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relac. familiar.

Lámina 7: Hija ausente.

Lámina 18: Agresividad

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Preocupación.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Preocupación.

PACIENTE: I.B.M. CASO: 86 N.H. ? EDAD: 34

PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	no, desde molest.
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero doloroso a la palpación.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Algia Pélvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Frigidez

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	Analfa-
Algia:	beta.
Rechazo sexual:	
Rechazo embarazo:	
Feminidad:	
S.E.V.:	
Blatt:	
Ansiedad:	
Cornell:	
Total:	

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	5
Culpabilidad:	0
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	1
Rechazo:	3
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Sin rel.

Lámina 7: Hija enfadada

Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresión.

PACIENTE: Mª D.C.R. CASO: 87 N.H. 6996 EDAD: 43

PARIDAD: 6 ANTICONCEPCION: C.I./C.O. TIPO COITO: C.I./Norm.

MOTIVO CONSULTA: METRORRAGIAS

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	mensual
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Trastorno hemorragico funcional.

RECUENTO DE ATALANTA:

Trastornos menstruales.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	5
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	2
S.E.V.:	7
Blatt:	7
Ansiedad:	22
Cornell:	19
Total:	45

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	2
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	3
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Sin relación.

Lámina 7: Relac. familiar.

Lámina 18: Caido, llorando.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-depresión.

PACIENTE: J.G.A. CASO: 88 N.H. 7051 EDAD: 29
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: POLISINTOMATICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 mes.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	5
Algia:	8
Rechazo sexual:	7
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	0
S.E.V.:	7
Blatt:	9
Ansiedad:	31
Cornell:	15
Total:	52

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	4
Culpabilidad:	3
Feminidad:	4
Inseguridad:	0
Depresión:	2
Rechazo:	2
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Esposos reñidos.
Lámina 7: Tristes por ausenc. padre.
Lámina 18: Cuidado.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo.

PACIENTE: D.L-V. CASO: 89 N.H. 6261 EDAD: 45

PARIDAD: 5 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nda ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Trastornos menstruales.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	7
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	1
S.E.V.:	6
Blatt:	9
Ansiedad:	26
Cornell:	16
Total:	47

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	4
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	2
Depresión:	3
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Sra. muy pensativa

Lámina 7: Triste por falta de padre

Lámina 18: Triste, enf.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Agresividad-culpa.

PACIENTE: A.L.B. CASO: 90 N.H. 6358 EDAD: 31
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: Combinac. TIPO COITO: Norm/I/
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	3 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Hipogalactia

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	4
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	2
Feminidad:	2
S.E.V.:	4
Blatt:	4
Ansiedad:	17
Cornell:	13
Total:	35

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	0
Agresividad:	4
Culpabilidad:	2
Feminidad:	8
Inseguridad:	3
Depresión:	3
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Rel. triangular
Lámina 7:	Hija no atiende
Lámina 18:	Mujer extrangula

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Culpa-rechazo.

PACIENTE: H.L.C. CASO: 91 N.H. 7251 EDAD: 26

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I./D.I.U TIPO COITO: I/Normal

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	5 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/sem.
Apetencia:	si
Orgasmo:	a veces
Satisfacción:	alguna

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné: Desgarro Iº

Vagina: N

Genitales internos: Anejo dcho doloroso.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Congestión Pélvica

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia:	4
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	0
S.E.V.:	11
Blatt:	9
Ansiedad:	22
Cornell:	19
Total:	48

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	0
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	1
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Sin relación.

Lámina 7: Rechazo.

Lámina 18: Madre angustiada

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Preocupación

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: F.G. S. CASO: 92 N.H. 7382 EDAD: 42
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	+ de 5 años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hipogalactia+Hipermenorrea +Dismenorrea+Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	7
Algia:	4
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	3
S.E.V.:	11
Blatt:	12
Ansiedad:	26
Cornell:	17
Total:	53

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	No evaluable.
Agresividad:	
Culpabilidad:	
Feminidad:	
Inseguridad:	
Depresión:	
Rechazo:	
Percepción:	
Lámina 2:	
Lámina 7:	
Lámina 18:	

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

PACIENTE: J.M.M. CASO: 93 N.H. 7771 EDAD: 45

PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.

MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA/METRORRAGIA

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	5 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	si
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	1/15 dias
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	alguna.

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	Utero doloroso a la mov.hipertróf.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Congestión Pelvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

-

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	4
Algia.	6
Rechazo sexual:	2
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	2
S.E.V.:	5
Blatt:	8
Ansiedad:	25
Cornell:	15
Total:	46

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	4
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	1
Rechazo:	0
Percepción:	M.P.
Lámina 2:	Descripción.
Lámina 7:	Apersonación
Lámina 18:	Agresión

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Preocupación

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: E.L.F. CASO: 94 N.H. 7523 EDAD: 37
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: No TIPO COITO: Normal.
MOTIVO CONSULTA: ALGIA PELVICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	unos meses
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	2/sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	a veces
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	Desgarro IIIº
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Desgarro perineal.

RECUENTO DE ATALANTA:

Pérdidas reproductoras.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	7
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	3
Feminidad:	0
S.E.V.:	8
Blatt:	5
Ansiedad:	18
Cornell:	10
Total:	37

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	4
Culpabilidad:	1
Feminidad:	6
Inseguridad:	0
Depresión:	3
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar.
Lámina 7: Hija atiende
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-culpa.

PACIENTE: R.E.J. CASO: 95 N.H. 7041 EDAD: 37
PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: PELVIALGIA CRONICA.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	12 años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	escasa
Orgasmo:	ocasional
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-perineé:	N
Vagina:	Violácea
Genitales internos:	Dolor al tactar úterosacros.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Algia pélvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	1
Algia:	7
Rechazo sexual:	5
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	1
S.E.V.:	4
Blatt:	7
Ansiedad:	28
Cornell:	21
Total:	46

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Descripción.
Lámina 7: Ella pendiente de el
Lámina 18: Dos mujeres luchan

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad.

PACIENTE: M.G.P. CASO: 96 N.H. 6629 EDAD: 31

PARIDAD: 3 ANTICONCEPCION: C.I./C.O. TIPO COITO: Normal/I.

MOTIVO CONSULTA: DOLOR HIPOGASTRICO

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Varios años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	Al realizar coito en posición del misionero
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	si
Orgasmo:	sí, si no duele.
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Congestión pélvica.

RECUENTO DE ATALANTA:

Hiperemesis+Dismenorrea.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	3
Algia:	6
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	3
S.E.V.:	5
Blatt:	9
Ansiedad:	21
Cornell:	15
Total:	42

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	1
Agresividad:	1
Culpabilidad:	1
Feminidad:	8
Inseguridad:	0
Depresión:	5
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.
Lámina 2:	Rel. triangular
Lámina 7:	Necesidad compañia
Lámina 18:	Comprensión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-rechazo.

PACIENTE: E.M.R. CASO: 97 N.H. 7356 EDAD: 20
PARIDAD: 1 ANTICONCEPCION: Prervativo TIPO COITO: Condomatos
MOTIVO CONSULTA: DOLOR F.I.D.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	1 año.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+1/seman.
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N

Genitales internos: Dolor palpación anejo derecho.

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	3
Rechazo sexual:	3
Rechazo embarazo:	4
Feminidad:	2
S.E.V.:	8
Blatt:	2
Ansiedad:	15
Cornell:	9
Total:	31

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	5
Agresividad:	5
Culpabilidad:	1
Feminidad:	8
Inseguridad:	2
Depresión:	2
Rechazo:	3
Percepción:	B.P.

Lámina 2: No relaciones.
Lámina 7: Hija enfadada
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-agresividad-culpa y depresión.

PACIENTE: J.J.D. CASO: 98 N.H. 6190 EDAD: 39
PARIDAD: 9 ANTICONCEPCION: C.I. TIPO COITO: C.I.
MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Muchos años
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	si

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	no

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Gestante.

RECUENTO DE ATALANTA:

Pérdidas reproductoras+Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	Analfabeta.
Algia:	
Rechazo sexual:	
Rechazo embarazo:	
Feminidad:	
S.E.V.:	
Platt:	
Ansiedad:	
Cornell:	
Total:	

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	6
Agresividad:	7
Culpabilidad:	1
Feminidad:	4
Inseguridad:	2
Depresión:	1
Rechazo:	1
Percepción:	M.P.

Lámina 2: Poca elaboración.
Lámina 7: Hija escucha madre.
Lámina 18: Agresión.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

Negativa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Rechazo-agresividad.

PACIENTE: A.J.V. CASO: 99 N.H. 6573 EDAD: 31
PARIDAD: 2 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal
MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR.

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	4 meses.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	si
Concomitante:	-
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	semanal
Apetencia:	si
Orgasmo:	si
Satisfacción:	si

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico

RECUENTO DE ATALANTA:

Dismenorrea+Agalactia.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	6
Algia:	8
Rechazo sexual:	6
Rechazo embarazo:	6
Feminidad:	3
S.E.V.:	13
Blatt:	12
Ansiedad:	33
Cornell:	25
Total:	64

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	3
Agresividad:	3
Culpabilidad:	2
Feminidad:	8
Inseguridad:	2
Depresión:	4
Rechazo:	2
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Triángulo.
Lámina 7: Madre adora hija.
Lámina 18: Agresividad.

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Inmadurez-rechazo-ansiedad-depresión.

PACIENTE: T.F.J. CASO: 100 N.H. 6397 EDAD: 31

PARIDAD: 4 ANTICONCEPCION: C.O. TIPO COITO: Normal

MOTIVO CONSULTA: PLANIFICACION FAMILIAR

DATOS DE LA DISPAREUNIA

Duración:	Dos años.
Desde inicio rel. sex.:	-
Post. inicio rel. sex.:	si
Tipo:	
Entrada o penetrac.:	-
Concomitante:	si
Posterior:	-
Combinaciones:	-
Mal definida:	-

PARAMETROS SEXUALES

Frecuencia coito:	+ de sem.
Apetencia:	no
Orgasmo:	no
Satisfacción:	alguna

EXPLORACION GENITAL

Vulva-periné:	N
Vagina:	N
Genitales internos:	N

DIAGNOSTICO GINECOLOGICO

Nada ginecológico.

RECUENTO DE ATALANTA:

Frigidez.

CUESTIONARIO GINECOLOGICO

Menstruación:	2
Algia:	1
Rechazo sexual:	4
Rechazo embarazo:	5
Feminidad:	2
S.E.V.:	13
Blatt:	9
Ansiedad:	32
Cornell:	22
Total:	51

T.A.T. DE MURRAY

Ansiedad:	4
Agresividad:	3
Culpabilidad:	0
Feminidad:	6
Inseguridad:	1
Depresión:	2
Rechazo:	0
Percepción:	B.P.

Lámina 2: Relación familiar.

Lámina 7: Rel. madre hija.

Lámina 18: Ayuda a una mujer

ACTITUD SEXUAL CONSCIENTE:

No expresa.

ACTITUD SEXUAL INCONSCIENTE:

Ansiedad-depresión.

CONCLUSIONES

1º) El 40% de nuestras dispareunicas presentaron hallazgos orgánicos que justificaban la Dispareunia. El 60%, no.

Los hallazgos orgánicos más frecuentes fueron: Colpitis (25%); Estenosis vulvo-vaginales (15%); Endometriosis (15%); Cervicitis (12'5%) e Inflamaciones pélvicas (10%).

2º) La Dispareunia orgánica se produce fundamentalmente en varios momentos del coito y con gran frecuencia persiste tras finalizar éste, por eso le llamamos de combinaciones del dolor, en relación al momento del coito.
La Dispareunia funcional, es concomitante con el coito y generalmente desaparece al finalizar éste.

3º) La Dispareunia orgánica es más frecuente en mujeres de paridad nula o baja.

4º) Las dispareunicas orgánicas, más frecuentemente, no realizan contracepción. Las dispareunicas funcionales, más frecuentemente realizan contracepción con métodos no naturales.

5º) El Coito Interrumpido no influye en la Dispareunia.

6º) La Dispareunia no conlleva necesariamente anorgasmia.

7º) Las dispareunicas funcionales tienen significativamente una mayor frecuencia de orgasmo que las dispareunicas orgánicas. Tambien presentan una mayor frecuencia de relaciones sexuales, si bien ésto último no es significativo.

8º) Casi dos tercios de las dispareunicas se declaran sexualmente insatisfechas.

9º) El setenta y nueve por ciento de las dispareunicas, tanto orgánicas como funcionales,presentaron rechazo de la sexualidad en un cuestionario autoadministrado.

10º) Las dispareunicas funcionales presentaron un mayor rechazo del embarazo.

11º) Las dispareunicas funcionales presentan un mayor rechazo de la feminidad.

12º) Las dispareunicas funcionales presentan en conjunto una mayor frecuencia de ansiedad moderada.

13º) Las dispareunicas sin hallazgos orgánicos,o funcionales ,proyectan más frecuentemente historias de culpa-victimación en el T.A.T.

14º) Las dispareunicas sin hallazgos orgánicos,presentan con mayor frecuencia una percepción defectuosa de las imágenes del T.A.T.

15º) Las dispareunicas funcionales tienen preferentemente una actitud sexual negativa,reflejada en el T.A.T.

BIBLIOGRAFIA

1.- ACIEN,P.:Agenesia renal y malformaciones útero-vaginales.Acta Ginecol.Vol.XLIII,nº 5,Madrid,1986.

2.- AHMAD,J. and ARSHAT,H.:The symptomatology and diagnosis of endometriosis. Obstet. Gynecol. Indones,1978, 4/3,(148-156).

3.- ALLEN,W.M.:Chronic pelvic congestion and pelvic pain. Am. J. Obstet. Gynecol.,1970. 109:198-202.

4.- ALLEN,W.M. and MASTERS,W.:Traumatic laceration of uterine support. Am. J. Obstet. Gynecol.1955,70:500-513.

5.- AYLWARD,M.;HOLLY,F. and PARKER,R.J.: An evaluation of clinical response to piperazine oestrone sulphate (Harmoden) in premenopausal patiens. Curr. Med. Res. Opin. 1974. 2/7. (417-423).

6.- BANCROFT,J.: Human sexuality and its problems. New York: Churchill,Livingstone,1983.

7.- BLUM,M.;WERCHOW,M.E. and YESHURUN,D.: The influenze of the topycal vaginal estrogen application on the lipids metabolisme. Gynecol. Obstet. Invest.,1983.

8.- BROWN,F.R. and KEMPTON,T.: Sex questions and answers. New York: Mac. Graw-Hill.1950.

9.- BRUN,G.;SPANTZ,F.;GIRARD,P. and COSSAR,F.: Mechanical vaginal sutures after hysterectomy. Rev. Fr. Gynecol. Obstet. 1982. 77/12 (773-775).

10.- BUCKINGHAM,J.C.;BUETHE,R.A.Jr. and DANFORTH,D.N.: Collagen muscle ratio in clinically normal and clinically incompetet cervius. Am. J. Obstet. Gynecol. 91: 232,1965.

11.- CALATRONI RUIZ,C.: Terapeutica ginecológica.Ed. Panamericana. Buenos Aires. 1982.

12.- CARRASCO DE LA PEÑA,J.L.: Conformidad de un experimento con una teoria. En: El mètodo estadístico en la investigación médica. Ed. Karpos,Madrid. 1982.

13.- CARSON,C.C.III.,SEGURA,J.W. and KEYES,T.W.: Psychogis characteristics of patien with female uretral syndrome. J. Clin. Psychol. 1979; 35:312.

14.- CERDA,E.: Validez del Cornell Fn-2 en sujetos españoles. Rev. Psicol. Gin. Apl. 17,752. 1957.

15.- CHRIST,J.E. and LOTZE,E.C.: The residual ovary syndrome. Obstet. Gynecol. (N.Y),1975. 46/5,(551-556).

16.- COHEN,J.C.: Reproduction. pp.67-72. London;Butterwoths.1977.

17.- COLECTIVO DE MUJERES DE BOSTON: Nuestros cuerpos,nuestras vidas. 1ª ed. esp. 1985.

18.- COSTA TALENS,P. y COLORADO VICENTE,M.J.: Un problema ginecológico en el papiro de Ramssem IV. Med. Esp. 1971. 66/392,(274-276).

19.- CUENCA,C.: Diagnóstico psicológico en Ginecologia. Actual. Clin. Ob. Gin. 1960.

20.- CUENCA,C y SALVATIERRA,V.: Validación del cuestionario Cornell Index Fn-2 en pacientes ginecológicas. Actual. Clin. Ob. Gin. 8,251.1968.

21.- CUENCA,C.: Aplicación del T.A.T. en ginecología.Conferencia al I curso de Ginecología Psicosomática.Málaga.1975.

22.- CUENCA,C.: Investigaciones sobre el uso del cuestionario Cornell Fn-2 en Ginecología.Tesis Doctoral.Gráficas del Sur.Granada.1977.

23.- CUENCA,C. y SALVATIERRA,V.: El Cuestionario Ginecológico: comunicación preliminar.Actas XVI Reunión Sec. Esp. Med. Psicosomática. Granada,1978.

24.- CUENCA,C. y SALVATIERRA,V.: El cuestionario Cornell Fn-2 como medida del neuroticismo en diversos cuadros ginecológicos. Rev. Esp. Obst. y Gin. 38,326. 1979.

25.- CUENCA,C. y SALVATIERRA,V.: Test de Apercepción Temática de Murray y comportamiento sexual.Rev. de Psiq. y Psicol. Med.,15,49. 1981.

26.- CUENCA,C.;SALVATIERRA,V. y FLORIDO,J.: Comportamiento sexual y frecuencia de orgasmo en pacientes obstetricas y ginecológicas. En "Comportamientos sexuales". Ed. Fontanella. Barcelona.1980.

27.- DANFORTH,D.N. et al.: Conective tissue changes incident to cervical effacement. Am. J. Obst. Gynecol. 80:939,1960.

28.- DEBRUX,J.A.;BRET,J.A.;DEMAY,C. & BARDIAUX,M.: Recurring pelvic peritonitis.A coment on the Allen Masters Syndrome. Am. J. Obstet. Gynecol. 1968. 102-4 (501-505).

29.- DE GRAFF,R.: New treatise concerning de generative

orgams of women. In: Ladas,A.K.;Whiple,B.;Perry,J.D. eds. The G spot and other recent discoveries about human sexuality. N.Y. :Holt,Riverhart & Winston,1982.

30.- DEXEUS FONT,S.: Tratado de Ginecología. Salvat ed. Barcelona,1970.

31.- DICKENSON,R.L.: Human Sex Anatomy.2ª ed. London.Bailliere Tindall. 1948.

32.- DOCUMENTA GEIGY: Tablas científicas.6ª ed.SADAG.Barcelona. 1965.

33.- DUNCAN,E.H. y TAYLOR,H.C.: A psychosomatic study of pelvic congestion. Am. J. Obstet. Gynecol. 1962,64:1.

34.- EICHNER,W.: Psychogenesis and therapy of funcional sex disorderes in the female. Am. Weit. 1976. 24/33-34, (1270-1272).

35.- EICHNER,W & KUBLI,F.: Psychosexual problems in gynecology. Geburtsh Frauenheilk,1973. 33/9, (732-736).

36.- EYSENCK,H.J.: Fundamentos biológicos de la personalidad. Ed. Fontarella,1ª ed..Barcelona,1970.

37.- FASTH,S.;FILIPSSONS,A;HELLBERG,R.: Sexual disfuntion folloving proctocolectomy. Ann. Chir. Gynecol. Fenn. 1978. 67/1,(8-12).

38.- FINK,P.: Dyspareunia: current concepts. Med. Asp. Hum. Sex. 1972.6:28.

39.- FISHER & YATES: Statical tables for Agricultural,Biological and Medical Research.Ed. Oliver &Boyd. 1953.

40.- FISHER,S.: The female orgasm.-Psychology,Physiology, Fantasy. New York: Basic Books.1973.

41.- FISHER,S.: Understanding the female orgasm.New York. Bantan Books. 1973.

42.- FORDNEY,D.S.: Dyspareunia and Vaginismus.Clin. Obst. Gynecol. 1978. 21/1.(205-221).

43.- FORSBERG,J.G.: Cervico vaginal epitelium: its origin and developement. Am.J.Obst.Gynecol. 6:115:1025. 1973.

44.- FOX,C. & FOX,B.: A comparative study of coital sexual climax. J. Sex. Marital Ther. 1971; 24,319.

45.- FRANCIS,W.J.A. & JEFFCOATE,T.N.A.: Dyspareunia following vaginal operations. J. Obst. Gynecol. Br. Commonwlth. 1961.(1-10).

46.- FULLERTON,W.: Dyspareunia. Br. Med. J. 1971,2:31.

47.- GALLO,M.A.: Estudio de los factores psicológicos y sexuales en la pelvialgia crónica. Tesina de Licenciatura. Univ. de Granada.1986.

48.- GARDNER,H.I.: The vulvovaginitides (New interpretations and treatment methods.In: Taymor,M.L.;Green,T.H. deds).Progress in Gynecol.Grunex Straton. N.Y. 307-338.

49.- GILLILAND,B.C. & MANNIK,M.:Rhematoid Arthritis.In: G.W.Thorn;R.D.Adams;E.Braunwald;K.J.Isselbacher and R.G. Petersdorf eds. Harrison's.Principles of Internal Medicine.(8th ed.) N.Y. Mc Graww-Hill Book Co. 1977.pp 2050-2061.

50.- GONZALEZ MERLO,J.: Ginecología.Salvat ed. Barcelona. 1977.

51.- GRABER,E.A.;BARBER,H.K.;O'ROURKE,J.J.: Newlywed apareunia. Obst. Gynecol.(N.Y.)1969. 33/3, (418-421).

52.- GRIMM,E.R. & VERNERY,W.R.: The relationship of emotional adjustement and attituds to the course and out comon of pregnancy.Psychosomatic Medicales,28, 34, 1966.

53.- HALSPELS,A.A.: Iatrogenic dyspareunia after gynecological treatment.In: Musaph,H.;Halspels,A. eds. Dyspareunia.Aspects of peinful coitus. Bon Scheltema & Holkema.

54.- HAMMOND,C.B.;HANEY,A.F.: Conservative treatment of endometriosis. Fertility and Sterility. 1978. 30/5. 467-509.

55.- HEATH,R.G.: Pleasme and brain activity in man. Journal of Nervus and Mental Diseases. 154,3. 1972.

56.- HEINOMEN,P.K.: Longitudinal vaginal septum. Eur.J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1982. 13/4,(253-258).

57.- HENRY,W.E.: The Tematic Apperception Technique in the study of the culture,personality and relations.Ed. Genetic Psichology Monograph. 1947.

58.- HERRERA VENTURA,E.: Sexualidad en la menopausia.Ponencia en XXII Reunion de la Sociedad Española de Med. Psicosomática. Torremolinos. 1986.

59.- HILMAN,H.: Compemdio de los test psicodinámicos.

Ed. Kapeluz.Buenos Aires,1962.

60.- HITE,S.: The hite repport.N.Y. Dell Publishing.1977.

61.- HITSCHMANN,F.;ADLER,L.: The estructura of endometrium of the sexuality mature woman. Machr. Geburtsh Gynaek. 27:1,1908.

62.- HODSGON,B.I.;EDDY.C.A.: The automatic nervous sistem and is relationship to tubal ovum transport.-A reppraisal. Gynecol. Invest. Gi. 161. 1975.

63.- HOFF,J.: Treattement of dyspareunia. Rev. Med. Toulouse. 1980. 16/supp.5. (361-368).

64.- HORNEY,K.: Psicoligia femenina. Alianza Editorial. 1986.

65.- HORSTEIN,F.X. & FALLER,A.: Gesundes Geschlechts Leben. In: Handbuch für Ehefragen.Olten. Switzerland: Otto Walter. 1950.

66.- HUFFMAN,J.W.: Uterine dysplacement as a cause of dyspareunia. Med. Aspects. Human. Sex. 1976.10/12. (62-71).

67.- IOSIF,C. & BEKASSY,Z: Prevalence of genito-urinary symptoms in the late menopause. Acta, Obstet. Gynecol. Scand. 1984. 63/3.

68.- JACOBO,E.: Diseases of the urethra.In: Buchsbaum.H.S.; Schmid,J.D. (eds.)Gynecologic and Obstetric Urology. Saunders. Philadelphia.London,1978.pp 325-346.

69.- JAMES,C.E,;BREESON,A.J.;KOVAS,G. et al: The syntoma-

tology of the climateric in relation to hormonal and cytological factors. Gr. Br. J. Obstet. Gynecol.1984. 91/1, (56-62).

70.- JEFFCOATE,T.N.A.: Posterior colpoperineorrhaphy. Am. J. Obstet. Gynecol. 77-490:502,1959.

71.- JIMENEZ GARCIA,A.: Factores psicosociales de la Planificacion Familiar en la provincia de Granada:Un análisis diacrónico.Tesis doctoral.Universidad de Granada.1985.

72.- KAPLAN,H.S.: The new sex therapy. USA: Brunner/Mazel 1974.

73.- KAPLAN,H.S.: Disordes od the sexual desire.New York: Brunner/Mazel. 1979.

74.- KAPLAN,D.L.;STEEGE,J.F.: The urethral syndrome: sexual components. Sexuality and Disability.Clin. Obstet. Gynecol. 27,3,973. 1984.

75.- KÄSER,O.;VETER.L. & HIRSCH,H.A.: Traumatic clamage to the utherine supports (Allen Masters Syndrome). Geburtsh. Frauenheil K. 1971. 31/2. 113-118.

76.- KÄSER,O.;IKLE,F.A. HIRSCH,H.A.: Atlas der Gynäkologischen operationen. 3rd ed. Thieme.Stuttgart. 1973.

77.- KÄSER,O.;FRIEDBERG,V.;OBER,E.K.;THOMSEM,K.;ZANDER,J.: Obstetricia y Ginecologia. Salvat ed. Barcelona.1974.

78.- KJLKU,P.;ERKKOLA,R. and GRONROOS,M.: Nom especificity of symptoms related to adenomyosis.A prospective comparative survey.Act. Obst.Gynecol.Scand. 1984. 63/3 (229-3).

79.- KILKU,P.: Supravaginal uterine amputations us hysterectomy.Effects on coital frecuency and dyspareunia. Acta Obst. Gynecol. Scand. 1983. 62/2, (141-145).

80.- KINSEY,A.C.;POMEROY,W.B.;MARTIN,C.E. & GEBHARD,P.H.: Sexual Behavoir in the human female.Philadelphia:W/B. Saunders.1953.

81.- KISTNER,R.W.: Management of endometriosis in the infertile patient. Fertility and Esterility. 26:1151-1166. 1975.

82.- KNORR,K.;BELLER,F.K. & LAURITZEN,C.H.: Manual de Ginecología. Ed. Cientifico-Medica. 1975.

83.- KOLODNY,R.C.;MASTERS,W & JOHNSON,V.: Tratado de Medicina Sexual. Salvat Ed. 1983.

84.- KOLODNY,R.C.: Effects of alphametil-dopa on male sexual function.Sexuality and Disability. 1:223-228. 1978.

85.- KORTEW,J.: Indicationes and executing of intravaginal estrogen therapy with Dienostrol Orthovaginal cream. Fortschr. Med. 1973. 91/22-23,(921-928).

86.- KRANTZ,K.E.: Inervation of the human vulva and vagina. Obstet. Gynecol. 13:328- 1958.

87.- LANGLOIS,P.L.: The size of the normal uterus. J. Reprod. Med. 4:22, 1970.

88.- LAMONT,J.: Vaginismus. Am.J.Obstet.Gynecol. 1978. 131:632.

89.- LAMONTAGNE,Y. & NOBERT,F.: Treatment of female sexual disfunction. Can. Un. Med. Canadá. 1976.

90.- LAVER,M.C.: Sexual behavoir patterns in maly hypertensives. Australiam and New Zeland Journal of Med. 4:29-33,1974.

91.-LERNER,M.: Un caso de dispareunia y vaginismos tratado básicamente con psicoterapia de Roger. Psiquiat. Psicol. Amer. Lat. 1971. 17/1 (19-32).

92.- LEVIN,R.J.;WAGNER,G.: Human vaginal fluid-ionic composition and modification by sexual arousal. Journal of Psichology,2666,62-638. 1977.

93.- LEVIN,R.J.;WAGNER,G.: Haemodinamic changes of the human vagina during sexual arousal assesed by a heated oxygen electrode. Journal of Psichology. 275, 23-24p. 1978.

94.- LEVIN,R.J. & WAGNER,G.: Influence of atropine of sexual arousal and orgasm in women - a pilot study.In: Medical Sexology (Proceedings of the International Congress of Medical Sexology,Roma) Ed. Forleo.R.; Pasini,W. pp 618-624. Littleton,Massachusetts:PSG publishing. 1980.

95.- LIEVEAUX,A.: Dyspareunia (with a repport of 143 cases): Rev. Franç. Gynec. 1967. 62/6,309-314.

96.- LONDON,N.B.;GOLDANE,M.J.;LONDON,J.D. & VESEY,M.P.: Genito urinary simtoms and sings in women ussing diferent contraceptive met Br.J.Fam.Plann. 1982. 8/1,3-6.

97.- LUDWING,H.& METZER.H.: Human female reproductive tract a scannig electron microscopic atlas. p.14. Berlin. Springer-Verlag. 1976.

98.- MARTIN,A.;BOLAÑOS,M.J.;LUNA,J.D. y SANCHEZ-CANTALEJO,E.: Bioestadistica. Granada. 1981.

99.- MARQUETTE,G.P.;SU,B. & WOODDRUF,J.D.: Introital adenosis associated with Stevens-Jhonson syndrome. Obst. Gynecol. 1985. 66/1 (143-145).

100.- MASTERS,W.H.: The sexual response cicle of the human female: vaginal lubrication. Annals of the New York Academy of Sciences. 83,30. 1959.

101.- MASTERS,W.H. & JOHNSON,V.E.: Human sexual response. Boston. Little Brown. 1966.

102.- MAXIMOV,A.A. & BLOOM,W.: A text of Histology.Philadelphia: W.B. Saunders. 1903.

103.- MEAD,M.: Male and female. New York: William Morrow. 1949.

104.- MEARS,E.: Dyspareunia. Brit. Med. J.1958.509,3,(443-445).

105.- MESSIT,J.J.: Dyspareunia from autosuture staples.A repport of two cases. Obstet. Gynecol. (N.Y.),1977. 48/3.(369-370).

106.- MOLL,A.: The sexual life of the child.New York: Macmillan.1912.

107.- MUNSICK,R.A.: Introital operations for dyspareunia. Indiana Univ. Sch. Med. Indianapolis. Ind. USA. Clin. Obstel. Gynecol. 1980. 23/1,(243-271).

108.- MURRAY,H.A. & MORGAN,CH.D.: A method for investigation phantasies: the Tematic Apperception Test. Ed. Paidos. Buenos Aires. 1975.

109.- NAGATA,I.;KATO,K.:FURUYA,K. & KUKI,E.: Abdominal repair of vaginal prolapse and the postoperative outcome as judged by a scoring system and X-ray colpografi. Arch. Gynecol. 1985. 237/1. (11-17).

110.- NEWMAN,R.J. & SALERNO,H.R.: Sexual disfuntion due to methyldopa (letter). Brit. Med. J. 4:106,1974.

111.- NOVAK,J.: Nature and tratement of vaginismus.Urol. Cutan. Rev. 1948;52:128.

112.- NOVAK,E.R. & WOODRUF,D.: Ginecología y Obstetricia. Ed. Alhambra. 1985.

112.- O'NEIL: I. Sindrome de Atalanta.Citado por SALVATIERRA,V. en: La reacción psicoendocrina.Curso para residentes.1980.

113.- PAGE,L.S.: A avising hypertensive patients about sex. Medical Aspects of Human Sexuality.9(1):103-104.1975.

114.- PARRILLA,F.: Diagnóstico diferencial de las pelvialgias crónicas sin lesión. Tesis Doctoral.Univ. de Granada,1977.

115.- PATERSON,M.E.L.;JORDAN,J.A. & LOGAN,E.R.: A survey of 100 patients who had laparoscopic ventresuspension. Brit. J.Obst.Gynec. 1978. 85/6.(468-471).

116.- PATIL,U.;NESBITT,R. & MAYER,R.: Genitourinary tract injuries due to fracture of the pelvic in female: secuelac and their managemnet. Br. J. Urol. 1982, 54/1,(32-38).

117.- PERLEY,M.J. & GUZE,S.B.: Hysteria.- The stability and usefulness of clinical criteria. New England J. of Medicine. 266:421-426. 1962.

118.- PYRTELL,J.J.;ROBINS,E. & COHEN,M.E.: Observation on clinical aspects of hysteria. J. of the Am. Med. Ass. 146,902-909. 1951.

119.- RABOCH,J.;BARTAK,V. & LUKSC,M.F.: Dyspareunia in women with chronic genital inflamation. Zbl. Gynek. 1964. 86/28, (979-983).

120.- RABOCH,J. & BARTAK,V.: Contribution to the study of sexual dyspareunia in female. C.S. Psichyat. 1968. 64/5, (314-318).

121.- RANKIN,R.P.: The use of Z-plasty in gynecologic operations: case report. Am.J.Obstet. Gynecol. 117: 231-232.

122.- REIFFENSTUHL,G.;PLATZER,W.: Operaciones por via vaginal. Salvat ed. Barcelona,1978.

123.- REMINGTON,R. & SCHORK,M.A.: Fundamentos generales y estadigráficos ji-cuadrado básico.En: Estadística Biomédica y Sanitaria.Ed. Prentice Hall International. Madrid.1974.

124.- RENAER,M.;VERTOMMEN,H.;NIJS,P. et al.: Psychological aspects of chronic pelvic pain in women. Am. J.

Obstet. Gynecol. 134,75. 1979.

125.- RENAER,M.;NIJS,P. & VAN ASSHE,A.: Chronic pelvic pain without obvius pathology in women. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 10/6,415-462. 1980.

126.- RENAER,M.: Chronic pelvic pain in women. Ed. Springer-Verlac. Berlin,1981.

127.- SALVATIERRA,V.: Tensión emocional durante el embarazo.Conferencia en el curso sobre asistencia prenatal. Univ. Menendez Pelayo. Santander. 1975.

128.- SALVATIERRA,V.: La depresión en la clínica ginecológica. En: Las depresiones en el curso de la enfermedad somática. Servic. Public. Minist. San. y Cons. Madrid. 1985.

129.- SCHWALM,H. & DURRAUSZKY,V.: The structure of the musculature of the human uterus-muscles and conective tissue. Am. J. Obstet. Gynecol. 94:391. 1966.

130.- SEMMENS,C.P.;TSAI,C.C.; SEMMENS,E.C. & LOADHOLT,C.B.: Effects of the estrogen terapy au vaginal phisiology during menopause. Obstet. Gynecol. 1985. 66/1 (15-18).

131.- SERRAYN,R. & VANDLKERCKHOVE,D.: Lacerations of the broad ligament. A critical approach to the Allen-Masters Syndrome. Eur. J. Obstet. Gynecol. 1972. 2/5. (133-139).

132.- SHAINESS,N.: Sexual problems of women. J. Sex. Marit. Thre. 1974. 1:100.

133.- SHERFEY,M.J.: The evolution and nature of female

sexuality in relation of psychoanalitic teory. J. of Am. Psychoan. Ass. 14,28. 1966.

134.- SIMONS,S.C.: Dyspareunia following repair. J. Obstet. Gynecol. Br. Cwlth. 1963,70/3,(476-478).

135.- SINGER,I.: The goals of human sexuality. London: Wilwood Hous. 1973.

136.- SOTILE,W. & KILMANN,P.: Treatment of psychogenic female sexual disfunction. Psychol. Bur.,1977,84:619.

137.- STEEGE,I.: Dyspareunia and vaginismus. Clin. Obstet. Gynecol. 27/3.960-973. 1984.

138.- STEG,G.: La dyspareuni. Dans: La douler pelvienne chronique. Ed. Masson.Paris. 1981.

139.- STONE,H.M. & STONE,A.A.: Marriage manual. N.Y.: Simons & Schuster,1953.

140.- SYMONDS,P.M.: Manual for Symonds picture-story test. New. York. Ed. Bureau of Publication Teachers College Columbia Univ. 1949.

141.- TESTUT,L. & LATARJET,A.: Anatomía Humana. Salvat ed. Barcelona,1971.

142.- THIERY,M.;BUYSE,G.;HASPELS,A.A.: Anticonceptive.Staflen,Leiden. 1971.

143.- TOMKINS,S.S. & TOMKINS,E.S.: The tematic apperception test. The theory and technique of interpretation. Ed. Grune Stratton. New York. 1948.

144.- URBACH,K.: Uber die zeitliche gefunlsdifferenz der geschlechter wahrend der kohabitation. Z. Sexualwis. 8: 124-138. 1921.

145.- VAN DE VELDE, H.: Ideal marriage. N.Y. Cocovi-Friede. 1930.

146.- WEISBERG,M.: Fisiologia de la función sexual femenina. Cin. Obstet. Ginec. 3,890-902. 1983.

147.- WEISMAN,A.I.: Spermatozoa and sterility. N.Y.: Paul B. Hoeber. Inc. 1941.

148.- WENGER,M.A.;JONES,F.N.;JONES,M.H.: Physiological Psichology. London: Constabl. 1956. 347-348.

149.- WILLIAMS,E.A.: Congenital abscense of the vagina. A simple operation for its relief. J. Obst. Gynecol. Br. Cwlth. 77: 511-516. 1964.

150.- WOODRUFF,R.A.;GOOWIN,D.W. & GUZE,S.B.: Psychiatric Diagnosis. N.Y. Oxford Univ. Press. 1974.

151.- WOODRUFF,J.D. & PARMLEY,T.H.: Infection of the minor vestibular gland. Obstet, Gynecol. 1983. 62/5. (609-612).